



J. M. ALDRICH
National Museum
WASHINGTON, D. C.

KATALOG
DER
PALÄARKTISCHEN DIPTEREN

BEARBEITET VON

TH. BECKER, Dr. M. BEZZI, Dr. K. KERTÉSZ
und P. STEIN.

BAND III.

CYCLORRAPHA ASCHIZA,
CYCLORRAPHA SCHIZOPHORA : SCHIZOMETOPA

VON Dr. M. BEZZI UND P. STEIN.

BUDAPEST.

1907.

Abgeschlossen den 1. December 1907.

DEGONIC-NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEGED.

IV. INS.
U. S. NATL. MIS.

CYCLORRHAPHA.

Aschiza.

SYRPHOIDEA.

SYRPHIDAE.

Syrphinae.

Paragus

LATR., Hist. nat. crust. ins., III. (1802) et XIV. 359. (1804).

aegyptius MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 464. (160). 2. (1850). Aegyptus.

aeneus MEIG. = **tibialis** FALL.

albifrons FALL., Dipt. Succ. Syrph., 60. 6. [*Pipiza*] (1817); MEIG., S. B., III. 181. 8. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 186. (38). Europa.

5. (1827) et Suit. à BUFF., I. 566. 9. (1834); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1842. 163. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 851. 4. (1843); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 309. 1. (1857) et F. A., I. 258. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 284. 2. (1861); VERR., Entom. Monthly Mag., IX. 286. (1873) et Cat. europ. Syrph., 21. (1909).

ater MEIG., S. B., III. 182. 9. (1822); MACQ., Suit. à BUFF., I. 567. 10. (1834); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 188. 7. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 36. (1868).

lavandulae ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 140. (1865).

majoranae ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 192. 6. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 140. (1865).

Pecchiolii ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 192. 4. [*Pecchiolii*] (1857).

?*thymastri* FABR., Spec. ins., II. 433. 60. [*Syrphus*] (1781), Mant. ins., II. 340. [*Syrphus*] (1787) et Syst. Antl., 250. 4. [*Seavea*] (1805); VILL., Entom. linl., III. 459. 124. [*Musca*] (1789).

?*thymastri* PANZ., Fauna germ., LX. 12. [*Syrphus*] (1798); LATR., Gen. crust. ins., IV. 326. (1809) et Cons. gén., 413. (1810); ROND., N. Ann. Sci. Nat. Bologna, (2) VIII. 349. (1817) et Dipt. ital. Prodr., II. 188. 5. (1857).

albipes GIMM. — *tibialis* FALL.

algirus MACQ. — ? *strigatus* MEIG.

angustifrons LW. **bicolor** FABR. var. **lacerus** LW.

arcuatus MEIG. **bicolor** FABR. var.

ater MEIG. — **albifrons** FALL.

auricaudatus BIG. **tibialis** FALL.

- bicolor** FABR., Entom. syst., IV. 297. 71. [*Syrphus*] (1794), Suppl., 559. 8. [*Mulio*] (1798) et Syst. Antl., 186. 10. [*Mulio*] (1805); GEOFFR., Hist. d. Ins., II. 520. 51. [—] (1762); COQUEB., Ill. icon., 102. t. XXIII. f. 9. [*Syrphus*] (1804); LATR., Dict. hist. nat. Deter., XXIV. 194. 565. (1804), Hist. nat. crust. ins., XIV. 359. (1804), Gen. crust. ins., IV. 326. (1809) et Cons. gen., 443. (1810); MEIG., S. B., III. 178. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 185. (37). 2. t. I. f. 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 565. 2. t. XII. f. 17. (1834); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 600. (1840); ZETT., Dipt. Scand., II. 849. 1. (1843); RONSD., N. Ann. Sci. Nat. Bologna. (2). VIII. 345. (1847) et Dipt. ital. Prodr., II. 194. 11. (1857); WALK., Ins. Brit., I. 268. 1. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 301. 5. (1857) et F. A., I. 259. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 284. 1. (1861); DISCONZI, Entom. vicent., 220. f. 257. (1865); WILL., Syn. N. A. Syrph., 18. t. I. f. 7, 9. (1886); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 78. (1893); TYL.-TOWNS., Psyche, VIII. 139. (1897); CHAGNON, Nat. Can., 1901. 21. (1901); VERR., Brit. Fl., VIII. 152. 2. (1901).
angustifrons LW., Berlin. entom. Zeitschr., VII. 309. 64. (1863); WILL., Syn. N. A. Syrph., 17. (1886).
cruentatus GEOFFR., apud Fourc., Entom. paris., II. [*Musca*] (1785); VILL., Entom. linn., III. 462. 135. t. IX. f. 22. [*Musca*] (1789).
melanochrysa GIMMEL., Syst. nat., V. 2879. 374. [*Musca*] (1788).
punctulatus ZETT., Ins. Lapp., 617. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 850. 2. (1843) et XIII. 6033. 2. (1859).
ruficauda ZETT., Dipt. Scand., II. 852. 5. (1843).
sevarcuatus BIG., Ann. Soc. entom. Fr., (4). II. 113. 4. (1862); RONSD., Atti Soc. ital. Sci. nat., XI. 35. (1868); VERR., Brit. Fl., VIII. 154. f. 178. (1901).
zonatus MEIG., S. B., III. 177. 1. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 184. (36). 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 565. 1. (1834); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 302. 6. (1857).
var. **arcuatus** MEIG., S. B., III. 179. 3. t. XXVII. f. 20, 21. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 565. 3. (1834); LW., Programm Posen, 27. 1. (1840) et Isis, 1840. 544. 1. (1840); WALK., Ins. Brit., I. 268. 2. (1851); RONSD., Dipt. ital. Prodr., II. 189. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 35. (1868).
var. **lacerus** LW., Programm Posen, 27. 2. (1840) et Isis, 1840. 544. 2. (1840); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1842. 163. (1842); RONSD., Dipt. ital. Prodr., II. 194. 10. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 303. 7. (1857) et F. A., I. 258. (1862); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 78. (1893).

Europa,
Africa sept.

Europa centr.
et mer.

Europa centr.
et mer.

- var. taeniatus* MEIG., S. B., III. 179. 4. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 186. (38). 3. (1827) et Snit. à Buff., I. 565. 4. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 850. 3. (1843); ROND., Atti Soc. ital. Sci. nat., XI. 35. (1868); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 147. 114. (1899) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hereceg., VII. 585. (1900).
- var. testaceus* MEIG., S. B., III. 180. 6. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 566. 6. (1834); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 195. 12. (1857). Europa centr. et mer.
- bifasciatus* MACQ. = **quadrifasciatus** MEIG.
- bimaculatus* WIED. = **strigatus** MEIG.
- cinctus** SCHIN. et EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, III. 96. (1853); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 300. 2. (1857) et F. A., I. 257. (1862); JAROSCH., Trud. Naturf. Ges. Karkoff, XX. 4. 10. (sep.) (1886); VERR., Cat. europ. Syrph., 20. (1900). Europa centr. et mer.
- abracteus* ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 193. 8. (1857).
- abracteatus* SCHIN., F. A., I. 259. (1862) et Cat. syst. dipt. Europ., 112. (1864).
- ? *excalceatus* ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 34. (1868).
- intermedius* PALMA, Ann. Acc. asp. nat., (3). III. 63. 113. f. VII. f. 15. (1864); A. COSTA, Ricerche entom. sopra i monti Partenii, Napoli, 23. (*sine nomine*) (1858); ROND., Atti Soc. ital. Sci. nat., XI. 35. (1868).
- coadunatus* ROND. = **tibialis** FALL.
- compeditus** WIED., AUSSER. zweifl. Ins., II. 89. 3. (1830). Aegyptus.
- cruentatus* GEOFFR. = ? **bicolor** FABR.
- dimidiatus* LW. = **tibialis** FALL.
- dispar* SCHUMM. = **tibialis** FALL.
- abractus* ROND. = **cinctus** SCHIN. et EGG.
- abracteatus* SCHIN. = **cinctus** SCHIN. et EGG.
- excalceatus* ROND. = ? **cinctus** SCHIN. et EGG.
- fasciatus** COQUILL., Proc. U. S. nation. Mus., XXI. 320. (1898). Japonia
- femoratus* MEIG. = **tibialis** FALL.
- geniculatus* CURT. = **tibialis** FALL.
- hemorrhous* MEIG. = **tibialis** FALL.
- intermedius* PALMA = **cinctus** SCHIN. et EGG.
- lacerus* LW. = **bicolor** FABR. *var.*
- lavandulae* ROND. = **albifrons** FALL.
- majoranae* ROND. = **albifrons** FALL.
- melanochrysa* GIMEL. = ? **bicolor** FABR.
- mundus** WOLL., Ann. Mag. Nat. Hist., (3). I. 114. t. V. f. 4. (1858). Madera.
- nigritus* GIMM. = **tibialis** FALL.
- nitidissimus** A. COSTA, Atti Acc. Napoli, VII. 15. (1875). Aegyptus.
- numida** MACQ., Luc. Explor. Alger. Zool., III. 471. 179. t. V. f. 12. (1849). Algeria.
- obscurus* MEIG. = **tibialis** FALL.
- Pecchiolii* ROND. = **albifrons** FALL.
- productus** SCHIN., F. A., I. 258. (1862). Europa centr.
- pulcherrimus** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 78. (1893). Europa mer.
- punctulatus* ZETT. = **bicolor** FABR.

- quadrifasciatus** MEIG., S. B., III. 181. 7. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 566. 7. (1834); ROND., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (2). VIII. 347. (1847) et Dipt. ital. Prodr., II. 189. 9. (1857); SEMS., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 300. 3. (1857) et F. A., I. 258. (1862); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 79. (1893) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herzeg., VII. 586. (1900).
bifasciatus Macq., Suit. à Buff., I. 566. 8. (1834); MEIG., S. B., VII. 108. 16. (1838).
quadrivittatus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 186. (38). 4. (*f-vittatus*) (1827).
quadrivittatus Macq. — **quadrifasciatus** MEIG.
ruficauda ZETT. = **bicolor** FABR.
sevarcuaus BIG. — **bicolor** FABR.
sigillatus CURT. — **tibialis** FALL.
- strigatus** MEIG., S. B., III. 180. 5. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 565. 5. (1834); VERR., Cat. europ. Syrph., 21. (1900).
 ? *algius* Macq., Luc. Explor. Alger. Zool., III. 471. 178. t. IV. f. 12. (1849).
bimaculatus WIED., Anal. entom., 33. 48. (1824) et Ausser. zweifl. Ins., II. 89. 2. (1830); MEIG., S. B., VII. 108. 15. (1838); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 301. 4. (1857) et F. A., I. 258. (1862); JAROSCH., Trud. Naturf. Ges. Karkoff, XX. 6. 11. (*sep.*) (1886).
Tuechettii ROND. = **tibialis** FALL.
tacniatus MEIG. = **bicolor** FABR. *var.*
tarsatus ROND. — **tibialis** FALL.
testaceus MEIG. = **bicolor** FABR. *var.*
thymastri FABR. = ? **albifrons** FALL.
thymastri PANZ. = ? **albifrons** FALL.
- tibialis** FALL., Dipt. Succ. Syrph., 60. 5. [*Pipiza*] (1817); MEIG., S. B., III. 183. 13. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 187. (39). 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 567. 14. (1834); ZETT., Ins. Lapp., 618. 2. (1838) et Dipt. Scand., II. 852. 6. (1843); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1842. 164. (1842); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 303. 8. (1857) et F. A., I. 257. (1862); BONSD., Finkl. Insekt., I. 284. 3. (1861); WILL., Syn. N. A. Syrph., 19. t. I. f. 8. (1886); TYL-TOWNS., Psyche, VIII. 140. (1897); VERR., Brit. Fl., VIII. 150. 1. f. 175—177. (1901).
aeneus MEIG., S. B., III. 183. 11. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 567. 12. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 854. 8. (1843) et VIII. 3188. 8. (1849).
albipes GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 668. (1842).
auricaudatus BIG., Ann. Soc. entom. France, (6). III. 540. (1883).
coadunatus ROND., N. Ann. Sci. Nat. Bologna, (2). VIII. 346. (1847) et Dipt. ital. Prodr., II. 190. 1. (1857); SEMS., Novara Dipt., 369. 103. (1868).
dimidiatus Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VII. 308. 63. (1863);
- Europa centr.
et mer.
- Europa mer.
Africa sept.
- Europa,
Africa sept.,
Madera.

WILL., Syn. N. A. Syrph., 20. (1886) et Biol. centr. amer., III. 5. (1891).

dispar SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1842. 163. (1842).

femoratus MEIG., S. B., III. 184. 14. (1822); CURT., Brit. entom., 593. (1835); WALK., Ins. Brit., I. 268. 4. t. X. f. 3. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 188. 2. (1857).

geniculatus CURT., Guide sec. edit., 250. 5. (1837).

haemorrhous MEIG., S. B., III. 182. 10. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 567. 11. (1834).

nigritus GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 668. (*nigritis*) (1842).

obscurus MEIG., S. B., III. 183. 12. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 187. (39). 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 567. 13. (1834); CURT., Brit. Entom., 593. (1835); WALK., Ins. Brit., I. 268. 3. (1851); STROBL, Wiss. Mittheil. Bosn. Herezeg., VII. 585. (1900).

sigillatus CURT., Brit. Entom., 593. (1835).

Taechettii ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 140. (1865).

tarsatus ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 191. (1857).

trianguliferus ZETT., Ins. Lapp., 618. 3. (1838) et Dipt. Scand., II. 853. 7. (1843); BONSD., Finnl. Insekt., I. 284. 4. (1861).

varipes BIG., Ann. Soc. entom. France, (5). X. 150. [*Orthoneura*] (1850) et (6). V. 249. [*Orthoneura*] (1885).

trianguliferus ZETT. **tibialis** FALL.

varipes BIG. **tibialis** FALL.

zonatus MEIG. - **bicolor** FABR.

Triglyphus

Lw., Programm Posen, 30. XV. (1840) et Isis, 1840. 563. XV. (1840).

primus Lw., Programm Posen, 30. I. f. 38—40. (1840) et Isis, 1840. Europa centr. 563. I. t. I. f. 38—39. (1840); SCHN., F. A., I. 266. (1862). et mer.

Pipizella

ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 54. (1856) et II. 185. (1857).

Heringia ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 53. (1856) et II. 184. [*Heryugia*] (1857).

Phalangus MEIG. in litt ap. MEIG., III. 253.

annulata MACQ. **virens** FABR.

atra Lw. ? **Heringi** ZETT.

biguttata CURT. **flavitarsis** MEIG.

bipunctata STROBL **flavitarsis** MEIG.

caeruleascens MACQ. — ? **flavitarsis** MEIG.

campestris FALL. -- **flavitarsis** MEIG. et **virens** FABR.

- curvinervis** STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 228. [*Pipiza*] Europa centr. (1898).
- flavitarsis** MEIG., S. B., III. 248. 14. [*Pipiza*] (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 569. 7. [*Pipiza*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 832. 8. (1843), VIII. 3183. 8. (1849) et XIII. 6927. 8. [*Pipiza*] (1859); WALK., Ins. Brit., I. 272. 8. [*Pipiza*] (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 307. 18. [*Pipiza*] (1857) et F. A., I. 263. [*Pipiza*] (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 279. 8. [*Pipiza*] (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 241. [*Heringia*] (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 157. 3, 163. (1901).
- biguttata* CURT., Brit. Entom., 669. [*Pipiza*] (1837); VERR., Entom. Monthly Mag., V. 24. [*Pipiza*] (1869).
- bipunctata* STROBL., Programm Seitenst., XIV. 60. (1880); MIK, Verh. zool. bot. Ges. Wien, XXXI. 349. (1881).
- ? *caeruleseens* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 180. (32). 13. [*Pipiza*] (1827) et Suit. à Buff., I. 571. 14. [*Pipiza*] (1834); MEIG., S. B., VII. 121. [*Pipiza*] (1838).
- campestris* FALL. var. *b.* Dipt. Succ. Syrph., 60. [*Pipiza*] (1817).
- melancholica* MEIG., S. B., III. 251. 20. t. XXIX. f. 12. [*Pipiza*] (1822); WALK., Ins. Brit., I. 272. 10. [*Pipiza*] (1851); SCHN., F. A., I. 260. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 164. (1901).
- neuphratica* ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 34. (1868).
- Ratzburgi* ZETT., Dipt. Scand., II. 843. 23. (1843), VIII. 3186. 23. (1849) et XIII. 6032. 22. [*Pipiza*] (1859).
- virtea* MEIG., S. B., III. 249. 15. [*Pipiza*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 177. (29). 6. [*Pipiza*] (1827) et Suit. à Buff., I. 570. 8. [*Pipiza*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 832. 9. (1843), VIII. 3183. 9. (1849), XII. 4671. 9. (1855) et XIII. 6027. 9. [*Pipiza*] (1859); WALK., Ins. Brit., I. 271. 7. [*Pipiza*] (1851); PALMA, Ann. Acc. Asp. nat., (3). III. 66. (1864); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 33. (1868); VERR., Brit. Fl., VIII. 163. (1901).
- fulvitarsis** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 182. (34). 19. [*Pipiza*] (1827) et Suit. à Buff., I. 572. 19. [*Pipiza*] (1834); MEIG., S. B., VII. 120. 39. [*Pipiza*] (1838); MALM, Kongl. Vet. Handl., 1863, 68. [*Pipiza*] (1863); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 194. [*Pipiza*] (1893).
- geniculata* CURT. = **virens** FABR.
- geniculata* ZETT. = **Heringi** ZETT.
- Heringii* STROBL. = **virens** FABR.
- Heringi** ZETT., Dipt. Scand., II. 844. 24. (1843), XI. 4307. 24. (1852) Europa. et XIII. 6032. 24. [*Pipiza*] (1859); SCHN., F. A., I. 260. (1862); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 139. (1865); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 176. (1870) et Brit. Fl., VIII. 159. 4. f. 181. 185. (1901); WACHRL, Wien. entom. Zeitg., I. 279. 42. (1882).
- ? *abra* LAW., Programm Posen, 30. 12. [*Pipiza*] (1840) et Isis. 1840. 563. 12. [*Pipiza*] (1840).

geniculata ZETT., Dipt. Scand., II. 389. 18. [*Pipiza*] (1843).
leucogona ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3185. 18. [*Pipiza*] (1849);
 SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 309. 31. [*Pipiza*]
 (1857); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 241. [*Heringia*] (1885).
sculpeonata ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 139. (1865).
Zetterstedtii ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 53. (1856) et II. 185. I.
 [*Heringia*] (1857); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 241.
 [*Heringia*] (1885).

interrupta HAL. = ? **virens** FABR.

leucogona ZETT. = **Heringi** ZETT.

lucida MEIG. = ? **maculipennis** MEIG.

maculipennis MEIG., S. B., III. 254. 27. [*Pipiza*] (1822); ZETT., Dipt.
 Scand., II. 841. 20. [*Pipiza*] (1843); BOSSD., Finkl. Insekt., I. 282.
 19. [*Pipiza*] (1861); ? STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 193.
 [*Pipiza*] (1893); VERR., Brit. Fl., VIII. 156. 2, 164. (1901).
 ? *lucida* MEIG., S. B., III. 247. 11. [*Pipiza*] (1822); VERR., Brit.
 Fl., VIII. 163. (1901).

Europa centr.
 et sept.

melancholica MEIG. = **flavitaris** MEIG.

morosa LW. = **virens** FABR.

neuphratica ROND. = **flavitaris** MEIG.

nigripes MACQ. = **virens** FABR.

obscuripennis MEIG. = **virens** FABR.

Ratzburgi ZETT. = **flavitaris** MEIG.

sculpeonata ROND. = **Heringi** ZETT.

tristis MEIG. = **virens** FABR.

varians ROND. = **virens** FABR.

varipes MEIG. = **virens** FABR.

virens FABR., Syst. Antl., 186. 12. [*Malio*] (1805); MEIG., S. B., III.
 253. 26. [*Pipiza*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 181. (33).
 16. t. I. f. 6. [*Pipiza*] (1827) et Suit. à Buff., I. 572. 17. [*Pipiza*]
 (1834); WALK., Ins. Brit., I. 272. 12. [*Pipiza*] (1851); SCHN.,
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 310. 42. [*Pipiza*] (1857) et F. A.,
 I. 260. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 193. [*Pipiza*]
 (1893); VERR., Brit. Fl., VIII. 155. 1, 164. f. 179—180. (1901);
 KETEL, Programm Pasewalk, II. *observ.* (1904).

Europa.

annulata MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 181. (33). 15. [*Pipiza*]
 (1827) et Suit. à Buff., I. 572. 16. [*Pipiza*] (1834); MEIG., S.
 B., VII. 120. 38. [*Pipiza*] (1838); LW., Programm Posen, 29.
 9. [*Pipiza*] (1840) et Isis, 1840. 562. 9. [*Pipiza*] (1840); ZETT.,
 Dipt. Scand., II. 842. 22. (1843), VIII. 3186. 22. [*Pipiza*]
 (1843) et VIII. 3186. 22. [*Pipiza*] (1849); SCHN., Verh. zool.-
 bot. Ges. Wien, VII. 311. 44. [*Pipiza*] (1857) et F. A., I. 260.
 (1862); BOSSD., Finkl. Insekt., I. 282. 18. [*Pipiza*] (1861);
 ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 139. (1865); STROBL,
 Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 193. [*Pipiza*] (1893).

campestris FALL., Dipt. Suec. Syrph., 59. 4. [*Pipiza*] (1817).
 ZETT., Dipt. Scand., II. 840. 19. (1843), VIII. 3186. 19. (1849).

et XIII. 6031. 19. [*Pipiza*] (1859); BONSD., Finnl. Insekt., I. 281. 15. [*Pipiza*] (1861).

geniculata CURT., Brit. Entom., 533. [*Pipiza*] (1835).

Heringii STROBL. (nec ZETT.), Programm Seitenst., XIV. 14. (1880).

? *interrupta* HAL., Entom. Mag., I. 165. [*Pipiza*] (1833); WALK., Ins. Brit., I. 273. 13. [*Pipiza*] (1851).

morosa LW., Programm Posen, 29. 10. [*Pipiza*] (1840) et Isis, 1840. 562. 10. [*Pipiza*] (1840).

? *nigripes* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 182. (34). 17. [*Pipiza*] (1827) et Snit. à Buff., I. 572. 18. [*Pipiza*] (1834); MEIG., S. B., VII. 120. 40. [*Pipiza*] (1838).

obscuripennis MEIG., S. B., VII. 119. 36. [*Pipiza*] (1838); SCHN., F. A., I. 265. [*Pipiza*] (1862).

tristis MEIG., S. B., III. 253. [*Phalangus*] (1822) et VII. 119. 53. [*Pipiza*] (1838); SCHN., F. A., I. 265. [*Pipiza*] (1862).

varians ROND., N. Ann. Sci. Nat. Bologna, (2). VIII. 343. [*Pipiza*] (1847) et Dipt. ital. Prodr., II. 186. 1. (1857).

varipes MEIG., S. B., III. 254. 28. [*Pipiza*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 182. (34). 18. [*Pipiza*] (1827); LW., Programm Posen, 30. 11. [*Pipiza*] (1810) et Isis, 1840. 563. 11. [*Pipiza*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., II. 841. 21. (1843), VIII. 3186. 21. (1849) et XIII. 6031. 21. [*Pipiza*] (1859); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 311. 43. [*Pipiza*] (1857); HEEG., Sitzgsber. Akad. Wiss. Wien, XXXI. 299. t. II. f. 1—8. [*Pipiza*] (1858); BONSD., Finnl. Insekt., I. 282. 17. [*Pipiza*] (1861); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 193. [*Pipiza*] (1893).

vitrea MEIG. = **flavitarsis** MEIG.

Zetterstedtii ROND. = **Heringi** ZETT.

Pipiza

FALL., Specimen entom., 11. (1810) et Dipt. Suec. Syrph., 58. (1817).

albipila MEIG. = **noctiluca** L.

albitarsis MEIG. = **noctiluca** L.

anthracina MEIG. = **noctiluca** L.

Artemis MEIG. = **festiva** MEIG.

austriaca MEIG. = ? **festiva** MEIG.

bardus HARR. = **noctiluca** L.

biguttula ZETT. = **noctiluca** L.

bimaculata MEIG., S. B., III. 246. 9. (1822); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3182. 6—7. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 271. 4. (1851); SCHN., F. A., I. 263. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 163. 172. 5. f. 190. (1901).

chalybeata MEIG., S. B., III. 252. 22. (1822); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 309. 32. (1857) et F. A., I. 264. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 164. (1901).

geniculata MEIG., S. B., III. 245. 7. (1822); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3180. 1—2. (1849) et XIII. 6026. 1—2. (1859); ROND.,

- Dipt. ital. Prodr., II. 180. 2. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 306. 7. (1857) et F. A., I. 262. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 278. 2. (1861); MALM, Kongl. Vet. Handl., 1863. 63. (1863); VERR., Brit. Fl., VIII. 164 (1901).
- guttata* MEIG., S. B., III. 247. 12. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 176. (28). 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 569. 5. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 830. 5. (1843); WALK., Ins. Brit., I. 271. 6. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 307. 16. (1857) et F. A., I. 263. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 278. 5. (*gullata*) (1861); KOW., Wien. entom. Zeitzg., IV. 242. (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 164. (1901).
- binotata* ZETT. = **noctiluca** L.
- bipunctata* STROBL = **quadrimaculata** PANZ. *var.*
- calceata* MEIG. = **notata** MEIG.
- carbonaria* ZETT. p. p. = **noctiluca** L.
- chalybeata* MEIG. = **bimaculata** MEIG.
- dirac* HARR. = **noctiluca** L.
- excalceata* ROND. = **festiva** MEIG.
- Fairmairei* BIG. = **festiva** MEIG.
- fasciata** MEIG., S. B., III. 242. 1. t. XXIX. f. 17. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 174. (26). 1. t. I. f. 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 568. 1. (1834); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 304. 1. (1857) et F. A., I. 261. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 163. (1901). Europa centr.
- fenestrata** MEIG., S. B., III. 248. 13. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 177. (29). 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 569. 6. (1834); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 307. 17. (1857) et F. A., I. 263. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 164. 171. (1901). Europa centr.
- festiva** MEIG., S. B., III. 243. 2. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 175. (27). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 568. 2. (1834); LW., Programm Posen, 29. 1. (1840) et Isis, 1840. 562. 1. (1840); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 305. 2. (1857) et F. A., I. 262. (1862); KOW., Wien. entom. Zeitzg., IV. 242. (1885); WILL., Syn. N. A. Syrph., 27. (1886); VERR., Brit. Fl., VIII. 163. (1901). Europa.
- Artemis* MEIG., S. B., III. 244. 5. (1822); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 305. 4. (1857).
- caustriaca* MEIG., S. B., III. 252. 23. (1822); LW., Programm Posen, 29. 7. (1840) et Isis, 1840. 562. 7. (1840); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 308. 24. (1857) et F. A., I. 261. (1862); KOW., Wien. entom. Zeitzg., IV. 212. (1885).
- excalceata* ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 181. 4. (1857).
- Fairmairei* BIG., Ann. Soc. entom. France, (6). III. 536. [*Myolepti*] (1883).
- leucopeza* MEIG., S. B., VII. 118. 33. (1838); SCHN., F. A., I. 265. (1862).
- lanata* MEIG., S. B., III. 243. 4. (1822); SCHN., Verh. zool. bot. Ges. Wien, VII. 305. 3. (1857); VERR., Cat. europ. Syrph., 25 (*lanulata*) (1900).

noctiluca ROND. (*ucc* AUCT.), Dipt. ital. Prodr., II. 180. 1. (1857).

ornata MEIG., S. B., III. 243. 3. (1822).

rosarum PANZ. (*ucc* FABR.), Fauna germ., XCV. 21. [*Syrphus*] (1804).

funebri MEIG. = **lugubris** FABR.

geniculata MEIG. = **bimaculata** MEIG.

guttata MEIG. = **bimaculata** MEIG.

hyalipennis ZETT. = **noctiluca** L.

immaculata STROBL = **quadrimaculata** PANZ. *var.*

Jablonskii MIK = **noctiluca** L.

leucopeza MEIG. = **festiva** MEIG.

luctuosa MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 179. (31). 11. (1827) et Suit. à Buff., I. 571. 12. t. XII. f. 18. (1834); MEIG., S. B., VII. 119. 37. (1838). Europa centr.

lugubris FABR., Syst. entom., 770. 36. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., H. 431. 50. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 303. 91. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 246. 64. [*Eristalis*] (1805); VILL., Entom. linn., III. 458. 121. [*Musca*] (1789); ROSSI, Mant. Ins., II. 62. 528. [*Syrphus*] (1794); SCHRANK, Fauna boica, III. 109. 2416. [*Musca*] (1803); MEIG., S. B., III. 250. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 180. (32). 12. (1827) et Suit. à Buff., I. 571. 13. (1834); ZETT., Ins. Lapp., 617. 7. (1838) et Dipt. Scand., II. 834. 11. (1843), VIII. 3183. 11. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 272. 9. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 179. 8. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 308. 22. (1857) et F. A., I. 263. (1862); BOSSD., Fennl. Insekt., I. 280. 10. (1861); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 243. (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 164. 176. 8. (1901). Europa.

funebri MEIG., S. B., III. 250. 17. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 179. (31). 10. (1827) et Suit. à Buff., I. 570. 11. (1834); SCHN., F. A., I. 264. (1862); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 32. (1868); VERR., Brit. Fl., VIII. 164. (1901).

moesta GMEI., Syst. Nat., V. 2874. [*Musca*] (1788).

lanata MEIG. = **festiva** MEIG.

luteitarsis ZETT., Dipt. Scand., II. 828. 2. (1843) et XIII. 6026. 2. (1859); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 306. 8. (1857) et F. A., I. 265. (1862); MALM, Kongl. Vet. Handl., 1863. 63. (1863); VERR., Brit. Fl., VIII. 165. 1. f. 186. (1901). Europa centr. et sept.

maculata ZETT. = **quadrimaculata** PANZ.

moesta GMEI. = **lugubris** FABR.

noctiluca L., Syst. Nat., X. 593. [*Musca*] (1758), Fauna suec., 1814. [*Musca*] (1761) et Syst. Nat., XII. II. 986. 48. [*Musca*] (1767); FABR., Syst. entom. 770. 38. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II. 431. 54. [*Syrphus*] (1781), Mant. ins., II. 340. [*Syrphus*] (1787), Entom. syst., IV. 304. 98. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 247. 69. [*Eristalis*] (1805); GMEI., Syst. Nat., V. 2874. 48. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 445. 97. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etc., II. 293. 1475. [*Syrphus*] (1790); CEDERH., Faunae ingr. Prodr.,

305. 960. [*Syrphus*] (1798); DONOV., Nat. Hist. Brit. Ins., X. 346. [*Musca*] (1801); ILLIG., Rossi Fanna etc., II. 453. 1475. [*Syrphus*] (1807); LATR., Gen. crust. ins., IV. 332. [*Milesia*] (1809); FALL., Dipt. Svec. Syrph., 59. 2. (1817); MEIG., S. B., III. 244. 6. (1822); MAGQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 175. (27). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 568. 3. (1834); ZETT., Ins. Lapp., 615. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 826. 1. (1843), VIII. 3180. 1. (1849); LW., Programm Posen, 29. 3. (1840) et Isis, 1840. 562. 3. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 568. (1849) et Ins. Brit., I. 270. 3. t. X. f. 5. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 305. 5. (1857) et F. A., I. 262. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 277. 1. (1861); MALM, Kongl. Vet. Handl., 1863. 62. (1863); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 242. (1885); GRIMSH., The Naturalist, 1898. 103. (1898); VERR., Entom. Monthly Mag., VII., 203. (1871) et Brit. Fl., VIII. 168. 3. f. 188. 189. (1901); VILLEN., Feuille jeun. Natur., (4). XXXIII. 118. (1903).
- albipila* MEIG., S. B., VI. 350. 31. (1830); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 309. 34. (1857).
- albitarsis* MEIG., S. B., VI. 350. 30. (1830).
- anthracina* MEIG., S. B., III. 253. 25. (1822); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 308. 26. (1857); VERR., Brit. Fl., VIII. 164. (1901).
- bardus* HARR., Expos. engl. Ins., 106. t. XXXII. f. 39. [*Musca*] (1776).
- biguttula* ZETT., Ins. Lapp., 616. 5. (1838).
- binotata* ZETT., Ins. Lapp., 616. 3. (1838) et Dipt. Scand., II. 829. 4. (1843), XIII. 6026. 4. (1859); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 278. 4. (1861).
- carbonaria* var. *b.* ZETT., Dipt. Scand., II. 836. 13. (1843) et VIII. 3184. (1849); MALM, Kongl. Vet. Handl., 1863. 63. (1863).
- divae* HARR., Expos. engl. Ins., 112. t. XXXIII. f. 57. [*Musca*] (1776).
- hyalipennis* ZETT., Ins. Lapp., 616. 4. (1838) et Dipt. Scand., II. 831. 7. (1843), XIII. 6027. 7. (1859); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 279. 7. (1861).
- Jablonskii* Mlk, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 417. t. X. f. 1—2. (1867).
- obsoleta* ZETT., Ins. Lapp., 616. 2. (1838) et Dipt. Scand., II. 828. 3. (1843); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 278. 3. (1861).
- plana* ROSE., Dipt. ital. Prodr., II. 181. 3. (1857); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 242. (1885).
- rafithorae* MEIG., S. B., VI. 350. 32. (1830).
- stigmatica* ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6029. 13—14. (1859); MALM, Kongl. Vet. Handl., 1863. 63. (1863); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 242. (1885).
- tristor* HARR., Expos. engl. Ins., 107. t. XXXII. f. 42. [*Musca*] (1776).

- vana* ZETT., Dipt. Scand., II. 835. 12. (1843); VIII. 3184. 12. (1849) et XIII. 6028. 12. (1859); BONSD., Finnl. Insekt., I. 280. 11. (1861); MALM, Kongl. vet. Handl., 1863. 63. (1863); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 33. (1868).
- vidua* ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 183. 7. (1857).
- noctiluca* ROND. = **festiva** MEIG.
- notata** MEIG., S. B., III. 246. 10. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 178. (30). 9. (1827) et Suit. à Buff., I. 569. 4. (1834); CURT., Brit. Entom., 669. (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 830. 6. (1843) et VIII. 3182. 6. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 271. 5. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 306. 12. (1857) et F. A., I. 263. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 279. 6. (1861); VERR., Brit. Fl., VIII. 175. 7. (1901).
- calceata* MEIG., S. B., III. 251. 19. (1822); SCHN., F. A., I. 265. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 164. (1901).
- obscura** MACQ., Suit. à Buff., I. 573. 20. (1834); MEIG., S. B., VII. 121. 41. (1838); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 179. 6. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 33. (1868); VERR., Brit. Fl., VIII. 164. (1901).
- obsoleta* ZETT. = **noctiluca** L.
- ornata* MEIG. = **festiva** MEIG.
- plana* ROND. = **noctiluca** L.
- quadriguttata* MACQ. = **quadrinaculata** PANZ.
- quadrinaculata** PANZ., Fauna germ., LXXXVI. 19. [*Syrphus*] (1804); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 59. 3. (1817); MEIG., S. B., III. 249. 16. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 177. (29). 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 570. 9. (1834); ZETT., Ins. Lapp., 616. 6. (1838) et Dipt. Scand., II. 833. 10. (1843); WALK., Ins. Brit., I. 270. 1. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 307. 19. (1857) et F. A., I. 262. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 279. 9. (*i-maculata*) (1861); MALM, Kongl. vet. Handl., 1863. 65. (1863); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 242. (*i-maculata*) (1885); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 194. (1893); VERR., Brit. Fl., VIII. 163. 167. f. 187. (1901).
- maculata* ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6028. 10. (1859).
- quadriguttata* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 178. (30). 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 570. 10. (1834); MEIG., S. B., VII. 119. 34. (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 833. (1843); WALK., Ins. Brit., I. 270. 2. (1851).
- quatrinaculata* ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 183. *nota*. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 33. (1868).
- var. bipunctata* STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 230. (1898). Alpes.
- var. immaculata* STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 230. (1898). Alpes.
- quatrinaculata* ROND. = **quadrinaculata** PANZ.
- rostrum* PANZ. **festiva** MEIG.
- rajithorax* MEIG. **noctiluca** L.

signata MEIG., S. B., III. 246. 8. (1822); LW., Programm Posen, 29. Europa centr.
4. (1840) et Isis, 1840. 562. 4. (1840); ZETT., Dipt. Scand., VIII.
3181. 1-2. (1843); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 306.
6. (1857) et F. A., I. 262. (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg.,
IV. 242. (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 164. 174. 6. (1901).

stigmatica ZETT. = **noctiluca** L.

tristor HARR. = **noctiluca** L.

vana ZETT. = **noctiluca** L.

vidua ROND. = **noctiluca** L.

Penium

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 741. (1865); KOW., Wien. entom. Zeitg.,
IV. 241. (1885).

carbonarium MEIG., S. B., III. 251. 21. [*Pipiza*] (1822); ZETT., p. p., Europa.
Dipt. Scand., II. 836. 13. (1843), VIII. 3184. 13. (1849) et XIII.
6029. 13. [*Pipiza*] (1859); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
VII. 309. 30. [*Pipiza*] (1857) et F. A., I. 264. [*Pipiza*] (1862);
MALM, Kongl. vet. Handl., 1863. 63. [*Pipiza*] (1863); KOW., Wien.
entom. Zeitg., IV. 243. (1885); STROM., Mittheil. Ver. Steierm.,
XXIX. 196. (1893); VERR., Brit. Fl., VIII. 164. (1901).

Cnemodon

EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 573. (1865); KOW., Wien. entom. Zeitg.,
IV. 241. (1885).

acuminatus LW. = **vitripennis** MEIG.

anthracinus ZETT. = ? **fulvimanus** ZETT.

aphidioplagus A. COSTA = ? **vitripennis** MEIG.

brevicens EGG. = **vitripennis** MEIG.

carbonarius ZETT. = **fulvimanus** ZETT.

fulvimanus ZETT., Dipt. Scand., II. 838. 16. (1843), VIII. 3184. 16. Europa centr.
(1849) et XIII. 6030. 16. [*Pipiza*] (1859); BOSSD., Fiml. Insekt., et sept.
I. 281. 13. [*Pipiza*] (1861); MALM, Kongl. vet. Handl., 1863. 67.
[*Pipiza*] (1863); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 243. (1885);
STROM., Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 196. (1893); VERR., Cal.
europ. Syrph., 27. (1900).

? *anthracinus* ZETT. (nec MEIG.). Ins. Lapp., 617. 8. [*Pipiza*]
(1838) et Dipt. Scand., II. 836. 14. (1843), VIII. 3184. 14.
[*Pipiza*] (1849); BOSSD., Fiml. Insekt., I. 280. 12. [*Pipiza*]
(1861); SCHIX., F. A., I. 264. [*Pipiza*] (1862); VERR., Brit.
Fl., VIII. 164. (1901).

carbonarius var. *a.* ZETT., Dipt. Scand., II. 836. (1843) et VIII.
3184. [*Pipiza*] (1849).

? *raficoruis* MEIG., S. B., III. 252. 24. [*Pipiza*] (1822); ZETT.,
Ins. Lapp., 617. 9. [*Pipiza*] (1838) et Dipt. Scand., II. 838.

17. (1843), VIII. 3185. 17. (1849) et XIII. 6030. 17. [*Pipiza*] (1859); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 281. 14. [*Pipiza*] (1861); MALM, Kongl. vet. Handl., 1863. 67. [*Pipiza*] (1863); VERR., Brit. Fl., VIII. 164. (1901).
- rufimanus* BOHEM., Öfv. vet. Akad. Förh., I. 97. [*Pipiza*] (1844).
- latitarsis** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 573. (1865); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 243. (1885). Europa centr.
- ? *vitripennis* STROBL (*nec* MEIG.), Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 195. (1893).
- morianellus** ZETT., Dipt. Scand., II. 837. 15. (1843) et VIII. 3184. 15. [*Pipiza*] (1849); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 243. (1885). Europa centr. et sept.
- ? *ruficornis* STROBL (*nec* MEIG.), Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 196. (1893).
- ruficornis* MEIG. = ? **fulvimanus** ZETT.
- ruficornis* STROBL = ? **morianellus** ZETT.
- rufimanus* BOHEM = **fulvimanus** ZETT.
- vitripennis** MEIG., S. B., III. 254. 29. [*Pipiza*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 180. (32). 14. [*Pipiza*] (1827) et Suit. à Buff., I. 571. 15. [*Pipiza*] (1834); WALK., Ins. Brit., I. 272. 11. [*Pipiza*] (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 182. 5. [*Pipiza*] (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 309. 38. [*Pipiza*] (1857) et F. A., I. 264. [*Pipiza*] (1862); HEEG., Sitzgsber. Akad. Wiss. Wien, XXXI. 295. t. I. f. 1—6. [*Pipiza*] (1858); VERR., Brit. Fl., VIII. 177. 1. f. 191—194. (1901).
- acuminatus* LW., Programm Posen, 30. 13. [*Pipiza*] (1840) et Isis, 1840. 563. 13. [*Pipiza*] (1840); SCHN., F. A., I. 265. [*Pipiza*] (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 176. [*Pipiza*] (1870).
- ? *aphidiphagus* A. COSTA, Atti Istit. Inc. Napoli, IX. 1. [*Pipiza*] (1853); PALMA, Ann. Acc. asp. nat., (3). III. 65. 124. t. VII. f. 16. [*Pipiza*] (1864); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 34. [*Pipiza*] (1868).
- brevidens* EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 574. (1865); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 243. (1885).
- vitripennis* STROBL — ? **latitarsis** EGG.

Psilota

MEIG., S. B., III. 256. CVI. (1822).

- anthracina** MEIG., S. B., III. 256. 1. t. XXIX. f. 18—20. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 172. (24). t. I. f. 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 573. 1. t. XII. f. 19. (1834); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 600. (1840); ? WALK., Ins. Brit., I. 269. 1. t. X. f. 4. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 318. 1. (1857) et F. A., I. 266. (1862); LW., Berlin. entom. Zeitschr., II. 229. (1858); MÜK., Wien. entom. Zeitg., XI. 183. 9. (1892); VERR., Brit. Fl., VIII.
- Europa centr. et mer.

182. f. 195—196. (1901); ADAMS, Entom. Monthly Mag., (2). XII. 199. (1901).

atra BLOOMF. (*neq* FALL.), Entom. Monthly Mag., (2). VI. 267. (1895).

conjugata ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 174. 1. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 139. (1865).

atra BLOOMF. **anthracina** MEIG.

atra FALL., Dipt. Succ. Syrph., 58. 1. [*Pipiza*] (1817); ZETT., Dipt. Scand., II. 846. 1. (1843). Europa sept.

conjugata ROND. — **anthracina** MEIG.

innupta ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 176. 2. (1857). Italia.

rotundicornis STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 430. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 586. (1900). Bosnia.

Chrysogaster

MEIG., Illiger's Magaz., II. 274. (1803) et S. B., III. 265. (1822).

A. *Orthonевра*

MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 188. (40). (*Orthonевра*) (1827).

Camponевра ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 52. 22. (1856) et II. 12 et 163. 22. (*Campineura*) (1857), em. VERR. ap. Scudd. 1882.

Camptoneura WILL., Syn. N. A. Syrph., 31. (1886).

Cryptoneura BIG., Rev. Mag. Zool., XI. 307. (*Cryptineura*) (1859), em. VERR. ap. Scudd. 1882.

brevicornis LW. Stettin. entom. Zeitg., IV. 269. t. III. f. 19—21. (1843) Europa centr. et Wien. entom. Monatschr., I. 7. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 317. 26. (1857) et F. A., I. 272. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 188. 2. f. 199—200. (1901).

byzantina STROBL = **nobilis** FALL. *var.*

elegans MEIG., S. B., III. 272. 14. t. XXX. f. 9. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 189. (41). t. I. f. 8. (1827) et Suit. à Bull., I. 564. 1. t. XII. f. 16. (1834); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 669. (1842); LW., Stettin. entom. Zeitg., IV. 275. t. III. f. 22—24. (1843); ZETT., Dipt. Scand., II. 824. 8. (1843) et XIII. 6024. 8. (1859); WALK., Ins. Brit., I. 273. t. X. f. 6. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 318. 30. (1857) et F. A., I. 272. (1862); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 163. 4. (1857); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 276. 7. (1861); VERR., Brit. Fl., VIII. 187. 1. f. 197—198. (1901).

splendida WALK. (*neq* MEIG.), Ins. Brit., I. 277. 8. (1851).

erythrogona MALM, Kongl. vet. Handl., 1863. 61. (1863).

frontalis LW., Stettin. entom. Zeitg., IV. 270. t. III. f. 10—12. (1843) Europa centr. et Wien. entom. Monatschr., I. 7. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 317. 27. (1857) et F. A., I. 273. (1862). et mer.

- venusta* Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 164. 1. [*Campencara*] (1857).
- fumipennis** Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 271. t. III. f. 7—9. (1843). Asia min.
- fuscipennis* ZETT. = **geniculata** MEIG.
- geniculata** MEIG., S. B., VI. 352. 16. (1830); Lw., Programm Posen, Europa.
31. 10 f. 46. (1840), Isis, 1840. 564. 10. (1840), Stettin. entom.
Zeitg., IV. 273. 280. t. III. f. 25—27. (1843) et Wien. entom.
Monatschr., I. 8. (1857); ZETT., Dipt. Scand., II. 824. 9. (1843) et
XIII. 6025. 9. (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 163. 5. (1857);
BONSD., Finnl. Insekt., 276. 8. (1861); SCHN., F. A., I. 273. (1862).
fuscipennis ZETT., Ins. Lapp., 615. 3. (1838).
- gonadesma** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 231. 124. (1871). Sibiria.
- nigricollis* MEIG. = **nobilis** FALL.
- nobilis** FALL., Dipt. Suec. Syrph., 57. 17. [*Eristalis*] (1817); REAUM., Europa.
Mém. Ins., IV. t. XXXI. f. 13—16. [—] (1738); MEIG., S. B., III.
272. 13. t. XXX. f. 18. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 564. 2.
(1834); ZETT., Ins. Lapp., 615. 2. (1838) et Dipt. Scand., II. 823.
7. (1843); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 262. t. III. f. 16—18.
(1843); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 162. 3. (1857); SCHN., Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, VII. 317. 24. (1857) et F. A., I. 272. (1862);
WALK., Ins. Brit., I. 274. 2. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 275.
6. (1861); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 69. (1883);
VERR., Brit. Fl., VIII. 190. 3. f. 201—202. (1901).
nigricollis MEIG., S. B., III. 271. 12. (1822); Rond., Dipt. ital.
Prodr., II. 163. 2. (1857).
- var. byzantina* STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hereog., Dalmatia.
XIV. 479. (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hereog., IX. 538.
(1904).
- plumbago** Lw., Programm Posen, 31. 1. f. 43. 46. (1840), Isis, 1840. Europa centr.
564. 1. (1840) et Stettin. entom. Zeitg., IV. 268. t. III. f. 13—15.
(1843); SCHN., F. A., I. 273. (1862).
- recurrens** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 232. 25. (1871). Sibiria.
- splendida* WALK. = **elegans** MEIG.
- tumescens** Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 214. 134. (1873). Rossia.
- varipes** BIG., Ann. Soc. entom. France, (5). X. 150. (1880) et (6). V. Caucasus.
249. (1885).
- venusta* Rond. = **frontalis** Lw.

B. *Liogaster*

Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 166. (*Lejogaster*) (1857) em. VERR., ap. Scudd. 1882.

- amethystea* MEIG. = **splendida** MEIG.
- amethystina* MACQ. = **splendida** MEIG.
- bicolor* MACQ. = **splendida** MEIG.
- caerulescens* MACQ. = **metallina** FABR.
- discicornis* MEIG. = **metallina** FABR.
- grandicornis* MEIG. = **metallina** FABR.
- metallica* FABR. = **metallina** FABR.

- metallina** FABR., Gen. Insect., 307. [*Syrphus*] (1777), Spec. ins., II. Europa.
431. 52. [*Syrphus*] (1781), Mant. ins., II. 340. [*Syrphus*] (1787) et
Entom. syst., IV. 303. 95. [*Syrphus*] (1794); GIMEL., Syst. Nat.,
V. 2874. 359. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 458. 122.
[*Musca*] (1789); ROSSI, Mant. ins., II. 62. 527. [*Syrphus*] (1794);
SCHRANK, Fauna boica, III. 109. 2418. [*Musca*] (1803); COQUEB.,
III. icon., 116. t. XXVI. f. 4. [*Syrphus*] (1804); SCHN., Verh. zool-
bot. Ges. Wien, VII. 313. 16. (1857) et F. A., I. 268. (1862);
VERR., Brit. Fl., VIII. 192. 1. f. 203—204. (1901).
- caerulescens* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 192. (44). 3. (1827) et
Suit. à Buff., I. 561. 3. (1834); MEIG., S. B., VII. 121. 17.
(1838). LW., Stettin. entom. Zeitg., IV. 211. (1843).
- discicornis* MEIG., S. B., III. 270. 8. (1822); LW., Programm
Posen, 31. 5. (1840) et Isis, 1840. 564. 5. (1840); WALK., Ins.
Brit., I. 276. 7. (1851).
- grandicornis* MEIG., S. B., III. 270. 7. (1822); MACQ., Suit. à
Buff., I. 563. 11. (1834); LW., Stettin. entom. Zeitg., IV. 253.
(1843) et Wien. entom. Monatschr., I. 6. (1857); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., III. 572. (1849).
- metallica* FABR., Syst. Antl., 246. 67. [*Eristalis*] (1805); FALL.,
Dipt. Succ. Syrph., 57. 16. [*Eristalis*] (1817); MEIG., S. B.,
III. 267. 3. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 192. (44). 4.
(1827) et Suit. à Buff., I. 561. 4. (1834); ZETT., Ins. Lapp.,
615. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 820. 5. (1843), VIII. 3178.
5. (1849); LW., Stettin. entom. Zeitg., IV. 211. (1843); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., III. 571. (1849); BONSD., Finnl. Insekt.,
I. 275. 5. (1861); BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVIII.
3. (1888).
- polita* HARR., Expos. engl. Ins., 81. t. XXIV. f. 26. [*Musca*]
(1776).
- varipes* CURT., Guide, sec. edit., 251. 9. (1837).
- violacea* MEIG., S. B., III. 267. 2. (1822); ? MACQ., Soc. Sci. Lille,
1827. 191. (43). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 561. 2. (1834);
GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 669. (1842); LW.,
Stettin. entom. Zeitg., IV. 210. (1843); SCHN., Verh. zool. bot.
Ges. Wien, VII. 312. 3. (1857) et F. A., I. 269. (1862); ROND.,
Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 138. (1865).
- polita* HARR. **métallina** FABR.
- rufitarsis* LW. **splendida** MEIG.
- splendida** MEIG., S. B., III. 271. 11. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, Europa.
1827. 196. (48). 10. (1827) et Suit. à Buff., I. 563. 12. (1834);
LW., Programm Posen, 31. 7. (1840), Isis, 1840. 564. 7. (1840) et
Stettin. entom. Zeitg., IV. 258. (1843); SCHN., Verh. zool.-bot.
Ges. Wien, VII. 316. 21. (1857) et F. A., I. 267. (1862); VERR.,
Brit. Fl., VIII. 193. 2. (1901).
- amethystea* MEIG., S. B., VII. 122. 21. (1838)
- amethystina* MACQ., Suit. à Buff., I. 563. 13. (1834); LW., Wien

- entom. Monatschr., I. 6. (1857); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 138. (*ametistina*) (1865).
- bicolor* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 193. (45). 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 561. 5. (1834); MEIG., S. B., VII. 121. 18. (1838): Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 259. (1843).
- rufitarsis* Lw., Programm Posen, 31. 6. f. 41. (1840) et Isis, 1840 564. 6. (1840).
- tarsata* MEIG., S. B., III. 271. 10. (1822); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 255. (1843); ZETT., Dipt. Scand., II. 822. 6. (1843) et VIII. 3178. 6. (1849); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 167. 6. (1857).
- tarsata* MEIG. = **splendida** MEIG.
- varipes* CURT. = **metallina** FABR.
- violacea* MEIG. = **metallina** FABR.
- virgo** ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 138. (1865). Alpes.
- C. Chrysogaster* s. str.
- ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 165. (1857).
- Melanogaster* ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 166. (1857).
- aenea** MEIG., S. B., III. 270. 9. (1822); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 254. (1843); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 316. 18. (1857) et F. A., I. 269. (1862). Europa centr.
- aerosa** Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 253. (1843); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 314. 13. (1857) et F. A., I. 269. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 208. (1885). Europa centr.
- basalis** Lw., Wien. entom. Monatschr., I. 5. (1857); SCHN., F. A., I. 270. (1862). Europa centr.
et sept.
- chalybeata* ZETT., Dipt. Scand., II. 819. 3. *mas.* (1843).
- chalybeata** MEIG., S. B., III. 267. 4. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 561. 6. (1834); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 241. (1843); ZETT., Dipt. Scand., II. 819. 3. *foem.* (1843), VIII. 3177. 3. (1849), XII. 4670. 3. (1855) et XIII. 6023. 3. (1859); WALK., Ins. Brit., I. 275. 2. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 313. 5. (1857) et F. A., I. 270. (1862); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 167. 4. (1857); BONSD., Finnl. Insekt., I. 274. 3. (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 208. (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 201. 5. f. 209. (1901).
- coenotaphii* MEIG., S. B., VI. 351. 15. (1830); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 317. 23. (1857) et F. A., I. 267. (1862).
- capraria* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 194. (46). 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 562. 8. (1834); MEIG., S. B., VII. 122. 19. (1838).
- solstitialis* p. p., ZETT., Dipt. Scand., II. 817. 1. (1843); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IV. 279. (1843).
- chalybeata* ZETT., p. p. **basalis** Lw.

- coemeteriorum* L. — **solstitialis** FALL.
coenotaphii MEIG. = **chalybeata** MEIG.
capraria MACQ. — **chalybeata** MEIG.
fumipennis WALK. = **solstitialis** FALL.
fumosa LW. — **solstitialis** FALL.
- hirtella** LW., Stettin. entom. Zeitg., IV. 251. (1843); SCHN., F. A., I. Europa centr.
 271. (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 208. (1885); VERR.,
 Brit. Fl., VIII. 197. 2. f. 205—207. (1901).
Macquarti VERR. (*nec* LW.), Entom. Monthly Mag., VI. 176. (1870).
viduata WALK. (*nec* L.), Ins. Brit., I. 276. 5. (1851).
- incisa** LW., Stettin. entom. Zeitg., IV. 245. (1843); SCHN., F. A., I. Germania.
 271. (1862).
- inornata** LW., N. Beitr., II. 18. 37. (1854); SCHN., F. A., I. 270. (1862). Germania.
- insignis** LW., Stettin. entom. Zeitg., IV. 261. t. III. f. 4—6. Europa mer.,
 (1843). Asia min.
- longicornis** LW., Stettin. entom. Zeitg., IV. 240. t. III. f. 1—3. (1843). Europa mer.,
lucida Scop. — ? **solstitialis** FALL. Asia min.
- Macquarti** LW., Stettin. entom. Zeitg., IV. 250. (1843); SCHN., Verh. Europa.
 zool.-bot. Ges. Wien, VII. 314. 12. (1857) et F. A., I. 269. (1862);
 KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 208. (1885); VERR., Brit. Fl., VIII.
 199. (1901).
viduata Macq. (*nec* L.), Soc. Sci. Lille, 1827. 194. (46). 8. (1827)
 et Suit. à Buff., I. 562. 9. (1834); BLANCH., Hist. nat. Ins.,
 III. 600. (1840); ZETT., Dipt. Scand., II. 818. 2. (1843), XII.
 4670. 2. (1855) et XIII. 6023. 2. (1859); ROND., Dipt. ital. Prodr.,
 II. 167. 2. (1857); BONSD., Finnl. Insekt., I. 274. 2. (1861).
- Macquarti* VERR. 1870. = **hirtella** LW.
- nubilis** ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 167. 1. (1857) et Atti Soc. ital. Italia.
 Sci. Nat., VIII. 137. (1865).
- unda* Macq. — **viduata** L.
- parumplicata* LW. = **viduata** L. var.
- simplex** LW., Stettin. entom. Zeitg., IV. 243. (1843); SCHN., F. A., Germania.
 I. 270. (1862).
- solstitialis** FALL., Dipt. Succ. Syrph., 56. 14. [*Eristalis*] (1817); ZETT., Europa.
 Dipt. Scand., II. 817. 1. (1843), VIII. 3177. 1. (1849), XII. 4669. 1.
 (1855) et XIII. 6022. 1. (1859); BONSD., Finnl. Insekt., I. 274. 1.
 (1861); VERR., Brit. Fl., VIII. 203. 6. (1901).
 ? *coemeteriorum* L., Syst. Nat., X. 597. [*Musca*] (1758), XII. II.
 992. 82. [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1842. [*Musca cremi-*
teriorum] (1761); O. F. MÜLL., Fauna Fridrichsd., 738. [*Musca*]
 (1764); FABR., Syst. entom., 779. 28. [*Musca*] (1775), Spec.
 ins., II. 443. 39. [*Musca*] (1781), Mant. insect., II. 339. [*Syr-*
phus] (1787), Entom. syst., IV. 303. 94. [*Syrphus*] (1794) et
 Syst. Anth., 246. 65. [*Eristalis*] (1805); GMEL., Syst. Nat., V.
 2878. 82. [*Musca*] (1788); VUL., Entom. linn., III. 489. 200.
 (1789) et IV. 555. [*Musca*] (1789); DWIGGLES., Primit. faunae
 Mosqu., 178. 671. [*Musca*] (1802).

coemeteriorum PANZ., Fauna germ., LXXXII. 17. [*Syrphus*] (1801); LATR., Dict. Hist. Nat. Déterv., XXIV. 194. 569. [*Eristalis*] (1804); MEIG., S. B., III. 268. 5. t. XXX. f. 17. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 193. (45). 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 562. 7. t. XII. f. 15. (1834); LW., Programm Posen, 30. 1. (1840), Isis, 1840. 563. 1. (1840) et Stettin. entom. Zeitg., IV. 246. (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 571. (1849) et Ins. Brit., I. 276. 4. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 167. 3. (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 313. 6. (1857) et F. A., I. 270. (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 208. (1885).

fumipennis WALK. (*nec* LW. 1843), Ins. Brit., I. 275. 3. (1851); LW., Wien. entom. Monatschr., I. 6. (1857); VERR., Entom., V. 23. (1871).

fumosa LW., Programm Posen, 30. 2. (1840) et Isis, 1840. 563. 2. (1840).

? *lucida* SCOP., Entom. carn., 347. 936. [*Musca*] (1763); VILL., Entom. linn., III. 522. 285. [*Musca*] (1789).

? *speculifera* VILL., Entom. linn., III. 464. 140. t. IX. f. 25. [*Musca*] (1789).

solstitialis ZETT. p. p. = **chalybeata** MEIG.

speculifera VILL. = ? **solstitialis** FALL.

splendens MEIG., S. B., III. 266. 1. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 191. (43). 1. t. II. f. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 560. 1. (1834); LW., Stettin. entom. Zeitg., IV. 209. (1843) et Wien. entom. Monatschr., I. 6. (1857); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 167. 5. (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 312. 1. (1857) et F. A., I. 269. (1862); WALK., Ins. Brit., I. 275. 1. (1851); VERR., Brit. Fl., VIII. 195. 1. (1901). Europa centr. et mer., Africa sept.

tristis LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 229. 123. (1871). Alpes.

viduata L., Syst. Nat., X. 598. [*Musca*] (1758), XII. II. 994. 94. [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1852. [*Musca*] (1761); FABR., Syst. entom., 781. 41. [*Musca*] (1775), Spec. ins., II. 446. 54. [*Musca*] (1781), Mant. insect., 348. [*Musca*] (1787) et Entom. Syst., IV. 336. 10. [*Musca*] (1794); GMEL., Syst. Nat., V. 2850. 94. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 494. 211. [*Musca*] (1789); DWIGGERS., Primit. faunae Mosqu., 176. 650. [*Musca*] (1802); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 56. 15. [*Eristalis*] (1817); MEIG., S. B., III. 269. 6. (1822); LW., Programm Posen, 31. 3. (1840), Isis, 1840. 564. 3. (1840) et Stettin. entom. Zeitg., IV. 248. (1843); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 314. 14. (1857) et F. A., I. 268. (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 208. (1885); BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVIII. 3. (1888). Europa.

nuda MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 195. (47). 9. (1827) et Suit. à Buff., I. 562. 10. (1834); MEIG., S. B., VII. 122. 20. (1838); ZETT., Dipt. Scand., II. 820. 4. (1843) et XII. 4670. 4. (1859); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 275. 4. (1861).

- var. parumplicata* Lw., Programm Posen, 31. 4. (1840) et Isis. Germania. 1840. 364. 4. (1840).
- var. vitripennis* STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 193. Alpes (1893).
- viduata* MACQ. = **Macquarti** Lw.
- viduata* WALK. = **hirtella** Lw.
- virescens** Lw., N. Beitr., II. 17. 36. (1854); SCHN., F. A., I. 270. Europa centr. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 208. (1885); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 193. (1893); VERR., Brit. Fl., VIII. 200. 4. f. 208. (1901).
- vitripennis* STROBL = **viduata** L. *var.*

Chilosia

MEIG., S. B., III. 296. (1822) et VII. 123. [*Chilosia*] (1838).

Blera BILLB., Enum. ins., 118. (*nomen nudum*) (1820).

Cartosyrphus BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 230. (1883).

Eristalis ZETT., Ins. Lapp., 610. 57. (1838).

Liota ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 176. *nota*. [*Lejota*] (1857)
em. VERR. ap. SECCO. 1882.

acutilabris BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 491. 125. f. 81. Europa sept.-Sibiria. (1894).

acrea DUF. ? **vernalis** FALL.

aestivalis BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 472. 108. f. 41. Alpes. (1894); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 177. (1893).

ahenea v. Ros., Württemb. CorrbL., I. 54. [*Syrphus*] (1840); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 352. 19. f. 141. (1894). Europa centr.

albibarbis BIG. = **latifacies** Lw.

albichaeta ROND. = ? **umbrisquama** BECK.

albipila MEIG., S. B., VII. 125. 9. (1838); SCHN., F. A., I. 288. (1862); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 414. 68 et 508. (1894) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 355. 8. (1902); VERR., Brit. Fl., VIII. 239. 16. (1901). Europa.

chrysocoma WEYENB. (*nec* MEIG.), Tijdschr. Entom., XII. 164. t. V. f. 1-13. (1869); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 508. (1894).

flavicornis SCHN. (*nec* FABR.), Verh. zool. bot. Ges. Wien, VII. 329. 51. (1857) et F. A., I. 285. (1862); BOE, Stettin. entom. Zeitg., XI. 212. (1856); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 508. (1894); PANZ., Rev. entom., XXIV. 35. (1905).

flavipes ZETT. (*nec* PANZ.), Ins. Lapp., 611. 5. [*Eristalis*] (1838) et Dipt. Scand., II. 784. 9. (1843), VIII. 3167. 9. [*Eristalis*] (1849); WALK., Ins. Brit., I. 282. 5. (1851); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 391. (1856); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 149. 4. (1857).

albiseta MEIG. = ? *longula* ZETT.

albiseta ROND. = ? *umbrisquama* BECK.

albitarsis MEIG., S. B., III. 290. 22. [*Syrphus*] (1822); ST. FARG. SERV., Europe,
Encycl. méth., X. 513. [*Syrphus*] (1825); MACQ., Soc. Sci. Lille, Africa sept.
1827. 200. (52). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 557. 8. (1834); ZETT.,
Ins. Lapp., 612. 8. [*Eristalis*] (1838) et Dipt. Scand., VIII. 3170.
18-19. (1849), XII. 4666. 18-19. [*Eristalis*] (1855); LW., Programm
Posen, 33. 13. (1840) et Isis, 1840, 566. 13. (1840); WALK., Ins.
Brit., I. 283. 10. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII.
329. 53. (1857) et F. A., I. 283. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I.
267. 14. [*Eristalis*] (1861); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 205.
(1870) et Brit. Fl., VIII. 245. 19. f. 213. (1901); KOW., Wien. entom.
Zeitg., IV. 205. (1885); GIRSCHN., III. Wochenschr., II. t. III. f. 14.
(1897); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 352. 22. (1902);
PANZ., Rev. entom., XXIV. 38. (1905).

coemetiorum var. *g.* FALL., Dipt. Suec. Syrph., 55. [*Eristalis*]
(1817).

florimana MEIG., S. B., VII. 126. 25. (1838); LW., Programm
Posen, 32. 4. (1840) et Isis, 1840, 565. 4. (1840); ZETT., Dipt.
Scand., II. 793. 18. (1843) et VIII. 3169. 18. [*Eristalis*] (1849);
ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 151. 13. (1857); VERR., Entom.
Monthly Mag., VI. 205. (1870); BECK., Zeitschr. Hymenopt.
Dipterolog., II. 355. 25. (1902).

innupta ZETT., Dipt. Scand., II. 802. 26. (1843), VIII. 3172. 26.
(1849) et XIII. 6018. 26. [*Eristalis*] (1859); ROND., Dipt. ital.
Prodr., II. 141. 14. (1857); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad.,
LXII. 249. (1894).

? *mutabilis* WALK. (nec FALL.), Ins. Brit., I. 283. 11. (1851).

vidua MEIG., S. B., III. 282. 9. [*Syrphus*] (1822) et VII. 124.
(1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 198. (50). I. t. II. f. 2.
(1827) et Suit. à Buff., I. 556. 6. (1834); LW., Programm
Posen, 32. 5. (1840) et Isis, 1840, 565. 5. (1840); WALK., List
Dipt. Brit. Mus., III. 574. (1849); BECK., Zeitschr. Hymenopt.
Dipterolog., II. 351. 9. (1902).

viduata SCHN. (nec FABR.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 331.
57. (1857) et F. A., I. 288. (1862); BECK., N. Acta Leop.
Carol. Akad., LXII. 439. 86. f. 91. (1894).

alpestris BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 333. 6. f. 126. Alpes.
(1894).

alpina SCHN. et EGG. = *canicularis* PANZ.

alpina STROBL = *semifasciata* BECK. var.

alpina ZETT., Ins. Lapp., 611. 3. [*Eristalis*] (1838) et Dipt. Scand., Europe sept.,
II. 782. 6. (1843), XIII. 6013. 6. [*Eristalis*] (1859); BECK., N. Acta Sibiria.
Leop. Carol. Akad., LXII. 401. 57. f. 2. (1894) et Acta Soc. Sci.
Fenn., XXVI. 64. (1900).

angustigena BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 393. 49. f. Lapponia.
119. (*angustigenis*) (1894).

- angustipennis** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 483. 119. f. 60—61. (1894). Europa centr., Alpes.
- anthraciformis* MEIG. — **scutellata** FALL.
- antiqua* LW. — **nigripes** MEIG.
- antiqua** MEIG., S. B., III. 291. 24. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 201. (53). 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 558. 12. (1834); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 353. 24. (1902). Europa centr.
- pubera* VERR. (nec ZETT.), Entom. Monthly Mag., VII. 206. (1870).
- sparsa* LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 604. 20. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 323. 21. (1857) et F. A., I. 278. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 207. (1870) et Brit. Fl., VIII. 214. 2. (1901); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 187. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 339. 8. f. 139. (1894).
- atra* FABR. — **variabilis** PANZ.
- atra* GIMM. = ? **pagana** MEIG.
- aurata* FABR. — **canicularis** PANZ.
- auripila* MEIG. — **canicularis** PANZ.
- barbata** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 586. 3. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 320. 4. (1857) et F. A., I. 275. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 204. (1870) et Brit. Fl., VIII. 230. 11. (1901); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 204. (1885); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 387. 44. f. 109. (1894); PANZ., Rev. entom., XXIV. 32. (1905). Europa.
- geniculata* v. Ros., Württemb. Corrbt., I. 54. [*Syrphus*] (1840); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 251. (1894).
- vulnerata* PANZ., Fauna germ., LX. 9. [*Syrphus*] (1798); MEIG., S. B., III. 286. 15. [*Syrphus*] (1822) et VII. 124. (1838); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 328. 47. (1857); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 352. 15. (1902).
- Bergenstammi** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 462. 102. f. 55. (1894); VERR., Brit. Fl., VIII. 250. 21. f. 228. (1901); KETEL, Programm Pasewalk, 16. (1903). Europa centr. et sept.
- Bigoti** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 498. 130. f. 45. (1894). Europa ?
- brachyptera** PALMA, Ann. Acc. Asp. Nat., (3). III. 62. 105. t. VII. f. 14. (*brachiptera*) (1864); RONZ., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 31. (1868); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 396. 52. f. 120, 121 et 505. 140. (1894). Europa centr. et mer.
- brachysoma** Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 355. (1860); SCHN., F. A., I. 287. (1862); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 423. 75. f. 24—25. (1894). Europa centr.
- Braueri** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 435. 83. f. 69. (1894). Alpes.
- brevipennis** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 474. 110. f. 43—44. (1894). Alpes.
- brunnipennis** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 417. 71. f. 29. (1894). Europa mer.
- caerulescens** MEIG., S. B., III. 295. 33. [*Syrphus*] (1822) et VII. 129. Europa centr., Alpes.

38. (1838); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 593. 9. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 321. 10. (1857) et F. A., I. 279. (1862); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 375. 36. f. 168—169. (1894); PAND., Rev. entom., XXIV. 42. (1905).
- ? *chalybeata* MEIG., S. B., III. 294. 32. [*Syrphus*] (1822); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 334. 83. (1857) et F. A., I. 288. (1862); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 354. 32. (1902).
- signata* Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 351. (1860); SCHN., F. A., I. 280. (1862).
- canicularis** PANZ., Fauna germ., LXXXII. 20. [*Syrphus*] (1801); MEIG., S. B., III. 280. 3. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 209. (61). 19. (1827) et Suit. à Buff., I. 556. 3. (1834); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 325. 30. (1857) et F. A., I. 284. (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 204. (1885); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 176. (1893); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 404. 59. f. 4. (1894); PAND., Rev. entom., XXIV. 33. (1905).
- alpina* SCHN. et Egg. (nec ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, III. 98. (1853).
- aurata* FABR., Syst. Antl., 244. 53. [*Eristalis*] (1805); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 153. 3. (1857).
- aaripila* MEIG., S. B., VII. 124. 8. (1838); SCHN., F. A., I. 287. (1862); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 355. 8. (1902).
- himantopus* PANZ., Fauna germ., LIV. 9. [*Syrphus*] (1798); MEIG., S. B., III. 289. 20. (1822); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 326. 31. (1857) et F. A., I. 285. (1862); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 352. 20. (1902).
- Nowickii* LW., Krak. Gel. Ges., XLI. 18. (1870).
- var. **dilutior** STROBL, Mittheil. Ver. Hermannstadt, XLVI. 41. (1897). Hungaria.
- var. **innominata** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 406. 60. (1894). Alpes.
- carbonaria** Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 353. (1860); SCHN., F. A., I. 281. (1862); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 454. 97. f. 31—32. (1894); VERR., Brit. Fl., VIII. 260. 27. (1901). Europa centr. et sept.
- castaneiventris* Bug. — **nigripes** MEIG.
- chalybeata* MEIG. — ? **caerulescens** MEIG.
- chalybeata* WALK. — **vernalis** FALL.
- chloris** MEIG., S. B., III. 284. 11. [*Syrphus chlorus*] (1822), VI. 352. (1830) et VII. 123. (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 203. (55). 9. [*chlora*] (1827) et Suit. à Buff., I. 558. 15. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 788. 13. [*Eristalis*] (1843); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 328. 48. (1857) et F. A., I. 286. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 265. 8. [*Eristalis*] (1861); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 391. (1856); KALTENB., Pflanzenf., 325. 14. (1874);

Kow., Wien. entom. Zeitzg., IV. 205. (1885); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 420. 73. f. 21-22. (1894); PAND., Rev. entom., XXIV. 36. (1905).

flavicornis FABR., Spec. ins., II. 431. 49. [*Syrphus*] (1781), Entom. Syst., IV. 302. 87. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Anfl., 244. 56. [*Eristalis*] (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2874. 357. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 458. 120. [*Musca*] (1789); COQUEB., III. icon., 116. t. XXVI. f. 5. [*Syrphus*] (1804); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 265. (57). 13. (1827) et Suit. à Buff., I. 559. 18. (1834); WESTW., Introd., II. 559. (1840); ZETT., Dipt. Scand., II. 785. 10. (1843) et VIII. 3167. 10. [*Eristalis*] (1849); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 149. 5. (1857); BONSD., Finnl. Insekt., I. 264. 5. [*Eristalis*] (1861); KALTENB., Pflanzent., 378. 49. (1874); Kow., Wien. entom. Zeitzg., IV. 204. (1885); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 351. 14. (1902).

limbata MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 204. (56). 11. (1827) et Suit. à Buff., I. 559. 17. (1834); MEIG., S. B., VII. 128. 47. (1838).

chloris VERR. — **fraterna** MEIG.

chlorus WALK. — **fraterna** MEIG. et **proxima** ZETT.

Christophori BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 480. 116. f. 52. (1894). Rossia mer.

chrysocoma MEIG., S. B., III. 280. 4. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 210. (62). 20. (1827) et Suit. à Buff., I. 556. 4. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 784. 8. (1843) et VIII. 3166. 8. [*Eristalis*] (1849); WALK., p. p., Ins. Brit., I. 282. 4. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 325. 29. (1857) et F. A., I. 286. (1862); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 32. (1868); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 205. (1870) et Brit. Fl., VIII. 238. 15. (1901); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 406. 61. f. 9. (1894); PAND., Rev. Entom., XXIV. 35. (1905). Europa.

chrysosoma GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 348. [*Syrphus*] (1832) et XV. 670. (1842).

phantoma ZETT., Ins. Lapp., 611. 4. [*Eristalis*] (1838) et Dipt. Scand., II. 783. 7. (1843), VIII. 3166. 7. (1849), XIII. 6013. 7. [*Eristalis*] (1859); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 326. 34. (1857).

chrysocoma WALK. **grossa** FALL.

chrysocoma WEYENB. — **albipila** MEIG.

chrysosoma GIMM. — **chrysocoma** MEIG.

coemeteriorum FALL. **albitarsis** MEIG., **impressa** LW. et **nigripes** MEIG.

confinis BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 465. 104. f. 36-37. (1894). Alpes.

conops BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 385. 42. f. 105. (1894). Europa centr.

coracina ZETT. **cynocephala** LW.

- correcta** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 488. 123. f. 73. Europa centr.
(1894); STROB., Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercegov., X. 433. (1898) et mer.
et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercegov., VII. 589. (1900)
? *testaceicornis* ROXD., Dipt. ital. Prodr., II. 154. 7. (1857).
- corydon* HARR. = **grossa** FALL.
- crassiseta** LW., Wien. entom. Monatschr., III. 223. 2. (1859); SCHN., Europa centr.
F. A., I. 279. (1862); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 188. et mer.
(1889) et N. Alact. eop. Carol. Akad., LXII. 353. 20. f. 142—143.
(1894).
- curialis* MEIG. = **scutellata** FALL.
- curvinervis** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 484. 120. f. Europa centr.
58—59. (1894).
- curvitibia** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 479. 115. f. Europa centr.
50—51. (1894).
- cynocephala** LW., Programm Posen, 32. 7. f. 45. (1840) et Isis. 1840. Europa centr.
569. f. 45. (1840); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 327. et sept.
41. (1857) et F. A., I. 282. (1862); FRAUCENF., Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, XVI. 975. (1866); KALTENB., Pflanzenf., 378. 50. (1874);
VERR., Entom. Monthly Mag., XXII. 230. (1886) et Brit. Fl., VIII.
259. 26. f. 211. (1901); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII.
456. 98. f. 33—34. (1894).
- coracina* ZETT., Dipt. Scand., II. 805. 29. (1843) et VIII. 3173.
29. [*Eristalis*] (1849); ROXD., Dipt. ital. Prodr., II. 151. 15.
(1857).
- rostrata* ZETT., Dipt. Scand., II. 805. 30. (1843), VIII. 3173. 30.
(1849), XII. 4668. 30. (1855) et XIII. 6019. 30. [*Eristalis*]
(1859); BONSD., Finnl. Insekt., I. 271. 23. [*Eristalis*] (1861);
SCHN., F. A., I. 287. (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV.
205. (1885).
- decidua* EGG. = **velutina** LW.
- decidua* VERR. = **proxima** ZETT.
- depila* MEIG. = **flavipes** PANZ.
- derasa** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 612. 24. (1857); SCHN., Alpes.
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 324. 25. (1857) et F. A., I. 277.
(1862); MUK, Dipt. Hermsl., 66. (1885); BECK., Berlin. entom.
Zeitschr., XXXIII. 187. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad.,
LXII. 325. 2. f. 127. (1894).
- dilutior* STROB. = **canicularis** PANZ. var.
- dimidiata* ZETT. = **fraterna** MEIG.
- dombressonensis** BECK., ap. ROUGEM., Bull. Soc. Neuchatel. Sci. Helvetia.
Nat., XXVI. 1. (1898).
- erythrochila* ROXD. = ? **frontalis** LW.
- erythrostoma** ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 29. (1868); BECK., Alpes.
N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 255. (1894).
- fasciata** SCHN. et EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, III. 97. (1853); Europa centr.
SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 334. 75. (1857) et F. A., et mer.
I. 284. (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 205. (1885); BELING,

- Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVIII, 3. (1888); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII, 442. 88 et 509. f. 92-93. (1894).
- faucis** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII, 364. 26. f. 128. (1894). Alpes.
- flavicornis* FABR. = **chloris** MEIG.
- flavicornis* MEIG. = **Langhofferi** BECK.
- flavicornis* SCHIX. = **albipila** MEIG.
- flavimana* MEIG. = **albitarsis** MEIG.
- flavipes** PANZ., Fauna germ., LIV, 10. [*Syrphus*] (1798); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 53. 8. [*Eristalis*] (1817); MEIG., S. B., III, 288. 19. [*Syrphus*] (1822); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII, 329. 52. (1857); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII, 415. 69. (1894) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II, 352. 19. (1902); PAND., Rev. entom., XXIV, 34. (1905).
- depila* MEIG., S. B., III, 289. (1822).
- fulvipes* ZETT., Ins. Lapp., 611. *obsere.* [*Eristalis*] (1838).
- gilvipes* ZETT., Dipt. Scand., II, 786. 11. (1843), VIII, 3167. 11. (1849), XII, 4664. 11. (1855) et XIII, 6014. 11. [*Eristalis*] (1859); EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI, 391. (1856); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII, 329. 50. (1857) et F. A., I, 286. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I, 264. 6. [*Eristalis*] (1864); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV, 205. (1885); PAND., Rev. entom., XXIV, 34 et 44. (1905).
- flavipes* ZETT. = **albipila** MEIG.
- flavissima** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII, 371. 34. f. 163. (1894). Austria.
- floccosa* VERR. = **pagana** MEIG. var.
- fraterna** MEIG., S. B., VI, 352. 97. [*Syrphus*] (1830); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII, 328. 49. (1857); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII, 244. (1894) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II, 355. 97. (1902); VERR., Brit. Fl., VIII, 248. 20. f. 227. (1901).
- chloris* VERR. (*ae* MEIG.), Entom. Monthly Mag., VI, 205. (1870); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV, 205. (1885).
- chlorus* WALK., p. p., Ins. Brit., I, 282. 7. (1851).
- dimidiata* ZETT., Dipt. Scand., VIII, 3168. 17-18. [*Eristalis*] (1849); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII, 422. 74. f. 64. (1894).
- rafilibia* EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X, 349. (1860); SCHIX., F. A., I, 288. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX, 178. (1893).
- fraterna* ZETT. = **intonsa** LW.
- frontalis** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII, 587. 4. (1857); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII, 329. 5. (1857) et F. A., I, 275. (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV, 204. (1885); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII, 392. 48. f. 118. (1894); PAND., Rev. entom., XXIV, 32. (1905).
- erythrochila* ROSS., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI, 29. (*erythrochila*) (1868); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII, 255. (1894).

- fulvicornis* MEIG. = ? *soror* ZETT.
fulvipes ZETT. = *flavipes* PANZ.
funebri HARR. = *variabilis* PANZ.
funeralis MEIG. = *mutabilis* FALL.
funeralis WALK. = *vernalis* FALL.
fusca SCHRANK = ? *pagana* MEIG.
fusicornis ROND. = ? *proxima* ZETT.
- gagatea** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 601. 17. (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 323. 18. (1857) et F. A., I. 277. (1862); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 184. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 331. 5. f. 131. (1894); PAND., Rev. entom., XXIV. 40. (1905). Alpes.
- gemina** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 434. 82. (1894). Italia.
- geniculata* v. ROS. = *barbata* LW.
geniculata ZETT. = ? *longula* ZETT.
- Gerstaeckeri** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 477. 113. f. 46. (1894). Patria ignota.
- gibbosa** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 500. 133. f. 74. (1894). ? Germania.
- gigantea** ZETT., Ins. Lapp., 612. 7. [*Eristalis*] (1838) et Dipt. Scand., II. 791. 16. (1843), VIII. 3168. 16. (1849), XIII. 6015. 16. [*Eristalis*] (1859); BONSD., Finnl. Insekt., I. 266. 11. [*Eristalis*] (1861); BRUSCHKE, Entom. Nachricht., VI. 56. (1880); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 429. 78 et 507. f. 66—67. (1894). Europa centr. et sept., Alpes.
- olivacea* ZETT., Ins. Lapp., 611. 6. [*Eristalis*] (1838) et Dipt. Scand., II. 791. 15. (1843), XII. 4664. 15. (1849), XIII. 6015. 15. [*Eristalis*] (1859); BONSD., Finnl. Insekt., I. 265. 10. [*Eristalis*] (1861); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 207. (1885); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 247. (1894).
- gilvipes* ZETT. = *flavipes* PANZ.
glabrata MEIG. = *ruralis* MEIG.
- glirina* ROND. = ? *mutabilis* FALL.
- globulipes** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 496. 129. f. 82—83. (1894). Europa centr.
- granulata** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 388. 45. f. 110. (1894). Germania.
- griseiventris** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 589. 6. (1857); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 397. 53. f. 111. (1894). Europa mer., Africa sept.
- grisella** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 350. 18. f. 144. (1894). Europa centr. Alpes.
- grossa** FALL., Dipt. Suec. Syrph., 53. 7. [*Eristalis*] (1817); MEIG., S. B., III. 281. 5. [*Syrphus*] (1822); ST. FARG. SERV., Encycl. méth., XII. 512. [*Syrphus*] (1825); MACQ., Soc. Sci. Lille. 1827. 210. (62). 21. (1827) et Suit. à Buff., I. 556. 5. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 781. 5. (1843) et VIII. 3166. 5. [*Eristalis*] (1849); WALK., Ins. Brit., I. 281. 3. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 153. 2. (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 326. 33.

- (1857) et F. A., I. 286. (1862); BOSSD., Finkl. Insekt., I. 264. 4. [*Eristalis*] (1861); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 204. (1885); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 205. (1870) et Brit. Fl., VIII. 236. 14. (1901); WAINWR., Entom. Monthly Mag., (2) V. 177. (1894); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 402. 58. f. 1. (1894); PAND., Rev. entom., XXIV. 35. (1905).
- chrysocoma* WALK. p. p. (*aec* MEIG.), Ins. Brit., I. 282. 4. (1851).
- corydon* HARR., Expos. Engl. Ins., 106. t. XXXII. f. 36. [*Musca*] (1776).
- Hercyniae** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 596. 12. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 322. 13. (1857) et F. A., I. 281. (1862); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 379. 38. f. 166. 167. (1894); PAND., Rev. entom., XXIV. 42. (1905).
- means* FABR., Entom. syst. Suppl., 562. 63—64. [*Syrphus*] (1798) et Syst. Antl., 192. 19. [*Milesia*] (1805); MEIG., S. B., VII. 127. 29. (1838); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 230. (1894).
- limantopus* PANZ. = **canicularis** PANZ.
- hirtiventris* BIG. = **latifacies** LW.
- honesta** ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 30. (1868); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 255. (1894); VERR., Brit. Fl., VIII. 226. 9. (1901). Europa centr.,
Alpes.
- fulviventris* v. ROS., in litt. ap. BECK.
- lasiopa* KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 206. (1885); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 386. 43. f. 108. (1894).
- olivae* a VERR. (*aec* ZETT.), Entom. Monthly Mag., IX. 285. (1873).
- hypena** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 389. 46. f. 107. (1894). Europa mer.
- illustrata** HARR., Expos. engl. Ins., 104. t. XXXII. f. 32. [*Musca*] (1776); VERR., Brit. Fl., VIII. 234. 13. f. 224. (1901). Europa,
Asia sept.
- oestracea* SCHELL. (*aec* L.), Genr. Monch. Dipt., 54. t. XI. f. 2. a—d. [*Syrphus*] (1803); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 21. 9. [*Syrphus*] (1816); MEIG., S. B., III. 279. 2. [*Syrphus*] (1822) et VII. 123. (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 208. (60). 18. (1827) et Suit. à Buff., I. 555. 2. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 772. 2. [*Eristalis*] (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 574. (1849) et Ins. Brit., I. 281. 2. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 149. 1. (1857); SEMN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 319. 1. (1857) et F. A., I. 274. (1862); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 584. 1. (1857); BOSSD., Finkl. Insekt., I. 263. 2. [*Eristalis*] (1861); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 204. (1870); PORTSEN., Trudy Russk. Entom., X. 161. t. III. f. 3—6. (1877); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 204. (1885); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 380. 39. (1894); PAND., Rev. entom., XXIV. 31. (1905).
- rapestris* PASZ., Fauna germ., LIX. 13. [*Syrphus*] (1798); HALL., Stettin. entom. Zeitg., XII. 110. (1851).

- impressa** Lw., Programm Posen, 33. 9. (1840) et Isis, 1840. 570. 9. Europa.
(1840); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 332. 66. (1857) et F. A., I. 282. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 204. (1870) et Brit. Fl., VIII. 243. 18. f. 226. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 205. (1885); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 436. 84. f. 19. (1894); PAND., Rev. entom., XXIV. 38. (1905).
coemeteriorum FALL. (*nec* L.), Dipt. Suec. Syrph., 55. 11. [*Eristalis*] (1817); ZETT., Dipt. Scand., II. 804. 28. (1843) et XIII. 6019. 28. [*Eristalis*] (1859); BONSD., Finnl. Insekt., I. 270. 22. [*Eristalis*] (1861).
vernalis MEIG. (*nec* FALL.), S. B., III. 290. 23. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 201. (53). 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 557. 11. (1834); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 352. 23. (1902).
- impudens** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 348. 16. f. Europa centr.
148—149. (1894).
- innupta* ZETT. = **albitarsis** MEIG.
- insignis** Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 614. 26. (1857); SCHN., Europa centr.
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 324. 27. (1857) et F. A., I. 279. (1862); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 188. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 366. 30. f. 157. (1894).
- intonsa** Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 588. 5. (1857); SCHN., Europa,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 320. 6. (1857) et F. A., I. 274. Africa sept.
(1862); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 31. (1868); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 204. (1870) et Brit. Fl., VIII. 232. 12. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 204. (1885); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 394. 50. f. 112—113. (1894); PAND., Rev. entom., XXIV. 33. (1905).
fraterna ZETT. (*nec* MEIG.), Dipt. Scand., II. 798. 22. (1843), VIII. 3172. 22. (1849) et XIII. 6017. 22. [*Eristalis*] (1859); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 154. 6. (1857); BONSD., Finnl. Insekt., I. 269. 18. [*Eristalis*] (1861).
latifrons ZETT., Dipt. Scand., II. 811. 35. (1843) et XIII. 6020. 35. [*Eristalis*] (1859); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 159. 19. (1857); BONSD., Finnl. Insekt., I. 272. 27. [*Eristalis*] (1861); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 249. (1894).
- laevis** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 361. 24. f. 155—156. Alpes.
(1894).
venosa BECK. (*nec* Lw.), Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 178. 187. (1889).
- laeiventris** Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 602. 18. (1857); Alpes.
SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 322. 19. (1857) et F. A., I. 277. (1862); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 185. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 358. 23. f. 153—154. (1894).
- Langhofferi** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 411. 66. f. Europa centr.
14—16. (1894). et mer.

- flavicornis* MEIG. (nec FABR.), S. B., III. 285. 14. [*Syrphus*] (1822); ? MACQ., Suit. à Buff., I. 559. 18. (1834).
- lanigulosa** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 416. 70. f. 18. Helvetia. (1894).
- lapponica** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 440. 87. f. 90. Lapponia. (1894).
- lasiopa* KOW. = **honesta** ROND.
- laticornis* ROND. = **latifacies** LW.
- latifacies** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 593. 10. (1857); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 376. 37. f. 164—165. (1894); Europa mer., Asia min. VERR., Cat. europ. Syrph., 37. (1900).
- albibarbis* BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 550. 2. [*Cartosyrphus*] (1883).
- hirtiventris* BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 550. 1. [*Cartosyrphus*] (1883).
- laticornis* ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 160. 20. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 137. (1865).
- means* LW. (nec FABR.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 594. 11. (1857); SCHUS., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 322. 12. (1857) et F. A., I. 280. (1862); PASD., Rev. entom., XXIV. 43. (1905).
- superciliata* ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 30. (1868); MISÁ PAL., Natural. Sicil., XIV. 17. 3. (1896).
- latifrons* ZETT. = **intonsa** LW.
- lenis** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 463. 103. f. 38. Europa centr. (1894). Alpes.
- lenta** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 478. 114. f. 86. (1894). Hungaria.
- limbata* MACQ. = **chloris** MEIG.
- linearis* v. Ros. = **mutabilis** FALL.
- lineata* ZETT. = **morio** ZETT.
- Loewi** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 349. 17. f. 145—147. Europa centr. (1894).
- longifila** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 471. 107. f. 47—48. Germania. (1894).
- longiventris** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 482. 118. f. 56. (1894). Helvetia.
- longula** ZETT., Ins. Lapp., 613. 15. [*Eristalis*] (1838) et Dipt. Scand., II. 812. 36. [*Eristalis*] (1843); VERR., Entom. Monthly Mag., VII. 201. (1871) et Brit. Fl., VIII. 217. 4. f. 217. (1901); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 370. 33. f. 162. (1894). Europa centr. et sept., Sibiria.
- ? *albiseta* MEIG., S. B., VII. 127. 36. (1838); SCHUS., F. A., I. 288. (1862); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 355. 36. (1902).
- ? *geniculata* ZETT. (nec v. Ros.), XII. 4639. 37. [*Eristalis*] (1855) (nec II. 812); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 250. (1894).
- ? *nigricornis* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 203. (55). 10. (1827).

et Suit. à Buff., I. 559. 16. (1834); MEIG., S. B., VII. 126. 24. (1838); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 355. 24. (1902).

plumulifera LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 600. 17. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 323. 17. (1857) et F. A., I. 280. (1862); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 252. (*plumilifera*) (1894); PAND., Rev. entom., XXIV. 41. (1905).

luctuosa MEIG. = *vernalis* FALL.

lugubris ZETT. = *nigripes* MEIG.

luteicornis ZETT. = *morio* ZETT.

maculata FALL., Dipt. Suec. Syrph., 52. 6. [*Eristalis*] (1817); MEIG., S. B., III. 295. 34. [*Syrphus*] (1822); ZETT., Dipt. Scand., II. 780. 4. [*Eristalis*] (1843); WALK., Ins. Brit., I. 284. 17. (1851); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 616. 27. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 324. 28. (1857) et F. A., I. 278. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 207. (1870) et Brit. Fl., VIII. 212. I. f. 212. 214—216. (1901); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 188. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 366. 29. f. 158. (1894). Europa centr. et sept.

maculicornis BONSD. = *pagana* MEIG.

magnicornis BONSD. = *pagana* MEIG.

marginata BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 362. 25. f. 122—123. (1894). Alpes.

maroccana BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 395. 51. f. 114—115. (*marokkana*) (1894). Marocco.

means FABR. = *Hercyniae* LW.

means LW. = *latifacies* LW.

means MEIG. = *soror* ZETT.

means ZETT. = *pagana* MEIG.

melanopa ZETT., Dipt. Scand., II. 807. 31. (1843) et VIII. 3173. 31. [*Eristalis*] (1849); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 590. 8. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 321. 9. (1857) et F. A., I. 276. (1862); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 389. 47. f. 116. (1894). Europa centr. et sept., Sibiria.

melanura BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 176. 171. (*sine nomine*) (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 468. 106. f. 40. (1894); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 127. (1893). Europa centr., Alpes.

metallina BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 398. 54. f. 106. (1894). Gallia.

mixta BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 481. 117. f. 57. (1894); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 178. (1893). Europa centr.

modesta EGG. = *proxima* ZETT.

montana EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 350. (1860); SCHN., F. A., I. 284. (1862); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 176. 170. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 400. 56. f. 3. (1894). Europa centr., Alpes.

- morio** ZETT., Ins. Lapp., 612. 9. [*Eristalis*] (1838) et Dipt. Scand., II. 795. 19. (1843), VIII. 3171. 19. [*Eristalis*] (1849); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 267. 15. [*Eristalis*] (1861); SCHN., F. A., I. 283. (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 205. (1885); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 179. (1893); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 448. 92 f. 100. (1894); PAXD., Rev. entom., XXIV. 37. (1905).
- lineata* ZETT., Dipt. Scand., II. 807 *observ.* (1843) et VIII. 3171. [*Eristalis*] (1849).
- lateicornis* ZETT., Ins. Lapp., 612. 11. [*Eristalis*] (1838) et Dipt. Scand., II. 799. 23. (1843), VIII. 3172. 23. [*Eristalis*] (1849); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 156. 10. (1857).
- mutabilis** FALL., Dipt. Suec. Syrph., 54. 10. [*Eristalis*] (1817); MEIG., S. B., III. 283. 10. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 202. (54). 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 558. 14. (1834); ZETT., Ins. Lapp., 614. 18. [*Eristalis*] (1838) et Dipt. Scand., II. 802. 27. (1843), XIII. 6019. 27. [*Eristalis*] (1859); SCHEFFER ap. F. Rossi, Syst. Verz., 41. 28. (1848); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 332. 69. (1857) et F. A., I. 283. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 270. 21. [*Eristalis*] (1861); ? LABOULE., Annal. Soc. entom. France, (4). IV. 88. (1864); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 32. (1868); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 205. (1870) et Brit. Fl., VIII. 252. 23. (1901); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 490. 124. f. 79. (1894) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 351. 10. (1902).
- funeralis* MEIG., S. B., III. 292. 26. [*Syrphus*] (1822); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 333. 70. (1857); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 353. 26. (1902).
- glirina* ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 155. 9. (1857).
- linearis* v. Ros., Württemb. Corrbll., I. 54. [*Syrphus*] (1840); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 251. (1894).
- placida* MEIG., S. B., VII. 128. 40. (1838); SCHN., F. A., I. 288. (1862); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 355. 40. (1902).
- pratensis* MEIG., S. B., III. 293. 30. [*Syrphus*] (1822); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 333. 72. (1857); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 354. 30. (1902).
- pasilla* ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 156. 12. (1857).
- pygmaea* ZETT., Ins. Lapp., 614. 20. [*Eristalis*] (1838) et Dipt. Scand., II. 796. 20. (1843), VIII. 3171. 20. (1849), XIII. 6016. 20. [*Eristalis*] (1859); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 268. 16. [*Eristalis*] (1861); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 32. (1868).
- mutabilis* WALK. ? *albitarsis* MEIG.
- naso** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 476. 112. f. 62. (1894). Europa centr. et sept.
- nasuta* ZETT. = **nigra** ZETT.
- nasutula** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 342. 11. (1894); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 226. (*al. var. nigripedis*) (1898). Europa centr.

- nebulosa** VERR., Entom. Monthly Mag., VII. 201. (1871) et Brit. Fl., Europa centr. VIII. 241. 17. f. 225. (1901).
Verralliana MIK, Wien. entom. Zeitg., XVI. 116. 8. (1897).
- nigra** ZETT., Dipt. Scand., II. 847. 2. (1843) et VIII. 3186. 2. [*Psilota*] Scandinavia. (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 283. 1. [*Psilota*] (1861); SCHN., F. A., I. 266. [*Psilota*] (1862).
nasuta ZETT., Ins. Lapp., 613. 14. [*Eristalis*] (1838) et Dipt. Scand., II. 816. *obserr.* [*Psilota*] (1843).
- nigricornis* MACQ. = ? **longula** ZETT.
- nigrina* MEIG. = **variabilis** PANZ.
- nigripes** MEIG., S. B., III. 282. 8. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Europa, Lille, 1827. 200. (52). 4. (1827) et Suit à Buff., I. 557. 10. (1834); Asia min. GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscov., XV. 669. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 283. 13. (1851); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 609. 22. (1857); ROSD., Dipt. ital. Prodr., II. 151. 17. (1857); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 115. (1889) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 350. 8. (1902).
antiqua LW. (*nec* MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 606. 21. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 323. 22. (1857) et F. A., I. 278. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 207. (1870) et Brit. Fl., VIII. 215. 3. (1901); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 188. (1889), N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 336. 7. f. 138. (1894) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 353. 24. (1902); PAND., Rev. entom., XXIV. 40. (1905).
castaneiventris BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 551. 3. [*Cartosyrphus*] (1883).
coemeteriorum var. *b.* FALL., Dipt. Suec. Syrph., 55. [*Eristalis*] (1817); ZETT., Ins. Lapp., 613. 13. [*Eristalis*] (1838).
lugubris ZETT., Ins. Lapp., 614. 19. [*Eristalis*] (1838) et Dipt. Scand., II. 815. 39. [*Eristalis*] (1843).
Schmidtii p. p., ZETT., Dipt. Scand., II. 813. 38. (1843) et VIII. 3174. 38. [*Eristalis*] (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 272. 28. [*Eristalis*] (1861).
tropica MEIG., S. B., III. 291. 25. [*Syrphus*] (1822); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 324. 23. (1887); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 353. 25. (1902).
- nigrita* FABR. — **variabilis** PANZ.
- nigritarsis* STROBL. — **Schnabli** BECK. var.
- nigropilosa* STROBL. — **pagana** MEIG. var.
- nitida* MEIG. = **vernalis** FALL.
- nitidula* KALTENE. — **vernalis** FALL.
- nivalis** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 341. 10. (1894); Europa centr. STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 227. (1898).
- Nowickii* LW. = **circularis** PANZ.
- nudiseta** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 407. 62. f. 10. Sibiria. (1894).

- obscura* LW. — **vernalis** FALL.
oestracea SCHELL. = **illustrata** HARR.
olivacea VERR. = **honesta** ROND.
olivacea ZETT. = **gigantea** ZETT.
omissa BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 466. 105. f. 39. (1894). Europacentr.,
 Alpes.
pagana MEIG., S. B., III. 292. 28. [*Syrphus*] (1822); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 334. 78. (1857); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 354. 28. (1902). Europa,
 Sibiria.
? atra GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscon, XV. 670. (1842); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 504. 137. (1894).
? fusca SCHRANK, Enum. insect., 452. 916. [*Musca*] (1781).
maculicornis BONSD., Finnl. Insekt., I. 266. 13. [*Eristalis*] (1861).
magnicornis BONSD., Finnl. Insekt., I. 271. 25. [*Eristalis*] (1861).
means ZETT. (nec FABR.), Dipt. Scand., II. 787. 12. (1843), VIII. 3167. 12. (1849) et XIII. 6014. 12. [*Eristalis*] (1859); WALK., Ins. Brit., I. 282. 6. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 265. 7. [*Eristalis*] (1861); MALM, Kongl. Vet. Handl., 1863. 53. (1863).
pulchriceps ALDRICH, Cat. N. A. Dipt., 353. (1905).
pulchripes LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 597. 13. (1857); SCHN., Verh. zool. bot. Ges. Wien, VII. 322. 14. (1887) et F. A., I. 281. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 206. (1870) et Brit. Fl., VIII. 222. 7. f. 222. 223. (1901); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 372. 35. f. 161. (1894); PAND., Rev. entom., XXIV. 42. (1905).
subalpina ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 161. 23. (1857).
var. floccosa VERR., Brit. Fl., VIII. 224. (1901). Europacentr.
var. nigropilosa STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 432. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 588. (1900). Europa mer.
pallidicornis MEIG. — **vernalis** FALL.
parvicornis BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 340. 9. f. 129. (1894). Helvetia.
pascuorum BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 433. 81. (1894). Europa centr.
 et sept.
pedemontana ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 158. 18. (1857); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 178. 188. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 327. 3. f. 130. (1894); ? PAND., Rev. entom., XXIV. 39. (1905). Alpes.
pedestris BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 452. 95. f. 99. (1894). Helvetia.
personata LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 613. 25. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 324. 26. (1857) et F. A., I. 276. (1862); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 186. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 323. 1. (1894); PAND., Rev. entom., XXIV. 39. (1905). Europacentr.
phantoma ZETT. **chrysocoma** MEIG.
pictipennis EGQ., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 352. (1860); SCHN., Alpes.

- F. A., I. 285. (1862); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 408. 63. f. 12—13. (1894).
- var. innominata* BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 409. Silesia. 64. (1894).
- pigra* LW. = **vulpina** MEIG.
- pilifer** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 364. 27. f. 133—134. Alpes. (1894).
- pini** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 450. 93. f. 102. (1894). Austria.
- placida* MEIG. = **mutabilis** FALL.
- planifacies** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 438. 85. f. 101. Silesia. (1894).
- plumbella** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 475. 111. f. 42. Helvetia. (1894).
- plumulifera* LW. = **longula** ZETT.
- polita** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 501. 134. f. 75. (1894). Europa centr.
- pollinosa** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 494. 127. f. 17. Sibiria. (1894).
- praecox* ZETT. = **ruralis** MEIG.
- pratensis* MEIG. = **mutabilis** FALL.
- proxima** ZETT., Dipt. Scand., II. 792. 17. [*Eristalis*] (1843); BONSD., Finnl. Insekt., I. 266. 12. [*Eristalis*] (1861); SCHN., F. A., I. 282. (1862); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 432. 80. f. 71—72. (1894); VERR., Brit. Fl., VIII. 256. 25. (1901); PAND., Rev. entom., XXIV. 36. (1905). Europa, Sibiria.
- chlorus* p. p., WALK., Ins. Brit., I. 282. 7. (1851).
- decidua* VERR. (*nec* EGG.), Entom. Monthly Mag., VI. 206. (1870).
- ? *fuscicornis* ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 137. (1865).
- modesta* EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 354. (1860); SCHN., F. A., I. 287. (1862); PAND., Rev. entom., XXIV. 37. (1905).
- psilophthalma** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 495. 128. Hungaria. f. 76—78. (1894).
- pubera* VERR. = **antiqua** MEIG.
- pubera** ZETT., Ins. Lapp., 613. 16. [*Eristalis*] (1838) et Dipt. Scand., II. 810. 34. (1843), XII. 4669. 34. [*Eristalis*] (1855); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 610. 23. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 324. 24. (1857) et F. A., I. 278. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 272. 26. [*Eristalis*] (1861); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 188. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 346. 15. f. 140. (1894). Europa centr. et sept.
- pulchriceps* ALDR. = **pagana** MEIG.
- pulchripes* LW. = **pagana** MEIG.
- pusilla* ROND. = **mutabilis** FALL.
- pygmaea* ZETT. = **mutabilis** FALL.
- recens** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 343. 13. f. 152. Austria. (1894).
- rhyncops** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 353. (1860); SCHN., F. A., I. 277. (1862); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. Europa centr., Alpes.

- 177, 175 (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 445, 90. f. 88. (1894); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 226. (1898).
- rostrata* ZETT. **cynocephala** Lw.
- rotundiventris** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 459, 100. f. 54. (1894). Europa centr. et mer.
- vernalis* ROND. (nec FALL.), Dipt. ital. Prodr., II. 158, 8. (1857).
- ruficollis** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 461, 101. f. 63. (1894). Austria.
- rufimana** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 473, 109. f. 49. (1894). Germania.
- rufipes* MACQ. - ? **ruralis** MEIG.
- rufitarsis** ZETT., Dipt. Scand., XII. 4665, 17-18. [*Eristalis*] (1855); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 176. (1893) et XXXIV. 225. (1898). Europa centr. et sept.
- rufitibia* EGG. - **fraterna** MEIG.
- rupestris* PANZ. = **illustrata** HARR.
- ruralis** MEIG., S. B., III. 293, 29. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827, 202. (54), 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 558, 13. (1834); SCHUS., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 333, 71. (1857); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 354, 29. (1902). Europa, Sibiria, Africa sept.
- glabrata* MEIG., S. B., VII. 125, 15. (1838); SCHUS., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 328, 46. (1857); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 355, 15. (1902).
- praecox* ZETT., Dipt. Scand., II. 801, 25. (1843), XII. 4668, 25. (1855) et XIII. 6018, 25. [*Eristalis*] (1859); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 150, 11. (1857); BOSSQ., Finnl. Insekt., I. 269, 20. [*Eristalis*] (1861); SCHUS., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 331, 60. (1857) et P. A., I. 287. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 206. (1870) et Brit. Fl., VIII. 251, 22. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 205. (1885); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 493, 126. f. 85. (1894).
- rafipes* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827, 206. (58), 14. (1827) et Suit. à Buff., I. 559, 19. (1834); MEIG., S. B., VII. 128, 41. (1838).
- tarsata* MACQ., Suit. à Buff., I. 557, 7. (1834); MEIG., S. B., VII. 129, 48. (1838).
- urbana* p. p. MEIG., S. B., III. 287, 16. [*Syrphus*] (1822); SCHUS., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 331, 61. (1857); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 352, 16. (1902).
- Sahlbergi** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 354, 21. f. 136-137. (1894). Europa centr. et sept.
- sareptana** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 418, 72. (1894); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hereceg., XIV. 479. (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hereceg., IX. 538. (1904). Europa mer.
- Schineri** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 357. (1860); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 419, 65. f. 17. (1894). Europa mer., Asia min.
- Schmidti* ZETT. **nigripes** MEIG. et **vicina** ZETT.

- Schnabli** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 498. 131. f. 84. Caucasus.
(1894).
- var. nigritarsis* STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hereceg., Bosnia.
X. 433. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hereceg., VII. 588. (1900).
- scutellata** FALL., Dipt. Suec. Syrph., 55. 13. [*Eristalis*] (1817); MEIG., Europa,
S. B., III. 284. 12. t. XXX. f. 29. 30. [*Syrphus*] (1822) et VII. 123. Sibiria,
(1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 207. (59). 16. (1827) et Smit. Asia min.
à Buff., I. 560. 21. (1834); ZETT., Ins. Lapp., 613. 17. [*Eristalis*]
(1838) et Dipt. Scand., II. 308. 32. (1843), VIII. 3173. 32. (1849),
XIII. 6020. 32. [*Eristalis*] (1859); DUF., Ann. Sci. Nat., (2). XIII.
149. 1. t. III. f. 1—4. (1840) et Annal. Soc. entom. France, (3).
I. 384. B. (1853); ROSD., Dipt. ital. Prodr., II. 160. 21. (1857);
LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 600. 15. (1857); SCHN.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 322. 16. (1857) et F. A., I. 280.
(1862); BONSD., Fiml. Insekt., I. 271. 24. [*Eristalis*] (1861);
FRAENK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 161. (1868); VERR.,
Entom. Monthly Mag., VI. 206. (1870) et Brit. Fl., VIII. 219. 5. f.
218—220. (1901); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 368.
31. f. 159. (1894); PAND., Rev. entom., XXIV. 43. (1905).
- anthraciformis* MEIG., S. B., III. 289. 21. [*Syrphus*] (1822);
SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 334. 81. (1857);
BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 352. 21. (1902).
- carialis* MEIG., S. B., III. 287. 17. [*Syrphus*] (1822); SCHN.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 334. 76. (1857); BECK.,
Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 352. 17. (1902).
- tarditas* HARR., Expos. engl. Ins., 106. t. XXXII. f. 40. [*Musca*]
(1776).
- urbana* p. p., MEIG., III. 287. 16. [*Syrphus*] (1822).
- scutellata* WALK. = **soror** ZETT.
- semifasciata** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 443. 89. f. Europa centr.
94—95. (1894).
- var. alpina* STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 225. (1898). Alpes.
- sibirica** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 344. 14. f. 135. Sibiria.
(1894).
- siciliana** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 447. 91. f. 97. (1894). Sicilia.
- signata* EGG. = **caerulescens** MEIG.
- signaticornis** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 365. 28. (1894). Helvetia.
- songarea** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 451. 94. f. 103. Songaria.
(1894).
- soror** ZETT., Dipt. Scand., II. 899. 33. [*Eristalis*] (1843); LW., Verh. Europa,
zool.-bot. Ges. Wien, VII. 599. 14. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Sibiria.
Ges. Wien, VII. 322. 15. (1857) et F. A., I. 279. (1862); ROSD.,
Dipt. ital. Prodr., II. 152. 22. (1857); EGG., Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, X. 666. (1860); MALM, Kongl. vet. Handl., 1863. 57. (1863);
VERR., Entom., V. 22. (1871), Entom. Monthly Mag., VI. 206.
(1870) et Brit. Fl., VIII. 221. 6. f. 221. (1901); BECK., N. Acta Leop.
Carol. Akad., LXII. 369. 32. f. 160. (1894).

- ? *fabricicornis* MEIG., S. B., III. 288. 18. [*Syrphus*] (1822); ST. FARG. SERV., Encycl. méth., X. 512. [*Syrphus*] (1825); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 204. (56). 12. (1827); SCHX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 322 et 327. 45. (1857) et F. A., I. 288. (1862); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 352. 18. (1902).
- means* MEIG. (nec FABR.), S. B., III. 285. 13. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 206. (58). 15. (1827) et Suit. à Buff., I. 550. 20. (1834); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 240. (1894) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 355. 29. (1902).
- scutellata* WALK. (nec FALL.), Ins. Brit., I. 283. 12. (1851).
- sparsa* LW. = **antiqua** MEIG.
- strigillata** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 502. 135. f. 68. (1894). Rossia mer.
- Strobli** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 425. 76. f. 27. (1894). Austria.
- stupidida** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 413. 67. f. 30. (1894). Hungaria.
- subalpina* ROND. = **pagana** MEIG.
- superba** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 509. 55. f. 11. (1894). Sibiria.
- superciliata* ROND. = **latifacies** LW.
- tarditas* HARR. **scutellata** FALL.
- tarsata* MACQ. = ? **ruralis** MEIG.
- testacicornis* ROND. = ? **correcta** BECK.
- trisulcata** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 426. 77. f. 19--20. (1894). Helvetia.
- tropica* MEIG. = **nigripes** MEIG.
- tumidilabris** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 485. 121. f. 53. (1894). Sibiria.
- umbrisquama** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 453. 96. (1894); VERR., Cat. europ. Syrph., 43. (1900). Europa mer.
- ? *albichaeta* ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 31. (*albicheta*) (1868).
- albiseta* ROND. (nec MEIG.), Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 136. (1865).
- arbana* MEIG. **ruralis** MEIG. et **scutellata** FALL.
- uviformis** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 499. 132. f. 65. (1894). Helvetia.
- variabilis** PASZ., Fauna germ., LX. 10. [*Syrphus*] (1798); LATR., Gen. crust. ins., IV. 325. [*Syrphus*] (1809); FALL., Dipt. Succ. Syrph., 54. 9. [*Eristalis*] (1817); MEIG., S. B., III. 281. 6. [*Syrphus*] (1822) et VII. 123. (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 200. (52). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 557. 9. (1834); ZEFF., Dipt. Scand., II. 790. 14. (1843), VIII. 3168. 14. (1849), XII. 4664. 14. (1855) et XIII. 6015. 14. [*Eristalis*] (1859); WALK., Ins. Brit., I. 282. 8. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 151. 16. (1857); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 589. 7. (1857); SCHX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 321. 8. (1857) et F. A., I. 276. (1862); BOSSD.,

- Finnl. Insekt., I. 265. 9. [*Eristalis*] (1861); KALTENB., Pflanzenf., 378. 51. (1874); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 204. (1870) et Brit. Fl., VIII. 224. 8. f. 210. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 204. (1885); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 381. 40. f. 117. (1894); PAND., Rev. entom., XXIV. 31. (1905).
- atra* FABR., Syst. Antl., 246. 66. [*Eristalis*] (1805).
- funebri* HARR., Expos. engl. Ins., 106. t. XXXII. f. 37. [*Musca*] (1776).
- nigri*na MEIG., S. B., III. 282. 7. [*Syrphus*] (1822); WALK., Ins. Brit., I. 283. 9. (1851); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 350. 7. (1902).
- nigrita* FABR., Syst. Antl., 244. 55. [*Eristalis*] (1805).
- varians** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 182. 189. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 329. 4. f. 124—125. (1894). Helvetia.
- velutina** Lw., Programm Posen, 33. 11. (1840) et Isis, 1840. 570. 11. Europa centr. (1840); SCHN., F. A., I. 288. (1862); BRISCHKE, Entom. Nachricht., VI. 56. (1880); MIK, Wien. entom. Zeitg., VI. 264. 38. (1887); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 486. 122. f. 80. (1894). et sept.
- veidua* EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 356. (1860); SCHN., F. A., I. 275. (1862).
- venosa* BECK. 1889. — **laevis** BECK.
- venosa** Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 603. 19. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 323. 20. (1857) et F. A., I. 277. (1862); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 356. 22. f. 150—151. (1894). Alpes.
- vernalis** FALL., Dipt. Succ. Syrph., 55. 12. [*Eristalis*] (1817); ZETT., Ins. Lapp., 612. 10. [*Eristalis*] (1838) et Dipt. Scand., II. 797. 21. (1843), VIII. 3171. 21. (1849), XIII. 6016. 21. [*Eristalis*] (1859); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 331. 59. (1857) et F. A., I. 287. (1862); BOYSD., Finnl. Insekt., I. 268. 17. [*Eristalis*] (1861); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 206. (1870) et Brit. Fl., VIII. 254. 24. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 208. (1885); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 457. 99. f. 35. (1894); PAND., Rev. entom., XXIV. 37. (1905). Europa.
- vaerea* DUF., Annal. Sci. Nat., (3). IX. 209. t. XVI. f. 6—10. (1840); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 504. 138. (1894).
- chalybeata* WALK. (nec MEIG.), Ins. Brit., I. 284. 14. (1851); HARDY, Scot. Nat., I. 177. (1860).
- funeralis* WALK. (nec MEIG.), Ins. Brit., I. 284. 16. (1851).
- luctuosa* MEIG., S. B., VII. 125. 16. (1838); SCHN., F. A., I. 288. (1862); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 355. 16. (1902).
- metatarsata* STAEG. in litt. ap. ZETT. [*Eristalis*].
- nitida* MEIG., S. B., VII. 126. 17. (1838); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 245. (1894) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 355. 17. (1902).
- nitidula* KALTENB., Verh. naturwiss. Ver. preuss. Rheintl., XXI.

233. 3. (1864) et Pflanzenf., 342. 15. (1874); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 507. (1894); VERR., Brit. Fl., VIII. 425. [*Syrphus*] (1901).
- obscura* LW., Programm Posen, 33. 10. (1840) et Isis, 1840. 570. 10. (1840).
- pallidicornis* MEIG., S. B., III. 294. 31. [*Syrphus*] (1822); ZETT., Dipt. Scand., II. 800. 24. (1843) et VIII. 3172. 24. [*Eristalis*] (1849); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 330. 56. (1857); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 269. 19. [*Eristalis*] (1861); BECK., Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 354. 31. (1902); PAND., Rev. entom., XXIV. 36. (1905).
- vernalis* MEIG. = **impressa** LW.
- vernalis* ROND. = **rotundiventris** BECK.
- Ferralliana* MIK = **nebulosa** VERR.
- vicina** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3175. 38—39. (1849) et XIII. 6021. 38—39. [*Eristalis*] (1859); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 273. 29. [*Eristalis*] (1861); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 186. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 342. 12. f. 132. (1894); PAND., Rev. entom., XXIV. 40. (1905).
- Schmidtii* var. *b.* ZETT., Dipt. Scand., II. 814. [*Eristalis*] (1843).
- vidua* MEIG. = **albitarsis** MEIG.
- viluata* SCHN. = **albitarsis** MEIG.
- violaceozonata** PALMA, Ann. Acc. asp. nat., (3). III. 61. 104. t. VII. f. 13. (1864); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 31. (1868); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 505. 1:9. (1894).
- vulnerata* PANZ. = **barbata** LW.
- vulpina** MEIG., S. B., III. 292. 27. [*Syrphus*] (1822); WALK., Ibs. Brit., I. 284. 15. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 332. 65. (1857); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 242 et 503. 136. (1894) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 353. 27. (1902); VERR., Brit. Fl., VIII. 228. 10. (1901); PAND., Rev. entom., XXIV. 37. (1905).
- pigra* LW., Programm Posen, 33. 14. (1840), Isis 1840. 571. 14. (1840) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 585. 2. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 320. 2. (1857) et F. A., I. 275. (1862); VERR., entom. Monthly Mag., VI. 204. (1870); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 175. 169. (1889) et N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 383. 41. f. 104. (1894); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercegov., X. 432. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercegov., VII. 588. (1900); PAND., Rev. entom., XXIV. 32. (1905).
- Zetterstedti** BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 430. 79. f. 70. (1894).^{*)}

^{*)} *divaricata* AM STEIN, Nat. Jahrb. Graubünd., II. 99. (1857) et *sphaerocera* BECK. ap. STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 179. (1893), sunt nomina nuda.

Platychirus

ST. FARG. SERV., Encycl. méthod., X. 513. [*Platychirus*] (1825), emend. Agassiz, Nomencl., 295. (1842—46).

agilitas HARR. = **albimanus** FABR.

albimanus FABR., Spec. insect., II. 434. 63. [*Syrphus*] (1781), Entom. Europa.

syst., IV. 310. 117. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 253. 23. [*Scaeva*] (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2876. 364. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 455. 125. [*Musca*] (1789); FALL., p. p., Dipt. Snee. Syrph., 46. 19. [*Scaeva*] (1817); MEIG., S. B., III. 333. 87. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 225. (77). 1. [*Syrphus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 546. 41. [*Syrphus*] (1834); ZETT., Ins. Lapp., 607. 35. [*Scaeva*] (1838) et Dipt. Scand., II. 752. 56. (1843), XII. 4650. 56. [*Scaeva*] (1855); LW., Programm Posen, 36. 20. [*Syrphus*] (1840) et Isis, 1840. 573. 20. [*Syrphus*] (1840); STAEG., Kröjers Tidsskr., (2). I. 4. 326. [*Scaeva*] (1845); ROSD., Dipt. ital. Prodr., II. 118. 3. (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 359. 94. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 294. (1862); BONSD., Finkl. Insekt., I. 253. 53. [*Scaeva*] (1861); VERR., Entom. Monthly Mag., VII. 128. (1871) et Brit. Fl., VIII. 280. 7. f. 241—244. (1901); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 202. (1885); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 173. (1893); GRIFF., Miscell. entom., III. 107. (1895).

agilitas HARR., Expos. engl. Ins., 108. t. XXXII. f. 45. [*Musca*] (1776).

ciliatus BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 74. (1884); WILL., Syn. N. A. Syrph., 60. (1886).

? *cyaneus* O. F. MÜLL., Fauna Fridrichsd., 761. [*Musca*] (1764); WALK., Ins. Brit. I. 294. 28. [*Syrphus*] (1851).

pulchellus PALMA, Ann. Acc. asp. Nat., (3). III. 56. 88. t. VI. f. 8. (1864); ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 26. (1868); v. RÖD., Entom. Nachricht., XVII. 81. (1891).

albimanus FALL. = **albimanus** FABR., **clypeatus** MEIG., **peltatus** MEIG. et **scutatus** MEIG.

alpicola SCHUMM. = **manicatus** MEIG.

alpinus STROBL = **clypeatus** MEIG. var.

angustatus ZETT., Dipt. Scand., II. 762. 64. (1843), VIII. 3154. 64. Europa centr. (1849), XII. 4661. 64. (1855) et XIII. 6005. 64. [*Scaeva*] (1859); et sept. BONSD., Finkl. Insekt., I. 256. 62. [*Scaeva*] (1861); MALM, Kongl. vet. Handl., 1863. 42. (1863); VERR., Entom. Monthly Mag., VII. 129. (1871) et Brit. Fl., VIII. 295. 14. 679. f. 254—255. (1901); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 174. (1893).

? *bimaculatus* v. Ros., Württemb. Corubl., I. 55. [*Syrphus*] (1840).

bimaculatus v. Ros. = ? **angustatus** ZETT.

chactopodus WILL. = ? **scambus** STAEG.

ciliatus BIG. = **albimanus** FABR.

ciliger LW. = **tarsalis** SCHUMM.

- clypeatus** MEIG., S. B., III. 335. 90. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 227. (79). 4. [*Syrphus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 547. 44. [*Syrphus*] (1834); ZETT., Ins. Lapp., 606. 31. [*Scavea*] (1838) et Dipt. Scand., II. 748. 51. (1843), VIII. 3145. 51. (1869), XIII. 6001. 51. [*Scavea*] (1859); LW., Programm Posen, 36. 21. [*Syrphus*] (1840) et Isis, 1840. 573. 21. [*Syrphus*] (1840); STAEG., Kröjers Tidskr., (2). I. 4. 323. [*Scavea*] (1845); WAHLBG., Öfv. vet. Akad. Förhandl., IV. 101. [*Scavea*] (1847); WALK., Ins. Brit. I. 294. 25. [*Syrphus*] (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 118. 1. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 359. 92. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 296. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 250. 46. [*Scavea*] (1861); SIEBKE, Enum. insect. norveg., IV. 61. 43. [*Scavea*] (1877); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 203. (1885); JAROSCH, Trud. Naturf. Ges. Karkoff, XX. 9. 14. (*sep.*) (1886); VERR., Brit. Fl., VIII. 293. 13. f. 252—53. (1901); MELL., Zool. Jahrbüch., XV. t. 44—45. (1902).
- albimanus* FALL., p. p., Dipt. Suec. Syrph., 46. [*Scavea*] (1817).
dilatatus MACQ., Suit. à Buff., I. 547. 45. [*Syrphus*] (1834); MEIG., S. B., VII. 138. 115. [*Syrphus*] (1838); STROBL, Mittheil. Verh. Steierm., XXXIV., 224. (1898).
- ?*hyperboreus* WÜLL. (*acc* STAEG.), Syn. N. A. Syrph., 57. t. III. f. 12. (1886); SNOW, Kans. Univ. Quart., III. 231. (1895); CHAGNON, Nat. Can., 1901. 29. 2. (1901); HOW., Ins. book, t. XXI. f. 22. (1902).
- var. alpinus* STROBL, Mittheil. Verh. Steierm., XXIX. 174. (1893). Alpes.
- clypeatus* ZETT. = **clypeatus** MEIG. et **scambus** STAEG.
complicatus BECK. = **sticticus** MEIG.
cristatus SCHUMM. = **peltatus** MEIG.
cyaneus MÜLL. = ? **albimanus** FABR.
dilatatus MACQ. = **clypeatus** MEIG.
dilatatus STROBL = **melanopsis** LW.
- discimanus** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 227. 121. (1871); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 202. (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 270. 3. f. 233—234. (1901).
latimanus VERR. (*acc* WAHLBG.), Entom. Monthly Mag., IX. 283. (1873).
- fasciculatus** LW., N. Beitr., IV. 45. 37. (1856); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 358. 88. [*Syrphus*] et F. A., I. 293. (1862).
ferruginus MACQ. = **fulviventris** MACQ.
ferruginus ZETT. = **fulviventris** MACQ. et **immarginatus** ZETT.
- fulviventris** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 229. (81). 6. [*Syrphus*] (1837) et Suit. à Buff., I. 548. 47. [*Syrphus*] (1834); MEIG., S. B., VII. 136. 112. [*Syrphus*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., 750. 53. (1843) et VIII. 3150. 51. [*Scavea*] (1849); STAEG., Kröjers Tidskr., (2). I. 4. 325. [*Scavea*] (1845); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 118. 2. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 361. 100. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 296. (1862); VERR., Entom. Monthly

Europa.

Alpes.

Europa centr.

Europa centr.

Europa.

- Mag., VII. 129. (1871) et Brit. Fl., VIII. 288. 11. f. 248. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 203. (1885).
- ferrugineus* Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 229. (81). 7. [*Syrphus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 548. 48. [*Syrphus*] (1834); MEIG., S. B., VII. 137. 113. [*Syrphus*] (1838); ZETT. p. p., Dipt. Scand., II. 749. 52. (1843) et VIII. 3148. 52. [*Scavea*] (1849); WALK., Ins. Brit., I. 294. 26. [*Syrphus*] (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 251. 48. [*Scavea*] (1861).
- mellinus* DEG. (ae L.), Ins., VI. 117. [*Musca*] (1776).
- Winthemii* MEIG., S. B., VI. 353. 100. [*Syrphus*] (1830).
- geniculatus* ZETT. = **manicatus** MEIG.
- hyperboreus** STAEG., Kröjers Tidskr., (2). I. 4. 362. [*Scavea*] (1845); Europa sept.
LUNDB., Vid. Medd., 1899. 301. 91. (1899).
- hyperboreus* WILL. = ? **clypeatus** MEIG.
- immarginatus** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3149. 52—53. [*Scavea*] (1849); Europa centr.
BONSD., Finnl. Insekt., I. 251. 49. [*Scavea*] (1861); SCHN., F. A. et sept.
I. 296. (1867); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 174. (1870), VII. 129. (1871) et Brit. Fl., VIII. 287. 10. f. 247. (1901).
- ferrugineus* var. c. ZETT., Dipt. Scand., II. 749. [*Scavea*] (1863).
- navus* HARR., Expos. engl. Ins., 109. t. XXXII. f. 50. [*Musca*] (1776).
- polatyratus* p. p., ZETT., Dipt. Scand., II. 751. [*Scavea*] (1843); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 362. 102. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 296. (1862); STROB., Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 174. (1893).
- latimanus* VERR. 1873 = **discimanus** LW.
- latimanus** WAHLBG., Öfv. vet. Akad. Förhandl., I. 66. [*Scavea*] (1844); Europa sept.
ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3151. 55—56. [*Scavea*] (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 252. 52. [*Scavea*] (1861).
- manicatus** MEIG., S. B., III. 336. 91. [*Syrphus*] (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 228. (80). 5. [*Syrphus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 548. 46. [*Syrphus*] (1834); ZETT., Ins. Lapp., 606. 33. [*Scavea*] (1838) et Dipt. Scand., II. 745. 48. (1843), VIII. 3144. 48. [*Scavea*] (1869); STAEG., Kröjers Tidskr., (2). I. 4. 321. [*Scavea*] (1845); WALK., Ins. Brit., I. 293. 23. [*Syrphus*] (1851); BONSD., Dipt. ital. Prodr., II. 119. 5. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 357. 86. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 294. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 249. 43. [*Scavea*] (1861); VERR., Entom. Monthly Mag., VII. 127. (1871) et Brit. Fl., VIII. 266. 1 f. 229. 239. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 202. (1885).
- alpicola* SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1843. 190. [*Syrphus*] (1843).
- geniculatus* ZETT., Ins. Lapp., 612. 12. [*Eristalis*] (1838) et Dipt. Scand., II. 812. 37. [*Eristalis*] (1843); Beck., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 250. (1894).
- melanopsis** LW., N. Beitr., IV. 45. 38. (1856); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 360. 96. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 294. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., VII. 127. (1871) et Brit. Fl.,

- VIII. 272. 4. f. 235-236. (1901); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 224. (1898).
- dilatatus* STROBL (*nec* MACQ.), Mittheil. Ver. Hermannstadt, XLVI. 41. (1897).
- ? *parvatus* ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 121. 6. (1857).
- mellinus* DEG. = **fulviventris** MACQ.
- narus* HARR. = **immarginatus** ZETT.
- nudipes** BEGG., Acta Soc. Sci. fenn., XXVI. 41. 62. (1900) Sibiria.
- octomaculatus* v. Ros. = **peltatus** MEIG.
- parvatus* ROND. = ? **melanopsis** LW.
- peltatus** MEIG., S. B., III. 334. 89. t. XXX. f. 31. 32. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. et Suit. à Buff., I. 547. 43. [*Syrphus*] (1834); LW., Programm Posen, 35. 17. [*Syrphus*] (1840) et Isis, 1840. 572. 17. [*Syrphus*] (1840); ZETT., Ins. Lapp., 606. 30. [*Scaeva*] (1838) et Dipt. Scand., II. 747. 50. [*Scaeva*] (1843); STAEG., Kröjers Tidskr., (2) I. 4. 322. [*Scaeva*] (1845); WALK., Ins. Brit., I. 293. 24. [*Syrphus*] (1851); HAL., Stett. entom. Zeitg., XII. 140. (1851); SCHN., Verh. zool. bot. Ges. Wien, VII. 358. 91. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 295. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 250. 45. [*Scaeva*] (1861); SIEBKE, Enum. insect. norveg., IV. 60. 42. [*Scaeva*] (1877); MALM, Entom. Foren., 1880. 1. (1880); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 203. (1885); WILL., Syn. N. A. Syrph., 58. (1886); MIK, Wien. entom. Zeitg., VII. 141. 53. (1887); VERR., Brit. Fl., VIII. 274. 5. f. 237-238. (1901).
- albimanus* p. p., FALL., Dipt. Suec. Syrph., 46. [*Scaeva*] (1817).
- cristatus* SCHMML., Arb. schles. Ges., 1836. 85. [*Syrphus*] (1836).
- octomaculatus* v. Ros., Württemb. Corrb., I. 55. [*Syrphus*] (1840); SCHN., F. A., I. 292. [*Melanostoma*] (1862).
- rostratus* ZETT., Ins. Lapp., 607. 34. [*Scaeva*] (1838) et Dipt. Scand., II. 746. 49. (1843), VIII., 3144. 49. [*Scaeva*] (1849); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 250. 44. [*Scaeva*] (1861).
- timeo* HARR., Expos. engl. Ins., 107. t. XXXII. f. 44. [*Musca*] (1776).
- perpallidus** VERR., Brit. Fl., VIII. 290. 12., 679, f. 249. 250. (1901). Anglia.
- podagratus** ZETT., Ins. Lapp., 606. 32. [*Scaeva*] (1838) et Dipt. Scand., II. 751. 54. (1860), VIII. 3150. 54. [*Scaeva*] (1849); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 252. 50. [*Scaeva*] (1861); VERR., Entom. Monthly Mag., VII. 129. (1871) et Brit. Fl., VIII., 282. 8. f. 245. (1901); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 174. (1895). Europa centr. et sept.
- podagratus* ZETT. = **immarginatus** ZETT.
- pulchellus* PALMA = **albimanus** FABR.
- quadratus* MACQ. = **scutatus** MEIG.
- rostratus* ZETT. **peltatus** MEIG.
- scambus** STAEG., Kröjers Tidskr., (2) I. 4. 325. [*Scaeva*] (1845); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3147. 51-52. (1869) et XIII. 6002. 51-52. [*Scaeva*] (1859); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 251. 47. [*Scaeva*] (1861); MALM, Entom. Tidskr., I. 170. (1880); VERR., Entom.

- Monthly Mag., VII. 129. (1871) et Brit. Fl., VIII. 284. 9. f. 246. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 203. (1885).
? chaetopodus WILL., Syn. N. A. Syrph., 59. (1886).
clypeatus p. p., ZETT., Ins. Lapp., 606. 31. [*Scaeva*] (1838) et Dipt. Scand., II. 748. 51. [*Scaeva*] (1843); ? SCHIN., F. A., I. 296. (1862).
- scutatus** MEIG., S. B., III. 333. 88. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 225. (77). 2. [*Syrphus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 546. 42. [*Syrphus*] (1834); LW., Programm Posen, 36. 18. [*Syrphus*] (1840) et Isis, 1840. 573. 18. [*Syrphus*] (1840); WESTW., Introd., II. 559. [*Syrphus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., II. 751. 55. [*Scaeva*] (1843) et XIII. 6003. 55. [*Scaeva*] (1859); STAEG., Kröjers Tidsskr., (2). I. 4. 322. [*Scaeva*] 1845); WALK., Ins. Brit., I. 294. 27. [*Syrphus*] (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 119. 4. (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 359. 93. [*Syrphus*] (1887) et F. A., I. 295. (1862); BONSD., Finkl. Insekt., I. 252. 51. [*Scaeva*] (1861); VERR., Entom. Monthly Mag., VII. 128. (1871) et Brit. Fl., VIII. 277. 6. f. 239. 240. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 202. (1885).
albimanus p. p., FALL., Dipt. Suec. Syrph., 46. [*Scaeva*] (1817).
quadratus MACQ. (nec SAY 1823), Soc. Sci. Lille, 1827. 230. (82). 8. [*Syrphus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 549. 49. [*Syrphus*] (1838); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 324. [*Scaeva*] (1845); SCHIN., F. A., I. 297. (1862).
serenotatus MEIG., S. B., VII. 134. 107. [*Syrphus*] (1838); SCHIN., F. A., I. 312. [*Syrphus*] (1862).
- serenotatus* MEIG. = **scutatus** MEIG.
spathulatus ROND. = **sticticus** MEIG.
- sticticus** MEIG., S. B., III. 332. 86. [*Syrphus*] (1822); SCHIN., F. A., I. 292. [*Melanostoma*] (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 297. 15. 679. f. 256. (1901).
complicatus BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 172. 155. (1889).
spathulatus ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 121. 7. (1857).
- tarsalis** SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1836. 84. [*Syrphus*] (1836); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 203. (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 268. 2. f. 231--232. (1901).
ciliiger LW., N. Beitr., IV. 44. 36. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 358. 89. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 293. (1862).
- timeo* HARR. = **peltatus** MEIG.
Winthemii MEIG. = **fulviventris** MACQ.

Pyrophaena

SCHIN., Wien. entom. Monatschr., IV. 213. (1860).

- brassicaria* PANZ. = **granditarsa** FORST.
confusa HARR. = **granditarsa** FORST.

- granditarsa** FORST., Nov. species ins. Cent., 1. 99. [*Musca*] (1781); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 591. [*Syrphus*] (1849) et Ins. Brit., I. 295. 29. [*Syrphus*] (1851); VERR., Brit. Fl., VIII. 300. 1. f. 257—259. (1901). Europa centr. et sept.
- brassicaria* PANZ. (nec FABR.), Fauna germ., XX. 20. [*Musca*] (1794).
- confusa* HARR., Expos. engl. Ins., 110. t. XXXIII. f. 51. [*Musca*] (1776).
- lobata* MEIG., S. B., III. 336. 92. (1822) et VI. 353. [*Syrphus*] (1830).
- ocyni* FABR., Entom. syst., IV. 309. 114. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 252. 18. [*Scaeva*] (1805); PANZ., Fauna germ., LXXXII. 18. [*Syrphus*] (1801); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 48. 23. [*Scaeva*] (1817); MEIG., S. B., III. 337. 93. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 230. (82). 9. [*Syrphus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 546. 40. [*Syrphus*] (1834); ZETT., Ins. Lapp., 607. 36. [*Scaeva*] (1838) et Dipt. Scand., II. 754. 57. (1843), VIII. 3152. 57. [*Scaeva*] (1849); STAEG., Kröjers Tidskr., IV. 326. [*Scaeva*] (1845); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 362. 103. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 297. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 253. 54. [*Scaeva*] (1861); WILL., Syn. N. A. Syrph., 55. (1886); CHAGNON, Nat. Can., 1901. 25. (1901); How., Insect book, t. XX. f. 20. (1902).
- lobata* MEIG. = **granditarsa** FORST.
- noctiluca* PANZ. = **rosarum** FABR.
- ocyni* FABR. = **granditarsa** FORST.
- platygastra** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 229. 122. (1871). Sibiria.
- rosae* HENNECK. = **rosarum** FABR.
- rosarum** FABR., Mant. insect., II. 341. [*Syrphus*] (1787), Entom. syst., IV. 307. 109. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 251. 11. [*Scaeva*] (1805); VILL., Entom. linn., III. 460. 127. [*Musca*] (1789); GMEL., Syst. Nat., V. 2877. 366. [*Musca*] (1788); ROSSI, Mant. insect., II. 62. 529. [*Syrphus*] (1794); PANZ., Fauna germ., CVIII. 14. [*Cheilosisia*] (1809); MEIG., S. B., III. 338. 94. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 231. (83). 10. [*Syrphus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 545. 39. [*Syrphus*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 755. 58. (1843) et VIII. 3152. 58. [*Scaeva*] (1849); WALK., Ins. Brit., I. 195. 30. [*Syrphus*] (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 123. 2. [*Syrphus*] (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 357. 85. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 298. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 253. 55. [*Scaeva*] (1861); WILL., Syn. N. A. Syrph., 55. (1886); VERR., Brit. Fl., VIII. 392. 2. f. 260. (1901). Europa.
- noctiluca* PANZ. (nec L.), Fauna germ., LXXII. 24. [*Syrphus*] (1793).
- rosae* HENNECKE, Ber. naturw. Ver. Harzes, IV. 40. [*Syrphus*] (1845).

Melangyna

VERR., Brit. Fl., VIII. 313. 13. (1901).

barbifrons SCHIN. = **quadrimaculata** VERR.

quadrimaculata VERR., Entom. Monthly Mag., IX. 281. [*Melanostoma*] Europa centr. (1873) et Brit. Fl., VIII. 314. 1. (1901); KÖW., Wien. entom. Zeitr., IV. 201. [*Melanostoma*] (1885).

barbifrons SCHIN. (nec FALL.), F. A., I. 290. [*Melanostoma*] (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., VII. 201. [*Melanostoma*] (1873).

Spathiogaster

ROND., N. Ann. Sci. Nat. Bologna, X. 33. [*Spazigaster*] (1843), emend. LW. (1876).

Syrphisoma A. COSTA, Giamb. Vico, II. 440. (1857).

ambulans FABR., Entom. syst. Suppl., 562. 63. [*Syrphus*] (1798) et Europa centr. Syst. Antl., 192. 18. [*Milesia*] (1805); MEIG., S. B., III. 234. 8. et mer. [*Milesia*] (1822) et VI. 350 et 353. 99. [*Syrphus*] (1830); LW., Zeitschr. entom. Breslau, (2). V. 1. (1876); VERR., Cat. europ. Syrph., 52. (1900).

alpinus ROND. in litt. ap. ROND.

apennini ROND., N. Ann. Sci. nat. Bologna, X. 33. [*Spazigaster*] (1843), Magas. Zool. Guerin, t. 155. [*Spazigaster*] (1845), Dipt. ital. Prodr., II. 107. 1. [*Spazigaster*] (1857) et Atti Soc. it. Sci. Nat., VIII. 134. [*Spazigaster*] (1865).

lugubris A. COSTA, Giamb. Vico, II. 448. [*Syrphisoma*] (1857); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 108. 2. [*Spazigaster*] (1857).

ambulans SCHIN. = **Schummelii** LW.

apennini ROND. = **ambulans** FABR.

coarctatus SCHUMM. = **Schummelii** LW.

dispar LW. = **Schummelii** LW.

lugubris A. COSTA = **ambulans** FABR.

Schummelii LW., Zeitschr. entom. Breslau, (2). V. 2. (1876). Europa centr.

ambulans SCHIN. (nec FABR.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 373. 1. [*Spatigaster*] (1857) et F. A., I. 298. [*Spatigaster*] (1862).

coarctatus SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1836. 85. [*Syrphus*] (1836).

dispar LW., Stettin. entom. Zeitg., II. 6. [*Syrphus*] (1841); GERM., Fauna ins. europ., XXIII. t. 23. [*Syrphus*] (1842).

Melanostoma

SCHIN., Wien. entom. Monatschr., IV. 213. (1860).

ambiguum FALL., Dipt. Succ. Syrph., 47. 21. [*Scaeva*] (1817); ZERT., Europa. Ins. Lapp., 608. 38. [*Scaeva*] (1838) et Dipt. Scand., II. 757. 60.

(1843), VIII. 3153. 60. [*Scacra*] (1849); STAEG., Kröjers Tidskr., (2). 1. 4. 361. [*Syrphus*] (1845); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 353. 63. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 291. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 254. 57. [*Scacra*] (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 201. (1885); LUNDB., Vid. Medd., 1899. 300. 90. (1899); VERR., Brit. Fl., VIII. 304. 1. f. 261—262. (1901).

hyperboreum HOLMGR. (nec STAEG.), Öfv. vet. Akad. Förh., XXIX. 100. [*Scacra*] (1872).

monochaetum LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 224. 120. [*Syrphus*] (1871).

annulatum BIG. = ? *mellinum* L.

cingulatum EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 663. (1860); SCHN., F. A., I. 291. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 201. (1885). Europa centr.

concolor WALK. = *mellinum* L.

cruciatum BIG. = ? *mellinum* L.

dubium ZETT., Ins. Lapp., 609. 42. [*Scacra*] (1838) et Dipt. Scand., II. 763. 65. [*Scacra*] (1843); SIERKE, Nyt Mag. Naturw., VII. 297. [*Scacra*] (1853); BONSD., Finnl. Insekt., I. 256. 63. [*Scacra*] (1861); SCHN., F. A., I. 290. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 201. (1885); VERR., Entom. Monthly Mag., XXII. 230. (1886) et Brit. Fl., VIII. 307. 2. (1901); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 170. (1893). Europa.

? *unicolor* ROND. (nec MACQ.), Dipt. ital. Prodr., II. 128. 1. [*Syrphus*] (1857); SCHN., F. A., I. 292. (1862).

facultas HARR. = *mellinum* L.

fimbriatum LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 222. 119. [*Syrphus*] (1881). Sibiria.

gravile MEIG. — *scalare* FABR.

hyperboreum HOLMGR. = *ambiguum* FALL.

laevigatum MEIG. — *mellinum* L.

maculosum MEIG. = *scalare* FABR.

mellarium MEIG. = *mellinum* L.

mellinum L., Syst. Nat., X. 594. [*Musca*] (1758), XII. II. 988. 55. [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1821. [*Musca*] (1761); PODA, Ins. Mus. graec., 117. [*Musca*] (1761); Scop., Entom. Carn., 346. 934. [*Musca*] (1763); GEOFFR., Hist. Ins., II. 515. 42. [—] (1764); O. F. MÜLL., Fauna Friedrichsd., 82. 724. [*Musca*] (1764); FABR., Syst. Entom., 771. 44. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II. 433. 61. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 308. 110. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Autl., 251. 12. [*Scacra*] (1805); SCHRANK, Enum. insect., 449. 910. [*Musca*] (1781) et Fauna boica, III. 106. 2410. [*Musca*] (1803); GMELL., Syst. Nat., V. 2876. 55. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 459. 104. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etr., II. 297. 1481. [*Syrphus*] (1790); CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 306. 963. [*Syrphus*] (1798); HALL., Fauna etr. Rossi, II. 457. 1481. [*Syrphus*] (1807); LATR., Gen. crust. ins., IV. 325. [*Syrphus*] (1809); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 46. 2. [*Scacra*] (1817); MEIG., S. B., III. 331. 85. [*Syrphus*]

(1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 234. (86). 14. [*Syrphus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 544. 35. [*Syrphus*] (1834); ZETT., Ins. Lapp., 608. 40. [*Scaeva*] (1838) et Dipt. Scand., II. 759. 62. (1843), VIII. 3153. 62. (1849), XII. 4661. 62. [*Scaeva*] (1855); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 587. [*Syrphus*] (1849) et Ins. Brit., I. 295. 31. [*Syrphus*] (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 124. 5. [*Syrphus*] (1857); SEMN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 355. 73. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 292. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 254. 59. [*Scaeva*] (1861); LLOY, Atti Istit. Ven., (3). IX. 753. [*Psilogaster*] (1863); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 201. (1885); WILL., Syn. N. A. Syrph., 49. (1883) et Biol. centr. amer., III. 11. 4. (1891); F. LYNCH A., Ann. Soc. cient. Argent., XXXIII. 311. 3. (1892); SNOW, Kans. Univ. Quart., I. 35. (1892); GIUGLIO-T., Mem. Acc. Sci. Torino, (2). XLIII. 37. 92. (1892); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 171. (1893); GIARD, Bull. Soc. entom. France, 1896. 234. (1896); PLATEAU, Mém. Soc. Zool. France, 1900. 279. (1900); CHAGNOS, Nat. Can., 1901. 27. 3. (1901); VERR., Brit. Fl., VIII. 309. 3. f. 263. (1901); ЧАПМ., Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 151. (1905).

? *annulatum* BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 76. (1884).
concolor WALK., Ins. Brit., I. 296. 33. [*Syrphus*] (1851).

? *cruciatum* BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 81. (1884);
 ALDEICH, Cat. N. A. Dipt., 361. (1905).

facultas HARR., Expos. engl. Ius., 109. t. XXXIII. f. 49. [*Musca*] (1776).

laevigatum MEIG., S. B., VII. 134. 105. [*Syrphus*] (1822); SEMN., F. A., I. 292. (1862).

mellorium MEIG., S. B., III. 328. 81. (1822) et VII. 131. 81. [*Syrphus*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 235. (87). 15. [*Syrphus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 544. 36. [*Syrphus*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 762. [*Scaeva*] (1843); GRIFF., Bull. Mus. Torino, VIII. (143). 8. (1893).

mellitorgus MEIG., S. B., III. 329. 82. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 236. (88). 16. [*Syrphus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 544. 37. [*Syrphus*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 762. [*Scaeva*] (1843).

minutum MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 234. (86). 13. [*Syrphus*] (1827); MEIG., S. B., VII. 136. 110. [*Syrphus*] (1838).

nigricorne STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 172. (1893).
pruinosum BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 79. (1884).

scalare PANZ. (nec FABR.), Fauna germ., XLV. 20. [*Syrphus*] (1797); MEIG., S. B., III. 330. 83. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 233. (85). 12. [*Syrphus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 544. 33. [*Syrphus*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 762. [*Scaeva*] (1843).

unicolor MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 236. (88). 17. [*Syrphus*]

(1827) et Suit. à Buff., I. 545. 38. [*Syrphus*] (1834); MEIG., S. B., VII. 136. 111. [*Syrphus*] (1838); SCHN., F. A., I. 292. (1862).

melliturgus MEIG. = **mellinum** L.

minutum Macq. = **mellinum** L.

monochaetum LW. = **ambiguum** FALL.

nigricornis STROBL = **mellinum** L.

pruinosum BIG. = **mellinum** L.

punicatum MEIG., S. B., VII. 134. 106. [*Syrphus*] (1838); SCHN., F. A., I. 292. (1862). Germania.

scalare FABR., Entom. syst., IV. 308. 11². [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 252. 14. [*Scavea*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 325. [*Syrphus*] (1809); ZETT., Ins. Lapp., 608. 41. (*Scavea*) (1838) et Dipt. Scand., II. 760. 63. (1843), VIII. 3154. 63. [*Scavea*] (1849); WALK., Ins. Brit., I. 296. 32. [*Syrphus*] (1851); ROSS., Dipt. ital. Prodr., II. 124. 4. [*Syrphus*] (1857); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 255. 60. [*Scavea*] (1861); BRADL., Entom. Monthly Mag., (2). VI. 178. (1895); VERR., Brit. Fl., VIII. 311. 4. f. 264. (1901). Europa.

gracile MEIG., S. B., III. 328. 80. [*Syrphus*] (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 232. (84). 11. [*Syrphus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 543. 32. [*Syrphus*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 761. [*Scavea*] (1843); ROSS., Dipt. ital. Prodr., II. 124. 6. [*Syrphus*] (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 356. 74. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 292. (1862); LW., Berlin. entom. Zeitschr., II. 229. [*Syrphus*] (1858); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 256. 61. [*Scavea*] (1861); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 201. (1885).

maculosum MEIG., S. B., III. 330. 84. [*Syrphus*] (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 236. (88). 18. [*Syrphus*] (1827) et Suit. à Buff., 544. 34. [*Syrphus*] (1834).

scalare PANZ. = **mellinum** L.

transfugum ZETT., Ins. Lapp., 607. 37. [*Scavea*] (1838) et Dipt. Scand., II. 756. 59. (1843), VIII. 3153. 59. [*Scavea*] (1849); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 254. 56. [*Scavea*] (1861). Europa sept.

unicolor Macq. = **mellinum** L.

unicolor ROSS. ? **dubium** ZETT.

Xanthandrus

VERR., Brit. Fl., VIII. 316. 14. (1901).

comtus HARR., Expos. engl. Ins., 105. t. XXXII. f. 47. [*Masca*] (1776); VERR., Brit. Fl., VIII. 317. 1. f. 266. 267. (1901); CHAPM., Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 150. (1905). Europa.

hyalinatus FALL., Dipt. Succ. Syrph., 43. 13. [*Scavea*] (1817); MEIG., S. B., III. 312. 56. [*Syrphus*] (1822); Macq., Soc. Sci.

Lille, 1827. 237. (89). 19. [*Syrphus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 543. 31. [*Syrphus*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 722. 25. [*Scavea*] (1843); WALK., Ins. Brit. Dipt., I. 290. 11. [*Syrphus*] (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 123. 3. [*Syrphus*] (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 346. 38. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 290. [*Melanostoma*] (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 242. 22. [*Scavea*] (1861); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 201. [*Melanostoma*] (1885).

hyalinatus FALL. = **comtus** HARR.

parhyalinatus BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 76. 2. [*Melanostoma*] (1884); VERR., Brit. Fl., VIII. 317. (1901). Madera.

Leucozona

SCHN., Wien. entom. Monatschr., IV. 214. (1860).

asiliformis FABR. - **lucorum** L.

lucorum L., Syst. Nat., X. 592. [*Musca*] (1758), XII. II. 985. 36. Europa.

[*Musca*] (1767) et Fauna Suec. 1803. [*Musca*] (1761); FABR., Syst. entom., 766. 19. [*Syrphus*] (1775), Spec. insect., II. 426. 25. [*Syrphus*] (1781), Mant. insect., II. 337. [*Syrphus*] (1787), Entom. syst., IV. 291. 46. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 241. 37. [*Eristalis*] (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2871. 36. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 439. 85. [*Musca*] (1789); CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 303. 953. [*Syrphus*] (1798); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 50. 1. [*Eristalis*] (1817); MEIG., S. B., III. 313. 58. t. XXX. f. 27. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 250. (102). 39. [*Syrphus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 537. 8. [*Syrphus*] (1834); ZETT., Ins. Lapp., 610. 1. [*Eristalis*] (1838) et Dipt. Scand., II. 778. 1. (1843), XIII. 6012. 1. [*Eristalis*] (1859); CURT., Brit. Entom., 753. [*Syrphus*] (1838); STEPH., Ill. brit. Entom. Suppl., 29. t. XLVII. f. 1. [*Syrphus*] (1846); WALK., Ins. Brit., I. 281. 1. t. X. f. 11. b. c. [*Chilosia*] (1851) et List Dipt. Brit. Mus., III. 576. [*Syrphus*] (1849); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 139. 11. [*Lasiophthicus*] (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII., 336. 2. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 299. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 263. 1. [*Eristalis*] (1861); WILL., Syn. N. A. Syrph., 62. (1886); MIK., Wien. entom. Zeitg., XVI. 62. (1897); VERR., Brit. Fl., VIII., 319. 1. (1901); HOW., Insect Book, t. XX. f. 12. (1902).

asiliformis FABR., Spec. ins., II. 426. 24. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 291. 45. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 241. 36. [*Eristalis*] (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2871. 345. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 456. 115. [*Musca*] (1789); MEIG., S. B., III. 314. 59. [*Syrphus*] (1822).

pellucens HARR., Expos. engl. Ins., 82. t. XXIV. f. 28. [*Musca*] (1776).

praeincta SCOR., Entom. Carn., 357. 968. [*Conops*] (1763).

- var. nigripila* MÜK, Wien. entom. Zeitg., VII, 140, 52, (1888). — Caucasus
nigripila MÜK = **lucorum** L.
pellucens HARR. — **lucorum** L.
praeclucta SCOP. = **lucorum** L.

Eriozona

SEHN., Wien. entom. Monatschr., IV, 214, (1860).

- ocstriformis* MEIG. = **syrphoides** FALL.
syrphoides FALL., Dipt. Suec. Syrph., 36, 1, [*Scæra*] (1817); ZETT., Europa centr.
 Dipt. Scand., II, 699, 1, [*Scæra*] (1843); BOSSD., Finnl. Insekt., et sept.
 I, 233, 1, [*Scæra*] (1861); SEHN., F. A., I, 300, (1862); PORTSCH.,
 Trudy Russk. Entom., X, 165, (1877).
ocstriformis MEIG., S. B., III, 315, 60, (1822) et VII, 131, 60,
 [*Syrphus*] (1838); SEHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII,
 335, 1, [*Syrphus*] (1857).

Ischyrosyrphus

BIG., Bull. Soc. entom. France, (6), II, LXVIII, (1882) et Ann. Soc. entom. France,
 (6), III, 224, (1883).

Lagenosyrphus MÜK, Wien. entom. Zeitg., XVI, 64, (1897).

- Bellardii* ROND. = **liophthalmus** SEHN. et EGG.
coronatus ROND., Dipt. ital. Prodr., II, 143, 9, [*Lasiophthicus*] (1857); Alpes.
 MÜK, Wien. entom. Zeitg., XVI, 64, [*Lagenosyrphus*] (1897).
erraticus VILL. = **glaucius** L.
glaucius FALL. = **laternarius** O. F. MÜLL.
glaucius L., Syst. Nat., X, 593, [*Musca*] (1758), XII, II, 986, 47, Europa.
 [*Musca*] (1767) et Fauna Suec., 1813, [*Musca*] (1761); SCOP.,
 Entom. carn., 356, 966, [*Conops*] (1763); GMEL., Syst. Nat., V,
 2874, 47, [*Musca*] (1788); ZETT., Dipt. Scand., II, 725, 28, [*Scæra*]
 (1843); WALK., Ins. Brit., I, 290, 14, [*Syrphus*] (1851); ROND.,
 Dipt. ital. Prodr., II, 139, 8, [*Lasiophthicus*] (1857); SEHN., Verh.
 zool.-bot. Ges. Wien, VII, 337, 5, [*Syrphus*] (1857) et F. A., I,
 307, [*Syrphus*] (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I, 243, 25, [*Scæra*]
 (1861); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV, 133, [*Syrphus*] (1885);
 MÜK, Wien. entom. Zeitg., XVI, 64, [*Lagenosyrphus*] (1897); VERH.,
 Brit. Fl., VIII, 322, 1, (1901).
erraticus VILL., Entom. linn., III, 444, 95, [*Musca*] (1789).
glaucius FALL., Dipt. Suec. Syrph., 41, 8, [*Scæra*] (1817).
leucozonus GREM., Fauna ins. Europae, XI, 25, [*Syrphus*] (1825).
nobilis MEIG., S. B., III, 316, 62, [*Syrphus*] (1822); MACQ., Soc.
 Sci. Lille, 1827—251, (103), 40, [*Syrphus*] (1827) et Suit à
 Buff., I, 535, 1, [*Syrphus*] (1834).
glaucus FALL. = **glaucius** L.
glaucus MEIG. = **laternarius** O. F. MÜLL.

- laternarius** O. F. MÜLL., Zool. Dan. Prodr., 2040. [*Musca*] (1776); Europa.
 WALK., Ins. Brit., I. 291. 15. [*Syrphus*] (1851); SCHN., Verh. zool.-
 bot. Ges. Wien, VII. 337. 6. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 301.
 [*Syrphus*] (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 134. [*Syrphus*]
 (1885); MK., Wien. entom. Zeitg., XVI. 64. [*Lagenosyrphus*] (1897);
 VERR., Brit. Fl., VIII. 323. 2. f. 268. (1901).
glaucius FABR. (nec L.), Spec. Ins., II. 431. 53. [*Syrphus*] (1781).
 Mant. Ins., II. 434. [*Syrphus*] (1767), Entom. syst., IV. 304.
 97. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 243. 49. [*Eristalis*] (1805);
 VILL., Entom. linn., III. 445. 96. [*Musca*] (1789); PANZ.,
 Fauna germ., CIV. 16. [*Syrphus*] (1809); LATR., Gen. Ernst.
 ins., IV. 324. [*Elophilus*] (1809); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827.
 211. (63). 22. [*Chilosia*] (1827).
glauca MEIG., S. B., III. 315. 61. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Suit.
 à Buff., I. 543. 30. [*Syrphus*] (1834).
mutata ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3140. 28—29. [*Scæva*] (1849).
rosarum PANZ., Fauna germ., CVIII. 14. [*Chilosia*] (1809).
 ?*tricolor* BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 73. (1884).
velutinus WILL., Proc. Am. Phil. Soc., XX. 314. [*Syrphus*] (1882)
 et Syn. N. A. Syrph., 73. [*Syrphus*] (1886).
leucozonus GERM. — **glaucius** L.
- liophthalmus** SCHN. et EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, III. 54. t. Europa-centr.,
 I. f. 1. [*Syrphus liophthalmus*] (1853); SCHN., Verh. zool.-bot. Alpes.
 Ges. Wien, VII. 356. 4. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 305. [*Syrphus*]
 (1862); MK., Wien. entom. Zeitg., XVI. 62. [*Lagenosyrphus*]
 (1897).
Bellardii ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 143. 10. [*Lasiophthicus*]
 (1857).
mutatus ZETT. — **laternarius** O. F. MÜLL.
nobilis MEIG. — **glaucius** L.
rosarum PANZ. — **laternarius** O. F. MÜLL.
tricolor BIG. ? **laternarius** O. F. MÜLL.
velutinus WILL. — **laternarius** O. F. MÜLL.

Didea

MACQ., Suit. à Buff., I. 508. 15. (1834).

Henica MEIG., S. B., VII. 140. [*Enica*] (1838); *em.* VERR., ap.
 Sendd. 1882. (nec Macq., 1834. Dipt.)

- alneti** FALL., Dipt. Succ. Syrph., 38. 4. [*Scæva*] (1817); MEIG., S. B., Europa.
 III. 310. 54. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 539. 17.
 [*Syrphus*] (1834); ZETT., Ins. Lapp., 598. 1. [*Scæva*] (1838) et
 Dipt. Scand., II. 700. 2. (1843), VIII. 3131. 2. [*Scæva*] (1849);
 ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 47. 2. (1857); SCHN., Verh. zool.-
 bot. Ges. Wien, VII. 364. 3. (1857) et F. A., I. 314. (1862); BOSSQ.,

Finnl. Insekt., 1. 234 2. [*Scarcra*] (1861); VERR., Brit. Fl., VIII. 326. 1. f. 269—271. (1901).

glauca PANZ. (nec L.), Fauna germ., LIX. 17. [*Syrphus*] (1798).

pellucidula MEIG., S. B., III. 311. 55. [*Syrphus*] (1823); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 365. 4. (1857).

alneti WALK. — **fasciata** Macq.

fasciata Macq., Snit. à Buff., 1. 508. 1. t. XI. f. 15. (1831); MEIG., S. B., VII. 142. (1838); DESVIGN., Trans. entom. Soc. London, IV. 101. (1844); ROSD., Dipt. ital. Prodr., II. 46. 1. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 364. 1. (1857) et F. A., I. 314. (1862); EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 697. (1860); VERR., Brit. Fl., VIII. 328. 2. f. 272—274. (1901).

alneti WALK. (nec FALL.), Ins. Brit., 1. 286. 1. [*Syrphus*] (1851).

Foersteri MEIG., S. B., VII. 140. 1. t. LXXVII. f. 30—32. [*Enic*] (1838).

Foersteri MEIG. — **fasciata** Macq.

glauca PANZ. = **alneti** FALL.

intermedia LW., N. Beitr., II. 18. 39. (1854); EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 667. (1860); SCHN., F. A., I. 314. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 331. 3. f. 275—277. (1901).

pellucidula MEIG. — **alneti** FALL.

Asarcina

Macq., Dipt. exot., II. (2). 77. (135). 28. [*Asarcina*] (1812). em. LW. 1857.

Aegylosyrphus BIG., Bull. Soc. entom. France, (6). II. LXXIII. (1882).

eremophila LW., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XIV. 380. 25. (1857) et Nubia. Diptf. Südafr., (382). 310. *nota*. (1860); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXXV. 16. 3. (1903).

Fiorii BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXXV. 13. 2. (1903). Italia.

Lasiophthicus

ROSD., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (2). II. 459. (1844) et Ann. Acc. Asp. nat., III. 157. [*Lasiophthicus*] (1846); ALDANE, Cat. N. A. Dipt., 363. *nota*. (1905).

Catabomba OST. SACK., Bull. Geolog. Survey, III. 326. (1877).

affinis SAY — **pyrastrii** L.

albomaculatus Macq., Dipt. exot., II. (2). 86. (144). 1. t. XV. f. 6. Europa mer., [*Syrphus*] (1812); LW., Diptf. Südafr. (375). 303. 8. [*Syrphus*]; Africa sept., Mik. Wien. entom. Zeitzg., VII. 222. [*Catabomba*] (1888). Ins. Canar.,

Gemellarü ROSD., Ann. Acc. Asp. Nat., III. 157. (1846) et Dipt. ital. Prodr., II. 139. 6. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 339. 8. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 301. [*Syrphus*] (1862); A. COSTA, Atti Acc. Napoli, (2). V. 24. 41. (1893); KLEBL, Programm Pasewalk, 12. *observ.* [*Syrphus*] (1903).

annanites BIG. — **seleniticus** MEIG.

flavoscatellatus GÜRSCHN. — **pyrastrii** L. var.

Madera.

Gemellarii ROND. **albomaculatus** MACQ.

lanatus WIED. **seleniticus** MEIG.

mellinus HARR. **pyrastrii** L.

pyrastrii L., Syst. Nat., X. 594. [*Musca*] (1758), XII. II. 987. 51. [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1817. [*Musca*] (1761); RÉAUM., Mém. Ins., III. t. XXXI. f. 9. — (1737); PODA, Ins. Mus. graec., 115. [*Musca*] (1761); SCOP., Entom. carn., 345. 931. [*Musca*] (1763); O. F. MÛLL., Fauna Fridrichsd., 721. [*Musca*] (1764); GEOFFR., Hist. ins., II. 517. 46. — (1764); FABR., Syst. Entom. 771. 42. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II. 432. 58. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 305. 102. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 249. 3. [*Scaeva*] (1805); SCHRANK, Enum. insect., 447. 907. [*Musca*] (1781) et Fauna boica, III. 115. 2431. [*Musca*] (1803); GMEI., Syst. Nat., V. 2875. 51. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 447. 100. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etr., II. 295. 1479. [*Syrphus*] (1790); CEDERH., Faunae Ingr. Prodr., 306. 962. [*Syrphus*] (1798); DONOV., Brit. Ins., XII. 19. t. 401. f. 1. [*Musca*] (1807); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 454. 1479. [*Syrphus*] (1807); LATR., Hist. nat. crust. Ins., XIV. 363. 2. [*Syrphus*] (1803) et Gen. crust. ins., IV. 325. [*Syrphus*] (1809); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 39. 5. [*Scaeva*] (1817); MEIG., S. B., III. 303. 44. [*Syrphus*] (1822); DUMÉR., Cons. gén., t. IV. f. 10. [*Syrphus*] (1823); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 252. (104). 41. [*Syrphus*] (1827) et Suit. à Buff., I. 536. 3. [*Syrphus*] (1834); VALLOT, Bull. Soc. entom. France, III. LXV. [*Syrphus*] (1834); WESTW., Introd., II. 557. f. 130. 21. et 131. 1. [*Syrphus*] (1840); CURT., Gard. Chron., 1842. 1441. [*Scaeva*] (1842) et Farm. Ins., 80. [*Syrphus*] (1860); ZETT., Dipt. Scand., II. 703. 5. (1843) et XIII. 5091. 5. [*Scaeva*] (1859); ROND., N. Ann. Sci. Nat. Bologna, (2). VIII. 340. nota. (1847) et Dipt. ital. Prodr., II. 139. 7. (1857); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 579. [*Syrphus*] (1849) et Ins. Brit., I. 287. 2. t. X. f. 12. [*Syrphus*] (1851); RATZEB., Forstins., III. 159. [*Syrphus*] (1844); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 338. 7. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 301. [*Syrphus*] (1862); BOSSD., Finn. Insekt., I. 235. 5. [*Scaeva*] (1861); BOSSD., Entom. hortie., 631. [*Syrphus*] (1867); FRACENE., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 456. [*Syrphus*] (1867); OST-SACK., Bull. geolog. Survey, III. 325. [*Catabomba*] (1877) et Trans. entom. Soc. London, 1884. 495. 5. [*Syrphus*] (1884); WILL., Syn. N. A. Syrph., 63. t. IV. f. 1. [*Catabomba*] (1886); ADOLPH, N. Acta Leop. Carol. Acad., XLVII. t. II. f. 3. [*Syrphus*] (1885); GRIFF., Bull. Mus. Torino, VIII. (143). 6. [*Catabomba*] (1893); F. LYNCH, An. Soc. cient. argent., XXXIV. 120. 2. [*Catabomba*] (1893); SNOW., Kans. Univ. Quart., III. 232. [*Catabomba*] (1895); GIRSCHN., III. Wochenschr., 658. [*Syrphus*] (1897); PLATEAU, Mém. Soc. zool. France, 1900. 277. [*Syrphus*] (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 334. 1. f. 278—279. [*Catabomba*] (1901); HOW., Insect Book, t. XXI. f. 27. (1902); ALDRICH, Cat. N. A. Dipt., 363. (1905).

Europa,
Africa sept.,
Madera.

- affinis* SAY, Journ. Acad. Philad., III. 93. 9. [*Syrphus*] (1823) et Compl. Writ., II. 81. [*Syrphus*] (1859); WIED., Ausser. zweif. Ins., II. 117. 2. [*Syrphus*] (1830).
- mellinus* HARR., Expos. engl. Ins., 30. t. XXIV. f. 23. [*Musca*] (1776).
- rosae* DEG., Ins., VI. 108. 5. t. VI. f. 15-19. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI. 49. 5. t. VI. f. 14-21. [*Musca*] (1782).
- transfugus* FABR. (see L.), Entom. syst., IV. 306. 104. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Anth., 250. 5. [*Scaeva*] (1805); KETEL, Programm Pasewalk, 9. [*Syrphus*] (1903).
- var. **flavoscutellatus** GÜRSCHN., Wien. entom. Zeitg., III. 197. H. [*Syrphus*] (1884). Europa centr.
- var. **unicolor** CURT., Brit. Entom., 509. [*Scaeva*] (1838); VERR., Entom. Monthly Mag., V. 21. [*Syrphus*] (1869). Europa centr. et mer.
- rosae* DEG. **pyrastris** L.
- seleniticus** MEIG., S. B., III. 304. 45. t. XXX. f. 21. [*Syrphus*] (1822); Lw., Programm Posen, 34. 3. [*Syrphus*] (1840) et Isis, 1840, 571. 3. [*Syrphus*] (1840); ZELL., Isis, 1842. 829. 12. [*Syrphus*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 704. 6. (1843), VIII. 3132. 6. (1849) et XIII. 5091. 6. [*Scaeva*] (1859); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 138. 5. (1857); SEMN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 339. 9. [*Syrphus*] (1857) et F. A., I. 301. [*Syrphus*] (1862); BOISD., Pimul. Insekt., I. 236. 6. [*Scaeva*] (1861); BOISD., Entom. hortie., 629. [*Syrphus*] (1867); LEONARDI, Insetti novivi, III. 355. f. 185. [*Syrphus*] (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 337. 2. f. 280. [*Catabomba*] (1901).
- annanites* BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). V. 250. (1885).
- lanatus* WIED., Ausser. zweif. Ins., II. 121. 8. [*Syrphus*] (1830).
- transfugus* FABR. **pyrastris** L.
- unicolor* CURT. **pyrastris** L. var.

Syrphus

FABR., Syst. entom., 762. (1775).

Epistrophe WALK., Ins. Saunders., III. 242. (1852).

Psilogaster LOY, Atti Istit. Ven., (3). XX. 753. [*Psilogaster*] (1863) see BLANCH. 1840. Hym.

Scaeva FABR., Syst. Anth., 248. 57. (1805).

abbreviatus ZETT. **latifasciatus** MACQ.

affinis LW. **latifasciatus** MACQ.

affinis PALMA ? **latifasciatus** MACQ.

agnon WALK. **lapponicus** ZETT.

albostrigatus FALL., Dipt. Succ. Syrph., 42. 10. [*Scaeva*] (1817); MEIG., S. B., III. 317. 63. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 245. (97). 33. (1827) et Suit. à Bull., I. 541. 24. (1834); ZETT., Ins. Lapp., Europa.

601. 10. [*Scavea*] (1838) et Dipt. Scand., II. 727. 29. (1843), VIII. 3141. 29. [*Scavea*] (1849); LW., Programm Posen, 35. 9. (1840) et Isis, 1840. 572. 9. (1840); ZELL., Isis, 1842. 828. 11. t. VII. f. 38-43. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 291. 16. (1851); ROSS., Dipt. ital. Prodr., II. 138. 3. [*Lasiophthicus*] (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 348. 41. (1857) et F. A., I. 304. (1862); BOSSD., Fiml. Insekt., I. 244. 26. [*Scavea*] (1861); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 134. (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 344. 1. f. 282-284. (1901).

carinthiacus LATZ., Jahrb. naturf. Mus. Kärnt. 1876. 105. (*at var. areuati*) (1876); MK., Wien. entom. Zeitg., XVI. 61. 1. (1897).

var. confusus EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 664. (1860); SCHN., F. A., I. 304. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., IX. 251. (1873) et Brit. Fl., VIII. 346. (1901).

Europa centr.

alcidice WALK. — ? **lapponicus** ZETT.

alpinus MACQ. — **corollae** FABR. *var.*

alternans MACQ. **balteatus** DEG.

alternatus SCHRANK **balteatus** DEG.

amoenus LW. **umbellatarum** FABR.

andalusiacus STROBL. **balteatus** DEG. *var.*

annularis CURT. : — ? **corollae** FABR.

annulatus ZETT., Ins. Lapp., 604. 25. [*Scavea*] (1838) et Dipt. Scand., II. 744. 47. (1843) et VIII. 3144. [*Scavea*] (1849); VERR., Entom. Monthly Mag., IX. 252. (1873) et Brit. Fl., VIII. 358. 8. (1901).

Europa.

? *sinuatus* PALMA, Ann. Acc. Asp. Nat., (3). III. 51. 63. t. VI. f. 4. (1864); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 27. (1868).

? *Zetterstedti* VERR., Entom. Nachricht., XVII. 360. (1891).

annulipes ZETT., Ins. Lapp., 599. 3. [*Scavea*] (1838) et Dipt. Scand., II. 702. 4. (1843), VIII. 3131. 4. (1849), XIII. 5991. 4. [*Scavea*] (1859); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 339. 10. (1887) et F. A., I. 305. (1862); BOSSD., Fiml. Insekt., I. 235. 4. [*Scavea*] (1861); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 134. (1885); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 174. 156. (1889); GRAMSH., Ann. Scott. N. H., 1897. 21. (1897); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1899. CXXXII. [*Lasiophthicus*] (1899); VERR., Brit. Fl., VIII. 354. 6. f. 289. (1901).

Europa.

fulvipes BIG. (*acc* MEIG.), Bull. Soc. entom. France, (6). IV. CXVI. [*Dileca*] (1884).

arcticus ZETT., Ins. Lapp., 604. 23. [*Scavea*] (1838) et Dipt. Scand., I. 40. 42. [*Scavea*] (1843); BOSSD., Fiml. Insekt., I. 248. 39. [*Scavea*] (1861); VERR., Brit. Fl., VIII. 420. 34. f. 307-308. (1901).

Europa centr.
et sept.

barbifrons VERR. (*acc* FALL.), Entom. Monthly Mag., IX. 253. (1873).

arcuatus FALL., Dipt. Suec. Syrph., 42. 11. [*Scavea*] (1817); MEIG., S. B., III. 392. 43. (1822); MACQ., Suif. à Buff., I. 536. 6. (1834); ZETT., Ins. Lapp., 601. 9. [*Scavea*] (1838) et Dipt. Scand., II. 719. 22. [*Scavea*] (1843); WALK., Ins. Brit., I. 219. 8. (1851); SCHN.,

Europa,
Japonia.

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 344. 28. (1857) et F. A., I. 305. (1862); BOSSD., Fiml. Insekt., I. 241. 19. [*Scarcia*] (1861); ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 28. (1868); VERR., Entom. Monthly Mag., V. 22. (1869) et Brit. Fl., VIII. 380. 18. (1904); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885); JAROSCH., Trudy Naturf. Ges. Karkoff, XX. 9. 15. (*sep.*) (1886); WILL., Syn. N. A. Syrph., 68. (1886); SNOW, Kans. Univ. Quart., I. 36. (1892); SROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 168. (1893); LUNDB., Vid. Medd., 1899. 303. 95. (1899); CHAGNON, Nat. Can., 1:01. 3211. (1901); How., Insect Book, t. XXI. f. 9. (1902).

? *capreus* AM STEIN, Jahrb. Ges. Graubünd., V. 90. (1860).

var. bipunctatus GIRSCHN., Wien. entom. Zeitg., III. 197. 1. t. Germania. III. f. 1. (1884).

arcuatus FALL. = *arcuatus* FALL. et *lunulatus* MEIG.

arcuinctus WALK. = ? *lapponicus* ZETT.

auricollis MEIG., S. B., III. 318. 64. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. Europa. 535. 2. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 743. 26. [*Scarcia*] (1843);

WALK., Ins. Brit., I. 293. 22. (1851); ROXD., Dipt. ital. Prodr., II. 125. 12. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 354. 66. (1857) et F. A., I. 311. (1862); BOSSD., Fiml. Insekt., I. 248. 41. [*Scarcia*] (1861); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 397. 25. f. 303. (1901).

ciactipes ZETT., Dipt. Scand. XIII. 6000. 46 - 47. [*Scarcia*] (1859); MALM, Kongl. vet. Handl., 1863. 41. (1863).

decorus MEIG., S. B., III. 319. 66. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 237. (89). 20. (1827) et Suit. à Buff., I. 542. 28. (1834); WALK., Ins. Brit., I. 292. 20. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 352. 56. (1857) et F. A., I. 308. (1862).

? *fascus* PALMA, Atti Acc. Asp. Nat., (3). III. 55. 79. t. VI. f. 7. (1864); ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 27. (1868).

Iris MEIG., S. B., III. 320. 67. (1823); ZETT., Dipt. Scand., II. 761. [*Scarcia*] (1843).

macilentus MEIG., S. B., VII. 135. 109. (1823).

maculicornis ZETT., Dipt. Scand., II. 736. 38. (1843), VIII. 3142. 38. (1849) et XIII. 5098. [*Scarcia*] (1859); ROXD., Dipt. ital. Prodr., II. 124. 8. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 352. 54. (1857) et F. A., I. 308. (1862); EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 666. (1869); VERR., Entom. Monthly Mag., V. 7. (1869); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 175. 167. (1889); SROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 170. (1893).

modestas MEIG., S. B., III. 323. 72. (1823); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 353. 60. (1857) et F. A., I. 308 et 311. (1862).

umbellatorum p. p., FALL., Dipt. Suec. Syrph., 44. 15. [*Scarcia*] (1817).

var. nigritibius ROXD., Dipt. ital. Prodr., II. 130. 7. (1857). Europae et m.

- Babyssa** WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 584. (1849). Madera.
- balteatus** DEG., Ins., VI. 116. 7. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI. 52. Europa, Asia,
7. [*Musca*] (1782); GEOFFR., Hist. ins., II. 514. 40. |—| (1764); Japonia,
SCHAEFF., Icon. ins., t. XXXVI. f. 42. |—| (1766); VILL., Entom. Africa sept.,
linn., III. 454. 111. [*Musca*] (1789); MEIG., S. B., III. 312. 57. Madera.
(1823); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 249. (101). 38. (1827) et Suit.
à Buff., I. 538. 11. (1834); BOUCHE, Naturg., I. 50. 33. t. V. f.
1—3. (1834); VALLOT, Bull. Soc. entom. France, III. LXV. (1834);
BLANCH., Hist. ins., III. 600. t. IV. f. 2. (1840); ZETT., Dipt. Scand.,
II. 721. 24. (1843) et VIII. 3139. 24. [*Scavea*] (1849); ROXD., N.
Ann. Sci. Nat. Bologna, (2). VIII. 341. nota. (1847) et Dipt. ital.
Prodr., II. 125. 13. (*baltheatus*) (1857); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., III. 582. (1849) et Ins. Brit., I. 289. 10. (1851); SCHUS., Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, VI. 350. 50. (1857) et F. A., I. 309. (1862);
CURT., Farm. Ins., 82. (1860); BOXSÖ., Finl. Insekt., I. 241. 21.
[*Scavea*] (1861); WEYENB., Tijdschr. Entom., XVII. 149. (1873);
WULF, Müll. Sumatra, 33. 5. (1881) et Cat. Dipt. S. Asia, 118.
(1896); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 135. (1885); GRIFE., Bull.
Mus. Torino, VIII. (143). 7. (1893); MIK, Wien. entom. Zeitg., XVII.
169. 84. (1898); PLATEAU, Mém. Soc. zool. France, 1900. 278.
(1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 390. 22. f. 302. (1901); MELL., Zool.
Jahrbüch., XV. 679. f. 46—47. (1902).
- alternans* MACQ., Dipt. exot., II. (2). 89. (147). 7. (1842).
- alternatus* SCHRANK, Enum. ins., 448. 908. [*Musca*] (1781) et
? Fauna boica, III. 109. 2417. [*Musca*] (1803); GMEL., Syst.
Nat., V. 2864. 313. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etr., II.
297. 1483. (1790); DWIGORWS., Primit. faunae Mosqu., 178.
672. (1802); ILLIG., Fauna etr. Rossi, 457. 1483. (1807).
- canabinius* Scop., Entom. carn., 344. 929. [*Musca canabina*]
(1763); PETAGNA, Specim. ins., I. 43. 230. (1786) et ed. II.
43. 230. (1808); GMEL., Syst. Nat., V. 2864. 313. [*Musca*]
(1788); VILL., Entom. linn., III. 520. 281. [*Musca*] (1789);
SCHUS., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 415. (1856).
- nectareus* FABR., Mant. ins., II. 341. (1787), Entom. syst., IV. 309.
116. (1794) et Syst. Antl., 253. 22. [*Scavea*] (1805); VILL.,
Entom. linn., III. 460. 128. [*Musca*] (1789); PANSZ., Fauna
germ., LXXXII. 19. (1801); FALL., Dipt. Succ. Syrph., 43.
14. [*Scavea*] (1817); DISCONZI, Entom. vicent., 219. (1865);
BOXSÖ., Entom. hortie., 630. (1867).
- nectarinus* WIED., Ausser. zweifl. ins., II. 128. 21. (1830).
- scitule* HARR., Expos. engl. Ins., 111. t. XXXIII. f. 55. [*Musca*]
(1776).
- scitulus* HARR., Expos. engl. Ins., 105. t. XXXII. f. 33. [*Musca*]
(1776).
- var. andalusiacus* STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 145. Hispania.
99. (1899).
- barbifrons** FALL., Dipt. Succ. Syrph., 45. 17. [*Scavea*] (1817); MEIG., Europa e. ets.

S. B., III. 338. 95. (1822); ZETT., Ins. Lapp., 605. 26. [*Scavea*] (1838) et Dipt. Scand., II. 740. 43. (1843), XII. 4659. 43. (1855), XIII. 5099. 43. [*Scavea*] (1859); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 353. 61. (1857); Kow., Wien. entom. Zeitzg., IV. 202. [*Melanostoma*] (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 423. 35. f. 309—310. (1901).

latifrons SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1836. 81. (1836).

nitidulus ZETT., Ins. Lapp., 608. 39. [*Scavea*] (1838) et Dipt. Scand., II. 758. 61. (1843), VIII. 3153. 61. (1849), XII. 4661. 61. (1855), XIII. 6004. 61. [*Scavea*] (1859); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 254. 58. [*Scavea*] (1861); SCHN., F. A., I. 307. (1862).

barbifrons VERR. 1873 = **arcticus** ZETT.

berber BIG. = **corollae** FABR.

berberidis LW. = **venustus** MEIG.

bifasciatus FABR., Entom. syst., IV. 305. 101. (1794) et Syst. Antl., 248. 2. [*Scavea*] (1805); GERM., Fauna ins. europ., XI. 24. (1817); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 40. 7. [*Scavea*] (1817); MEIG., S. B., III. 309. 52. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 244. (96). 31. (1827) et Suit. à Buff., I. 539. 15. (1834); LW., Programm Posen, 34. 6. (1840) et Isis, 1840. 571. 6. (1840); ZETT., Dipt. Scand., II. 713. 15. (1843) et XII. 4656. 15. [*Scavea*] (1855); WALK., Ins. Brit., I. 288. 6. (1851); ROSD., Dipt. ital. Prodr., II. 126. 14. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 342. 21. (1857) et F. A., I. 309. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitzg., IV. 135. (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 387. 21. f. 299—301. (1901).

bifasciatus SCHRANK, Beitr. zur Naturg., 95. 66. [*Musca*] (1776) et Enum. insect., 452. 917. [*Musca*] (1781); VILL., Entom. linn., III. 462. 133. [*Musca*] (1789).

eligans HARR., Expos. engl. Ins., 105. t. XXXII. f. 34. [*Musca*] (1776).

fenestratus HOFFGG., in coll. ap. MEIG.

fulvipes MEIG., S. B., III. 339. 96. (1822) et VII. 353. (1838); BECK., N. Acta Leop. Carol. Akad., LXII. 245. (1894).

interruptus GMEI., Syst. Nat., V. 2879. 376. [*Musca*] (1788).

var. trifasciatus STROBL., Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 435. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 590. (1900).

bifasciatus SCHRANK = ? **bifasciatus** FABR.

bipunctatus GIRSCHN. = **arcuatus** FALL. *var.*

bisinuatus PALMA = **nitens** ZETT.

blandus HARR. = **ribesii** L.

Braueri EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 714. (1868); SCHN., F. A., I. 306. (1862); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 169. (1893); VERR., Brit. Fl., VIII. 387. (1901).

bucculatus ROSD., Dipt. ital. Prodr., II. 134. 19. (1857); STROBL., Wien. entom. Zeitzg., XII. 74. (1893).

calopus LW., Öfv. vet. Akad. Förhand., XIV. 379. 22. (1857) et Diptf. Sudaf., (381). 309. 7. t. II. f. 55. (1860).

- cannabinus* Scop. = **balteatus** Deg.
- carinthiacus* Latz. = **albostriatus** Fall.
- cinctellus** Zett., Dipt. Scand., II. 742. 45. (1843) et VIII. 3143. 45. Europa centr.
 [Scaeva] (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 354. 65. et sept.
 (1857) et F. A., I. 312. (1862); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
 X. 666. (1860); BonSD., Fiml. Insekt., I. 248. 40. [Scaeva] (1861);
 Verr., Entom. Monthly Mag., V. 7. (1869) et Brit. Fl., VIII. 392.
 23. (1901).
- cinctus* p. p., Fall., Dipt. Succ. Syrph., 45. 18. [Scaeva] (1817).
- cinctipes* Zett. = **auricollis** Meig.
- cinctus** Fall., Dipt. Succ. Syrph., 45. 18. [Scaeva] (1817); Meig., S. Europa.
 B., III. 318. 65. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 238. (90). 22.
 (1827) et Suit. à Buff., I. 542. 27. (1834); Zett., Ins. Lapp., 604.
 24. [Scaeva] (1838) et Dipt. Scand., II. 741. 44. (1843), VIII. 3143.
 44. (1849), XIII. 5099. 44. [Scaeva] (1859); Walk., Ins. Brit., I.
 292. 21. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 131. 11. (1857);
 Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 354. 64. (1837) et F. A.,
 I. 312. (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., VII., 201. (1871) et
 Brit. Fl., VIII. 394. 24. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV.
 136. (1885); Griff., Bull. Mus. Torino, VIII. (143). 7. (1893).
- var. placidus* Meig., S. B., III. 322. 70. (1822); Schin., F. A., Europa centr.
 I. 312. (1862).
- cinctus* Fall. = **cinctellus** Zett. et **cinctus** Fall.
- compositarium** Verr., Entom. Monthly Mag., IX. 254. (1873) et Brit. Europa.
 Fl., VIII. 412. 31. f. 304. (1901).
- umbellatarum* Meig. (nec Fabr.), S. B., III. 320. 68. (1822); Zett.,
 Ins. Lapp., 604. 21. [Scaeva] (1838) et Dipt. Scand., II. 734.
 36. (1843), VIII. 3142. 36. (1849), XIII. 5098. 36. [Scaeva]
 (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 125. 9. (1857); BonSD.,
 Fiml. Insekt., I. 246. 33. [Scaeva] (1861); Siebke, Enum.
 insecta norvég., IV. 59. 31. [Scaeva] (1877); Kow., Wien.
 entom. Zeitg., IV. 168. (1885).
- umbellatorum* Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 238. (90). 21. (1827)
 et Suit. à Buff., I. 542. 29. (1834).
- concarus* Say = ? **ribesii** L.
- ? **concinus** Meig., S. B., III. 321. 69. (1822); Rond., Atti Soc. ital. Europa centr.
 Sci. Nat., XI. 27. (1868); Verr., Cat. europ. Syrph., 65. (1900).
- confusus* Zett. = **vitripennis** Meig.
- confusus* Egg. = **albostriatus** Fall. *var.*
- conjungens* Walk. = **grossulariae** Meig.
- consisto* Harr. = **corollae** Fabr.
- corollae** Fabr., Entom. syst., IV. 306. 106. (1794) et Syst. Antl., Europa.
 250. 8. [Scaeva] (1805); Geoffr., Hist. Ins., II. 518. 48. [—] (1764); Asia sept.,
 Meig., S. B., III. 304. 46. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. Japonia,
 239. (91). 23. (1827) et Suit. à Buff., I. 539. 18. (1834); Wied., Africa sept.,
 Ausser. zweifl. Ins., II. 121. 7. (1830); Zett., Ins. Lapp., 602. 16. Madera.
 [Scaeva] (1838) et Dipt. Scand., II. 720. 23. (1843), VIII. 3138.

23. (1849), XII. 4657. 23. [*Scavra*] (1855); WALK., Ins. Brit., I. 289. 9. (1851); ROXD., Dipt. ital. Prodr., II. 127. 20. (1857); SCHN., Verh. zool. bot. Ges. Wien, VII. 345. 31. (1857) et F. A., I. 306. (1862); BOXED., Finnl. Insekt., I. 241. 20. [*Scavra*] (1861); PALMA, Ann. Acc. Asp. Nat., (3). III. 53. 67. (1864); WEYENB., Tijdschr. Entom., XVII. 149. (1873); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. et 168. (1885); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 169. (1893) et Wien. entom. Zeitg., XII. 74. (1893); PLATEAU, Mém. Soc. zool. France, 1900. 277. (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 381. 19. (1901); BECK, Mittheil. zool. Mus. Berlin, II. 84. 119. (1903); VILLEN., Feuille jeun. Nat., XXXIII. 119. (1903).

annularis CURT., Guide sec. edit., 252. 13. [*Scavra*] (1837).

berber BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 87. 3. (1884).

consisto HARR., Expos. engl. Ins., 112. t. XXXIII. f. 56. [*Musca*] (1776).

crenatus MACQ., Soc. Sci. Lille 1827. 243. (95). 29. (1827) et Suit. à Buff., I. 541. 23. (1834); MEIG., S. B., VII. 133. 104. (1838); SCHN., F. A., I. 312. (1862); PALMA, Annal. Acc. asp. Nat., (3). III. 54. 68. (1864); ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 28. (1868).

?*fluviventris* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 240. (92). 25. (1827) et Suit. à Buff., I. 540. 20. (1834).

fulvifrons MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 240. (92). 24. (1827) et Suit. à Buff., I. 540. 19. (1834); MEIG., S. B., VII. 132. 101. (1838); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 74. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 169. (1893).

lucerus MEIG., S. B., III. 301. 41. (1822); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 345. 32. (1857).

octomaculatus CURT., Guide sec. ed., 252. 15. [*Scavra*] (1837).

olitorius FALL., Dipt. Suec. Syrph., 43. 12. [*Scavra*] (1817).

?*pinastri* DEG., Ins., VI. 113. t. VII. f. 1-6. [*Musca*] (1776); VILL., Entom. linn., III. 454. 110. [*Musca*] (1789).

propinquus MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 150. (454). 44. t. XIV. f. 8. (1850).

pyrum SCHRANK, Fauna boica, III. 114. 2430. [*Musca*] (1803).

?*terminalis* WIED., Ansser. zweifl. Ins., II. 135. 33. (1830); Lw., Diptf. Südafr., (375). 303. 1. (1860).

toparius WALK. (nec MEIG.), Ins. Brit., I. 290. 12. (1851).

?*voraæ* GEOFFR., ap. FOURER. Entom. Paris, II. 486. 49. [*Musca*] (1785); VILL., Entom. linn., III. 539. 351. [*Musca*] (1789).

var. algirus MACQ., Luc. Explor. Alger. Zool., III. 469. 172. t. Africa sept. IV. f. 11. (1849); BECK, Mittheil. zool. Mus. Berlin, II. 84. 120. (1903).

crenatus MACQ. **corollæ** FABR.

eupreus AM STEIN ? **arcuatus** FALL.

curvipes BOHEM., Sv. Akad. Handl., 1851. 198. 111. [*Scavra*] (1851); Europe centr. ZETT., Dipt. Scand., XII. 1658. 40. 41. [*Scavra*] (1855); KOW., et sept. Wien. entom. Zeitg., IV. 161. (1886).

decorus MEIG. = **auricollis** MEIG.

decorus ZETT. = **euchromus** KOW.

diaphanus ZETT., Dipt. Scand., II. 711. 12. [*Scaeva*] (1843); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 342. 16. (1857) et F. A. I. 310. (1862); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 135. (1865); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 173. (1870) et Brit. Fl., VIII. 364. 12. (1901); JAROSCH., Trud. Naturf. Ges. Karkoff, XX. 11. 18. (*sep.*) (1886). Europa.

dignotus ROND. = **venustus** MEIG.

disjunctus MACQ., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 88. (146). 3. (1842) et Luc. Explor. Alger. Zool., III. 469. 171. (1849); LW., Diptf. Südafr., (375). 303. 3. (1860). Europa mer., Africa sept.

dryadis HOLMGR. = **tarsatus** ZETT.

Eggeri SCHIN., F. A., I. 303. (1862). Austria.

cligans HARR. = **bifasciatus** FABR.

emarginatus LW. = **excisus** ZETT.

euchromus KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 167. (1885); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 175. 165. (1889); VERR., Brit. Fl., VIII. 400. 26. (1901). Europa.

decorus ZETT. (*nec* MEIG.), Dipt. Scand., II. 738. 40. (1843) et XIII. 5098. 40. [*Scaeva*] (1859); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 125. 10. (1857); BONSD., Finnl. Insekt., I. 247. 37. (1861); VERR., Entom. Monthly Mag., XXII. 230. (1886).

excisus SCHIN. = **excisus** ZETT. et **latifasciatus** MACQ.

excisus ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3135. 13 -14. [*Scaeva*] (1843); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 340. 11. (1857) et F. A., I. 310. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 238. 13. [*Scaeva*] (1861); SCHIN., p. p., F. A., I. 311. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 387. (1901). Europa.

emarginatus LW., Jahrb. Krak. Gel. Ges., XII. 16. (1870).

flaviceps ROND. = **latifasciatus** MACQ.

flavifrons VERR. = **guttatus** FALL.

flaviventris MACQ. = **corollae** FABR.

formosus HARR. = **grossulariae** MEIG.

fulvifrons MACQ. = **corollae** FABR.

fulvipes BIG. = **annulipes** ZETT.

fulvipes MEIG. = ? **bifasciatus** FABR.

fuscus PALMA = ? **auricollis** MEIG.

grossulariae MEIG., S. B., III. 306. 48. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 542. 26. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 706. 7. (1843) et XIII. 5091. 7. [*Scaeva*] (1843); WALK., Ins. Brit., I. 287. 3. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 340. 11. (1857) et F. A., I. 310. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 236. 7. [*Scaeva*] (1861); VERR., Entom. Monthly Mag., V. 191. (1869) et Brit. Fl., VIII. 363. 11. f. 290. (1901); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885). Europa.

conjungens WALK., Ins. Saunders., III. 242. t. VI f. 5. [*Epistrophe*] (1852).

erraticus L., Syst. Nat. et coll., [*Musca*] teste HAL., Stettin. entom. Zeitg., XII. 140. (1851).

- formosus* HARR., Expos. engl. Ins., 107. t. XXXII. f. 43. [*Musca*] (1776).
- Lesucarii* MACQ., Dipt. exot., II. (2). 92. (150). 10. (1842); OST-SACK., Proc. Boston Soc., XVIII. 143. 3. (1875); WILL., Syn. N. A. Syrph., 80. t. IV. f. 2. (1886); CHAGNON, Nat. Can., 1901. 36. 7. (1901).
- ribesii* FALL., p. p., Dipt. Succ. Syrph., 40. [*Scacca*] (1817).
- guttatus** FALL., Dipt. Succ. Syrph., 44. 16. [*Scacca*] (1817); MEIG., Europa. S. B., III. 322. 71. (1822); ZETT., Ins. Lapp., 604. 22. [*Scacca*] (1838) et Dipt. Scand., II. 739. 41. (1843), VIII. 3143. 41. (1849) et XII. 4659. 41. [*Scacca*] (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 350. 49. (1857) et F. A., I. 307. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 247. 38. [*Scacca*] (1861); GÜRSCH., Wien. entom. Zeitg., III. 198. (1884); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885); JAROSCH., Trhd. Naturf. Ges. Karkoff, XX. 10. 16. (*sep.*) (1886); VERR., Brit. Fl., VIII. 407. 29. (1901).
- flacifrons* VERR., Entom. Monthly Mag., IX. 256. (1873).
- hibiris* ZETT. = **venustus** MEIG.
- hirticeps** LW., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XIV. 378. 17. (1857) et Nubia. Diptf. Südafr., (377). 305. *nota.* (1860).
- implicatus* MEIG. = **venustus** MEIG.
- ? **interumpens** WALK., Entom., V. 273. 47. (1871). Aegyptus.
- interruptus* GMEL. = **bifasciatus** FABR.
- Iris* MEIG. = **auricollis** MEIG.
- japonicus** LW., Wien. entom. Monatschr., II. 108. 12. (1858). Japonia.
- labiatarum** VERR., Brit. Fl., VIII. 415. 32. f. 305-306. (1901); Anglia. ANDREWS, Entom. Monthly Mag., (2). XIV. 38. (1902).
- luceras* MEIG. = **corollae** FABR.
- lapponicus** ZETT., Ins. Lapp., 598. 2. [*Scacca*] (1838) et Dipt. Scand., II. 701. 3. (1843), VIII. 3131. 3. (1849), XIII. 5090. 3. [*Scacca*] (1859); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 344. 29. (1857) et F. A., I. 305. (*var. arcuati*) (1862); LW., Jahrb. Krak. Gel. Ges., XLI. 17. 25. (1870); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 235. 3. [*Scacca*] (1861); EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 665. (1860); OST-SACK., Proc. Boston Soc., XVIII. 149. 8. (1875), Bull. Geolog. Survey, III. 326. 3. (1877) et Cat. N. A. Dipt., 2 edit., 245. 207. (1878); WILL., Syn. N. A. Syrph., 68. (*var. arcuati*) (1886); VERR., Entom. Monthly Mag., XXII. 239. (1886) et Brit. Fl., VIII. 380. f. 297. (*var. arcuati*) (1901); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 168. (*var. arcuati*) (1893).
- ? *agnon* WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 579. (1849).
- ? *alcidice* WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 579. (1849); WILL., Proc. Amer. Phil. Soc., XX. 312. [*Dileca*] (1882).
- ? *arcuinctus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 580. (1849).
- lapponus* ROSS., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 135. (1865).
- lapponus* ROSS. **lapponicus** ZETT.
- lasiophthalmus** ZETT., Dipt. Scand., II. 735. 37. (1843) et VIII. 3142. Europa e ets

37. [*Scaeva*] (1849); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 352. 53. (1857) et F. A., I. 307. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 246.
34. [*Scaeva*] (1861); VERR., Entom. Monthly Mag., V. 7. (1869), Proc. entom. Soc. London, 1872. 6 May (1872) et Brit. Fl., VIII. 417. 33. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 135. (1885); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 169. (1893).
- ? *serguttatus* MEIG., S. B., VII. 135. 108. (1838); SCHN., F. A., I. 312. (1862).
- 6-striatus* WAHLBG. in litt. ap. ZETT.
- latifasciatus** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 242. (94). 28. (1827) et Suit. à Buff., I. 541. 22. (1834); MEIG., S. B., VII. 132. 203. (1838); VERR., Entom. Monthly Mag., V. 192. (1869), IX. 253. (1873) et Brit. Fl., VIII. 371. 15. f. 292. (1901).
- abbreviatus* ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3136. 13—14. [*Scaeva*] (1849); OST-SACK., Proc. Boston Soc., XVIII. 144. 4. (1875); WILL., Syn. N. A. Syrph., 81. (1886); CHAGNON, Nat. Can., 1901. 33. 3. (1901).
- affinis* LW. (*nec* FABR., *nec* SAY), Programm Posen, 35. 11. (1840), Isis, 1840. 571. 11. (1840) et Jahrb. Krak. Gef. Ges., XLI. 16. 24. (1870); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 342. 19. (1857); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 167. (1893).
- ? *affinis* PALMA (*nec* FABR., *nec* SAY, *nec* LW.), Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 51. t. VI. f. 5. (1864); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 26. (1868).
- excisus* p. p., SCHN., F. A., I. 311. (1862).
- flaviceps* ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 133. 18. (1857).
- ? *var. rufinasutus* BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 88. 4. (1884).
- latifrons* SCHUMM. = **barbifrons** FALL.
- ? **latiusculus** WALK., Entom., V. 273. 46. (1871).
- latus** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 322. (1898).
- latus** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 323. (1898).
- Lesueurii* MACQ. = **grossulariae** MEIG.
- lineola** ZETT., Dipt. Scand., II. 714. 16. (1843), VIII. 3137. 16. (1849) et XIII. 5093. 16. [*Scaeva*] (1859); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 343. 22. (1857) et F. A., I. 309. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 239. 15. [*Scaeva*] (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 135. (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 359. 9. (1901).
- luniger** MEIG., S. B., III. 300. 40. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 248. (100). 37. (1827) et F. A., I. 536. 5. (1834); ZETT., Ins. Lapp., 600. 8. [*Scaeva*] (1838) et Dipt. Scand., II. 718. 21. [*Scaeva*] (1843); WALK., Ins. Brit., I. 288. 7. (1851); ROND., Dipt. Ital. Prodr., II. 127. 21. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 343. 27. (1857) et F. A., I. 306. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 240. 18. [*Scaeva*] (1861); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 174. 159. (1889); VERR., Brit. Fl., VIII. 385. 20. f. 298. (1901).
- Europa centr. et mer.
- M. Sinai.
Japonia.
Japonia.
- Europa centr. et mer.
- Europa.

- nigrifemoratus* Macq., Soc. Sci. Lille, 1827, 241 (1833), 26. (1827)
et Suit. à Buff., I. 540, 21. (1834); Meig., S. B., VII. 132.
102. (*nigrofemoratus*) (1838).
- lunulatus* Beck. — **nigricornis** Verr.
- lunulatus** Meig., S. B., III. 299, 39. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, Europa.
1827, 248. (100), 36. (1827) et Suit. à Buff., I. 536, 4. (1834);
Schm., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 349, 44. (1857) et F. A.,
I. 303. (1862); Palma, Annal. Acc. Asp. Nat., (3), III. 54, 72.
(1864); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 135. (1885); Verr., Brit.
Fl., VIII. 351, 4. f. 288. (1901).
- arcuatus* Fall., p. p., Dipt. Svec. Syrph., 42. [*Scaeva*] (1817).
- lunulatus* Zett. — **venustus** Meig.
- marilicentus* Meig. **auricollis** Meig.
- macularis** Zett., Dipt. Scand., II. 730, 32. (1843) et VIII. 3141, 32. Europa centr.
[*Scaeva*] (1849); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 667. (1860); et sept.
Schm., F. A., I. 302. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 167.
(1885).
- marilicornis* Zett. — **auricollis** Meig.
- major* Strobl. **ochrostoma** Zett.
- mecogramma** Big., Annal. Soc. entom. France, (3), VIII. 778. (1860); Sicilia.
Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 28. [*Lasiophthicus*] (1868).
- melanostoma** Zett. (*nec* Macq.), Dipt. Scand., II. 711, 13. (1843) et Europa centr.
VIII. 3134, 13. [*Scaeva*] (1849); Wahlbg., Öfv. vet. Akad. Förhandl., et sept.
IX. 187. (1852); Schm., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 342, 18.
(1857) et F. A., I. 311. (1862); Bond., Finnl. Insekt., I. 238, 12.
[*Scaeva*] (1861); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863, 29. (*var. nigri-*
tarsis) (1863); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 168. (1885).
- ribesii* Zett., p. p., Ins. Lapp., 599. [*Scaeva*] (1838).
- melanostomoides* Strobl. — **ochrostoma** Zett. *var.*
- modestus* Meig. — **auricollis** Meig.
- nectareus* Fabr. **balteatus** Deg.
- nectarinus* Wied. — **balteatus** Deg.
- nigricornis** Verr., Entom. Monthly Mag., IX. 251. (1873) et Brit. Fl., Europa centr.
VIII. 353, 5. (1901). et sept.,
Siberia.
- lunulatus* Beck. (*nec* Meig.), Wien. entom. Zeitg., VII. 71, f. (1887) et Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 174, 158. (1889);
Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 165. (1893).
- obscurus* Zett. (*nec* Say, 1824), Ins. Lapp., 601, 11. [*Scaeva*]
(1838) et Dipt. Scand., II. 733, 35. (1843), VIII. 3142, 35.
[*Scaeva*] (1849); Bond., Finnl. Insekt., I. 245, 32. [*Scaeva*]
(1861); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 165. (1893);
Beck., Acta Soc. Sci. fenn., XXVI. 44, 66. (1900).
- quadrilunulatus* Schumm. in litt.
- nigrifemoratus* Macq. ? **luniger** Meig.
- nigritarsis** Zett., Dipt. Scand., II. 719, 11. (1843), VIII. 3133, 11. Europa sept.
(1849) et XIII. 5092, 11. [*Scaeva*] (1859); Bond., Finnl. Insekt.,

- I. 238. 14. [*Scavea*] (1861); VERR., Entom. Monthly Mag., XIX. 225. (1883).
- nigritibius* ROND. - *auricollis* MEIG. *var.*
- nitens** ZETT., Dipt. Scand., II. 712. 14. (1843) et VIII. 3137. 14. [*Scavea*] Europa.
(1849); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 239. 14. [*Scavea*] (1861); VERR.,
Entom. Monthly Mag., V. 193. (1869) et Brit. Fl., VIII. 377. 17. f.
295—296. (1901); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XIX. 167. (*var.*
nitidicollis) (1893); GRAMSH., Annal. Scott. N. H., 1904. 222. 2.
(1904).
- ? *bisinuatus* PALMA, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 52. 65. t. VI.
f. 6. (1864); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 26. (1868).
- nitidicollis** MEIG., S. B., III. 308. 51. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille. Europa.
1827. 245. (97). 32. (1827) et Suit. à Buff., I. 538. 14. (1834);
ZETT., Ins. Lapp., 602. 13. [*Scavea*] (1838) et Dipt. Scand., II. 709.
10. (1843), VIII. 3133. 10. (1849) et XIII. 5092. 10. [*Scavea*] (1859);
ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 126. 15. (1857); SCHN., Verh. zool-
bot. Ges. Wien, VII. 341. 14. (1857) et F. A., I. 310. (1862); BOSSD.,
Finnl. Insekt., I. 237. 10. [*Scavea*] (1861); VERR., Entom. Monthly
Mag., V. 7 et 192. (1869) et Brit. Fl., VIII. 375. 16. f. 293—294.
(1901); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885); STROBL, Mit-
theil. Ver. Steierm., XXIX. 167. (1893).
- ? *ribesii* FALL., p. p., Dipt. Succ. Syrph., 40. [*Scavea*] (1817).
- nitidicollis* ZETT. **nitidicollis** MEIG. et **ochrostoma** ZETT.
- nitidulus* ZETT. **barbifrons** FALL.
- nuba** WIED.)*, Ausser. zweifl. Ins., II. 136. 34. (1830); LW., Diptf. Nubia.
Südafr., (375). 303. 2. (1860).
- obscurus* ZETT. — **nigricornis** VERR.
- ochrostoma** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3133. 12—13. [*Scavea*] (1849); Europa centr.
SCHN., Verh. zool-bot. Ges. Wien, VII. 342. 17. (1858) et F. A., et sept.
I. 310. (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885).
- ? *major* STROBL, Programm Seitenst., XIV. 15. (*var. melanostomi*)
(1880).
- ? *nitidicollis* ZETT., p. p., Ins. Lapp., 602. [*Scavea*] (1838).
- ? *var. melanostomoides* STROBL, Programm Seitenst., XIV. 60. Austria.
(1880) et Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 166. (1893).
- octomaculatus* CURT. = **corollae** FABR.
- octonotatus** BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 75. 1. [*Mela-* Algeria.
nostoma] (1884).
- olitorius* FALL. **corollae** FABR.
- philadelphicus* MACQ. - ? **ribesii** L.
- pinastri* DEG. ? **corollae** FABR.
- placidus* MEIG. **cinctus** FALL. *var.*
- porcinus** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 322. (1898). Japonia.
- propinquus* MACQ. **corollae** FABR.

*) - ? **corollae** FABR.

- punctulatus** VERR., Entom. Monthly Mag., IX, 254, (1873) et Brit. Anglia.
Fl., VIII, 404, 28, (1901).
- pyrorum** SCHRANK **corollae** FABR.
- rectus** OST.-SACK. = **ribesii** L.
- relictus** ZETT., Ins. Lapp., 603, 20, [*Scavea*] (1838) et Dipt. Scand., Scandinavia.
II, 716, 19, [*Scavea*] (1843).
- ribesii** FALL., **grossulariae** MEG., **nitidicollis** MEG., **ribesii** L. et
torvus O.-S.
- ribesii** L., Syst. Nat., X, 593, [*Musca*] (1758), XII, II, 987, 50, [*Musca*] Europa,
et Fauna Suec., 1816, [*Musca*] (1761); KRAM., Diss. Ins. Dan., Africa sept.,
28, [*Musca*] (1760); PODA, Ins. Mus. Graec., 117, [*Musca*] (1761); Japonia.
GEOFFR., Hist. Ins., II, 511, 45, [] (1761); O. F. MÜLLER, Fauna
Friedrichsd., 729, [*Musca*] (1764); FABR., Syst. entom., 770, (1775),
Spec. ins., II, 432, 57, (1781), Entom. syst., IV, 304, 10, (1794) et
Syst. Antl., 248, 1, [*Scavea*] (1805); DEG., Ins., VI, 103, 4, t. VI,
t. 4-9, [*Musca*] (1776) et O. F. Gütze, VI, 47, 4, [*Musca*] (1782);
SCHRANK, Enum. ins., 446, 905, [*Musca*] (1781) et Fauna boica,
III, 195, 2498, [*Musca*] (1803); GMELL., Syst. Nat., V, 2875, 59,
[*Musca*] (1788); VILL., Entom. lin., III, 446, 99, [*Musca*] (1789);
ROSSI, Fauna etr., II, 295, 1478, (1790); CEDERH., Faunae ingr.
Prodr., 306, 961, (1798); LATR., Hist. nat. Crust. Ins., XIV, 362,
1, (1804) et Gen. Crust. Ins., IV, 325, (1809); DOBSON., Brit. Ins.,
XII, 21, t. 401, f. 3, [*Musca*] (1807); HALL., Fauna etr. Rossi, II,
454, 1478, (1807); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 49, 6, [*Scavea*] (1817);
MEG., S. B., III, 306, 49, (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827,
246, (98), 34, (1827) et Suit. à Buff., I, 538, 12, t. XII, f. 10, (1831);
BOUCHÉ, Naturg., I, 51, 34, (1834); ZETT., Ins. Lapp., 599, 5, [*Scavea*]
(1838) et Dipt. Scand., II, 707, 8, (1843), VIII, 3132, 8, (1849) et
XII, 4656, 8, [*Scavea*] (1855); LW., Programm Posen, 1849, 35,
13, (1849) et Isis, 1840, 572, 13, (1840); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., III, 581, (1849) et Ins. Brit., I, 287, 4, (1851); SEMM., Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, VII, 349, 12, (1857) et F. A., I, 310, (1862);
ROSD., Dipt. ital. Prodr., II, 126, 16, (1857); CURT., Farm Ins., 81,
(1860); BOSSD., Fiml. Insekt., I, 237, 8, [*Scavea*] (1861); MAM.
Kongl. vet. Handl., 1863, 27, (1863); BOSSD., Entom. hortie., 639,
(1867); MEINERT, Trophi Dipt., 60, t. V, f. 6-9, [*Scavea*] (1881);
KOW., Wien. entom. Zeitzg., IV, 136, (1885); WOLL., Syn. N. A.
Syrph., 77, (1886) et Biol. centr. amer., III, 17, 6, (1891); GRIGIO
Tos., Mem. Acc. Torino, (2), XLIII, 27, 79, (1892); SCHOEN., Mit-
theil. Ver. Steierm., XXIX, 167, (1893); F. LAYEN A., Ann. Soc.
cient. Argent., XXXIV, 113, 1, (1895); GARR., Bull. Mus. Torino,
IX, (168), 3, (1894) et Miscell. entom., III, 108, (1895); GRUSH.,
The Natural., 1898, 103, (1898); VERR., Brit. Fl., VIII, 396, 13, f.
281 et 291, (1901); CHAGSO., Nat. Can., 1901, 36, 8, (1901); How.,
Insect Book, t. XXI, f. 5 et 10, (1902).
- blaudus* HARR., Expos. engl. Ins., 106, t. XXXII, f. 38, [*Musca*]
(1776)

- concaeus* SAV, Journ. Ac. Philad., III. 89. 3. [*Scaeva*] (1823)
et Compl. Writ., II. 78. [*Scaeva*] (1859); WIED., Ausser.
zweifl. Ins., II. 130. 24. (1830).
- philadelphicus* MACQ., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 151. (93). 11.
t. XVI. f. 2. (1842); OST-SACK., Cat. N. A. Dipt., 2 edit., 245.
209. (1878).
- rectus* OST-SACK. (*acc* NOW. 1875), Proc. Boston Soc., XVIII.
140. 2. (1875).
- vacuus* Scop., Entom. carn., 346. 935. [*Musca*] (1764); VILL.,
Entom. linn., III. 521. 284. [*Musca*] (1789).
- ribesii* ZETT. 1838. **melanostoma** ZETT. et **ribesii** L.
rufinasutus BIG. ? **latifasciatus** MACQ. *var.*
- scitale* HARR. = **balteatus** DEG.
scitulus HARR. **balteatus** DEG.
- serarius** WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 128. 20. (1830); SCHN., Novara Japonia.
Dipt., 352. 37. (1868); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 321.
(1898).
- sexguttatus* MEIG. = ? **lasiophthalmus** ZETT.
- sexmaculatus** ZETT., Ins. Lapp., 603. 17. [*Scaeva*] (1838) et Dipt. Europa centr.
Scand., II. 746. 18. [*Scaeva*] (1843); Kow., Wien. entom. Zeitg., et sept.
IV. 168. (1885).
- sinuatus* PALMA ? **annulatus** ZETT.
- solitarius* ZETT. = **venustus** MEIG.
- tarsatus** ZETT., Ins. Lapp., 601. 12. [*Scaeva*] (1838) et Dipt. Scand., Europa centr.
II. 730. 33. (1843) et VIII. 3141. 33. [*Scaeva*] (1849); STAEG., et sept.
Kröjers Tidskr., (2). I. 360. (1845); Egg., Verh. zool.-bot. Ges.
Wien. X. 667. (1860); BOSSD., Fiml. Insekt., I. 245. 30. [*Scaeva*]
(1861); SCHN., F. A., I. 392. (1862); LUNDB., Vid. Medd., 1899.
302. 94. (1899).
- dryadis* HOLMGR., Sv. vet. Akad. Handl., VIII. 26. [*Scaeva*]
(1869), XXIX. 100. [*Scaeva*] (1872) et Entom. Tidskr., IV. 165.
8. (1883).
- terminalis* WIED. = ? **corollae** FABR.
- topiarius* MEIG. = **vitripennis** MEIG.
- topiarius* WALK. = **corollae** FABR.
- topiarius* ZETT. **torvus** OST-SACK.
- torvus** OST-SACK., Proc. Boston Soc. N. H., XVIII. 139. I. (1875); Europa.
JOHNS. ap. SMITH, Insecta N. Jers., 660. f. 310—311. (1899); VERR.,
Brit. Fl., VIII. 356. 7. (1901); CHAGNON, Nat. Can., 1901. 25. 6.
(1901); How., Insect Book, t. XX. f. 13. (1902).
- ribesii* p. p., FALL., Dipt. Succ. Syrph., 40. [*Scaeva*] (1817);
MALM, Kongl. Vet. Handl., 1863. 34. (1863).
- topiarius* ZETT. (*acc* MEIG.), Ins. Lapp., 599. 4. [*Scaeva*] (1838)
et Dipt. Scand., II. 723. 26. (1843) et XIII. 5095. 26. [*Scaeva*]
(1859); STAEG., Kröjers Tidskr., (2). I. 360. (1845); ROND.,
Dipt. ital. Prodr., II. 138. 2. [*Lasiophthicus*] (1857); SCHN.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 347. 39. (1857) et F. A., I.

304. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 242. 23. [*Scavea*] (1861);
 MALM, Kongl. vet. Handl., 1863. 33. (1863); VERR., Entom.
 Monthly Mag., VI. 173. (1870); KOW., Wien. entom. Zeitg.,
 IV. 133. (1885); LINDB., Vid. Medd., 1899. 301. 32. (1899).
- triangulifer** ZETT., Dipt. Scand., II. 737. 39. [*Scavea*] (1843); SCHN., Europa centr.
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 352. 55. (1857) et F. A., I. 308. et sept.
 (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 247. 36. [*Scavea*] (1861); KOW.,
 Wien. entom. Zeitg., IV. 136. (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 402.
 27 et 679. (1901).
- tricinctus** FALL., Dipt. Suec. Syrph., 41. 9. [*Scavea*] (1817); MEIG., Europa.
 S. B., III. 310. 53. (1829); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 243. (95).
 30. (1827) et Suit. à Buff., I. 539. 16. (1834); ZETT., Ins. Lapp.,
 600. 6. [*Scavea*] (1838) et Dipt. Scand., II. 724. 27. (1843), VIII.
 3140. 27. (1849), XII. 4657. 27. (1855) et XIII. 5095. 27. (1859);
 WALK., Ins. Brit., I. 290. 13. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges.
 Wien, VII. 347. 40. (1857) et F. A., I. 303. (1862); BOSSD., Finnl.
 Insekt., I. 242. 24. [*Scavea*] (1861); KOW., Wien. entom. Zeitg.,
 IV. 134. (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 346. 2. f. 285—286. (1901).
- trifasciatus* STROBL = **bifasciatus** FABR. var.
- ? **turbidus** WALK., Entom., V. 274. (1871). Aegyptus.
- umbellatarum** FABR., Entom. syst., IV. 307. 197. (1794) et Syst. Antl., Europa.
 250. 9. [*Scavea*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 44. 15. [*Scavea*]
 (1817); WALK., Ins. Brit., I. 292. 19. (1851); SCHN., Verh. zool.-
 bot. Ges. Wien, VII. 351. 51. (1857) et F. A., I. 308. (1862); ZETT.,
 Dipt. Scand., XIII. 5098. obs. [*Scavea*] (1859); ? OST-SACK., Proc.
 Boston Soc. N. H., XVIII. 151. (1875); ? WILL., Syn. N. A. Syrph.,
 85. (1886); JAROSCH., Trud. Naturf. Ges. Karkoff, XX. 11. 17.
 (sep.) (1886); VERR., Brit. Fl., VIII. 409. 30. (1901); ? CHAGSON,
 Can. Entom., 1901. 2. (1901).
- amoenus* LW., Programm Posen, 35. 15. (1840) et Isis, 1840.
 572. 15. (1840); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 168. (1885).
- umbellatarum* FALL. = **auricollis** MEIG. et **umbellatarum** FABR.
- umbellatarum* MEIG. = **compositarum** VERR.
- umbellatarum* MACQ. = **compositarum** VERR.
- unifasciatus** ZETT., Ins. Lapp., 603. 19. [*Scavea*] (1838) et Dipt. Europa sept.
 Scand., II. 717. 20. (1843) et VIII. 3138. 20. [*Scavea*] (1849); BOSSD.,
 Finnl. Insekt., I. 240. 17. [*Scavea*] (1861).
- vaeuus* Scop. = ? **ribesii** L.
- venustus** MEIG., S. B., III. 299. 38. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. Europa.
 537. 7. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 728. 30. (1843), VIII. 3111.
 30. (1849) et XII. 4658. 30. [*Scavea*] (1855); WALK., Ins. Brit., I.
 291. 17. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 319. 42.
 (1857) et F. A., I. 302. (1862); EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
 X. 667. (1860); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 244. 27. [*Scavea*] (1861);
 VERR., Entom. Monthly Mag., VII. 201. (1871) et Brit. Fl., VIII.
 348. 3. f. 287. (1901); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 135.
 (1885).

- berberidis* Lw., Programm Posen, 34. 7. (*et var.* S.) (1840) et Isis, 1840. 571. 7. (1840).
- dignotus* ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 141. 4. [*Lasiophthicus*] (1857).
- hilaris* ZETT., Dipt. Scand., II. 729. 31. (1843), VIII. 3141. 31. (1849) et XIII. 5097. 31. [*Scaeva*] (1859); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 667. (1860); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 244. 28. [*Scaeva*] (1861); SCHN., F. A., I. 302. (1862); MALM, Kongl. Vet. Handl., 1863. 36. (1863); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 167. (1885).
- implicatus* MEIG., S. B., III. 301. 42. (1822); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 666. (1860).
- lanulatus* ZETT. (*nec* MEIG.), Ins. Lapp., 600. 7. [*Scaeva*] (1838) et Dipt. Scand., II. 731. 34. (1843), XII. 4658. 34. (1855) et XIII. 5097. 34. [*Scaeva*] (1859); WALK., Ins. Brit., I. 291. 18. (1851); BOSSD., Finnl. insekt., I. 245. 31. [*Scaeva*] (1861).
- solitarius* ZETT., Ins. Lapp., 603. 18. [*Scaeva*] (1838).
- vitripennis** MEIG., S. B., III. 308. 50. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 247. (99). 35. (1827) et Suit. à Buff., I. 538. 13. (1834); ZETT., Ins. Lapp., 602. 15. [*Scaeva*] (1838) et Dipt. Scand., II. 708. 9. (1843) et VIII. 3132. 9. [*Scaeva*] (1849); Lw., Programm Posen, 35. 12. (1840) et Isis, 1840. 572. 12. (1840); WALK., Ins. Brit., I. 288. 5. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 126. 17. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 341. 13. (1857) et F. A., I. 310. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 237. 9. [*Scaeva*] (1861); MALM, Kongl. Vet. Handl., 1863. 27. (*var. ribesii*) (1863); PALMA, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 50. 62. (1864); GRIFF., Bull. Mus. Torino, IX. (168). 3. (1894); VERR., Brit. Fl., VIII. 370. 14. (1901).
- confinis* ZETT., Ins. Lapp., 602. 14. [*Scaeva*] (1838).
- topiarius* MEIG., S. B., III. 305. 47. (1822) et VII. 131. 47. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 241. (93). 27. (1827).
- vitripennis* ZETT. = **vitripennis** MEIG. et **vittiger** ZETT.
- vittiger** ZETT., Dipt. Scand., II. 715. 17. (1843), VIII. 3138. 17. (1849) et XIII. 5094. 17. [*Scaeva*] (1859); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 343. 23. (1857) et F. A., 309. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 240. 16. [*Scaeva*] (1861); VERR., Entom. Monthly Mag., IX. 253. (1873) et Brit. Fl., VIII. 361. 10. (1901); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 135. (1885); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIII. 175. 163. (1889); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XIX. 166. (1893).
- vitripennis* p. p., ZETT., Ins. Lapp., 602. [*Scaeva*] (1838).
- corae* GEOFFR. : = ? **corollae** FABR.
- Zetterstedti* VERH. = ? **annulatus** ZETT.

Europa.

Europa centr.
et sept.

Sphaerophoria

St. FARG. et SERV., Encycl. méthod., X, 513. (1825).

Melithreptus LW., Programm Posen, 37. et Isis, 1840, 573.
(1840) *nee* VIEILL. AVES.

Melitrophus WALK., Ins. Brit., III, XXI. (1856).

abbreviata ZETT. = *menthastri* L. *var.* *picta* MEIG.

egyptia WIED. = *scutellaris* FABR.

analis Macq. = ? *scripta* L.

annulipes Macq., Dipt. exot. Suppl., II, (2), 103. (161), 1. (1842). Aegyptus.

brachyptera THOMS. = *scutellaris* FABR.

calceolata Macq.*), Dipt. exot. Suppl., II, (2), 104. (162), 2. t. XVII. Aegyptus.
f. 7. (1842); BECK., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II, 91. 127. [*Melithreptus*] (1903).

contigua Macq. = *cylindrica* SAY.

cylindrica SAY, Amer. Entom., I, 22, t. XI. [*Syrphus*] (1824) et Compl. Japonia
Writ., I, 22. [*Syrphus*] (1859); WIED., Ausser. zweifl. Ins., II, 138.
38. [*Syrphus*] (1830); WILL., Syn. N. A. Syrph., 105. t. IV, f. 16.
(1886); RILEY, Rep. Dept. Agric., 1889, 351. (1889); COQUILL.,
Proc. Unit. Stat. Mus., XXI, 323. (1898); CHAGNON, Nat. Can.,
1901, 41. (1901).

contigua Macq., Dipt. exot. Suppl., II, 78. (62), 4. (1847).

dispar LW. = *scripta* L. *var.*

dubia ZETT. = *menthastri* L. *var.*

fasciata O. F. MÜLL. = *scripta* L.

felic WALK. = ? *scutellaris* FABR.

flavicauda ZETT., Dipt. Scand., II, 771. 6. (1843) et VIII, 3161. 6. (1849); Europa.
PALMA, Annal. Acc. Asp. Nat., (3), III, 58, 94, t. VII, f. 9—12.
(1864); RONDI, Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI, 25. (1868); VERR., Brit.
Fl., VIII, 441. 3. f. 315—317. (1901).

var. *nitidicollis* ZETT., Dipt. Scand., VIII, 3163. 8—9. (1849)
et XIII, 6009. 8—9. (1859); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
VII, 372. 10. (1857) et F. A., I, 318. [*Melithreptus*] (1862); VERR.,
Entom. Monthly Mag., VI, 173. (1869) et Brit. Fl., VIII, 445.
(1901); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV, 133. [*Melithreptus*] (1885).

taeniata WALK. (*nee* MEIG.), Ins. Brit., I, 299. 3. [*Melithreptus*].

formosa Egg. = *Loewii* ZETT.

gemmata Scop. = *scripta* L.

hieroglyphica MEIG. = *menthastri* L. *var.* *philanthus* MEIG.

incerta WIED., Ausser. zweifl. Ins., II, 143. 47. [*Syrphus*] (1830) Nubia

incisa LW. = *menthastri* L. *var.* *philanthus* MEIG.

insignita ZETT. = *menthastri* L. *var.* *philanthus* MEIG.

*) Sphaer. *calceolata* Macq., Dipt. exot. Suppl., II, (2), 91.
[*Syrphus*] (1842), BLANCH., Phil., v. D. WILF. et Giglio Tos, alia est
species, Americae meridionalis incola.

invisito HARR. — **scripta** L.

lacunulatae MACQ. — ? **scripta** L. *var. dispar* LW.

libatrix SCOP. — ? **scripta** L.

limbata MACQ. — ? **scripta** L.

Loewii ZETT., Dipt. Scand., II. 774. 9. (*löwii*) (1843) et XII. 4662. Europa centr. (1855). et sept.

formosa EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 406. [*Melithreptus*] (1859); SCHN., F. A., I. 317. [*Melithreptus*] (1862); JAROSCH., Trud. Naturf. Ges. Karkoff, XVII. 304. 14. [*Melithreptus*] (1883).

longicornis MACQ. — **scutellaris** FABR.

melissae MEIG. — **menthastri** L. *var. philanthus* MEIG.

menthastri DEG. — **scripta** L.

menthastri L., Syst. Nat., X. 594. [*Musca*] (1758), XII. II. 987. 53. Europa.

[*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1819. [*Musca*] (1761); GEOFFR., Hist. Ins., II. 514. 41. [—] (1764); O. F. MÜLLER, Fauna Friedrichsd., 722. [*Musca*] (1764); FABR., Syst. Entom., 771. 43. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II. 433. 59. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 308. 111. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 251. 13. [*Scarcia*] (1805); SCHRANK, Enum. insect., 448. 909. [*Musca*] (1781) et Fauna boica, III. 106. 2409. [*Musca*] (1803); GMEL., Syst. Nat., V. 2875. 53. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 448. 102. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etr., II. 296. 1480. [*Syrphus*] (1790); CEDERH., Faunae Ingr. Prodr., 306. 964. [*Syrphus*] (1798); DWIG., Primitiae faunae Mosqu., 178. 669. [*Musca*] (1802); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 456. 1480. [*Syrphus*] (1807); LATR., Gen. crust. Ins., IV. 325. [*Syrphus*] (1809); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 48. 24. [*Scarcia*] (1817); MEIG., S. B., III. 325. 75. [*Syrphus*] (1822); ST. FARG. SERV., Encycl. méth., X. 513. (1825); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 219. (71). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 551. 3. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 769. 4. (1843) et VIII. 3160. 4. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 593. [*Syrphus*] (1849) et Ins. Brit., I. 299. 2. t. X. f. 14. [*Melithreptus*] (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 115. 6. (1857); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 259. 6. (1861); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 370. 5. (1857) et F. A., I. 317. [*Melithreptus*] (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 133. [*Melithreptus*] (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 434. 2. (1901); KETEL., Programm Pasewalk, 9. obs. [*Melithreptus*] (1903).

var. dubia ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3162. 7—8. (1849) et XIII. 6009. 7—8. (1859); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 134. [*Melithreptus*] (1885); MK., Dipt. Hertenstein., 65. [*Melithreptus*] (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 439. (1901). Europa.

var. philanthus MEIG., S. B., III. 327. 79. [*Syrphus*] (1822); ZETT., Dipt. Scand., II. 773. 8. (1843) et VIII. 3163. 8. (1849); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 260. 9. (1861). Europa.

hieroglyphica MEIG., S. B., III. 327. 78. [*Syrphus*] (1822); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 372. 12. (1857).

incisa LW., Programm Posen, 57. 4. f. 55. [*Melithreptus*] (1840)

et Isis, 1840, 573, 4, f. 55. [*Melithreptus*] (1840); SCHN., F. A., I, 318. [*Melithreptus*] (1862).

insignita ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6010, 11, (1859).

melissae MEIG., S. B., III, 326, 76. [*Syrphus*] (1822); ST. FARG. SERV., Encycl. méth., X, 513, (1825); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827, 220, (72), 7, (1827) et Suit. à Buff., I, 552, 7, t. XII, f. 12, (1834); ZETT., Ins. Lapp., 606, 27. [*Scæva*] (1838) et Dipt. Scand., II, 770, 5, (1843), VIII, 3161, 5, (1849); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII, 371, 6, (1857) et F. A., I, 318. [*Melithreptus*] (1862); BOSSD., Fimml. Insekt., I, 260, 7, (1861).

multipunctata ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6009, 10, (1859); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXIX, 162. [*Melithreptus*] (1893).

multipunctata ROXD. (nec ZETT.), Atti Sec. ital. Sci. Nat., VIII, 134, (1865).

oleandri ROXD., Dipt. ital. Prodr., II, 114, 4, (1857).

origani MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827, 220, (72) 4, (1827) et Suit. à Buff., I, 552, 4, (1834); MEIG., S. B., VII, 138, 116. [*Syrphus*] (1838).

serpylli ROXD., Dipt. ital. Prodr., II, 115, 7. (*serpilli*) (1857).

var. **pieta** MEIG., S. B., III, 326, 77. [*Syrphus*] (1822); ST. FARG. SERV., Encycl. méth., X, 513, (1825); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827, 221, (73), 8, (1827) et Suit. à Buff., I, 553, 8, (1834); ZETT., Dipt. Scand., II, 772, 7, (1843), VIII, 3161, 7, (1849) et XIII, 6007, 7, (1859); ROXD., Dipt. ital. Prodr., II, 114, 5, (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII, 371, 9, (1857) et F. A., I, 317. [*Melithreptus*] (1862); BOSSD., Fimml. Insekt., I, 260, 8, (1861); VERR., Entom. Monthly Mag., VI, 173, (1870) et Brit. Fl., VIII, 437, 440, (1901); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV, 134. [*Melithreptus*] (1885); STROBL., Wien. entom. Zeitg., XVIII, 145, 98. [*Melithreptus*] (1893).

abbrecciata ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6007, 7-8, (1859).

var. **taeniata** MEIG., S. B., III, 325, 74, t. XXX, f. 35-36. [*Syrphus*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827, 219, 71, 2, (1827) et Suit. à Buff., I, 551, 2, (1834); BOCHER, Naturg., I, 51, 35, t. V, f. 4-6. [*Syrphus*] (1834); ZETT., Ins. Lapp., 605, 27. [*Scæva*] (1838) et Dipt. Scand., II, 768, 3, (1843), VIII, 3160, 3, (1849); BLASCH., Hist. nat. Ins., III, 600, t. IV, f. 3, (1840); Lw., Programm Posen, 37, 3. [*Melithreptus*] (1840) et Isis, 1840, 573, 3. [*Melithreptus*] (1840); ROXD., Dipt. ital. Prodr., II, 113, 3, (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII, 370, 4, (1857) et F. A., I, 318. [*Melithreptus*] (1862); BOSSD., Fimml. Insekt., I, 259, 5, (1861); BOSSD., Entom. hortie., 629. [*Syrphus*] (1867); SIEBKE, Enum. insect. norveg., IV, 63, 4, (1877); MESZB., Kopskel. Mund. Zweifl., t. III, f. 2-6, 9, 10, 12. [*Syrphus*]; KOW., Wien. entom. Zeitg., IV, 134. [*Melithreptus*] (1885); GRAY., Bull. Mus. Torino, VIII, (143) 6, (1893) et IX, (168) 1, (1894); VERR., Brit. Fl., VIII, 439, 440, (1901).

Europa.

Europa,
Japonia.

multipunctata ROXD. — **menthastri** L. var. **philanthus** MEIG.

- multipunctata* ZETT. — *menthastri* L. var. *philanthus* MEIG.
natalensis MACQ. — *scutellaris* FABR.
nigricoxa ZETT. — *scripta* L. var.
nitidicollis ZETT. *flavicauda* ZETT. var.
oleandri ROND. — *menthastri* L. var. *philanthus* MEIG.
origani MACQ. — *menthastri* L. var. *philanthus* MEIG.
philanthus MEIG. — *menthastri* L. var.
philanthus SCHN. — *scripta* L. var. *strigata* STAEG.
picta MEIG. — *menthastri* L. var.
Rueppellii WIED., *Ausser. zweifl. Ins.*, II. 141. 44. [*Syrphus Rüppellii*] Nubia. (1830).
scripta L., *Syst. Nat.*, X. 594. [*Musca*] (1758), XII. II. 987. 54. [*Musca*] Europa. et Fauna Suec., 1820. [*Musca*] (1761); ROESEL, *Insect. Belust.*, II. *Musc.* f. VI. [—] (1764); O. F. MÜLL., *Fauna Fridrichsd.*, 723. [*Musca*] (1764); FABR., *Syst. Entom.*, 772. 45. [*Syrphus*] (1775), *Spec. ins.*, II. 434. 62. [*Syrphus*] (1781), *Entom. syst.*, IV. 308. 113. [*Syrphus*] (1794) et *Syst. Antl.*, 252. 17. [*Scavva*] (1805); GILL., *Syst. Nat.*, V. 2876. 54. [*Musca*] (1788); VILL., *Entom. linn.*, III. 449. 103. [*Musca*] (1789); CEDERN., *Faunae Ingr. Prodr.*, 307. 965. [*Syrphus*] (1798); SCHELL., *Genres Mouch. Dipt.*, 52. t. X. f. 2. [*Syrphus*] (1803); LATR., *Diet. Hist. nat. Déterv.*, XXIV. 195. 568. [*Syrphus*] (1804) et *Gen. crust. Ins.*, IV. 325. [*Syrphus*] (1809); MEIG., S. B., III. 324. 73. [*Syrphus*] (1822); ST. FARG. SERV., *Encycl. méth.*, X. 513. (1825); MACQ., *Soc. Sci. Lille*, 1827. 218. (70). I. t. II. f. 3. (1827); et *Suit. à Buff.*, I. 551. 1. (1834); LW., *Programm Posen*, 37. 1. 2. f. 52. [*Melithreptus*] (1840) et *Isis*, 1840. 573. [*Melithreptus*] (1840); ZETT., *Ins. Lapp.*, 695. 28. [*Scavva*] (1838) et *Dipt. Scand.*, II. 766. 1. (1843), VIII. 3157. 1. (1849); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, III. 592. [*Syrphus*] (1869) et *Ins. Brit.*, I. 299. 1. [*Melithreptus*] (1851); ROND., *Dipt. ital. Prodr.*, II. 112. 1. (1857); SCHN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, VII. 369. 1. (1857) et F. A., I. 316. [*Melithreptus*] (1862); CERR., *Farm. Ins.*, 82. (1860); BOSSD., *Finnl. Insekt.*, I. 257. 1. (1861); KOW., *Wien. entom. Zeitg.*, IV. 133. [*Melithreptus*] (1885); GURSCH., III. *Wochenschr. Entom.*, II. t. III. f. 16. [*Melithreptus*] (1897); VERR., *Brit. Fl.*, VIII. 428. I. f. 311—314. (1901); KETEL., *Programm Pasewalk*, 9. obs. [*Melithreptus*] (1903); MEIG., *Zool. Jahrbüch.*, XV. 679. [*Melithreptus*] (1903).
caulis MACQ., *Suit. à Buff.*, I. 553. 9. (1834); MEIG., S. B., VII. 139. 119. [*Syrphus*] (1838).
fasciata O. F. MÜLL., *Fauna Fridrichsd.*, 725. [*Musca*] (1764); VILL., *Entom. linn.*, III. 546. 379. [*Musca*] (1789).
geminata Scop., *Entom. carn.*, 356. 965. [*Conops*] (1763)
incisita HAER., *Expos. engl. Ins.*, 83. t. XXIV. f. 31. [*Musca*] (1776).
libatrix Scop., *Entom. carn.*, 346. 933. [*Musca*] (1763); VILL., *Entom. linn.*, III. 521. 283. [*Musca*] (1789).

- umbata* Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 220. (72). 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 552. 6. (1834); Meig., S. B., VII. 139. 118. [*Syrphus*] (1838).
- menthasvri* DEG. (nec L.), Ins., VII. 119. 10. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI. 53. 10. [*Musca*] (1782); FALL., p. p., Dipt. Succ. Syrph., 48. [*Scavea*] (1817).
- sinuata* Macq., Suit. à Buff., I. 553. 10. (1834); Meig., S. B., VII. 139. 120. [*Syrphus*] (1838).
- var. dispar* Lw., Programm Posen, 37. 5. t. 53—54. [*Melithreptus*] (1840) et Isis, 1840. 573. 5. [*Melithreptus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., II. 767. p. p. (1843). VIII. 3157. 1—2. (1849); GERM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 174. 1. [*Melithreptus*] (1847); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 370. 2. (1857) et F. A., I. 317. [*Melithreptus*] (1862); BOHSD., Finnl. Insekt., I. 258. 2. (1861); VERR., Entom. Monthly Mag., VII. 173. (1870) et Brit. Fl., VIII. 431. (1901); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 134. [*Melithreptus*] (1885). Europa.
- lavandulae* Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 220. (72). 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 552. 5. (1834); Meig., S. B., VII. 138. 117. [*Syrphus*] (1838).
- var. nigricoxa* ZETT., Dipt. Scand., II. 767. 2. (1843) et VIII. 3158. 2. (1849); RONDI., Dipt. ital. Prodr., II. 112. 2. (1857); BOHSD., Finnl. Insekt., I. 258. 3. (1861); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 134. [*Melithreptus*] (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 431. (1901). Europa.
- var. strigata* STAEG., Kröjers Tidsskr., (2). I. 362. (1845); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3159. 2—3. (1849); BOHSD., Finnl. Insekt., I. 258. 4. (1861); SCHN., F. A., I. 316. [*Melithreptus*] (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 134. [*Melithreptus*] (1885); SIEBEL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 145. 97. [*Melithreptus*] (1899) et Wiss. Mittheil. Bosh. Hercegov., VII. 591. [*Melithreptus*] (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 432—433. (1901). Europa, Madera.
- philanthus* SCHN. (nec MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 371. 8. [*Melithreptus*] (1857).
- scutellaris** FABR., Syst. Anth., 252. 15. [*Scavea*] (1805); WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 139. 25. [*Syrphus*]; Lw., Diptf. Südafr., (375). 303. 5. [*Syrphus*] (1860). Africa sept., Ins. Canar., Madera.
- egyptia* WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 133. 29. [*Syrphus*] (1830); Lw., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XIV. 378. 19. [*Syrphus*] (1854) et Diptf. Südafr., 375. (303). 6. et (378). 306. 4. [*Syrphus*] (1860); VERR., Trans. entom. Soc. London, 1898. 414. 4. [*Syrphus*] (1898) et Cat. europ. syrph., 65. [*Allograpta*] (1900).
- brachyptera* THOMS., Eng. Resa, 496. 86. [*Syrphus*] (1858).
- felix* WALK., Ins. Saunders., III. 229. [*Syrphus*] (1852); Lw., Diptf. Südafr., (375). 303. 4. [*Syrphus*] (1860).
- longicaulis* Macq., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 152. (94). 13. 1.

XVI. f. 5. [*Syrphus*] (1842); BECK., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 84. 121. [*Syrphus*] (1903).

natalensis MACQ., Dipt. exot., Suppl. I. 262. (134). 28. [*Syrphus*] (1845).

serpylli ROND. — **menthastri** L. var. **philanthus** MEIG.

sinuata MACQ. — **scripta** L.

strigata STAEG. — **scripta** L. var.

taeniata MEIG. — **menthastri** L. var.

taeniata WALK. — **flavicauda** ZETT. var. **nitidicollis** ZETT.

Xanthogramma

SCHN., Wien. entom. Monatschr., IV. 215. (1860).

anteambulo HARR. = **citrofasciatum** DEG.

arcuatum DON. = **citrofasciatum** DEG.

citrofasciatum DEG., Ins., VI. 118. 9. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, Europa. VI. 53. 9. [*Musca*] (1782); WALK., Ins. Brit., I. 297. 2. [*Doros*] (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 366. 2. [*Doros*] (1857) et F. A., I. 319. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 450. 2. f. 319. (1901).

anteambulo HARR., Expos. engl. Ins., 60. t. XV. f. 17. [*Musca*] (1776).

arcuatum DONOV. (nec L.), Brit. Ins., XII. 84. t. 424. f. 2. [*Musca*] (1807).

festivum FABR. (nec L.), Syst. entom., 769. 34. [*Syrphus*], Spec. ins., II. 430. 47. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 300. 82. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 242. 46. [*Eristalis*] (1805); SCHAEFF., Icon., t. XXVI. f. 10. [—] (1777); GEOFFR., Ins., II. 505. 27. t. XVIII. f. 1. [—] (1764); SCHRANK, Enum. ins., 446. 906. [*Musca*] (1781) et Fauna boica, III. 116. 2433. [*Musca*] (1803); GMEL., Syst. Nat., V. 2874. 45. [*Musca*] (1788) VILL., Entom. linn., III. 444. 94. [*Musca*] (1789); CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 305. 958. [*Syrphus*] (1798); LATR., Gen. crust. Ins., IV. 325. [*Syrphus*] (1809); FALL., Dipt. Succ. Syrph., 38. 3. [*Scarva*] (1817); MEIG., S. B., III. 297. 36. [*Syrphus*] (1822) et VII. 130. 2. [*Doros*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 214. (66). 2. [*Doros*] (1827) et Suit. à Buff., I. 550. 2. [*Doros*] (1834); ZELL., Isis, 1842. 830. 13. 2. [*Doros*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 692. 2. [*Doros*] (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 577. [*Syrphus*] (1849); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 127. 22. [*Syrphus*] (1857); BONSD., Finl. Insekt., I. 230. 1. [*Doros*] (1861).

philanthinum ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 450. [*Scarva*] (1807).

decoratum ZETT. = **ornatum** MEIG.

dives ROND. = **ornatum** MEIG. var.

festivum FABR. **citrofasciatum** DEG.

festivum FALL. **citrofasciatum** DEG. et **ornatum** MEIG.

festivum ROSSI **ornatum** MEIG.

maculipenne MIK, Wien. entom. Zeitzg., VI. 163. 4. (1887). Caucasus.

marginale Lw., N. Beitr., II. 18. 38. [*Doros*] (1854); SCHN., Novara Dipt., 347. 18. (1868). Hispania.

var. **Morenae** STROBL, Wien. entom. Zeitzg., XVIII. 144. 96. (1889). Hispania.

Morenae STROBL = **marginale** Lw. *var.*

ornatum MEIG., S. B., III. 298. 37. [*Syrphus*] et VII. 130. 3. [*Doros*] Europa.

(1838); GERM., Fauna ins. Europ., X. 20. [*Syrphus*] (1826); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 215. (67). 3. [*Doros*] (1827) et Suit. à Buff., I. 550. 3. [*Doros*] (1834); ZELL., Isis, 1842. 830. 13. 3. [*Doros*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 693. 3. (1845) et VIII. 3127. 3. [*Doros*] (1849); WALK., Ins. Brit., I. 298. 3. [*Doros*] (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 127. 23. [*Syrphus*] (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 367. 3. [*Doros*] (1857) et F. A., I. 319. (1862); BOSSD., Fimil. Insekt., I. 230. 2. [*Doros*] (1861); BELING, Arch. Naturg. Trosehl., XLVIII. 232. 38. (1882); GRIFF., Bull. Mus. Torino, VIII. (143). 8. [*Syrphus*] (1893); VERR., Brit. Fl., VIII. 448. I. f. 318. (1901).

decoratum ZETT., Dipt. Scand., II. 694. 4. (1843), VIII. *obs.* 2. (1849) et XIII. 5088. *obs.* [*Doros*] (1859).

festivum FALL., p. p., Dipt. Succ. Syrph., 38. [*Scaeva*] (1887).

festivum ROSSI (*nec* L.), Fauna otr., II. 291. 1470. [*Syrphus*] (1790); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 450. 1470. [*Syrphus*] (1807).

pedissequum HARR., Expos. engl. Ins., 61. t. XV. f. 19. [*Musca*] (1776).

var. **dives** ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 136. 24. [*Syrphus*] (1857). Italia.

pedissequum HARR. = **ornatum** MEIG.

philanthinum ILLIG. = **citrofasciatum** DEG.

Olbiosyrphus

MIK, Wien. entom. Zeitzg., XVI. 66. (1897).

flavomarginatus STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. Dalmatia.

479. [*Syrphus*] (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX. 539. [*Syrphus*] (1904).

laetus FABR., Entom. Syst., IV. 301. 83. [*Syrphus*] et Syst. Antl., 243. Europa centr.

47. [*Eristalis*] (1805); CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 305. 959. et mer.

[*Syrphus*] (1798); MEIG., S. B., VI. 353. 98. [*Syrphus*] (1830); SCHN., F. A., I. 304. [*Syrphus*] (1863); GIRSCHN., Wien. entom. Zeitzg., III. 198. III. [*Syrphus*] (1884); MIK, Wien. entom. Zeitzg., XVI.

64. (1897).

novus ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 140. 1. [*Lasiophthicus*] (1857)

et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 136. [*Lasiophthicus*] (1865);

STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 164. (1893) et XXXIV.

222. [*Syrphus*] (1898).

novus ROND. = **laetus** FABR.

Doros

MEIG., Illiger's Magaz., II. 274. (1803).

bipunctatus MIK = **conopeus** FABR. *var.*

coarctatus PANZ. = **conopeus** FABR.

conopeus ZELL., Isis, 1842. 830. 13. 1. (1842).

Europa.

coarctatus PANZ., Fauna germ., XI.V. 22. [*Syrphus*] (1797).

conopeus FABR., Syst. Entom., 768. 26. [*Syrphus*] (1775), Spec.

ins., II. 429. 38. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 297. 69.

[*Syrphus*] (1794), Entom. syst. Suppl., 559. 6. [*Mulio*] (1798)

et Syst. Antl., 195. 29. [*Milesia*] (1805); GMEL., Syst. Nat.,

V. 2868. 21. [*Musca*] (1788); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt.,

52. t. X. f. 1. [*Syrphus*] (1803); LATR., Gen. crust. ins., IV.

325. [*Syrphus*] (1809); FALL., Dipt. Succ. Syrph., 37. 2.

[*Scarcra*] (1817); MEIG., S. B., III. 296. 35. [*Syrphus*] (1822)

et VII. 130. 1. t. LXVIII. f. 7. (1838); ST. FARG. SERV., Encycl.

méth., X. 521. [*Baccha*] (1825); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827.

213. (65). 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 550. 1. t. XII. f. 11.

(1834); BREM., Isis, 1846. 164. (1846); ZETT., Dipt. Scand.,

II. 691. 1. (1843) et XIII. 5087. 1. (1859); WALK., List Dipt.

Brit. Mus., III. 577. [*Syrphus*] (1849) et Ins. Brit., I. 297. 1.

t. X. f. 13. (1851); HAL., Stett. entom. Zeitg., XII. 138. (1851);

SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien VII. 365. 1. (1857) et F.

A., I. 320. (1862); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 797.

(1864) et Wien. entom. Zeitg., IV. 53. (1885); VERR., Brit.

Fl., VIII. 453. 1. f. 320. (1901).

profuges HARR., expos. engl. Ins., 81. t. XXIV. f. 25. [*Musca*]

(1776).

var. bipunctatus MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXV. Austria.

328. (1885).

var. destillatorius MIK, Wien. entom. Zeitg., IV. 53. (1885), Austria.

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 797. (*conopeus*) (1864) et XXXV.

327. (1885); BRACER, Denkschr. Akad. Wiss. Wien. 1883. 67.

(*sep.*) (1883).

conopeus FABR. = **conopeus** FABR. *em.* ZELL.

destillatorius MIK = **conopeus** FABR. *var.*

profuges HARR. = **conopeus** FABR.

Pseudodoros

BECK., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 92. (1903).

nigricollis BECK., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 92. 128. (1903.)¹⁾ Aegyptus.

¹⁾ **Ocyptamus funebris** MACQ., Suit. à Buff., I. 554. 1. (1834)

et Dipt. exot., II. (2). 163. (105). 1. t. XIX. f. 2. (1842), Brasiliae

incola, a MACQUART, WILLISTON, GIGLIO-TOS et ALDRICH ex insula Tene-

rife recordatur, quod LOEW, Diptf. Südafr., (365). 293. repellit.

Baccha

FABR., Syst. Antl., 199. 44. (1805).

abbreviata MEIG. = **elongata** FABR.*angusta* OST-SACK. — ? **elongata** FABR.**apicalis** LW., Wien. entom. Monatschr., II. 196. 9. [*Baccha*] (1858). Japonia,**elongata** FABR., Syst. Entom., 768. 29. [*Syrphus*] (1775). Spec. ins., Europa.

II. 430. 42. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 299. 76. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 200. 6. (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2873. 353. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 457. 117. [*Musca*] (1789); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 14. 1. (1816); MEIG., S. B., III. 197. 1. t. XXVIII. f. 13. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 163. 1. t. I. f. 1. (1827) et Suit. à BUFF., I. 577. 1. t. XII. f. 22. (1834); CURT., Brit. Entom., 737. (1838); ZETT., Ins. Lapp., 581. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 893. 1. (1843); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 601. (1840); LW., Programm Posen, 28. 1. (1840) et Isis, 1840. 566. 1. (1840); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1842. 168. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 300. 1. (1851); RONDI., Dipt. ital. Prodr., II. 195. 1. [*Bacca*] (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 383. 1. (1857) et F. A., I. 324. [*Baccha*] (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 298. 1. (1861); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 158. (1893), VERR., Brit. Fl., VIII. 458. 2. f. 321. (1901).

abbreviata MEIG., S. B., III. 200. 6. (1822).? *angusta* OST-SACK., Bull. Geolog. Survey, III. 332. (1877).? *erratica* SCOP., Entom. carn., 345. 932. [*Musca*] (1763); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 415. (1856).*Klugii* MEIG., S. B., VI. 349. 9. (1830); SCHN., F. A., I. 324. [*Baccha*] (1862); KETEL., Programm Pasewalk, 7. (1903).*nigricornis* SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1842. 169. (1842).*nigripennis* MEIG., S. B., III. 200. 7. (1822); CURT., Brit. Entom., 737. (1838); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 384. 3. (1857) et F. A., I. 324. [*Baccha*] (1862); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 159. (1893).*perocilis* HARR., Expos. engl. Ins., 81. t. XXIV. f. 24. [*Musca*] (1776).*scutellata* MEIG., S. B., III. 198. 2. (1822); MACQ., Suit. à BUFF., I. 577. 2. (1834); CURT., Brit. Entom., 737. (1838); WALK., Ins. Brit., I. 301. 3. (1851); RONDI., Dipt. ital. Prodr., II. 195. 3. [*Bacca*] (1857).*sphegina* MEIG., S. B., III. 198. 3. (1822); CURT., Brit. Entom., 737. (1838); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1842. 169. (1842).*tabida* MEIG., S. B., III. 199. 5. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 164. 2. (1827) et Suit. à BUFF., I. 578. 3. (1834); CURT., Brit. Entom., 737. (1838); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1842. 168. (1842); WALK., Ins. Brit., I. t. X. f. 15. (1851).*viripennis* MEIG., S. B., III. 200. 8. (1822).*erratica* SCOP. — ? **elongata** FABR.*Klugii* MEIG. — **elongata** FABR.

- maculata** WALK., Ins. Saunders., III. 223. (1856); Coquill., Proc. Japonia. Unit. Stat. Mus., XXI. 324. (1898).
- nigricornis* SCHUMM. = **elongata** FABR.
- nigripennis* MEIG. = **elongata** FABR.
- obscuripennis** MEIG., S. B., III. 199. 4. (1822); CURT., Brit. Entom., 737. (1838); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1842. 170. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 894. 2. (1843) et VIII. 3196. 2. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 301. 2. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 105. 2. [*Bacca*] (1857); SCHN., Verh. zool. bot. Ges. Wien, VII. 384. 2. (1857) et F. A., I. 326. [*Bacha*] (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 299. 2. (1861); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 133. (1885); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 159. (1893); VERR., Brit. Fl., VIII. 456. (1901). Europa.
- perexilis* HARR. = **elongata** FABR.
- scutellata* MEIG. = **elongata** FABR.
- sphagina* MEIG. = **elongata** FABR.
- tabula* MEIG. = **elongata** FABR.
- vitripennis* MEIG. = **elongata** FABR.

Chamaesyrrhus

MIK, Wien. entom. Zeitg., XIV. 133. (1895).

albifrons v. Ros. = **scaevoides** FALL.

lusitanicus MIK, Wien. entom. Zeitg., XVII. 143. (1898); SHARP, Entom. Monthly Mag., (2). XIV. 197. (1903). Europa centr. et mer.

pusillus v. Ros. = **scaevoides** FALL.

quadricinctus ROND. = **scaevoides** FALL.

scaevoides FALL., Dipt. Suec. Syrph., 35. 5. [*Rhòngia*] (1817); MEIG., S. B., III. 263. 5. [*Brachyopa*] (1822); ZETT., Ins. Lapp., 609. 1. [*Pelecocera*] (1838) et Dipt. Scand., II. 776. 2. [*Pelecocera*] (1843); EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 705. [*Pelecocera*] (1858); BONSD., Finnl. Insekt., I. 261. 1. [*Pelecocera*] (1861); SCHN., F. A., I. 315. [*Pelecocera*] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 163. [*Pelecocera*] (1893); MIK, Wien. entom. Zeitg., XIV. 135. 1. (1895); VERR., Brit. Fl., VIII. 680. 1. f. 458. (1901). Europa.

albifrons v. Ros., Württemb. Corrb., I. 55. [*Syrphus*] (1840).

pusillus v. Ros., Württemb. Corrb., I. 55. [*Syrphus*] (1840).

quadricinctus ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 135. [*Pelecocera*] (1865); MIK, Wien. entom. Zeitg., XIV. 135. (1895).

Schinerii ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 135. [*Pelecocera*] (1865); MIK, Wien. entom. Zeitg., XIV. 135. (1895).

Schinerii ROND. = **scaevoides** FALL.

Pelecocera

MEIG., S. B., III. 340. CXI. (1822).

Euceratomyia WILL., Wien. entom. Zeitg., III. 185. (1884).

flavicornis MEIG. = **tricincta** MEIG.

flavicornis SCHN. = **latifrons** LW.

latifrons LW., N. Beitr., IV. 46. 39. (1856); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Europa centr. Wien, VIII. 704. (1858); SCHN., F. A., I. 315. (1862); KERT., Term. Füzet., XIX. 29. (1896) et Wien. entom. Zeitg., XVI. 150. (1897).

flavicornis SCHN. (*nec* MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 363. 2. (1857); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 706. (1858).

rectinervis KERT., Term. Füzet., XIX. 26. f. 2 et 4-6. (1896) et Wien. entom. Zeitg., XVI. 149. (1897); Mik. Wien. entom. Zeitg., XV. 109. 50. (1896).

lugubris PERR., Annal. Soc. entom. France, VIII. 52. t. VI. f. 2. a-c. Gallia. (1839); Mik. Wien. entom. Zeitg., XIV. 134. 2. (1895) et XV. 109. (1896); KERT., Term. Füzet., XIX. 27. f. 1 et 3. (1896).

rectinervis KERT. = **latifrons** LW.

ruficornis ROSD. = **tricincta** MEIG.

tricincta MEIG., S. B., III. 340. I. t. XXXI. f. 3. (1822); MACQ., Suit. Europa. à Bufl., I. 531. I. t. XII. f. 8. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 775. I. (1843); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 363. I. (1857) et F. A., I. 315. (1862); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 702. (1858); VERR., Entom. Monthly Mag., VII. 200. (1871) et Brit. Fl., VIII. 461. I. f. 322, 324-325. (1901); Mik. Wien. entom. Zeitg., XIV. 134. (1895); KERT., Term. Füzet., XIX. 29. (1895).

flavicornis MEIG., S. B., III. 341. 2. (1822); LW., Berlin. entom. Zeitschr., II. 229. (1858).

ruficornis ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 135. (1865).

Ischyroptera

POKORS., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 397. (1887).

bipilosa Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 399. t. VII. f. 6. (1887). Alpes.

Sphegina

MEIG., S. B., III. 193. c. (1822).

clunipes FALL., Dipt. Succ. Syrph., 12. 10. [*Milesia*] (1816); MEIG., Europa. S. B., III. 194. I. t. XXVIII. f. 5. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 165. I. t. I. f. 2. (1827) et Suit. à Bufl., I. 576. I. t. XII. f. 21. (1834); ZETT., Ins. Lapp., 588. I. (1838) et Dipt. Scand., II. 891. I. (1843), VIII. 3196. I. (1849) et XIII. 6043. I. (1859);

- SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1842, 166. (1842); ZELL., Stettin. entom. Zeitg., IV, 302, 1. (1843); WALK., Ins. Brit., I, 302, I, t. X, f. 16. (1851); ROXD., Dipt. ital. Prodr., II, 103, 1. (1857); SEMX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII, 381, 1. (1857) et F. A., I, 323. (1862); BOSCH., Finkl. Insekt., I, 297, 1. (1861); JAROSCH., Trud. Naturf. Ges. Karkoff, XIX, 7, 14. (*sep.*) (1885); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV, 133. (1885); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXIX, 159. (1893); GIESCH., III, Wochenschr. Entom., II, t. III, f. 19. (1897); VERR., Brit. Fl., VIII, 464, I, f. 326—327. (1901).
- elegans* SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1842, 167. (1842); ZELL., Stettin. entom. Zeitg., IV, 304, 2. (1843); SEMX., F. A., I, 323. (1862); KITT. et KNECHEL., System. Uebers., 75, 2. (1872).
- flava* MACQ., Suit. à Buff., I, 577, 4. (1834); MEG., S. B., VII, 109, 4. (1838).
- nigra* MEG., S. B., III, 195, 2. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I, 576, 3. (1834); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1842, 167. (1842); ZELL., Stettin. entom. Zeitg., IV, 304, 3. (1843); ZETT., Dipt. Scand., II, 891, 2. (1843) et VIII, 3196, 2. (1849); ROXD., Dipt. ital. Prodr., II, 103, 2. (1857); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXIX, 160. (1893).
- nigricornis* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827, 166, 2. (1827) et Suit. à Buff., I, 576, 2. (1834); MEG., S. B., VII, 109, 3. (1838).
- elegans* SCHUMM. = **elunipes** FALL.
- flava* MACQ. = **elunipes** FALL.
- Kimakowiczii** STROBL., Mittheil. Ver. Hermannstadt, XLVI, 39. (1897) Austria.
et Mittheil. Ver. Steierm., XXIX, 160. (*elunipes* var. *f*) (1893).
- latifrons** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV, 294. (1865); STROM., Austria.
Mittheil. Ver. Steierm., XXIX, 160. (1893).
- Loewii** ZELL., Stettin. entom. Zeitschr., IV, 305, 4. (1843); SEMX., Germania.
F. A., I, 323. (1862).
- nigra* MEG. = **elunipes** FALL.
- nigricornis* MACQ. = **elunipes** FALL.
- nigricornis* ZETT. = **Zetterstedti** SEMX.
- spheringea* ZETT. = **Zetterstedti** SEMX.
- Zetterstedti** SEMX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII, 382, 6. (1857) et Europa centr.
F. A., I, 323. (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV, 133. (1885). et sept.
- nigricornis* ZETT. (*acc* MACQ.), Dipt. Scand., II, 892, 3. (1843) et VIII, 3196, 3. (1849).
- spheringea* ZETT., Ins. Lapp., 582, I. [*Ascia*] (1838).

Neoascia

WILLIST., Synops. N. A. Syrph., 111. (1886).

Ascia MEG., S. B., III, 185, XCIX. (1822) *acc* Scop., 1777. Lep.

acnea MEG. = **floralis** MEG.

analis MACQ. = ? **floralis** MEG.

- bifasciata* ZETT. **floralis** MEIG.
- bipunctata* CURT. **podagrica** FABR.
- clavata* Scop. ? **podagrica** FABR.
- crassipes* SCHRANK **podagrica** FABR.
- dispar** MEIG., S. B., III, 188, 4, t. XXVII, 1-2, 28. [*Ascia*] (1822); Europe.
 Macq., Soc. Sci. Lille, 1827, 169, (21), 6, [*Ascia*] (1827) et Suit. à Buff., I, 575, 6, [*Ascia*] (1834); ZETT., Ins. Lapp., 583, 3, [*Ascia*] (1838) et Dipt. Scand., II, 887, 3, (1843), VIII, 3194, 3, (1849) et XII, 4676, 3, [*Ascia*] (1855); WALK., Ins. Brit., I, 393, 2, [*Ascia*] (1851); ROSS., Dipt. ital. Prodr., II, 101, 3, [*Ascia*] (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII, 379, 1, [*Ascia*] (1857) et F. A., I, 321, [*Ascia*] (1862); BOSSQ., Finkl. Insekt., I, 295, 3, [*Ascia*] (1861); VERR., Entom., V, 21, [*Ascia*] (1871) et Brit. Fl., VIII, 470, 2, t. 532, [*Ascia*] (1901); KOW., Wien. entom. Zeitzg., IV, 133, [*Ascia*] (1885); STROB., Mittheil. Ver. Steierm., XXIX, 161, [*Ascia*] (1893).
 ? *uncticlosa* Scop., Entom. carn., 344, 927, [*Masea*] (1763); SCHRANK, Enum. insect., 477, 972, [*Masea*] (1781); VILL., Entom. linn., III, 520, 279, [*Masea*] (1789).
- elongata* SCHRANK **podagrica** FABR.
- floralis** MEIG., S. B., III, 183, 3, [*Ascia*] (1822); Macq., Soc. Sci. Europe.
 Lille, 1827, 169, (21), 3, [*Ascia*] (1827) et Suit. à Buff., I, 574, 4, Ins. Canad., [*Ascia*] (1834); SCURM., Arb. schles. Ges., 1842, 165, [*Ascia*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., II, 886, 2, (1843), VIII, 3193, 2, (1849) et XIII, 6041, 2, [*Ascia*] (1859); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII, 380, 4, [*Ascia*] (1857) et F. A., I, 321, [*Ascia*] (1862); BOSSQ., Finkl. Insekt., I, 295, 2, [*Ascia*] (1861); MARM. Kongl. Vet. Handl., 1863, 76, [*Ascia*] (1863); KOW., Wien. entom. Zeitzg., IV, 133, [*Ascia*] (1885); STROB., Mittheil. Ver. Steierm., XXIX, 161, [*Ascia*] (1893); VERR., Brit. Fl., VIII, 472, 3, [*Ascia*] (1901).
- acuta* MEIG., S. B., III, 191, 9, [*Ascia*] (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827, 170, (22), 7, [*Ascia*] (1827) et Suit. à Buff., I, 575, 8, t. XII, f. 20, [*Ascia*] (1834); ZETT., Ins. Lapp., 583, 6, [*Ascia*] (1838) et Dipt. Scand., II, 889, 7, (1843), VIII, 3195, 7, [*Ascia*] (1849); ROSS., Dipt. ital. Prodr., II, 101, 4, [*Ascia*] (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII, 381, 9, [*Ascia*] (1857).
- canalis* Macq., Hist. Nat. Can. Webb Entom., I, 109, 53, [*Ascia*] (1838) et Dipt. exot., II, (2), 167, (199), [*Ascia*] (1842).
- bifasciata* ZETT., Ins. Lapp., 583, 4, [*Ascia*] (1838).
- hastata* MEIG., S. B., III, 189, 5, [*Ascia*] (1822); LW., Programm Posen, 1840, 28, 3, [*Ascia*] (1840) et Isis, 1840, 567, 3, [*Ascia*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., II, 890, *obs.*, [*Ascia*] (1843); GÜMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX, (3), 172, 1, [*Ascia*] (1845); WALK., Ins. Brit., I, 393, 3, [*Ascia*] (1851); SCHN., F. A., I, 322, [*Ascia*] (1862).
- atlabala* MEIG., S. B., III, 191, 8, [*Ascia*] (1822); ZETT., Dipt. Scand., II, 889, 6, [*Ascia*] (1843); SCHN., Verh. zool.-bot.

Ges. Wien, VII. 381. 8. [*Ascia*] (1857) et F. A., I. 322. [*Ascia*] (1862).

quadripunctata MEIG., S. B., III. 189. 6. [*Ascia*] (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 574. 5. [*Ascia*] (1834); ZETT., Ins. Lapp., 583. 5. [*Ascia*] (1838) et Dipt. Scand., II. 887. 4. (1843), XII. 4676. 4. (1855) et XIII. 6042. 4. [*Ascia*] (1859); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1842. 165. [*Ascia*] (1842); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 101. 2. [*Ascia*] (1857); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 380. 5. [*Ascia*] (1857) et F. A., I. 321. [*Ascia*] (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 296. 4. [*Ascia*] (1861); VERR., Entom. Monthly Mag., IX. 251. [*Ascia*] (1873).

geniculata MEIG., S. B., III. 192. 10. [*Ascia*] (1822); ZETT., Ins. Lapp., 583. 7. [*Ascia*] (1838) et Dipt. Scand., II. 890. 8. (1843) et VIII. 3195. 8. [*Ascia*] (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 296. 6. [*Ascia*] (1861); SCHIX., F. A., I. 322. [*Ascia*] (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 473. 4. [*Ascia*] (1901). Europa.

hustata MEIG. = **floralis** MEIG.

ichneumonea SCHRANK = **podagrica** FABR.

interrupta MEIG., S. B., III. 190. 7. [*Ascia*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 170. (22). 6. [*Ascia*] (1827) et Suit. à Buff., I. 575. 7. [*Ascia*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 888. 5. (1843), VIII. 3195. 5. (1849), XI. 4309. 5. (1852) et XII. 4676. 5. [*Ascia*] (1855); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 173. 3. [*Ascia*] (1847); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 380. 7. [*Ascia*] (1857) et F. A., I. 322. [*Ascia*] (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 296. 5. [*Ascia*] (1861). Europa.

littoralis ZETT. in litt. ap. ZETT.

lanceolata MEIG. = **podagrica** FABR.

maculata MACQ. = **podagrica** FABR.

meticalosa SCOP. ? **dispar** MEIG.

molio HAER. = **podagrica** FABR.

nitidula MEIG. = **floralis** MEIG.

podagrica FABR., Syst. entom., 768. 30. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II. 430. 43. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 299. 77. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 198. 10. [*Merodon*] (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2873. 354. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. lim., III. 457. 118. [*Musca*] (1789); PANZ., Fauna germ., LIN. 16. [*Syrphus*] (1798); LATR., Gen. crust. ins., IV. 331. [*Milesia*] (1809); FALL., Dipt. Succ. Syrph., 13. 11. [*Milesia*] (1816); MEIG., S. B., III. 186. 1. [*Ascia*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 168. (20). 1. t. 1. f. 3. [*Ascia*] (1827) et Suit. à Buff., I. 573. 1. [*Ascia*] (1834); ZETT., Ins. Lapp., 582. 2. [*Ascia*] (1838) et Dipt. Scand., II. 884. 1. [*Ascia*] (1843); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 601. [*Ascia*] (1840); LW., Programm Posen, 27. 1. [*Ascia*] (1840) et Isis, 1840. 566. 1. [*Ascia*] (1840); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1842. 165. [*Ascia*] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 546. [*Ascia*] (1854) et Ins. Brit., I. 303. 1. t. X. f. 17. [*Ascia*] (1851); ROND., Dipt.

Europa.

ital. Prodr., II. 101. 1. [*Ascia*] (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 379. 2. [*Ascia*] (1857) et F. A., I. 321. [*Ascia*] (1862); BOISD., Finnl. Insekt., I. 295. 1. [*Ascia*] (1861); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 133. [*Ascia*] (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 468. I. f. 328—331. [*Ascia*] (1901).

bipunctata CURR., Guide, sec. edit., 250. 2. *b.* [*Ascia*] (1837).

clarata SCOP., Entom. carn., 357. 970. [*Onops*] (1763).

crassipes SCHRANK, Enum. Ins., 450. 913. [*Masca*] (1781) et Fauna boica, III. 108. 2415. [*Masca*] (1803).

elongata SCHRANK, Fauna boica, III. 108. 2414. [*Masca*] (1803).
ichuamouca SCHRANK (*var. L.*), Enum. ins., 449. 911. [*Masca*] (1781).

lancolata MEIG., S. B., III. 187. 2. [*Ascia*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 168. (20). 2. [*Ascia*] (1827) et Suit. à Buff., I. 574. 2. [*Ascia*] (1834); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1842. 165. [*Ascia*] (1842); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 380. 3. [*Ascia*] (1857) et F. A., I. 321. [*Ascia*] (1862).

maculata MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 169. (21). 3. [*Ascia*] (1827) et Suit. à Buff., I. 574. 3. [*Ascia*] (1834); MEIG., S. B., VII. 108. 11. [*Ascia*] (1838).

molio HARR., Expos. engl. Ins., 111. t. XXXIII. f. 54. [*Masca*] (1776).

temur HARR., Expos. engl. Ins., 112. t. XXXIII. f. 59. [*Masca*] (1776).

unifasciata STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 222. [*Ascia*] (1898).

quadripunctata MEIG. **floralis** MEIG.

temur HARR. **podagrica** FABR.

unifasciata STROBL **podagrica** FABR.

Brachyopa

MEIG., S. B., III. 260. CVIII. (1822).

arcuata PANZ., Fauna germ., LX. 15. [*Masca*] (1798); MEIG., S. B., III. 262. 3. (1822); ROSS., Dipt. ital. Prodr., II. 170. 2. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 370. 7. (1857) et F. A., I. 327. (1862). Europa centr.

bicolor FALL., Dipt. Suec. Syrph., 33. 2. [*Rhingiä*] (1817); MEIG., S. B., III. 262. 2. t. XXX. f. 6. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 260. (112). t. II. f. 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 531. 2. t. XII. f. 7. (1834); v. ROS., Württemb. Corrb., 1831. 10. (1834); LW., Programm Posen, 30. 1. (1840) et Isis, 563. 1. (1840); WESW., Introd., II. 559. (1840); ZETT., Dipt. Scand., II. 699. 5. (1843) et XIII. 5987. 5. (1859); DCF., Annal. Soc. entom. France, (2). IV. XLVII. (1846) et Annal. Sci. Nat., (3). IX. 199. f. (1848); WALK., Ins. Brit., I. 277. 1. (1857); ROSS., Dipt. ital. Prodr., II. 170. 1.

- (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 377. 6. (1857) et F. A., I. 327. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 230. 4. (1861); VEER., Brit. Fl., VIII. 475. 1. f. 333—335. (1901).
scutellata ROB.-DESV., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 39. (1844).
cinerea WAHLB., Öfv. vet. Akad. Förhandl., I. 65. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3126. 5—6. (1849). Scandinavia.
dorsata ZETT., Ins. Lapp., 597. 3. (1838) et Dipt. Scand., II. 689. 4. (1843); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 229. 3. (1861); SCHN., F. A., I. 327. (1862). Europa centr. et sept.
scutellaris ROB.-DESV. = **bicolor** FALL.

Hammerschmidtia

SCHUMM., Isis, 1834. 740. (1834).

Eugeniamyia WILL., Can. Entom., XIV. 80. (1882).

Erochila ROSSD., Dipt. ital. Prodr., II. 170. *nota*. [*Exocheila*] (1857 *nee* 1868!).

- conica** PANZ., Fauna germ., LX. 20. [*Musca*] (1798); MEIG., S. B., III. 261. 1. [*Brachyopa*] (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 530. 1. [*Brachyopa*] (1834); WALK., Ins. Brit., I. 278. 2. t. X. f. 8. [*Brachyopa*] (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 376. 2. [*Brachyopa*] (1857) et F. A., I. 327. [*Brachyopa*] (1862); JÄENN., Ber. Offenb. Ver. f. Naturk., 1868. 40. *nota*. [*Brachyopa*] (1868). Europa.
testacea PANZ., Fauna germ., LX. 14. [*Musca*] (1798); FALL., Dipt. Succ. Syrph., 34. 4. [*Rhingiä*] (1817); ZETT., Ins. Lapp., 597. 2. [*Brachyopa*] (1838) et Dipt. Scand., II. 688. 3. [*Brachyopa*] (1843); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 229. 2. [*Brachyopa*] (1861); STROBL, Progr. Seitenst., XIV. 16. [*Brachyopa*] (1880).
ferruginea FALL., Dipt. Succ. Syrph., 34. 3. [*Rhingiä*] (1817); MEIG., S. B., III. 263. 4. [*Brachyopa*] (1822); ZETT., Ins. Lapp., 596. 1. [*Brachyopa*] (1858) et Dipt. Scand., II. 686. 1. [*Brachyopa*] (1843); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 376. 1. [*Brachyopa*] (1857) et F. A., I. 327. [*Brachyopa*] (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 229. 1. [*Brachyopa*] (1861); WILL., Syn. N. A. Syrph., 131. t. V. f. 4. [*Eugeniamyia*] (1886); v. ROSSD., Zeitschr. Entom. Breslau, (N. F.) XIII. 2. (1888). Europa.
rafa WILL., Can. Entom., XIV. 80. [*Eugeniamyia*] (1882).
vittata SCHUMM., Isis, 1834. 740. (1834).
rafa WILL. = **ferruginea** FALL.
testacea PANZ. = **conica** PANZ.
vittata SCHUMM. = **ferruginea** FALL.
vittata ZETT. (*nee* SCHUMM. 1834), Dipt. Scand., II. 687. 2. [*Brachyopa*] (1843). Scandinavia.

Rhingia

Scop., Entom. carn., 358. (1763).

- austriaca** MEIG., S. B., VI. 351. 3. (1830); SCHUS., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 376. 3. (1857) et F. A., I. 326. (1862); BEZZI, Atti Soc. ven. trent. Sci. Nat., (2), I. 73. 2. (*isep.*) (1893); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 182. (1893). Europa centr.
- campestris** MEIG., S. B., III. 259. 2. t. XXIX. f. 27. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 263. (115). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 529. 2. (1834); CURT., Brit. Entom., 182. (1830); ZETT., Dipt. Scand., II. 685. 2. (1843), VIII. 3124. 2. (1849) et XIII. 5086. 2. (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 570. (1849); RONDI., Dipt. ital. Prodr., II. 172. 1. [*Rhynqia*] (1857); SCHUS., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 375. 2. (1857) et F. A., I. 326. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 183. (1893); VERR., Brit. Fl., VIII. 479. 2. f. 336—337. (1901). Europa.
- laevigata** Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 107. 10. (1858). Japonia.
- macrocephala* HARR. — **rostrata** L.
- nasata* HARR. **rostrata** L.
- rostrata** L., Syst. Nat., X. 604. [*Conops*] (1758), XII. II. 1004. 1. [*Conops*] (1767); REAUM., Mém. Ins., IV. t. XVI. f. 10. 41. [] (1738); SCOP., Entom. carn., 358. 972. (1763); DEG., Ins., VI. 129. 19. t. VII. f. 21—23. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI. 57. 19. [*Musca*] (1782); GEOFFR., Hist. ins., II. 541. 3. [—] (1764); SCHRANK, Enum. ins., 484. 989. [*Conops*] (1781) et Fauna boica, III. 156. 2538. (1803); FABR., Syst. entom., 791. I. (1775), Spec. ins., II. 460. I. (1781), Entom. syst., IV. 374. I. (1794) et Syst. Antl., 222. I. (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2892. 8. [*Stomoxys*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 576. 1. [*Conops*] (1789); ROSSI, Fauna etr., II. 323. 1553. (1790); LATR., Dict. Hist. nat. Détérv., XXIV. 193. 561. (1804), Hist. nat. crust. ins., XIV. 352. (1804) et Gen. crust. ins., IV. 320. (1809); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 74. t. XVIII. (1803); PANZ., Fauna germ., LXXXVII. 22 (1805); HALLG., Fauna etr. Rossi, II. 490. 1553. (1807); FALL., Dipt. Succ. Syrph., 33. I. (1817); MEIG., S. B., III. 258. 1. (1822); DUMER., Cons. gén., t. XLVII. f. 7. (1823); ? Dict. pict. Hist. nat., VII. 481. t. 640. f. 2. (?) ; MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 262. (114). 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 529. 1. t. XII. f. 5. (1834); CURT., Brit. entom., 182. (1836); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 599. (1840); WESTW., Introd., II. 559. (1840); ZETT., Dipt. Scand., II. 684. 1. (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 570. (1849) et Ins. Brit., I. 279. 1. t. X. f. 9. (1851); RONDI., Dipt. ital. Prodr., II. 172. 2. (1857); SCHUS., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 374. 1. (1857) et F. A., I. 326. (1862); MEIN., Trophi Dipt., t. V. f. 10 + 20. (1881); APOLLON, N. A. Leop. Carol. Akad., XLVII. t. XXV. f. 5. (1885); MUR., Dipt. Herust., 67. (1885); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 182. (1893); VERR., Brit. Fl., VIII. 478. 1. (1901).

macrocephala HARR., Expos. engl. Ins., 82, t. XXIV, f. 27.
[*Musca*] (1776).

notata HARR., Expos. engl. Ins., 105, t. XXXII, f. 35. [*Musca*]
(1776).

Volucellinae.

Volucella

GEOFFR., Hist. ins., II, 540. (1764).

Aemnicera BIG., Bull. Soc. entom. France, (6), II, XII. (1882).

Campania GIGLIO-TOS, Bull. Mus. Torino, VI, (117). (1892).

Cenogaster DUMÉR., Zool. analyt., 282. (1806).

Ornidia ST. FARG. SERV., Encycl. méth., X, 786. (1825).

Pterocera MEIG., Illig. Mag., II, 274. (1803), *nee* LAM. 1799. MOLL.

Temnocera ST. FARG. SERV., Encycl. méth., X, 786. (1825).

aluterrina ROND. - **bombylans** L.

alpicola ROND. - **bombylans** L.

alpina STROBL. - **bombylans** L.

analis MACQ. - **liquida** ER.

annulata HARR. - **inanis** L.

apiaria SCHRANK - **bombylans** L.

apicora DEG. - **inanis** L.

bifasciata SCOP. - **zonaria** PODA.

bombylans L., Syst. Nat., X, 591. [*Musca*], XII, II, 983, 25. [*Musca*] Europa,
(1767) et Fauna suec., 1792. [*Musca*] (1761); SCOP., Entom. carn., Caucasus.
353, 955. [*Comops*] (1763); O. F. MULL., Fauna Fridrichsd., 710.
[*Musca*] (1764) et Zool. Dan. Prodr., 2090. [*Musca*] (1776):
SCHAEFF, Icon., t. X, f. 7. | -| (1766); FABR., Syst. entom., 762.
1. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II, 421, 1. [*Syrphus*] (1781),
Entom. syst., IV, 279, 4. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 224, 4.
[*Syrphus*] (1805); HARR., Expos. engl. Ins., 40, t. X, f. 3. [*Musca*]
(1776); GMEL., Syst. Nat., V, 2867, 25. [*Musca*] (1788); VILL.,
Entom. linn., III, 429, 66, t. IX, f. 15. [*Musca*] (1789); PANZ.,
Fauna germ., VIII, 21. [*Syrphus*] (1793); DOXOV., Brit. Ins., V, t.
151, f. 4. (1796) et XIV, t. 471, f. 15. [*Musca*] (1810); CEDERH.,
Faunae ingr. Prodr., 301, 946. [*Syrphus*] (1798); DWIG., Primitiae
faunae Mosqu., 177, 660. [*Musca*] (1802); SCHRANK, Fauna boica,
III, 127, 2473. (1803); LATR., Gen. crust. ins., IV, 322. (1809);
FALL., Dipt. Suec. Syrph., 18, 3. [*Syrphus*] (1817); MEIG., S. B.,
III, 402, 1. (1822); ST. FARG. SERV., Encycl. méth., X, 785. (1825);
MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827, 3, 6. (188), 1. (1827) et Suit. à Buff.,
I, 493, 3, t. XI, f. 9. (1834); GRER., Icon. règne anim. Ins., t.
XCIX, f. 1. (1829); ZETT., Ins. Lapp., 591, 3. (1838) et Dipt. Scand.,

II. 650. 3. (1843); BOIE, Kröjers Tidsskr., (I). II. 237. (1838); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 597. (1840); ZELL., Stettin. entom. Zeitzg., III. 65. (1842); ERICHs., Stettin. entom. Zeitzg., III. 113. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 634. (1849) et Ins. Brit., f. 261. 4. (1851); RONd., Dipt. ital. Prodr., II. 31. 5. (1857); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 384. 1. (1857) et F. A., I. 329. (1862); BOHSD., Finnl. Insekt., I. 217. 3. (1861); ORMIEROD, Entom. Monthly Mag., X. 196. f. 1—7. (1874); KÜSCKEL, Recherches, t. V. (1875); PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 166. (1877); BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 79. (1883); ADOLF. N. Acta Leop. Carol. Akad., XLVII. t. XXV. f. 4. (1885); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 183. (1893); VERR., Brit. Fl., VIII. 483. 1. f. 339. (1901).

abalterina RONd., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 128. (1865); BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 79. (1883).

alpicola RONd., Dipt. ital. Prodr., II. 32. 7. (1857); BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 80. (1883).

alpina STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 183. (*sine nomine*) (1893), Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hereceg., X. 437. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hereceg., VII. 592. (1900).

apiaria SCHRANK (*ae* FABR.), Fauna boica, III. 128. 2475. (1803).

caucasica PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 167. f. III. f. 7. (1877).

erecta WALK., Dipt. Saunders., III. 251. (1852); BIG., Annal. Soc. Entom. France, (6). III. 85. (1883); WILL., Syn. N. A. Syrph., 136. t. VI. f. 6. (1886); TYL.-TOWNS., Trans. am. entom. Soc., XXII. 42. (1895); CHAGNON, Nat. Can., 1901. 47. (1901).

facialis WILL., Proc. am. Phil. Soc., XX. 316. (1882) et Syn. N. A. Syrph., 137. (1886).

heterorrhoidalis ZETT., Ins. Lapp., 591. 2. (1838) et Dipt. Scand., II. 649. 2. (1843); BOHSD., Finnl. Insekt., I. 217. 2. (1861).

hybrida RONd., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 127. (1865); BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 79. (1883).

investiosa RONd., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 128. (1865); BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 80. (1883).

melanopyrrha FORST., Novae sp. insect., Cent. I. 98. [*Masca*] (1781).

mustacea L., Syst. Nat., X. 591. (1758), XII. II. 983. 26. [*Masca*] (1757) et Fauna Suec., 1793. [*Masca*] (1761); O. F. MULL., Fauna Fridrichsd., 711. [*Masca*] (1764); FABR., Syst. Entom., 762. 2. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II. 421. 2. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 279. 5. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 224. 5. [*Syrphus*] (1805); HAIR., Expos. engl. Ins., 39. t. X. f. 1. [*Masca*] (1776); GILL., Syst. Nat., V. 2867. 26. [*Masca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 439. 67. [*Masca*] (1789); PANZ., Fauna germ., VIII. 22. [*Syrphus*] (1793); CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 302. 947. [*Syrphus*] (1798); SCHILL., Genr. Monch. Dipt., 50. t. VIII. f. 1. [*Syrphus*] (1803); SCHRANK, Fauna

boica, III. 128. 2474. (1803); DUMER., Cours, g n., t. 4. f. 11. [*Conogaster*] (1823); LATR., Cuv. R gne anim., V. 491. (1825); ROXD., Dipt. ital. Prodr., II. 31. 6. (1857); BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 80. (1883).

pennata Scop., Entom. carn., 353. 956. [*Conops*] (1763).

plumata DEG., Ins., VI. 131. 5. t. VIII. f. 4—9. [*Musca*] (1776) et ed G tze, VI. 58. 5. [*Musca*] (1782); VILL., Entom. linn., III. 430. 68. [*Musca*] (1786); LATR., Gen. crust. ins., IV. 322. (1809); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 17. 2. [*Syrphus*] (1816); MEIG., S. B., III. 403. 2. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 337. (189). 2. (1827) et Suit.   Buff., I. 494. (1834); ZETT., Vns. Lapp., 590. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 648. 1. (1843), VIII. 3110. 1. (1849), XII. 4649. 1. (1855) et XIII. 5077. 1. (1859); ZELL., Stettin. entom. Zeitg., III. 65. (1842); ERICHs., Stettin. entom. Zeitg., III. 113. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 634. (1849); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 217. 1. (1861).

plumosa GMEL., Syst. Nat., V. 2877. 333. [*Musca*] (1788).

popopygus Poda, Ins. Mus. Graec., 118. 4. [*Conops*] (1761); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 405. 4. (1856).

proxima ROXD., Dipt. ital. Prodr., II. 32. 8. (1857); BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 80. (1883).

sanguinea WILL., Syn. N. A. Syrph., 136. (*var. cecata*) (1886).

sonora O. F. M LL., Zool. Dan. Prodr., 2094. [*Musca*] (1776).

spuria ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 128. (1865); BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 79. (1883).

tricolor Poda, Ins. Mus. Graec., 118. 1. [*Conops*] (1761); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 404. 1. (1856).

variabilis MALM., Kongl. Vet. Handl., 1863. 13. (1863).

calpina MEIG., S. B., VI. 355. 7. (1830); BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 79. (1883).

cautholeuca MIK., Wien. entom. Zeitg., VI. 265. 41. (1887).

brevipila PORTSCH., Hof. Soc. entom. Ross., XXI. 5. (1886).

Siberia.

caucasica PORTSCH. **bombylans** L.

argophila ROXD. **inflata** FABR.

dryophila Scop. **pellucens** L.

dryophila SCHRANK **inflata** FABR.

elegans LW., Wsch. entom. Monatschr., VI. 294. 1. (1862).

Hispania.

cecata WALK. **bombylans** L.

facialis WILL. = **bombylans** L.

fera HARR. **pellucens** L.

haemorrhoidalis ZETT. **bombylans** L.

Hochhuthii GIMM. **inflata** FABR.

hybrida ROXD. **bombylans** L.

ivanicus FABR. **zonaria** Poda.

inanis L., Syst. Nat., X. 595. [*Musca*] (1758), XII. II. 989. 61. [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1825. [*Musca*] (1761); SCHAEFF., Icon. ins., t. XXXVI. f. 7—8. [—] (1766); FABR., Syst. entom., 773. 3. [*Musca*] Europa.

(1775) et Spec. ins., II. 435. 1. [*Musca*] (1781); GMELL., Syst. Nat., V. 237. 61. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 465. 144. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etr., II. 298. 1486. [*Musca*] (1790); PANZ., Fauna germ., II. 6. [*Syrphus*] (1795); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 459. 1486. [*Musca*] (1807); LATR., Hist. nat. Crust. ins., XIV. 366. 2. (1864), Gen. crust. ins., IV. 322. (1869) et Cuv. Règne anim., V. 491. (1825); DONOV., Brit. Ins., XIV. 59. t. 490. f. 1. [*Musca*] (1810); FALL., Dipt. Succ. Syrph., 19. 6. [*Syrphus*] (1816); SAM., Entom. Compend., 71. t. IX. f. 3. [*Musca*] (1819); MEIG., S. B., III. 407. 6. (1822); ST. FARG. SERV., Encycl. méth., X. 334 et 785. (1825); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 341. (293). 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 492. (*var. zonariæ*) (1834); CURT., Brit. entom., 452. (1838); SCHMIDT, Stettin. entom. Zeitg., III. 20. (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 652. 5. (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 635. (1849) et Ins. Brit., I. 261. 1. (1851); ROSD., Dipt. ital. Prodr., II. 28. 1. (1857); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 387. 5. (1857) et F. A., I. 330. (1862); DISCONZI, Entom. vicent., 220. 4. t. 255. (1865); KÜCK., Recherches, t. IV. (1875); ERNÉ, Mittheil. schweiz. entom. Ges., IV. 561. (1876); BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 75. (1883); VERR., Brit. Fl., VIII. 486. 2. (1901).

annulata HARR., Expos. engl. Ins., 40. t. X. f. 4. [*Musca*] (1776).

apivora DEG., Ins., VI. 56. 3. t. III. f. 4. [*Musca*] (1776) et ed.

Götze, VI. 28. 3. [*Musca*] (1782); VILL., Entom. linn., III. 480. 176. [*Musca*] (1789).

micans FABR., Entom. syst., IV. 278. 2. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 224. 2. [*Syrphus*] (1805).

trifasciata Scop., Entom. carn., 352. 953. [*Conops*] (1763); SCHRANK, Emm. ins., 453. 919. [*Musca*] (1781); VILL., Entom. linn., III. 483. 188. [*Musca*] (1789).

incestivosa ROSS. = **bombylans** L.

inflata FABR., Entom. syst., IV. 280. 8. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 226. 8. [*Syrphus*] (1805); MEIG., S. B., III. 405. 4. t. XXXII. f. 28. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 339. (191). 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 493. (*pellucens* var.) (1834); CURT., Brit. entom., 452. (1836); LW., Programm Posen, 38. 4. (1840) et Isis, 1840. 574. 4. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 635. (1849) et Ins. Brit., I. 261. 3. (1851); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 388. 6. (1857) et F. A., I. 329. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 488. 3. (1901).

dryaphila ROSS. (*acc* Scop.), Dipt. ital. Prodr., II. 29. 3. (1857).

dryophila SCHRANK, Fauna boica, III. 129. 2476. (1803); BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 73. (1883).

Hochbathii GÜMM., Programm Riga, 10. (1817) et Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (5). 177. 2. (1847).

pellucens ROSSI (*acc* L.), Fauna etr., II. 299. 1487. [*Musca*] (1790); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 460. 1487. [*Musca*] (1807).

tabanoides MEISCH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXXII. (2). 504. (1859).

Europa centr.
et mer.,
Sibiria.

- japonica** BIG., Annal. Soc. entom. France, (5). V. 473. 2. (1875) et Japonia.
(6). III. 72. (1883).
- jeddona** BIG., Annal. Soc. entom. France, (5). V. 472. 1. (1875) et Japonia.
(6). III. 70. (1883).
- liquida** ERICHS., Reis. Alg. Wagner, III. 194. (1841); Macq., Luc. Africa sept.
Explor. Alg. Zool., III. 464. 150. (1849); Lw., Diptf. Südafr., (359).
287. 20. (1860); BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 71. (1883).
andis Macq., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 81. (23). 4. t. IV. f. 3.
(1842).
- melanopyrrha* FORST. — **bombylans** L.
- micans* FABR. = **inanis** L.
- mystacea* L. — **bombylans** L.
- nigricans** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 324. (1898). Japonia.
- nigropicta** PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVIII. 127. (1883). Sibiria.
- pellucens** L., Syst. Nat., X. 595. [*Musca*] (1758), XII. II. 989. 62. Europa.
[*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1826. [*Musca*] (1761); GEOFFR., Japonia.
Hist. ins., II. 540. 1. [—] (1764); FABR., Syst. entom., 773. 2.
[*Musca*] (1775), Spec. ins., II. 435. 2. [*Musca*] (1781), Mant. ins.,
II. 342. 2. [*Musca*] (1787), Entom. syst., IV. 279. 3. [*Syrphus*]
(1794) et Syst. Antl., 224. 3. [*Syrphus*] (1805); DEG., Ins., VI. 53.
1. t. III. f. 1—3. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI. 27. 1. [*Musca*]
(1782); SCHRANK, Enum. ins., 453. 920. [*Musca*] (1781) et Fauna
boica, III. 131. 2481. (1803); GMEL., Syst. Nat., V. 2838. 62.
[*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 432. 72 et 466. 145. t.
IX. f. 28. [*Musca*] (1789); CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 301. 945.
[*Syrphus*] (1798); PANZ., Fauna germ., I. 17. [*Syrphus*] (1793);
HERBST, Gem. Natursyst., VIII. t. 340. f. 4. [*Musca*] (1799); DWIG.,
Primitiae faunae Mosqu., 175. 633. [*Musca*] (1802); LATR., Gen.
crust. ins., IV. 322. (1809); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 19. 5. [*Syrphus*]
(1816); MEG., S. B., III. 404. 3. (1822); Macq., Soc. Sci.
Lille, 1827. 338. (190). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 493. 2. (1834);
ZETT., Ins. Lapp., 591. 4. (1838) et Dipt. Scand., II. 651. 4. (1843)
et XIII. 5078. 4. (1859); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. XX.
(3). 176. 1. (1847); BOH., Entom. Arsberätt., 52. (1849); WALK,
List Dipt. Brit. Mus., III. 634. (1849) et Ins. Brit., I. 261. 2. (1851);
HAL., Stettin. entom. Zeitg., XII. 140. (1851); ROSS., Dipt. ital.
Prodr., II. 29. 4. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien. VII.
389. 7. (1857) et F. A., I. 329. (1862); BOSSD., Fiml. Insekt., I.
218. 4. (1861); STONE, Trans. entom. Soc. London, (3). I. Proc.
77. (1862); GERSTFELDT, Mundth. saug. Ins., t. I. f. 4—7. (1853);
KÜNCKEL, Recherches, t. IV. (1875); SIEBKE, Enum. Ins. Norveg.,
IV. 51. 4. (1877); BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 72.
(1883); VEER., Brit. Fl., VIII. 490. 4. f. 338—340. (1901).
dryaphila Scop., Entom. carn., 353. 957. [*Couops*] (1763).
fera HARR., Expos. engl. Ins., 39. t. X. f. 2. [*Musca*] (1776).
patescens SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., t. VIII. f. 2. [*Syrphus*]
(1803).

- pellucens* ROSSI = *inflata* FABR.
pennata SCOP. = *bombylans* L.
plumata DEG. = *bombylans* L.
plumosa GMEL. = *bombylans* L.
poecopygus PODA = *bombylans* L.
proxima ROND. = *bombylans* L.
pulescens SCHELL. = *pellucens* L.
sanguinea WILL. = *bombylans* L.
sonora O. F. MÜLL. = *bombylans* L.
spuria ROND. = *bombylans* L.
tabanoïdes MOTSCH. = *inflata* FABR.
tricolor PODA = *bombylans* L.
trifasciata SCOP. = *inanis* L.
valentina O. F. MÜLL. = *zonaria* PODA.
variabilis MALM = *bombylans* L.
vulpina MEIG. = *bombylans* L.
xantholeuca MIK. = *bombylans* L.

zonaria PODA, *Ins. Mus. Graec.*, 118, 3. [*Conops*] (1761); REAUM., *Mém. ins.*, VI, t. XXXIII, f. 15. | | (1742); SCHAEFF., *Icon. ins.*, t. LXXX, f. 1. |—| (1766); SCHRANK, *Enum. ins.*, 454, 921. [*Musca*] (1781); VILL., *Entom. linn.*, III, 483, 189, t. IX, f. 30. [*Musca*] (1789); MEIG., *S. B.*, III, 406, 5. (1822); MACQ., *Soc. Sci. Lille*, 1827, 340, (192), 5, t. IV, f. 2. (1827) et *Suit. à Buff.*, I, 492, 1. (1834); ZETT., *Dipt. Scand.*, II, 653. *nota.* (1843); SCHMIDT, *Stettin. entom. Zeitg.*, III, 18. (1842); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, III, 635. (1849); SEMN., *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, VI, 404, 3. (1856), VII, 386, 4. (1857) et *F. A.*, I, 330. (1862); KÜCKEREL, *Recherches*, t. III. (1875); ERSE, *Mittheil. schweiz. entom. Ges.*, IV, 561. (1876); BIG., *Annal. Soc. entom. France*, (6), III, 77. (1883).

bifasciata SCOP., *Entom. carn.*, 351, 952. [*Conops*] (1763); CYRILL., *Entom. neapol. spec. prim.*, t. X, f. 5. [*Syrphus*] (1787); PANZ., *Fauna germ.*, II, 8. [*Syrphus*] (1793); ILLIG., *Fauna etc. Rossi*, II, 459, II. [*Syrphus*] (1807); ROND., *Dipt. ital. Prodr.*, II, 28, 2. (1857).

fasciata VERR., *Cat. europ. Syrph.*, 76. (1900).

inanis FABR. (*ovæ* L.), *Entom. syst.*, IV, 278, 1. [*Syrphus*] (1794) et *Syst. Antl.*, 223, 1. [*Syrphus*] (1805); PAVONA, *Spec. ins., ult. Calabriae*, 43, 226. [*Musca*] (1786) et *edit.* II, 43, 226. [*Musca*] (1888); CEDERH., *Faunae ingr. Prodr.*, 301, 944. [*Syrphus*] (1798); DEMÉR., *Cons. gen.*, t. I, f. 12—13. [*Cenogaster*] (1823).

valentina O. F. MÜLL., *ap. ALL., Manip. ins. taurin. in Mém. soc. royal. Turin*, III, 198. [*Musca*] (1766); GIORNA, *Calendario entom. Torino*, 109. [*Musca*] (1791); LESSONA, *Annal. Acc. Agricolt. Torino*, XVI, 59. (*scop.*) (1873).

Europa centr.
et mer.

Eristalinae.

Eristalis

LATR., Hist. Nat. Crust. Ins., III. (1802) et XIV. 363. (1804).

Syrphus ZETT., Ins. Lapp., 591. 52. (1838).

A. *Megaspis*

MACQ., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 85. (27). 13. (1842); LW., Diptf. Südafr., 318. (390). (1860).

Pachycephalus WIED., AUSSER. zweifl. Ins., II. 152. *nota*. (1830).

cingulatus VOLLENH., Medd. Akad. Vet., XV. 5. 5. (1862). Japonia.

flavofasciatus MACQ. = **zonalis** WIED.

? **viridis** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 326. [*Eristalis*] (1898). Japonia.

zonalis FABR., Entom. syst., IV. 294. 57. [*Syrphus*] (1794) et Syst. China sept.,

Antl., 242. 43. [*Eristalis*] (1805); WIED., AUSSER. zweifl. Ins., II. Japonia.

152. 2. (1830); MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 106. (86). 2. (1855);

SCHN., Novara Dipt., 364. 86. (1868); WULF, Midd. Sumatra, 30.

1. (1881); OST-SACK., Annal. Mus. civ. Genova, XVI. 441. (1881);

MEL., Bijdr. Dierk. Nat. Art. mag., 17 et 18. 100. (1904).

flavofasciatus MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 440. (136). 59. [*Eristalis*] (1850).

zonatus FABR., Mant. ins., II. 337. 37. [*Eristalis*] (1787).

zonatus FABR. = **zonalis** FABR. ★

B. *Simoides*

LW., Öfv. vet. Akad. Förh., XIV. 382. 14. (1837) et Diptf. Südafr., (390). 318. (1860).

expletus LW., Öfv. vet. Akad. Förh., XIV. 382. 37. (1857) et Diptf. Nubia.

Südafr., (394). 322. *nota*. (1860).

villipes LW., Öfv. vet. Akad. Förh., XIV. 382. 38. (1857) et Diptf. Nubia.

Südafr., (395). 323. *nota*. (1860).

C. *Eristalinus*

ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 40. III. (1857).

ater HARR. = **sepulchralis** L.

interpunctus HARR. = **sepulchralis** L.

sepulchralis L., ? Syst. Nat., X. 596. [*Musca*] (1758), XII. II. 991. 73. Europa.

[*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1835. [*Musca*] (1761); FABR., Syst.

entom., 772. 49. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II. 431. 51. [*Syrphus*]

(1781), Entom. syst., IV. 303. 91. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl.,

245. 61. (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2878. 73. [*Musca*] (1788);

VILL., Entom. linn., III. 473. 156. [*Musca*] (1789); LATR., Gen.

crust. ins., IV. 324. [*Elophilus*] (1804); MEIG., S. B., III. 383. 1.

(1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 308. (160). I. t. III. f. 6. (1827)

et Suit. à Buff., I. 506. 17. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 670. 16. [*Syrphus*] (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 609. (1849) et Ins. Brit., I. 244. 5. (1851); ROSD., Dipt. ital. Prodr., II. 40. 12. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 398. 21. (1857) et F. A., I. 333. (1862); WULP., Mém. Soc. entom. Pays-Bas., I. 18. t. I. f. 1. 2. (1857); BOSSD., Faun. Insekt., I. 224. 11. [*Syrphus*] (1861); GÜRSCHN., Berlin. entom. Zeitschr., XXXI. t. III. f. II. (1887); STROBL., Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hereceg., X. 437. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hereceg., VII. 592. (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 498. I. f. 345—347. (1901).

ater HARR., Expos. engl. Ins., 58. t. XV. f. 11. [*Musca*] (1776).

interpunctus HARR., Expos. engl. Ins., 59. t. XV. f. 13. [*Musca*] (1776).

tristis FABR., Entom. syst., IV. 303. 92. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 245. 62. (1805); STURM, Verzeichn. Ins. Samml., 64. 42. t. IV. f. 10. [*Syrphus*] (1796); PANZ., Fauna germ., LXXXII. 16. [*Syrphus*] (1801); LATR., Hist. nat. crust. Ins., XIV. 364. 4. (1804); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 29. 23. [*Syrphus*] (1817).

tarsalis MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 107. (87). 68. (1855).

China sept.

tristis FABR. = **sepulchralis** L.

D. *Lathyrrophthalmus*

MÜK, Wien. entom. Zeitzg., XVI. 114. (1897).

acnescens MACQ. = ? **aeneus** SCOP.

aeneus SCOP., Entom. carn., 356. 967. [*Conops*] (1763); VILL., Entom. linn., III. 522. 287. [*Musca*] (1789); FABR., Entom. syst., IV. 302. 88. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 244. 57. (1805); PANZ., Fauna germ., LXXXII. 15. [*Syrphus*] (1801); LATR., Gen. crust. Ins., IV. 324 et 332. [*Elophilus* et *Milesia*] (1809); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 28. 22. [*Syrphus*] (1817); MEIG., S. B., III. 384. 2. (1822) et VII. 143. (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 309. (161). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 506. 16. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 668. 14. [*Syrphus*] (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 610. (1849) et Ins. Brit., I. 244. 4. (1851); ROSD., Dipt. ital. Prodr., II. 40. 11. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 390. 19. (1857) et F. A., I. 333. (1862); PALMA, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 43. 28. (1864); WILL., Syn. N. A. Syrph., 161. (1886); VERR., Trans. entom. Soc. London, 1898. 415. 7. (1898) et Brit. Fl., VIII. 501. 2. f. 348—349. (1901); HOW., Insect Book, t. XX. f. 14. (1902); BECK., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 83. 118. (1903).

Europa,
Africa sept.,
Ins. Canar.

? *acnescens* MACQ., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 117. (59). 45. (1842).

capricornatus WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 190. 54. (1836).

flavicornis ROSSI (nec FABR.), Fauna otr., II. 290. 1465. [*Syrphus*] (1790); ALLAG., Fauna otr. Rossi, II. 147. 1465. [*Syrphus*] (1807).

- melanius* HARR., Expos. engl. Ins., 53. t. XV. f. 12. [*Musca*] (1776).
- punctatus* O. F. MÜLL., Faun. Fridrichsd., 720. [*Musca*] (1764) et Zool. Dan. Prodr., 2050. [*Musca*] (1776); VILL., Entom. linn., III. 465. 143. [*Musca*] (1789); SCHRANK, Fauna boica, III. 115. 2432. [*Musca*] (1803).
- sincerus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 611. (1849); T. HARR., Insects injur. to Veg., 3 ed., 609. (1862); LW., Sillim. Journ. of Sci. and Arts, XXXVII. 317. (1864).
- stygius* NEWM., Entom. Mag., II. 313. (1830).
- taphicus* WIED., Ausser zweifl. Ins., II. 191. 57. (1830).
- caprovittatus* WIED. = **aeneus** SCOP.
- fasciatus* MEIG. = **quinquelineatus** FABR.
- flavicornis* ROSSI = **aeneus** SCOP.
- megacephalus* ROSSI = **quinquelineatus** FABR.
- melanius* HARR. = **aeneus** SCOP.
- ocularius** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 325. (1898); MUK., Japonia. Wien. entom. Zeitzg., XVIII. 194. (1899).
- punctatus* O. F. MÜLL. = **aeneus** SCOP.
- punctifer* WALK. = **quinquelineatus** FABR.
- quinquefasciatus* SCHIN. = **quinquelineatus** FABR.
- quinquelineatus** FABR., Spec. ins., II. 425. 21. [*Syrphus*] (1781) entom. syst., IV. 290. 42. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 239. 29. (1805); WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 185. 47. (1830); ERICHS., Jahresber., 1847. (1847); LW., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XIV. 382. 40. (1857), Berl. entom. Zeitschr., II. 230. (1858) et Diptf. Südafr., (396). 324. 8. (1860); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 397. 18. (1857) et Novara Dipt., 364. 84. (1868); VERR., Trans. entom. Soc. London, 1898. 415. 9. (1898); BECK., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 82. 116. (1903).
- fasciatus* MEIG., S. B., VII. 143. 22. (1838); GERM., Fauna ins. Europae, XXIII. 23. (1839).
- megacephalus* ROSSI, Mant. ins., II. 63. 532. t. V. f. 4. [*Syrphus*] (1794).
- punctifer* WALK., Entom., V. 274. 55. (1871); VERR., Entom. Monthly Mag., (2). XII. 77. (1901).
- quinquefasciatus* SCHIN., Novara Dipt., 364. (1860); BECK., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 81. (1903).
- ? *quinquestriatus* FABR., Entom. syst., IV. 289. 41. [*Syrphus 5-striatus*] (1794) et Syst. Antl., 245. 60. (1805); WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 187. 50. (1830).
- quinquevittatus* MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 465. 154. t. IV. f. 10. (1849).
- ? *ridens* WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 610. (1849).
- ? *tabanoides* JAENX., Abh. Senkt. Ges., VI. 402. (94). 126. t. II. f. 10. (1867); BECK., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 83. 117. (1903).

quinquestriatus FABR. — ? **quinquelineatus** FABR.
quinquevittatus MACQ. **quinquelineatus** FABR.
rileus WALK. ? **quinquelineatus** FABR.
sincerus HARR. — **aeneus** SCOP.
stygicus NEWM. **aeneus** SCOP.
tabanoïdes JAENS. — ? **quinquelineatus** FABR.
taphicus WIED. **aeneus** SCOP.

E. *Eristalodes*

Mik, Wien. entom. Zeitg., XVI. 114. (1897).

aegyptius WALK. — **taeniops** WIED.
fasciatus LW. — **taeniops** WIED.
pulchricreps MEIG. = **taeniops** WIED.

taeniops WIED., Zool. Mag., II. 42. (1819) et Ausser, zweifl. Ins., Europa mer.,
 182. 43. (1830); LW., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XIV. 382. 39. Africa sept.
 (1857), Berl. entom. Zeitschr., II. 230. (1858) et Dipt. Südafr.,
 (396). 324. 7. (1860); RICARDO, Annal. Mag. N. Hist., VII. (7). 106.
 (1901).

aegyptius WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 621. (1849).

fasciatus LW., Germ. Fauna, 24. 22. (1839). ?

pulchricreps MEIG., S. B., III. 375. 8. [*Helophilus*] (1822); Macq.,
 Suit. à Buff., I. 595. 14. (1834); GERM., Fauna ins. Europae,
 XXII. 22. (1839); LW., Stettin. entom. Zeitg., II. 26. 2. [*Helophilus*]
 (1841); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 40. 10. (1857);
 SEMN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 397. 17. (1857).

taeniopus Mik, Wien. entom. Zeitg., XVI. 114. (1897); GIESCH.,
 III. Wochenschr. Entom., II. 602. (1897).

torridus WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 612. (1849).

taeniopus Mik **taeniops** WIED.

torridus WALK. — **taeniops** WIED.

F. *Eristalomyia*

ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 40. II. [*Eristalomyia*] (1857); Mik, Wien. entom. Zeitg.,
 XVI. 114. (1897).

Eriops LIOV, Atti Istit. Veneto, (3). IX. 743. (1863).

alpinus STROBL. **tenax** L. var.

anthophorinus FALL., Dipt. Succ. Syrph., 28. 21. [*Syrphus*] (1817); Europa cent.
 MEIG., S. B., III. 390. 11. (1822); ZETT., Ins. lapp., 594. 9. [*Syrphus*]
 et sept. (1838) et Dipt. Scand., II. 666. 12. (1843), XIII. 5082. 12.
 [*Syrphus*] (1859); BONSD., Fönnl. Insekt., I. 222. 8. [*Syrphus*] (1861).

apiformis FALL. **oestraceus** L.

arbutorum SCHRANK **tenax** L.

? **auricalceus** ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 129. (1865). Italia

compestris MEIG. **tenax** L. var.

- cryptarum** FABR., Entom. syst., IV. 285. 26. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 235. II. (1805); FALL., Dipt. Succ. Syrph., 29. 24. [*Syrphus*] (1817); MEIG., S. B., III. 389. 9. t. XXXII. f. 22. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 312. (164). 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 505. 13. (1834); ZETT., Ins. Lapp., 594. 8. [*Syrphus*] (1838) et Dipt. Scand., II. 667. 13. [*Syrphus*] (1843); WALK., Ins. Brit., I. 244. 3. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 396. 24. (1857) et F. A., I. 333. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 223. 9. [*Syrphus*] (1861); VERR., Brit. Fl., VIII. 503. 3. (1901).
nubilipennis CURT., Brit. Entom., VIII. 432. (1836).
- fraterculus** ZETT., Ins. Lapp., 592. 2. [*Syrphus*] (1838) et Dipt. Scand., II. 664. 9. [*Syrphus*] (1843)* Scandinavia.
- fuscus* Scop. = **tenax** L.
hortorum MEIG. = **tenax** L. var.
- ? **murorum** FABR., Entom. syst., IV. 288. 35. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 237. 20. (1805); WIED., AUSSER. zweifl. Ins., II. 178. 36. (1830). Africa sept.
- ? **nigrifrons** BRULLÉ, Exped. Morée, III. 320. (1832). Graecia.
nigrifrontis SCHN., Cat. Dipt. Europ., 108. (1864).
- nigrifrontis* SCHN. = **nigrifrons** BRULLÉ.
- Nili** ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (3). II. 166. I. t. IV. f. 1. (1860). Aegyptus.
- nitidiventris** ZETT. (nec. Macq. 1842), Dipt. Scand., II. 665. 10. [*Syrphus*] (1843). Scandinavia.
- nubilipennis* CURT. — **cryptarum** FABR.
- oestraceus** L., Syst. Nat., X. 592. [*Musca*] (1758), XII. II. 985. 34. [*Musca*] (1767) et Fauna succ., 1801. [*Musca*] (1761); KRAMER, Diss. Ins. Dan., 28. [*Musca*] (1760); O. F. MÖLL., Fauna Fridrichsd., 717. [*Musca*] (1764); SCHAEFF., Icon. ins., t. X. f. 6. [—] (1766); FABR., Syst. entom., 766. 18. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II. 426. 23. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 290. 44. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 240. 34. (1805); DEG., Ins., VI. 139. 4. [*Musca*] (1776); GMEL., Syst. Nat., V. 2871. 34. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 437. 83. [*Musca*] (1788); HERBST, Gem. Naturg., VIII. 106. t. 340. f. 2. [*Musca*] (1799); HAL., Stettin. entom. Zeitg., XII. 139. (1851).
apiformis FALL., Dipt. Succ. Syrph., 28. 20. [*Syrphus*] (1817); MEIG., S. B., III. 390. 10. (1822); ZETT., Dipt. Scand., II. 665. 11. (1843) et XI. 4302. 11. [*Syrphus*] (1852); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 400. 24. (1857) et F. A., I. 333. (1862); PORRSCH., Trudy Russk. Entom., X. 172. t. III. f. 8. (1877).
tricolor MEIG., Ill. Mag., II. 274. [*Hiclophilus*] (1803).

* **fumipennis** STEPH., Ill. Brit. Entom., t. XLVII. f. 3. (1835); WALK., Ins. Brit., I. 243. 2. (1851) et III. XII. (1856); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 392. 3. (1857); VERR., Brit. Fl., VIII. 672. (1901), est species neartica, nempe **hortorum** FABR.

- pilosus** Lw., Berlin, entom. Zeitschr., IX, 174, 70. (1865); WILK., Syn. ?Europa sept.
N. A. Syrph., 174. (1886); VERM., Cat. Europ. Syrph., 80. (1900).
- purciatus** DEG. = **tenax** L.
- silvaticus** MEIG. = **tenax** L. var. **hortorum** MEIG.
- tenax** L., Syst. Nat., X, 591. [*Musca*] (1758), XII, II, 384, 32. [*Musca*] Ubique.
(1767) et Fauna suec., 1799. [*Musca*] (1761); RAU-M., Mém. Ins.,
I, t. II, (1734) et IV, t. XX, f. 8, (1738); SWANMEED., Biblia
Nat., t. XXXVIII, f. 9. [—] (1737); GEORGE, Hist. Ins., II, 520.
52. [—] (1764); O. F. MULL., Fauna Friedrichsd., 716. [*Musca*]
(1764); FABR., Syst. Entom., 765, 15. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins.,
II, 425, 19. [*Syrphus*] (1786), Entom. syst. IV, 288, 36. [*Syrphus*]
(1794) et Syst. Antl., 238, 24. (1805); HAER., Expos. engl. Ins.,
41, t. X, (2), f. 1. [*Musca*] (1776); GMELL., Syst. Nat., V, 2870,
32. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III, 436, 81. [*Musca*]
(1789); ROSSI, Fauna etr., II, 285, 1455. [*Syrphus*] (1790); PANZ.,
Fauna germ., XIV, 23, 24. [*Syrphus*] (1794); CEDERH., Faunae
ingr. Prodr., 303, 952. [*Syrphus*] (1798); SCHRANK, Fauna boica,
III, 113, 2427. [*Musca*] (1803); SCHELL., Genf. Monch. Dipt., 52,
t. IX, f. 1. [*Syrphus*] (1803); LATR., Hist. nat. crust. Ins., XIV,
364, 3. (1804) et Gen. crust. ins., IV, 324. [*Elaphilus*] (1809);
SHAW, Gener. Zool., VI, 389, t. 146. [*Musca*] (1806); DWIG., Primi-
tiviae faunae Mosqu., 178, 665. [*Musca*] (1802); HALG., Fauna
etr. Rossi, II, 441, 1455. [*Syrphus*] (1807); DOXOV., Brit. Ins.,
XVI, 66, t. 574. [*Musca*] (1883); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 26,
17. [*Syrphus*] (1817); MEIG., S. B., III, 385, 4. (1822); MACQ., Soc.
Sci. Lille, 1827, 310. (162), 3, t., III, f. 5. (1827) et Suit. à Buff.,
I, 594, 11. (1834); ZETT., Ins. Lapp., 594, 7. [*Syrphus*] (1838) et
Dipt. Scand., II, 661, 7. (1843), VIII, 3113, 7. (1849), XI, 4301, 7.
(1852), XII, 4651, 7. [*Syrphus*] (1855); WESTW., Introd., II, 559,
f. 131, 7-9. (1840); ERICHS., Entom., t. II, f. E, c, c. (1840);
WALK., List Dipt. Brit. Mus., III, 610. (1849) et Ins. Brit., I, 243,
I, t. IX, f. 5. (1851); RONDI., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (3), II,
t. IV, f. 2. (1850) et Dipt. ital. Prodr., II, 42, 9. (1857); HAL.,
Stettin, entom. Zeitg., XII, 139. (1851); LETZNER, Arb. schles. Ges.,
1856, 117. (1856); FRAENK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI, 439.
(1856); F. MULL., Trans. entom. Soc. London, VI, 336. (1851)
et Entom. Monthly Mag., VIII, 273. (1872); SEMS., Verh. zool.-
bot. Ges. Wien, VII, 390, 1. (1857) et F. A., I, 331. (1862);
BOSSO., Finnl. Insekt., I, 222, 7. [*Syrphus*] (1861); BOWLER.,
Entom., VI, 547. (1872); OSB. SACK., Cat. N. A. Dipt., 2 ed., 249,
228. (1878), Entom. Monthly Mag., XXIII, 97. (1883), Trans. entom.
Soc. London, 1884, 489, 1. (1884), Bull. Soc. entom. ital., XXV,
186. (1893), On the so call. Bug., Heidelberg (1894) et Berlin,
entom. Zeitschr., XI, 112. (1895); BYRALLI, Bull. soc. entom. ital.,
XI, 77, t. I-V. (1879) et Ann. Mag. N. H., (5), III, 94. (1880);
MEISNER, Trophi Dipt., t. V, f. 21. (1881); WILK., Syn. N. A.
Syrph., 160, t. VII, t. 7. (1886); HOSON, Trans. N. Zealand Instit.

- XXII. 187. (1889); RIL. et HOW., *Ins. Life*, II. 262. (1899) et III. 22. (1890); J. B. SMITH, *Trans. am. ent. Soc.*, XXII. 334. t. 18. (1890) et *Trans. am. phil. Soc.*, XIX. t. I. f. 3., t. III. f. 5. 10. (1896); GIEFF., *Bull. Mus. Torino*, VIII. (143) 3. (1893); SMITH, *Entom. Monthly Mag.*, XXVI. 240. (1890); BECKTON, *Nat. Hist. Er. tenax*. (1895); MIALL, *N. H. aquat. Ins.*, 1 ed., 198. (1895) et 2 ed., 198. f. 70—77. (1903); TYL—TOWNS., *Trans. am. entom. Soc.*, XXII. 49. (1895); GIRSCHN., *Ill. Wochenschr. Entom.* II., t. III. f. 17. 18. (1897); WANDOLL., *Zool. Anz.*, 1898. 289. f. 2. (1898); PLATEAU, *Mém. soc. zool. France*, 1900. 283. (1900); MELL., *Entom. Tijdschr.*, XXXVIII. 21. f. 21. (1900) et *Zool. Jahrb.*, XIV. t. VII. f. 39. (1900) et t. XXXV. f. 127—128. (1901) et XV. 678. f. 43. (1902); VERR, *Brit. Fl.*, VIII. 505. 4. f. 350—352. (1901); HUTTON, *Trans. N. Zealand Instit.*, XXXIII. 36. (1900); CHAGNON, *Nat. Can.*, 1901. 51. 1. (1901); W. W. SMITH, *Entom. Monthly Mag.*, (2). XII. 300. (1901); How., *Insect Book*, t. XX. f. 22. (1902); ALDRICH, *Cat. N. A. Dipt.*, 389. (1905).
- arbutorum* SCHREANK (*nec* L.), *Enum. ins.*, 445. 902. [*Musca*] (1781).
fuscus SCOP., *Entom. carn.*, 355. 961. [*Conops*] (1763); VILL., *Entom. linn.*, III. 461. 132. [*Musca*] (1789); SEMS., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, VI. 418. (1856).
porcinus DEG., *Ins.*, VI. 98. 1. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI. 45. 1. [*Musca*] (1782).
silvaticus MEIG., *S. B.*, III. 388. 8. (1822).
vulgaris SCOP., *Entom. carn.*, 354. 960. [*Conops*] (1763).
calpinus MEIG., *S. B.*, III. 388. 7. (1822); SEMS., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, VII. 392. 2. (1857) et *F. A.*, I. 334. (1882).
var. alpinus STROBL (*nec* PANZ.), *Mittheil. Ver. Steierm.*, XXIX. 185. (1893). Alpes.
var. campestris MEIG., *S. B.*, III. 387. 5. (1822); MACQ., *Soc. Sci. Lille*, 1827. 312. (164). 4. (1827) et *Suit. à Buff.*, I. 505. 12. (1834); LW., *Programm Posen*, 38. 4. (1840) et *Isis*, 1840. 574. 4. (1840). Europa.
var. hortorum MEIG., *S. B.*, III. 387. 6. (1822) et VII. 143. 6. (1838). Europa.
ustus WOLL., *Annal. Mag. N. H.*, (3). I. 114. (1858). Madera.
vulgaris SCOP. — **tenax** L.
vulpinus MEIG. — **tenax** L. *var. hortorum* MEIG.

G. *Eristalis* s. str.

- ROSD., *Dipt. ital. Prodr.*, II. 39. 1. (1857); MÜK, *Wien. entom. Zeitg.*, XVI. 114. (1897).
- alpinus** PANZ., *Fauna germ.*, LIX. 14. [*Syrphus*] (1798); MEIG., *S. B.* III. 398. 20. (1822); SEMS., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, VII. 393. 5. (1857) et *F. A.*, I. 336. (1862); STROBL, *Mittheil. Ver. Steierm.*, XXIX. 186. (1893). Europacentr., Alpes.

?*Amsteini* BREM., ap. Ann. Spein, Jahrb. nat. Grenb., II. 101. (1857).

var. caucasicus PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XXVI. 209. Caucasus. t. I. f. 6. (1891).

Amsteini BREM. ? *alpinus* PANZ.

arbustorum L., Syst. Nat., X. 591. [*Musca*] (1758), XII. II. 984. 31. Europa.

[*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1798. [*Musca*] (1761); O. F. MULL., Fauna Fridrichsd., 715. [*Musca*] (1764); FABR., Syst. Entom., 765. 12. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II. 424. 15. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 286. 30. [*Syrphus*] et Syst. Antl., 236. 17. (1805); Gmel., Syst. Nat., V. 2869. 31. [*Musca*] (1788); Vill., Entom. linn., III. 436. 80. [*Musca*] (1789); Rossi, Fauna etr., II. 285. 1454. [*Syrphus*] (1790); Panz., Fauna germ., XIV. 22. [*Syrphus*] (1794); CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 303. 951. [*Syrphus*] (1798); SCHRANK, Fauna boica, III. 113. 2425. [*Musca*] (1803); Illig., Fauna etr. Rossi, II. 440. 1454. [*Syrphus*] (1807); LATR., Gen. crust. Ins., IV. 324. [*Elophilus*] (1809); Fall., Dipt. Suec. Syrph., 25. 15. [*Syrphus*] (1817); Meig., S. B., III. 395. 17. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827, 317. (169). 10. (1827) et Suit. à Buff., I. 503. 7. (1834); Boche, Naturg., I. 54. 37. t. V. f. 14. (1834); Zett., Ins. Lapp., 593. 6. [*Syrphus*] (1838) et Dipt. Scand., II. 659. 5. (1843), XII. 4651. 5. (1855), XIII. 5080. 5. [*Syrphus*] (1859); Blanch., Hist. nat. ins., III. 598. t. IV. f. 1. (1840); Lw., Programm Posen, 38. 9. (1840) et Isis, 1840. 574. 9. (1840); Walk., List. Dipt. Brit. Mus., III. 632. (1849) et Ins. brit., I. 245. 9. (1851); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 39. 6. (1857); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 393. 6. (1857) et F. A., I. 335. (1862); Sundev., Ins. Extrem., t. III. f. 24—25. [*Syrphus*] (1860); Bond., Finl. Insekt., I. 221. 5. [*Syrphus*] (1861); Schenk, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau, VI. 35. (1850); Palma, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 42. 23. (1864); Wagner, Stettin. entom. Zeitg., XXXI. 78. (1870); R. Blanch., Zool. médic., II. 523. (1890); Griff., Bull. Mus. Torino, VIII. (143). 4. (1893); Verh., Brit. Fl., VIII. 519. 6. f. 353—354. (1901).

? *lineolar* HARR., Expos. engl. Ins., 58. t. XV. f. 10. [*Musca*] (1776).

? *paralleli* HARR., Expos. engl. Ins., 43. t. X. f. 7. [*Musca*] (1776).

arvens PANZ. **intricarius** L.

bombyliiformis FABR. **intricarius** L.

caucasicus PORTSCH. **alpinus** PANZ. *var.*

cinctus HARR. **horticola** DEG.

cryptarum PANZ. **rupium** FABR.

flavocinctus FABR. **horticola** DEG.

flavivarsis MALM **pertinax** SCOP.

flavocinctus FALL. **horticola** DEG. et **rupium** FABR.

fossarum MEIG. **pertinax** SCOP.

fuscus VERR. **intricarius** L. *var.*

fuscus HARR. **intricarius** L.

- horticola** DEG., Ins., VI. 140. 5. t. VIII. f. 13. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI. 60. 5. [*Musca*] (1782); MEG., S. B., III. 396. 18. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 318. (179). II. (1827) et Suit. à Buff., I. 503. 8. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 632. (1849) et Ins. Brit., I. 246. 10. (1851); ROXD., Dipt. ital. Prodr., II. 39. 5. (1857); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 395. 8. (1857) et F. A., I. 336. (1862); DIMMOCK, The anat. of the mouth. part. of Dipt. Boston, t. III. f. 1-7. (1881); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 187. (1893); VERR., Brit. Fl., VIII. 518. 10. f. 358-359. (1901). Europa.
- cinctus* HARR., Expos. engl. Ins., 43. t. X. f. 6. [*Musca*] (1776).
flavocinctus FABR., Syst. Antl., 232. 5. (1805); ZETT., Ins. Lapp., 592. 3. [*Syrphus*] (1838) et Dipt. Scand., II. 655. 2. (1843), XII. 4650. 2. [*Syrphus*] (1855); BOXSÖ., Finnl. Insekt., I. 220. 2. [*Syrphus*] (1861).
flavocinctus var. *a.* FALL., Dipt. Suec. Syrph., 24. 13. [*Syrphus*] (1817).
lineatus HARR., Expos. engl. Ins., 42. t. X. f. 4. [*Musca*] (1776).
lunula VILL., Entom. linn., III. 433. 76. t., IX. f. 16. [*Musca*] (1789).
- luna* BIG. — ? **pertinax** Scop.
- incisuralis** LW., Wien. entom. Monatschr., II. 108. 14. (1858). Japonia.
- interruptus* PODA — **nemorum** L.
- intricarius** L., Syst. Nat., X. 592. [*Musca*], XII. II. 985. 33. [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1800. [*Musca*] (1761); FABR., Syst. entom. 766. 17. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II. 426. 22. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 281. 11. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 232. 3. (1805); DEG., Ins., VI. 138. 3. t. VIII. f. 10-11. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI. 59. 3. [*Musca*] (1782); GMEL., Syst. Nat., V. 2871. 33. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 437. 82. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etr., II. 282. 1448. [*Syrphus*] (1790); PANZ., Fauna germ., LIX. 11. [*Syrphus*] (1798); SCHBANK, Fauna boica, III. 130. 2479. [*Volucella*] (1803); LATR., Hist. nat. crust. Ins., XIV. 368. 2. (1804); ILJG., Fauna etr. Rossi, II. 436. 1448. [*Syrphus*] (1807); FALL., Dipt. Suec. syrph., 23. 12. [*Syrphus*] (1817); MEG., S. B., III. 391. 12. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 319. (171). 13. (1827) et Suit. à Buff., I. 501. 1. (1834); ZETT., Ins. Lapp., 592. 1. [*Syrphus*] (1838) et Dipt. Scand., II. 654. 1. (1843), XII. 4650. 1. (1855) et XIII. 5079. 1. [*Syrphus*] (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 631. (1849) et Ins. Brit., I. 244. 6. (1851); ROXD., Dipt. ital. Prodr., II. 39. 3. (1857); SCHEUS., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 400. 25. (1857) et F. A., I. 334. (1862); BOXSÖ., Finnl. Insekt., I. 219. 1. [*Syrphus*] (1861); FORSEN., Trud. Russk. Entom., X. 170. (1877); ADOLPH., N. Acta Leop. Carol. Akad., XLVII. t. XXV. f. 2. (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 508. 5. (1901). Europa.
- aurus* PANZ., Fauna germ., XC. 20. [*Syrphus*] (1805).

- bomblyliformis* FABR., Entom. syst., IV, 281, 13. [*Syrphus*] (1794)
 et Syst. Antl., 227, 12. [*Syrphus*] (1805); PANZ., Fauna germ.,
 IIX, 12. [*Syrphus*] (1798).
- fuscus* HARR., Expos. engl. Ins., 42, t. X, f. 3. [*Musca*] (1776).
- leucorrhoeus* SCOP., Entom. carn., 354, 958. [*Conops*] (1763).
- var. *furvus* VERR., Brit. Fl., VIII, 510. (1901). Anglia.
- jugorum** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII, 713. (1858); SCHN.,
 F. A., I, 335. (1862). Alpes.
- leucorrhoeus* SCOP. = **intricarius** L.
- lineatus* HARR. = **horticola** DEG.
- lincolae* HARR. = ? **arbustorum** L.
- lacorum* MEIG. = **pertinax** SCOP.
- lanata* VILL. = **horticola** DEG.
- lyra* HARR. = **nemorum** L.
- nemorum** L., Syst. Nat., X, 591. [*Musca*] (1758), XII, II, 984, 30. Europa.
 [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1797. [*Musca*] (1761); REAUM.,
 Mém. Ins., III, t. XXXI, f. 8. — (1737); GEOFFR., Hist. Ins.,
 II, 511, 36. — (1764); O. F. MÜLL., Fauna Fridrichsd., 714.
 [*Musca*] (1764); KRAM., Diss. ins. dan., 28. [*Musca*] (1760);
 FABR., Syst. entom., 764, 10. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II, 424,
 13. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV, 285, 25. [*Syrphus*] (1794)
 et Syst. Antl., 234, 10. (1805); SCHRANK, Enum. Ins., 445, 903.
 [*Musca*] (1781) et Fauna boica, III, 130, 2478. [*Volucella*] (1803);
 GMEL., Syst. Nat., V, 2869, 30. [*Musca*] (1788); VILL., Entom.
 him., III, 435, 79. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etr., II, 284, 1452.
 [*Syrphus*] (1790); CEDERN., Faunae ingr. Prodr., 303, 959. [*Syr-*
phus] (1798); LAUR., Gen. crust. ins., IV, 324. [*Elophilus*] (1809);
 HLLG., Fauna etr. Rossi, II, 439, 1452. [*Syrphus*] (1807); DWIG.,
 Primitiae faunae Mosqu., 178, 664. [*Musca*] (1802); MEIG., S. B.,
 III, 394, 16. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827, 316. (168), 9. (1827)
 et Suit. à Buff., I, 502, 5. (1834); ZETT., Ins. Lapp., 593, 5. [*Syr-*
phus] (1838) et Dipt. Scand., II, 658, 4. [*Syrphus*] (1843); WALK.,
 List Dipt. Brit. Mus., III, 632. (1849) et Ins. Brit., I, 245, 8,
 (1851); SCHENK, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau, VI, 35. (1850); ROND.,
 Dipt. ital. Prodr., II, 39, 4. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges.
 Wien, VII, 394, 7. (1857) et F. A., I, 336. (1862); BOSSD., Fiml.
 Insekt., I, 221, 4. [*Syrphus*] (1861); VERR., Brit. Fl., VIII, 514, 8,
 f. 355. (1901).
- interruptus* PODA, Ins. Mus. Graec., 118, 2. [*Conops*] (1761);
 SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI, 404, 3. (1856).
- lyra* HARR., Expos. engl. Ins., 42, t. X, f. 5. [*Musca*] (1776).
- var. **silvarum** MEIG., S. B., VII, 144, 24. [*sglvarum*] (1823); Europa centr.
 SCHN., F. A., I, 337. (1862); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm.,
 XXIX, 185. (1893).
- nigritarsis** MACQ., Suit. à Buff., I, 503, 6. (1834); MEIG., S. B., VII
 144, 25. (1838). Europa centr.
 et mer.
- ! *saltuum* ROND., Dipt. ital. Prodr., II, 43, 8. (1857).

nigroantennatus SCHUMM. **pratorum** MEIG.

parralleli HARR. = ? **arbustorum** L.

pascuorum ROND. — **pratorum** MEIG.

pertinax SCOP., Entom. carn., 352. 954. [*Couops*] (1763); Rossi, Europa.

Fauna etr., II. 282. 1447. [*Syrphus*] (1790); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 436. 1447. [*Syrphus*] (1807); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 417. (1856), VII. 396. 11. (1857) et F. A., I. 336. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 185. (1893); VERR., Brit. Fl., VIII. 513. 7. (1901).

consobriatus MEIG. in litt. ap. Illiger.

flavivittatus MALM, Kongl. Vet. Handl., 1863. 17. [*Syrphus*] (1863).

fosarum MEIG., S. B., III. 393. 15. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1821. 315. (167). 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 502. 3. (1834); WALK., Ins. Brit., I. 246. 12. (1851).

caeca BIG., Annal. Soc. entom. France, (5) X. 217. (1880).

lucorum MEIG., S. B., VII. 143. 23. (1822); SCHN., F. A., I. 337. (1862); ? STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 187. (1893).

similis FALL., Dipt. Succ. Syrph., 25. 16. [*Syrphus*] (1817); MEIG., S. B., III. 392. 13. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 314. (166). 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 502. 2. t. XI. f. 14. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 660. 6. (1843) et XII. 4651. 6. [*Syrphus*] (1855); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 176. 2. (1847); WALK., Ins. Brit., I. 245. 7. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 40. 1. (1857); BONSD., Finnl. Insekt., I. 221. 6. [*Syrphus*] (1861).

picus FALL. **rupium** FABR.

pratorum MEIG., S. B., III. 393. 14. (1822); Lw., Programm Posen, Europa centr.

38. 8. (1840) et Isis, 1840. 574. 8. (1840); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 396. 12. (1857) et F. A., I. 336. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 186. (1893).

nigroantennatus SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1843. 191. (1843).

pascuorum ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 41. 2. (1857).

rupium FABR., Syst. Antl., 241. 38. (1805); MEIG., S. B., III. 397. 19. Europa.

t. XXXII. f. 22. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1837. 319. (171). 12. (1827) et Suit. à Buff., I. 503. 9. (1834); Lw., Programm Posen, 38. 12. (1840) et Isis, 1840. 574. 12. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 632. (1849) et Ins. Brit., I. 246. 11. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 40. 7. (1857) et F. A., I. 335. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 186. (1893); VERR., Brit. Fl., VIII. 516. 9. f. 356—357. (1901).

cryptarum PANZ. (*nec* FABR.), Fauna germ., XC. 18. [*Syrphus*] (1805).

flavocinctus var. *b.* FALL., Dipt. Succ. Syrph., 24. 13. [*Syrphus*] (1817).

picus FALL., Dipt. Succ. Syrph., 24. 14. [*Syrphus*] (1817); ZETT., Ins. Lapp., 593. 4. [*Syrphus*] (1838) et Dipt. Scand., II. 656.

3. (1843) et XII. 4650. 3. [*Syrphus*] (1855) BOSSD., Finkl. Insekt., I. 220. 3. [*Syrphus*] (1861).

saltuum ROXD. ? *nigritarsis* MACQ.

silvarum MEIG. = *nemorum* L. var.

similis FALL. = *pertinax* SCOP.

vitripennis STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 187. (1893). Styria.

Helophilus

MEIG., Hliger's Magaz., II. 274. [*Elophila*] (1803) em. FABR.

A. *Mesembrius*

ROXD., Dipt. ital. Prodr., II. 50. *nota*. (1857).

peregrinus LW., Stettin. entom. Zeitg., VII. 118. 1. (1846); ROXD., Dipt. ital. Prodr., II. 49. 2. (1857); SCHUS., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 68. (1855) et VII. 404. 2. (1857) et F. A., I. 340. (1862); LW., Diptf. Südafr., (384). 312. (1860); GÜRSCH., III. Wochenschr. Entom., II. 603. (1897). Europa mer., Africa sept.

B. *Helophilus* s. str.

GÜRSCH., III. Wochenschr. Entom., II. 604. (1897).

affinis WAHLBG., Öfv. Vet. Akad. Förh., I. 64. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3119. 2-3. (1849); BOSSD., Finkl. Insekt., I. 226. 3. (1861); MALM, Kongl. Vet. Handl., 1863. 20. (1863). Europa sept.

arcticus p. p., ZETT., Ins. Lapp., 595. 2. (1838) et Dipt. Scand., II. 678. 2. (1843).

arcticus ZETT. 1838. *affinis* WAHLBG. *groenlandicus* O. FABR. et *lapponicus* WAHLBG.

bilineatus CURT. *groenlandicus* FABR.

borealis SIEBKKE *Siebkii* VERR.

borealis STABG., Krøyers Tidsskr., (2). I. 359. 25. (1845); LW., Stettin. entom. Zeitg., VII. 123. 4. (1846); WILL., Syn. N. A. Syrph., 185. (1886); LUNDB., Vid. Medd., 1899. 305. 99. (1899). Europa sept.

bottnicus WAHLBG., Öfv. Vet. Akad. Förh., I. 65. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3122. 2-3. (1849). Europa sept.

camporum MEIG. = *trivittatus* FABR.

continuus LW., N. Beitr., II. 18. 40. (1854); PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XXI. 9. (1886). Sibiria.

glacialis LW., Stettin. entom. Zeitg., VII. 121. 3. (1846); WILL., Syn. N. A. Syrph., 184. (1886). Europa sept.

groenlandicus O. FABR., Fauna groenl., 208. 170. [*Tubanus*] (1780); LW., Stettin. entom. Zeitg., VII. 119. 2. (1846); WILL., Syn. N. A. Syrph., 185. (1886); LUNDB., Medd. om Grønland, VII. t. VII. f. 17. (1893) et Vid. Medd., 1899. 304. 98. (1899); VERR., Cat. europ. Syrph., 85. (1900); ALDR., Cat. N. A. Dipt., 393. (1905). Europa sept.

arcticus p. p., ZETT., Ins. Lapp., 595. 2. (1838) et Dipt. Scand., II. 678. 2. (1843) et VIII. 3. 117. 2. (1849); STAEG., Kröjers Tidsskr., (2). I. 359. 24. *var. a.* (1845); WAHLBG., Öfv. Vet. Akad. Förh., IX. 185. (1852); BONSD., Finnl. Insekt., I. 226. 2. (1861).

bilineatus CURT., Descr. Ins. Ross Exped. App., LXXVIII. 30. (1831); SCHMÖDE, Berlin. entom. Zeitschr., III. 153. (1859)

?*latro* WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 607. (1849).

Henricii SCHNABL — **hybridus** LW.

hybridus LW., Stettin. entom. Zeitg., VII. 141. 6. (1846); WALK., Ins. Brit., I. 249. 2. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 406. 10. (1857) et F. A., I. 339. (1862); EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 668. (1860); MALM, Kongl. Vet. Handl., 1863. 19. (1863); VERR., Brit. Fl., VIII. 529. 2. f. 362—363. (1901).

Henricii SCHNABL, Wiad. nauk. przyr. Warschau, I. 1. (1881);
Mik, Wien. entom. Zeitg., II. 46. (1883).

Novac-Scotiae MACQ., Dipt. exot. Suppl., II. 76. (60). 10. (1847);
WILL., Syn. N. A. Syrph., 197. (1886).

lapponicus WAHLBG., Öfv. Vet. Akad. Förh., I. 65. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3120. 2—3. (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 227. 4. (1861).

arcticus p. p., ZETT., Ins. Lapp., 595. (1838) et Dipt. Scand., II. 678. (1843).

lulifrons LW. = **trivittatus** FABR.

latro WALK. = **groenlandicus** (O. FABR.)*

Novac-Scotiae MACQ. = **hybridus** LW.

parallelus HARR. = **trivittatus** FABR.

pendulus L., Syst. Nat., X. 591. [*Musca*] (1758), XII. II. 984. 28. [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1795. [*Musca*] (1761); REAUM., Mém. Ins., IV. t. XXXI. f. 9—11. [—] (1738); FRISCH., Besch. allert. Ins., IV. t. XIII. [—] (1722); KRAMER, Diss. ins. dan., 28. [*Musca*] (1760); GEOFFR., Hist. Ins., II. 513. 39. [—] (1764); O. F. MULL., Fauna Fridrichsd., 712. [*Musca*] (1764); SCHAEFF., Icon. ins., t. 129. f. 3. 4 et t. 130. f. 2. [—] (1766); FABR., Syst. Entom., 763. 7. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II. 423. 10. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 282. 17. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 233. 7. [*Eristalis*] (1805); DEG., Ins., VI. 101. 3. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI. 46. 3. [*Musca*] (1782); SCHRANK, Enum. ins., 444. 901. [*Musca*] (1781) et Fauna boica, III. 112. 2425. [*Musca*] (1803); GMEL., Syst. Nat., V. 2868. 28. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 433. 77. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etr., I. 283. 1450. [*Syrphus*] (1790); DONOV., Brit. Ins., I. 69. t. XXXI. f. 2. [*Musca*] (1792); PANZ., Fauna germ., XXII. 21.

* Speciem *H. modesto* WIED. (Aussere. zweifl. ins., II. 165. 19) affinem, cl. v. ROEDER in Wien. entom. Zeitg., II. 94. (1883) et Dipt. Separ. 1883. 6., ex Insulis Canariis, nullo nomine, recordat.

[*Syrphus*] (1794): CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 302, 948. t. III. f. n. [*Syrphus*] (1798); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 52. t. IX. f. 2. [*Syrphus*] (1803); LATR., Dict. H. N. Deterv., XXIV. 194. 569. [*Eristalis*] (1804), Hist. nat. Crust. Ins., XIV. 365. 6. [*Eristalis*] (1804) et Gen. crust. ins., IV. 324. [*Elophilus*] (1809); DWIG., Primitiae faunae Mosqu., 177. 662. [*Musca*] (1802); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 438. 1450. [*Syrphus*] (1807); FALL., Dipt. Snee. Syrph., 30. 26. [*Syrphus*] (1817); MEIG., S. B., III. 373. 6. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 302. (154). 4. t. III. f. 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 509. 1. (1834); CURT., Brit. Entom., 429. (1836); ZETT., Ins. Lapp., 595. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 676. 1. (1843); VII. 3117. 1. (1849); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 598. (1840); LW., Stettin. entom. Zeitg., VII. 125. 5. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 606. (1849) et Ins. Brit., I. 249. 1. t. IX. f. 6. (1851); RONP., Dipt. ital. Prodr., II. 49. 4. (1857); SEMN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 406. 9. (1857) et F. A., I. 340. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 226. 2. (1861); MALM, Kongl. Vet. Handl., 1863. 19. (1863); VERR., Brit. Fl., VIII. 531. 3. f. 364-366. (1901).

praecox ROSSI, Fauna etr., II. 294. 1476. t. X. f. 8. [*Syrphus*] (1790); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 453. 1476. [*Syrphus*] (1807).
similis CURT., Guide, 1245. (1829) et Brit. Entom., 429. (1836).
trilinea HARR., Expos. engl. Ins., 58. t. XV. f. 9. [*Musca*] (1776).
trilineatus HARR., Expos. engl. Ins., 58. t. XV. f. 9. [*Musca trilineatus*] (1776).*)
trivittatus MEIG., p. p., S. B., III. 373. 5¹. (1822).

praecox ROSSI: **pendulus** L.

Siebkii VERR., Cat. europ. Syrph., 86. (1900).

borealis SIEBKE (nec. STAEG.), Nyt Mag. f. Naturk., 1864. 166. (1864) et Enum. ins. norveg., IV. 54. 4. (1877).

similis CURT. **pendulus** L.

trilinea HARR. **pendulus** L.

trilineatus HARR. **pendulus** L.

trivittatus FABR., Syst. Anth., 235. 15. [*Eristalis*] (1805); MEIG., p. p., S. B., III. 373. 5. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 304. (156). 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 510. 2. t. XI. f. 17. (1834); CURT., Brit. Entom., 429. (1836); LW., Programm Posen, 38. 6. (1840), Isis, 1840. 574. 6. (1840) et Stettin. entom. Zeitg., VII. 142. 7. (1846); ZETT., Dipt. Scand., II. 679. 3. (1843) et VIII. 3123. 3. (1849); RONP., Dipt. ital. Prodr., II. 48. 3. (1857); SEMN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 406. 11. (1857) et F. A., I. 340. (1862); WALK., Ins. Brit., I. 249. 3. (1851); GIUGLI-TOSS., Mem. Acc. Sci. Torino, XLIII. 18. 67. (1892); VERR., Brit. Fl., VIII. 526. 1. (1901).
camporum MEIG., S. B., III. 372. 4. (1822); LW., Stettin. entom. Zeitg., VII. 168. 13. (1846).

Scandinavia.

Europa,
Persia.

*) *trilineatus* FABR. 1791. Novae Zealandiae et *similis* MACQ. 1842. Americae borealis, incolae sunt.

latifrons Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VII. 313. 73. (1863); RILEY, Amer. Entom., II. 142. (1870); OST-SACK., Bull. geolog. Survey, III. 337. (1877); WILL., Syn. N. A. Syrph., 188. (1886) et Biol. centr. amer., III. 68. 1. (1892); LINTNER, Sev. N. Y. Rep., 228. 234. (1891); CHAGNON, Nat. Can., 1901. 59. 3. (1901); How., Insect Book, t. XXI. f. 25. (1902).*)

parallelus HARR., Expos. engl. Ins., 57. t. XV. f. 8. [*Musca*] (1776).

trivittatus MEIG. = **pendulus** L. et **trivittatus** FABR.

virgatus COQUILL., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 326. (1898).

Japonia.

C. *Parhelophilus*

(GIRSCHN., Ill. Wochenschr. Entom., II. 604. (1897).

consimilis MALM, Kongl. Vet. Handl., 1863. 80. (1863).

Scandinavia.

femoralis FALL. = **frutetorum** FABR.

frutetorum FABR., Syst. entom., 765. 14. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II. 425. 17. [*Syrphus*] (1781), Entom. Syst., IV. 287. 33. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 236. 19. [*Eristalis*] (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2870. 340. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 456. 114. [*Musca*] (1789); MEIG., S. B., 374. 7. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 304. (156). 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 510. 3. (1834); Lw., Programm Posen, 37. 4. (1840), Isis, 1840. 574. 4. (1840) et Stettin. entom. Zeitg., VII. 147. 9. (1846); ZETT., Dipt. Scand., II. 680. 4. (1843) et VIII. 3123. 4. (1849); STEPH., Ill. Brit. Entom. Suppl., 30. t. XLVII. f. 2. (1846); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 407. 14. (1857) et F. A., I. 341. (1862); PALMA, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 45. 33. (1864); VERR., Entom. Monthly Mag., VII. 202. (1871) et Brit. Fl., VIII. 534. 4. f. 367. (1901); GIRSCHN., Ill. Wochenschr. Entom., II. 604. (1897).

Europa.

femoralis FALL., Dipt. Succ. Syrph., 31. 27. [*Syrphus*] (1817).

versicolor MALM, Kongl. Vet. Handl., 1863. 79. (1863.)

var. **xanthopygus** Lw., Stettin. entom. Zeitg., VII. 149. (1846).

Sicilia.

lunulatus MEIG., S. B., III. 370. 2. t. XXXII. f. 9. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 301. (153). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 511. 5. (1834); CURT., Brit. Entom., 429. (1833); ZETT., Dipt. Scand., II. 681. 5. (1843) et VIII. 3123. 5. (1849); Lw., Stettin. entom. Zeitg., VII. 165. 11. (1846); WALK., Ins. Brit., I. 250. 6. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 408. 16. (1857) et F. A., I. 340. (1862); MALM, Kongl. Vet. Handl., 1863. 22. (1863); GIRSCHN., Ill. Wochenschr. Entom., II. 604. (1897); VERR., Brit. Fl., VIII. 540. 6. f. 372-373. [*Evarinomia*] (1901).

Europa.

solitarius ROSD., Dipt. ital. Prodr., II. 50. 5. (1857).

Italia.

*) *latifrons* SCHN., Novara Dipt., 359. 66. (1868), est species diversa, Novae Zealandiae incola, melius nomine *Hochstetteri* Nowicki 1875, distinguenda.

- versicolor** FABR., Entom. syst., IV, 283. 19. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 233. 19. [*Eristalis*] (1805); PANZ., Fauna germ., LXXXII. 14. [*Syrphus*] (1801); LW., Stettin. entom. Zeitg., VII. 144. 8. (1846); WALK., Ins. Brit., I. 250. 4. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 407. 13. (1857) et F. A., I. 341. (1862); MALM, Kongl. Vet. Handl., 1863. 21. (1863); GIRSCHN., Ill. Wochenschr. Entom., II. 604. (1897); VERR., Brit. Fl., VIII. 537. 5. f. 568—571. (1901).
- versicolor* MALM = **frutetorum** FABR.
- xanthopygus* LW. = **frutetorum** FABR. var.

D. *Eurimyia*.

- BIG., Bull. Soc. entom. France, (6). III. XX. [*Eurimyia*] (1883) et Annal. Soc. entom. France, (6). III. 226. 230. [*Eurimyia*] (1883) emend. MIK, Wien. entom. Zeitg., XVI. 115. (1897).

Anasimyia SCHN., Cat. europ. Dipt., 108. (1864); OST-SACK., Record Life, 178. (1903).

- anaasis* WALK. — **lineatus** FABR.
- conostoma* WILL. = **lineatus** FABR.
- femoratus* PANZ. — **lineatus** FABR.
- interpunctus* HARR. — **transfugus** L.

- lineatus** FABR., Entom. syst., IV. 375. 2. [*Rhingia*] (1794) et Syst. Antl., 223. 2. [*Rhingia*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 31. 28. [*Syrphus*] (1817); MEIG., S. B., III. 369. 1. t. XXXII. f. 7. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 299. (151) 1. (1827) et Suit. à Bull., I. 511. 6. (1834); CURT., Brit. Entom., 429. (1836); ZETT., Ins. Lapp., 596. 3. (1838) et Dipt. Scand., II. 682. 7. (1843), VIII. 3124. 7. (1849), XIII. 5085. 7. (1859); LW., Stettin. entom. Zeitg., VII. 167. 12. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 602. (1849) et Ins. Brit., I. 250. 5. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 48. 1. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 408. 17. (1857) et F. A., I. 341. (1862); BOSSD., Fiml. Insekt., I. 228. 6. (1861); OST-SACK., Cat. N. A. Dipt., 2 ed., 250. 233. (1878); VERR., Brit. Fl., VIII. 545. 8. f. 376—377. (1901).

anaasis WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 603. (1849).

conostoma WILL., Syn. N. A. Syrph., 193. t. VIII. f. 3. (1886); CHAGNON, Nat. Can., 1901. 57. (1901); ALDR., Cat. N. A. Dipt., 392. (1905).

femoratus PANZ., Fauna germ., XX. 24. [*Masca*] (1794); DUF., Bull. Soc. entom. France, (2). IV. LVII. [*Rhingia*] (1846); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4303. obs. [*Rhingia*] (1852).

muscarius FABR., Entom. syst., IV. 375. 3. [*Rhingia*] (1794) et Syst. Antl., 222. 3. [*Rhingia*] (1805).

rhingioides BIG., Bull. Soc. entom. France, (6). III. XXI. [*Eurimyia*] (1883); MIK, Wien. entom. Zeitg., II. 66. 2. (1883).

? *stipatus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 602. (1849).

var. novus SCHNEID. ap. SIEBKE, *Enchir. ins. norveg.*, IV. 54. 8. Norvegia. (1877).

muscarius FABR. — *lineatus* FABR.

novus SCHNEID. — *lineatus* FABR. *var.*

rhingioides BIG. — *lineatus* FABR.

stipatus WALK. — ? *lineatus* FABR.

transfugus L., *Syst. Nat.*, X. 594. [*Musca*] (1758), XII. II. 987. 52. Europa.
 [*Musca*] (1767) et *Fauna suec.*, 1818. [*Musca*] (1761); GMEL., *Syst. Nat.*, V. 2875. 52. [*Musca*] (1788); VILL., *Entom. linn.*, III. 448. 101. [*Musca*] (1789); MEIG., S. B., III. 371. 3. t. XXXII. f. 8. (1822); MACQ., *Soc. Sci. Lille*, 1827. 301. (153). 3. (1827) et *Suit. à Buff.*, I. 510. 4. (1834); CURT., *Brit. Entom.*, 429. (1833); ZETT., *Dipt. Scand.*, II. 682. 6. (1843) et VIII. 3123. 6. (1849); LW., *Stettin. entom. Zeitzg.*, VII. 164. 10. (1846); WALK., *Ins. Brit.*, I. 251. 7. (1851); SCHN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, VII. 407. 15. (1857) et F. A., I. 342. (1862); BONSD., *Finnl. Insekt.*, I. 227. 5. (1861); VERR., *Brit. Fl.*, VIII. 542. 7. f. 374—375. (1901).

interpunctus HARR., *Expos. engl. Ins.*, 59. t. XV. f. 13. [*Musca*] (1776).

E. *Liops*

ROSD., *Dipt. ital. Prodr.*, II. 33. *nota*. [*Lejops*] (1857), emend. VERR. ap. SCDD. 1882.

Raddii CURT. = *vittatus* MEIG.

vittatus MEIG., S. B., III. 378. 1. [*Mallota*] (1822); MACQ., *Suit. à Buff.*, I. 500. 3. [*Mallota*] (1834); WALK., *Ins. Brit.*, III. XII. [*Mallota*] (1856); ROSD., *Dipt. ital. Prodr.*, II. 33. (1857); SCHN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, VII. 402. 5. [*Mallota*] (1857) et F. A., I. 339. (1862); MK, *Dipt. Harnstein*, 68. (1885); VERR., *Brit. Fl.*, VIII. 548. 9. f. 378. (1901).

Raddii CURT., *Entom. Mag.*, I. 107. 4. (1833) et *Brit. Entom.*, 429. (1836).

Myiatropa

ROSD., *N. Annal. Sci. Nat. Bologna*, (2). II. 453. [*Myathropa*] (1844), emend. VERR. ap. SCDD. 1882.

ablecta HARR. = *florea* L.

atropos SCHRANK = *florea* L.

Bigotii MACQ. — *florea* L. *var.*

flavofemorata STROBL. — *florea* L. *var.*

florea L., *Syst. Nat.*, X. 591. [*Musca*] (1758), XII. II. 984. 29. Europa,
 [*Musca*] (1767) et *Fauna suec.*, 1796. [*Musca*] (1761); PODA, *Ins. Africa sept.*
Mus. Graec., 117. [*Musca*] (1761); Scop., *Entom. carn.*, 354. 959.
 [*Conops*] (1763); O. F. MÜLL., *Fauna Fridrichsd.*, 713. [*Musca*]
 (1774) et *Zool. Dan. Prodr.*, 2044. [*Musca*] (1776); SCHAEFF., *Icon.*
ins., t. LIV. f. 11. [—] (1766); FABR., *Syst. entom.*, 764. 8. [*Syrphus*]
 (1775), *Spec. ins.*, II. 423. 11. [*Syrphus*] (1781), *Entom. syst.*,
 IV. 283. 20. [*Syrphus*] (1794) et *Syst. Antl.*, 233. 9. [*Eristalis*]

(1805); DEG., Ins., VI. 100. 2. t. VI. f. 2. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI. 46. 2. [*Musca*] (1782); GMEL., Syst. Nat., V. 2868. 29. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 434. 78. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna otr., II. 284. 1451. [*Syrphus*] (1790); PANZ., Fauna germ., XIV. 21. [*Syrphus*] (1794); CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 302. 949. t. III. f. o. [*Syrphus*] (1798); DWIG., Primitiae faunae Mosqu., 178. 663. [*Musca*] (1802); SCHRANK, Fauna boica, III. 113. 2406. [*Musca*] (1803); LATR., Dict. Hist. nat. Deferv., XXIV. 194. 569. [*Eristalis*] (1804) et Gen. crust. ins., IV. 324. [*Elophilus*] (1809); ILIAG., Fauna otr. Rossi, II. 439. 1451. [*Syrphus*] (1807); FALL., Dipt. Svec. Syrph., 30. 25. [*Syrphus*] (1817); MEIG., S. B., III. 399. 21. [*Eristalis*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 313. (165). 6. t. III. f. 4. [*Eristalis*] (1827) et Suit. à Buff., I. 504. 10. [*Eristalis*] (1824); ZETT., Ins. Lapp., 594. 10. [*Syrphus*] (1838) et Dipt. Scand., II. 669. 15. (1843), VIII. 3114. 14. (1849) et XII. 4652. 15. [*Syrphus*] (1855); O. G. COSTA, Atti Acc. Sci. Napoli, V. (2). 107. 13. [*Eristalis*] (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 633. [*Eristalis*] (1849) et Ins. Brit., I. 247. 13. [*Eristalis*] (1851); HALD., Stettin. entom. Zeitg., XII. 139. [*Helophilus*] (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 45. 1. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 403. 1. [*Helophilus*] (1857) et F. A., I. 338. [*Helophilus*] (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 223. 10. [*Syrphus*] (1861); PALMA, Ann. Acc. Asp. Nat., (3). III. 43. 30. (1864); GRIFF., Bull. Mus. Torino, VIII. (143). 3. [*Helophilus*] (1893); VERR., Brit. Fl., VIII. 521. 21. (1901).

ablecta HARR., Expos. engl. Ins., 41. t. X. f. 2. [*Musca*] (1776).

atropos SCHRANK, Enum. ins., 446. 904. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2880. 383. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 460. 129. [*Musca*] (1789).

tenax LAMPERT (nec L.), Das Leben d. Binnengew., 136. t. II. Ins. t. 2. [*Eristalis*] (1899).

var. Bigotii MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 445. (141). 11. t. XIII. f. 4. [*Helophilus*] (1850). Aegyptus.

var. flavofemorata STROBL., Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 481. (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX. 541. (1904). Dalmatia.

var. nigrotarsata SCHN., F. A., I. 339. [*Helophilus*] (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 174. (1870); BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVIII. 4. (1888). Europa centr.

nigrotarsata SCHN. *florea* L. *var.*

tenax LAMP. *florea* L.

Palumbia

ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 129. (1865).

Bellierii BIG., Annal. Soc. entom. France, (3). VIII. 776. [*Sphæca*] Sicilia. (1869); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 23. (1868).

sicula ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 130. (1865).

sicula ROND. **Bellierii** BIG.

Platynochaetus

WIED., Auser. zweifl. ins., II. 147. (1830).

- Macquarti** Lw., Wien. entom. Monatschr., VI. 296. 2. (1862). Sicilia.
setosus MACQ. (*nec* WIED.), Suit. à Buff., I. 509. 1. t. XI. f. 16.
 (1834) et II. 663. 1. (1835) et Dipt. exot. Suppl., II. (2). 127.
 (69). t. XII. f. 3. (1842).
- rufus** MACQ., Suit. à Buff., II. 663. 2. (1835). Africa sept.
setosus FABR., Entom. syst., IV. 288. 37. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Europa mer.,
 Antl., 238. 25. [*Eristalis*] (1805); COQUEB., III. icon., 103. t. XXIII. Africa sept.
 f. 13. [*Syrphus*] (1804); WIED., Auser. zweifl. ins., II. 147. t.
 IX. f. 8. (1830); SCHIN., F. A., I. 337. (1862).
- setosus* MACQ. = **Macquarti** Lw.

Mallota

MEIG., S. B., III. 377. CXVI. (1822).

Imatisma MACQ., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 125. (67). 19. (1842).

A. *Mallota* s. str.

ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 44. 1. (1856) et II. 33. 1. (1857).

- fuciformis** FABR., Entom. syst., IV. 290. 43. [*Syrphus*] (1794) et Europa centr.
 Syst. Antl., 239. 31. [*Eristalis*] (1805); COQUEB., III. icon., 104. t. et mer.
 XXIII. f. 14. [*Syrphus*] (1804); LATR., Diet. Hist. Nat. Déterv.,
 XXIV. 194. 569. [*Eristalis*] (1804) et Gen. crust. ins., 323. [*Eri-*
stalis] (1809); MEIG., S. B., III. 379. 3. t. XXXII. f. 13. (1822);
 MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 322. (174). 1. t. III. f. 7. (1827) et
 Suit. à Buff., I. 499. 1. t. XI. f. 13. (1834); BLANCH., Hist. Nat.
 Ins., III. 598. [*Eristalis*] (1840); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges.
 Wien, VII. 401. 1. (1857) et F. A., I. 343. (1862); PORTSCH., Trudy
 Russk. Entom., X. 173. (1877).
- tricolor** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 234. 126. (1871); PORTSCH., Russia mer.
 Trudy Russk. Entom., X. 177. t. III. f. 8—11. (1877).

B. *Zetterstedtia*

ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 452. (1844).

atrox KARSCH = **cimbiciformis** FALL.

bautias WALK. = **cimbiciformis** FALL.

- cimbiciformis** FALL., Dipt. Suec. Syrph., 27. 18. [*Syrphus*] (1817); Europa.
 MEIG., S. B., III. 285. 3. [*Eristalis*] (1822); ZETT., Dipt. Scand.,
 II. 663. 8. (1843) et XII. 4652. 8. [*Syrphus*] (1855); ROND., N.
 Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 452. [*cymbiciformis*] (1844) et
 Dipt. ital. Prodr., II. 36. 1. (1857); WILL., Berlin. entom. Zeitschr.,
 XXVII. 171. (1883) et Syn. N. A. Syrph., 202. t. VIII. f. 11 et t.

- IX. f. 8. (1886); HUNTER, *Can. Entom.*, XXVII. 99. (1896); VERR., *Brit. Fl.*, VIII. 552. 1. f. 379. (1901); CHAGNON, *Nat. Can.*, 1901. 56. 2. (1901); ALDR., *Cat. N. A. Dipt.*, 395. (1905).
- atrox* KARSCH, *Berlin. entom. Zeitschr.*, XXVII. 172. (1883).
- bantias* WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, III. 600. [*Merodon*] (1849); OST-SACK., *Cat. N. A. Dipt.* 2 ed., 250. 239. (1878); KARSCH, *Berlin. entom. Zeitschr.*, XXVII. 172. (1883).
- crystalloides* SCHIN., *Cat. dipt. europae*, 108. (1864).
- dentipes* WILL. ap. LINTNER, *First N. Y. Rep.*, 211. (1883).
- eristaloïdes* LW., *N. Beitr.*, IV. 17 et 43. 35. (1856); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, VII. 402. 4. (1857) et *F. A.*, I. 343. (1862); BECH., *Wien. entom. Zeitg.*, I. 253. (1882); JAROSCH., *Trudy naturf. Ges. Karkoff*, XVII. 307. 20. (1883).
- posticata* MACQ. (*nec* FABR.), *Dipt. exot.*, II. (2). 126. (68). 1. t. XII. f. 2. [*Imatisma*] (1842); LW., *N. Beitr.*, IV. 18. (1856) et *Sillim. Journ. Sci. and Arts*, XXXVII. 317. (1864); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, VII. 402. 3. (1857) et *F. A.*, I. 343. (1862); OST-SACK., *Bull. Geol. Survey*, III. 338. (1877) et *Cat. N. A. Dipt.* 2 ed., 135. (1878); BRG., *Annal. Soc. entom. France*, (6). III. 227. (1883).
- Sackeni* WILL., *Proc. amer. phil. Soc.*, XX. 324. (1882); *Syn. N. A. Syrph.*, 204. t. VIII. f. 14. (1886) et *Biol. Centr. Amer.*, III. 70. (1892); ALDR., *Cat. N. A. Dipt.*, 395. (1905).
- crystalloides* SCHIN. = **cimbiciformis** FALL.
- dentipes* WILL. = **cimbiciformis** FALL.
- eristaloïdes* LW. = **cimbiciformis** FALL.
- megilliformis** FALL., *Dipt. Suec. Syrph.*, 27. 19. [*Syrphus*] (1817); MEIG., *S. B.*, III. 379. 2. (1822). MACQ., *Soc. Sci. Lille*, 1827. 323. (175). 2. (1827) et *Suit. à Buff.*, I. 500. 2. (1834); ZETT., *Dipt. Scand.*, II. 675. 1. (1843); SCHIN., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, VII. 401. 2. (1857) et *F. A.*, I. 343. (1862); BOSSD., *Finnl. Insekt.*, I. 225. 1. (1861); PORTSON., *Trudy Russk. Entom.*, X. 174. (1877). Europa centr. et sept.
- posticata* MACQ. = **cimbiciformis** FALL.
- rossica** PORTSCH., *Trudy Russk. Entom.*, X. 175. t. III. f. 9—10. (1877). Russia.
- Sackeni* WILL. = **cimbiciformis** FALL.

Merodon

MEIG., *Hilger's Mag.*, II. 274. (1803).

- aberrans** EGG., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, X. 664. (1860); SCHIN., *F. A.*, I. 345. (1862); MIK., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XXXIII. 182. 3. (1883); BEZZI., *Bull. Soc. entom. ital.*, XXXII. 89. 431. (1900). Europa centr. et mer.
- Knerii* MIK., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVII. 415. t. X. f. 3—4. (1867).
- obscuripennis* PALMA, *Annal. Acc. Asp. Nat.*, (3). III. 47. 46. t. VI. f. 3. (1864); ROSD., *Atti Soc. ital. Sci. nat.*, XI. 22. (1868).

- aeneus** MEIG., S. B., III. 367. 27. (1822) et VII. 141. (1838); MACQ., Suit. à Buff., I. 517. 15. (1834); ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 260. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 59. 4. (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 416. 24. (1857) et F. A., I. 347. (1862).
? *pumilus* MACQ., Linc. Expl. Alg. Zool., III. 466. 159. (1849).
- aerarius** ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 60. 5. (1857); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 189. (1893). Europa centr. et mer.
- albifrons** MEIG., S. B., III. 359. 15. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 516. 10. (1834); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 413. 7. (1857) et F. A., I. 346. (1862). Europa centr.
- analis** MEIG., S. B., III. 357. 12. (1822); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 412. 6. (1857) et F. A., I. 347. (1862); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 76. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 189. (1893). Europa centr.
- annulatus** FABR., Entom. syst., IV. 296. 67. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 198. 7. (1805); MEIG., S. B., III. 363. 21. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 294. (146). 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 516. 12. (1834); PALMA, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 4. 6. (1864); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 22. (1868); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 91. 433. (1900). Europa centr. et mer.
distinctus PALMA, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 46. 45. t. VI. f. 2. (1864); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 22. (1868).
- armipes** ROND., Mag. Zool. Guer., t. 154. (1845), N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 262. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 61. 7. (1857); A. COSTA, Giamb. Vico, II. 457. (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 414. 12. (1857) et F. A., I. 346. (1862). Europa centr. et mer.
- atripes* BIG. = **cinereus** FABR.
- aureus** FABR., Syst. Antl., 198. 8. (1805); MEIG., S. B., III. 366. 26. (1822); SCHIN., F. A., I. 347. (1862). Germania.
- aurifer** LW., Berlin. entom. Zeitschr., VI. 83. 53. (1862). Graecia.
- auripilus** MEIG., S. B., VI. 354. 28. (1830). Africa sept.
- avidus** ROSSI, Fauna otr., II. 292. 1472. [*Syrphus*] (1790); ILLIG., Fauna otr. Rossi, II. 451. 1472. [*Syrphus*] (1807); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 415. 15. (1857) et F. A., I. 345. (1862); VERR., Cat. europ. Syrph., 92. (1900). Europa mer.
graccus WALK., Ins. Saunders., III. 243. (1852).
ruftibius ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 265. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 55. 20. (1857).
- bulborum* ROND. = **equestris** FABR.
- canipilus* ROND. = **clavipes** FABR.
- caucasicus** PORTSCH., Trndy Russk. Entom., X. 181. t. III. f. 12. (1877); VERR., Cat. europ. Syrph., 90. (1900). Caucasus.
- chalybeus** MEIG., S. B., III. 365. 23. (1822). Lusitania.
- cinereus** FABR., Entom. syst., IV. 293. 53. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 242. 41. [*Eristalis*] (1805); MEIG., S. B., III. 356. 10. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 515. 7. (1834); ROND., N. Annal. Sci. Nat.

- Bologna, (2). IV. 257. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 52. 3. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 412. 5. (1857) et F. A., I. 346. (1862).
- atripes* BIG., Bull. Soc. entom. France, (6). IV. CXVI. (1884).
- posticatus* MEIG., S. B., III. 357. 11. (1822) et VI. 354. (1830).
- ? *virescens* BREMI ap. AM STEIN, Jahrb. Nat. Geraub., II. 100. (1857).
- claudus* VILL. — ? **clavipes** FABR.
- clavipes** FABR., Spec. ins., II. 427. 29. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 292. 50. [*Syrphus*] (1794), Mant. ins., II. 337. [*Syrphus*] (1798) et Syst. Antl., 195. 1. (1805); REAUM., Mém. Ins., IV. t. XXXIV. f. 9—10. [—] (1738); ROSSI, Fauna etr., II. 286. 1456. [*Syrphus*] (1790); LATR., Dict. Hist. nat. Déterv., XXIV. 194. 565. (1804) et Gen. crust. ins., IV. 331. (1809); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 441. 1456. [*Syrphus*] (1807); MEIG., S. B., III. 351. 1. t. XXXI. f. 22. (1822); ST. FARG. SERV., Encycl. méth., X. 525. (1825); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 291. (143). 1. t. III. f. 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 513. 1. t. XI. f. 20. (1834); CURT., Brit. Entom., 98. (1826) et Gard. Chron. (1842); WESTW., Introd., II. 559. f. 131. 5. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 597. (1849) et Ins. Brit., I. 252. 1. (1851); ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 256. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 54. 10. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 410. 1. (1857) et F. A., I. 344. (1862); PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 184. (1877); VERR., Brit. Fl., VIII. 560. (1901).
- canipilus* ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 131. (1865).
- ? *claudus* VILL., Entom. linn., III. 463. 139. [*Musca*] (1789).
- carripes* GMEI., Syst. Nat., V. 2871. 347. [*Musca*] (1788).
- gravipes* ROSSI, Fauna etr., II. 286. 1457. [*Syrphus*] (1790); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 442. 1457. [*Syrphus*] (1807).
- coerulescens** LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 252. 145. (1869). Rhodus Ins.
- constans* MEIG. = **equestris** FABR.
- constans** ROSSI, Mant. ins., II. 62. 530. t. IV. f. A. [*Syrphus*] (1794); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 131. (1865). Italia.
- montanus* ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 63. 13. (1857); STROBL., Tief's Nachl., 41. (1909) et Mittheil. Ver. Steiern., XXXIV. 227. (1898).
- carripes* GMEI. **clavipes** FABR.
- distinctus* PALMA **annulatus** FABR.
- eques** FABR., Syst. Antl., 193. 23. [*Milesia*] (1805); WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 148. 2. (1830). Algeria.
- equestris** FABR., Entom. syst., IV. 292. 51. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 196. 2. (1805); PASZ., Fauna germ., LX. 1 et 2. [*Syrphus*] (1798); MEIG., S. B., III. 352. 2. t. XXXI. f. 23. (1822) et VII. 141. (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 292. (144). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 514. 3. (1834); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 598. (1840); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 411. 3. (1857) et F. A., I. 344. (1862); KALTENB., Verh. nat. Ver. Rheinl., XXI. 253. 1. Europa centr. et mer., Africa sept.

(1864) et Pflanzenf., 718. 1. (1874); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 131. (1865); OST-SACK., Cat. N. A. Dipt., 135. (1878); VERR., Entom. Monthly Mag., VI. 175. (1870) et Brit. Fl., VIII. 556. 1. f. 380—381. (1901); PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 185. (1877); RITSEM., Tijdschr. Entom., XXVI. p. XXIII et XXVII. (1883); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 89. (1901); BIGNELL., Entom. Monthly Mag., (2). XII. 10. (1901); MELI., Zool. Jahrbüch., XV. 678. f. 40—42. (1903).

bulborum ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 256. (1845), Dipt. ital. Prodr., II. 61. 8. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 130. (1865); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 89. (1900).

constans MEIG. (nec ROSSI), S. B., III. 354. 5. (1822).

ferrugineus FABR., Syst. Antl., 240. 35. [*Eristalis*] (1805); MEIG., S. B., III. 355. 7. (1822); WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 148. 1. (1830).

flavicans FABR., Entom. syst., IV. 292. 52. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 242. 40. [*Eristalis*] (1805); MEIG., S. B., III. 355. 8. (1822); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 89. (1900).

fusciformis SCHELL. (nec FABR.), Genf. Mouch. Dipt., 54. t. XI. f. 1. [*Syrphus*] (1803).

narcissi FABR., Syst. Antl., 239. 32. [*Eristalis*] (1805); MEIG., S. B., III. 354. 6. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 293. (145). 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 514. 5. (1834); BOUCHÉ, Naturg., 52. 36. t. V. f. 7—11. (1834) et Stettin. entom. Zeitg., VI. 150. (1845); LW., Stettin. entom. Zeitg., II. 25. 1. (1841); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 598. (1849); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 131. (1865); KALTENB., Pflanzenf., 718. 2. (1874); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 89. (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 558. (1901).

nigrithorax BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 89. (1900).

nobilis MEIG., S. B., III. 353. 3. (1822) et VII. 141. (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 293. (145). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 514. 4. (1834); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 89. (1900).

transversalis MEIG., S. B., III. 354. 4. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 294. (146). 5. (1827); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 131. (1865); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 89. (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 558. (1901).

tuberculatus ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 256. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 61. 9. (1857).

validus MEIG., S. B., III. 365. 24. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 296. (148). 9. (1827) et Suit. à Buff., I. 517. 13. (1834); SCHIN., F. A., I. 347. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 558. (1901).

ferrugineus FABR. = **equestris** FABR.

flavicans FABR. = **equestris** FABR.

fusciformis SCHELL. = **equestris** FABR.

fulvus MACQ. = **pruni** ROSSI.

- funestus** FABR., Entom. syst., IV. 302. 89. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Europa mer.
Antl., 245. 58. [*Eristalis*] (1805); MEIG., S. B., III. 365. 25. (1822);
MACQ., Suit. à Buff., I. 517. 14. (1834); ROND., N. Annal. Sci. Nat.
Bologna, (2). IV. 261. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 64. 15. (1857);
SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 415. 22. (1857) et F. A.,
I. 347. (1862).
- fuscinervis** v. RÖD., Berlin. entom. Zeitschr., XXXI. 73. (1887). Creta Ins.
- graeus** LW. (nec WALK.), Wien. entom. Monatschr., VI. 165. 41. (1862). Graecia.
- graeus* WALK. = **avidus** ROSSI.
- gravipes* ROSSI = **clavipes** FABR.
- gudaurensis** PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 182. (1877); VERR., Caucasus.
Cat. europ. Syrph., 90. (1000).
- inermis** MACQ., Suit. à Buff., I. 517. 16. (1834); MEIG., S. B., VII. 142. Patria ignota.
31. (1838).
- italicus* ROND. = **melancholicus** FABR.
- Kneri* MIK = **aberrans** EGG.
- melancholicus** FABR., Entom. syst., IV. 302. 90. [*Syrphus*] (1794) et Europa mer.
Syst. Antl., 245. 59. [*Eristalis*] (1805); MEIG., S. B., III. 358. 13.
(1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 515. 8. (1834); SCHN., Verh. zool.-
bot. Ges. Wien, VII. 413. 8. (1857); VERR., Cat. europ. Syrph.,
91. (1900).
- italicus* ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 259. (1845)
et Dipt. ital. Prodr., II. 62. 12. (1857).
- natans* FABR., Entom. syst., IV. 283. 18. [*Syrphus*] (1794) et
Syst. Antl., 193. 20. [*Milesia*] (1805); MEIG., S. B., III. 362.
20. (1822) et VI. 354. (1830).
- minutus** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 77. (1893); BEZZI, Bull. Italia mer.
Soc. entom. ital., XXVII. 16. (1895).
- moenium** MEIG., S. B., III. 362. 19. (1822); SCHN., Verh. zool.-bot. Europa mer.
Ges. Wien, VII. 415. (1857).
- montanus* ROND. = **constans** ROSSI.
- mucronatus** ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 60. 6. (1857); STROBL, Glas- Europa mer.
nik Zem. Mus. Bosn. Hereceg., X. 439. (1898) et Wiss. Mittheil.
Bosn. Hereceg., VII. 593. (1900).
- var. trebevicensis* STROBL, Wiss. Mittheil. Bosn. Hereceg., VII. Bosnia.
594. (1900).
- narcissi* FABR. = **equestris** FABR.
- natans* FABR. = **melancholicus** FABR.
- nigritarsis** ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 264. (1845) Europa centr.
et Dipt. ital. Prodr., II. 55. 17. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. et mer.
Ges. Wien, VII. 415. 14. (1857) et F. A., I. 345. (1862).
- nigrithorax* BEZZI = **equestris** FABR.
- nobilis* MEIG. = **equestris** FABR.
- obscuripennis* PALMA = **aberrans** EGG.
- osmioides** PERR., Annal. Soc. Linn. Lyon, 1850—52. 201. (1852). Gallia mer.
- pallidus** MACQ., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 128. (70). I. t. XIII. f. 1. Asia min.
(1842).

- parietum** MEIG., S. B., III. 360. 17. (1822); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 414. 11. (1857). Europa mer.
- planiceps** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VI. 84. 54. (1862). Graecia.
- posticatus* MEIG. = **cinereus** FABR.
- pruni** ROSSI, Fauna etr., II. 293. 1473. t. X. f. 7. [*Syrphus*] (1790); Italia.
ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 452. 1473. [*Syrphus*] (1807); Lw.,
Beschreib. europ. Dipt., I. 254. (1869); Bezzi, Bull. Soc. entom.
ital., XXXII. 90. 432. (1900).
fulvus MACQ., Suit. à Buff., I. 514. 2. (1834); MEIG., S. B., VII.
141. 29. (1838).
sicanus ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 264. (1845),
Dipt. ital. Prodr., II. 65. 18. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat.,
VIII. 132. (1865).
- pudicus** ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 56. 1. (1857). Italia.
- pumilus* MACQ. = **aeneus** MEIG.
- quadrilineatus* LLOY = **spinipes** FABR.
- rubidiventris** A. COSTA, Rendic. Acc. Napoli, XXIII. 173. (1884), Sardinia.
Atti Acc. Sei. Napoli, XXIV. 30. (1885) et Bull. Soc. entom. ital.,
XVII. 253. 9. (1885).
ruficornis MEIG. = **spinipes** FABR.
- rufitibius* ROND. = **avidus** ROSSI.
- rufus** MEIG., S. B., VII. 142. 30. (1838); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Europa mer.
Wien, VII. 416. 25. (1857) et F. A., I. 347. (1862); STROBL, Wien.
entom. Zeitg., XII. 76. (1893).
- segetum** FABR., Entom. syst., IV. 289. 38. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Africa sept.
Antl., 238. 26. [*Eristalis*] (1805); COQUEB., III. icon., 104. t. XXIII.
f. 15. [*Syrphus*] (1804); WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 151. 6 et
195. 63. [*Eristalis*] (1830).
- senilis** MEIG., S. B., III. 356. 9. t. XXXI. f. 15. (1822); MACQ., Suit. Italia.
à Buff., I. 515. 6. (1834); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 54. 11.
(1857).
- serrulatus** MEIG., S. B., III. 360. 16. (1822); SCHN., Verh. zool.-bot. Hispania.
Ges. Wien, VII. 413. 10. (1857); STROBL, Wien. entom. Zeitg.,
XII. 76. (1893).
- sicanus* ROND. = **pruni** ROSSI.
- spinipes** FABR., Entom. syst., IV. 296. 66. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Europa centr.
Antl., 197. 5. (1805); PANZ., Fauna germ., LX. 6 et 7. [*Syrphus*] et mer.
(1798); COQUEB., III. icon., 105. t. XXIII. f. 18. [*Syrphus*] (1804);
LATR., Gen. crust. ins., IV. 331. [*Milesia*] (1809); FALL., Dipt.
Succ. Syrph., 32. *nota*. (1817); MEIG., S. B., III. 361. 18. (1822);
MACQ., Soc. Sei. Lille, 1827. 295. (147). 7. (1827) et Suit. à Buff.,
I. 516. 11. (1834); ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV.
258. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 66. 19. (1857); SCHN., Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, VII. 414. 13. (1857) et F. A., I. 345. (1862);
VERR., Cat. europ. Syrph., 92. (1900).
quadrilineatus LLOY, Atti Istit. Ven., (3). IX. 743. (1864).
ruficornis MEIG., S. B., III. 358. 14. (1822); MACQ., Suit. à Buff.,

- I. 516. 9. (1834); ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 265. (1845); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 413. 9. (1857) et F. A., I. 346. (1862).
- viaticus* FABR., Syst. Antl., 197. 6. (1805); MEIG., S. B., III. 364. 22. (1822) et VI. 354. (1330); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 296. (148). 8. (1827).
- subfasciatus** ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 261. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 57. 2. (1857); MINÀ PAL., Nat. Sicil., VI. 21. (1896). Italia.
- submetallicus** ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 63. 14. (1857); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 189. (1893). Europa centr. et mer.
- transversalis* MEIG. = **equestris** FABR.
- trobvicensis* STROBL. = **mucronatus** ROND. var.
- trochanteratus** A. COSTA, Rendic. Acc. Napoli, XXIII. 173. (1884). Sardinia.
trochantericus A. COSTA, Atti Acc. Sci. Napoli, XXIV. 29. (1885) et Bull. Soc. entom. ital., XVII. 253. 8. (1885).
- trochantericus* A. COSTA = **trochanteratus** A. COSTA.
- tuberculatus* ROND. = **equestris** FABR.
- validus* MEIG. = **equestris** FABR.
- varius** ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). IV. 262. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 64. 16. (1857). Italia.
- velox** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 253. 146. (1869). Asia min.
- viaticus* FABR. = **spinipes** FABR.
- virescens* BREM. = ? **cinereus** FABR.

Milesiinae.

Tropidia

MEIG., S. B., III. 346. CXIII. (1822).

Milesiformis ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 454. (1844).

dorsalis MACQ. = **scita** HARR.

Fallenii ROND. = **scita** HARR.

fasciata MEIG., S. B., III. 346. 1. t. XXXI. f. 13. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 287. (139). 3. t. III. f. 2. (1827) et Suit. à Bull. I. 519. 3. t. XI. f. 21. (1834); SCHN., Verh. zool. bot. Ges. Wien, VII. 417. 1. (1857) et F. A., I. 348. (1862). Europa centr.

Marsanii PERR., Annal. Soc. Linn. Lyon, 1850—52. 201. (1852). Gallia mer.

milesiformis FALL. = **scita** HARR.

rafomaculata CURT. = **scita** HARR.

scita HARR., Expos. engl. Ins., 107. t. XXXII. f. 41. [*Masca*] (1776); VERR., Brit. Fl., VIII. 568. t. f. 395—399. (1901). Europa.

dorsalis MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 285. (137). 1. (1827) et Suit. à Bull., I. 518. 2. (1834); MEIG., S. B., VII. 141. 3. (1838).

Falleii ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 454. [*Milesiformis*] (1844).

milesiformis FALL., Dipt. Succ. Syrph., 52. 5. [*Eristalis milesiformis*] (1817); MEIG., S. B., III. 347. 2. t. XXXI. f. 14. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 286. (138). 2. t. III. f. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 518. 1. (1834); Lw., Programm Posen, 37. 1. (1840) et Isis, 1840. 574. 1. (1840); ZETT., Dipt. Scand., II. 883. 1. (1843); WALK., Ins. Brit., I. 253. 1. t. IX. f. 8. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 417. 2. (1857) et F. A., I. 349. (1862).

rafomaculata CURT., Brit. Entom., 401. (1830).

sinensis MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 111. (91). 2. (1855).

China sept.

Kirimyia

BIG., Bull. Soc. entom. France, (6). II. V. (1882).

eristaloidea BIG., Bull. Soc. entom. France, (6). II. V. (1882) et (6). Japonia. III. 347. (1883).

Myiolepta

NEWM., Entom. Mag., V. 373. [*Myiolepta*] (1838) *em* VERR. ap. SCUDD. 1882.

Leptomylia WALK., Ins. Brit., I. 254. (1851).

Xylotaeja ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 457. (1844).

dubia FABR. — *luteola* GMEL.

lateralis FALL. — *luteola* GMEL.

luteola GMEL., Syst. Nat., V. 2879. 379. [*Musca*] (1788); NEWM., Entom. Mag., V. 373. (1838); WALK., Ins. Brit., I. 256. 6. [*Xylota*] (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 374. 1. (1857) et F. A., I. 325. (1862); BECH., Wien. entom. Zeitz., I. 252. (1882); VERR., Brit. Fl., VIII. 573. 1. f. 400—402. (1901).

dubia FABR., Syst. Antl., 221. 14. [*Thereva*] (1805); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 97. 2. [*Xylotaeja*] (1857).

lateralis FALL., Dipt. Succ. Syrph., 41. 4. [*Eristalis*] (1817); MEIG., S. B., III. 224. 18. [*Xylota*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 281. (133). 9. [*Xylota*] (1827) et Suit. à Buff., I. 522. 9. [*Xylota*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 880. 15. [*Xylota*] (1843).

? *potens* HARR., Expos. engl. Ins., 110. t. XXXIII. f. 53. [*Musca*] (1776).

nigra Lw. — ? *obscura* BECH.

obscura BECH., Wien. entom. Zeitz., I. 250. (1882); VERR., Cat. europ. Austria. Syrph., 95. (1900).

? *nigra* Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVI. 84. 52. (1872); WILL., Syn. N. A. Syrph., 129. t. IV. f. 15. (1886).

palustris Scop. ? **vara** Panz.

potens Harr. = ? **luteola** Gmel.

rara Fabr. - **vara** Panz.

ruficornis Zett., Dipt. Scand., II. 847. 3. (1843) et VIII. 3187. 3. Europa centr.
 [*Psilota*] (1849); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 715. et mer.
 (1858) et IX. 388. (1859); Schm., F. A., I. 325. (1862).

vara Panz., Fauna germ., LIV. 8. [*Syrphus*] (1798); Meig., S. B., III. Europa centr.
 214. 2. [*Xylota*] (1822) et VII. 116. [*Criorrhina*] (1838); Macq., et mer.
 Soc. Sci. Lille, 1827. 282. (134). 10. [*Xylota*] (1827) et Suit. à
 Buff., I. 523. 1. [*Brachypalpus*] (1834); Rond., Dipt. ital. Prodr.,
 II. 97. 1. [*Xylotaecja*] (1857); Schm., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
 VII. 442. 1. [*Brachypalpus*] (1887) et F. A., I. 325. (1862); Egg.,
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 708. (1858).

? *palustris* Scop., Entom. Carn., 345. 930. [*Musca*] (1763).

rara Fabr., Syst. Antl., 193. 24. [*Milesia*] (1805).

Criorrhina

Meig., S. B., III. 236. B. (1822) et VII. 115. [*Criorrhina*] (1838) em. Walk. 1855.

Brachymyia Will., Can. Entom., XIV. 77. (1882).

Eriophora Phil., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 736. (1865).

Eurinomallota Big., Bull. Soc. entom. France, (6). II. LXVII.

[*Eurhynomallota*] (1882).

Heliophilus Meig., Illig. Mag., II. 273. (1803).

Somula Macq., Dipt. exot. Suppl., II. 73. (57). (1847).

apiformis Macq. - **paclhymera** Egg.

asilica Fall., Dipt. Succ. Syrph., 22. 10. [*Syrphus*] (1816); Meig., Europa.
 S. B., III. 238. 14. [*Milesia*] (1822); St. Farg. Serv., Encycl.
 méthod., X. 518. [*Milesia*] (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827.
 327. (179). 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 498. 5. (1834); Zett., Dipt.
 Scand., II. 672. 2. (1843). XII. 4653. 2. (1855) et XIII. 5083. 2.
 (1859); Walk., Ins. Brit., I. 259. 5. (1851); Schm., Verh. zool.-bot.
 Ges. Wien, VII. 439. 1. (1857) et F. A., I. 351. (1862); Bonnd.,
 Finkl. Insekt., I. 224. 1. (1861); Malm, Kongl. Vet. Handl., 1863.
 19. (1863); Verh., Brit. Fl., VIII. 585. 5. f. 404. (1901).

rufipila Meig., S. B., III. 215. 4. [*Xylota*] (1822).

berberina Fabr., Syst. Antl., 240. 33. [*Eristalis*] (1805); Meig., S. Europa.
 B., III. 237. 11. t. XXIX. f. 9. [*Milesia*] (1822) et VII. 116. (1838);
 St. Farg. Serv., Encycl. méthod., X. 518. [*Milesia*] (1825); Macq.,
 Soc. Sci. Lille, 1827. 326. (178). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 497.
 2. (1834); Lw., Programm Posen, 29. 1. (1840) et Isis, 1840. 562.
 1. (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 674. 3. (1843) et VIII. 3114. 3.
 (1849); Walk., Ins. Brit., I. 258. 2. (1851); Rond., Dipt. ital.
 Prodr., II. 74. 3. (1857); Schm., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII.
 440. 4. (1857) et F. A., I. 350. (1862); Gerst., Geb. Entom., 1863.

201. (1863); PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 187. (1877); VERR., Brit. Fl., VIII. 580. 2. (1901).
- bombiformis* PERR. = **oxyacanthae** MEIG.
- Brebissonii* MACQ. = **oxyacanthae** MEIG.
- brevipila** Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 235. 127. (1871). Sibiria.
- femorata* ROND. = **pachymera** EGG.
- flavicauda* MACQ. = **ranunculi** PANZ.
- floccosa** MEIG., S. B., III. 238. 13. [*Milesia*] (1822); ST. FARG. SERV., Europa.
Encycl. méthod., X. 518. [*Milesia*] (1825); MACQ., Soc. Sci. Lille,
1827. 327. (1827) et Suit. à Buff., I. 498. 4. (1834); ROND., Dipt.
ital. Prodr., II. 75. 6. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
VII. 439. 2. (1857) et F. A., I. 351. (1862); PORTSCH., Trudy Russk.
entom., X. 189. (1877); VERR., Brit. Fl., VIII. 583. 4. f. 403. (1901).
regulus FALL., Dipt. Suec. Suppl., 9. [*Syrphus*] (1826); ZETT.,
Dipt. Scand., II. 672. 1. (1843); WALK., Ins. Brit., I. 259. 4.
(1851).
- haemorrhoidalis* MEIG. = **ranunculi** PANZ.
- narcissi* SAM. = **oxyacanthae** MEIG.
- oxyacanthae** MEIG., S. B., III. 237. 12. [*Milesia*] (1822); ST. FARG. Europa,
SERV., Encycl. méth., X. 518. [*Milesia*] (1825); MACQ., Soc. Sci. Japonia.
Lille, 1827. 326. (178). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 498. 3. (1834);
v. Ros., Württemb. Corbl., 1834. 10. (1834); ZETT., Dipt. Scand.,
VIII. 3114. *observ.* (1849); WALK., Ins. Brit., I. 259. 3. t. IX. f.
12. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 75. 5. (1857); SCHN.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 440. 3. (1857) et F. A., I. 351.
(1862); GERST., Geb. Entom., 1863. 201. (1863); PORTSCH., Trudy
Russk. Entom., X. 187. (1877); VERR., Brit. Fl., VIII. 581. 3. (1901).
bombiformis PERR., Annual. Soc. entom. France, VIII. 54. t. VI.
f. 3. *a-b*. (1839).
Brebissonii MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 328. (180). 6. (1827) et
Suit. à Buff., I. 498. 6. (1834); MEIG., S. B., VII. 117. 16.
(1838); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 75. 4. (1857).
narcissi SAMUELLE (*nec* FAER.), Entom. compend., I. 16. (1889);
STEPH., Syst. Cat. Brit. Ins., 291. (1829).
- pachymera** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 712. (1858); SCHN., Europa centr.
F. A., I. 349. (1862).
apiformis MACQ. (*nec alior.*), Soc. Sci. Lille, 1827. 329. (181). 9.
(1827) et Suit. à Buff., I. 499. 9. (1834); MEIG., S. B., VII.
118. 18. (1838).
femorata ROND. (*nec alior.*), Dipt. ital. Prodr., II. 75. 7. (1857).
- Piccioii* ROND. = **ranunculi** PANZ.
- ranunculi** PANZ., Fauna germ., XCI. 21. [*Syrphus*] (1805); MEIG., S. Europa.
B., III. 239. 16. [*Milesia*] (1822); WALK., Ins. Brit., I. 258. 1.
(1851); EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 391. [*Milesia*] (1856);
ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 74. 1. (1857); VERR., Brit. Fl., VIII.
578. 1. (1901).
flavicauda MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 329. (181). 8. (1827) et

Suit. à Buff., I. 499. 8. (1834); MEIG., S. B., VII. 117. 17. (1838); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1903. 126. III. (1903).

haemorrhoidalis MEIG., S. B., III. 215. 3. [*Nyglota*] (1822).

Piccioii ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 133. (1865).

ruficauda MEIG., S. B., III. 239. 15. [*Milesia*] (1822); ST. FARG. SERV., Encycl. méth., X. 518. [*Milesia*] (1825); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 328. (180). 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 498. 7. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 597. (1849); EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 391. (1856); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 441. 7. (1857) et F. A., I. 350. (1862); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 23. (1868); PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 186. (1877).

regulus FALL. — **floccosa** MEIG.

ruficauda MEIG. = **ranunculi** PANZ.

rufipila MEIG. — **asilica** FALL.

Pocota

ST. FARG. SERV., Encycl. méthod., X. 518. (1825).

Dasymyia EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 711. (1858).

Hudromyia WILL., Can. Entom., XIV. 78. (1882).

Plocota SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 440. (1857) et F. A., I. 352. (1862).

apivata MEIG. = **apiformis** SCHRANK.

apiformis SCHRANK, Enum. ins., 459. 933. [*Musca*] (1781) et Fauna Europa. boica, III. 117. 2436. [*Musca*] (1803); GMEL., Syst. Nat., V. 2862. 296. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 543. 370. [*Musca*] (1789); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 440. 5. [*Criorhina*] (1857) et F. A., I. 352. [*Plocota*] (1862); EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 711. [*Dasymyia*] (1858); VERR., Entom. Monthly Mag., VII. 203. (1871) et Brit. Fl., VIII. 587. 1. f. 405. (1901); PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 189. [*Plocota*] (1877); BECH., Wien. entom. Zeitg., I. 249. (1882).

apivata MEIG., S. B., III. 236. 10. t. XXIX. f. 4. [*Milesia*] (1822); ST. FARG. SERV., Encycl. méth., X. 519. (1825); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 325. (177). 1. t. III. f. 8. [*Criorhina*] (1827) et Suit. à Buff., I. 497. 1. t. XI. f. 12. [*Criorhina*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3114. 3 - 4. (1849) et XII. 4653. 3 - 4. [*Criorhina*] (1855); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 74. 2. [*Criorhina*] (1857).

Cynorrhina

WILL., Syn. N. A. Syrph., 209. [*Cynorrhina*] (1886) em. VERR.

- fallax** L., Syst. Nat., X. 592. [*Musca*] (1758), XII. H. 985. 35. [*Musca*] Europa.
(1767) et Fauna suec., 1802. [*Musca*] (1761); FABR., Spec. ins.,
H. 426. 26. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 291. 47. [*Syrphus*]
(1794) et Syst. Antl., 190. 10. [*Milesia*] (1805); GMEL., Syst. Nat.,
V. 2871. 35. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 438. 84.
[*Musca*] (1789); MEIG., S. B., III. 235. 9. t. XXIX. f. 10. [*Milesia*]
(1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 253. (110). 4. [*Milesia*] (1827)
et Suit. à Buff., I. 534. 8. [*Milesia*] (1834); ZETT., Dipt. Scand.,
II. 860. 6. [*Milesia*] (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 566.
[*Milesia*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 436. 7.
[*Spilomyia*] (1857) et F. A., I. 350. [*Criorhina*] (1862); ROND.,
Dipt. ital. Prodr., II. 72. 2. [*Calliprobola*] (1857); BONSD., Finnl.
Insekt., I. 287. 5. [*Milesia*] (1861); WILL., Syn. N. A. Syrph., 209.
(1886). VERR., Brit. Fl., VIII. 590. I. f. 406. (1901).
ruficaudis DEG., Ins., VI. 127. 7. [*Musca*] (1776) et ed. Götze,
VI. 74. 7. [*Musca*] (1782).
semirufa FABR., Entom. syst., IV. 301. 85. [*Syrphus*] (1794) et
Syst. Ant., 243. 51. [*Eristalis*] (1805); FALL., Dipt. Suec.
Syrph., 51. 3. [*Eristalis*] (1817).

ruficaudis DEG. = **fallax** L.

semirufa FABR. = **fallax** L.

Brachypalpus

MACQ., Suit. à Buff., I. 523. 24. (1834).

angustatus SCHIN. = **bimaculatus** MACQ.

angustus EGG. = **bimaculatus** MACQ.

bimaculatus MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 282. (134). 11. [*Xylota*] Europa centr.
(1827) et Suit. à Buff., I. 524. 2. t. XII. f. 2. (1834); MEIG., S. B.,
VII. 116. 7. [*Criorhina*] (1828); VERR., Brit. Fl., VIII. 594. I. f.
407. (1901).

angustatus SCHIN., F. A., I. 353. (1862).

angustus EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 665. (1860);

SCHIN., F. A., I. 352. (1862).

femoratus STEPH. (nec L.), III. Brit. Entom. Suppl., 30. t. XLVI.
f. 4. [*Criorhina*] (1846); WALK., Ins. Brit., I. 259. 6. [*Crior-*
hina] (1851).

chrysites EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 388 et 405. (1859); Europa centr.
SCHIN., F. A., I. 353. (1862).

rufipilus EGG. (nec MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 708.
(1858).

eunotus LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 213. 133. (1873).

Hungaria.

femoratus FABR. = **valgus** PANZ.

femoratus MEIG. = **Meigenii** SCHIN.

femoratus STEPH. — **bimaculatus** MACQ.

laphriformis FALL., Dipt. Suec. Syrph., 22. 11. [*Syrphus*] (1816); Europa.
GERST., Troschel Arch., 1862. 294. (1862).

valgus ZETT. (nec PANZ.), Dipt. Scand., II. 868. 1. [*Xylota*] (1843)
et VIII. 3191. 1. (1849); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 78. 2.
(1857).

Meigenii SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 443. 3. (1857) et Europa centr.
F. A., I. 353. (1862).

femoratus MEIG. (nec L.), S. B., III. 216. 6. [*Xylota*] (1822);
MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 283. (135). 12. [*Xylota*] (1827)
et Suit. à Buff., I. 524. 3. (1834); Lw., Programm Posen,
28. 2. [*Xylota*] (1840) et Isis, 1840. 561. 1. [*Xylota*] (1840);
EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 708. (1858).

olivaceus MEIG. = **valgus** PANZ.

rufipilus EGG. = **chrysites** EGG.

tuberculatus MACQ. = **valgus** PANZ.

valgus PANZ., Fauna germ., LIV. 7. [*Syrphus*] (1798); MEIG., S. B., Europa centr.
III. 217. 7. [*Xylota*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 283. (135). et mer.
13. [*Xylota*] (1827) et Suit. à Buff., I. 524. 4. (1834); BREM., Isis,
III. 170. (1846); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 442. 2.
(1857) et F. A., I. 353. (1862); EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
VIII. 708. (1858).

femoratus FABR. (nec L.), Syst. Entom., 772. 48. [*Syrphus*] (1775),
Spec. ins., II. 429. 37. [*Syrphus*] (1781), Mant. ins., II. 338.
[*Syrphus*] (1787), Entom. syst., IV. 296. 65. [*Syrphus*] (1794)
et Syst. Antl., 197. 4. [*Merodon*] (1805); VILL., Entom. linn.,
III. 453. 107. [*Musca*] (1789); ? SCOP., Entom. carn., 355. 963.
[*Conops*] (1763).

olivaceus MEIG., S. B., III. 215. 5. [*Xylota*] (1822); ROND., Dipt.
ital. Prodr., II. 78. 1. (1857).

tuberculatus MACQ., Suit. à Buff., I. 524. 5. (1834); MEIG., S. B.,
VII. 117. 8. [*Criorhina*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3191.
(1849).

valgus ZETT. = **laphriformis** FALL.

Zugmayeriae MÜK., Wien. entom. Zeitg., VI. 164. 5. (1887).

Caucasus.

Xylota

MEIG., S. B., III. 211. CIII. (1822).

Eumeros MEIG., Illig. Mag., II. 273. (1803).

Micraptoma WESTW., Introd. Synopsis, 136. (1840).

Zelima MEIG., Nouv. class. Mouches, Paris (1800).

abiens MEIG., S. B., III. 218. 9. (1822); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. Europe centr.,
80. 2. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 423. 12. Alpes.
(1857) et F. A., I. 357. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., VII.

202. (187). et Brit. Fl., VIII. 609. 7. f. 415. (1901); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 191. (1893).

semulater HARR., Expos. engl. Ins., 112. t. XXXIII. f. 58. [*Musca*] (1776).

tristor HARR., Expos. engl. Ins., 107. t. XXXII. f. 42. [*Musca*] (1776).

bifusciata MEIG. = **nemorum** FABR.

brassicariae DONOV. — **segnis** L.

caeruleiventris ZETT., Ins. Lapp., 586. 5. (1838) et Dipt. Scand., II. Europa centr.
873. 7. (1843) et VIII. 3192. 7. (1849); BONSD., Finnl. Ins., I. 291. et mer.
6. (1861); LW., Krak. Gel. Ges., XLI. 17. 26. (1870).

confinis ZETT. = **tarda** MEIG.

crassipes WAHLBG. = **pigra** FABR.

cuprina COQUILL., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 327. (1898).

Japonia.

curvipes LW., N. Beitr., II. 19. 41. (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Europa centr.
(Ges. Wien, VII. 420. 4. (1857) et F. A., I. 356. (1862); OST-SACK.,
Bull. Buffalo Soc. N. Sci., III. 70. (1875) et Cat. N. A. Dipt. 2. ed.,
252. (1878); WILL., Syn. N. A. Syrph., 232. (1886); CHAGNON, Nat.
Can., 1901. 63. (1901).

satania BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 546. (1883).

eumera LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 254. 147. (1869).

Rossia mer.

femorata L., Syst. Nat., X. 595. [*Musca*] (1758), XII. II. 988. 58. Europa,
[*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1824. [*Musca*] (1761); GMEL., Syst. China.
Nat., V. 2877. 58. [*Musca*] (1788); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 11.
8. [*Milesia*] (1816); ZETT., Ins. Lapp., 586. 7. (1838) et Dipt.
Scand., II. 876. 10. (1843); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
VII. 419. 3. (1857) et F. A., I. 355. (1862); BONSD., Finnl. Insekt.,
I. 293. 9. (1861).

volvulus FABR., Entom. syst., IV. 295. 62. [*Syrphus*] (1794) et
Syst. Antl., 192. 15. [*Milesia*] (1805); MEIG., S. B., III. 223.
16. t. XXVIII. f. 29. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 278.
(130). 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 520. 2. (1834); LW., Pro-
gramm Posen, 29. 4. (1840) et Isis, 1840. 562. 4. (1840).

florum FABR., Syst. Antl., 250. 7. [*Scavra*] (1805); MEIG., S. B., III. Europa.
217. 8. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 280. (132). 7. (1827)
et Suit. à Buff., I. 521. 4. t. XII. f. 1. (1834); WESTW., Introd.,
II. 559. f. 131. 5. (1840); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII.
422. 11. (1857) et F. A., I. 356. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I.
293. 11. (1861); VERR., Entom. Monthly Mag., VII. 203. (1871) et
Brit. Fl., VIII. 606. 6. f. 414. (1901); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm.,
XXIX. 190. (1893).

lugens ROSSI, Fauna etr., II. 298. 1485. [*Syrphus*] (1790); ILLIG.,
Fauna etr. Rossi, II. 458. 1485. [*Syrphus*] (1807).

nemorum MEIG. (nec FABR.), S. B., III. 219. 11. (1822); MACQ.,
Soc. Sci. Lille, 1827. 279. (131). 6. (1827) et Suit. à Buff., I.
521. 3. (1834). ZETT., Ins. Lapp., 585. 3. (1838) et Dipt. Scand.,
II. 871. 3. (1843) et VIII. 3191. 3. (1849); WALK., Ins. Brit.,

- I. 256. 5. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 80. 3. (1857);
 BOSSD., Finnl. Insekt., I. 290. 2. (1861).
- florum* ROND. = **nemorum** FABR.
- florum* ZETT. = **nigripes** ZETT.
- facata* HARR. = **segnis** L.
- fulviventris** BIG., Annal. Soc. entom. France, (4). 1. 228. 2. (1861); Corsica.
 ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 23. (1868).
- haematodes* FABR. = **pigra** FABR.
- ignava* FALL. = **nemorum** FABR.
- ignava** PANZ., Fauna germ., LX. 4. [*Syrphus*] (1798); LATR., Gen. Europa.
 crust. ins., IV. 331. [*Milesia*] (1809); MEIG., S. B., III. 221. 13.
 (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 277. (129). 2. (1827) et Suit.
 à Buff., I. 522. 6. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 875. 9. (1843),
 VIII. 3192. 9. (1849) et XIII. 6039. 9. (1859); ROND., Dipt. ital.
 Prodr., II. 80. 6. (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII.
 421. 7. (1857) et F. A., I. 355. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I.
 292. 8. (1861).
- impigra* ROSSI = **silvarum** L.
- lenta** MEIG., S. B., III. 222. 15. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. Europa.
 280. (132). 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 522. 8. (1834); ZETT., Ins.
 Lapp., 586. 5. (1838) et Dipt. Scand., II. 877. 11. (1843); WALK.,
 Ins. Brit., I. 255. 2. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 81. 7.
 (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 420. 6. (1857) et
 F. A., I. 355. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 601. 3. f. 411. (1901).
- pigra* PANZ. (*nee* FABR.), Fauna germ., LX. 5. [*Syrphus*] (1798);
 SCHRANK, Fauna boica, III. 184. 2429. [*Musca*] (1803); FALL.,
 p. p., Dipt. Succ. Syrph., 11. 7. [*Milesia*] (1816).
- longa** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 327. (1898). Japonia.
- longisco* HARR. = **silvarum** L.
- lugens* ROSSI = **florum** FABR.
- maritima* SCOP. = ? **segnis** L.
- nemorum** FABR., Syst. Antl., 192. 17. [*Milesia*] (1805); LW., Zeitschr. Europa.
 Ges. Naturwiss., XIII. 103. 109. (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot.
 Ges. Wien, VII. 423. 13. (1857) et F. A., I. 356. (1862); VERR.,
 Entom. Monthly Mag., VII. 203. (1871) et Brit. Fl., VIII. 604. 5.
 f. 413. (1901); WILL., Syn. N. A. Syrph., 231. (1886).
- bifasciata* MEIG., S. B., III. 219. 10. (1822); CURT., Brit. Entom.,
 425. (1832); ZETT., Ins. Lapp., (?) 585. 2. (1838) et Dipt.
 Scand., II. 872. 4. (1843), VIII. 3191. 4. (1849); ? WALK., Ins.
 Brit., I. 256. 4. (1851); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 291. 3. (1861).
- florum* ROND. (*nee* FABR.), Dipt. ital. Prodr., II. 80. 4. (1857).
- ignava* FALL. (*nee* PANZ.), Dipt. Succ. Syrph., 11. 6. [*Milesia*]
 (1816).
- nemorum* MEIG. = **florum** FABR.
- oigra* WALK. = **pigra** FABR.
- nigripes** ZETT., Ins. Lapp., 585. 4. (1838) et Dipt. Scand., II. 880. 14. Scandinavia.
 (1843) et VIII. 3193. 14. (1849).

- florum* ZETT. (nec FABR.), Dipt. Scand., II. 879. 13. (1843).
- nitida** PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XV. 137. (1880). Russia.
- pictipes** LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 237. 129. (1871); BECK., Acta Soc. Sci. Fenn., XXVI. 45. 69. (1900). Europa sept.,
Siberia.
- pigra** FABR., Entom. syst., IV. 295. 63. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 192. 16. [*Milesia*] (1805); LATR., Gen. Crust. Ins., IV. 331. [*Milesia*] (1809); FALL., Dipt. Suec. Syrph., II. var. b. [*Milesia*] (1816); MEIG., S. B., III. 221. 14. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 277. (129). 3. (1887) et Suit. à Buff., I. 522. 7. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 878. 12. (1843); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 420. 5. (1857) et F. A., I. 355. (1862); BONSD., Finn. Insekt., I. 293. 10. (1861); PERR., Annal. Soc. entom. France, (4). X. 326. 20. t. IV. f. 112—124. (1870); WILL., Syn. N. A. Syrph., 227. f. XI. f. 7. (1886); TYL.-TOWNS., Trans. am. entom. Soc., XXII. 53. (1895); CHAGNON, Nat. Can., 1901. 63. 1. (1901); How., Insect Book, t. XXI. f. 16. (1902); DAECKE, Entom. News, XIV. 275. (1903); ALDRICH, Cat. N. A. Dipt., 399. (1905).
- crassipes* WAHLBG., Öfv. Vet. Akad. Handl., 1838. 15. (1838).
- haematodes* FABR., Syst. Antl., 193. 21. [*Milesia*] (1805); SAY, Amer. Entom., I. 16. t. VIII. f. 4. (1824) et Compl. Writ., I. 16. (1859); WIED., Auser. zweifl. Ins., II. 99. 3. (1830); MACQ., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 131. (73). 1. t. XIII. f. 4. (1842).
- nigra* WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 554. (1849).
- pini* PERR., Annal. Soc. entom. France, (4). X. 330. (1870).
- pigra* PANZ. = **lenta** MEIG.
- pini* PERR. = **pigra** FABR.
- rufipes** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 212. (132). (1873).*) Hungaria.
- satanica* BIG. = **curvipes** LW.
- segnis** L., Syst. Nat., X. 595. [*Musca*] (1758), XII. II. 988. 57. [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1823. [*Musca*] (1761); GEOFFR., Hist. ins., II. 526. 62. [—] (1764); SCHAEFF., Icon. ins., t. CVII. f. 7. [—] (1766); FABR., Syst. Entom., 772. 47. [*Syrphus*] (1781), Spec. ins., II. 428. 36. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 295. 61. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 191. 14. [*Milesia*] (1805); DEG., Ins., VI. 121. 12. t. VII. f. 10—12. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI. 54. 12. [*Musca*] (1782); SCHRANK, Enum. ins., 450. 914. [*Musca*] (1781) et Fauna boica, III. 107. 2412. [*Musca*] (1803); GMEL., Syst. Nat., V. 2877. 57. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 452. 106. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etr., II. 288. 1461. [*Syrphus*] (1790); PANZ., Fauna germ., LX. 3. [*Syrphus*] (1798); CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 304. 956. [*Syrphus*] (1798); LATR., Diet. Hist. Nat. Détérv., XXIV. 194. 567. [*Milesia*] (1804) et Gen. crust. ins., IV. 331. [*Milesia*] (1809); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 444. 1451. [*Syrphus*] (1807); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 10. 5. [*Milesia*] (1816); MEIG., S. B., III. 220. 12. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 276. (128). 1. t. II. f. 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 521. 5. (1834); ZETT., Ins. Lapp., 585. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 874. 5. (1843); WALK.,

List Dipt. Brit. Mus., III. 555. (1849) et Ins. Brit., I. 255. 3. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 80. 5. (1857); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 421. 8. (1857) et F. A., I. 354. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 292. 7. (1861); BELING, Archiv. Naturg., XII. 54. (1875); GRIFF., Bull. Mus. Torino, VIII. (143). 5. (1893); VERR., Brit. Fl., VIII. 598. 1. f. 408—409. (1901).

brassicaria DONOV. (nec FABR.), III. Brit. Ins., V. t. CLI. f. 1. [*Musca*] (1796); CEDERH., Faunae ingr. Prodr., t. III. f. l. [*Musca*] (1798).

facata HARR., Expos. engl. Ins., 83. t. XXIV. f. 29. [*Musca*] (1776).

? *maritima* SCOP., Entom. carn., 344. 926. [*Musca*] (1763).

semulater HARR. = *abiens* MEIG.

sibirica Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 233. 128. (1871).

Siberia.

silvarum L., Syst. Nat., X. 592. (1758), XII. II. 985. 37. [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1804. [*Musca sylvarum*] (1761); FABR., Syst. entom., 767. 20. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II. 447. 27. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 291. 48. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 191. 13. [*Milesia*] (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2871. 37. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 439. 86. [*Musca*] (1789); CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 304. 954. [*Syrphus*] (1798); LATR., Gen. crust. ins., IV. 332. [*Milesia*] (1809); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 10. 4. [*Milesia*] (1816); MEIG., S. B., III. 223. 17. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 278. (130). 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 520. 1. (1834); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 599. (1840); ZETT., Ins. Brit., II. 870. 2. (1843); WALK., Ins. Brit., I. 255. 1. t. IX. f. 10. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 80. 1. (1857); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 418. 2. (1857) et F. A., I. 356. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 290. 1. (1861); GRIFF., Miscell. entom., III. 58. (1895); VERR., Brit. Fl., VIII. 602. 4. f. 412. (1901).

Europa.

impigra ROSSI, Fauna etr., II. 289. 1463. t. X. f. 3. [*Syrphus*] (1790); PANZ., Fauna germ., XLV. 21. [*Syrphus*] (1797); ILLEG., Fauna etr. Rossi, II. 445. 1463. [*Syrphus*] (1807).

longisco HARR., Expos. engl. Ins., 83. t. XXIV. f. 30. [*Musca*] (1776).

tarda MEIG., S. B., III. 225. 19. (1822); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 422. 9. (1857) et F. A., I. 357. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 600. 2. f. 410. (1901).

Europa.

confinis ZETT., Dipt. Scand., II. 872. 5. (1843), VIII. 3191. 5. (1849) et XII. 4674. 5. (1855); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 422. 10. (1857) et F. A., I. 354. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 291. 4. (1861); VERR., Entom. Monthly Mag., IX. 285. (1873).

confluens APETZ et WAHLB. in litt. ap. ZETT.

triangularis ZETT., Ins. Lapp., 586. 6. (1838) et Dipt. Scand., II. 873. 6. (1843), VIII. 3192. 6. (1849) et XIII. 6038. 6. (1859); SCHIX., Verh.

Europa centr. et sept.

zool.-bot. Ges. Wien, VII. 418. 1. (1857) et F. A., I. 357. (1862);
BONSD., Finnl. Insekt., I. 291. 5. (1861).

tristor HARR. = **abiens** MEIG.

volvulus FABR. = **femorata** L.

Syritta

ST. FARG. SERV., Encycl. méthod., X. 808. (1825).

Coprina ZETT., Ins. Lapp., 584. 45. (1838), *ncc* ROB.-DESW. 1830.
Dipt.

Planes ROND., Arch. Zool. Modena, III. 9. (1863).

Xylota WESTW., Introd.: Synopsis, 136. (1840).

fasciata WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 103. 11. [*Xylota*] (1830); VERR., Nubia.
Trans. entom. Soc. London, 1898. 421. 13. (1898).

nigricornis MACQ., Dipt. exot. Suppl., II. (2). 132. (74). 1. t. XIV. f. Aegyptus.
4. (1842).

obscuripes STROBL = **pipiens** L. *var.*

pipiens L., Syst. Nat., X. 594. [*Musca*] (1758), XII. II. 988. 56. [*Musca*] Europa,
(1767) et Fauna suec., 1882. [*Musca*] (1761); SCOP., Entom. carn., Africa sept.
357. 969. [*Conops*] (1763); GEOFFR., Hist. Ins., II. 519. 49. [—]
(1764); O. F. MÜLL., Fauna Fridrichsd., 725. [*Musca*] (1764); FABR.,
Syst. Entom., 772. 46. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II. 434. 65.
[*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 310. 119. [*Syrphus*] (1794) et
Syst. Antl., 194. 27. [*Milesia*] (1805); DEG., Ins., VI. 120. 11. t.
VII. f. 8—9. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI. 53. 11. [*Musca*]
(1782); SCHRANK, Enum. Ins., 451. 915. [*Musca*] (1781) et Fauna
boica, III. 106. 2411. [*Musca*] (1803); GMEL., Syst. Nat., V. 2877.
56. [*Musca*] (1781); VILL., Entom. linn., III. 451. 105. [*Musca*]
(1789); ROSSI, Fauna etr., II. 298. 1484. [*Syrphus*] (1790); PANZ.,
Fauna germ., XXXII. 20. [*Syrphus*] (1796); CEDERH., Faunae
ingr. Prodr., 307. 966. [*Syrphus*] (1798); DWIG., Primitiae faunae
Mosqu., 178. 670. [*Musca*] (1802); SCHELL., Genres Mouch. Dipt.,
54. t. X. f. 3. [*Syrphus*] (1803); LATR., Dict. Hist. Nat. Déterv.,
XXIV. 194. 567. [*Milesia*] (1804), Hist. Nat. Crust. Ins., XIV. 362.
2. [*Milesia*] (1804), Gen. crust. ins., IV. 331. [*Milesia*] (1809) et
Cons. Gén., 443. [*Milesia*] (1810); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II.
458. 1484. [*Syrphus*] (1807); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 12. 9.
[*Milesia*] (1816); MEIG., S. B., III. 213. 1. [*Xylota*] (1822) et VII.
114. 1. t. LXVII. f. 21—29. (1838); ST. FARG. SERV., Encycl.
méthod., X. 808. (1825); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 272. (124).
t. II. f. 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 525. 1. t. XII. f. 3. (1834);
ZETT., Ins. Lapp., 584. 1. [*Coprina*] (1838) et Dipt. Scand., II. 881.
1. (1843), XII. 4675. 1. (1851); WESTW., Introd., II. 559. [*Xylota*]
(1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 552. (1849) et Ins. Brit.,
I. 253. 1. t. IX. f. 9. (1851); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
VII. 424. 1. (1857) et F. A., I. 358. (1862); BONSD., Finnl. Insekt.,

- I. 294. I. (1861); WILL., Syn. N. A. Syrph., 240. t. XII. f. 1. (1886); BELING, Arch. Naturg., XLVIII. 233. 39. (1882); GRIFF., Bull. Mus. Torino, VIII. (143). 5. (1893); WAND., Zool. Anz., 1898. 288. f. 1. (1898); HOW., Proc. Wash. Acad. Sci., II. 597. (1900) et Insect Book, t. XXI. f. 18. (1902); VERR., Brit. Fl., VIII. 612. 1. f. 416—487. (1901); CHAGNON, Nat. Can., 1901. 61. (1901); ALDRICH, Cat. N. A. Dipt., 397. (1905).
- proxima* SAY, Amer. Entom., I. 16. t. VIII. f. 3. [*Xylota*] (1824) et Compl. Writ., I. 16. [*Xylota*] (1859); WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 102. 9. [*Xylota*] (1830).
- var. **obscuripes** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 146. 110. (1899). Hispania.
- proxima* SAY — **pipiens** L.
- spinigera** LW., Stettin. entom. Zeitg., IX. 331. (1848), Öfv. vet. Akad. Förh., XIV. 377. 13. (1857) et Diptf. Südafr., (373). 301. 5. (1860). Europa mer., Asia min., Syria.
- subtilis** BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 89. 125. (1903). Aegyptus.
- vittata** PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XI. 27. (1875). Transcaepia.
- ## Eumerus
- MEIG., S. B., III. 202. CII. (1822).
- Pumilio* SCHEMBRI in litt. ap. ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 127. (1850).
- acanthodes* ROSSI = ? **strigatus** FALL.
- aeneus* MACQ. = **strigatus** FALL.
- alpinus* ROND. = **olivaceus** LW.
- amoenus** LW., Stettin. entom. Zeitg., IX. 132. 15. (1848); BECK., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 87. 122. (1903). Europa mer., Africa sept.
- angusticornis* ROND. = **basalis** LW.
- angustifrons** LW., Stettin. entom. Zeitg., IX. 125. 11. (1848). Asia min.
- annulatus** PANZ., Fauna germ., LX. 11. [*Syrphus*] (1798); LW., Stettin. entom. Zeitg., IX. 112. 2. (1848) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 690—693. (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 426. 4. (1857) et Fauna austr., I. 359. (1862). Europa.
- grandis* MEIG., S. B., III. 203. I. t. XXVIII. f. 14—18. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 526. 1. (1834); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 599. [*Xylota*] (1840).
- lateralis* ZETT., Vet. Acad. Handl., 1819. 83. 38. [*Pipiza*] (1819) et Dipt. Scand. II. 862. 1. (1843); FALL., Dipt. Suec. Suppl., 10. [*Pipiza*] (1826).
- rarius* MEIG., S. B., III. 205. 3. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 267. (119). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 526. 3. (1834).
- argyropus** LW., Stettin. entom. Zeitg., IX. 135. 18. (1848) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 688. (1855). Europa mer.

- exilipes* RONSD., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 121. 3. t. IV. (2). f. 1—3. (1850) et Dipt. ital. Prodr., II. 89. 4. (1857).
- nivipes* RONSD. in litt. ap. RONSD.
- australis** MEIG., S. B., VII. 110. 14. (1838). Hispania.
- barbarus** COQUEB., Ill. icon., 117. t. XXVI. f. 6. [*Syrphus*] (1804); Europa mer.,
WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 112. 2. (1830); RONSD., Annal. Soc. Africa sept.
entom. France, (2). VIII. 128. 12. (1850) et Dipt. ital. Prodr., II.
88. 18. (1857).
- barbiventris* RONSD. = **ruficornis** MEIG.
- basalis** LW., Stettin. entom. Zeitg., IX. 126. 12. (1848) et Verh. zool.- Europa mer.
bot. Ges. Wien, V. 688. (1855).
- angusticornis* RONSD., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 128.
11. t. IV. (2). f. 10—11. (1850), Dipt. ital. Prodr., II. 95. 17.
(1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 25. (1868).
- bicolor* RONSD. = **ovatus** LW.
- cavitibius* RONSD. = **emarginatus** LW.
- cilitarsis* LW. = **obliquus** FARR.
- clavtibius* RONSD. = **emarginatus** LW.
- crassitarsis** A. COSTA, Atti Acc. Sci. Napoli, XXIV. 30. (1885) et Sardinia.
Bull. Soc. entom. ital., XVII. 254. 10. (1885); VERR., Cat. europ.
Syrph., 104. (1900).
- Delicatae* RONSD. = **pulchellus** LW.
- elegans* SCHIN. et EGG. = **flavitarsis** ZETT.
- emarginatus** LW., Stettin. entom. Zeitg., IX. 124. 10. (1848) et Verh. Italia.
zool.-bot. Ges. Wien, V. 688. (1855).
- cavitibius* RONSD., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 126. 9.
t. IV. (2). f. 9. (1850).
- clavtibius* RONSD., Dipt. ital. Prodr., II. 94. 14. (1857).
- exilipes* RONSD. = **argyropus** LW.
- flavitarsis** ZETT., Dipt. Scand., II. 867. 8. (1843); BONSD., Finnl. Insekt., Europa centr.
I. 289. 3. (1861); Kow., Wien. entom. zeitg., IV. 208. (1885). et sept.
- elegans* SCHIN. et EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, III. 52.
t. I. f. 2. (1853); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 694.
(1855) et Berlin. entom. Zeitschr., II. 230. (1858); SCHIN.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 430. 27. (1857) et F. A., I.
361. (1862).
- fucatus** RONSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 575. 2. (1868). Italia.
- fugitivus* ROSSI = ? **pusillus** LW.
- fulvicornis** MACQ., Suit. à Buff., I. 528. 9. (1834); MEIG., S. B., VII. Europa centr.
111. 15. (1838); RONSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 25. (1868). et mer.
- ruficornis* MACQ. (*nec* MEIG.), Soc. Sci. Lille, 1827. 269. (121). 7.
(1827).
- fumipennis* CURT. = **ornatus** MEIG.
- funeralis* MEIG. = **strigatus** FALL.
- grandicornis* MEIG. = **strigatus** FALL.
- grandis* MEIG. = **annulatus** PANZ.

- immarginatus** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827, 268. (120. 5. (1827); Gallia.
MEIG., S. B., VII. 111. 16. (1838).
- Iris** LW., Stettin entom. Zeitg., IX. 118. 7. (1848); BEZZI, Bull. Soc. Sicilia.
entom. ital., XXXII. 92. 467. (1900).
? *truncatus* ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 575. 5. (1868);
MINÀ PAL., Nat. Sicil., XIV. 18. 7. (1896).
- lasiops** ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 92. 11. (1857) et Atti Soc. ital. Italia.
Sci. Nat., XI. 25 et 575. (1868).
- lateralis* ZETT. = **annulatus** PANZ.
- latitarsis** MACQ., Hist. nat. Can. Webb, Entom., I. 108. 45. (1838) et Ins. Canar.
Dipt. exot., II. (2). 134. (76). 1. t. XIV. f. 5. (1842); LW., Diptf.
Südafr., (369). 297. (1860).
- liops** ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 94. 16. [*lejops*] (1857). Italia.
- litoralis* CURT. = **sabulonum** FALL.
- longicornis** LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 695. (1855); SCHX., Europa centr.
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 431. 29. (1857) et F. A., I. 361.
(1862).
- lucidus** LW., Stettin. entom. Zeitg., IX. 134. 17. (1848). Rhodus ins.
- lunatus** FABR., Entom. syst., IV. 296. 64. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Africa sept.
Antl., 193. 22. [*Milesia*] (1805); COQUEB., III. icon., 105. t. XXIII.
f. 17. [*Syrphus*] (1804); LATR., Gen. crust. ins., IV. 331. [*Milesia*]
(1809); WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 111. 1. (1830); MEIG., S.
B., VII. 111. 17. (1838).
- lunulatus* MEIG. = **strigatus** FALL.
- melanopus* ROND. — **strigatus** FALL. var.
- micans** FABR., Entom. Syst. Suppl., 562. 63—64. [*Syrphus*] (1798) et Europa mer.
Syst. Antl., 242. 45. [*Eristalis*] (1805); MEIG., S. B., III. 206. 6.
(1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 527. 5. (1834); SCHX., F. A., I.
362. nota. (1862).
- mixtus* MEIG. = **ovatus** LW.
- mixtus* PANZ. = ? **tricolor** MEIG.
- nebrodensis** MINÀ PAL., Nat. Sicil., XIV. 18. 6. (1896). Sicilia.
nebrodesius ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 575. 4. (1868).
- nebrodesius* ROND. = **nebrodensis** MINÀ PAL.
- nudus** LW., Stettin. entom. Zeitg., IX. 117. 6. (1848). Europa mer.,
ruficauda BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). III. 539. (1883). Africa sept.
- obliquus** FABR., Syst. Antl., 194. 28. [*Milesia*] (1805); WIED., Ausser. Europa mer.,
zweifl. Ins., II. 112. 3. (1830); LW., Diptf. Südafr., (369). 297. 1. Africa sept.
(1860); BECK., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 87. 123. (1903).
ciltarsis LW., Stettin. entom. Zeitg., IX. 120. 8. (1848); SCHX.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 427. 10. (1857) et F. A., I.
361. (1862).
- olivaceus** LW., Stettin. entom. Zeitg., IX. 116. 5. (1848); BEZZI, Bull. Italia
Soc. entom. ital., XXXII. 92. 466. (1900).
alpinus ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 91. 9. (1857).
- ornatus** MEIG., S. B., III. 205. 4. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 527. Europa.
4. (1834); CURT., Brit. Entom., 749. (1836); ZETT., Dipt. Scand.,

- II. 865. 4. (1843); ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 123. 4. t. IV. (2). f. 4—6. (1850) et Dipt. ital. Prodr., II. 85. 6. (1857); WALK., Ins. Brit., I. 241. 1. (1851); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 694. (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 430. 26. (1857) et F. A., I. 362. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 620. 2. f. 423. (1901).
- fumipennis* CURT., Brit. Entom., 250. 2. b. (1830).
- ruficornis* CURT. (*nec* MEIG.), Brit. Entom., 749. (1836); WALK., Ins. Brit., I. 241. 2. (1851).
- ovatus** Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 109. 1. (1848) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 693. (1855); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 425. 1. (1857) et F. A., I. 359. (1862). Europa centr. et mer.
- bicolor* ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 89. 3. (1857); PALMA, Atti Acc. Asp. Nat., (3). III. 49. 53. (1864).
- mixtus* MEIG. (*nec* PANZ.), S. B., VII. 110. 13. (1838); ZETT., Dipt., Scand., II. 862. *observ.* (1843).
- tricolor* Lw. (*nec* MEIG.), Programm Posen, 1840. 28. 1. (1840) et Isis, 1840. 561. 1. (1840).
- planifrons* MEIG. = **strigatus** FALL.
- pulchellus** Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 130. 14. (1848) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 688. (1855). Italia.
- Delicatae* ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 127. 10. (1850) et Dipt. ital. Prodr., II. 94. 13. (1857).
- parvulus* SCHEMBRI in litt. ap. ROND.
- punctifrons** Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 85. 6. (1857). Syria.
- purpureus** MACQ., Hist. nat. Can. Webb, Entom., I. 108. 46. (1838) et Dipt. exot., II. (2). 135. (77). 2. (1842). Ins. Canar.
- pusillus** Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 133. 16. (1848). Europa mer., Asia min.
- ? *fugitivus* ROSSI, Fauna etr., II. 297. 1482. [*Syrphus*] (1790); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 457. 1482. [*Syrphus*] (1807); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 25, 564 et 574. (1868).
- rubriventris* MACQ. = **sabulonum** FALL.
- ruficauda* BIG. = **nudus** Lw.
- ruficornis* CURT. = **ornatus** MEIG.
- ruficornis* MACQ. = **fulvicornis** MACQ.
- ruficornis** MEIG., S. B., III. 206. 5. (1822); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 127. 13. (1848) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 688—694. (1855); ZETT., Dipt. Scand., II. 865. 5. (1843) et XIII. 6036. 5. (1859); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 428. 15. (1857) et F. A., I. 362. (1862). Europa.
- barbiventris* ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 124. 6. t. IV. (2). f. 8. (1850), Dipt. ital. Prodr., II. 86. 8. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 133. (1865).
- sabulonum** FALL., Dipt. Suec. Syrph., 61. 7. [*Pipiza*] (1817); ZETT., Dipt. Scand., II. 863. 2. (1843) et XII. 4673. 2. (1849); Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX. 114. 4. (1848) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 693. (1855); ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 119.

1. (1850) et Dipt. ital. Prodr., II. 84. 1. (1857): WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 551. (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 426. 6. (1857) et F. A., I. 288. 1. (1861); VERR., Brit. Fl., VIII. 616. 1. f. 418-420. (1901).

litoralis CURT., Brit. Entom., 749. (1836); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 431. (1857) et F. A., I. 362. [*lateralis*] (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., VII. 203. (1871).

rubricentris MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 267. (119). 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 528. 10. (1834); MEIG., S. B., VII. 112. 18. (1838).

Selene MEIG., S. B., III. 210. 12. (1822); CURT., Brit. Entom., 749. (1836); WALK., Ins. Brit., I. 242. 4. (1851).

? *strigatus* MEIG. (*acc* FALL.), S. B., III. 207. 7. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 267. (120). 4. (1827).

? *tricolor* FABR., Entom. syst. Suppl., 563. 85-86. [*Syrphus*] (1798) et Syst. Antl., 244. 52. [*Eristalis*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 331. [*Milesia*] (1809).

Selene Lw. = **strigatus** FALL.

selene MEIG. = **sabulonum** FALL.

sinuatus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 692. (1855); SCHIN., Austria. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 425. 2. (1857) et F. A., I. 360. (1862).

spinipes ROSSI = ? **strigatus** FALL.

strigatus FALL., Dipt. Succ. Syrph., 61. 8. [*Pipiza*] (1817); GEOFFR., Hist. Ins., II. 518. 47. [-] (1764); MACQ., Suit. à Buff., I. 527. 6. (1834); CURT., Brit. Entom., 749. (1836); ZETT., Dipt. Scand., II. 864. 3. (1843) et XII. 4674. 3. (1855); RONSD., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 126. 8. (1850), Dipt. ital. Prodr., II. 87. 12. (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 25. (1868); WALK., Ins. Brit., I. 241. 3. t. IX. f. 4. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 288. 2. (1861); KALTENB., Pflanzenf., 720. 3. (1874); VERR., Brit. Fl., VIII. 621. 3. f. 424. (1901).

aeanthodes ROSSI, Mant. Ins., II. 63. 531. [*Syrphus*] (1794); RONSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 25. 564 et 574. (1868).

acneus MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 269. (121). 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 528. 11. (1834); MEIG., S. B., VII. 112. 19. (1838); CURT., Brit. Entom., 749. (1836) et Gard. Chron., II. 252. (1842); DEF., Soc. Sci. Lille, 1845. 197. t. I. f. 1-4. (1845); BOUCHE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 145. 17. (1847); RONSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 25. (1868).

funeralis MEIG., S. B., III. 208. 9. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 269. (121). 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 527. 8. (1834); CURT., Brit. Entom., 749. (1836); ZETT., Dipt. Scand., II. 867. 7. (1843); RONSD., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 125. 7. (1850) et Dipt. ital. Prodr., II. 92. 10. (1857).

grandicornis MEIG., S. B., III. 208. 8. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 527. 7. t. XII. f. 4. (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 866. 6. (1843).

Europa.

- lanulatus* MEIG., S. B., III. 209. 11. (1822); BOUCHE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 145. (1847); LW., Stettin. entom. Zeitg., IX. 121. 9. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 550. (1849); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 427. 11. (1857) et F. A., I. 362. (1862).
- planifrons* MEIG., S. B., III. 209. 10. (1822); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 173. 1. (1847).
- Scelene* LW. (*aec* MEIG.), Programm Posen, 28. 5. (1840) et Isis, 1840. 561. 5. (1840).
- spinipes* ROSSI, Mant. Ins., II. 143. t. VI. f. 4. [*Syrphus*] (1794).
- var. melanopus* ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 90. 5. (1857). Italia.
- strigatus* MEIG. = ? **sabulonum** FALL.
- sulcitibius** ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 24. (1868). Italia.
- tarsalis** LW., Stettin. entom. Zeitg., IX. 113. 3. (1848) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 689—693. (1855); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 426. 3. (1857) et F. A., I. 359. (1862). Europa centr.
- tricolor* FABR. = ? **sabulonum** FALL.
- tricolor* LW. = **ovatus** LW.
- tricolor** MEIG. (*aec* FARR.), S. B., III. 204. 2. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 266. (118). 1. t. II. f. 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 526. 2. (1834); ? ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 121. 2. (1850) et Dipt. ital. Prodr., II. 84. 2. (1857); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 690—693. (1855); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 426. 5. (1857) et F. A., I. 360. (1862). Europa centr. et mer.
- ? *mixtus* PANZ., Fauna germ., LX. 8. [*Syrphus*] (1798).
- truncatus* ROND. — ? **Iris** LW.
- Truquii** ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 95. 19. (1857); A. COSTA, Atti Acc. Sci. Napoli, 1882. 39. (39). (1882). Italia.
- tuberculatus** ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 93. 13. (1857). Italia.
- uncipes** ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 123. 5. t. IV. (2). f. 7. (1850) et Dipt. ital. Prodr., II. 85. 7. (1857). Italia.
- varius* MEIG. — **annulatus** PANZ.

Ferdinandea

ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 196. (1844).

Chrysochlamys WALK., Ins. Brit., I. 279. XXIV. [*Chrysochlamis*] (1851).

- aurea** ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 198. 1. t. II. f. 1—7. (1844) et Dipt. ital. Prodr., II. 148. 3. [*Chrysochlamys*] (1857); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 620. 3. [*Chrysochlamys*] (1857). Europa mer.
- nigricornis* ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 202. *explic. tab.* (1844).
- cuprea** SCOV., Entom. carn., 355. 962. [*Conops*] (1763); ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 199. 2. (1844) et Dipt. ital. Prodr., Japonia.

II. 146. 1. [*Chrysochlamys*] (1857); WALK., Ins. Brit., I. 280. 1. t. X. f. 10. [*Chrysochlamys*] (1851); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 432. 1. [*Chrysochlamys*] (1857) et F. A., I. 363. [*Chrysochlamys*] (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg., IV. 108. [*Chrysochlamys*] (1885); VERR., Brit. Fl., VIII. 624. 1. f. 425—426. (1901).

nigrifrons EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 664. [*Chrysochlamys*] (1860); SCHN., F. A., I. 364. [*Chrysochlamys*] (1862); GRAMSCH., Annal. Scott. N. H., 1897. 22. (1897) et The Natural., 1898. 103. [*Chrysochlamys*] (1898).

nitens VILL., Entom. linn., III. 549. 392. [*Musca*] (1789).

ruficornis ROSSI (nec FABR.), Fanna etr., II. 290. 1466. t. X. f. 9. (err. XI). [*Syrphus*] (1790); PANZ., Fauna germ., LXXVII. 20. [*Syrphus*] (1801); ILLIG., Fanna etr. Rossi, II. 448. 1466. [*Syrphus*] (1807); LATR., Gen. ernst. ins., IV. 324. [*Elophilus*] (1809); FALL., Dipt. Svec. Syrph., 50. 2. [*Eristalis*] (1817); MEIG., S. B., III. 278. 1. [*Syrphus*] (1822); ST. FARG. SERV., Encycl. méthod., X. 312. [*Syrphus*] (1825); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 207. (59) 17. [*Cheilosia*] (1827) et Suit. à Buff., I. 555. 1. t. XII. f. 14. [*Chilosia*] (1834); ZETT., Ins. Lapp., 610. 2. [*Eristalis*] (1838) et Dipt. Scand., II. 779. 3. [*Eristalis*] (1843); BONSD., Finnl. Insekt., I. 263. 3. [*Eristalis*] (1861).

rutilo HARR., Expos. engl. Ins., 80. t. XXIV. f. 21. [*Musca*] (1776).

testacicornis ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 201. (1844).

nigricornis ROND. = **aurea** ROND.

nigrifrons EGG. = **cuprea** SCOP.

nitens VILL. = **cuprea** SCOP.

ruficornis FABR., Syst. Entom., 769. 35. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., Europa centr. II. 431. 48. [*Syrphus*] (1781), Mant. ins., II. 339. [*Syrphus*] (1784), et mer.

Entom. syst., IV. 301. 84. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 243.

50. [*Eristalis*] (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2874. 356. [*Musca*]

(1788); VILL., Entom. linn., III. 458. 119. [*Musca*] (1789); WALK.,

List Dipt. Brit. Mus., III. 573. [*Syrphus*] (1849); LW., Verh. zool.-

bot. Ges. Wien, VII. 620. 1. [*Chrysochlamys*] (1857); ROND., Dipt.

ital. Prodr., II. 147. 2. [*Chrysochlamys*] (1857); SCHN., Verh.

zool.-bot. Ges. Wien, VII. 432. 2. [*Chrysochlamys*] (1857) et F. A.,

I. 363. [*Chrysochlamys*] (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., IX.

285. [*Chrysochlamys*] (1873) et Brit. Fl., VIII. 626. 2. [*Chrysochlamys*]

(1901); JAROSCH., Trudy Naturf. Ges. Karkoff, XII. 116. 32. (1878).

ruficornis ROSSI = **cuprea** SCOP.

rutilo HARR. = **cuprea** SCOP.

testacicornis ROND. = **cuprea** SCOP.

Arctophila

SCHIN., Wien. entom. Monatschr., IV. 215. (1860).

bombiformis FALL., Specim. entom., 25. [*Syrphus*] (1810) et Dipt. Succ. Syrph., 16. 1. [*Syrphus*] (1816); MEIG., S. B., III. 343. 1. t. XXXI. f. 8. [*Sericomyia*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 331. (183). 1. [*Sericomyia*] (1827) et Suit. à Buff., I. 496. 1. [*Sericomyia*] (1834); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 597. [*Sericomyia*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., II. 644. 1. [*Sericomyia*] (1843); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 26. 1. [*Sericomyia*] (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 438. 4. [*Sericomyia*] (1857) et F. A., I. 331. (1862); PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 169. (1877).
? *personata* HARR., Expos. engl. Ins., 79. t. XXIV. f. 20. [*Musca*] (1776).

fulva HARR. — **mussitans** FABR.

mussitans FABR., Gen. ins. mant., 306. [*Syrphus*] (1777), Spec. ins., II. 422. 3. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 279. 6. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 225. 6. [*Syrphus*] (1705); GMEL., Syst. Nat., V. 2867. 327. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 431. 70. [*Musca*] (1789); PANZ., Fauna germ., I. 15. [*Syrphus*] (1793); FALL., Dipt. Succ. Syrph., 18. 4. [*Syrphus*] (1816); MEIG., S. B., III. 345. 4. [*Sericomyia*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 332. (184). 2. t. IV. f. 1. [*Sericomyia*] (1827) et Suit. à Buff., I. 496. 2. t. XI. f. 11. [*Sericomyia*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 645. 2. [*Sericomyia*] (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 595. [*Sericomyia*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 438. 3. [*Sericomyia*] (1857) et F. A., I. 332. (1862); PORTSCH., Trudy Russk. Entom., X. 170. (1877); GIARD, Bull. Soc. entom. Francee, 1897. VII. (1897); VERR., Brit. Fl., VIII. 632. 1. f. 431—432. (1901).
fulva HARR., Expos. engl. Ins., 80. t. XXIV. f. 22. [*Musca*] (1776).

superbiens O. F. MÜLL., Zool. dan. Prodr., 2093. [*Volucella*] (1776); WALK., Ins. Brit., I. 263. 3. [*Sericomyia*] (1851); JORD., Scot. Nat., II. 63.

personata HARR. — ? **bombiformis** FALL.

superbiens O. F. MÜLL. = **mussitans** FABR.

Sericomomyia

MEIG., Illiger's Magaz., II. 274. (1803).

Sericomyza ZETT., Ins. Lapp., 589. 50. (1838).

borealis FALL., Dipt. Succ. Syrph., 20. 7. [*Syrphus*] (1816); MEIG., S. B., III. 343. 2. t. XXXI. f. 9. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 332. (184). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 496. 3. (1834); ZETT., Ins. Lapp., 590. 1. [*Sericomyza*] (1838) et Dipt. Scand., II. 645. 3. (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 594. (1849) et Ins. Brit.,

- I. 262. 1. t. IX. f. 14. (1851); HAL., Stettin. entom. Zeitg., XII. 142. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 437. 2. (1857) et F. A., I. 331. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 216. 1. (1861); BLOOMF., Entom. Monthly Mag., XVIII. 159. (1882) et XXXIII. 222. (1897); JAROSCH., Trudy Naturf. Ges. Karkoff, XIX. 8. 15. (*sep.*) VERR., Brit. Fl., VIII. 635. 1. f. 433—434. (1901).
- lappona* DEG. (*nec* L.), Ins., VI. 142. 6. t. VIII. f. 14. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI. 61. 6. [*Musca*] (1782).
- silentis* HARR., Expos. engl. Ins., 59. t. XV. f. 14. [*Musca*] (1776).
- lappona* DEG. = **borealis** FALL.
- lappona** L., Syst. Nat., X. 591. [*Musca*] (1758), XII. II. 983. 27. [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1794. [*Musca*] (1761); VILL., Entom. linn., III. 431. 69. [*Musca*] (1789); LATR., Hist. nat. Crust. ins., XIV. 265. [*Volucella*] (1804) et Gen. crust. ins., IV. 322. (1809); MEIG., S. B., III. 344. 3. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 469. 4. (1834); ZETT., Ins. Lapp., 590. 2. [*Sericomyza*] (1838) et Dipt. Scand., II. 646. 4. (1843); WALK., Ins. Brit., I. 263. 2. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 27. 2. (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 437. 1. (1857) et F. A., I. 331. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 216. 2. (1861); WULP., Tijdschr. Entom., XXV. 126. (1882); VERR., Brit. Fl., VIII. 637. 2. f. 435—436. (1901).
- laponum* FABR., Spec. ins., II. 422. 4. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 280. 7. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 226. 7. [*Syrphus*] (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2867. 27. [*Musca*] (1788); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 20. 8. [*Syrphus*] (1816).
- nigra** PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., IX. 291. 6. (1874). Sibiria.
- silentis* HARR. = **borealis** FALL. Russia.
- volucellina** PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XVI. 137. (1881) et XXI. 189. t. VI. f. 5. (1886).

Milesia

LATR., Hist. nat. crust. Ins., III. (1802) et XIV. 361. (1804).

Sphceea ROND., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 455.
[*Sphixaea*] (1844).

- crabroniformis** FABR., Syst. Entom., 768. 31. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II. 430. 44. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 299. 78. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 187. 1. (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2873. 355. [*Musca*] (1788); CYRILL., Entom. neap. Spec. prim., t. X. f. 2. [*Syrphus*] (1787); LATR., Gen. crust. ins., IV. 332. (1809); GERM., Fauna ins. europ., VIII. 25. (1820); MEIG., S. B., III. 227. 1. (1822); ST. FARG. SERV., Encycl. méth., X. 518. (1825); MACQ., Suit. à Buff., I. 532. 1. t. XII. f. 9. (1834); ?, Diet. pict. d'Hist. Nat., V. 321. (1836—39); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 599. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 561. (1849); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 69. 2. [*Sphixaea*] (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Europa mer., Madera.

Wien, VII. 444. 1. (1857) et F. A., I. 367. (1862); GRIFF., Bull. Mus. Torino, VIII. (143). 4. (1893).

gigas ROSSI, Fauna etr., II. 283. 1449. t. X. f. 11. [*Syrphus*] (1790); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 437. 1449. [*Syrphus*] (1807).

eristaloides PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 187. t. VI. f. 4. (1886). Caucasus.

fulminans FABR. = **semiluctifera** VILL.

gigas ROSSI = **crabroniformis** FABR.

semiluctifera VILL., Entom. linn., III. 463. 137. t. IX. f. 23. [*Musca*] (1789). Europa mer.

fulminans FABR., Syst. Antl., 241. 39. [*Eristalis*] (1805); MEIG., S. B., III. 228. 2. t. XXIX. f. 8. (1822); ST. FARG. SERV., Encycl. méth., X. 518. (1825); MACQ., Suit. à Buff., I. 532. 2. (1834); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 445. (1862).

splendida ROSSI, Fauna etr., II. 292. 1471. t. X. f. 10. [*Syrphus*] (1790); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 451. 1471. [*Syrphus*] (1807); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 69. 1. [*Sphixea*] (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 445. 2. (1857) et F. A., I. 367. (1862).

splendida ROSSI = **semiluctifera** VILL.

undulata VOLLENI., Medd. Akad. Vetén., XV. 5. 6. (1862).

Japonia.

Spilomyia

MEIG., Illiger's Magaz., II. 273. (1803).

digitata ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 132. [*Milesia*] (1865). Italia.

diophthalma L., Syst. Nat., X. 593. [*Musca*] (1758), XII. II. 986. 43. [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1810. [*Musca*] (1761); FABR., Syst. Entom., 769. 32. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II. 430. 45. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 300. 79. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 187. 2. [*Milesia*] (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2873. 43. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 442. 92. [*Musca*] (1789); LATR., Hist. nat. Crust. Ins., XIV. 361. [*Milesia*] (1804), Dict. Hist. nat. Déterv., XXIV. 194. 567. [*Milesia*] (1804), Gen. crust. ins., IV. 332. [*Milesia*] (1809) et Cons. gén., 443. [*Milesia*] (1810); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 8. 2. [*Milesia*] (1816); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 225. (107). 1. [*Milesia*] (1827) et Suit. à Buff., I. 532. 3. [*Milesia*] (1834); ?, Dict. pict. d'Hist. nat., V. 321. [*Milesia*] (1836-39); ZETT., Dipt. Scand., II. 855. 1. [*Milesia*] (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 565. [*Milesia*] (1849); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 434. 2. (1857) et F. A., I. 365. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 285. 1. [*Milesia*] (1861).

saltuum MEIG. (nec FABR.), S. B., III. 230. 4. [*Milesia*] (1822) et VI. 349. (1830); Lw., Programm Posen, 29. 1. (1840) et Isis, 1840. 562. 1. (1840).

diophthalma ROSSI = **saltuum** FABR.

- manicata** ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 132. [*Milesia*] (1865). Italia.
saltuum FABR., Entom. syst., IV. 287. 32. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Europa.
 Antl., 189. 9. [*Milesia*] (1805); MEIG., S. B., VI. 349. (1830); Japonia.
 WAHLEG., Vet. Akad. Handl., 1838. 16. 8. [*Milesia*] (1838); ZETT.,
 Dipt. Scand., II. 856. 2. (1843) et VIII. 3188. 2. [*Milesia*] (1849);
 SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 433. 1. (1857) et F. A.,
 I. 365. (1862); GÜRSCHN., Berlin. entom. Zeitschr., XXXI. t. III. f.
 12. (1887).
diophtalma ROSSI (*nec* L.), Fauna etr., II. 294. 1477. t. X. f. 2.
 [*Syrphus*] (1790); PANZ., Fauna germ., LXXII. 23. [*Syrphus*]
 (1799); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 454. 1477. [*Syrphus*]
 (1807); MEIG., S. B., III. 229. 3. [*Milesia*] (1832) et VI. 349.
 (1830).
saltuum MEIG. = **diophtalma** L.

Temnostoma

ST. FARG. SERV., Encycl. méthod., X. 518. (1825).

Microrrhynchus LLOY, Atti Istit. ven., (3). IX. 751. [*Micro-
 rhynchus*] (1864) emend. VERR. ap. SCUDD. (*nec* MEIG. 1823.
 COL., *nec* BELL. 1835. Crust.).

- apiforme** FABR., Entom. syst., IV. 300. 80. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Europa centr.
 Antl., 188. 3. [*Milesia*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 332. et sept.
 [*Milesia*] (1809); ZETT., Ins. Lapp., 587. 2. [*Milesia*] (1838) et
 Dipt. Scand., II. 858. 4. [*Milesia*] (1842); SCHN., Verh. zool.-bot.
 Ges. Wien, VII. 435. 4. [*Spilomyia*] (1857) et F. A., I. 366. [*Spilo-
 myia*] (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 286. 3. [*Milesia*] (1861).
respiforme DEG. (*nec* L.), Ins., VII. 122. 13. t. VII. f. 13. [*Musca*]
 (1776) et ed. Götze, VI. 54. 13. [*Musca*] (1782).

apiforme PANZ. — **vespiforme** L.

Balyras WALK. = **bombylans** FABR.

- bombylans** FABR., Syst. Antl., 189. 8. [*Milesia*] (1805); PANZ., Fauna Europa centr.
 germ., CVIII. 11. [*Milesia*] (1809); ST. FARG. SERV., Encycl. méth., et sept.
 X. 518. (1825); MEIG., S. B., III. 233. [*Milesia*] (1822); MACQ., Suit.
 à Buff., I. 534. 6. [*Milesia*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II. 859.
 5. [*Milesia*] (1843); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 435.
 5. [*Spilomyia*] (1857) et F. A., I. 366. [*Spilomyia*] (1862); BONSD.,
 Finnl. Insekt., I. 287. 4. [*Milesia*] (1861); WULL., Syn. N. A.
 Syrph., 250. t. XII. f. 6. (1886); CHAGNON, Nat. Can., 1901. 70. 1.
 (1901).

Balyras WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 577. [*Doros*] (1849);

OST-SACK., Cat. N. A. Dipt., 2. ed., 138 et 253. (252). (1878).

obscurum LW., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 67. 35. (1864).

Zetterstedti FALL., Dipt. Succ. Syrph., 8. I. [*Milesia*] (1816).

obscurum LW. **bombylans** FABR.

sericomgiaeforme PORTSCH. **vespiforme** L. *var.*

sibiricum PORTSCH. = **vespiforme** L. var.

vespiforme DEG. = **apiforme** FABR.

vespiforme L., Syst. Nat., X. 593. [*Musca*] (1758), XII. II. 986. 44. Europa centr. et sept.

[*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1811. [*Musca*] (1761); FABR., Syst. Entom., 769. 33. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II. 430. 46. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 300. 81. [*Syrphus*] (1794) et Syst. Antl., 188. 4. [*Milesia*] (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2873. 44. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 443. 93. [*Musca*] (1789); DWIG., Primitiae faunae Mosqu., 178. 667. [*Musca*] (1802); PANZ., Fauna germ., XCI. 20. [*Syrphus*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 9. 3. [*Milesia*] (1816); ST. FARG. SERV., Encycl. méth., X. 518. (1825); MEIG., S. B., III. 232. 5. [*Milesia*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 256. (108). 2. t. II. f. 4. [*Milesia*] (1827) et Suit. à Buff., I. 533. 5. [*Milesia*] (1834); ZETT., Ins. Lapp., 587. 1. [*Milesia*] (1838) et Dipt. Scand., II. 857. 3. [*Milesia*] (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 564. [*Milesia*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 434. 3. [*Spilomyia*] (1857) et F. A., I. 366. [*Spilomyia*] (1862); BONSD., Finkl. Insekt., I. 286. 2. [*Milesia*] (1861); SIEBKE, Enum. ins. norveg., IV. 71. 2. [*Milesia*] (1877); PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 7. t. I. f. 6. [*Spilomyia*] (1886).

apiforme PANZ. (nec FABR.), Fauna germ., XC. 19. [*Syrphus*] (1805).

Wagae GORSKI, Anal. ad Entom. Imp. Ross., Fasc., I. [*Milesia*] (1852).

var. **sericomylaeforme** PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXII. 8. [*Spilomyia*] (1886). Russia.

var. **sibiricum** PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 7. Sibiria. [*Spilomyia*] (1886).

var. **vulgare** PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 7. Russia. [*Spilomyia*] (1886).

vulgare PORTSCH. = **vespiforme** L. var.

Wagae GORSKI = **vespiforme** L.

Zetterstedtii FALL. = **bombylans** FABR.

Calliprobola

ROSD., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). II. 455. (1844).

cimbiciformis PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XV. 157. [*Spilomyia*] (1880). Sibiria.

speciosa ROSSI, Fauna ctr., II. 285. 1453. t. X. f. 6. [*Syrphus*] (1790); SCHAEFF., Icon. ins., t. 208. f. 3. — (1766); PANZ., Fauna germ., LIV. 6. [*Syrphus*] (1798); FABR., Syst. Antl., 188. 6. [*Milesia*] (1805); LLIG., Fauna ctr. Rossi, II. 440. 1453. [*Syrphus*] (1807); LATR., Gen. crust. ins., IV. 332. [*Milesia*] (1809); MEIG., S. B., III. 234. 7. [*Milesia*] (1822); ST. FARG. SERV., Encycl. méth., X. 518. [*Tennostoma*] (1825); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 258. (110). Europa centr. et mer.

3. [*Milesia*] (1827) et Suit. à Buff., I. 534. 7. (1834); CURT., Brit. Entom., 34. (1830); ? Diet. piet. d'Hist. nat., V. 322. t. 363. f. 1. [*Milesia*] (1836—39); WALK., Ins. Brit., I. 257. 1. t. IX. f. 11. [*Milesia*] (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 72. 1. (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 435. 6. [*Spilomyia*] (1857) et F. A., I. 365. [*Spilomyia*] (1862); GIRSCHN., Wien. entom. Zeitg., III. 199. IV. t. III. f. 2. [*Spilomyia*] (1884); VERR., Brit. Fl., VIII. 629. 1. f. 4. 30. (1901).

Chrysotoxinae.

Chrysotoxum

MEIG., Illiger's Magaz., II. 275. (1803).

Mulio FABR. (nec LATR.), Syst. Anfl., 183. 41. (1805).

affinis GIGLIO-TOS = **Lessonae** GIGLIO-TOS var.

albopilosum STROBL = **fasciolatum** DEG. var.

alpinum ROND. = **arcuatum** L.

angustifasciatum MÜK = **arcuatum** L. var.

annulatum LW. = **festivum** L.

arcuatum DEG. = **festivum** L.

arcuatum FALL. = **festivum** L. et **octomaculatum** CURT.

arcuatum L., Syst. Nat., X. 592. [*Musca*] (1758), XII. II. 985. 39. Europa.

[*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1806. [*Musca*] (1761); SCHAEFF., Icon. ins., t. 169. f. 2. [—] (1766); DWIG., Primitiae faunae Mosqu., 178. 666. [*Musca*] (1802); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1841. 117. (1841); LW., Stettin. entom. Zeitg., II. 159. 3. (1841) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 609. 4. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 294. 2. (1857) et F. A., I. 253. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 645. 2. f. 443—444. (1901).

alpinum ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 141. (1865).

fasciolatum MEIG. (nec DEG.), S. B., III. 170. 4. (1822); ZETT., Ins. Lapp., 588. 2. (1838) et Dipt. Scand., II. 634. 2. (1843). VIII. 3108. 2. (1849), XI. 4300. 2. (1852) et XIII. 5074. 2. (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 541. (1849) et Ins. Brit., I. t. X. f. 1. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 211. 2. (1861).

hortense MEIG., S. B., III. 173. 8. (1822); CURT., Brit. Entom., 653. (1838); LW., Stettin. entom. Zeitg., II. 160. 7. (1841); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1841. 124. (1841); GIGLIO-TOS, Atti Accad. Sci. Torino, XXVI. 142. t. II. f. 5. (1890).

marginatum WALK., Ins. Brit., I. 266. 6. (1851).

pubescens CURT., Guide, sec. ed., 250. 8. (1837).

scoticum CURT., Brit. Entom., 653. (1838).

var. **angustifasciatum** MÜK, Wien. entom. Zeitg., XXI. 115. Alpes. 7. (1897).

- var. nigropilosum* GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. Italia. 142. (1890).
- arcuatum* PANZ. = *cautum* HARR.
- arcuatum* SCHRANK = *elegans* LW.
- bicinctum** L., Syst. Nat., X. 592. [*Musca*] (1758), XII. II. 985. 38. Europa.
 [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1805. [*Musca*] (1761); FABR., Syst. Entom., 767. 21. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II. 427. 30. [*Syrphus*] (1784) et Entom. syst., IV. 293. 54. [*Syrphus*] (1794), Suppl., 557. 1. [*Mulio*] (1798) et Syst. Antl., 183. 2. [*Mulio*] (1805); O. F. MÜLL., Zool. dan. Prodr., 2019. [*Musca*] (1776); DEG., Ins., VI. 126. 16. t. VII. f. 16—17. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI. 56. 16. [*Musca*] (1782); GMEL., Syst. Nat., V. 2872. 38. [*Musca*] (1788). VILL., Entom. linl., III. 439. 87. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etr., II. 287. 1459. [*Syrphus*] (1790); PANZ., Fauna germ., XLV. 18. [*Syrphus*] (1797); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 44. t. XXII. f. 2. [*Mulio*] (1803); SCHRANK, Fauna boica, III. 107. 2413. [*Musca*] (1803); LATR., Hist. nat. crist. Ins., XIV. 358. [*Psarus*] (1804) et Gen. ins. crist., IV. 327. (1809); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 443. 1459. [*Syrphus*] (1807); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 6. 3. [*Mulio*] (1816); MEIG., S. B., III. 168. 1. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 346. (198). 1. (1827) et Suit. à Bnff., I. 489. 1. (1834); CURT., Brit. Entom., 653. (1838); ZETT., Ins. Lapp., 588. 4. (1838) et Dipt. Scand., II. 638. 7. (1843); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 597. (1840); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1841. 117. (1841); LW., Programm Posen, 26. 6. f. 33. (1840) et Isis, 1840. 560. 6. (1840), Stettin. entom. Zeitg., II. 159. 1. (1841) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 613. 14. (1856); ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 202. 9. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 200. 12. (1857); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 171. 1. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 540. (1849) et Ins. Brit., I. 264. 1. (1851); HAL., Stettin. entom. Zeitg., XII. 142. (1851); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 298. 1. (1857) et F. A., I. 255. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 212. 16. (1861); BECH., Denkschr. Akad. Wien, XLV. t. III. f. 19. (1882); BELING, Arch. Naturg., XLVIII. 231. 37. (1882); GIGLIO-TOS, Acc. Sci. Torino, XXVI. 162. t. II f. 20. (1890); VERR., Brit. Fl., VIII. 653. 7. f. 448. (1901).
- callosum* HARR., Expos. engl. Ins., 61. t. XV. f. 18. [*Musca*] (1776).
- tricinctum* ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 201. 8. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 204. 11. (1857); GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 163. (1890).
- Bigoti** GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino. XXVI. 154. (1890) et Bull. Italia. Mus. Torino, VI. (94). 5. (1891).
- bipunctatum* O. F. MÜLL. = *festivum* L.
- callosum* HARR. = *bicinctum* L.
- canariense* MACQ. = *triarcuatum* MACQ.
- cautum** HARR., Expos. engl. Ins., 60. t. XV. f. 15. [*Musca*] (1776); Europa. VERR., Brit. Fl., VIII. 643. 1. f. 441—442. (1901).

- arcuatum* PANZ. (*nec* L.), Fauna germ., II. 10. [*Syrphus*] (1793); WALK., Ins. Brit., I. 265. 3. (1851); GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 149. t. II. f. 8—9. (1890).
- fasciolatum* MACQ. (*nec* DEG.), Soc. Sci. Lille, 1827. 350. (202). 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 490. 5. t. XI. f. 6. (1834); CURT., Brit. Entom., 653. (1838); ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 199. 5. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 198. 4. (1857).
- lubricum* GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 151. t. II. f. 10—11. (1890) et Bull. Mus. Torino, VI. (94). 7. (1891).
- marginatum* CURT., Brit. Entom., 653. (1838).
- scutellatum* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 349. (201). 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 490. 4. (1834); MEIG., S. B., VII. 107. 10. (1838).
- silvarum* MEIG., S. B., III. 171. 6. (*sylvarum*) (1822); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1841. 121. (1841); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 608. 1. (1856); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 294. 3. (1857) et F. A., I. 253. (1862).
- var. impudicum* LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 609. 2. (1856); SCHN., F. A., I. 253. (1862); GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 149. (1890). Europa.
- chrysolita* ROND. = **octomaculatum** CURT.
- cisalpinum** ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 197. 2. t. III. (4). f. 2. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 200. 1. (1857); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 611. 6. (1856); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 295. 6. (1862) et F. A., I. 254. (1862); GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 148. t. II. f. 7. (1890). Europa mer.
- collinum* ROND. = **vernale** LW.
- costale* MEIG. = **fasciolatum** DEG.
- elegans** LW. (*nec* VILL.), Stettin. entom. Zeitg., II. 140 et 159. 5. (1841) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 613. 12. (1856); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1841. 125. (1841); ZETT., Dipt. Scand., II. 637. 5. (1843), XI. 4300. 5. (1852) et XII. 4644. 5. (1855); ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 200. 6. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 199. 8. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 296. 8. (1857) et F. A., I. 256. (1862); GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 153. t. II. f. 14. (1890); GÜRSCHN., III. Wochenschr. Entom., II. t. III. f. 15. (1897); VERR., Brit. Fl., VIII. 649. 4. 446. (1901).
- arcuatum* SCHRANK (*nec* L.), Fauna boica, III. 104. 2407. [*Musca*] (1803).
- intermedium* WALK. (*nec* MEIG.), Ins. Brit., I. 265. 5. (1851); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 142. (1865).
- elegans* VILL. = **octomaculatum** CURT.
- fasciolatum** DEG., Ins., VI. 124. 14. t. VII. f. 14—15. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI. 55. 14. [*Musca*] (1782); VILL., Entom. linn., III. 455. 112. [*Musca*] (1789); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 5. 1. [*Mulio*] (1816); LW., Stettin. entom. Zeitg., II. 160. 8. (1841) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 609. 3. (1856); SCHN., Verh. zool.-bot.

Ges. Wien, VII. 293. 1. (1857) et F. A., I. 253. (1862); GIOLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 139. t. II. f. 12. (1890).

costale MEIG., S. B., III. 172. 7. (1822).

marginatum MEIG., S. B., III. 171. 5. (1822); ZETT., Ins. Lapp., 587. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 633. 1. (1843) et XII. 4644. 1. (1855); LW., Stettin. entom. Zeitg., II. 160. 9. (1841); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1841. 120. (1841); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 299. 6. (1857); BONSD., Finn. Insekt., I. 211. 1. (1861).

var. albopilosum STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 197. Styria. (1893).

fasciolatum MACQ. = *cautum* HARR.

fasciolatum MEIG. = *arcuatum* L.

festivum L., Syst. Nat., X. 593. [*Musca*] (1758), XII. II. 986. 45. Europa.

[*Musca*] (1767) et Fauna succ., 1812. [*Musca*] (1761): PODA, Ins. Mus. graec., 117. [*Musca*] (1761); SCOP., Entom. carn., 354. 964. [*Conops*] (1763); DWIG., Primitiae faunae Mosqu., 178. 668. [*Musca*] (1802): v. ROS., Württemb. Corrb., 1834. 267. (1834); WALK., Ins. Brit., I. 264. 2. (1851); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 612. 9. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 297. 10. (1857) et F. A., I. 255. (1862); GIOLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 159. t. II. f. 19. (1890); GRIFF., Bull. Mus. Torino, IX. (168). 2. (1894); VERR., Brit. Fl., VIII. 650. 5. f. 440. (1901).

annulatum LW., Programm Posen, 26. 4. (1840) et Isis, 1840. 560. 4. (1840).

arcuatum DEG. (nec L.), Ins., VI. 125. 15. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI. 55. 15. [*Musca*] (1712); ? GEOFFR., Hist. ins., II. 506. 28. [-] (1764); ? O. F. M'CLL., Fauna Fridrichsd., 754. [*Musca*] (1764) et Zool. Dan. Prodr., 2020. (1776); FABR., Syst. entom., 767. 22. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II. 427. 31. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 293. 55. [*Syrphus*] (1794), Suppl., 558. 2. [*Mulio*] (1798) et Syst. Antl., 184. 3. [*Mulio*] (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2872. 39. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. finn., III. 440. 88. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etr., II. 287. 1460. [*Syrphus*] (1790); CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 304. 955. [*Syrphus*] (1798); SCHRANK, Fauna boica, III. 104. 2407. [*Musca*] (1803); LATR., Hist. nat. Crust. Ins., XIV. 258. 2. [*Psarus*] (1804) et Gen. crust. ins., IV. 337. (1809); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 444. 1460. [*Syrphus*] (1807); FALL., Dipt. Succ. Syrph., 5. 2. [*Mulio*] (1816); MEIG., S. B., III. 168. 2. t. XXVII. f. 7. (1822); DUMÉR., Cons. gén., t. I. f. 9. [*Mulio*] (1823); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 347. (199). 2. t. IV. f. 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 489. 2. (1834); v. ROS., Württemb. Corrb., 1834. 9. (1834); CRT., Brit. Entom., 653. (1838); LW., Programm Posen, 26. 1. (1840), Isis, 1840. 560. 1. (1840) et Stettin. entom. Zeitg., II. 138. 159. (1841); ZETT., Ins. Lapp., 588. 3. (1838) et Dipt. Scand.,

II. 636. 4. (1843); XII. 4644. 4. (1855) et XIII. 5074. 4. (1859);
 Rond., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 201. 7. (1845) et
 Dipt. ital. Prodr., II. 200. 9. (1857); GÜMM., Bull. Soc. Imp.
 Nat. Moscou, XV. 668. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
 III. 541. (1849); BOHSD., Fiml. Insekt., I. 211. 4. (1861).

bipunctatum O. F. MÜLL., Zool. Dan. Prodr., 2041. [*Musca*]
 (1776).

imbelle HARR., Expos. engl. Ins., 60. t. XV. f. 16. [*Musca*]
 (1776).

infuscatum Lw., Programm Posen, 26. 3. (1840) et Isis, 1840.
 560. 3. (1840).

scutellare Lw., Programm Posen, 26. 5. (1840) et Isis, 1840.
 560. 5. (1840).

var. tomentosum GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. Italia.
 159. (1890).

flavipenne PALMA, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III. 40. 12. t. VI. f. 1. Italia.
 (1864); BERGR. ap. MIK, Wien. entom. Zeitg., XV. III. 53. (1896).

fuscum GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 160. (1890)
 et Bull. Mus. Torino, VI. (94). 6. (1891).

var. vernaloides GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. Italia.
 161. (1890) et Bull. Mus. Torino, VI. (94). 6. (1891).

gracum WALK. — **intermedium** MEIG.

gymnophthalmum GIGLIO-TOS — **intermedium** MEIG. *var.*

hortense MEIG. — **arcuatum** L.

hyalipenne GIGLIO-TOS — **Lessonae** GIGLIO-TOS.

imbelle HARR. — **festivum** L.

impudicum Lw. — **cautum** HARR. *var.*

infuscatum Lw. = **festivum** L.

intermedium MEIG., S. B., III. 169. 3. t. XXVII. f. 6. (1822); MACQ., Europa centr.
 Soc. Sci. Lille, 1827. 348. (200). 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 489. et mer.
 3. (1834); Lw., Programm Posen, 26. (1840), Isis, 1840. 560.
 (1840) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 610. 5. (1856); SCHÜMM.,
 Arb. schles. Ges., 1841. 118. (1841); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges.
 Wien, VII. 296. 7. (1857) et F. A., I. 254. (1862).

gracum WALK., Ins. Saunders., III. 219. (1852).

italicum ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 196. 1. t.
 III. (4). f. 1. (1845); Dipt. ital. Prodr., II. 201. 2. (1857) et
 Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 141. (1865); PALMA, Annal. Acc.
 Asp. Nat., (3). III. 39. (1864); GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino,
 XXVI. 146. t. II. f. 6. (1890).

lambdatum BRULLÉ, Exped. de Morée Zool., III. 311. (1832).

monticola SCHÜMM., Arb. schles. Ges., 1841. 120. (1841).

scutellatum Lw. (acc. Macq.), Stettin. entom. Zeitg., II. 159. 6.
 (1841).

var. gymnophthalmum GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. Italia.
 146. (1890).

intermedium WALK. — **elegans** Lw.

intermedium ZETT. = **octomaculatum** CURT.

italicum ROND. = **intermedium** MEIG.

Lessonae GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 144. t. II. f. Italia.
3—4. (1890) et Bull. Mus. Torino, VI. (94). 1. (1891).

var. **affine** GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 144. (1890) Italia.
et Bull. Mus. Torino, VI. (94). 2. (1891).

var. **hyalipenne** GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 144. Italia.
(1890) et Bull. Mus. Torino, VI. (94). 2. (1891).

lineare ZETT., Vet. Akad. Handl., 1819. 82. 37. [*Mulio*] (1819) et Europa.
Dipt. Scand., II. 639. 8. (1843); FALL., Dipt. Snee. Suppl., 8. (1826);
MEIG., S. B., III. 173. 9. (1822) et VI. 349. (1830); Lw., Stettin.
entom. Zeitg., II. 159. 2. (1841) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
VI. 611. 7. (1856); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 298.
(1857) et F. A., I. 255. (1862); GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino,
XXVI. 161. (1890).

lubricum GIGLIO-TOS = **cautum** HARR.

lunulatum BRULLÉ = ? **intermedium** MEIG.

marginatum CURT. = **cautum** HARR.

marginatum MEIG. = **fasciolatum** DEG.

marginatum WALK. = **arcuatum** L.

monticola SCHUMM. = **intermedium** MEIG.

nigropilosum GIGLIO-TOS = **arcuatum** L. var.

octomaculatum CURT., Brit. Entom., 653. (1838); WALK., Ins. Brit., Europa.
I. 265. 4. (1851); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 612. 11.
(1856); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 295. 5. (1857) et
F. A., I. 255. (1862); GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI.
156. t. II. f. 16. (1890); VERR., Brit. Fl., VIII. 647. 3. f. 445.
(1901).

arcuatum var. *b.* FALL., Dipt. Snee. Syrph., 5. [*Mulio*] (1816).

chrysopolita ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 199. 4.
t. III. (4). f. 4. (1845), Dipt. ital. Prodr., II. 199. 7. (1857) et
Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 141. (1865); GIGLIO-TOS, Atti
Acc. Sci. Torino, XXVI. 155. t. II. f. 15. (1890).

? *elegans* VILL., Entom. linn., III. 464. 142. t. IX. f. 27. [*Musca*]
(1789).

intermedium ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., II. 635. 3. (1843);
BOSSD., Finnl. Insekt., I. 211. 3. (1861).

parmense ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 198. 3. t. III. Italia.
(4). f. 3. (1845) et Dipt. ital. Prodr., II. 198. 3. (1857); Lw., Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, VI. 613. 13. (1856); GIGLIO-TOS, Atti Acc.
Sci. Torino, XXVI. 149. (1890).

Przewalskyi PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 4. (1886). Asia media.

pubescens CURT. = **arcuatum** L.

robustum PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXI. 5. t. I. f. 4. (1886). Persia.

Sackeni GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 152. t. II. f. 12—13. Italia.
(1890) et Bull. Mus. Torino, VI. (94). 3. (1891).

scolicum CURT. = **arcuatum** L.

- scutellare* Lw. = **festivum** L.
- scutellatum* Lw. **intermedium** MEIG.
- scutellatum* Macq. **cautum** HARR.
- sibiricum** Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 611. 8. (1856); KERT., Asia sept. et
Horv. Zoolog. Ergebn. Reise Ziehy, II. 196. 96. (1901). media.
- silvaram* MEIG. - **cautum** HARR.
- tomentosum* GIGLIO-TOS = **festivum** L. var.
- triarcuatum** Macq., Hist. Can. Webb Entom., I. 107. 39. (1838); Ins. Canar.
v. RÖD., Wien. entom. Zeitg., II. 123. (1883) et Dipterolog.
Separata, 9. (1883).
- cauriense* Macq., Dipt. exot., II. (2). 74. (16). I. t. III. f. 16.
(1842); v. RÖD., Wien. entom. Zeitg., II. 93. (1883) et
Dipterolog. Separata, 6. (1883).
- trivinctum* Rond. = **bicinctum** L.
- vernale** Lw., Stettin. entom. Zeitg., II. 159. 4. (1841) et Verh. zool.- Europa.
bot. Ges. Wien, VI. 612. 10. (1856); SCHUMM., Arb. schles. Ges.,
1841. 115. (1841); ZETT., Dipt. Scand., II. 637. 6. (1843) et XIII.
5075. 6. (1859); Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 204. 10. (1857);
SCHM., Verh. zool. bot. Ges. Wien, VII. 296. 9. (1857) et F. A.,
I. 255. (1862); BOXSÖ., Finnl. Insekt., I. 212. 5. (1865); VERR.,
Entom. Monthly Mag., VI. 176. (1870) et Brit. Fl., VIII. 652. 6.
f. 447. (1901); GIGLIO-TOS, Atti Acc. Sci. Torino, XXVI. 157. t. II.
f. 17-18. (1890).
- collinum* Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 202. 5. (1857).
- vernuloides* GIGLIO-TOS = **flavipenne** PALMA var.

Psarus

LATR., Hist. nat. crust. ins., III. (1802) et XIV. 357. (1804).

- abdominalis** FABR., Entom. syst., IV. 307. 108. [*Syrphus*] (1794), Europa.
Suppl., 557. 2. [*Ceria*] (1798) et Syst. Antl., 211. 1. (1805); GEOFFR.,
Hist. ins., II. 519. 50. [—] (1764); LATR., Hist. nat. crust. ins.,
XIV. 357. (1804). Diet. Hist. nat. Déterv., XXIV. 193. 563. (1804),
Gen. crust. ins., IV. 326. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); COQUEB.,
III. icon., 102. t. XXIII. f. 9. [*Syrphus*] (1804); GERM., Fauna
insect. Europ., X. 19. (1820); MEIG., S. B., III. 174. I. t. XXVII.
f. 8. 12. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 344. (196). t. IV. f.
3. (1827) et Suit. à Bull., I. 490. 1. (1834); Lw., Programm Posen.
27. 1. (1840) et Isis, 1840. 561. 1. (1840); SCHUMM., Arb. schles.
Ges., 1841. 126. (1841); ZETT., Dipt. Scand., II. 643. 1. (1843);
WALK., Ins. Brit., I. 267. I. t. X. f. 2. (1851); SCHM., Verh. zool.-
bot. Ges. Wien, VII. 299. (1857) et F. A., I. 252. (1862); VERR.,
Brit. Fl., VIII. 655. I. f. 437. (1901).
- arcuatus* Macq., Suit. à Bull., I. t. XI. f. 7. (1834).
- coalescens* GEOFFR. ap. FOURER., Entom. paris, II. 486. 51.

[*Musca*] (1785); VILL., Entom. linn., III. 540. 352. [*Musca*] (1789).

arcuatus MACQ. = **abdominalis** FABR.

coalescens GEOFFR. = ? **abdominalis** FABR.

Sphecomyia

LATR., Dict. Hist. nat. Détérv., XV. 545. (?) et Fam. nat. Règne anim., V. 495. (1825).

Tyzenhausia GORSKI, Anal. ad entom. imp. ross., I. 170. (1852).

ornata WIED. = **vittata** WIED.

vespiformis GORSKI = **vittata** WIED.

vittata WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 87. 1. [*Chrysotoxum*] (1830); Europa centr. et sept.

MACQ., Dipt. exot., II. (2). 76. (18). 1. t. III. f. 3. (1842); OST-SACK., Bull. Buffalo Soc. N. Sci., 1875. 65. (25). (1875) et Cat. N. A. Dipt. 2. ed., 254. (254). (1878); v. RÖD., Entom. Nachr., V. 96. (1879); PORTSCH., Horae Soc. entom. Ross., XXI. 6. t. I. f. 5. (1886); WILL., Syn. N. A. Syrph., 257. (1886); CHAGNON, Nat. Can., 1901. 71. (1901); How., Insect Book, t. XX. f. 25. (1902).

ornata WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 91. t. IX. f. 7. [*Psarus*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 491. [*Psarus*] (1834) et Dipt. exot., II. (2). 76. (18). (1842).

vespiformis GORSKI, Anal. ad entom. imp. ross., I. 170. t. I. f. 1. [*Tyzenhausia*] (1852); WAHLBG., Öfv. vet. Akad. Förh., XI. 155. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4646. 1. (1855) et XIII. 6035. obs. (1859); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 445. 1. (1857) et F. A., I. 368. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., I. 213. 1. (1861).

Callicera

PANZ., Fauna germ., CIV. 17. (1809).

aenea FARR., Gen. ins. mant., 304. [*Bibio*] (1777), Spec. ins., II. 413. Europa.

4. [*Bibio*] (1788), Mant. ins., II. 328. [*Bibio*] (1788), Entom. syst., IV. 254. 1. [*Bibio*] (1794) et Syst. Antl., 66. 2. [*Bibio*] (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2830. 134. [*Musca*] (1788); PANZ., Fauna germ., CIV. 17. (1809); LATR., Gen. crust. ins., IV. 328. (1809); MEIG., S. B., III. 155. 1. t. XXVI. f. 16—20. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 357. (209). t. IV. f. 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 485. 1. t. XI. f. 2. (1834); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1841. 112. (1841); WALK., Ins. Brit., I. 239. 1. t. IX. f. 2. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 209. 3. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 290. 1. (1857) et F. A., I. 249. (1862); E. F. STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., IV. 325. (1860); MALM, Kongl. Vet. Handl., 1863. 9. (1863); VERR., Brit. Fl., VII. 656. 1. f. 449—450. (1901).

- aurata* ROND. (*nec* ROSSI), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 67. 4. (1844).
- Panzerii* ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 68. (1844).
- aurata* ROND. = **aenea** FABR.
- aurata* ROSSI = ? **rufa** SCHUMM.
- Bertolonii** ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 212. 6. (1857); YERR., Entom. Monthly Mag., (2). XII. 78. (1901). Europa mer.
- Fagesii* GUER. = **rufa** SCHUMM.
- Macquartii* ROND. = **rufa** SCHUMM.
- Panzerii* ROND. = **aenea** FABR.
- Porrii** ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 211. 5. (1857). Italia.
- Roserii** ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 65. 2. (1844) et Dipt. ital. Prodr., II. 209. 2. (1857). Italia.
- rufa** SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1841. 112. (1841); GERM., Fauna ins. Europ., XXIII. (1841); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 291. 2. (1857) et F. A., I. 249. (1862). Europa centr. et mer.
- ? *aurata* ROSSI (*nec* FABR.), Fauna ctr., II. 288. 1462. t. X. f. 4. [*Syrphus*] (1790); ILLIG., Fauna ctr. Rossi, II. 445. 1462. [*Syrphus*] (1807); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 36. (1868).
- Fagesii* GUER.-MEX., Leon. règne anim., VII. 546. (1844).
- Macquartii* ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 66. 3. (1844) et Dipt. ital. Prodr., II. 210. 4. (1857); LW., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 154. (1847); A. COSTA, Atti Acc. Napoli, 1886. 38. (1886).
- Spinolae** ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 64. 1. (1844) et Dipt. ital. Prodr., II. 209. 1. (1857). Europa mer.
- Yerburyi** VERR., Entom. Monthly Mag., (2). XV. 229. (1904). Anglia.

Microdontinae.

Microdon

MEIG., Illiger's Magaz., II. 275. (1803).

Aphritis LATR., Hist. nat. crust. ins., III. (1802) et XIV. 358. (1804).

Ceratophya WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 79. (1830).

Chymophila MACQ., Suit. a Buff., I. 485. 3. (1834).

Dimeraspis NEWM., Entom. Mag., V. 372. (1838).

Mesophila WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1157. (1849).

Ubristes WALK., Ins. Saunders., III. 217. (1852).

[*Parmala* HEYD., Isis, 1823. 1217. (1823) larva.]

[*Scatelligera* SPIX, Abh. bayer. Akad. Wiss., IX. (1824). larva.]

analis MACQ., Dipt. exot., II. (2). 70. (12). 3. [*Aphritis*] (1842). Algeria

- anthinus* MEIG. = **devius** L.
apiarius LATR. = **mutabilis** L.
apiformis CURT. = **devius** L.
apiformis DEG. = **mutabilis** L.
auricomus COQUILL., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 320. (1898). Japonia.
auropubesceus LATR. = **mutabilis** L.
brevicornis EGG. **Eggeri** MİK.
conicus PANZ. = **devius** L. *
devius L., Syst. Nat., X. 592. [*Musca*] (1758), XII. II. 985. 41. [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1808. [*Musca*] (1761); FABR., Syst. Entom., 767. 25. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., H. 428. 34. [*Syrphus*] (1781), Mant. ins., II. 338. [*Syrphus*] (1788), Entom. syst., IV. 294. [*Syrphus*] (1794), Suppl., 558. 4. [*Mulio*] (1798) et Syst. Antl., 185. 5. [*Mulio*] (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2872. 41. [*Musca*] (1788); MAERKEL, Germ. Zeitschr. entom., V. 266. 284. [*sine nomine*] (1845); LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 600. (1856); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 292. 2. (1857) et F. A., I. 251. (1862); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 207. 3. [*Aphritis*] (1857); POUJADE, Annal. Soc. entom. France, (6). III. 28. t. I. f. 17—19. (1883); WASM., Krit. Verz., 173. (1894); MİK, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 139. (1899); VERR., Brit. Fl., VIII. 662. 2. f. 454. (1901).
anthinus MEIG., S. B., III. 165. 4. t. XXVI. f. 34. (1822); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1841. 115. (1841).
apiformis CURT. (*nec* DEG.), Brit. Entom., 70. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 353. (205). 1. t. IV. f. 5—6. [*Aphritis*] (1827) et Suit. à Buff., I. 486. 1. [*Aphritis*] (1834); ZETT., Ins. Lapp., 589. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 641. 1. (1843); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 207. 1. [*Aphritis*] (1857); BOSSD., Finnl. Insekt., I. 214. 1. (1861).
conicus PANZ., Fauna germ., XII. 21. [*Stratiomys*] (1793).
fuscitarsis SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1841. 115. (1841).
micans MEIG., S. B., III. 165. 3. (1822); MACQ., Suit. à Buff., I. 487. 3. [*Aphritis*] (1834).
mutabilis MACQ. (*nec* L.), Soc. Sci. Lille, 1827. 354. (206). 2. [*Aphritis*] (1827) et Suit. à Buff., I. 487. 2. t. XI. f. 4. [*Aphritis*] (1834); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 596. [*Aphritis*] (1840).
piger SCHRANK, Fauna boica, III. 97. 2387. [*Stratiomys*] (1803).
plebejus SCHRANK, Enum. ins., 438. 890. [*Musca*] (1781).
viridescens VILL., Entom. linn., III. 463. 138. t. IX. f. 24. [*Musca*] (1789).
var. picticornis MİK, Wien. entom. Zeitg., XVI. 66. (1897) et XVIII. 142. (1899). Austria.
Eggeri MİK, Wien. entom. Zeitg., XVI. 66. (1897) et XVIII. 138. (1899); STROBL, Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 585. (1900); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1903. CXCIII. IV. (1903). Europa centr. et mer.
brevicornis EGG. (*nec* LW.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 783. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX. 198. (1893).

mutabilis POULJADE (*nec* L.), Annal. Soc. entom. France, (6), III, 23, t. I, f. 1—16. (1883).

fascitarsis SCHUMM. **deivius** L.

latifrons LAW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI, 600. (1856); SCHN., F. A., I, 251. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXIX, 198. (1893) et Wien. entom. Zeitg., XVIII, 138. (1899); VERR., Brit. Fl., VIII, 663, 3, f. 455. (1901). Europa centr.

latipes CURT. - **mutabilis** L.

micans MEIG. **deivius** L.

mutabilis L., Syst. Nat., X, 592. [*Musca*] (1758), XII, II, 985, 40. Europa.

[*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1807. [*Musca*] (1764); FABR., Syst. entom., 767, 24. [*Syrphus*] (1775), Spec. ins., II, 428, 33. [*Syrphus*] (1781), Mant. ins., II, 338. [*Syrphus*] (1788), Entom. syst., IV, 294, 59. [*Syrphus*] (1794), Suppl., 558, 3. [*Mulio*] (1798) et Syst. Antl., 184, 4. [*Mulio*] (1805); GMEL., Syst. Nat., V, 2842, 40. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III, 441, 89. [*Musca*] (1789); PANZ., Fauna germ., LXXXII, 21. [*Syrphus*] (1801); FALL., Dipt. Succ. Syrph., 4, 1. (1816); MEIG., S. B., III, 164, 2. (1822); ZETT., Ins. Lapp., 589. obs. (1838) et Dipt. Scand., II, 642, 2. (1843); ELDRIT, Stettin. entom. Zeitg., VI, 384, t. I, f. 6—14. (1845); WISSM., Stettin. entom. Zeitg., IX, 79. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III, 539. (1849) et Ins. Brit., I, 240, 1. (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II, 207, 2. [*Aphritis*] (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII, 291, 1. (1857) et F. A., I, 250. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., I, 215, 2. (1861); LATZEL, Jahrb. nat. Land. Kärnt., 1876, 105. (1876); WÄSM., Krit. Verz., 173. (1894); MÜK, Wien. entom. Zeitg., XVIII, 141. (1899); VERR., Brit. Fl., VIII, 660, 1, f. 451—453. (1901); ADAMS, Entom. Monthly Mag., (2), XIV, 126. (1903).

apiarius LATR., Diet. Hist. nat. Détérv., XXIV, 193, 564.

[*Aphritis*] (1804); FABR., Syst. Antl., 185, 9. [*Mulio*] (1805).

apiformis DEG., Ins., VI, 128, 18, t. VII, f. 18—20. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI, 56, 18. [*Musca*] (1782); VILL., Entom. linn., III, 455, 113. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etr., II, 287, 1458. [*Syrphus*] (1790); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II, 442, 1458. [*Syrphus*] (1807); MEIG., S. B., III, 163, 1. (1822) et VI, 349. (1830); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1841, 114. (1841); LAW., Programm Posen, 26, 1. (1840). Isis, 560, 1. (1849) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI, 600. (1856); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III, 539. (1849) et Ins. Brit., I, 240, 2, t. IX, f. 3. (1851). *europabescens* LATR., Hist. nat. crust. Ins., XIV, 358, 1. [*Aphritis*] (1804), Gen. crust. ins., I, t. XVI, f. 7. = [*Aphritis*] (1806) et Cons. gén., 443. [*Aphritis*] (1810).

latipes CURT., Guide 2. ed., 249, 1. (1837).

novus SCHIRANK, Beitr. zur Naturg., 93, 63. [*Musca*] (1776) et Enum. ins., 437, 889. [*Musca*] (1781); VILL., Entom. linn., III, 427, 58. [*Musca*] (1789).

- scutellatus* SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1841. 116. (1841).
mutabilis MACQ. = **devius** L.
mutabilis POUJ. = **Eggeri** MIK.
novus SCHRANK = **mutabilis** L.
picticornis MIK = **devius** L. var.
piger SCHRANK = **devius** L.
plebejus SCHRANK = **devius** L.
scutellatus SCHUMM. = **mutabilis** L.
viridescens VILL. = **devius** L.

Ceriinae.

Cerioides

ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 211. (1850).

Ceria FABR. (nec SCOP. 1763), Entom. syst., IV. 277. (1794).

Sphæcomorpha ROND., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 212. [*Sphærimorpha* (1850) emend. Bezzi 1906, nec HÜBN. 1806. LEP., nec NEWM. 1838. COL.]

adunata GEOFFR. = **conopoides** L.

binominata VERR., Brit. Fl., VIII. 665. [*Ceriat*] (1901).

Europa centr.

tridens LW. (nec LW. 1872), Beschreib. europ. Dipt., III. 210. 131. (1873).

et or.

clavicornis COQUEB. = **vespiformis** LATR.

clavicornis FABR. = **conopoides** L.

clavicornis SCHELL. = **conopoides** L. et **subsessilis** ILLIG.

conopea ROSSI em. = **conopoides** L.

conopoides L., emend. [*conopsoides*], Syst. Nat., X. 590. [*Musca*] Europa.
 (1758), XII. II. 982. 21. [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1790.
 [*Musca*] (1761); O. F. MÜLL., Fauna Fridrichsd., 709. [*Musca*]
 (1764); SCHAEFF., Icon. ins., 1. 104. f. 3. [—] (1766); GMEL., Syst.
 Nat., V. 2868. 21. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 414.
 20. t. IX. f. 8. [*Musca*] (1789); SCHRANK, Enum. ins., 440. 895.
 [*Musca*] (1781); LATR., Gen. crust. ins., IV. 328. [*Ceria*] (1809);
 MEIG., S. B., III. 160. 2. t. XXVI. f. 21—25. [*Ceria*] (1822); Macq.,
 Soc. Sci. Lille, 1827. 329. (211). 1. t. IV. f. 8. [*Ceria*] (1827) et
 Suit. à Buff., 1. 484. 1. t. XI. f. 1. [*Ceria*] (1834); CURT., Brit.
 Entom., 186. [*Ceria*] (1828); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 596.
 [*Ceria*] (1840); WESTW., Introd., II. 558. [*Ceria*] (1840); LW.,
 Programm Posen, 26. 1. [*Ceria*] (1840), Isis, 1840. 560. 1. [*Ceria*]
 (1840) et N. Beitr., II. 6. 1. [*Ceria*] (1853); SCHUMM., Arb. schles. Ges.,
 1841. 114. [*Ceria*] (1841); ZETT., Dipt. Scand., II. 631. 1. (1843)
 et VIII. 3017. 1. [*Ceria*] (1849); O. G. COSTA, Atti Acc. Napoli,
 V. (2). 98. 4. [*Ceria*] (1844); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Museon,
 XX. (3). 170. 1. [*Ceria*] (1847); DUF., Annal. Soc. entom. France,

(2). V. 19. t. I. (1). f. 1—6. [*Ceria*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 537. [*Ceria*] (1849) et Ins. Brit., 1. 238. 1. t. IX. f. 1. [*Ceria*] (1851); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 213. 1. [*Ceria*] (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 446. 3. [*Ceria*] (1857) et F. A., I. 369. [*Ceria*] (1862); BOSSD., Finn. Insekt., I. 210. 1. [*Ceria*] (1861); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. 279. 43. [*Ceria*] (1882); VERR., Brit. Fl., VIII. 665. 1. f. 456—457. [*Ceria*] (1901).

ulunata GEOFFR., ap. FOURCR., Entom. par., II. 488. 56. [*Musca*] (1785); VILL., Entom. linn., III. 540. 353. [*Musca*] (1789).

clavicornis FABR., Entom. syst., IV. 277. 1. [*Ceria*] (1794), Suppl., 557. 1. [*Ceria*] (1798) et Syst. Antl., 173. 1. [*Ceria*] (1805); SCHELL., ♂, Genr. Mouch. Dipt., 42. t. XXIII. f. 1. [*Ceria*] (1803); MEIG., ♀, Klass., I. 282. 1. t. XIV. f. 10—12. [*Ceria*] (1804); LATR., Diet. Hist. nat. Deterv., XXIV. 193. 662. [*Ceria*] (1804) et Hist. nat. ernst. ins., XIV. 356. [*Ceria*] (1804); FALL., Dipt. Suec. Syrph., 6. [*Ceria*] (1816); DUMER., Cons. g en., t. XLVIII. f. 10. [*Ceria*] (1823).

conopa ROSSI (*nec* L.), Fauna etr., II. 289. 1464. [*Syrphus conopseus*] (1790); PANZ., Fauna germ., XLIV. 20. [*Syrphus*] (1797); DWIG., Primitiae faunae Mosqm., 177. 661. [*Musca*] (1802); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 446. 1464. [*Syrphus*] (1807).

vaginicornis SOHRANK, Fauna boica, III. 163. 2561. [*Conops*] (1803).

conopsoides auct. = **conopoides** L. *em.*

euprosopa Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 256. 148. [*Ceria*] (1869).

Asia min.

Garibaldii ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., II. 145. 2. t. V. f. A. [*Sphecomorpha*] (1860); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 212. *nota*. [*Ceria*] (1873); BEZZI, Atti Soc. Ven. trent. Sci. Nat., (2). I. 81. 2. (*sep.*) [*Ceria*] (1893).

Italia.

intricata SAUND. = **vespiformis** LATR.

Petronillae ROND., Annal. Soc. entom. Francee, (2). VIII. 213. t. VII. (1). f. 1—3. [*Sphecomorpha*] (1850), Dipt. ital. Prodr., II. 215. 2. [*Sphecomorpha*] (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., II. 145. 3. [*Sphecomorpha*] (1860); Lw., N. Beitr., I. 9. 4. [*Ceria*] (1853).

Italia.

scutellata MACQ. — **vespiformis** LATR.

subsessilis ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 446. *nota*. [*Ceria*] (1807); LATR., Gen. ernst. ins., IV. 328. [*Ceria*] (1809); MEIG., S. B., III. 159. 1. t. XXVI. f. 26. [*Ceria*] (1822); MACQ., Suit.   Buff., I. 484. 2. [*Ceria*] (1834); SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1841. 114. [*Ceria*] (1841); ROND., Annal. Soc. entom. Francee, (2). VIII. 212. [*Sphecomorpha*] (1850), Dipt. ital. Prodr., II. 215. 1. [*Sphecomorpha*] (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., II. 145. 1. [*Sphecomorpha*] (1860); Lw., N. Beitr., I. 8. 3. [*Ceria*] (1853); SAUND., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 446. 2. [*Ceria*] (1857) et F. A., I. 369. [*Ceria*] (1862).

Europa centr.
et mer.

clavicornis SCHELL. (*nec* FABR.), ♂, Genr. Mouch. Dipt., 42. 1.

XXIII. f. 2. [*Ceria*] (1803); MEIG., ♂, Klass., I. 282. 1. t.

XIV. f. 7-9. [*Ceria*] (1804).

tridens Lw. — **binominata** VERR.

vaginicornis SCHIRANK = **conopoides** L.

vespiformis LATR., Gen. crust. ins., IV. 328. [*Ceria*] (1809) et Cons. Europa mer.,
gén., 443. [*Ceria*] (1810); MEIG., S. B., III. 161. 3. (1822) et VI. Africa sept.

348. [*Ceria*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 484. 3. [*Ceria*] (1834);

Lw., N. Beitr., I. 7. 2. [*Ceria*] (1853); SCHIN., Verh. zool.-bot.

Ges. Wien, VII. 447. 4. [*Ceria*] (1857); ROND., Dipt. ital. Prodr.,

H. 213. 2. [*Ceria*] (1857); PALMA, Annal. Acc. Asp. Nat., (3). III.

38. 2. [*Ceria*] (1864).

clavicornis COQUEB. (nec FABR.), III. icon., 103. t. XXIII. f. 8.

[*Ceria*] (1804).

intricata W. W. SAUND., Trans. entom. Soc. London, IV. 64.

t. IV. f. 2. [*Ceria*] (1845).

scutellata MACQ., Dipt. exot., H. (2). 68. (10). 1. t. I. f. 1. [*Ceria*]

(1842); W. W. SAUND., Trans. entom. Soc. London, IV. 66.

[*Ceria*] (1845).

PIPUNCULIDAE.

Nephrocerus

ZETT., Ins. Lapp., 578. 40. (1838).

flavicornis ZETT., Dipt. Scand., III. 949. 2. (1842); SCHIN., F. A., I. Europa centr.
248. (1862); BONSD., Finl. Insekt., II. 20. 1. (1866); BECK., Berlin. et sept.
entom. Zeitschr., XLII. 31. 1. (1897) et XLV. 235. 1. (1900); VERR.,
Brit. Fl., VIII. 77. 1. (1901).

lapponicus ZETT., Ins. Lapp., 578. 1. (1838) et Dipt. Scand., III. 947. Europa centr.
1. (1844); ? POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 401. (1887); et sept.
BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 34. 3. (1897) et XLV. 215. 3.
(1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 77. (1901).

scutellatus MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 356. 9. t. VI. f. 10. [*Pipunc-* Europa centr.
ulus] (1834) et Suit. à Buff., II. 9. 1. t. XVI. f. 4. [*Pipunculus*] et mer.
(1835); MEIG., S. B., VII. 147. 19. [*Pipunculus*] (1838); GIMM.,
Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 178. 1. [*Pipunculus*]
(1847); SCHIN., F. A., I. 248. (1802); BECK., Berlin. entom. Zeitschr.,
XLII. 32. 2. t. II. f. 24. (1897) et XLV. 215. 2. (1900); VERR.,
Brit. Fl., VIII. 77. (1901).

Pipunculus

LATR., Hist. nat. Crust. ins., III. 463. (1802), XIV. 392. (1804).

Alloneura ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 140. 4. (1856) *nee* SELYS
NEUR.

Cephalops FALL., Specimen entom., 10. 28. (1810).

Microcera MEIG., Illiger's Magaz., II. 273. 71. (1803).

Prothechus ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 139. 2. (1856).

aeneus FALL. = **pratorum** FALL.

albitarsis ZETT. = **haemorrhoidalis** ZETT.

annulipes ZETT. = **maculatus** WALK. et **vittipes** ZETT.

arimosus BECK. = **ruralis** MEIG.

ater MEIG. = **campestris** LATR.

auctus ROND. = **furcatus** EGG.

Braueri STROBL, Programm Seitenst., XIV. 13. (1880) et Mittheil. Europa centr.
Ver. Steierm., XXX. 7. (1894); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., et sept.
XLII. 76. 36. t. II. f. 22—23. (1897) et XLV. 227. (1900); GIRSCHN.,
Wien. entom. Zeitg., XXI. 123. 4. (1902).

flavipes p. p., ZETT. (*nee* MEIG.), Dipt. Scand., III. 961. 15. (1844)
et VIII. 3207. 15. (1849); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 24. 7.
(1866); THOMS., Opusc. entom., II. 118. (1869).

calceatus v. ROS., Württemb. Corubl., 1840. 55. (1840); BECK., Berlin. Europa centr.
entom. Zeitschr., XLII. 65. 28. (1897) et XLV. 226. (1900). et mer.

campestris LATR., Hist. nat. crust. ins., XIV. 392. (1804), Gen. crust. Europa.
ins., IV. 332. (1809) et Cons. gén., 444. (1810); PANZ., Fauna
germ., CVIII. 17. (1809); LEACH, Edinburgh. Encycl., X. 130.
(1815); MEIG., S. B., IV. 19. 1. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille,
1833. 354. 1. t. VI. f. 9. (1834) et Suit. à Buff., II. 10. 3. t. XIII.
f. 5. (1835); WALK., Entom. Mag., II. 267. 6. (1834), List Dipt.
Brit. Mus., III. 640. (1849) et Ins. Brit., I. 232. 6. t. VIII. f. 6.
(1851); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 605. (1840); ZETT., Dipt.
Scand., III. 952. 3. (1844), VIII. 3205. 3. (1849) et XIII. 6057. 3.
(1859); GUER-MÉN., leon. règne anim., VII. t. XCVI. f. 7. (1844);
SCHN., F. A., I. 247. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 22. 3.
(1866); THOMS., Opusc. entom., II. 121. 21. (1869); BECHER, Denk-
schr. Akad. Wien, XLIV. 150. t. III. f. 24. (1882); STROBL, Mit-
theil. Ver. Steierm., XXX. 5. (1894); BECK., Berlin. entom.
Zeitschr., XLII. 69. 31. t. II. f. 11. (1897) et XLV. 226. (1900);
VERR., Brit. Fl., VIII. 99. 12. f. 94. 99—102. (1901).

ater MEIG., S. B., IV. 23. 9. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833.
356. 8. (1834); ZETT., Dipt. Scand., III. 953. 4. (1844); SCHN.,
F. A., I. 247. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 23. 4. (1866);
THOMS., Opusc. entom., II. 119. 19. (1869); KOW., Wien.
entom. Zeitg., VI. 153. 14. (1887); STROBL, Mittheil. Ver.
Steierm., XXX. 8. (1894) et Wien. entom. Zeitg., XVIII. 147.

116. (1899); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 68. 30. t. II. f. 20. (1897) et XLV. 226. (1900).
 ? *cephalotes* BOSCH, Journ. d'Hist. Nat., II. 55. t. XXVIII. f. 5. [*Musca*] (1792).
dentipes MEIG., S. B., VII. 146. 15. (1838); SCHIN., F. A., I. 247. (1862).
dispar ZETT., Ins. Lapp., 579. 3. (1838).
spinipes MEIG., S. B., VI. 359. 14. (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 355. 7. (1834) et Suit. à Buff., II. 11. 12. (1835).
Wolfii KOW., Wien. entom. Zeitg., VI. 152. 13. (1887).
- carinatus** VERR., Brit. Fl., VIII. 104. 14. f. 104. (1901). Anglia.
cephalotes BOSCH = ? **campestris** LATR.
- clavatus** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 39 et 56. 22. t. II. f. 7. (1897); KERT., Termész. Füzet., XXIV. 161. (1901). Italia.
- coloratus** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 57. 24. (1897) et XLV. 220. (1900). Europa centr.
fascipes STROBL (*ucc* ZETT.), Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 3. (1894).
- confusus** VERR., Brit. Fl., VIII. 114. 20. f. 110—111. (1901). Anglia.
dentipes MEIG. = **campestris** LATR.
- discoidalis** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 46. 12. (1897) et XLV. 220. (1900). Asia min.
- disjunctus** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 239. 69. (1900) et Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 97. 133. [*dijunctus*] (1903). Aegyptus.
- dispar* ZETT. = **campestris** LATR.
elegans EGG. = **pratorum** FALL.
- elephas** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 42. 7. t. II. f. 2. (1897) et XLV. 227. (1900). Europa centr.
- fascipes* STROBL = **coloratus** BECK.
- fascipes** ZETT., Dipt. Scand., III. 964. 18. (1844); BONSD., Finnl. Insekt., II. 24. 9. (1866); THOMS., Opusc. entom., II. 116. 14. (1869); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 53. 19. t. II. f. 8. (1897) et XLV. 220. (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 87. 3. (1901). Europa.
- flavipes** MEIG., S. B., IV. 21. 5. t. XXXIII. f. 21. (1824); MACQ., Suit. à Buff., II. 12. 13. (1835); WALK., Ins. Brit., I. 232. 4. (1851); SCHIN., F. A., I. 247. (1862); THOMS., p. p., Opusc. entom., II. 117. (1869); KOW., Wien. entom. Zeitg., VI. 150. 8. (1887); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 74. 35. t. II. f. 23. (1897) et XLV. 228. (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 108. 16. (1901); GÜRSCHN., Wien. entom. Zeitg., XXI. 123. 2. (1901). Europa.
- flavipes* ROND. = ? **littoralis** BECK.
flavipes WALK. = **semifumosus** KOW.
flavipes ZETT. = **Braueri** STROBL et **vittipes** ZETT.
- fluviatilis** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 224. 62. (1900) et Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 94. 130. (1903). Aegyptus.
- frontatus** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 87. 45. (1897), XLV. 240. 45. (1900) et Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 97. 135. (1903). Europa mer., Aegyptus.

fulvipes MACQ. = **maculatus** WALK.

fureatus EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 347. (1860); SCHIN., F. A., I. 246. (1862); THOMS., Opusc. entom., II. 121. 22. (1869); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 2. (1894); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 40. 4. (1897) et XLV. 216. (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 84. 1. f. 95—96. (1901); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXIV. 582. (1902).

auctus ROND. (*nec* FALL.), Dipt. ital. Prodr., I. 139. (1856).

fuscipes STROBL = **terminalis** THOMS.

fuscipes ZETT. *) Dipt. Scand., III. 953. 5. (1844) et XII. 4682. 5. (1855); BOHEM., Öfv. vet. Akad. Förhandl., VII. 212. (1850) et XI. 302. t. V. f. 1—8. (1854); ? PERR., Annal. Soc. Linn. Lyon, 1850—52. 172. (1852); SCHIN., F. A., I. 247. (1862); ? FRAUENF., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 900. 3. (1865); BOSSD., Finkl. Insekt., II. 23. 5. (1866); THOMS., Opusc. entom., II. 116. 13. (1869); SIEBKE, Emm. ins. norveg., IV. 78. 5. (1877); KOW, Wien. entom. Zeitg., VI. 149. 5. (1887); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 54. 20. (1897) et XLV. 218. (1900); ? STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 147. 117. (1899); VERR., Brit. Fl., VIII. 89. 5. (1901).

pratorum p. p., FALL., Dipt. Succ. Syrph., 15. 1. [*Cephalops*] (1816).

ruralis STROBL (*nec* MEIG.), Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 5. (1894).

fusculus ZETT., Dipt. Scand., III. 955. 7. (1844); SCHIN., F. A., I. 247. (1862); BOSSD., Finkl. Insekt., II. 23. 6. (1866); THOMS., Opusc. entom., II. 113. 8. (1869); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 43. 8. t. II. f. 3. (1897) et XLV. 217. (1900).

geniculatus MEIG., S. B., IV. 20. 2. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 354. 2. (1834) et Suit. à Buff., II. 10. 4. (1835); WALK., Entom. Mag., II. 265. 3. (1834); VERR., Brit. Fl., VIII. 120. 25. t. 114—115. (1901).

griseipennis VERR., Cat. europ. Pipunc., 11. (1900).

nigritulus ZETT., Dipt. Scand., III. 957. 10. (1844) et VIII. 3206. 10. (1849); SCHIN., F. A., I. 246. (1862); BOSSD., Finkl. Insekt., II. 26. 13. (1866); THOMS., Opusc. entom., II. 109. 2. (1869); KOW, Wien. entom. Zeitg., VI. 148 et 153. 16. (1887); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 11. (1894); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 84. 41. t. II. f. 10. (1897) et XLV. 234. (1900).

var. griseifrons STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 147. 118. (1897).

geniculatus ZETT. = **incognitus** VERR

griseifrons STROBL. = **geniculatus** MEIG. *var.*

griseipennis VERR. = **geniculatus** MEIG. *var. griseifrons* STROBL.

*) *Athysanus maritimus* PERR., *Tettigonia virescens* FABR., *Typhlocyba bifasciata* FABR. et *rosae* L.

- haemorrhoidalis** ZETT., Ins. Lapp., 580. 6. (1838) et Dipt. Scand., III. 959. 13. (1844); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 27. 16. (1866); THOMS., Opusc. entom., II. 112. 6. (1869); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 10. (1894); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 91. 51. t. II. f. 13. (1897) et XLV. 235. (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 116. 22. (1901).
albitarsis ZETT., Dipt. Scand., III. 958. 11. (1844); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 26. 14. (1866).
- halteratus** MEIG., S. B., VII. 146. 16. (1838); ? STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 6. (1894); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 79. 39. (1897) et XLV. 228. (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 95. 10. f. 98. (1901).
- holosericeus* BECK. = **sericeus** BECK.
- horridus** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 41. 6. t. II. f. 1. (1897) et XLV. 216. (1900).
- incognitus** VERR., Brit. Fl., VIII. 113. 19. f. 109. (1901).
geniculatus ZETT. (*nec* MEIG.), Ins. Lapp., 579. 4. (1838) et Dipt. Scand., III. 955. 8. (1844); WALK., Ins. Brit., I. 232. 3. (1851); SCHIN., F. A., I. 247. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 25. 11. (1866); THOMS., Opusc. entom., II. 111. 4. (1869); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 10. (1894); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 90. 49. (1897) et XLV. 235. (1900).
- Kowarzi** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 48. 14. (1897) et XLV. 217. (1900).
- lateralis* MACQ. = **maculatus** WALK.
- littoralis* BECK. = **minus** BECK.
- maculatus** WALK., Entom. Mag., II. 264. 1. (1834) et Ins. Brit., I. 232. 1. (1851); VERR., Brit. Fl., VIII. 119. 24. (1901).
annulipes p. p., ZETT., Ins. Lapp., 580. 7. (1838).
fulvipes MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 355. 5. (1834) et Suit. à Buff., II. 11. 9. (1835); MEIG., S. B., VII. 147. 18. (1838); ZETT., Dipt. Scand., III. 960. 14. (1844); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 28. 17. (1866); THOMS., Opusc. entom., II. 112. 7. (1869).
lateralis MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 355. 4. (1834) et Suit. à Buff., II. 11. 8. (1835); MEIG., S. B., VII. 147. 17. (1838); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 87. 46. (1897) et XLV. 235. (1900).
- melanostolus** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 40. 5. (1897) et XLV. 216. (1900).
- minus** BECK., Berlin. entom. Zeit. chr., XLII. 85. 43. (1897) et XLV. 233. (1900); KERT., Termész. Füzet., XXIV. 162. (1901).
fulvipes ROND. (*nec* MEIG.), Dipt. ital. Prodr., I. 140. [*Alloncura*] (1856).
littoralis BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 86. 44. (1897) et XLV. 239. 44. (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 122. 26. f. 116. (1901).
- modestus** HAL., Entom. Mag., I. 162. (1833); WALK., Entom. Mag., Europa e. ets.

- II. 267. 7. (1835) et Ins. Brit., I. 232. 7. (1851); VERR., Brit. Fl., VIII. 88. 4. (1901).
- monticola** SCHUMM., Arb. schles. Ges., 1836. 86. 3. (1837). Germania.
- montium** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 50. 16. (1897) et XLV. 218. (1900). Europa centr.
- mutatus** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 85. 42. t. II. f. 12. (1897), XLV. 139. 42. (1900) et Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 97. 134. (1903). Europacentr., Aegyptus.
- nigritulus* ZETT. -- **geniculatus** MEIG.
- nitidifrons** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 241. 70. (1900) et Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 98. 136. (1903). Aegyptus.
- obscurinervis* SCHN. **obtusinervis** ZETT.
- obtusinervis** ZETT., Dipt. Scand., III. 965. 20. (1844); THOMS., Opusc. entom., II. 114. 10. (1869); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 45. 11. (1897) et XLV. 217. (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 93. 9. f. 97. (1901). Europa centr. et sept.
- obscurinervis* SCHN., F. A., I. 248. (1862).
- omissinervis** BECK., Wien. entom. Zeitg., VIII. 83. 7. t. I. f. 9—10. (1889), Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 64. 26. (1897) et XLV. 226. (1900). Alpes.
- opacus** FALL., Dipt. Succ. Syrph., 15. 2. [*Cephalops*] (1816); MEIG., S. B., VI. 359. 13. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 11. 11. (1835); ZETT., Dipt. Scand., XXI. 966. 21. (1844); THOMS., Opusc. entom., II. 114. 9. (1869); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 44. 9. (1897) et XLV. 217. (1900). Europa centr. et sept.
- pannonicus** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 51. 17. t. II. f. 5. (1897) et XLV. 218. (1900). Europa centr. et mer.
- zoultus* STROBL (*nec* ZETT.), Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 5. (1894).
- pilosiventris** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 236. 67. (1900) et Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 95. 131. (1903). Aegyptus.
- pratorum* FALL. **fuscipes** ZETT. et **pratorum** FALL.
- pratorum** p. p., FALL., Dipt. Succ. Syrph., 15. 1. [*Cephalops*] (1816); MEIG., S. B., IV. 22. 7. (1824); WALK., Entom. Mag., II. 266. 5. (1834) et Ins. Brit., I. 232. 5. (1851); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 354. 3. (1834) et Suit. à Buff., II. 11. 7. (1835); CURT., Brit. entom., 757. (1836); ZETT., Ins. Lapp., 579. 1. (1838) et Dipt. Scand., III. 951. 2. (1844); SCHN., F. A., I. 247. (1862); BONSD., Fintl. Insekt., II. 22. 2. (1866); THOMS., Opusc. entom., II. 120. 20. (1869); KOW., Wien. entom. Zeitg., VI. 152. 11. (1887); KERR., Wien. entom. Zeitg., XIX. 245. 6. (1900) et XX. 183. (1901); VERR., Brit. Fl., VIII. 103. 13. f. 103. (1901); BECK., Wien. entom. Zeitg., XXI. 13. (1902); GIRSCHN., Wien. entom. Zeitg., XXI. 123. 1. (1902).
- aneus* FALL., Specim. entom., 25. t. I. f. 3. [*Cephalops*] (1810).
- elegans* Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 347. (1860); SCHN., F. A., I. 246. (1862).
- Thomsoni* BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 67. 29. t. II.

- f. 18. (1897), XLV. 226. (1900) et Wien. entom. Zeitg., XX. 132. (1901); GÜRSCHN., Wien. entom. Zeitg., XXI. 123. 5. (1902).
- pulchripes** THOMS., Opusc. entom., II. 117. 16. (1869); Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 149. 6. (1887); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 72. 33. (1897) et XLV. 227. (1900). Europa centr. et sept.
- Roseri** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 45. 10. (1897) et XLV. 219. (1900). Europa centr.
- rufipes** MEIG., S. B., IV. 21. 4. (1824); MACQ., Suit. à Buff., II. 10. 6. (1835); ZETT., Dipt. Scand., III. 959. 12. (1844) et VIII. 3207. 12. (1849); SCHN., F. A., I. 247. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 27. 15. (1866); THOMS., Opusc. entom., II. 110. 3. (1869); Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 154. 18. (1887); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 9. (1893); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 89. 48. t. II. f. 15. (1897) et XLV. 235. (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 115. 21. f. 112. (1901). Europa.
- acuticornis* ZELL. in litt. ap. ZETT.
- ruralis** MEIG., S. B., IV. 22. 8. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 355. 6. (1834) et Suit. à Buff., II. 11. 10. (1835); ? ZETT., Dipt. Scand., III. 965. 19. (1844); ? SCHN., F. A., I. 247. (1862); ? Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 152. 12. (1887); VERR., Brit. Fl., VIII. 90. 6. (1901). Europa centr. et sept.
- arimosus* BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 221. 59. (1900) et Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 93. (1903); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 478. (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX. 537. (1904).
- terminalis* STROBL (*nec* THOMS.), Wien. entom. Zeitg., XII. 80. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 3. (1894); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 48. (1897).
- ruralis* STROBL — **fuscipes** ZETT.
- semifumosus** Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 149. 7. (1887); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 6. (1894); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 70. 32. (1897) et XLV. 227. (1900). Europa centr. et sept.
- flavipes* WALK. (*nec* MEIG.), Entom. Mag., II. 266. 4. (1835); THOMS., Opusc. entom., II. 117. 17. (1869); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 7. (1894).
- semimaculatus** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 91. 52. t. II. f. 21. (1897) et XLV. 235. (1900). Europa centr. et sept.
- seminitidus** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 73. 34. t. II. f. 19. (1897) et XLV. 227. (1900). Europa mer.
- sericeus** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 100. *nota*. (1897) et XLV. 218. (1900). Europa centr. et mer.
- holosericeus* BECK., (*nec* MEIG.), Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 55. 21. (1897); KERR., Wien. entom. Zeitg., XIX. 245. 4. (1900) et Termész. Füzet., XXIV. 161. (1901).
- signatus** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 232. 66. (1900). Hungaria.
- silvaticus** MEIG., S. B., IV. 20. 3. [*sylvaticus*] (1824); WALK., Entom. Europa.

- Mag., II. 265. 2. (1834) et Ins. Brit., I. 232. 2. (1851); Macq., Suit. à Buff., II. 10. 5. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 579. 5. (1838) et Dipt. Scand., III. 956. 9. (1844), VIII. 3206. 9. (1849) et XIII. 6058. 9. (1859); SCHIX., F. A., I. 246. (1862); BOSSD., Fiml. Insekt., II. 26. 12. (1866); THOMS., Opusc. entom., II. 109. 1. (1869); KOW., Wien. entom. Zeitzg., VI. 148. (1887); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 83. 40. t. II. f. 16. (1897) et XLV. 236. 40. (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 124. 27. t. 117. (1901); MELI., Zool. Jahrbüch., XIV. t. XXXV. f. 125. (1901).
- spinipes* MEG. - **campestris** LATR.
- straminipes** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 225. 63. (1900). Italia.
- strigulipes** VERR., Brit. Fl., VIII. 112. 18. (1901). Anglia.
- Strobli** VERR., Brit. Fl., VIII. 169. 17. f. 106—108. (1901). Anglia.
- sulcatus** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 57. 23. (1897) et XLV. 219. (1900). Europa mer.
- sylvaticus* auctor. **silvaticus** (MEG.) KOW.
- terminalis* STROBL **ruralis** MEG.
- terminalis** THOMS., Opusc. entom., II. 115. 11. (1869); KOW., Wien. entom. Zeitzg., VI. 149. 3. (1887); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 47. 13. (1897) et XLV. 218. (1900); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercegov., X. 428. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercegov., VII. 584. (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 92. 8. (1901).
- fascipes* STROBL (*novae* ZETT.), Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 4. (1894); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 48. (1907).
- rulyatissimus* BECK. in litt. ap. STROBL.
- Thomsoni* BECK. - **pratorum** FALL.
- trapezoides** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 223. 61. (1900). Hungaria.
- trochanteratus** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 221. 60. (1900) et Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 93. 129. (1903). Aegyptus.
- ultimus** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 231. 65. (1900). Italia.
- unicolor** ZETT., Dipt. Scand., III. 954. 6. (1844); SCHIX., F. A., I. 247. (1862); THOMS., Opusc. entom., II. 116. 15. (1869); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 29. 15. t. II. f. 4. (1897) et XLV. 918. (1900). Europa.
- varipes** MEG., S. B., IV. 21. 6. (1824); ZETT., Dipt. Scand., III. 963. 16. (1844); SCHIX., F. A., I. 247. (1862); BOSSD., Fiml. Insekt., II. 24. 8. (1866); KOW., Wien. entom. Zeitzg., VI. 151. 9. (1887); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 6. (1894); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 62. 25. t. II. f. 17. (1897) et XLV. 226. (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 96. 11. (1901). Europa.
- vestitus** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 230. 64. (1900). Europa centr.
- vicinus** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLV. 238. 68. (1900) et Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. 96. 132. (1903). Aegyptus.
- vittipes** ZETT., Dipt. Scand., III. 963. 17. (1844); BOSSD., Fiml. Insekt., II. 25. 10. (1866); THOMS., Opusc. entom., II. 118. 18. (1869); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 77. 37. (1897) et XLV. 227. (1900). Europa centr. et sept.

- annulipes* ZETT., p. p., Ins. Lapp., 580. 7. (1838); KERT., Wien. entom. Zeitg., XIX. 245. 5. (1900) et Termész. Füzet., XXIV. 158. (1901).
- flavipes* p. p., ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., III. 964. var. *b.* ♂ (1844).
- Wolffi* KOW. = **campestris** LATR.
- xanthocerus** KOW., Wien. entom. Zeitg., VI. 153. 17. (1887); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 10. (1894); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 89. 47. t. II. f. 14. (1897) et XLV. 235. (1900). Europa centr. et mer.
- xanthopus** THOMS., Opusc. entom., II. 111. 5. (1869); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 90. 50. (1897) et XLV. 235. (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 117. 23. f. 113. (1901.) Europa centr. et sept.
- zermattensis** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 77. 38. (1897) et XLV. 228. (1900). Alpes.
- zonatus* STROBL = **pannonicus** BECK.
- zonatus** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3206. 5--6. (1849), XII. 4683. 5--6. (1855) et XIII. 6058. 5--6. (1859); SCHIN., F. A., I. 248. (1862); THOMS., Opusc. entom., II. 115. 12. (1869); KOW., Wien. entom. Zeitg., VI. 149. 4. (1887); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 52. 18. t. II. f. 9. (1897) et XLV. 219. (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 86. 2. (1901); GIRSCHN., Wien. entom. Zeitg., XXI. 122. 3. (1901); WESCHÉ, Journ. microscop. Soc., 1904. t. VI. f. 16. (1904). Europa centr. et sept.
- Zugmayeriae** KOW., Wien. entom. Zeitg., XLII. 64. 27. (1897) et XLV. 226. (1900). Europa centr.

Chalarus

WALK., Entom. Mag., II. 269. (1838).

Atelencura MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 356. [*Atelencura*] (? 1834).

- basalis** LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 215. 135. (1873); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 2. (1894); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 97. 58. (1897). Europa centr.
- exiguus* HAL. = **spurius** FALL.
- holosericeus* MEIG. = **spurius** FALL.
- obscurus* ZETT. = **spurius** FALL.
- spurius** FALL.,*) Dipt. Svec. Syrph., 16. 3. [*Cephalops*] (1816); MEIG., S. B., IV. 24. 11. t. XXXIII. f. 24. [*Pipanculus*] (1824); ZETT., Ins. Lapp., 530. 8. [*Pipanculus*] (1838) et Dipt. Scand., III. 961. 23. (1844), XIII. 6060. 23. [*Pipanculus*] (1859); WALK., Entom. Mag., II. 269. 2. (1834), List Dipt. Brit. Mus., III. 640. (1869) et Ins. Brit., I. 233. 2. t. VIII. f. 7. (1851); SCHIN., F. A., I. 245. (1862); BOSSO., Finnl. Insekt., II. 29. 19. [*Pipanculus*] (1866); THOMS., Opusc. entom., II. 123. 25. [*Pipanculus*] (1869); GIARD.,

*) *Typhlocyba rosae* L.

Comptes rend., CIX. 708. [*Ateleneura*] et 1889. 79. [*Ateleneura*] (1889); TETENS, Entom. Nachr., XV. 1. (1889); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 1. (1894); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 96. 56. (1897); VERR., Brit. Fl., VIII. 68. 1. f. 4. (1901); MELL., Zool. Jahrbüch., XIV. t. VII. f. 42. [*Ateleneura*] (1900) et XV. 677. f. 31. [*Ateleneura*] (1901).

exiguus HAL., Entom. Mag., I. 162. [*Pipunculus*] (1833); WALK., Ins. Brit., I. 233. 3. (1851).

holosericeus MEIG., S. B., IV. 24. 12. (1824) et VII. 148. [*Pipunculus*] (1838); WALK., Entom. Mag., II. 270. 1. (1834), List Dipt. Brit. Mus., III. 640. (1869) et Ins. Brit., I. 233. 1. (1851); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 357. 1. t. VI. f. 8. [*Ateleneura*] (1834) et Suit. à Buff., II. 13. 2. [*Ateleneura*] (1835); SCHN., F. A., I. 245. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 1. (1893); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 97. 57. (1897).

obscurus ZETT., Ins. Lapp., 580. 9. [*Pipunculus*] (1834).

relativus MACQ., Suit. à Buff., II. 12. 1. t. XIII. f. 6. [*Ateleneura*] (1835); MEIG., S. B., VII. 148. [*Ateleneura*] (1838).

relativus MACQ. - **spurius** FALL.

Verrallia

MIK, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 133. (1899).

Cephalops THOMS. (nec FALL.), Opusc. entom., II. 122. (1869).

Protheceus BECK. (nec RONSD.), Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 93. (1897).

aucta FALL., Dipt. Succ. Syrph., 61. 1—2. [*Cephalops*] (1817); MEIG., S. B., IV. 23. 10. (1824) et VI. 358. [*Pipunculus*] (1830); WALK., Entom. Mag., II. 269. 9. [*Pipunculus*] (1834) et Ins. Brit., I. 233. 9. t. VIII. f. 6. [*Pipunculus*] (1851); MACQ., Suit. à Buff., II. 9. 2. [*Pipunculus*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., III. 950. 1. (1844) et XIII. 6057. 1. [*Pipunculus*] (1859); SCHN., F. A., I. 246. [*Pipunculus*] (1862); RONSD., Finnl. Insekt., II. 22. 1. [*Pipunculus*] (1866); THOMS., Opusc. entom., II. 122. 23. [*Pipunculus*] (1869); KOW., Wien. entom. Zeitg., VI. 148. 1. [*Pipunculus*] (1887); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 94. 53. t. II. f. 25. [*Protheceus*] (1897); VERR., Brit. Fl., VIII. 74. 3. f. 93. (1901); JENKINS., Entom. Monthly Mag., (2). 93. (1897). XIV. 222. (1903.)

fasciata v. Ros. **pilosa** ZETT.

modesta SCHN. **pilosa** ZETT.

pilosa ZETT., Ins. Lapp., 579. 2. [*Pipunculus*] (1838) et Dipt. Scand., III. 967. 22. (1844), VIII. 3208. 22. (1869), XIII. 6060. 22. [*Pipunculus*] (1859); RONSD., Finnl. Insekt., II. 28. 18. [*Pipunculus*] (1866); THOMS., Opusc. entom., II. 123. 21. [*Pipunculus*] (1869); KOW., Wien. entom. Zeitg., VI. 148. 2. [*Pipunculus*] (1887);

- STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 2. [*Pipanculus*] (1894);
 BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 94. 54. [*Prothecus*] (1897);
 VERR., Brit. Fl., VIII. 71. 1. f. 89—97. (1901).
fasciata v. Ros., Württemb. CorrbL., 1840. 55. [*Pipanculus*]
 (1840).
modesta SCHN. (nec HAL.), F. A., I. 246. [*Pipanculus*] (1864);
 BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 94. nota. (1897).
ruralis WALK. (nec MEIG.), Entom. Mag., II. 268. 8. [*Pipanculus*]
 (1834) et Ins. Brit., I. 233. f. [*Pipanculus*] (1851).
var. setosa VERR., Brit. Fl., VIII. 73. (1901). Anglia.
ruralis WALK. — *pilosa* ZETT.
setosa VERR. — *pilosa* ZETT. var.
villosa v. Ros., Württemb. CorrbL., 1840. 55. [*Pipanculus*] (1840);
 Kow., Wien. entom. Zeitg., VI. 148. [*Pipanculus*] (1887); BECK.,
 Berlin. entom. Zeitschr., XLII. 95. 55. [*Prothecus*] (1897); VERR.,
 Brit. Fl., VIII. 74. 1. (1901). Europa.

HYPOCERA.

PHORIDAE.

Phora

- LATR., Précis Caract. génér. Ins., 125. (1796) et Hist. Nat. Crust. ins., III. 464. (1802)
 et XIV. 394. (1804)
Ancurina LLOY, Atti Istit. Ven., (3). X. 77. (1864).
Ceroplatus SCHELL. (nec BOSCH), Genr. Mouch. Dipt., 16. (1803).
Noda SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., t. XII. (1803).
Trineura FALL. (nec MEIG.), Dipt. Succ. Phytom., 5. (1823).
abbreviata v. Ros., Württemb. CorrbL., 1840. 54. (1840); BECK.,
 Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 22. 9 et 73. t. I. f. 10. (1901). Europa centr.
 et mer.
sordidipennis DUF., Soc. Sci. Lille, 1841. 424. (1841); SCHN.,
 F. A., II. 344. (1864).
abdominalis FALL., Dipt. Succ. Phytom., 5. 2. [*Trineura*] (1823);
 MEIG., S. B., VI. 225. 40. (1830); CURT., Brit. Entom., 437. (1832);
 ZETT., Dipt. Scand., VII. 2067. 17. (1848) et XIV. 6476. 17.
 [*Trineura*] (1860); WALK., Ins. Brit., II. 279. 3. (1853); SCHN.,
 F. A., II. 336. (1864); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 35. 25.
 t. II. f. 27—29. (1901). Europa.
flucrosa EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 1233. (1862);
 SCHN., F. A., II. 338. (1864).
 ? *florea* FABR., Entom. syst., IV. 255. 8. [*Bibio*] (1794) et Syst.
 Antl., 68. 9. [*Bibio*] (1805); MEIG., S. B., VI. 241. 31. (1830);
 MACQ., Suit. à Buff., II. 629. 10. (1835); WALK., Ins. Brit.,

- II. 280. 6. (1853); SCHN., F. A., II. 337. (1864); LLOY, Atti Istit. ven., (3). X. 77. [*Diploneura*] (1864).
- fabrirentris* BOHEM., Vet. Acad. Handl., 1852. 20. 8. [*Trineura*] (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4824. 17—18. [*Trineura*] (1855).
- palpina* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2868. 18. [*Trineura*] (1848); SCHN., F. A., II. 345. (1864); WULP., Tijdschr. Entom., (2). IV. (XIV). 209. (1871); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 197. 13. (1892).
- aptina** SCHN., Fama Adelsberg Grotte, 30. (1853) et F. A., II. 340. (1864); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 34. 24. t. I. f. 26. (1901); BEZZI, Riv. ital. Speleol. Bologna, I. fasc. 1., 13. 16. (1903).
- autumnalis** BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 44. 36. t. III. f. 44. (1901).
- hiemalis* DAHL., Sitzungsber. Akad. Berlin, 1896. 21. [*nomen nudum*] (1896).
- Bergenstammi** MIK., Verh. zool. bot. Ges. Wien, I. 25. 12. t. I. f. 14—16. (1901).
- sphingicoides* STROBL (*nec* BOUCHÉ), Wien. entom. Zeitg., XI. 197. 15. (1892).
- Bohemani** BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 27. 14. t. I. f. 18. [*Bohemanni*] (1901).
- caliginosa** MEIG., S. B., VI. 214. 6. (1830); BREM., Isis, 1846. 172. (1846); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3365. *obs.* [*Trineura*] (1849); GMM., Arb. naturf. Ver. Riga, I. 324. (1848).
- trochanterata* ZETT., Dipt. Scand., XII. 4822. 5—6. [*Trineura*] (1855).
- urbana* MEIG., S. B., VI. 215. 11. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 617. 8. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2856. 5. [*Trineura*] (1863); SCHN., F. A., II. 342. (1864); LLOY, Atti Istit. ven., (3). X. 77. [*Ancarina*] (1864); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 21. 7 et 70. 11. t. I. f. 9. (1901).
- chlorogastra** BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 32. 20. (1901).
- concinna** MEIG., S. B., VI. 221. 28. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2875. *obs.* [*Trineura*] (1868); SCHN., F. A., II. 345. (1864); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 24. 11. t. I. f. 13. (1901).
- distincta* Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 1233 (1862); SCHN., F. A., II. 338. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 15. (1894).
- funbris* MEIG., S. B., VI. 221. 30. (1830); WALK., Ins. Brit., II. 281. 11. (1851); SCHN., F. A., II. 338. (1864); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 71. 30. (1901).
- gynaephorina* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2461. 14. (1848) et XIV. 6476. 14. [*Trineura*] (1860).
- lacteosa* MEIG., S. B., VII. 412. 43. (1838).
- pseudocinina* STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 199. 19. (1892).

Europa centr.

Europa centr.

Europa centr.
et mer.

Europa sept.

Europa,
Asia sept.Europa mer.
Europa.

- crassicornis** MEIG., S. B., VI. 220. 26. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 629. 22. t. XXIV. f. 3. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2874. 24. [*Trineura*] (1848); WALK., Ins. Brit., II. 280. 7. (1853); SCHN., F. A., II. 344. (1864); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 199. 18. (1892); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 23. 10. t. I. f. 12. t. IV. f. 61. (1901). Europa.
- curvinervis** BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 33. 23. t. 2. f. 25. (1901). Europa centr.
- dimidiata* MEIG. **thoracica** MEIG.
distincta EGG. **concinna** MEIG.
distingueda STROBL. **unispinosa** ZETT.
dorsalis BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 31. 19. t. II. f. 23. (1901). Europa.
 fulvicornis LW. in. coll. ap. BECK.
 immaculata STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 14. (*var. thoracicae*) (1894).
erythronota STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 195. 6. (1892); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 33. 22. t. II. f. 24. (1901). Europa centr. et sept.
excisa BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 22. 16. t. I. f. 19. (1901). Europa c. et s.
fennica BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 22. 8. (1901). Europa centr. et sept.
flavicornis MACQ. **maculata** MEIG.
flexuosa EGG. **abdominalis** FALL.
floreæ FABR. ? **abdominalis** FALL.
fulvicentris BOH. **abdominalis** FALL.
fuscibris MEIG. **concinna** MEIG.
fuscipes STROBL = **Strobli** BECK.*
gymnophorina ZETT. **concinna** MEIG.
helicivora DUF. **maculata** MEIG.
hiemalis DAHL **autumnalis** BECK.
immaculata STROBL. **dorsalis** BECK.
luctuosa MEIG. **concinna** MEIG.
lugubris MEIG., S. B., VI. 217. 17. (1830); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 18. 4. (1901). Europa centr. et sept.
maculata MEIG., S. B., VI. 214. 7. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2854. 3. [*Trineura*] (1848); WALK., Ins. Brit., II. 279. 1. (1853); SCHN., F. A., II. 341. (1864); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 26. 13. t. I. f. 17. (1901). Europa.
 flavicornis MACQ., Suit. à Buff., II. 626. 2. (1835); MEIG., S. B., VII. 413. 46. (1838).
 helicivora DUF., Soc. Sci. Lille. 1841. 420. t. I. f. 13-21. (1841).
 notata ZETT., Dipt. Scand., VII. 2855. 4. [*Trineura*] (1848).
 puscipennis ZETT., Dipt. Scand., VII. 2856. *observ.* [*Trineura*] (1848).
 ulgaris p. p. FALL., Dipt. Succ. Phytom., 6. 5. [*Trineura*] (1823).

* *Groenlandica* LINDB., Vid. Medd., 1900. 307. 154. f. 5. (1900) nondum in Europa capta.

- nigra* SCHELL. ? *opaca* MEIG.
nigricornis EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 1235. (1862); Europa centr.
 SCHN., F. A., II. 342. (1864); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I.
 18. 3. t. I. f. 6. 7. (1901).
- notata* ZETT. -- **maculata** MEIG.
nudipalpis BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 29. 17. (1901). Europa centr.
opaca MEIG. S. B., VI. 216. 12. (1830); Macq., Suit. à Buff. II. 617. Europa.
 9. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2. 866. 16. [*Trineura*] (1848);
 SCHN., F. A., II. 342. (1864); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges.,
 I. 17. 2 et 77. t. I. f. 4. 5. (1901); CZERNY, Verh. zool.-bot. Ges.
 Wien, LIII. 238. (1903).
 ? *nigra* SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 16. [*Ceroplastas*] t. XII. f.
 A. [*Noda*] (1803).
perennis MEIG., S. B., VII. 412. 44. (1838); SCHN., F. A., II.
 345. (1864); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 72. 43. (1901).
- palpina* ZETT. -- **abdominalis** FALL.
palposa ZETT., Dipt. Scand., VII. 2870. 20. [*Trineura*] (1840); BECK., Europa centr.
 Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 16. 1. t. I. f. 1—3. (1901). et sept.
- perennis* MEIG. -- **opaca** MEIG.
pseudocincta STROBL. -- **concinna** MEIG.
punctipennis ZETT. -- **maculata** MEIG.
sordidipennis DUF. -- **abbreviata** v. Ros.
sororcula WULF., Tijdschr. Entom., XIV. 209. (1871); BECK., Abhandl. Europa centr.
 zool.-bot. Ges., I. 45. 37. (1901).
- splingoides* STROBL. **Bergenstammi** MEIG.
spinossissima STROBL., Wien. entom. Zeitg., XI. 196. 12. (1892); Europa centr.
 BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 27. 15. (1901).
- Strobli** BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 36. 26. t. II. f. 30. (1901). Europa centr.
fuscipes STROBL. (nec Macq.), Wien. entom. Zeitg., XI. 198. 17.
 (1892).
- thoracica** MEIG., Klass., I. 313. 2. [*Trineura*] (1804) et S. B., Europa.
 VI. 214. 8. (1830); LATR., Gen. crust. insect., IV. 360. t. XV. f.
 12. (1809); FALL., Dipt. Suec. Phytom., 6. 3. [*Trineura*] (1823);
 Macq., Suit. à Buff., II. 625. t. XXIV. f. I. (1835); ZETT., Ins.
 Lapp., 795. 2. [*Trineura*] (1838) et Dipt. Scand., VII. 2852. 1.
 (1848); XIV. 6672. 1. [*Trineura*] (1860); BLASCH., Hist. nat. Ins.,
 III. 630. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1135. (1849) et
 Ins. Brit., II. 279. 2. (1853); SCHN., F. A., II. 342. (1864); WULF.,
 Tijdschr. Entom., XIV. 209. (1871); STROBL., Wien. entom. Zeitg.,
 XI. 196. 7. (1892); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 20. 6. t. I.
 f. 8. (1901); BRUES, Trans. am. entom. Soc., XXIV. 342. t. V. f.
 4. (1903).
dimidiata MEIG., S. B., VI. 215. 9. (1830); GRM., Bull. Soc.
 Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 207. 1. (1847); ZETT., Dipt. Scand.,
 VII. 2853. 2. [*Trineura*] (1848); WALK., Ins. Brit., II. 279. 1
 (1853).
- trinervis** BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 19. 5. (1901). Europa centr.

- trochanterata* ZETT. **caliginosa** MEIG.
unicarata BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 32. 21. (1901). Europa sept.
 albispina BOHEM., in coll. ZETT.
unispinosa ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6475. 12—13. [*Trineura*] (1860); Europa centr.
 BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., X. 30. 18. t. II. f. 21—22. (1901). et sept.
 distinguenda STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 198. 16. (1892).
urbana MEIG. = **caliginosa** MEIG.
vulgaris FALL. = **maculata** MEIG. et **Apfioch. rufipes** MEIG.

Species dubiae vel incertae sedis.

- Diploneura* LLOY, Atti Istit. ven., (3). X. 77. (1864).
Lissometopia LLOY, Atti Istit. ven., (3). X. 79. (1864).
Obelosia LLOY, Atti Istit. ven., (3). X. 77. (1864).
Palpimega RONDI., Dipt. ital. Prodr., I. 136. 3. (1856).
Triphleba RONDI., Dipt. ital. Prodr., I. 136. 4. (1856).
algira MACQ., Dipt. exot., III. 427. (270). 1. t. XXXVI. f. 3. (1843). Algeria.
anceps ZETT., Dipt. Scand., VII. 2888. 1. [*Trineura*] (1848). Scandinavia.
atra MACQ., Suit. à Buff., II. 629. 21. (1835); MEIG., S. B., VII. 414. Gallia.
 52. (1838); LLOY., Atti Istit. Ven., (3). X. 77. [*Diploneura*] (1864).
bovistae GIMM., Arb. naturf. Ver. Riga, I. 329. (1848). Livlandia.
Carpentieri GÖB., Bull. Soc. Linn. Nord. France, 1877. 202. 55. Gallia.
 (1877).
consanguinea LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moskou, 1870. 59. 97. Turkestan.
 (1870); OST-SACK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien., XXXII. 462. 197.
 (1884).
dubia ZETT., Dipt. Scand., VII. 2888. 2. [*Trineura*] (1848). Scandinavia.
erythroceras MEIG., S. B., VI. 220. 27. (1830); SCHIN., F. A., II. 345. Germania.
 (1864).
flavipalpis MACQ., Suit. à Buff., II. 626. 5. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia.
 413. 48. (1838).
fuscipes MACQ., Suit. à Buff., II. 627. 10. (1835); MEIG., S. B., VII. Europa centr.
 413. 51. (1838); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2874. 21. [*Trineura*] et sept.
 (1848); HARDY, Zoologist, 2099. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 280.
 5. (1853).
gracilipes MEIG., S. B., VI. 216. 13. (1830); MAERKEL, Germ. Zeitschf. Europa centr.
 Entom., V. 266. 283. (1845); WALK., Ins. Brit., II. 280. 10. (1851);
 BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 72. (1901).
hiemalis RONDI., Dipt. ital. Prodr., I. 136. [*Triphleba hiemalis*] (1856), Italia.
 nom. nud.
hyalinata MEIG., S. B., VI. 222. 32. (1830). Germania.
litoralis DAHL, Sitzungsab. Akad. Berlin, 1896. 22. (1896), *nom. nud.* Germania.
monochaeta STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 202. 9. (1892). Austria.
nitidula MEIG., S. B., VI. 221. 29. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Europa centr.
 629. 19. t. XXIV. f. 2. (1835); LLOY, Atti Istit. ven., (3). X. 77.
 [*Diploneura*] (1864).

- nivalis** ROXB., Dipt. ital. Prodr., I. 136. [*Palpimega*] (1886), *nom. nud.* (an *palposa* ZETT?) Italia.
- nudifrons** MACQ., Suit. à Buff., II. 630. 28. (1835); MEIG., S. B., VII. 412. 42. (1838); LLOY, Atti Istit. Ven., (3). X. 79. [*Lissonetopia*] (1864). Gallia.
- plurispinulosa** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6473. 7—8. [*Trineura*] (1860); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 75. (1901). Scandinavia.
- quadrata** GÜMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 686. (1842). Rossia.
- rapida** MEIG., S. B., 412. 45. (1838). Germania.
- rufipennis** MACQ., Suit. à Buff., II. 626. 4. (1835); MEIG., S. B., VII. 413. 47. (1838); LLOY, Atti Istit. ven., (3). X. 77. [*Obelosia*] (1864). Gallia.
- scapularis** MACQ., Suit. à Buff., II. 626. 6. (1835); MEIG., S. B., VII. 413. 49. (1838). Gallia.
- semiflava** HARTIG, Jahresber., I. 305. (1838) et Isis, 1846. 173. (1846); SCHN., F. A., II. 345. (1864). Germania.
- setigera** LW., Zeitschr. ges. Naturwiss., XLIII. 420. 22. (1874). Rossia mer.
- sphingicides*** BOUCHE, Naturg., 101. 94. (1834); SCHN., F. A., II. 345. (1864). Germania.
sphingidis WESTW., Introd., II. 575. (1840).
- sphingidis* WESTW. = **sphingicides** BOUCHE.
- subquadrifasciata** ZETT., Dipt. Scand., XII. 4826. 27—28. [*Trineura*] (1855); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 75. (1901). Scandinavia.
- tubericola** FRAUENF., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 972. fig. (1866). Austria.
- vicina** MACQ., Suit. à Buff., II. 627. 7. (1835); MEIG., S. B., VII. 413. 50. (1838). Gallia.
- villosa** MACQ., Dipt. exot., III. 428. (271). 2. (1843). Algeria.

Hypocera

LLOY, Atti Istit. ven., (3). X. 78. (1864); BRUES, Trans. am. entom. Soc., XXI. 351. (1903).

Gymnoptera LLOY, Atti Istit. ven., (3). X. 79. (1864).

Nemosia LLOY, Atti Istit. ven., (3). X. 78. (1864) *nee* VIELL. Aves.

- agilis** MEIG., S. B., VI. 213. 3. [*Phora*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 630. 27. [*Phora*] (1835); SCHN., F. A., II. 339. [*Phora*] (1864); LLOY, Atti Istit. ven., (3). X. 78. (1864); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 193. 2. [*Phora*] (1892); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 42. 33. t. III. f. 39—40. [*Phora*] (1901). Europa.
- carinifrons* † ZETT., Dipt. Scand., VII. 2885. 33. [*Trineura*] (1848).
- albohalterata* STROBL. **vitripennis** MEIG. *var.*
- Bernuthi** EGA., Verh. zool.-bot. Ges. Wien., XII. 1234. [*Phora*] (1862); SCHN., F. A. II. 339. [*Phora*] (1864); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 38. 28. [*Phora*] (1901). Europa centr.

* Protocerae Convolvuli L.

- carinifrons* ZETT. **agilis** MEIG. et **carinifrons** ZETT.
carinifrons ZETT., ♂ nec ♀, Dipt. Scand., VII. 2885. 33. [*Trineura*] Europa sept.
 (1848); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 38. 29. t. II. f. 9.
 [*Phora*] (1901).
- citreiformis** BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 43. 34. t. III. f. 42. Europa sept.
 [*Phora*] (1901).
- coronata** BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 41. 32. t. II. f. 36–38. Europa centr.
 [*Phora*] (1901).
- femorata* MEIG. = **flavimana** MEIG.
flavimana MEIG., S. B., VI. 213. 4. [*Phora*] (1830). Europa centr.
 et sept.
femorata MEIG., S. B., VI. 213. 5. [*Phora*] (1830); ZETT., Dipt.
 Scand., VII. 1886. 34. (1848) et XIV. 6479. 34. [*Trineura*]
 (1860); SCHIX., F. A., II. 339. [*Phora*] (1864); HOWARD, Proc.
 Washing. Acad. Sci., II. 598. [*Phora*] (1900); BECK., Ab-
 handl. zool.-bot. Ges., I. 41. 31. t. II. f. 35. [*Phora*] (1901);
 BRUES, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 354. t. VI. f. 21.
 (1903).
- incrassata** MEIG., S. B., VI. 212. 1. t. LXIII. f. 5. [*Phora*] (1830); Europa.
 MACQ., Suit. à Buff., II. 630. 25. [*Phora*] (1835); ZETT., Dipt.
 Scand., VII. 2882. 30. [*Trineura*] (1848); WALK., Ins. Brit., II.
 281. 13. t. XIX. f. 6. [*Phora*] (1853); SCHIX., F. A., II. 339.
 [*Phora*] (1864); LLOY, Atti Istit. ven., (3). X. 78. [*Nemosia*]
 (1864); LEONARD', Inutti nosisi Napoli, III. 212. (1900); BECK.,
 Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 37. 27. t. 2. t. 31–32. [*Phora*] (1901).
- minor* STROBL = **vitripennis** MEIG.
mordellaria FALL., Dipt. Succ. Phytom., 6. 4. [*Trineura*] (1823); Europa.
 MEIG., S. B., VI. 212. 2. [*Phora*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II.
 630. 26. [*Phora*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2883. 31. (1848),
 VIII. 3365. 31. (1849) et XIV. 6478. 31. [*Trineura*] (1860); HAL.,
 Stettin. entom. Zeitg., XII. 144. [*Phora*] (1851); SCHIX., F. A., II.
 339. [*Phora*] (1864); LLOY, Atti Istit. ven., (3). X. 74. (1864);
 BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 40. 30. t. II. f. 34. [*Phora*]
 (1901); BRUES, Trans. am. entom. Soc., XXIV. 355. (1903).
flaripalpis v. Ros., in litt. ap. BECK.
- vitripennis** MEIG., S. B., VI. 223. 36. [*Phora*] (1830); MACQ., Suit. à Europa centr.
 Buff., II. 631. 30. [*Phora*] (1834); ? ZETT., Dipt. Scand., VII. 2889. et sept.
 3. [*Trineura*] (1848); LLOY, Atti Istit. ven., (3). X. 79. [*Gymnoptera*]
 (1864); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 193. 3. [*Phora*]
 (1892); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 44. 35 et 71. 36. t. III.
 f. 43. [*Phora*] (1901).
minor STROBL (nec ZETT.), Programm Seitenst., XIV. 40. [*Phora*]
 (1880).
car. albohalterata STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 194. Austria.
 [*Phora*] (1892).

(1860); SCHIN., F. A., II. 344. [*Phora*] (1864); PERR., Annal. Soc. France, 1873. 74. [*Phora*] (1874); ALDRICH, Trans. entom. Soc. London, 1896. 436. 3. [*Phora*] (1896); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 50. 40. t. III. f. 47. [*Phora*] (1901); BRUES, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 360. (1903).

atricapilla CURT., Brit. Entom., 437. [*Phora*] (1828) et Guide, sec. ed., 277. 25. a. [*Phora*] (1834).

flava FALL., Dipt. Suec. Phyt., 7. 8. [*Trineura*] (1823); ZETT., Ins., Lapp., 797. 10. [*Trineura*] (1838) et Dipt. Scand., VII. 2876. 25. [*Trineura*] (1848); WALK., Ins. Brit., I. 280. 9. [*Phora*] (1853); SCHIN., F. A., II. 343. [*Phora*] (1864); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 54. 44. t. III. f. 52. [*Phora*] (1901); BRUES, Trans. am. entom. Soc., 361. t. VI. f. 29. (1903). Europa.

flava MEIG. = **lutea** MEIG.

flavicoxa ZETT. = **ruficornis** MEIG.

formicarum VERR., Journ. linn. Soc., XIII. 258. [*Phora*] (1. 77); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 68. 65. [*Phora*] (1901); BRUES, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 375. [? *Melanoloucha*] (1903). Anglia.

Giraudii EGG. *) Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 1235. [*Phora*] (1862); SCHIN., F. A., II. 341. [*Phora*] (1864); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 148. 121. [*Phora*] (1899); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 58. 50. [*Phora*] (1901); BRUES, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 366. (1903). Europa centr. et mer.

breviciliata STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 148. [*Phora*] (1899).

longiciliata STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 148. [*Phora*] (1899).

heracleellae BOUCHÉ = ? **sordida** ZETT.

heracleellae STROBL = **rufipes** MEIG.

humeralis ZETT., Ins. Lapp., 796. 7. [*Trineura*] (1838) et Dipt. Scand., VII. 2862. 11. [*Trineura*] (1848); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 200. 22. [*Phora*] (1892) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 16. [*Phora*] (1894); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 61. 54. [*Phora*] (1901). Europa centr. et sept.

interrupta ZETT. = **pieta** LEHM.

latifemorata BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 67. 64. t. III. f. 58. [*Phora*] (1901). Europa centr. et sept.

longiciliata STROBL = **Giraudii** EGG.

luctuosa STROBL = **pulicaria** FALL.

lutea MEIG., S. B., VI. 220. 25. [*Phora*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 628. 18. [*Phora*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 797. 11. [*Trineura*] (1838) et Dipt. Scand., VII. 2877. 26. [*Trineura*] (1848); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 54. 45. t. III. f. 53-54. [*Phora*] (1901); BRUES, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 362. t. VII. f. 31. (1903) et Annal. Mus. nat. hung., III. 399. (1905). Europa.

bicolor MEIG., S. B., VI. 219. 23. [*Phora*] (1830); MACQ., Suit.

*) *Cimbex lutea* L.

- à Buff., II. 628. 16. [*Phora*] (1835); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 70. 23. [*Phora*] (1901).
- flava* FALL., p. p., Dipt. Suec. Phyt., 7. 8. [*Trincura*] (1823); MEIG., S. B., VI. 219. 24. t. LXIII. f. 12. [*Phora*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 628. 17. [*Phora*] (1835).
- sulphuripes* MEIG., S. B., VI. 219. 22. [*Phora*] (1830).
- lutea* SCHIN. = **melanocephala** v. Ros.
- Meigeni** BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 53. 43. t. III. f. 51. [*Phora*] (1901). Europa.
- bicolor* ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., VII. 2880. 29. (1848) et XIV. 6478. 29. [*Trincura*] (1860); SCHIN., F. A., II. 337. [*Phora*] (1864); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 196. 8. [*Phora*] (1892).
- melanocephala** v. Ros., Württemb. Corrbll., 1840. 64. [*Phora*] (1840); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 55. 46 et 73. t. III. f. 54. [*Phora*] (1901). Europa.
- lutea* SCHIN. (nec MEIG.), F. A., II. 343. [*Phora*] (1864).
- minor** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2864. 13. (1848) et XII. 4824. 13. [*Trincura*] (1855); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 63. 57. [*Phora*] (1901). Europa centr. et sept.
- nitidifrons* STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 200. 23. [*Phora*] (1892) et XVIII. 148. 123. [*Phora*] (1899).
- nigra* MEIG. = **pusilla** MEIG.
- nigra* SCHELL = ? **rufipes** MEIG.
- nigra* STROBL = **pulicaria** FALL.
- nigripes* STROBL = **pulicaria** FALL.
- nitidifrons* STROBL = **minor** ZETT.
- nudipes** BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 66. 62. [*Phora*] (1901). Europa centr.
- pullipes* LATR. = **rufipes** MEIG.
- Palmeni** BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 65. 60. [*Phora*] (1901). Europa centr.
- picta** LEHM., Programm Hamburg, 43. t. I. f. 6. [*Phora*] (1822) et Acta Acad. Leop. carol., XII. (1). 245. [*Phora*] (1824); BECK., ap. Mik, Wien. entom. Zeitg., XV. 112. [*Phora*] (1896); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 52. 42. t. III. f. 50. [*Phora*] (1901); BRUES, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 361. t. VII. f. 28. (1903).
- interrupta* ZETT., Ins. Lapp., 797. 12. [*Trincura*] (1838) et Dipt. Scand., VII. 2878. 27. (1848). XIV. 6478. 27. [*Trincura*] (1860); SCHIN., F. A., II. 337. [*Phora*] (1864).
- posticata** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 591. [*Phora*] (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 646. [*Phora*] (1900). Europa mer.
- projecta** BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 56. 48. [*Phora*] (1901). Europa e. et s.
- pulicaria** FALL., Dipt. Suec. Phyt., 7. 6. [*Trincura*] (1823); MEIG., S. B., VI. 217. 16. [*Phora*] (1830); ZETT., Ins. Lapp., 795. 4. [*Trincura*] (1838) et Dipt. Scand., VII. 2859. 7. [*Trincura*] (1848); MACQ., Suit. à Buff., II. 628. 13. [*Phora*] (1835); SCHOLTZ, Entom. Zeitschr. Breslau, IV. 28. [*Phora*] (1848); SCHIN., F. A., II. 341. [*Phora*] (1864); RITSEMA, Annal. Soc. entom. neerl., VI. 210. [*Phora*] (1864). Europa, Africa sept.

(1871); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 202. 25. [*Phora*] (1892); WASM., Krit. Verzeichn., 174. [*Phora*] (1894); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 62. 55. [*Phora*] (1901); BRUES, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 371. f. VIII. f. 45. (1903).

luctuosa STROBL (*nec* MEIG.), Wien. entom. Zeitg., XI. 202. c. [*Phora*] (1892) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 646. [*Phora*] (1900).

nigra STROBL (*nec* MEIG.), Programm Seitenst., XIV. 39. [*Phora*] (1880) et Wien. entom. Zeitg., XI. 202. [*Phora*] (1892).

nigripes STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 202. f. [*Phora*] (1892).

pumila ZETT. (*nec* MEIG.), Dipt. Scand., VII. 2873. 23. [*Trineura*] (1848); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 202. f. [*Phora*] (1892).

pumila MEIG. = **pusilla** MEIG.

pumila ZETT. = **pulicaria** FALL.

pusilla MEIG., S. B., VI. 218. 29. [*Phora*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 628. 15. [*Phora*] (1835); SCHIN., F. A., II. 345. [*Phora*] (1864); PERR., Annal. Soc. entom. France, (4). X. 354. 29. t. V. f. 162-170. [*Phora*] (1870); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 203. 26. [*Phora*] (1892) et XVIII. 148. 125. [*Phora*] (1899); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 63. 56. t. III. f. 64-65. [*Phora*] (1901.)

coleopterorum BRISCHKE, Schrift. Naturf. Danzig, N. F., II. (1). 4. [*Phora*] (1868); SPEISER, Allg. Zeitschr. Entom., IX. 266. 114. [*Phora*] (1904).

nigra MEIG. (*nec* SCHELL.), S. B., VI. 218. 18. [*Phora*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 628. 14. [*Phora*] (1835); DUF., Soc. Sci. Lille, 1841. 418. t. I. f. 1-12. [*Phora*] (1842); SCHIN., F. A., II. 345. [*Phora*] (1864).

pumila MEIG., S. B., VI. 218. 20. [*Phora*] (1830); WALK., Ins. Brit., II. 281. 12. [*Phora*] (1853); SCHIN., F. A., II. 345. [*Phora*] (1864).

pygmaea ZETT., Dipt. Scand., VII. 2860. 8. [*Trineura*] (1848); ? STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 204. 28. [*Phora*] (1892); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 49. 39. t. III. f. 46. t. IV. f. 63. 64. [*Phora*] (1901); BRUES, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 359. t. IV. f. 26. (1903).

brachyneura Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien., XII. 1236. [*Phora*] (1862); SCHIN., F. A., II. 344. [*Phora*] (1864); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 196. 11. [*Phora*] (1892).

ruficornis MEIG., S. B., VI. 218. 21. [*Phora*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2863. 12. [*Trineura*] (1861); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 57. 49 et 70. 21. [*Phora*] (1901).

carbonaria ZETT., Dipt. Scand., VII. 2865. 15. [*Trineura*] (1848); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 74. [*Phora*] (1901.)

- flavicoxa* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2869. 19. (1848), XI. 4340. 19. (1852) et XIV. 6476. 19. [*Trineura*] (1860).
- rufipes** MEIG., Klass., I. 313. 3. t. XV. f. 23. [*Trineura*] et VI. 216. 15. [*Phora*] (1830); FABR., Syst. Antl., 336. 1. [*Trineura*] (1805); MACQ., Suit. à Buff., II. 627. 12. [*Phora*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 795. 3. [*Trineura*] (1838) et Dipt. Scand., VII. 2857. 6. (1848), XII. 4823. 6. [*Trineura*] (1852); DUF., Annal. Sci. Nat., (2). XIII. 161. 1. [*Phora*] (1840); RATZEB., Forstins., III. 175. 22. [*Phora*] (1844); BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 146. 18. [*Phora*] (1847); GIMM., Arb. nat. Ver. Riga, I. 324. t. III. f. 4—5. [*Phora*] (1848); WALK., Ins. Brit., II. 280. 8. t. XIX. f. 6. [*Phora*] (1853); HEEGER, Sitzgsber. Akad. Wien, X. 173. [*Phora*] (1853); SCHIN., F. A., II. 340. [*Phora*] (1864); LABOULB., Annal. Soc. entom. France, (4). IV. 69. [*Phora*] (1864); SCHINABL, Deutsch. entom. Zeitsehr., 20. 215. t. I. 1—7. [*Phora*] (1876) et Wiad. z. nauk. przyr., II. 1. [*Phora*] (1882); BRANDT, Hor. Soc. entom. ross., XV. t. I. f. 12. [*Phora*] (1879); MEADE, The Entomologist, XIV. 285. [*Phora*] (1881); BECHER, Denkschr. Akad. Wien., XLV. 151. t. IV. f. 1. [*Phora*] (1882); GIRSCHN., Entom. Nachr., IX. 204. [*Phora*] (1883); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien., XLVII. 66. [*Phora*] (1883); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 202. [*Phora*] (1892); WASM., Krit. Verzeichn., 174. [*Phora*] (1894); KIEFF., III. Zeitsehr. f. Entom., V. 241. [*Phora*] (1900); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 59. 52. [*Phora*] (1901); MEIG., Zool. Jahrbüch., XV. 677. f. 39. [*Phora*] (1901); BRUES, Trans. Am. entom. Soc., XXIX. 368. t. VII. f. 40. (1903).
- annulata* MEIG., Klass., I. 314. 4. [*Trineura*] (1804) et S. B., VI. 216. 14. [*Phora*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 627. 11. [*Phora*] (1835); BREMI, Isis, 1846. 173. [*Phora*] (1846); HEEGER, Sitzgsb. Akad. Wien, X. 174. [*Phora*] (1853).
- heracleellae* STROBL (*nec* BOUCHÉ), Wien. entom. Zeitg., XI. 202. c. [*Phora*] (1892).
- ? *nigra* SCHELL., Gen. Mouch. Dipt., 16. [*Ceroplatus*], t. XII. f. 1. B. [*Noda*] (1803).
- pallipes* LATR., Gen. crust. ins., IV. 360. [*Phora*] (1809); MACQ., Suit. à Buff., II. 617. 12. [*Phora*] (1835); DUF., Annal. Sci. Nat., (2). XII. 54. 27. t. III. f. 107—110. [*Phora*] (1839) et Annal. Soc. entom. France, (3). I. 385. C. [*Phora*] (1853); LABOULB., Annal. Soc. entom. France, (4). IV. 88. [*Phora*] (1864).
- vulgaris* p. p., FALL., Dipt. Suec. Phytom., 6. 5. [*Trineura*] (1823).
- sordida***) ZETT., Ins. La; p., 796. 5. [*Trineura*] (1838) et Dipt. Scand., VII. 2861. 9. [*Trineura*] (1848); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 60. 53. t. III. f. 56. [*Phora*] (1901).

Europa.

Europa centr. et sept.

*) Depressaria Heracliana DEG.

- ? *heracleellae* BOUGHÉ, Naturg., 102. 95. [*Phora*] (1834): SCHIN.,
F. A., II. 341. [*Phora*] (1864).
sulphuripes MEIG. = *lutea* MEIG.
umbrimargo BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 65. 61. t. III. f. 45. Europa centr.
[*Phora*] (1901).
vulgaris FALL. = *rufipes* MEIG.
xanthozona STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 203. 17. [*Phora*] Europa centr.
(1892); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 64. 59. [*Phora*] (1901).
zonata ZETT., Ins. Lapp., 796. 6. [*Trineura*] (1838) et Dipt. Scand., Europa sept.
VII. 2862. 10. [*Trineura*] (1848): BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges.,
I. 59. 51. [*Phora*] (1901).

Trineura

MEIG., Illiger's Magaz., II. 276. (1803).

Philodendria RONDI., Dipt. ital. Prodr., I. 136. 2. (1856).

anthracina CURT. = **aterrima** FABR.

- aterrima** FABR., Entom. syst., IV. 334. 93. [*Musca*] (1794) et Syst. Europa.
Antl., 323. 35. [*Tephritis*] (1805); GEOFFR., Hist. d. Ins., II. 533.
76. [—] (1764); COQUEB., III. icon., 106. t. XXIV. f. 3. [*Musca*]
(1804); LATR., Dict. Hist. nat. Deterv., XXIV. 197. 594. [*Phorus*]
(1804), Hist. nat. crust. Ins., XIV. 394. [*Phora*] (1804) et Gen.
crust. ins., IV. 360. [*Phora*] (1809); MACQ., Suit. à Buff., II. 629.
23. t. XXIV. f. 4. [*Phora*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 796. 8. (1838)
et Dipt. Scand., VII. 2890. 35. (1848); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., IV. 1138. [*Phora*] (1849) et Ins. Brit., II. 281. 14. [*Phora*]
(1853); SCHIN., F. A., II. 347. (1864) et Novara Dipt., 223. 1.
(1868); MEGNIK, Comptes rendus., 1887. et Faune cadavres
(1887); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 204. (1892); BECK., Ab-
handl. zool.-bot. Ges., I. 80. 66. t. V. f. 73—75. (1901); BRUES,
Trans. am. entom. Soc., XXIX. 377. t. VIII. f. 50. (1903).

anthracina CURT., Guide sec. ed., 277. 39. a. [*Phora*] (1873).

atra MEIG., Klass., I. 313. 2. t. XV. f. 22. (1803); FALL., Dipt.
Succ. Phytom., 7. 7. (1823); OST-SACK., Cat. N. A. Dipt., 2.
ed. 212. [*Phora*] (1878); COQUEL., Can. Entom., XXVII. 103.
(1895).

obscura ZETT., Dipt. Scand., VII. 2884. 32. (1848).

stictica MEIG., S. B., VI. 225. 39. [*Phora*] (1830); ZETT., Ins.
Lapp., 797. 9. (1878) et Dipt. Scand., VII. 2893. 37.
(1848); GURSCHEX., Entom. Nachr., IX. 204. (1883); STROBL,
Wien. entom. Zeitg., XI. 204. (1903) et Mittheil. Ver. Steierm.,
XXX. 17. (1895); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 172. 39.
(1901).

atra MEIG. = **aterrima** FABR.

obscura ZETT. = **aterrima** FABR.

- Schineri** BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 80. 68. t. V. f. 72. (1901). Europa centr.

stictica SCHIS. (*occ* MEIG.), F. A., II. 347. (1864).

stictica MEIG. — **aterrima** FABR.

stictica SCHIS. — **Schineri** BECK.

velutina MEIG., S. B., VI. 224. 38. t. LXIII. f. 11. [*Phora*] (1830); Europa.
 Macq., Suit. à Buff., II. 630. 24. [*Phora*] (1835); v. Ros., Württemb.
 Corubl., 1840. 64. [*Phora*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2892.
 36. (1848); WALK., Ins. Brit., II. t. XIX. f. 6. c. [*Phora*] (1853);
 BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 80. 67. t. IV. f. 68—70. (1901);
 BRUES, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 378. t. VIII. f. 51. (1903).

Conicera

MEIG., S. B., VI. 226. CCXXVI. (1830).

albipennis MEIG. — **atra** MEIG.

atra MEIG., S. B., VI. 226. 1. t. LXII. f. 13. (1830); Macq., Suit. à Europa.
 Buff., II. 632. 1 et 666. t. XXIV. f. 6. (1835); BLANCH., Hist. nat.
 Ins., III. 630. (1840); WALK., Ins. Brit., II. 281. 15. t. XIX. f. 6.
 f. [*Phora*] (1853); SCHIS., F. A., II. 335. (1864); PERR., Annal.
 Soc. entom. France, (5). VI. 233. (1876); REINH., Verh. zool.-bot.
 Ges. Wien, XXXI. 207. (1888); ? WEBST., Insect Life, II. 356.
 (1900); RIL. et HOW., Insect Life, II. 351. (1900); BECK., Abhandl.
 zool.-bot. Ges., I. 88. 69. t. III. f. 59. (1901); BRUES, Trans. am.
 entom. Soc., XXIX. 380. t. IX. f. 55—56. (1903).

albipennis MEIG., S. B., VI. 223. 34. [*Phora*] (1830).

Dauci MEIG., S. B., VI. 223. 34. [*Phora*] (1830) et VII. 411.
 (1838); BOUCHE, Natrg., 101. 93. t. VI. f. 16—19. [*Phora*]
 (1834); Macq., Suit. à Buff., II. 630. 29. [*Phora*] (1835);
 WESTW., Introd., II. 132. f. 12. [*Phora*] (1840); LAOY, Atti
 Istit. ven., (3). X. 78. [*Hypocera*] (1864).

Nickerli KOW., Flieg. Böhmens, 69. *nota*. [*Phora*] (1894); MIK,
 Wien. entom. Zeitg., XIII. 22. 14. [*Phora*] (1894).

Dauci MEIG. — **atra** MEIG.

Nickerli KOW. — **atra** MEIG.

similis HAL., Entom. Mag., I. 179. [*Phora*] (1833); WALK., Ins. Brit., Europa centr.
 II. 281. 16. [*Phora*] (1853); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 81.
 70. (1903).

Gymnophora.

Macq., Suit. à Buff., II. 631. 2. (1835).

arcuata MEIG., S. B., VI. 222. 33. t. LXIII. f. 9. [*Phora*] (1830). Europa.
 Macq., Suit. à Buff., II. 631. 1. t. XXIV. f. 5. (1835); ZETT., Ins.
 Lapp., 795. 71. [*Princara*] (1838) et Dipt. Scand., VII. 2845. I.
 (1848); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 630. (1840); WALK., Ins.
 Brit., II. 282. 18. [*Phora*] (1853); SCHIS., F. A., II. 346. (1864);

LLOY, Atti Istit. ven., (3). X. 79. (1864); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 82. 71. (1901); BRUES, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 381. t. IX. f. 57. (1903).

debilis HAL., Entom. Mag., I. 179. [*Phora*] (1833); WALK., Ins. Brit., II. 282. [*Phora*] (1853).

? *fuliginosa* MEIG., S. B., VI. 215. 10. [*Phora*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 626. 3. [*Phora*] (1835).

rufipes FALL. (nec MEIG.), Dipt. Suec. Phytom., 5. 1. [*Trineura*] (1823).

debilis HAL. = *arcuata* MEIG.

fuliginosa MEIG. = ? *arcuata* MEIG.

rufipes FALL. = *arcuata* MEIG.

Metopina

MACQ., Suit. à Buff., II. 666. (1835).

Drepanophora STROBL, Programm Seitenst., XIV. 40. (1880)
nec LW. 1869. Dipt.

Leptophora SIX, Ned. Tidskr. v. Entom., XXI. 186. (1878).

Braueri STROBL = *galeata* HAL.

galeata HAL., Entom. Mag., I. 179. [*Phora*] (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 666. 1. (1835); MEIG., S. B., VII. 414. 1. (1838); WALK., Ins. Brit., II. 282. 17. [*galatea*] (1853) et III. XIV. [*Phora*] (1855); v. RÖD., Wien. entom. Zeitg., VI. 288. (1887); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 83. 72. t. V. f. 76—78. (1901).

Braueri STROBL, Programm Seitenst., XIV. 40. [*Drepanophora*] (1880).

oligoneura MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 414. t. X. f. 10—11. [*Phora*] (1867), XXXI. 348. [*Leptophora*] (1881) et Dipt. Hernstein, 65. [*Leptophora*] (1885).

perpusilla SIX, Ned. Tidskr. v. Entom., XXI. 186. [*Leptophora*] (1878).

oligoneura MIK = *galeata* HAL.

perpusilla SIX = *galeata* HAL.

Platyphora

VERR., Journ. Linn. Society, XIII. 259. (1877).

Lubbocki VERR., Journ. Linn. Soc., XIII. 259. (1877); LUBBOCK, Ameis. Bien. Wesp., 371. (1883); BECK., Abhandl. zool.-bot. Ges., I. 88. 78. (1901); BRUES, Trans. am. entom. Soc., XXIX. 316. (1903).

Aenigmatias

MEINERT, Entom. Meddel., H. 213. (1890).

- blattoides** MEINERT, Entom. Meddel., H. 213, t. IV, f. 1-6. (1890); Europa centr.
WASM., Krit. Verz., 32 et 175. (1894); BECK., Abhandl. zool-bot.
Ges., I. 89, 79. (1901); BRUES, Trans. am. entom. Soc., XXIX,
387. (1903).

PLATYPEZIDAE.

Opetia

MEIG., S. B., VI. 357. CXIX—CXX. (1830).

lonchopteroides CURT. = **nigra** MEIG.

- nigra** MEIG., S. B., VI. 357. 1. t. LXVI. f. 17—20. (1830); MACQ., Europa.
Suif. à Buff., H. 21. 1. t. XIII. f. 9. (1835); ZETT., Dipt. Scand.,
III. 922. 1. (1844); WALK., Ins. Brit., I. 230. 1. t. VIII. f. 4.
(1851); SCHX., F. A., I. 243. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 17. 1.
f. 31—38. (1901).

lonchopteroides CURT., Brit. Entom., 489. (1832).

Platynema

ZETT., Isis, (1837), Ins. Lapp., 334. (1838) et Dipt. Scand., I. 332. 17. (1842).

Atelestus WALK., Entom. Magaz., IV. 229. (1836).

- pulicaria** FALL., Dipt. Succ. Emp., 33. 44. [*Empis*] (1816); ZETT., Europa centr.
Ins. Lapp., 534. 3. [*Cyrtoma*] (1838) et Dipt. Scand., I. 332. 1. et sept.
(1842); WALK., Ins. Brit., I. 229. 1. t. VIII. f. 5. (1851); SCHX.,
F. A., I. 242. (1862); VERR., Brit. Fl., VIII. 20. 1. f. 39—41.
(1901).

silvicola WALK., Entom. Magaz., IV. 229. [*Atelestus*] (1836).

silvicola WALK. **pulicaria** FALL.

- tibiella** ZETT., Dipt. Scand., I. 333. 2. (1842); STROBL., Mittheil. Ver. Europa centr.
Steierm., XXX. 14. (1894); VERR., Brit. Fl., VIII. 21. (1901). et sept.

Callimyia

MEIG., Klass., I. 311. LXVI. [*Callomyia*] (1801) em. VERR., (1901).

Callomyia FALL., Dipt. Succ. Plat., 6. (1815).

Heteronoura FALL., Specim. entom., 7 et 25. (1810).

- amoena** MEIG., S. B., IV. 12. 2. t. XXXIII. f. 13. (1824); MACQ., Soc. Europa.
Sci. Lille, 1826. 221. (9). t. 1. f. 2. (1826) et Suif. à Buff., H. 19.
2. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 531. 1. [*Callomyia*] (1838) et Dipt.
Scand., III. 913. 4. (1843); WALK., Ins. Brit., I. 228. 2. (1851);

SCHIN., F. A., I. 239. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., II. 7. 4. (1866); VERR., Brit. Fl., VIII. 26. 2. f. 43-52. (1901); MEIG., Tijdschr. Entom., XLIII. 223. t. XIII. f. 1-14. (1901) et Zool. Jahrbüch., XV. 677. f. 37. (1901).

leptiformis var. *c.* ZETT., Vet. Acad. Handl., 1819. 79. [*Callomyza*] (1819).

Baumhaueri MEIG. = *leptiformis* FALL.

Dahlbomi ZETT., Ins. Lapp., 532. 9. [*Callomyza*] (1838) et Dipt. Scand., III. 918. 9. (1844), XIII. 6049. 9. (1859); BONSD., Finnl. Insekt., II. 8. 8. (1866).

elegantula var. *b.* ZETT., Vet. Acad. Handl., 1819. 80. [*Callomyza*] (1819).

divers ZETT. = *speciosa* MEIG.

elegans MEIG., Klass., I. 311. 1. t. XV. f. 12-17. (1804) et S. B., Europa.

IV. 11. 1. (1824); FABR., Syst. Antl., 271. 24. [*Dolichopus*] (1805); PANZ., Fauna germ., CIII. 18. 19. (1809); LATR., Gen. crust. ins., IV. 294. [*Dolichopus*] (1809); LAM., Anim. s. vert., III. 425. 3. [*Dolichopus*] (1816); MACQ., Suit. à Buff., II. 19. 1. t. XIII. f. 8. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 531. 3. [*Callomyza*] (1838) et Dipt. Scand., III. 913. 3. (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 638. (1849) et Ins. Brit., I. 227. 1. t. VIII. f. 3. (1851); SCHIN., F. A., I. 240. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., II. 6. 3. (1866); JAROSCH., Trnd. naturf. Ges. Karkoff, XIX. 7. 13. (*sep.*) (1885); CORTI, Bull. Soc. entom. ital., XXV. 39. 63. (1894); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 13. (1894).

Fabricii SCHIN., Cat. Dipt. Europae, 102. (1864).

leptiformis var. *b.* ZETT., Vet. Acad. Handl., 1819. 79. [*Callomyza*] (1819).

elegantula FALL., Dipt. Suec. Plat., 7. 2. [*Callomyza*] (1815) et Europa centr.

Suppl., 4. 4. [*Callomyza*] (1826); ZETT., Vet. Acad. Handl., 1819. 80. 33. [*Callomyza*] (1819) et Dipt. Scand., III. 916. 7. (1844); MEIG., S. B., IV. 13. 3. (1824); BONSD., Finnl. Insekt., II. 8. 7. (1866); WOOD, Entom. Monthly Mag., (1). XVI. 5. (1905); VERR., Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 7. (1905).

elegantula ZETT. 1819. = **Dahlbomi** ZETT. et **elegantula** FALL.

Fabricii SCHIN. = **elegans** MEIG.

humeralis LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 256. 149. (1869).

Europa centr.

leptiformis FALL., Specim. entom., 25. t. I. f. 2. [*Heteroneura*] (1810) et Dipt. Suec. Plat., 6. 1. [*Callomyza*] (1815); ZETT., Vet. Acad. Handl., 1819. 78. 31. [*Callomyza*] (1819), Ins. Lapp., 530. 1. [*Callomyza*] (1838) et Dipt. Scand., III. 910. 1. (1844); MEIG., S. B., IV. 13. 4. (1824); MACQ., Suit. à Buff., II. 20. 3. (1835); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 638. (1849) et Ins. Brit., I. 228. 4. (1851); SCHIN., F. A., I. 240. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., II. 6. 1. (1866).

Europa centr.
et sept.

Baumhaueri MEIG., S. B., IV. 14. 5. (1824).

sociæ WIED., Zool. Mag., I. 69. 13. (1818).

- leptiformis* ZETT. 1819 **amoena** MEIG., **elegans** MEIG. et **leptiformis** FALL.
- scutellaris** ZETT., Ins. Lapp., 532. 8. [*Callomyza*] (1838) et Dipt. Scand., III. 917. 8. (1844). Europa sept.
- sexmaculata** v. Ros., Württemb. Corrbll., 1840. 55. [*Calomyia*] (1840). Germania.
- socia** WIED. **leptiformis** FALL.
- speciosa** MEIG., S. B., IV. 14. 6. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 20. 4. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 530. 2. [*Callomyza*] (1838) et Dipt. Scand., III. 912. 2. (1844); WALK., Ins. Brit., I. 228. 3. (1851); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 6. 2. (1866); VERR., Brit. Fl., VIII. 24. 1. f. 42. (1901).
- dives* ZETT., Ins. Lapp., 531. 5. [*Callomyza*] (1838) et Dipt. Scand., III. 915. 5. (1844); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 7. 5. (1866).

Agathomyia

VERR., British Flies, VIII. 30. 4. (1901).

- antennata** ZETT., Vet. Acad. Handl., 1819. 79. 32. [*Callomyza*] (1819) et Dipt. Scand., III. 921. 12. [*Callomyia*] (1844); MEIG., S. B., IV. 15. 7. [*Callomyia*] (1824); FALL., Dipt. Succ. Suppl., 4. 3. [*Callomyia*] (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 20. 5. [*Callomyia*] (1835); WALK., Ins. Brit., I. 228. 5. [*Callomyia*] (1851); SCHN., F. A., II. 240. [*Callomyia*] (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 9. 9. [*Callomyia*] (1866); VERR., Brit. Fl., VIII. 31. 1. f. 53. (1901); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXIII. 139. (1904).
- cinerea* ZETT., Dipt. Scand., XI. 4310. 12-13. [*Callomyia*] (1852).
- Hoffmannseggii* MEIG., S. B., IV. 15. 8. t. XXXIII. f. 14. [*Callomyia*] (1824).
- aurantiaca** BEZZI, Wien. entom. Zeitg., XII. 304. [*Callomyia*] (1893); XXII. 21. (1903) et Bull. Soc. entom. Ital., XXXII. 85. [*Callomyia*] (1900); VERR., Cat. europ. Platyp., 4. (1900); HENSEL, Wien. entom. Zeitg., 21. 265. 23. [*Callomyia*] (1902); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXIII. 139. (1904). Europa mer.
- boreella** ZETT., Ins. Lapp., 532. 7. [*Callomyza*] et Dipt. Scand., III. 915. 6. (1844), XIII. 6949. 6. [*Callomyia*] (1859); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 7. 9. [*Callomyia*] (1866); WOOD, Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 6. (1905). Europa centr. et sept.
- cinerea* ZETT. **antennata** ZETT.
- Collini** VERR., Brit. Fl., VIII. 33. 2. f. 51-55. (1901). CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXIII. 139. (1904). Aeglia.
- Falleni** ZETT., Vet. Acad. Handl., 1819. 77. 30. [*Callomyza*] (1819) et Dipt. Scand., III. 919. 10. [*Callomyia*] (1844); FALL., Dipt. Succ. Suppl., 3. [*Callomyza*] (1823); MEIG., S. B., IV. 16. 9. [*Callomyia*] (1824); SCHN., F. A., I. 240. [*Callomyia*] (1862); VERR.,

Cat. europ. Platyp., 4. (1900); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXIII. 139. (1904).

Megerlei MEIG., S. B., IV. 16. 10. [*Callomyia*] (1824).

Hoffmannseggii MEIG. — **antennata** ZETT.

Megerlei MEIG. = **Falleni** ZETT.

- viduella** ZETT., Ins. Lapp., 531. 6. [*Callomyza*] (1838) et Dipt. Scand., III. 921. 13. (1844), XIII. 6050. 13. [*Callomyia*] (1859); BONSD., Finnl. Insekt., II. 9. 10. [*Callomyia*] (1866); VERR., Cat. europ. Platyp., 5. (1900); WOOD, Entom. Monthly Mag., (2). XIV. 271. fig. (1903); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXIII. 139. (1904). Europa centr. et sept.
- Wankowiczii** SCHNABL, Phys. Denkschr. Warschau, 1884. 1. [*Callomyia*] (1884); BEZZI, Wien. entom. Zeitg., XXII. 22. (1903); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXIII. 139. (1904). Europa centr.
- Zetterstedti** (WAHLBG.) ZETT., Dipt. Scand., III. 920. 11. (1844) et XI. 4310. 11. [*Callomyia*] (1852); VERR., Cat. europ. Platyp., 4. (1900); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXIII. 139. (1904). Europa sept.

Platypeza

MEIG., Klass. und Beschreib. chr. Zweifl. Ins., I. 309. LXV. (1804); VERR., Brit. Fl., VIII. 34. 5. (1901).

? *Clythia* MEIG., Nouv. Class. Mouch. à deux ailes, (1800).

aterrima WALK. = **fasciata** MEIG.

- atra** MEIG., Klass., I. 310. 3. (1804) et S. B., IV. 7. 4. (1824); FALL., Dipt. Suec. Plat., 6. 3. (1815); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 220. (81). 2. (1826) et Suit. à Buff., II. 18. 7. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 529. 3. (1838) et Dipt. Scand., III. 905. 7. (1844); WALK., Ins. Brit., I. 235. 5. (1851); SCHN., F. A., I. 242. (1852); BONSD., Finnl. Insekt., II. 4. 4. (1866); WILP, Tijdschr. Entom., XI. 228. (1868); VERR., Brit. Fl., VIII. 45. 4. f. 65—66. (1901). Europa.

barbata KOW. = **consobrina** ZETT.

- boletina** FALL., Dipt. Suec. Plat., 4. 1. (1815); MEIG., S. B., IV. 5. 1. (1824); v. ROS., Württemb. Corrbll., XI. 269. (1834); MACQ., Suit. à Buff., II. 18. 4. (1835); WESTW., Introd., II. 554. f. 130. 17. (1840); ZETT., Dipt. Scand., III. 900. 1. (1844); WALK., Ins. Brit., I. 225. 2. (1851); SCHN., F. A., I. 241. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., II. 3. 1. (1866); VERR., Brit. Fl., VIII. 42. f. 64. (1901). Europa centr. et sept.

braunipennis MACQ. — **fasciata** MEIG.

- connexa** BOHEM., Öfy. vet. Akad. Förh., XV. 55. t. II. f. 2. (1858); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6047. 8—9. (1859). Scandinavia.
- consobrina** ZETT., Dipt. Scand., III. 904. 5. (1844); VERR., Brit. Fl., VIII. 38. 1. f. 57—61. (1901). Europa centr. et sept.

barbata KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 323. f. 5. (1867).

- dorsalis** MEIG., Klass., I. 310. 2. (1804) et S. B., IV. 7. 5. (1824); Europa.

MACQ., Suit. à Buff., II. 19. 9. (1835); WALK., Entom. Monthly Mag., III. 181. (1835) et Ins. Brit., I. 226. 8. (1851); SCHIX., F. A., I. 242. (1862); WULF., Tijdschr. Entom., XI. 227. t. XI. f. 3. (1868); VERR., Brit. Fl., VIII. 47. 5. f. 67—68. (1901).

holosericea MEIG., S. B., IV. 8. 6. (1824); MACQ., Suit. à Buff., II. 19. 10. (1835); DUF., Annal. Sci. Nat., (2) XIII. 159. 6. t. III. f. 24—26. (1840); WALK., Ins. Brit., I. 227. 9. (1851); SCHIX., F. A., I. 241. (1862); BERGENST., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 22. 37. t. III. A. (1870); PERRIS, Annal. Soc. entom. France, (5). VI. 231. (1876); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. 151. t. III. f. 25. (1882).

subfasciata MEIG., S. B., IV. 6. 3. t. XXXIII. f. 10. (1824); MACQ., Suit. à Buff., II. 17. 3. (1833); SCHIX., F. A., I. 242. (1862); PERR., Annal. Soc. entom. France, (5). VI. 231. (1876).

fasciata FALL. = **picta** MEIG.

fasciata MEIG., KLASS., I. 310. 1. t. XV. f. 7—11. (1804) et S. B., IV. 6. 2. (1824); PANZ., Fauna germ., CIII. 20. (1809); FABR., Syst. Antl., 271. 22. [*Dolichopus*] (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 292. [*Dolichopus*] (1809); LAM., Anim. sans. vert., III. 424. 1. [*Dolichopus*] (1816); ZETT., Ins. Lapp., 529. 1. (1838) et Dipt. Scand., III. 901. 3. (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 638. (1849); SCHIX., F. A., I. 241. (1862); FRAUENF., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 68. (1864); WULF., Tijdschr. entom., XI. 228. t. XI. f. 2. (1868); MELL., Zool. Jahrbüch., XIV. t. XXXV. f. 124. (1900); VERR., Brit. Fl., VIII. 49. 6. f. 69—72. (1901).

brannipennis MACQ., Suit. à Buff., II. 18. 5. (1835); MEIG., S. B., VII. 145. 12. (1838); WULF., Tijdschr. Entom., XI. 228. (1868).

media MACQ., Suit. à Buff., II. 18. 6. (1835); MEIG., S. B., VII. 146. 13. (1838); ZETT., Dipt. Scand., III. 905. 6. (1844); BONSD., Finnl. Insekt., II. 4. 3. (1866).

? *palmipes* ROSSI, Mant., II. 74. 565. [*Musca*] (1794).

? *properans* ROSSI, Mant., II. 74. 564. [*Musca*] (1794).

fasciata WALK. = **infumata** HAL.

fumipennis WALK. = **picta** MEIG.

fumipennis ZETT. = **picta** MEIG.

furcata FALL., Dipt. Suec. Suppl., 2. 4. (1823); MEIG., S. B., VI. 357. 8. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 18. 8. (1835); ZETT., Dipt. Scand., III. 909. 10. (1844) et VIII. 3199. 10. (1869); WALK., Ins. Brit., I. 225. 1. (1851); VERR., Brit. Fl., VIII. 58. 10. f. 81—82. (1901).

rectinervis WULF., Tijdschr. entom., XI. 229. t. XI. f. 4—5. (1868).

hirticeps VERR., Brit. Fl., VIII. 52. 7. f. 73—74. (1901). Anglia.

holosericea MEIG. — **dorsalis** MEIG.

infumata HAL., Annal. Nat. Hist., II. 184. (1838); WALK., Ins. Brit., Europe etc.

- I. 226. 6. (1851); VERR., Brit. Fl., VIII. 53. 8. f. 75—77. (1901).
fasciata WALK. (*nee* MEIG.), Ins. Brit., I. 225. 3. (1851).
ornata MEIG., S. B., VII. 145. 11. (1838); WULF, Tijdschr.
 Entom., XI. t. XI. f. 5. (1868); BERTHNS, Dipt. Hamburg, 38.
 (1887).
 ? *vernalis* (WALK.) CURT., Guide, sec. ed., 254. 12. (1837).
vittata ZETT., Dipt. Scand., III. 902. 3. (1844); BONSD., Finnl.
 Insekt., II. 3. 2. (1866).
lutescens CURT. ? *rufa* MEIG.
media MACQ. = *fasciata* MEIG.
modesta ZETT., Dipt. Scand., III. 903. 4. (1844); VERR., Brit. Fl.,
 VIII. 41. 2. f. 56. 62—63. (1901). Europa centr.
 et sept.
ornata MEIG. = *infumata* HAL.
palmipes ROSSI = ? *fasciata* MEIG.
picta MEIG., S. B., VI. 358. 9. (1830); ZETT., Dipt. Scand., III. 906.
 8. (1844); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. (3). 177. 1.
 (1847); WALK., Ins. Brit., I. 226. 7. t. VIII. f. 2. (1851); BONSD.,
 Finnl. Insekt., II. 5. 5. (1866); VERR., Brit. Fl., VIII. 55. 9. f.
 78—80. (1901). Europa centr.
 et sept.
fasciata FALL. (*nee* MEIG.), Dipt. Succ. Platyp., 5. 2. (1815);
 MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 219. (7). 1. t. I. f. 1. (1826) et
 Suit. à Buff., II. 17. 1. (1835); BLANCH., Hist. nat. Ins., III.
 606. (1840).
famipennis WALK., Entom. Mag., III. 181. (1835) et Ins. Brit.,
 I. 227. 10. (1851).
famipennis ZETT. (*nee* WALK.), Ins. Lapp., 529. 2. (1838).
saperba KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 322. f. 4.
 (1867).
properans ROSSI ? *fasciata* MEIG.
rectinervis WULF = *furcata* FALL.
rufa MEIG., S. B., VI. 358. 10. (1830) et VII. 145. (1838); ZETT., Dipt.
 Scand., III. 908. 9. (1844) et XIII. 6048. 9. (1859); WULF, Tijdschr.
 entom., XI. 226. (1868); VERR., Brit. Fl., VIII. 44. 3. (1901). Europa.
 ? *lutescens* CURT., Guide, Sec. ed., 254. 13. (1837).
rufiventris MACQ., Suit. à Buff., II. 17. 2. t. XIII. f. 7. (1835).
rufiventris MACQ. = *rufa* MEIG.
subfasciata MEIG. = *dorsalis* MEIG.
saperba KOW. = *picta* MEIG.
vernalis CURT. ? *infumata* HAL.
vittata ZETT. = *infumata* HAL.

SCHIZOPHORA.

Eumyidae.

SCHIZOMETOPA.

TACHINIDAE.

Tachininae.

Mikia

KOWARZ, Wien. entom. Zeitg., IV. 51. (1885).

magnifica MUK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 260. 5. f. 4. [*Fabricia*] (1883); Kow., Wien. entom. Zeitg., IV. 51. (1885); WACHSEL, Wien. entom. Zeitg., XIII. 143. (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 614. [*Tachina*] (1894). Carinthia.

Servillia

R.-D., Myod., 49. VIII. (1830).

A. *Hystriomyia*

PORTSCH, Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 257. (1882).

Fetisowii PORTSCH, Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 258. (1882). Asia media.

lata PORTSCH, Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 4. (*sep.*) (1883). Asia media.

B. *Servillia s. str.*

argyrostoma SCHRANK — ? **ursina** MEIG.

cuculliae R.-D. **lurida** FABR.

oclinata MEIG. **lurida** FABR.

ephippium v. Ros. **lurida** FABR.

hirsuta DONOV. **lurida** FABR.

Jakovlevii PORTSCH, Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 5. (*sep.*) (1883) Sibiria,

et XXI. 15. [*Echinomyia*] (1887); COQUELLE, Proc. Unit. Stat. Japonia.

Mus., XXI. 329. (1898).

lateralis R.-D. **lurida** FABR.

leucocoma MEIG. **lurida** FABR.

lurida FABR. *) Spec. ins., II. 441. 29. [*Musca*] (1781), Entom. Syst., Europa centr. et sept.

*) *Aconicta aceris* L., *Cucullia Verbasci* L., *Deilephila euphorbiae* L.

IV. 324. 52. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 310. 6. [*Tachina*] (1805); Gmel., Syst. nat., V. 2845. 205. [*Musca*] (1788); Meig., S. B., IV. 244. 8. [*Tachina*] (1824) et VII. 187. 2. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 320. 5. [*Echinomyia*] (1834), Suit. à Buff., II. 75. 14. [*Echinomyia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 264. 11. t. IV. f. 10. [*Echinomyia*] (1845); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 652. [*Tachina*] (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 729. [*Tachina*] (1849) et Ins. Brit., II. 21. 6. [*Tachina*] (1853); Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 52. 5. [*Echinomyia*] (1859); Schm., F. A., I. 426. [*Echinomyia*] (1862); R.-D., Posth., I. 644. 1. (1863); Meade, Entom. Monthly Mag., (2). II. 90. [*Echinomyia*] (1891); Pand., Rev. entom., XV. 73. 2. [*Echinomyia*] (1896).

cuculliae R.-D., Myod., 49. 16. [*Echinomyia*] (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). II. 19. 5. [*Echinomyia*] (1844).

echinata Meig., S. B., IV. 245. 10. [*Tachina*] (1824) et VII. 187. 4. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 320. 4. [*Echinomyia*] (1834), Suit. à Buff., II. 76. 21. [*Echinomyia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 266. 14. t. IV. f. 11. [*Echinomyia*] (1845); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 24. 3. (1844); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 136. (1900).

ephippium v. Ros., Württemb., CorrbL., I. 57. [*Tachina*] (1840).
? *hirsuta* Donovan., Brit. Ins., X. 53. t. ? [*Musca*] (1801).

lateralis R.-D., Myod., 49. 15. [*Echinomyia*] (1830).

leucocoma Meig., S. B., IV. 244. 9. [*Tachina*] (1824) et VII. 187. 1. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 321. 6. [*Echinomyia*] (1834), Suit. à Buff., II. 75. 15. [*Echinomyia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 265. 13. t. IV. f. 9. [*Echinomyia*] (1845); Stein, Entom. Nachricht., XXVI. 142. (1900).

potens R.-D., Posth., I. 645. 2. (1863).

luteola Coquill., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 330. (1898).

Japonia.

pedemontana Macq. ***ursina*** Meig.

persica Portsch., Hor. Soc. entom. Ross., IX. 293. t. IX. f. 9. (1874) et XVII. 9. (*sep.*) [*Echinomyia*] (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 408. (1891).

Persia.

pilosa R.-D. ***ursina*** Meig.

politula Coquill., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 330. (1898).

Japonia.

potens R.-D. - ***lurida*** Fabr.

strenua R.-D. - ***ursina*** Meig.

subpilosa R.-D. - ***ursina*** Meig.

ursina Meig., S. B., IV. 245. 11. [*Tachina*] (1824) et VII. 187. 3. t. LXVIII. f. 25 - 30. (1838); R.-D., Myod., 50. 1. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 22. 2. (1844) et Posth., I. 646. 3. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 319. 1. [*Echinomyia*] (1834), Suit. à Buff., II. 76. 18. [*Echinomyia*] (1835) et Annal. Soc.

•Europa centr. et mer.

entom. France, (2). III. 265. 12. [*Echinomyia*] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 730. [*Tachina*] (1849) et Ins. Brit., II. 21. 5. [*Tachina*] (1853); ROSD., Dipt. ital. Prodr., III. 52. 4. [*Echinomyia*] (1859); SCHN., F. A., I. 426. [*Echinomyia*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 90. [*Echinomyia*] (1891); PAND., Rev. entom., XV. 72. 1. [*Echinomyia*] (1896).

? *argyrostoma* SCHRANK, Enum. ins., 460. 935. [*Musca*] (1781) et Fauna boica, III. 117. 2439. [*Musca*] (1803); VIL., Entom. linn., III. 544. 371. [*Musca*] (1789).

pedemontana Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 266. 15. t. IV. f. 8. [*Echinomyia*] (1845); ROSD., Dipt. ital. Prodr., III. 48. 3. [*Echinomyia*] (1859); BRACER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 496. 33. (1898).

pilosa R.-D., Myod., 50. 2. (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). II. 22. (*var. arsinæ*) (1844); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 184. 2. [*Echinomyia*] (1834) et Suit. à Buff., II. 76. 19. [*Echinomyia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 187. 5. (1838).

strenua R.-D., Posth., I. 649. 5. (1863).

subpilosa R.-D., Myod., 50. 3. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 23. 2. (1844) et Posth., I. 648. 4. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 320. 3. [*Echinomyia*] (1834) et Suit. à Buff., II. 76. 20. [*Echinomyia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 188. 6. (1838).

Echinomyia

DUMÉR., Zoologie analyt., 282. (1806).

Cnephaliodes B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 353 et 383. (1891).

Nowickia WACHTL, Wien. entom. Zeitg., XIII. 142. 5. (1894).

Pareudora WACHTL, Wien. entom. Zeitg., XIII. 141. 2. (1894).

Tachina B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 133. (1889).

albidopilosa PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 6. (*sep.*) (1883) Asia media. et XXI. 15. (1887).

algira Macq. ? **fera** L.

alpicola ROSD., Dipt. ital. Prodr., IV. 157. (1861).

Alpes.

alpina ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3118. 7—8. (1849); BOSSQ., Fiml. Insekt., II. 38. 5. (1866).

Europa sept.

analis R.-D. **fera** L.

autumnalis GIULIO-T., Ati Acc. Sci. Torino, XXV. (1890) et Bull. Mus. Torino, V. (78). 2. (1891).

Italia.

canariensis Macq., Hist. nat. Can. Webb. Entom., I. 110. 56. (1838), Dipt. exot., III. 194. (37). 1. t. III. f. 1. (1813) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 475. 188. t. V. f. 7. (1819); ? R.-D., Posth., I. 641. 13.

Ins. Canar.,

Africa sept.,

? Sicilia.

(1863); ? V. RÖD., Wien. entom. Zeitg., II. 95. (1883) et Dipt. Sep., 7. (1883); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 496. 35. (1898).

cenisia GIGLIO-T., Bull. Mus. Torino, VI. (97). 2. (1891).

Alpes.

Danilewskyi PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 6. (*sep.*) [*Danilewskyi*] (1883).

Tauria.

errans R.-D. = **fera** L.

* **fera** L.*) Syst. Nat., X. 592. [*Musca*] (1758), XII. II. 991. 74. [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1836. [*Musca*] (1761); GEOFFR., Hist. d. Ins., II. 509. 33. [—] (1762); O. F. MÜLL., Fauna fridrichsd., 734. [*Musca*] (1764); FABR., Syst. entom., 777. 18. [*Musca*] (1775), Spec. ins., II. 441. 28. [*Musca*] (1781), Entom. syst., IV. 324. 29. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 308. 1. [*Tachina*] (1805); HARR., Expos. engl. Ins., 35. t. IX. f. 2. [*Musca*] (1776); SCHRANK, Enum. ins., 460. 934. [*Musca*] (1781) et Fauna boica, III. 117. 24. 38. [*Musca*] (1803); PETAGNA, Specim. ins. ult. Cal., ed. I. 43. 227. (1786) et ed. II. 43. 227. [*Musca*] (1820); GMEL., Syst. Nat., V. 2845. 74. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 484. 192. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etr., II. 303. 1497. [*Musca*] (1790); PANZ., Fauna germ., XX. 18. [*Musca*] (1794); CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 310. 976. [*Musca*] (1798); HERBST, Gen. Naturg., VIII. 109. 13. t. CCCXLI. f. 1. [*Musca*] (1799); DWIGB., Primit. faunae Mosqu., 176. 742. [*Musca*] (1802); WALKEN., Fauna paris., II. 394. 1. [*Musca*] (1802); LATR., Dict. Hist. nat. Deterg., XXIV. 195. 571. [*Tachina*] (1804), Gen. crust. ins., IV. 343. (1804) et Hist. nat. crust. ins., XIV. 377. 2. (1805); LIL., Rossi Fauna etr., II. 464. 1497. [*Musca*] (1807); FALL., p. p., Vet. Acad. Handl., XXXI. 262. 2. [*Tachina*] (1810) et Dipt. Suec. Musc., 3. 2. [*Tachina*] (1820); LAM., Anim. s. vert., III. 362. 9. [*Musca*] (1816); DUMER., Diet. Sci. nat. Dipt., 10. (1819) et Cons. gén., t. L. f. 7. (1823); MEIG., S. B. IV. 240. 3. [*Tachina*] (1824) et VII. 182. 3. (1838); R.-D., Myod., 46. 9. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 14. 2. (1844) et Posth., I. 634. 4. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 322. 8. t. V. f. 10. (1834), Suit. à Buff., II. 72. 5. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). 3. 256. 3. t. IV. f. 1. (1845); v. SIER., Wiegmann Archiv., IV. 195. 1. [*Tachina*] (1838); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 609. t. IV. f. 8. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 652. (1842); ZETT., Dipt. Scand., III. 994. 3. (1844) et XIII. 6066. 3. (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 726. [*Tachina*] (1849) et Ins. Brit., II. 20. 2. [*Tachina*] (1853); TH. APERTZ, Mittheil. aus d. Osterl., XII. 60. (1853); ROSD., Dipt. ital. Prodr., III. 54. 7. (1859), Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 197. (1865) et XI. 578. *nota*. 1. (1869); SEMM.,

Europa,
Africa sept.

*) *Agrotis glareosa* Esp., *Aretia aulica* L., *Leucania obsoleta* Hb., *Lymantria dispar* L. et *monacha* L., *Mamestra pisi* L., *Oeonistis quadra* L., *Panolis griseovariegata* Goetze.

F. A., I. 425. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., II. 38. 6. (1866); BERTOLINI, Almanacco Trento, 1886. 19. f. 32. [*Tachina*] (1886); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 89. (1891); GIGLIO T., Bull. Mus. Torino, VI. (96). 5. (1891); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 40. [*Tachina*] (1894); PAND., Rev. entom., XV. 75. 4. (1896); LEONARD., Insetti nocivi, III. 330. f. 172. 173. (1900).

? *algira* MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 475. 189. t. V. f. 5. (1849).

analis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 16. B. (1844).

errans R.-D., Myod., 45. 5. (1830) et Posth., I. 637. 7. (1863);

MACQ., Suit. à Buff., II. 72. 3. (1835); MEIG., S. B., VII. 184. 14. (1838).

fulviceps MEIG., S. B., VII. 183. 10. (1838); SCHN., F. A., I. 426. (1862); R.-D., Posth., I. 638. 8. (1863); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 138. (1900).

intermedia R.-D., Myod., 47. 10. (1830) et Annal. Soc. entom.

France, (2). II. 16. C. (1844); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 322. 10. (1834) et Suit. à Buff., II. 73. 6. (1835); MEIG., S. B., VII. 183. 11. (1838).

interrupta R.-D., Posth., I. 636. 5. (1863).

Macquarti GIGLIO-T., Bull. Mus. Torino, VI. (96). 9. (1891).

✓ *magnicornis* SCHN. (nec, FALL.), F. A., I. 426. (1862).

Migenii GIGLIO-T., Bull. Mus. Torino, VI. (96). 7. (1891).

nigrofemorata R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 16.

D. (1844).

reccambo HARR., Expos. engl. Ins., 35. t. IX. f. 4. [*Musca*] (1776).

rubricornis R.-D., Myod., 46. 7. (1830) et Annal. Soc. entom.

France, (2). II. 16. E. (1844); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 322. 9. (1834) et Suit. à Buff., II. 72. 4. (1835); MEIG., S. B., VII. 185. 17. (1838).

ruficornis MEIG., S. B., VII. 183. 9. (1838); SCHN., F. A., I. 426. (1862).

testacea R.-D., Myod., 48. 14. (1830) et Annal. Soc. entom.

France, (2). II. 17. (1844).

virgo MEIG., S. B., IV. 243. 6. [*Tachina*] (1824) et VII. 182. 6.

(1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 73. 9. (1835); ZETT., Dipt., Scand., III., 995. 4. (1844) et XII. 4687. 4. (1855); R.-D., Posth., I. 631. 3. (1863); BONSD., Finnl. Insekt., II. 39. 7. (1866).

flavipes STROBL. **praeceps** MEIG.

fulviceps MEIG. **fera** L.

fuscipennis MACQ. **praeceps** MEIG.

✶ **grossa** L.)* Syst. nat., X. 592. [*Musca*] (4758), XII. 2. 991. 75. Europa.

~-----
*) *Hyloicus pinastri* L., *Lasiocampa quercus* L. et *trifolii* Esp., *Lemonia dumii* L., *Macrothylacia rubi* L.

[*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1837. [*Musca*] (1761); RÉAUM., Mém. Ins., IV. t. XXVI. f. 10. [—] (1738); GEOFFR., Hist. d. Ins., II. 495. 24. [—] (1762); FABR., Syst. entom., 777. 20. [*Musca*] (1775), Spec. ins., II. 441. 30. [*Musca*] (1781), Entom. syst., IV. 225. 53. [*Musca*] (1794) et Syst. Anth., 310. 7. [*Tachina*] (1805); HARR., Expos. engl. ins., 35. t. IX. f. 1. [*Musca*] (1776); DEG., Ins., VI. 12. 1. t. I. f. 1-2. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI. 21. 1. t. I. f. 1-2. [*Musca*] (1782); SCHAEFF., Icon. ins., III. t. CVIII. f. 6. [—] (1779); GMEL., Syst. nat., V. 2845. 75. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 485. 193. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etr., II. 303. 1499. [*Musca*] (1790); PANZ., Fauna germ., XXX. 21. [*Musca*] (1796); CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 310. 977. [*Musca*] (1798); HERBST, Gem. Naturg., VIII. 109. 14. t. CCCXLI. f. 2. [*Musca*] (1799); DONOV., Brit. Ins., X. 53. t. CCCXLVI. f. 1. [*Musca*] (1801); WALKEN., Fauna paris., II. 394. 2. [*Musca*] (1802); DWIG., Prim. faunae mosqu., 176. 643. [*Musca*] (1802); LATR., Dict. Hist. nat. Détérv., XXIV. 195. 572. [*Tachina*] (1804), Gen. crust. ins., IV. 343. (1804), Hist. nat. crust. ins., XIV. 377. 1. (1805), Cons. gén., 444. (1810) et Règne anim., V. 510. (1825); ILLEG., Rossi Fauna etr., II. 465. 1499. [*Musca*] (1807); FALL., Vet. Acad. Handl., XXXI. 261. 1. [*Tachina*] (1810) et Dipt. Suec. Musc., 3. 1. [*Tachina*] (1820); LAM., Anim. s. vert., III. 362. 8. [*Tachina*] (1816); DUMÉR., Dict. Sci. Nat. Dipt., 10. (1819) et Cons. gén., t. XLIX. f. 7. (1823); MEIG., S. B., IV. 239. 1. [*Tachina*] (1824) et VII. 182. 2. t. LXVIII. f. 14-30. (1838); R. D., Myod., 44. 1. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 14. 1. (1844) et Posth., I. 629. 1. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 323. 13. (1834), Suit. à Buff., II. 71. 1. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 255. 2. t. IV. f. 6. (1845); v. STEB., Wieg. Archiv., IV. 196. 3. [*Tachina*] (1838); BLASCH., Hist. nat. ins., III. 609. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 652. (1842); ZETT., Dipt. Scand., III. 992. 1. (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 725. [*Tachina*] (1849) et Ins. Brit., II. 19. 1. t. XI. f. 10. [*Tachina*] (1853); TH. APERTZ, Mittheil. aus d. Osterl., XII. 60. (1853); RONDI., Dipt. ital. Prodr., III. 48. 2. (1859); SCHN., F. A., I. 425. (1862); BONSP., Finnl. Insekt., II. 37. 1. (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 89. (1891); PAND., Rev. entom., XV. 74. 3. (1896); MELL., Zool. Jahrbüch., XV. 680. (1901).

intermedia R.-D. = **fera** L.

interrupta R.-D. = **fera** L.

latimargo PAND., Rev. entom., XV. 76. 6. (1896).

ligustica GIGLIO-T., Bull. Mus. Torino, VI. (97). 1. (1891).

Macquarti GIGLIO-T. = **fera** L.

macularia PAUL. ap. WIED., Anal. entom., 44. 86. [*Tachina*] (1824) et ANSSER. zweifl. Ins., 2. 285. 7. [*Tachina*] (1830); PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 257. (1882) et XVIII. 131. (1884).

Gallia mer.
Italia.

Rossia mer.

- magna** GIGLIO-T., Atti Acc. Sci. Torino, XXV. 10. (1890) et Bull. Italia. Mus. Torino, V. (78). 1. (1891).
- magnicornis* SCHIX. = **fera** L.
- * **Marklini** ZETT., Ins. Lapp., 634. 1. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III. 993. 2. (1844); SCHIX., F. A., I. 425. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., II. 37. 2. (1866); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 40. [*Tachina*] (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 614. [*Tachina*] (1894)
- parvula* HGG. in coll. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 436. [*Tachina*] (1891).
- regalis* ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 50. 1. (1859); GIGLIO-T., Bull. Mus. Torino, VI. (96). 14. (1891); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., XIII. 142. [*Nowickia*] (1894); B. B. Denkschr. Akad. Wien, LXI. 614. [*Tachina*] (1894).
- Meigenii* GIGLIO-T. = **fera** L.
- Micado** F. W. KIRBY, Annal. Mag. nat. Hist., (5). XIII. 458. (1883); Japonia. OST-SACK., Wien. entom. Zeitg., III. 316. (1884).
- nicaeana** R.-D., Posth., I. 641. 12. (1863). Gallia mer.
- nigrofemorata* R.-D. = **fera** L.
- ? **perversa** B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 353 et 383. [*Cnephaliodes*] (1891). Uerania.
- praeceps** MEIG.)* S. B., IV. 241. 4. [*Tachina*] (1824) et VII. 182. 5. (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 74. 12. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 260. 6. (1845); ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 57. 10. (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 578. nota. 2. (1868); SCHIX., F. A., I. 426. (1862); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 94. (1893); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., XIII. 141. [*Paucedora*] (1894).
- flavipes* STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 94. (1893).
- fuscicapennis* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 263. 10. t. IV. f. 5. (1845); R.-D., Posth., I. 639. 9. (1863); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 251. nota. (1894); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 496. 31. [*Paucedora*] (1898)
- pusilla* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 259. 5. t. IV. f. 7. (1845); R.-D., Posth., I. 640. 11. (1863); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 496. 32. (1898).
- Roederii* GIGLIO-T., Bull. Mus. Torino, VI. (97). 5. (1891).
- ? *similis* GIGLIO-T., Bull. Mus. Torino, VI. (97). 6. (1891).
- tricondyla* ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 37. (1868); A. COSTA, Atti Acc. Sci. Napoli, 1883. 104. (1883); GIGLIO T., Bull. Mus. Torino, VI. (96). 15. (1891).
- pusilla* MACQ. = **praeceps** MEIG.
- reccambo* HARR. = **fera** L.
- regalis* ROND. = **Marklini** ZETT.
- Roederii* GIGLIO-T. = **praeceps** MEIG.

*) *Hemaris fuciformis* L., *Euproctis chrysothoea* L.

- Rondanii** GIGLIO-T., Atti Acc. Sci. Torino, XXV. 2. (*sep.*) (1890) et Italia.
Bull. Mus. Torino, V. (78). 2. (1891).
- rubricornis* R.-D. **fera** L.
- rusticornis* MEIG. **fera** L.
- similis* GIGLIO-T. **praeceps** MEIG.
- Strobilii** ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 198. (1865). Alpes.
- testacea* R.-D. — **fera** L.
- ? **tetramera** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3216. 5-6. (1849). Scandinavia.
- tricondyla* ROND. **praeceps** MEIG.
- virgo* MEIG. — **fera** L.

Fabriciella

Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 49. 6. (1906).

Fabricia R.-D. Myod., 42. VI. (1830) *nee* Blainv. 1828. Verm.

- atripalpis* R.-D. **ferox** PANZ.
- ferox** PANZ.*). Fauna germ., CIV. 20. [*Tachina*] (1809); MEIG., S. B., IV. 240. 2. [*Tachina*] (1824) et VII. 182. 1. t. LXXVIII. f. 21-23. [*Echinomyia*] (1838); R.-D., Myod., 42. 1. [*Fabricia*] (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 12. 1. [*Fabricia*] (1844) et Postl., I. 625. 1. [*Fabricia*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 321. 7. [*Echinomyia*] (1834), Suit à Buff., II. 75. 17. [*Echinomyia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 254. 1. t. IV. f. 2. [*Echinomyia*] (1845); HARTIG, Jahresber. Fortschr. Forstwiss., I. 280. 1. [*Tachina*] (1838); O. G. COSTA, Atti Acc. Sci. Napoli, V. (2). 107. 12. [*Tachina*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., III. 999. 8. (1844), XII. 4688. 8. (1855) et XIII. 6067. 8. [*Echinomyia*] (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 722. [*Tachina*] (1849) et Ins. Brit., II. 20. 4. [*Tachina*] (1853); ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 58. 11. [*Echinomyia*] (1859); SCHIN., F. A., I. 424. [*Echinomyia*] (1862); BONSD., Finnl. Insekt., II. 39. 9. [*Echinomyia*] (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IX. f. 238. [*Fabricia*] (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 19. [*Echinomyia*] (1891); PAND., Rev. entom., XV. 76. 7. [*Echinomyia*] (1896).
- atripalpis* R.-D., Posth., I. 627. 2. [*Fabricia*] (1863); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 245. *nola*. [*Fabricia*] (1894).
- nigripalpis* GIGLIO-T., Atti Acc. Sci. Torino, XXV. 3. [*Fabricia*] (1890) et Bull. Mus. Torino, V. (78). 3. [*Fabricia*] (1890).
- rotundata* HARR., Expos. engl. ins., 35. t. IX. f. 2. [*Musca*] (1776).
- nigripalpis* GIGLIO-T. **ferox** PANZ.
- rotundata* HARR. — **ferox** PANZ.

*) Chloanthra polyodon CL.

Eudoromyia

Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 49. 5. (1906).

Eudora R.-D., Posth., I. 623. II. (1863) nec Pér. Les., 1809. Coel.

A. *Cnephaotachina*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 612. (1894).

crepusculi B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 615. (1894).

Europa mer.,
Asia min.

B. *Eudoromyia s. str.*

Braueri Lw. = **Lefeburei** R.-D.

? **Camerani** Giglio-T., Bull. Mus. Torino, VI. (97). 4. [*Echinomyia*] Italia.
(1891).

casta Rond. = **Lefeburei** R.-D.

conjugata Rond. = **magnicornis** Zett.

dispersa Giglio-T., Bull. Mus. Torino, VI. (97). 4. [*Echinomyia*] Italia.
(1891).

fera Fall. = **magnicornis** Zett.

Friedrichii Wachtl. = **magnicornis** Zett.

illustris R.-D. = **Lefeburei** R.-D.

Lefeburei R.-D., Myod., 45. 4. [*Echinomyia*] (1830) et Posth., I. Europa centr.
621. [*Eudora*] et 637. 6. [*Echinomyia*] (1863); Macq., Snit. à et mer.
Butt., II. 72. 2. [*Echinomyia*] (1835); Meig., S. B., VII. 184. 13.
[*Echinomyia*] (1838).

Braueri Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 45. 44. [*Echi-
nomyia*] (1873).

casta Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 53. 6. [*Echinomyia*] (1859)
et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 197. [*Echinomyia*] (1865).

illustris R.-D., Posth., I. 623. [*Eudora*] (1863).

magnicornis Zett.)*, Dipt. Scand., III. 996. 5. (1844), XII. 4687. 5. Europa.
(1855) et XIII. 6966. 5. [*Echinomyia*] (1859); Bossd., Finnl.
Insekt., II. 39. 8. [*Echinomyia*] (1866); Gussch., Berlin. entom.
Zeitschr., XXXVIII. 305. f. III. [*Echinomyia*] (1894); B. B.,
Denkschr. Akad. Wien, LXI. 618. [*Tachina*] (1894); Pass., Rev.
entom., XV. 75. 5. [*Echinomyia*] (1896).

conjugata Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 56. 9. [*Echinomyia*]
(1859).

fera Fall. (nec L.) p. p., Vet. Acad. Handl., XXXI. 262. 2.

[*Tachina*] (1810) et Dipt. Succ. Musc., 3. 2. [*Tachina*] (1820).

Friedrichii Wachtl., Wien. entom. Zeitg., XIII. 113. [*Eudora*]
(1894).

unpta Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 55. 8. [*Echinomyia*] (1859).

*) *Agrotis* sp. ind., *Hadena adusta* Esp., *Lymantria dispar* L.

- Atti Soc. ital. Sci. nat., VIII. 198. [*Echinomyia*] (1865) et XI. 578. nota. 2. [*Echinomyia*] (1868).
- ? *tessellata* FAER., Entom. syst., IV. 324. 51. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 309. 5. [*Tachina*] (1805).
- tessellata* MEIG., S. B., IV. 242. 5. [*Tachina*] (1824) et VII. 182. 4. [*Echinomyia*] (1838); R.-D., Myod., 47. 11. [*Echinomyia*] (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). II. 17. 3. [*Echinomyia*] (1844); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 323. 12. [*Echinomyia*] (1834), Suit. à Buff., II. 73. 10. [*Echinomyia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 258. 4. [*Echinomyia*] (1845); v. SIEB., Wieg. Archiv., IV. 196. 2. [*Tachina*] (1838); GIGLIO-T., Bull. Mus. Torino, VI. (96). 10. [*Echinomyia*] (1891); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 149. [*Echinomyia*] (1900).
- vernalis* R.-D., Myod., 48. 12. [*Echinomyia*] (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). II. 17. [*Echinomyia*] (1844); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 323. 11. [*Echinomyia*] (1834) et Suit. à Buff., II. 73. 8. [*Echinomyia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 183. 12. [*Echinomyia*] (1838); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 151. [*Echinomyia*] (1900).
- nupta* ROND. — **magnicornis** ZETT.
- tessellata* FAER. — ? **magnicornis** ZETT.
- tessellata* MEIG. — **magnicornis** ZETT.
- vernalis* R.-D. = **magnicornis** ZETT.

Peletieria

- R.-D., Myod., 39. IV. [*Peletieria*] (1830), em. BEZZI (1906).
- Echinogaster* LLOY, Atti Istit. ven., (3). IX. 1335. (1863).
- Faurella* R.-D., Myod., 41. V. (1830).
- Sphyromyia* BIG., Bull. Soc. entom. France, 1883. CVIII. (1883).

A. *Peletieria* s. str.

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 611. (1894).

abdominalis R.-D. — **ferina** ZETT.

albatica BIG., Annal. Soc. entom. France, (5). IV. 116. II. [*Echinomyia*] (1874); BRAUER, Sitzsgber. Akad. Wien, VII. 496. 29. (1898). Albania, Asia min., Syria.

Kotschy SCHN., in Mus. vindob. ap. BRAUER.

multisetosa SCHN., in Mus. vindob. ap. BRAUER.

algira R.-D. **prompta** MEIG.

argentifera MEIG. — **prompta** MEIG.

argentifrons MACQ. **prompta** MEIG.

Erschoffii PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 8. (sep.) [*Echi-* Persia

- nomyia*] (1882); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 247. 2. (1894).
- fera* SCHELL. - **prompta** MEIG.
- ferina** ZETT.*), Dipt. Scand., III. 998. 7. (1844) et VIII. 3217. 7. Europa.
 [*Echinomyia*] (1849); ROSD., Dipt. ital. Prodr., III. 59. 14. [*Echinomyia*] (1859); SCHN., F. A., I. 424. [*Echinomyia*] (1862); BOXSÖ., Finn. Insekt., II. 38. 4. [*Echinomyia*] (1866); STEIN., Entom. Nachricht., XIV. 19. [*Echinomyia*] (1888); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 250. 2. (1894); WAGHTL, Wien. entom. Zeitg., XIII. 142. (1894); PASD., Rev. entom., XV. 78. 9. [*Echinomyia*] (1896).
- abdominalis* R.-D., Myod., 41. 4. (1830) et Posth., I. 621. 8. (1863); MACQ., Suit. à Buff., II. 78. 26. [*Echinomyia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 186. 20. [*Echinomyia*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 722. [*Tachina*] (1849); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 251. 3. (1894); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hereg., XIV. 485. [*Echinomyia*] (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hereg., IX. 545. [*Echinomyia*] (1904).
- abstersa* Lw. in litt. ap. STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIII. 94. [*Echinomyia*] (1893).
- heterocera* MACQ. ap. BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 496. 34. (1898).
- monticola* ROSD. in litt. ap. ROSD.
- Paolilli A. COSTA, Annal. Acc. Asp. Nat., (2) I. 127. [*Echinomyia*] (1847); BEZZI, Annuar. Istit. Zool. Univ. Napoli, II. 7. (1905).
- provincialis* MACQ. ap. BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 496. 30. (1898).
- punctata* R.-D., Myod., 48. 13. [*Echinomyia*] (1830) et Posth., I. 639. 10. [*Echinomyia*] (1863).
- rabidigaster* BIG., Annal. Soc. entom. France, (3) VIII. 781. [*Echinomyia*] (1860); ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 37. [*Echinomyia*] (1868).
- rubrigaster* ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 578. [*Echinomyia*] (1868).
- flavicentris* WULF **prompta** MEIG.
- heterocera* MACQ. **ferina** ZETT.
- jugorum** STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 39. [*Echinomyia*] Alpes. (1894); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 255. 5. (1894).
- meridionalis* R.-D. ? **ruficeps** MEIG.
- neglecta* TYL.-TOWNS. **prompta** MEIG.
- nigricornis* MEIG. **prompta** MEIG.
- nigricornis* R.-D. **prompta** MEIG.
- Paolilli A. COSTA **ferina** ZETT.
- pedemontana* R.-D. **ruficeps** MACQ.

*) *Aretia aulica* L., *Lasiocampa trifolii* Esp.

- prompta** MEIG.*), S. B., IV. 243. 7. [*Tachina*] (1824) et VII. 182. 7. Europa,
t. LXVIII. f. 24. [*Echinomyia*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. Africa sept.
74. 13. [*Echinomyia*] (1835), Annal. Soc. entom. France, (2). III.
261. 8. t. IV. f. 3. [*Echinomyia*] (1845) et Luc. Explos. Alg.
Zool., III. t. V. f. 6. [*Echinomyia*] (1849); ROXD., Dipt. ital.
Prodr., IV. 157. [*Echinomyia*] (1861); R.-D., Posth., I. 616. 2.
(1863); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 255. nota. [*Echi-
nomyia*] (1894); STEIN, Entom. Nachricht, XXVI. 147. [*Echi-
nomyia*] (1900).
- algira* R.-D., Posth., I. 621. 9. (1863).
- argentifera* MEIG., S. B., VII. 184. 15. [*Echinomyia*] (1838).
- argentifrons* MACQ., Suit. à Buff., II. 73. 7. [*Echinomyia*] (1835);
LOY, Atti Istit. ven., IX. 1535. [*Echinogaster*] (1863).
- fera* SCHELL. (nec L.), Genr. Mouch. Dipt., 62. t. II. f. 1. [*Musca*]
(1803); FALL., p. p., Dipt. Succ. Muse., 4. var. g. [*Tachina*]
(1820).
- flaviventris* WULF, Biol. centr. amer., II. 32. 2. t. II. f. 11.
[*Echinomyia*] (1888).
- neglecta* TYL.-TOWNS., Annal. Mag. nat. Hist., XIX. 148. [*Echi-
nomyia*] (1887).
- nigricornis* MEIG. (nec R.-D. 1830), S. B., VII. 182. 8. (*Echi-
nomyia*] (1838); R.-D., Posth., I. 619. 5. (1863).
- nigricornis* R.-D., Myod. 45. 6. [*Echinomyia*] (1830), Annal.
Soc. entom. France, (2). II. 88. 4. [*Echinomyia*] (1844) et
Posth., I. 630. 2. [*Echinomyia*] (1863); GIGLIO-T., Bull. Mus.
Torino, VI. (96). 13. [*Echinomyia*] (1891).
- pulverulenta* R.-D., Posth., I. 615. 1. (1863).
- punctifera* WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 728. [*Tachina*]
(1849).
- rubescens* R.-D., Myod., 46. 8. [*Echinomyia*] (1830) et Annal.
Soc. entom. France, (2). II. 10. 1. (1844); MACQ., Suit. à
Buff., II. 74. 11. [*Echinomyia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 185.
16. [*Echinomyia*] (1838).
- tessellata* ZETT. (nec FABR.), Dipt. Scand., III. 997. 6. [*Echi-
nomyia*] (1844); WALK., Ins. Brit., II. 20. 3. [*Tachina*] (1853);
ROXD., Dipt. ital. Prodr., III. 58. 12. [*Echinomyia*] (1859);
SCHN., F. A., I. 424. [*Echinomyia*] (1862); BONSD., Finnl.
Insekt., II. 37. 3. [*Echinomyia*] (1866); B. B., Denkschr.
Akad. Wien, LVI. t. IX. f. 239. (1889); MEADE, Entom.
Monthly Mag. (2). II. 89. [*Echinomyia*] (1891); BEZZI, Bull.
Soc. entom. ital. XXVI. 253. 4. (1894); WACHTL, Wien.
entom. Zeitzg., XIII. 142. (1894); PAND., Rev. entom., XV.
77. 8. [*Echinomyia*] (1896); COQUILL., Revis. Tachin. N. A.,
141. (1897); HOWARD, Ins. Book, t. XXII. f. 11. (1902);
ALDRICH, Cat. N. A. Dipt., 485. (1905).

*) *Agrotis segetum* SCHFF. et *vestigialis* ROTT., *Papilio Machaon* L.

- provincialis* MACQ. — **ferina** ZETT.
pulverulenta R.-D. — **prompta** MEIG.
punctata R.-D. — **ferina** ZETT.
punctifera WALK. — **prompta** MEIG.
rubescens R.-D. — **prompta** MEIG.
rubidigaster BIG. — **ferina** ZETT.
rubrigaster ROND. — **ferina** ZETT.
ruficeps MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), III. 263. 9. t. IV. Europa mer.
 f. 4. [*Echinomyia*] (1845); ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 59. 13.
 [*Echinomyia*] (1859); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 249.
 1. (1894).
collina ROND. in litt. ap. ROND.
heteroneura MACQ. in litt. ap. R.-D.
 ? *meridionalis* R.-D., Myod. 41. 1. [*Faurella*] (1830) et Posth.,
 I. 618. 4. (1863); MACQ., Suit. à Buff., II. 79. 28. [*Echino-*
myia] (1838); MEIG., S. B., VII. 186. 19. [*Echinomyia*] (1838);
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 722. [*Tachina*] (1849).
pedemontana R.-D., Posth., I. 619. 6. (1863).
vernalis R.-D., Posth., I. 617. 3. (1863).
tessellata ZETT. — **prompta** MEIG.
vernalis R.-D. — **ruficeps** MACQ.
versuta Lw., Beschreib. Europ. Dipt., II. 307. 167. [*Echinomyia*] Sibiria.
 (1871); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 247. 1. (1894).
xenoprepes Lw., Zeitschr. Ges. Naturwiss., XLIII. 418. 11. [*Echi-* Transcaaspiä.
nomya] (1874).

B. *Tessarochaeta*

BEZZI, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 50. 10. (1906).

Tetrachaeta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 613. (1894)
 nec Ehrenb. 1816. Prot.

- brevipalpis** PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 137. [*Echi-* Rossia mer.
nomya] (1881); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 247. 4.
 [*Peletieria*] (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 614.
 [*Tetrachaeta*] (1894).
obscura B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 614. [*Tetrachaeta*] Mongolia.
 (1894).

C. *Chaetopeletieria*

Mik, Wien. entom. Zeitg., XIII. 100. [*Chaetopeletieria*] (1894) em.

Popelia BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 256. (1894).

Bellardii GIGLIO-T. — **Popelii** PORTSCH.

- Popelii** PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 7. (scp.) [*Echinomyia*] Europa centr.
 (1882); STEIN, Entom. Nachricht., XIV. 17. [*Echinomyia*] (1888); et mer.,
 Mik, Wien. entom. Zeitg., XIII. 100. (1894); BEZZI, Wien. entom. Asia media.
 Zeitg., XIII. 173. (1894).

Bellaridii GIGLIO-T., Atti Acc. Sci. Torino, XXV. 4. (sep.)
 [*Echinomyia*] (1890) et Bull. Mus. Torino, V. (78). 1. [*Echi-*
nomyia] (1891).

D. *Sphyrocera*

LIOY, Atti Istit. ven., (3). IX. 1336. [*Sphyricera*] (1863); BEZZI, Bull. Soc. entom.
 ital., XXVI. 257. (1894) et Wien. entom. Zeitg., XIII. 173. (1894).

acnea STAEG. ap. ZETT, Dipt. Scand., VIII. 3217. 6—7. [*Echinomyia*] ?Europa sept.
 (1849); COQUILL., Revis. Tachin. N. A., 140. (1897); BEZZI, Bull.
 Soc. entom. ital., XXVI. 247. 1. (1894); LUNDB., Vid. Medd.,
 1898. 305. 100. [*Echinomyia*] (1898); ALDRICH, Cat. N. A. Dipt.,
 484. (1905).

? *hirta* CURT., Append. Ross. Voy. Aret. Reg., 79. [*Tachina*]
 (1831).

angustiventris MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 476. 191. t. V. Algeria.
 f. 8. [*Jurinia*] (1849); R.-D., Posth., I. 620. 7. (1863).

Balassogloi PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 8. (sep.) (1882); Asia media.
 BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXVI. 247. (1894).

hirta CURT. — ? **aenea** ZETT.

sphyrocera MACQ., Suit. à Buff., II. 78. 27. [*Echinomyia sphyricera*] Europa centr.
 (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 260. 7. t. IV. f. 12. et mer.
 [*Echinomyia*] (1845); MEIG., S. B., VII. 186. 18. [*Echinomyia*]
 (1838); ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 60. 15. [*Echinomyia*] (1859);
 B. B., Denksehr. Akad. Wien, LVIII. 440. [*Cyphocera*] (1891) et
 LXI. 613. (1894); BEZZI, Ditt. Trentino, 91. (1892), Bull. Soc.
 entom. ital., XXVI. 258. 7. (1904) et Wien. entom. Zeitg., XIII.
 173. (1894).

palustris ROND. in litt. ap. ROND.; LIOY, Atti Istit. ven., (3). IX.
 1336. (1863).

Cyphocera

MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 267. II. [*Cyphocera*] (1845) em. ROND.

Palpibraca ROND., Annal. Acc. Asp. Nat., III. 22. (1846).

argyrocephala MACQ., Dipt. exot. Suppl., I. 272. (144). 3. t. XII. f. Europa mer.,
 4. [*Echinomyia*] (1845); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. Africa sept.
 496. 37. (1898).

pyrrhogaster ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 61. 1. [*pyrrhogaster*]
 (1859); SCHIN., F. A., I. 427. (1862); PAND., Rev. entom.,
 XV. 79. 10. [*Echinomyia*] (1896).

haemorrhoea ROND. — **ruficornis** MACQ.

haemorrhoidata SCHIN. = **ruficornis** MACQ.

pyrrhogaster ROND. — **argyrocephala** MACQ.

ruficornis MACQ., Suit. à Buff., II. 83. 9. [*Micropalpus*] (1835) et Europa centr.
 Annal. Soc. entom. France, (2). III. 267. 1. t. IV. f. 13. (1845); et mer.

MEIG., S. B., VII. 220. 16. [*Micropalpus*] (1838); Egg., Verh. zool.-bot. Ver., VI. 390. [*Micropalpus*] (1856); ROXD., Dipt. ital. Prodr., III. 62. 2. (1859); SCHN., F. A., I. 427. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IX. f. 243. (1889); PAND., Rev. entom., XV. 79. 11. [*Echinomyia*] (1896).

haemorrhoea ROXD., Annal. Acc. Asp. Nat., III. 23. [*Palpibrava*] (1846).

haemorrhoidata SCHN., F. A., I. 427. (1862); BRAUER, Sitzsgeb. Akad. Wien, CVII. 493. 11. (1898).

Linnaemyia

R.-D., Myod., 52. I. [*Linnaemyia*] (1830).

Bonnetia R.-D., Myod., 55. II. (1830).

Marshamia R.-D., Myod., 57. IV. (1830).

Micropalpus s. str. R.-D., Posth., I. 116. I. (1863).

aestivalis R.-D. = **compta** FALL.

analis R.-D. = **compta** FALL.

analis R.-D. = **compta** FALL.

Bigotina R.-D. = **compta** FALL.

borealis R.-D. = **compta** FALL.

compta MEIG. = **compta** FALL.

compta FALL.*), Vet. Akad. Handl., XXXI. 284. [*Tachina*] (1810) et Europa.

Dipt. Succ. Muse., 24. 48. [*Tachina*] (1820); ZETT., Dipt. Scand.,

III. 1094. 91. (1844), XII. 4695. 91. (1855) et XIII. 6096. 9.

[*Tachina*] (1859); BONSD., Fimml. Insekt., II. 73. 59. [*Tachina*]

(1866); COQUILL., Rev. Tach. N. A., 87. (1897); ALDRICH, Cat.

N. A. Dipt., 452. (1905).

aestivalis R.-D., Myod., 54. 6. (1830).

analis R.-D., Myod., 54. 4. (1830) et Posth., I. 124. 8. [*Micropalpus*]

(1863); MACQ., Suit. à Buff., II. 82. 4. [*Micropalpus*]

(1835); MEIG., S. B., VII. 219. obs. [*Micropalpus*] (1838);

WALK., Ins. Brit., II. 29. 22. [*Tachina*] (1853).

analis R.-D., Myod., 58. I. [*Marshamia*] (1830).

Bigotina R.-D., Posth., I. 120. 3. [*Micropalpus*] (1863).

borealis R.-D., Myod., 54. 7. (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille,

1833. 318. 4. [*Micropalpus*] (1834) et Suit. à Buff., II. 82. 5.

[*Micropalpus*] (1835); MEIG., S. B., VII. 220. 15. [*Micropalpus*]

(1838).

compta MEIG., S. B., IV. 262. 39. [*Tachina*] (1824) et VII. 218.

7. [*Micropalpus*] (1838); ROXD., Dipt. ital. Prodr., III. 70. 7.

[*Micropalpus*] (1859); R.-D., Posth., I. 121. 4. [*Micropalpus*]

(1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 133. [*Micropalpus*]

*) *Agrotis ypsilon* Rott.

- (1891); BEZZI, Dipt. Trentino, 90. [*Micropalpus*] (1892); PAND., Rev. entom., XIV. 348. 2. (1895); WAINWRIGHT, Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 200. [*Micropalpus*] (1905).
- coarctalis* R.-D., Posth., I. 127. 15. [*Micropalpus*] (1863).
- diadema* MEIG., S. B., IV. 332. 160. [*Tachina*] (1824) et VII. 255. 6. [*Exorista*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 363. 1. t. X. f. 1. [*Exorista*] (1849); SCHIN., F. A., I. 466. [*Exorista*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 427. [*Micropalpus*] (1891).
- discreta* R.-D., Posth., I. 125. 12. [*Micropalpus*] (1863).
- distincta* R.-D., Myod., 54. 5. (1830); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 496. 27. [*Micropalpus*] (1898).
- fulgens* MEIG., S. B., IV. 259. 34. t. XII. f. 32. [*Tachina*] (1824) et VII. 217. 1. t. LXX. f. 12—17. [*Micropalpus*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 83. 10. [*Micropalpus*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 271. 2. t. V. f. 2. [*Micropalpus*] (1845); ZETT., Dipt. Scand., III. 1096. 93. (1844) et XIII. 6098. 93. [*Tachina*] (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 736. [*Tachina*] (1849) et Ins. Brit., II. 56. 85. [*Tachina*] (1853); SCHIN., F. A., I. 428. [*Micropalpus*] (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 73. 61. [*Tachina*] (1866); WULP, Biol. Centr. Amer., II. 34. 1. [*Micropalpus*] (1888) et 474. [*Micropalpus*] (1903); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 91. [*Micropalpus*] (1891); GIGLIO-T., Mem. Acc. Sci. Torino, XLIV. 11. 16. (sep.) [*Micropalpus*] (1893); TYL.-TOWN, Psyche, VI. 467. [*Micropalpus*] (1893).
- fulvicornis* BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 495. 21. [*Micropalpus*] (1898).
- glabrata* R.-D., Posth., I. 122. 5. [*Micropalpus*] (1863).
- heraclei* R.-D., Myod., 53. 3. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 31. 2. (1844) et Posth., I. 118. 1. [*Micropalpus*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 317. 3. [*Micropalpus*] (1834) et Suit. à Buff., II. 81. 3. [*Micropalpus*] (1835); MEIG., S. B., VII. 219. 14. [*Micropalpus*] (1838).
- humeralis* R. D., Posth., I. 119. 2. [*Micropalpus*] (1863).
- juvenilis* R.-D., Posth., I. 128. 17. [*Micropalpus*] (1863).
- laevigata* R.-D., Posth., I. 123. 6. [*Micropalpus*] (1863).
- longipes* R.-D., Myod., 55. 1. [*Bonnetia*] (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). II. 34. 4. (1844); MACQ., Suit. à Buff., II. 84. 12. [*Micropalpus*] (1835); MEIG., S. B., VII. 221. 18. [*Micropalpus*] (1838).
- ? *Mesula* WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 737. [*Tachina*] (1849).
- nigriceps* R.-D., Myod., 58. 2. [*Marshallia*] (1830).
- nudithorax* R.-D., Posth., I. 125. 10. [*Micropalpus*] (1863).
- ocanthis* R.-D., Myod., 56. 2. [*Bonnetia*] (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 33. 3. (1844) et Posth., I. 123. 7.

[*Micropalpus*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 316. 1.
 [*Micropalpus*] (1834); MEIG., S. B., VII. 220. 17. [*Micropalpus*
oenanthi] (1838); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII.
 495. 20. [*Micropalpus*] (1898).

picca MACQ., Suit. à Buff., II. 84. 11. [*Micropalpus*] (1835).

rufiventris R.-D., Posth., I. 124. 9. [*Micropalpus*] (1863).

rutila R.-D., Posth., I. 126. 14. [*Micropalpus*] (1863).

sericea R.-D., Posth., I. 126. 13. [*Micropalpus*] (1863).

vaga R.-D., Posth., I. 127. 16. [*Micropalpus*] (1863).

ventralis R.-D., Posth., I. 125. 11. [*Micropalpus*] (1863).

coralis R.-D. **comta** FALL.

diadema MEIG. — **comta** FALL.

discreta R.-D. — **comta** FALL.

distincta R.-D. **comta** FALL.

frater ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 67. 3. [*Micropalpus*] (1859); Europa mer.

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 383. [*Micropalpus*] (1891);

BEZZI, Ditt. Trentino, 90. [*Micropalpus*] (1892); PAND., Rev. entom.

XIV. 351. (1895); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 495.

18. [*Micropalpus*] (1898).

fulgens MEIG. — **comta** FALL.

fulvicornis BRAUER — **comta** FALL.

glabrata R.-D. — **comta** FALL.

heraclei R.-D. — **comta** FALL.

humeralis R.-D. — **comta** FALL.

juvenilis R.-D. — **comta** FALL.

laevigata R.-D. — **comta** FALL.

longipes R.-D. — **comta** FALL.

Mesula WALK. ? **comta** FALL.

nigripes R.-D. — **comta** FALL.

nudithorax R.-D. **comta** FALL.

oenanthis R.-D. **comta** FALL.

picca MACQ. = **comta** FALL.

rufiventris R.-D. **comta** FALL.

rutila R.-D. = **comta** FALL.

sericea R.-D. = **comta** FALL.

Sophia R.-D., Myod., 53. 1. (1830) et Posth., I. 133. 3. (1863); MACQ., Italia mer.

Suit. à Buff., II. 81. 1. [*Micropalpus*] (1835); MEIG., S. B., VII.

218. 14. [*Micropalpus*] (1838); ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 66.

1. [*Micropalpus*] (1859).

vaga R.-D. **comta** FALL.

ventralis R.-D. **comta** FALL.

Homoeonychia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 133. (1889) et LX. 145. (1893).

Amphisa R.-D., Posth., I. 129. II. (1863) *nce* Curt. 1828. LEP.

anthophaga BRAUER = **lithosiophaga** ROND.

clausa ROND. = **lithosiophaga** ROND.

larvarum PASSER. = **lithosiophaga** ROND.

laticornis R.-D. = **lithosiophaga** ROND.

lithosiophaga ROND.*), Dipt. ital. Prodr., III. 66. 2. [*Micropalpus lithosiophagus*] (1859); PAND., Rev. entom., XIV. 351. 8. [*Linnemya*] (1895); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 485. [*Micropalpus*] (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX. 545. [*Micropalpus*] (1904). Europa mer.

anthophaga BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 495. 19. [*Micropalpus*] (1898).

clausa ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 38. [*Micropalpus*] (1868).

larvarum PASSER. (*nce* L.), N. Annal. Sci. Nat. Bologna, (2). I. 352. [*Musca*] (1844) et Atti Acc. Geograf., XXI. 1. [*Musca*] (1845).

laticornis R.-D., Posth., I. 130. 1. [*Amphisa*] (1863).

Micropalpus

MACQ., Suit. à Buff., II. 80. 2. (1835).

Bonellia R.-D., Myod. 56. III. (1830) *nce* ROU., 1822. ECHIN.

Linnemya R.-D., Posth., I. 130. III. [*Linnemya*] (1863).

agrestis R.-D. = **impudicus** ROND.

analis MACQ. = **impudicus** ROND.

analis MEIG. = **haemorrhoidalis** FALL.

apricatus R.-D. = **impudicus** ROND.

cineras MACQ. = **impudicus** ROND.

comtus SCHIN. = **haemorrhoidalis** FALL.

consobrinus MACQ. = **impudicus** ROND.

educatus R.-D. = **haemorrhoidalis** FALL.

erraticus R.-D. = **vulpinus** FALL.

fissiglobulus PAND., Rev. entom., XIV. 350. 6. [*Linnemya*] (1895). Gallia.

fulgens HART. = **vulpinus** FALL.

fulgens R.-D. = **impudicus** ROND.

glaucescens R.-D. = **haemorrhoidalis** FALL.

haemorrhoidalis FALL.**), Vet. Acad. Handl., XXXI. 284. [*Tachina*] Europa. (1810) et Dipt. Svec. Muse., 25. 50. [*Tachina*] (1820); ZEFF., Dipt. Scand., III. 1905. 92. (1844) et XIII. 6097. 92. [*Tachina*] (1859);

*) *Lithosia caniola* Hb.

**) *Agrotis C-nigrum* L.

BONSD., Finnl. Insekt., II. 73. 60. [*Tachina*] (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 244. (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 91. (1891); BEZZI, Ditt. Trentino, 90. (1892); PAND., Rev. entom., XIV. 350. 4. [*Limnemyia*] (1895); WAINWRIGHT, Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 201. (1905).

analis MEIG. in coll. ap. STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 131. (1900).

comtus SCHIN. (nec FALL.), F. A., I. 429. (1862); GIGLIO-T., Mem. Acc. Sci. Torino, XLIV. 11. 17. (sep.) (1893).

educatus R.-D., Posth., I. 140. 12. [*Bonellia*] (1863).

glaucescens R.-D., Posth., I. 136. 2. [*Bonellia*] (1830).

lateralis R.-D., Myod., 57. 2. [*Bonellia*] (1830).

marmoratus MEIG., S. B., IV. 261. 36. [*Tachina*] (1824) et VII. 217. 3. (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 274. 7. (1845); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 142. (1900).

pictus MEIG., S. B., IV. 261. 37. [*Tachina*] (1824) et VII. 2. 17. 4. (1838); MACQ., Annal. Soc. Entom. France, (2). III. 274.

S. t. V. f. 8. (1845); SCHIN., F. A., I. 429. (1852); COQUILL., Rev. Tachin. N. A., 87. [*Limnemyia*] (1897).

politus R.-D., Posth., I. 136. 3. [*Bonellia*] (1863).

punctulatus R.-D., Posth., I. 136. 4. [*Bonellia*] (1863).

rubiginosus R.-D., Myod., 57. 3. [*Bonellia*] (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 38. 3. [*Bonellia*] (1844) et Posth., I. 140. 11. [*Bonellia*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 318. 6. (1834) et Suit. à Buff., II. 83. 7. (1835); MEIG., S. B., VII. 219. 12. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 737. [*Tachina*] (1849).

tessellans R.-D., Myod., 56. 1. [*Bonellia*] (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). II. 35. 1. [*Bonellia*] (1844) et Posth., I. 134. 1. [*Bonellia*] (1863); MACQ., Suit. à Buff., II. 82. 6. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 272. 5. t. V. f. 6. (1845); MEIG., S. B., VII. 219. 13. (1838); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 622. (1894).

haemorrhoidalis MEIG. — **impudicus** ROSS.

impudicus ROSS., Dipt. ital. Prodr., III. 68. 4. (1859) et Atti. Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 198. (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 133. (1889) et LVIII. 383. (1891); BEZZI, Ditt. Trentino, 90. (1892).

aprestis R.-D., Posth., I. 138. 7. [*Bonellia*] (1863).

analis MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 272. 4. t. V. f. 4. (1845).

apricatus R.-D., Posth., I. 139. 10. [*Bonellia*] (1863).

cinereus MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 272. (1845).

consobrinus MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 133. 9. (1848).

fulgens R.-D., Posth., I. 139. 8. [*Bonellia*] (1863).

haemorrhoidalis M. (nec FALL.), S. B., IV. 258. 33. [*Tachina*] (1824) et VII. 217. 6. (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833.

Europa centr.
et mer.

318. 5. (1834), *Snit. à Buff.*, II. 83. 8. (1835) et *Annal. Soc. entom. France*, (2). III. 271. 3. t. V. f. 3. (1845); v. SIEB., *Wieg. Archiv.*, IV. 197. 4. [*Tachina*] (1838); R.-D., *Annal. Soc. entom. France*, (2). II. 37. 2. [*Bonellia*] (1844) et *Posth.*, I. 137. 6. [*Bonellia*] (1863); SCHN., F. A., I. 429. (1862); STEIN, *Entom. Nachricht.*, XXVI. 139. (1900).
- nubilus* MEIG., S. B., IV. 262. 38. [*Tachina*] (1824) et VII. 217. 5. (1838).
- rapidus* MEIG., S. B., IV. 218. 9. [*Tachina*] (1824) et VII. 218. 9. (1838).
- rusticanus* R.-D., *Posth.*, I. 137. 5. [*Bonellia*] (1863).
- thoracicus* R.-D., *Posth.*, I. 139. 9. [*Bonellia*] (1863).
- vicinus* MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (2). VI. 134. 10. (1868).
- intricatus** MEIG., S. B., VI. 368. 316. [*Tachina*] (1824) et VII. 218. Europa centr.
10. (1838); SCHN., F. A., I. 429. (1862).
- investigator* HARR. = ? **vulpinus** FALL.
- lateralis* R.-D. = **haemorrhoidalis** FALL.
- longirostris** MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (2). III. 273. 6. t. V. Europa centr.
f. 5. (1845).
- marmoratus* MEIG. = **haemorrhoidalis** FALL.
- nubilus* MEIG. = **impudicus** ROND.
- Orbilus* WALK. = ? **vulpinus** FALL.
- perinealis** PAND., *Rev. entom.*, XIV. 350. 5. [*Linnemya*] (1895). Gallia.
- pictus* MEIG. = **haemorrhoidalis** FALL.
- politus* R.-D. = **haemorrhoidalis** FALL.
- pudicus** ROND., *Dipt. ital. Prodr.*, III. 69. 5. (1859) et *Atti Soc. ital. Sci. Nat.*, VIII. 198. (1865); BEZZI, *Ditt. Trentino*, 90. (1892); AUSTEN, *Entom. Monthly Mag.*, (2). IX. 36. (1898); GRIMS., *Annal. Scott. Nat. Hist.*, 1900. 24. 80. (1900); WAINWR., *Entom. Monthly Mag.*, (2). XVI. 200. (1905).
- quadraticornis* MEADE, *Entom. Monthly Mag.*, (2). V. 160. [*Nemoraea*] (1894); MIK, *Wien. entom. Zeitg.*, XVII. 60. 72. (1898); GIRSCHN., *Wien. entom. Zeitg.*, XVII. 152. [*Erigone*] (1898).
- tessellans* PAND. (*nec* R.-D.), *Rev. entom.*, XIV. 349. 3. [*Linnemya*] (1895).
- punctulatus* R.-D. = **haemorrhoidalis** FALL.
- quadraticornis* MEADE = **pudicus** ROND.
- rapidus* MEIG. = **impudicus** ROND.
- retroflexus** PAND., *Rev. entom.*, XIV. 350. 7. [*Linnemya*] (1895). Gallia mer.
- rubiginosus* R.-D. = **haemorrhoidalis** FALL.
- rusticanus* R.-D. = **impudicus** ROND.
- silvestris* R.-D. = **vulpinus** FALL.
- tessellans* PAND. = **pudicus** ROND.
- tessellans* R.-D. = **haemorrhoidalis** FALL.
- thoracicus* R.-D. = **impudicus** ROND.
- vicinus* MACQ. = **impudicus** ROND.

- vulpinus** FALL.*), Vet. Acad. Handl., XXXI. 283. [*Tachina*] (1810) et Europa.
 Dipt. Suec. Muse., 23. 47. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV. 260. 35. [*Tachina*] (1824) et VII. 217. 2. t. XXX. f. 18—23. (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 317. 2. t. V. f. 9. (1834), Suit. à Buff., II. 81. 2. t. XIV. f. 2—3. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 270. 1. t. V. f. 1. (1845); v. SIEB., Wieg. Archiv., IV. 197. 5. [*Tachina*] (1838); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 609. (1840); ZETT., Dipt. Scand., III. 1087. 84. [*Tachina*] (1844); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 30. 1. [*Linnaemya*] (1844) et Posth., I. 131. 1. [*Linnaemya*] (1863); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 735. [*Tachina*] (1849) et Ins. Brit., II. 28. 21. [*Tachina*] (1853); ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 66. 8. (1859); SCHN., F. A., I. 428. (1862); BONSD., Fiml. Insekt., II. 70. 55. [*Tachina*] (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 91. (1891); BEZZI, Ditt. Trentino, 90. (1892); PAND., Rev. entom., XIV. 347. 1. [*Linnaemyia*] (1895); WALNWR., Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 200. (1905).
erraticus R.-D., Posth., I. 132. 2. [*Linnaemya*] (1863).
fulgens HARTIG (nec MEIG.), Jahresh. Forstischr. Forstwiss., I. 281. 5. [*Tachina*] (1838); MIK et WACHTL, Wien. entom. Zeitg., XIV. 218. 2. (1895).
 ? *investigator* HARR., Expos. engl. Ins., 35. t. IX. f. 3. [*Musca*] (1776).
 ? *Orbilus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 736. [*Tachina*] (1849).
silvestris R.-D., Myod., 53. 2. [*Linnaemya*] (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). II. 30. 1. [*Linnaemya*] (1844).
 Type of *fulgens* H.

Pokornya

STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 214. (1893).

- aberrans** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 93. [*Micropalpus*] (1893) Dalmatia.
 et 214. 4. (1893), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 119 et 410. (1901), Glasnik zem. Mus. Bosn. Hereceg., XIV. 485. [*Micropalpus*] (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hereceg., IX. 545. [*Micropalpus*] (1904); BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 489. *no'a*. (1893).

Chrysosoma

MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 255. (1834), nec GREY, 1826. ?

- auratum** FALL.*), Dipt. Suec. Muse., 25. 52. [*Tachina*] (1820); MEIG., Europa.
 S. B., IV. 257. 31. [*Tachina*] (1824) et VII. 217. 1. (1838); ZETT.,

*) *Hadena porphyrea* Esp., *Hyloicus pinastri* L.

**) *Phibalapteryx tersata* Hb.

Dipt. Scand., III. 1191. 194. [*Tachina*] (1844); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 91. 2. t. III. f. 5. (1848); SCHN., F. A., I. 431. [*Gymnochaeta*] (1862); R.-D., Posth., 108. 1. (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 251. (1889); PAND., Rev. entom., XV. 2. 1. [*Exorista*] (1896).

rufipes Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 91. 3. t. III. f. 4. (1846); PAND., Rev. entom., XV. 3. [*Exorista*] (1896). Europa centr.

Gymnochaeta

R.-D., Myod., 371. VII. [*Gymnochaeta*] (1830).

viridis FALL.*), Vet. Acad. Handl., XXXI. 253. [*Tachina*] (1810) et Dipt. Suec. Muse., 25. 51. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV. 258. 32. [*Tachina*] et VII. 217. 2. t. LXX. f. 6—11. [*Chrysosoma*] (1838); R.-D., Myod., 372. 1. (1830) et Posth., I. 110. 1. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 256. 1. t. IV. f. 6. [*Chrysosoma*] (1834), Suit. à Buff., II. 150. 1. t. XIV. f. 16. [*Chrysosoma*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 90. 1. t. III. f. 3. [*Chrysosoma*] (1848); BOIE, Kroyers Tidsskr., II. 241. [*Tachina*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III. 1190. 193. (1844) et XIII. 6143. 193. [*Tachina*] (1859); WALK., Ins. Brit., II. 26. 16. [*Tachina*] (1853); SCHN., F. A., I. 431. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., II. 99. 113. [*Tachina*] (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. I. f. 7. (1889) et LVIII. 318. (1891); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 154. (1891); PAND., Rev. entom., XV. 3. 2. [*Exorista*] (1896). Europa.

Ernestia

R.-D., Myod., 60. II. (1830).

Erigone R.-D., Myod., 65. VI. (1830), nec Sav. Aracn.

Fausta R.-D., Myod., 62. IV. (1830).

Mericia R.-D., Myod., 64. 5. (1830).

Olbya R.-D., Posth., I. 170. VI. (1863).

Platychira ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 64. 15. (1856) et III. 74. 15. (1859).

Varicharta SPEISER, Berlin. entom. Zeitschr., XLVIII. 69. 3. (1903).

A. *Ernestia* s. str.

Erigone BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 533. (1898).

abdominalis R.-D. **radicum** FABR.

albiceps R.-D. **radicum** FABR.

*) *Ortholitha limitata* Scop., *Petilampis areuosa* Hw.

- Aldrichi* TYL.-TOWNS. — **radicum** FABR.
Ampelus WALK. — **radicum** FABR.
anthophila R.-D. — **radicum** FABR.
appendiculata MACQ. — ? **truncata** ZETT.
atra BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 539. 13. [*Erigone*] (1898). Mongolia s.
bifasciata MEIG. = **radicum** FABR.
? **bijuncta** WALK., Ins. Brit., II. 24. 12. [*Tachina*] (1853). Anglia.
Bremii MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 130. 28. t. V. f. Helvetia.
2. [*Nemorea*] (1846).
brevicauda ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 204. [*Platychira*] Alpes.
(1865).
? **brunisqueamis** R.-D., Posth., I. 170. 1. [*Olbya*] (1863). Gallia.
chrysinu R.-D. = **nemorum** MEIG.
? **conducta** WALK., Ins. Brit., II. 298. [*Tachina*] (1853). Gallia.
puparum bis WALK. (nec FABR.), Ins. Brit., II. 71. 119. [*Tachina*]
(1853).
conjugata ZETT., Dipt. Scand., XII. 4697. 112—13. (1855) et XIII. Europa centr
6107. 112—13. [*Tachina*] (1859); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, et sept.
CVII. 534 et 537. 10. [*Erigone*] (1898).
connivens ZETT., Dipt. Scand., III. 1416. 112. (1844) et XIII. 6107. Europa centr.
112. [*Tachina*] (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 220. et sept.
[*Erigone*] (1893) et LXI. 620. [*Erigone*] (1894); BRAUER., Sitzgsber.
Akad. Wien, CVII. 536. 8. [*Erigone*] (1898).
caesia STROBL (nec FALL.) in coll. ap. B. B.
insciens PAND., Rev. entom., XV. 36. 9. [*Erigone*] (1896).
consobrina MEIG.*), S. B., IV. 248. 15. [*Tachina*] (1824) et VII. 221. Europa.
5. [*Nemorea*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI.
116. 10. t. VI. f. 6. [*Nemorea*] (1848); R.-D., Posth., I. 155. 54.
[*Erigone*] (1863); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 232.
[*Nemorea*] (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 220. [*Eri-*
gone] (1893); PAND., Rev. entom., XV. 35. 8. [*Erigone*] (1896);
BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 534. 6. [*Erigone*] (1898);
HEND., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 209. 7. [*Erigone*] (1901).
myiophoroidea R.-D., Myod., 67. 3 et 275. [*Erigone myop-*
horoidea] (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 35.
3. [*Erigone*] (1846); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 304. 5.
[*Nemorea*] (1834) et Suit. à Bull., II. 101. 8. [*Nemorea*]
(1835); MEIG., S. B., VII. 225. 36. [*Nemorea*] (1838).
recta MEIG., S. B., IV. 257. 30. [*Tachina*] (1824) et VII. 221.
11. [*Nemorea*] (1838); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII.
541. [*Erigone*] (1898).
reformata ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 79. [*Platychira*] (1859);
B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 221. [*Erigone*] (1893).
radis SCHN. (nec FALL.), F. A., I. 451. [*Nemorea*] (1862);
BRISCHKE, Schrift. Naturf. Ges. Danzig., N. F. VI. 16. [*Ne-*

*) *Cueullia Artemisiae* HES., *Lymantria dispar* L.

- morca*] (1885); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 539.
[*Erigone*] (1894).
- silvana* MEIG. ap. BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 534.
[*Erigone*] (1898).
- vagans* SCHIN. (nec MEIG.), F. A., I. 450. [*Nemorca*] (1862);
ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 78. 4. [*Platychira*] (1859) et
Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 202. [*Platychira*] (1865); MEADE,
Entom. Monthly Mag., (2). II. 230. [*Nemorca*] (1891);
GURSCH., Wien. entom. Zeitzg., XVII. 152. [*Erigone*] (1898).
- consobrina* ZETT. **vidida** ZETT.
- ? **contracta** WALK., Ins. Brit., II. 24. 13. [*Tachina*] (1853). Anglia.
- ? **corylana** GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseon, VII. 100. t. II. t.
132. [*Tachina*] (1834) et XV. 674. [*Nemorca*] (1842). Rossia sept.
- ? **detracta** WALK., Ins. Brit., II. 22. 8. [*Tachina*] (1853). Anglia.
- ? **dispartita** WALK., Ins. Brit., II. 23. 10. [*Tachina*] (1853). Anglia.
- divergens** BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 536. 9. [*Erigone*]
(1898). Austria.
- erigonea** R.-D., Myod. 65. 1. [*Mericia*] (1830) et Annal. Soc. entom.
France, (2). IV. 37. 1. [*Mericia*] (1846); MACQ., Soc. Sci. Lille,
1833. 303. 3. [*Nemorca*] (1834) et Snit. à Buff., II. 100. 6. [*Nem-
orca*] (1835); MEIG., S. B., VII. 225. 35. [*Nemoreux*] (1838). Gallia.
- flavipennis* R.-D. = **radicum** FABR.
- florea* R.-D. = **nemorum** MEIG.
- Gazagnairei** MEUN., Bull. Soc. entom. France, 1895. CCXCIV. Gallia.
[*Platychira*] (1895).
- Histro** MEIG., S. B., IV. 250. 19. [*Tachina*] (1824) et VII. 221. 18. Anglia.
[*Nemorea histris*] (1838); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 139.
(1900).
- ignobilis* MEIG. = **radicum** FABR.
- impatiens* R.-D. = **nemorum** MEIG.
- inconspecta* R.-D. = **radicum** FABR.
- inops* R.-D. = **nemorum** MEIG.
- insciens* PAND.* = **connivens** ZETT.
- intermedia** ZETT., Dipt. Scand., III. 1114. 110. (1844), XII. 4697. Europa centr.
110. (1855) et XIII. 6105. 110. [*Tachina*] (1859); BOSSD., Fimml.
Insekt., II. 79. 73. [*Tachina*] (1866); MEADE, Entom. Monthly
Mag., (2). II. 232. [*Nemorca*] (1891); AUSTEN, Entom. Monthly
Mag., (2). XVI. 58. [*Erigone*] (1905). et sept.
- ? **intracta** WALK., Ins. Brit., II. 23. 11. [*Tachina*] (1853). Anglia.
- lateralis* R.-D. = **nemorum** MEIG.
- latifrons** BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 538. 12. [*Erigone*] Europa centr.
(1898).
- intermedia* LW. (nec ZETT.) et STEIN in coll. ap. BRAUER.
- ? **radicum** PAND. (nec FABR.), Rev. entom., XV. 35. 6. [*Erigone*]
(1896).

*) Notae synonymicae omnes de speciebus a **Pandellé** con-
ditis, ex typis sumptae, mihi a Doct. **Villeneuve** traditae fuerunt.

- lurida* FALL. **radicum** FABR.
minor MACQ. **radicum** FABR.
myiophoroidea R.-D. **consobrina** MEIG.
 ? *neglecta* WALK., *Insc. Brit.*, II. 25. 15. [*Tachina*] (1853). Anglia.
nemorum MEIG., S. B., IV. 251. 20. [*Tachina*] (1824) et VII. 221. 21. Europa centr.
 [*Nemorea*] (1838); MACQ., *Suit. à Buff.*, II. 103. 18. [*Nemorea*] et sept.
 (1835) et *Annal. Soc. entom. France*, (2). VI. 129. 27. [*Nemorea*]
 (1848); ZETT., *Dipt. Scand.*, III. 1091. 87. [*Tachina*] (1844);
 SCHIS., F. A., I. 454. [*Nemorea*] (1862); R.-D., *Posth.*, I. 160. 3.
 [*Fausta*] (1863); MEADE, *Entom. Monthly Mag.*, (2). II. 231.
 [*Nemorea*] (1891); PAXD., *Rev. entom.*, XV. 37. 12. [*Erigone*]
 (1896); BRACER, *Sitzgsber. Akad. Wien*, CVII. 532. [*Erigone*]
 (1898); WAINWR., *Entom. Monthly Mag.*, (2). XVI. 205. [*Erigone*]
 (1905).
chrysiata R.-D., *Posth.*, I. 161. 4. [*Fausta*] (1863).
florica R.-D., *Myod.*, 64. 5. [*Fausta*] (1830), *Annal. Soc. entom.*
France, (2). IV. 31. 3. [*Fausta*] (1846) et *Posth.*, I. 162. 6.
 [*Fausta*] (1863); MACQ., *Soc. Sci. Lille*, 1833. 303. 1. [*Nemorea*]
 (1835); MEIG., S. B., VII. 225. 33. [*Nemorea*] (1838).
impatiens R.-D., *Posth.*, I. 163. 8. [*Fausta*] (186).
inops R.-D., *Posth.*, I. 163. 7. [*Fausta*] (1863).
lateralis R.-D., *Annal. Soc. entom. France*, (2). IV. 32. 5.
 [*Fausta*] (1846).
nerrosa R.-D., *Annal. Soc. entom. France*, (2). IV. 31. 4.
 [*Fausta*] (1846) et *Posth.*, I. 158. 1. [*Fausta*] (1863).
nigra R.-D., *Myod.*, 63. 1. [*Fausta*] (1830), *Annal. Soc. entom.*
France, (2). IV. 29. 1. [*Fausta*] (1846) et *Posth.*, I. 159. 1.
 [*Fausta*] (1863).
scutellaris R.-D., *Myod.*, 63. 2. [*Fausta*] (1830) et *Posth.*, I.
 165. 11. [*Fausta*] (1863).
tibialis R.-D., *Posth.*, I. 164. 10. [*Fausta*] (1863).
viridescens R.-D., *Myod.*, 64. 4. [*Fausta*] (1830), *Annal. Soc.*
entom. France, (2). IV. 30. 2. [*Fausta*] (1846) et *Posth.*, I.
 161. 5. [*Fausta*] (1863); MACQ., *Suit. à Buff.*, II. 99. 3. [*Nemorea*]
 (1835); MEIG., S. B., VII. 224. 32. [*Nemorea*] (1838).
arvensis R.-D. **nemorum** MEIG.
nigra R.-D. **nemorum** MEIG.
nigricornis R.-D. **radicum** FABR.
picea MEIG., S. B., IV. 246. 12. [*Tachina*] (1824) et VII. 221. 8. Europa centr.
 [*Nemorea*] (1838); WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, IV. 737. [*Tachina*]
 (1849); SCHIS., F. A., I. 451. [*Nemorea*] (1862).
puparum bis WALK. **conducta** WALK.
radicum FABR. *) *Entom. syst.*, IV. 326. 60. [*Musca*] (1791) et *Syst.* Europa.

*) *Chaerocampa* Elpenor L., *Deilephila* Galii Rott., *Lophopteryx* camelina L., *Panolis* griseovariegata GOEZE, *Spilosoma* menthastræ Esp., *Vanessa* Jo L.

Antl., 300. 82. [*Musca*] (1805); MEIG., S. B., IV. 249. 18. [*Tachina*] (1824) et VII. 221. 7. [*Nemorea*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 303. 4. [*Nemorea*] (1834), Suit. à Buff., II. 100. 7. [*Nemorea*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 110. 1. [*Nemorea*] (1848); ZERT., Ins. Lapp., 642. 35. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III. 1113. 109. (1844), XIII. 6105. 109. [*Tachina*] (1859); ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 80. 6. [*Platychira*] (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 201. [*Platychira*] (1865); SCHIN., F. A., I. 452. [*Nemorea*] (1862); R.-D., Posth., I. 152. 1. [*Erigone*] (1863); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 78. 72. [*Tachina*] (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 232. [*Nemorea*] (1891); STRIEBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 38. [*Erigone*] (1894); COQUILL., Rev. Tachin. N. A., 88. [*Panzeria*] (1897); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 534. 5. [*Erigone*] (1898); GÜRSCHN., Entom. Nachricht., XXV. 178. 5. [*Erigone*] (1899); ALDRICH, Cat. N. A. Dipt., 453. [*Panzeria*] (1905).

abdominalis R.-D., Myod. 63. 3. [*Fausta*] (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 302. 1. [*Nemorea*] (1834); MEIG., S. B., VII. 225. 34. [*Nemorea*] (1838).

albiceps R.-D., Posth., I. 154. 3. [*Erigone*] (1863).

Aldrichi TYL.-TOWNS., Trans. am. entom. Soc., XIX. 91. [*Hystriicia*] (1892).

Ampelus WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 732. [*Tachina*] (1849).

anthophila R.-D., Myod., 66. 1. [*Erigone*] (1863).

bifasciata MEIG., Illig. Mag., II. 280. [*Tachina*] (1803) et S. B., IV. 250. [*Tachina*] (1824); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 220. [*Erigone*] (1893).

flavipennis R.-D., Myod., 67. 5. [*Erigone*] (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 35. 2. [*Erigone*] (1846); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 304. 6. [*Nemorea*] (1834) et Suit. à Buff., II. 101. 9. [*Nemorea*] (1835); MEIG., S. B., VII. 226. 37. [*Nemorea*] (1838).

ignobilis MEIG., S. B., IV. 264. 42. [*Tachina*] (1824) et VII. 221. 19. [*Nemorea*] (1838); MACQ., Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 128. 25. [*Nemorea*] (1888); R.-D., Posth., I. 167. 14. [*Fausta*] (1863); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 139. (1900).

inconspicua R.-D., Posth., I. 166. 12. [*Fausta*] (1863); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 139. (1900).

larida FALL. (nec FABR.), Vet. Acad. Handl., XXXI. 270. [*Tachina*] (1810) et Dipt. Succ. Muse., 26. 54. [*Tachina*] (1820); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 33. 1. [*Erigone*] (1846).

minor MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 112. 3. t. V. f. 6. [*Nemorea*] (1848); R.-D., Posth., I. 154. 4. [*Erigone*] (1863).

- nigricornis* R.-D., Posth., I. 164. 9. [*Fausta*] (1863).
- radis* MEIG. (nec FALL.), S. B., IV. 246. 13. [*Tachina*] (1824) et VII. 221. 3. [*Nemorea*] (1838).
- scutellaris* R.-D., Myod., 66. 2. [*Erigone*] (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 35. [*Erigone*] (1846).
- sedula* R.-D., Posth., I. 153. 2. [*Erigone*] (1863).
- suspecta* PAND., Rev. entom., XV. 26. 10. [*Erigone*] (1896).
- radicum* PAND. = ? *latifrons* BRAUER.
- recta* MEIG. — *consobrina* MEIG.
- reformata* ROND. — *consobrina* MEIG.
- rudis* MEIG. = *radicum* FABR.
- radis* SCHIN. = *consobrina* MEIG.
- scutellaris* R.-D. [*Fausta*] = *nemorum* MEIG.
- scutellaris* R.-D. [*Erigone*] = *radicum* FABR.
- sedula* R.-D. = *radicum* FABR.
- setosa* MACQ. = *vivida* ZETT.
- silvana* MEIG. = *consobrina* MEIG.
- soror* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 115. 8. t. VI. f. 1. Helvetia. [*Nemorea*] (1848).
- suspecta* PAND. = *radicum* FABR.
- Tacchettii* ROND. = *vivida* ZETT.
- tessellans* EGG. = *vivida* ZETT.
- tessellata* B. B. = *vivida* ZETT.
- tibialis* R.-D. = *nemorum* MEIG.
- truncata* ZETT., Ins. Lapp., 642. 34. [*Tachina*] (1838), Dipt. Scand., III. 1089. 86. (1844) et XIII. 6095. 86. [*Tachina*] (1859); BOSSD., Finkl. Insekt., II. 71. 57. [*Tachina*] (1866); PAND., Rev. entom., XV. 33. 4. [*Erigone*] (1896); GURSCHN., Wien. entom. Zeitg., XVII. 152. [*Erigone*] (1898); AUSTEN, Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 58. [*Erigone*] (1905); WALSWR., Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 204. [*Erigone*] (1905).
- ? *appendiculata* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 112. 4. t. VI. f. 3. [*Nemorea*] (1848); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 230. [*Nemorea*] (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 219. [*Erigone*] (1893); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 540. [*Erigone*] (1898).
- unicolor* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 123. 19. t. VI. f. 4. [*Nemorea*] (1848). Europa centr. et sept.
- vagans* SCHIN. = *consobrina* MEIG.
- variicornis* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 118. 13. t. V. f. 7. [*Nemorea*] (1848). Gallia.
- viridescens* R.-D. = *nemorum* MEIG.
- vivida* ZETT., Ins. Lapp., 642. 36. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III. 1102. 99. (1844), VIII. 3243. 99. [*Tachina*] (1849); SOHN., F. A., I. 451. [*Nemorea*] (1862); BOSSD., Finkl. Insekt., II. 75. 63. [*Tachina*] (1866); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 535. 7. [*Erigone*] (1898). Europa.

- consobrina* ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., III. 1103. 100. (1844)
 et XIII. 6099. 100. [*Tachina*] (1859); ROND., Dipt. ital. Prodr.,
 III. 79. 5. [*Platychira*] (1865); SCHN., F. A., I. 451. [*Nemorea*]
 (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 75. 64. [*Tachina*]
 (1866); SIEBKE, Emm. insect. norveg., IV. 84. 33. [*Tachina*]
 (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). 231. [*Nemorea*]
 (1891).
- setosa* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 116. 9. t. V.
 f. IV. [*Nemorea*] (1848); AM STEIN, Jahresber. naturf. Ges.
 Graubünd., II. 103. [*Nemorea*] (1857).
- Tacchettii* ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 204. [*Platychira*]
 (1865).
- tessellans* EGG., (nec R.-D.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 389.
 [*Nemorea*] (1856); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 4.
 [*Nemorea*] (1857).
- tessellata* B. E., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 408. [*Erigone*]
 (1891).
- vulnerata** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3240. 88—89. [*Tachina*] (1849) Scandinavia.
 et XIII. 6095. 88—89. [*Tachina*] (1859).
- ? **xylosteara** GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 100. t. II. f. Russia sept.
 132. [*Tachina*] (1834) et XV. 674. [*Nemorea*] (1842).

B. *Eurythia*.

- R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 24. V. (1844); BRAUER, Sitzgsber. Akad.
 Wien, CVII. 530. (1898).

Echinosoma GIRSCHN., Entom. Nachricht., VII. 277. (1881) nec
 Serv. Orthopt.

- caesia** FALL.*), Vet. Acad. Handl., XXXI. 270. [*Tachina*] (1810) et Europa centr.
 Dipt. Suec. Musc., 27. 55. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV. et sept.
 247. 14. [*Tachina*] (1824) et VII. 221. 4. [*Nemorea*] (1838); ZETT.,
 Ins. Lapp., 643. 37. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III. 1115.
 111. [*Tachina*] (1844); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI.
 111. 2. t. VI. f. 7. [*Nemorea*] (1848); WALK., Ins. Brit., II. 22. 7.
 [*Tachina*] (1853); SCHN., F. A., I. 452. [*Nemorea*] (1862); R.-D.,
 Posth., I. 149. 1. (1863); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II.
 232. [*Nemorea*] (1891); PAND., Rev. entom., XV. 35. 7. [*Erigone*]
 (1896); GIRSCHN., Wien., entom. Zeitg., XVII. 152. (1898);
 BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien., CVII. 530. 1. (1898); STEIN,
 Entom. Nachricht., XXVI. 133. (1900).
- dabia* R.-D., Myod., 68. 8. [*Erigone*] (1830).
- indigena* PAND., Rev. entom., XV. 37. 11. [*Erigone*] (1896).
- longicornis* STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 38. [*Erigone*]
 (1894).

*) *Dianthoecia caesia* BKH.

papurum R.-D., Myod., 67. 4. [*Erigone*] (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). II. 25. 1. (1844).

tessellans R.-D., Myod., 67. 6. [*Erigone*] (1830); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 117. 11. t. V. f. 8. [*Nemorea*] (1848).

viridulans R.-D., Myod., 68. 7. [*Erigone*] (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 304. 7. [*Nemorea*] (1834) et Suit. à Buff., II. 101. 10. [*Nemorea*] (1835); MEIG., S. B., VII. 226. 38. [*Nemorea*] (1838); WALK., List. Dipt. Brit. Mus., IV. 730. [*Tachina*] (1849).

dubia R.-D. **caesia** FALL.

indigens PAND. = **caesia** FALL.

longicornis STROBL. = **caesia** FALL.

pectinata GIRSCHN., Entom. Nachricht., VII. 277. I. f. 1. [*Echino-* Europa centr.
soma pectinota] (1881) et Wien. entom. Zeitg., XVII. 151. 1.
(1898); MÜK, Entom. Nachricht., VII. 327. [*Tricholyga*] (1881),
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 182. 4. [*Platychira*] (1883)
et Wien. entom. Zeitg., XIII. 51. 25. [*Platychira*] (1894); B. B.,
Denkschr. Akad. Wien, LX. 223. [*Erigone*] (1893) et LXI. 623.
(1894); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 531. 2. (1898);
AUSTEN, Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 57. [*Erigone*] (1905).

papurum R.-D. = **caesia** FALL.

strigiceps ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6106. 111–12. [*Tachina*] (1859). Scandinavia.

tessellans R.-D. **caesia** FALL.

viridulans R.-D. = **caesia** FALL.

C. *Parerigone*

BRAUER, Sitzungsber. Akad. Wien, CVII. 540. (1898).

aurea BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 540. 16. (1898). Podolia.

D. *Panzeria*

R.-D., Myod., 68. 7. (1830); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 531. (1898).

conjuncta WALK. — **rudis** FALL.

falcigastris R.-D. — **rudis** FALL.

hyalinata R.-D. — **rudis** FALL.

laevigata MEIG. **rudis** FALL.

lateralis R.-D. **rudis** FALL.

microcera R.-D. **rudis** FALL.

nigra Macq. **rudis** FALL.

nigribarbis R.-D. **rudis** FALL.

rudis FALL.?), Vet. Acad. Handl., XXXI. 270. [*Tachina*] (1810) et Europa.
Dipt. Succ. Musc., 27. 56. [*Tachina*] (1820); ZETT., Dipt. Scand.,
III. 1100. 97. [*Tachina*] (1844); Macq., Annal. Soc. entom. France,

*) *Panolis griseovariegata* GOEZE.

(2). VI. 119. 14. t. V. f. 3. [*Nemorea*] (1848); WALK., Ins. Brit., II. 71. 120. [*Tachina*] (1853); R.-D., Posth., I. 145. 1. (1863); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 231. [*Nemorea*] (1891); PAND., Rev. entom., XV. 34. 5. [*Erigone*] (1896); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 532. 3. (1898); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 148. (1900); AUSTEN, Entom. Monthly Mag., (2). XIII. 59. (1902); WAINWR., Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 205. (1905).

conjuncta WALK., Ins. Brit., II. 59. 91. [*Tachina*] (1853); VERR., List Brit. Dipt., 2. ed. 25. [*Erigone*] (1901).

fulvigastris R.-D. ap. STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 138. [*Ernestia*] (1900).

hyalinata R.-D., Posth., I. 147. 2. (1863).

laevigata MEIG., S. B., VII. 222. 9. [*Nemorea*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 127. 24. t. VI. f. 8. [*Nemorea*] (1848); SCHN., F. A., I. 454. [*Nemorea*] (1862); R.-D., Posth., I. 166. 13. [*Fausta*] (1863); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 141. (1900).

lateralis R.-D., Myod., 69. 1. (1830).

microcera R.-D., Myod., 61. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 99. 1. [*Nemorea*] (1835).

nigra MACQ., Suit. à Buff., II. 99. 2. [*Nemorea*] (1835); MEIG., S. B., VII. 224. 31. [*Nemorea*] (1838); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 610. [*Nemorea*] (1840); R.-D., Posth., I. 147. 3. (1863).

nigribarbis R.-D., Posth., I. 148. 4. (1863).

strenua MEIG., S. B., IV. 249. 17. [*Tachina*] (1824) et VII. 221. 12. [*Nemorea*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III. 1101. 98. (1844) et XII. 4696. 98. [*Tachina*] (1885); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 126. 22. t. V. f. 9. [*Nemorea*] (1848); ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 78. 3. [*Platycheira*] (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 201. [*Platycheira*] (1865); SCHN., F. A., I. 450. [*Nemorea*] (1862); BONSD., Fennl. Insekt., II. 74. 62. [*Tachina*] (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 230. [*Nemorea*] (1891).

trivincta R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 23. 1. (1866). *vagans* MEIG., S. B., IV. 248. 16. [*Tachina*] (1824) et VII. 221. 13. [*Nemorea*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 127. 23. t. VI. f. 10. [*Nemorea*] (1848); R.-D., Posth., I. 156. 6. [*Erigone*] (1863).

varia MEIG., S. B., VII. 223. 26. [*Nemorea*] (1838); SCHN., F. A., I. 455. [*Nemorea*] (1862); BRAUER., Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 532. (1898).

strenua MEIG. = **rudis** FALL.

trivincta R.-D. = **rudis** FALL.

vagans MEIG. = **rudis** FALL.

varia MEIG. = **rudis** FALL.

Meriania

R.-D., Myod., 69. VIII. (1830).

Platychira B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 86. (1889).

albibarbis ROND. = **puparum** FABR.

argentifera MEIG.*), S. B., IV. 252. 22. [*Tachina*] (1824) et VII. 221. 15. [*Nemorea argentifer*] (1838); SCHN., F. A., I. 450. [*Nemorea*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. I. f. 3. [*Platychira*] (1889) et LVIII. 313. [*Platychira*] (1891). Europa centr. et mer.

latifrons ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 77. 2. [*Platychira*] (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 202. [*Platychira*] (1865).

bombylans WALK. = **puparum** FABR.

borealis R.-D. = **puparum** FABR.

fortis ROND. = **puparum** FABR.

latifrons ROND. = **argentifera** MEIG.

puparum FABR.*) Entom. syst., IV. 326. 58. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 299. 80. [*Musca*] (1805); CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 311. 980. [*Musca*] (1798); MEIG., S. B., IV. 251. 21. t. XLI. f. 22. Europa, Japonia.

[*Tachina*] (1824) et VII. 221. 6. t. LXX. f. 29. 30. [*Nemorea*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 305. 8. t. V. f. 3. [*Nemorea*] (1834), Suit. à Buff., II. 101. 11. t. XIV. f. 9. [*Nemorea*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 122. 18. t. V. f. 1. [*Nemorea*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., III. 1098. 95. [*Tachina*] (1844); WALK., Ins. Brit., II. 23. 9. [*Tachina*] (1853); ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 76. 1. [*Platychire*] (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 201. [*Platychira*] (1865); SCHN., F. A., I. 449. [*Nemorea*] (1862); R.-D., Posth., I. 168. 1. (1863); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 230. [*Nemorea*] (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 313. [*Platychira*] (1891); PAND., Rev. entom., XV. 31. 1. [*Erigone*] (1896).

albibarbis ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 203. [*Platychira*] (1865).

bombylans WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 756. [*Tachina*] (1849).

borealis R.-D., Myod., 70. 2. (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 305. 10. [*Nemorea*] (1834) et Suit. à Buff., II. 102. 13. [*Nemorea*] (1835); MEIG., S. B., VII. 227. 40. [*Nemorea*] (1838).

fortis ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 203. [*Platychira*] (1865).

robusta ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 202. [*Platychira*] (1865).

*) Mesogona oxalina Hb.

*) Panolis griseovariegata GÖTZE.

silvatica R.-D., Myod., 70. 1. (1830) et *Annal. Soc. entom. France*, (2), IV. 24. 1. (1846); MACQ., *Soc. Sci. Lille*, 1833. 305. 9. [*Nemorea*] (1834) et *Suit. à Buff.*, II. 102. 12. [*Nemorea*] (1835); MEIG., S. B., VII. 226. 39. [*Nemorea*] (1838). *trivincta* FALL., *Dipt. Suec. Musc.*, 26. 53. [*Tachina*] (1820). *valida* ROND., *Atti Soc. ital. Sci. Nat.*, VIII. 203. [*Platychira*] (1865).

robusta ROND. — **puparum** FABR.
silvatica R.-D. = **puparum** FABR.
trivincta FALL. — **puparum** FABR.
valida ROND. — **puparum** FABR.

Eversmannia

R.-D., *Posth.*, I. 181. 1. [*Eversmannia*] (1863) *em.* MARSCH. 1873.

Arge R.-D., *Posth.*, I. 182. II. (1863) *nov.* SCHRANK 1801.
 Hymenopt.

Micronychia B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVI. 131. (1889)
 et LX. 127. (1893).

maculipennis ZETT. = **ruficauda** ZETT.

punctum B. B. — **ruficauda** ZETT.

ruficauda R.-D. — **ruficauda** ZETT.

ruficauda ZETT.*), *Ins. Lapp.*, 643. 38. [*Tachina*] (1838) et *Dipt.*

Scand., III. 1110. 107. [*Tachina*] (1844); SCHN., F. A., I. 464.

[*Exorista*] (1862); BONSD., *Finnl. Insekt.*, II. 78. 70. [*Tachina*]

(1866); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII. 382. [*Micronychia*]

(1891); MEADE, *Entom. Monthly Mag.*, (2), III. 18. [*Exorista*] (1892).

? *maculipennis* ZETT., *Dipt. Scand.*, III. 1092. 89. [*Tachina*]
 (1844); BONSD., *Finnl. Insekt.*, II. 72. 58. [*Tachina*] (1866).

punctum WIED. ap. B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVI. t. IX.
 f. 227. [*Micronychia*] (1889) et LVIII. 382. [*Micronychia*]
 (1891).

ruficauda R.-D., *Posth.*, I. 182. 1. (1863).

terminalis R.-D., *Posth.*, I. 183. 1. [*Arge*] (1863).

terminalis R.-D. — **ruficauda** ZETT.

Europa,
 Asia min.

Lypha

R.-D., *Myod.*, 141. XVIII. (1830).

Aporomyia ROND., *Dipt. ital. Prodr.*, III. 90. *nota.* (1859).

Enthenis R.-D., *Posth.*, I. 199. IX. (1863).

berberidis MEIG. — **dubia** FALL.

cilligera R.-D. — **dubia** FALL.

*) *Larentia autumnalis* STRÖM., *Notodonta Phoebe* SIEBERT.

- dubia** FALL. ^{*)}, Vet. Acad. Handl., XXXI, 275. [*Tachina*] (1810) et Europa.
 Dipt. Suec. Musc., 29, 60. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV, 360, 210. [*Tachina*] (1824) et VII, 256, 22. [*Erorista*] (1838);
 R.-D., Myod., 141, 1. (1830) et Posth., I, 196, 1. (1863); MACQ.,
 Soc. Sci. Lille, 1833, 277, 5. [*Athricia*] (1834), Suit. à Buff.,
 II, 138, 23. [*Lydella*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2),
 VII, 376, 25, t. XI, f. 5. [*Erorista*] (1849); ZETT., Dipt. Scand.,
 III, 1111, 108. (1844) et XIII, 610, 5, 108. [*Tachina*] (1859);
 SCHIN., F. A., I, 460 et 463. [*Erorista*] (1862); BOSSD., Fennl.
 Insekt., II, 78, 71. [*Tachina*] (1866); B. B., Denkschr. Akad.
 Wien, LVI, t. 2, f. 43. [*Aporomyia*] (1889); MEADE, Entom.
 Monthly Mag., (2), II, 327. [*Erorista*] (1891); PASD., Rev. Entom.,
 XIV, 331, 2. [*Phorocera*] et 334, 1. [*Zenillia*] (1895); VILLEN.,
 Bull. Soc. entom. France, 1900, CLX, 21. [*Aporomyia*] (1900);
 WAINWR., Entom. Monthly Mag., (2), XII, 151. [*Aporomyia*] (1901).
berberidis MEIG., S. B., VII, 257, 23. [*Erorista*] (1838); MACQ.,
 Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 373, 19, t. X, f. 15.
 [*Erorista*] (1849); R.-D., Posth., I, 198, 5. (1863); STEIN,
 Entom. Nachricht., XXVI, 133. [*Erorista*] (1900); VILLEN.,
 Bull. Soc. entom. France, 1900, CLX, 22. [*Aporomyia*]
 (1900).
ciliger R.-D., Posth., I, 199, 1. [*Enthenis*] (1863).
grisea R.-D., Posth., I, 197, 2. (1863).
Macquartina R.-D., Posth., I, 198, 4. (1863).
nigripalpis R.-D., Posth., I, 197, 3. (1863).
punctum WIED. in litt. ap. MEIG.
silvatica R.-D., Myod., 142, 2. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II,
 139, 24. [*Lydella*] (1835).
umbrinervis ZETT., Dipt. Scand., III, 1146, 146. [*Tachina*]
 (1844); SCHIN., F. A., I, 526. [*Tryphera*] (1862); MEADE, Entom.
 Monthly Mag., (2), III, 261. [*Tryphera*] (1892).
grisea R.-D. — **dubia** FALL.
Macquartina R.-D. — **dubia** FALL.
nigripalpis R.-D. — **dubia** FALL.
silvatica R.-D. — **dubia** FALL.
tessellum MEIG., S. B., IV, 267, 48. [*Tachina*] (1824) et VII, 264. Europa centr.
 3. [*Tryphera*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III,
 178, 1, t. III, f. 1. [*Tryphera*] (1855); STEIN, Entom. Nachricht.,
 XXVI, 149. [*Erorista*] (1900).
umbrinervis ZETT. — **dubia** MEIG.

*) *Lina populi* L.; — an melius in *Dexinis* locanda ?

Lydina

R.-D., Myod., 124. XII. (1830).

Harrisia MEIG., S. B., VII. 260. 45. (1838) nec R.-D., 1830. Dipt.

Polidea MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 92. XII. (1848).

Somatolia ROND., Atti. Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 207. [*Somoleja*] (1865) emend. VERR. ap. SCUDD. 1882.

aenea MEIG., ♀ nec ♂, S. B., IV. 273. 60. [*Tachina*] (1824) et Europa.

VII. 260. 3. t. LXXII. f. 22. [*Harrisia*] (1838); ZETT., Ins. Lapp., 647. 55. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III. 1154. 153. (1844), VIII. 3246. 153. (1849), XIII. 6130. 153. [*Tachina*] (1859); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 93. 1. t. III. f. 6. [*Polidea*] (1848); SCHN., F. A., I. 526. [*Polidea*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 421. [*Somoleja*] (1891); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 130. (1900).

? *commissa* WALK., Ins. Brit., II. 69. 114. [*Tachina*] (1853).

crassitarsis ZETT., Ins. Lapp., 647. 56. [*Tachina*] (1830) et Dipt. Scand., III. 1155. 154. [*Tachina*] (1844); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 157. [*Polidea*] (1891).

cuprea R.-D., Myod., 125. 2. (1830) et Posth., I. 112. 2. (1863).

macromera R.-D., Myod., 125. 3. (1830) et Posth., I. 112. 3. (1863); PAND., Rev. entom., XV. 9. 9. [*Exorista*] (1896).

nitida R.-D., Myod., 124. 1. (1830) et Posth., I. 111. 1. (1863).

rebaptizata ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 92. 1. [*Harrisia*] (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 207. [*Somoleja*] (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. IV. f. 226. [*Somoleja*] (1889).

simplicitarsis ZETT., Ins. Lapp., 647. 57. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III. 1155. 155. (1844), VIII. 3247. (1849), XIII. 6131. 155. [*Tachina*] (1859).

commissa WALK. = **aenea** MEIG.

crassitarsis ZETT. = **aenea** MEIG.

cuprea R.-D. = **aenea** MEIG.

? **idiotica** MEIG., S. B., IV. 394. 269. [*Tachina*] (1824) et VII. 260. 2. Europa centr. [*Harrisia*] (1838).

macromera R.-D. = **aenea** MEIG.

nitida R.-D. = **aenea** MEIG.

rebaptizata ROND. = **aenea** MEIG.

simplicitarsis ZETT. = **aenea** MEIG.

Nemoraea

R.-D., Myod., 71. IX. (1830).

acutangularis MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 121. 17. Gallia. t. VI. f. 2. (1848).

affinis R.-D. = **pellucida** MEIG.

- bombylans* R.-D. **pellucida** MEIG.
conjuncta MACQ. **pellucida** MEIG.
diaphana B. B. = **pellucida** MEIG.
discreta R.-D. = **pellucida** MEIG.
fulva R.-D. 1830. = **pellucida** MEIG.
fulva R.-D. 1863. = **pellucida** MEIG.
glabrata MEIG.*), S. B., IV. 254. 25. [*Tachina*] (1824) et VII. 221. Europa centr.
 16. (1838); WFLP, Entom. Tijdschr., (2). IV. 140. (1869); MEADE,
 Entom. Monthly Mag., (2). II. 229. (1891) et (2). V. 104. (1894).
lateralis MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 121. 16. t. V. Gallia.
 f. 5. (1848).
neglecta MEIG. = **pellucida** MEIG.
nigroscutellata MACQ. = **rubrica** MEIG.
nupta ROND. = **rubrica** MEIG.
pellucida MEIG.**), S. B., IV. 254. 26. [*Tachina*] (1824) et VII. 221. 1. Europa.
 (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 306. 12. (1834) et Suit. à
 Buff., II. 103. 15. (1835); ZETT., Dipt. Scand., III. 1099. 96. (1844),
 VIII. 3242. 96. (1849) et XII. 4695. 96. [*Tachina*] (1855); R.-D.,
 Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 26. 1. (1846) et Posth., I.
 173. 1. (1863); SCHN., F. A., I. 449. (1862); PAND., Rev. entom.,
 XIV. 5. 4. [*Exorista*] (1895).
affinis R.-D., Myod., 72. 2. (1830).
bombylans R.-D., Myod., 72. 1. (1830).
conjuncta MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 120. 15.
 t. VI. f. 5. (1848); ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 72. 1. (1859)
 et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 199. (1865); B. B., Denkschr.
 Akad. Wien, LVI. 116. (1899) et LXI. 564. (1892); GIBSON.,
 Berlin. entom. Zeitschr., XXXVIII. 309. 1. (1893).
diaphana B. B., Denkschr. Akad., LVIII. 416. (1891).
discreta R.-D., Posth., I. 175. 2. (1863).
fulva R.-D., Myod., 72. 3. (1830).
fulva R.-D. (nec 1830), Posth., I. 175. 3. (1863).
neglecta MEIG., S. B., IV. 253. 24. [*Tachina*] (1824) et VII. 221.
 2. t. LXX. f. 24—28. (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 103.
 17. (1835).
strenua MACQ. (nec MEIG.), Soc. Sci. Lille, 1833. 306. 11. (1834)
 et Suit. Buff., II. 102. 14. (1835).
rubrica MEIG.***) S. B., IV. 255. 27. [*Tachina*] (1824) et VII. 222. Europa centr.
 25. (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 131. 30. et mer.
 (1848); WALK., Ind. Brit., II. 42. 53. [*Tachina*] (1853); SCHN.,
 F. A., I. 449. (1862); R. D., Posth., I. 176. 4. (1863); ? BORE,

*) *Panolis griseovariegata* GOEZE.

**) *Amphidasis betularia* L., *Euplexia lucipara* L., *Spilosoma lubricipeda* L., *Trachea atriplicis* L.

***) *Demas coryli* L., *Mamestra aliena* Hb. et *Leineri* FR., *Sphinx ligustri* L.

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 241. (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 178. t. VII. f. 143. (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 229. (1891); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 148. (1900).

nigroscutellata MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 117. 12. t. V. f. 11. (1848).

nipta ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 73. 2. (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 199. (1865).

sponsa ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 199. (1865).

rubricornis ZETT., Dipt. Scand., III. 1105. 102. [*Tachina*] (1844); Scandinavia.
BONSD., Finnl. Insekt., II. 76. 66. [*Tachina*] (1866).

sponsa ROND. = **rubrica** MEIG.

strenua MACQ. = **pellucida** MEIG.

vicina MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 477. 193. t. V. f. 9. (1849); Algeria.
R.-D., Posth., I. 177. 5. (1863).

vulneraticornis ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6100. 102-103. [*Tachina*] Scandinavia.
(1859).

Sturmia

R.-D., Myod., 171. I. (1830).

A. *Sturmia* s. str.

Blepharopoda ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 71. 40. [*Blepharipa*]
(1856) emend. (nec ROND., 1850. Dipt.)

Ctenoememis Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 460. (1872).

brunnicornis R.-D. = **scutellata** R.-D.

ciliata MACQ. = **scutellata** R.-D.

luteipalpis R.-D. = **scutellata** R.-D.

major MACQ. = **scutellata** R.-D.

obliqua R. D. = **scutellata** R.-D.

scutellata R.-D.*), Myod., 73. 4. [*Nemoraea*] (1830), Annal. Soc. Entom. France, (2). V. 260. 1. (1847) et Posth., I. 889. 2. (1863); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 458. 2. t. XIV. f. 1. [*Masicera*] (1859); ROND., Dipt. ital. Prodr., IV. 14. 1. [*Blepharipa*] (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 41. 1. [*Masicera*] (1861); SCHUS., F. A., I. 483. [*Masicera*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. III. f. 56. [*Blepharipoda*] (1889); PAND., Rev. entom., XV. 60. 17. [*Tachina*] (1896); GRISCH., Entom. Nachricht., XXV. 181. f. 1. (1899).

brunnicornis R.-D., Myod., 73. 6. [*Nemoraea*] (1830).

ciliata MACQ., Suif. à Buff., II. 113. 32. [*Scnometopia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 358. [*Scnometopia*] (1849).

*) *Acherontia atropos* L., *Vanessa antiopa* L.

- luteipalpis* R.-D., *Annal. Soc. entom. France*, (2), V, 262, 4, (1847).
major Macq., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VII, 471, 27, 1, XIV, f. 21. [*Masicera*] (1850); SCHIX., *F. A.*, I, 483. [*Masicera*] (1862); RONDI., *Atti Soc. ital. Sci. Nat.*, XI, 41. [*Masicera*] (1868); MEADE, *Entom. Monthly Mag.*, (2), III, 127. [*Masicera*] (1892).
obliqua R.-D., *Mvool.*, 73, 5. [*Nemoraea*] (1830).

B. *Crossocosmia*

Mik, *Wien. entom. Zeitg.*, IX, 313. (1890).

Ugomyia ROND., *Bull. Soc. entom. ital.*, II, 137. [*nomen nudum*] (1870).

Castellani GUER. = **sericariae** CORN.

Ondji GUER. = **sericariae** CORN.

sericariae CORNALIA*). *Bull. Soc. entom. ital.*, II, 217, t. III. [*Ugomyia*] Japonia, (1870) et *Trans. entom. Soc. London, Proc.*, XI et XXII. [*Ugomyia*] Asia mer. (1870); GIRARD, *Bull. Soc. entom. France*, (4), IV, CLV. [-] (1863); GERST., *Bericht.*, 1863, 64. [-] (1863); ADAMS, *Revue univ. serie.*, Lyon, n. 36. [-] (1870); ROND., *Bull. Soc. entom. ital.*, II, 137. [*Ugomyia*] (1870) s. *descr.* et *Bull. Comizio agr. Parma*, n. 4. [*Ugomyia*] (1870) s. *descr.*; GIRARD, *Bull. Soc. Imp. Acclimat.*, Juin [-] (1870); BRÄUER, *Denkschr. Akad. Wien*, XLVII, 77. [*Ugomyia*] (1884). *Wien. entom. Zeitg.*, IX, 313, t. III, f. 7-8, (1890) et XI, 116, 2, (1892); SASAKI, *Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo*, I, f. 1, f. 1, 1, A. [*Ugomyia*] (1886); BIGOT, *Bull. Soc. entom. France*, 1888, XXXIX, [*Leskia*] (1888) et 1891, CXC, [*Leskia*] (1891); MEINERT, *Entom. Medd.*, II, 162, t. II. [*Ugomyia*] (1890) et *Annal. Mag. N. H.*, 1890, 104, (1890); WELP, *Tijdschr. Entom.*, 1893, XXVI, LXI et 161, (1893); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LXI, 549, (1894); BOLLE, *Der Seidensp. i. Japan*, Budapest, 59, (1898).

Castellani GUER., ap. CASTELL., *Dell'allev. d. bachi d. seta i. Cina*, Firenze, 139. [*Tachina*] (1860) et ed. gall. Paris, 116. [*Tachina*] (1860) s. *descr.*

Ondji GUER., *Comptes rend. Ac. Paris*, LXX, 844. [*Tachina*] (1870).

C. *Argyrophylax*

B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LXI, 163, (1889) et LX, 101, (1893); GUSCUX., *Entom. Nachricht.*, XXV, 180, (1899).

Belida R.-D., *Posth.*, II, 45, V, (1863).

*) *Antheraea Yamamai* Guy. et *Mylitta Moorei*, *Sericaria mori* L.

Lamberlia R.-D., Posth., II, 30, II. (1863).

Schaumia R.-D., Posth., II, 43, IV. (1863).

Zygodobothria Mik, Wien. entom. Zeitg., X, 193, 96. (1891).

atropicida PERR. = *atropivora* R.-D.

atropivora R.-D.*). Myod., 171, 1. (1830). *Annal. Soc. entom. France*, (2), V, 261, 2. (1847) et *Posth.*, I, 890, 3. (1863); *Macq.*, *Soc. Sci. Lille*, 1833, 296, 1, 1, V, f. 2. [*Senomctopia*] (1834). *Suit. à Buff.*, II, 105, 1. [*Senomctopia*] (1835) et *Annal. Soc. entom. France*, (2), VIII, 477, 38, 1, XV, f. 9. [*Masicera*] (1850); *Blanch.*, *Hist. nat. Ins.*, III, 610. [*Xenorata*] (1840); *Rond.*, *Atti Soc. ital. Sci. Nat.*, IV, 42, 2. [*Masicera*] (1861) et *Dipt. ital. Prodr.*, IV, 15, 2. [*Blepharipa*] (1861); *Mik*, *Wien. entom. Zeitg.*, X, 193, 96. [*Zygodobothria*] (1891); *B. B.*, *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, 344. (1891); *MEADE*, *Entom. Monthly Mag.*, (2), III, 128. [*Masicera*] (1892); *GUSCH.*, *Entom. Nachricht.*, XXV, 182, f. 2. (1899); *STROBL*, *Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Herceg.*, XIV, 487. [*Masicera*] (1902) et *Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg.*, IX, 547. [*Masicera*] (1904).

atropicida PERR., *Annal. Soc. lim. Lyon*, 1850, 52, 58. [*Masicera*] (1852).

? *bella* MEIG., *S. B.*, IV, 317, 135. [*Tachina*] (1824) et VII, 194, 33. [*Tachina*] (1838); *Macq.*, *Annal. Soc. entom. France*, (3), II, 400, 2, 1, XIV, f. 2. [*Oodigaster*] (1854); *Scm.*, *F. A.*, I, 478. [*Tachina*] (1862); *GUSCH.*, *Entom. Nachricht.*, XXV, 183. (1899); *STEIN.*, *Entom. Nachricht.*, XXVI, 132. (1900).

mitlogrammica *ROND.* in litt. ap. *ROND.* [*Masicera*] (1861).

? *morosa* MEIG., *S. B.*, IV, 314, 129. [*Tachina*] (1824) et VII, 190, 12. [*Tachina*] (1838); *F. Rossi*, *Verzeichniss*, 47, 7. [*Tachina*] (1848); *WALK.*, *Ins. Brit.*, II, 44, 57. [*Tachina*] (1853); *Macq.*, *Annal. Soc. entom. France*, (3), II, 400, 3, 1, XIV, f. 4. [*Oodigaster*] (1854); *Scm.*, *F. A.*, I, 477. [*Tachina*] (1862); *MEADE*, *Entom. Monthly Mag.*, (2), III, 38. [*Tachina*] (1892); ? *MEXIER*, *Bull. Soc. entom. France*, 1893, CCLXXIV. [*Ceromasia*] (1893).

uora *DUF.* ap. *BRÄUER*, *Sitzgsber. Akad. Wien*, CVI, 33, 20. (1897).

bella MEIG. ? *atropivora* R.-D.

bimaculata *HARTIG.**)*, *Jahresber. Fortschr. Forstwiss.*, I, 286, 13. *Europa*. [*Tachina*] (1838); *R.-D.*, *Posth.*, II, 44, 1. [*Schaumia*] (1863); *WACHTL.*, *Wien. entom. Zeitg.*, I, 278, 32. [*Masicera*] (1882); *B. B.*, *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, 344. (1891); *Mik* et *WACHTL.*

*). *Acherontia Atropos* L., *Lymantria dispar* L., *Notodonta trepida* Esp., *Vanessa io* L.

**). *Lymantria monacha* L.; *Lophyrus pallidus* *Klug.*, *pini* L., *rufus* *Latre.*, *socius* *Klug.*, *variegatus* *Hart.* et *virens* *Klug.*

- Wien, entom. Zeiſg., XIV, 224, 9 et 227, [*Zyggobothria*] (1895);
 GURSCH., Entom. Nachricht., XXV, 179, 14 et 183, f. 4, (1899).
cursitans RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV, 46, 7, [*Masicera*]
 (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV, 21, 4, [*Masicera*] (1861);
 STEIN., Entom. Nachricht., XIV, 215, 54, [*Masicera*] (1888);
 STROBL., Wien, entom. Zeiſg., XII, 90, (1893); PAND., Rev.
 entom., XV, 59, 15, [*Tachina*] (1896).
flavoscutellata ZETT., Dipt. Scand., III, 1042, 33, [*Tachina*]
 (1844); SCHIX., F. A., I, 482, [*Masicera*] (1862); B. B., Denkschr.
 Akad. Wien, LX, 221, (1893); STROBL., Mittheil. Ver.
 Steierm., XXX, 124, (1894).
inconspicua MEIG., p. p., S. B., VI, 369, 318, [*Tachina*] (1830)
 et VII, 191, 52, [*Tachina*] (1838); SCHIX., F. A., I, 479,
 [*Tachina*] (1862); STEIN., Entom. Nachricht., XXVI, 140,
 (1900).
concolor R.-D. - *vanessae* R.-D.
cursitans RONDI. - *bimaculata* HART.
discrepanda PAND. - *vanessae* R.-D.
doris SCHIX. - *vanessae* R.-D.
flavipalpis R.-D., Posth., II, 45, 1, [*Belida*] (1863), Gallia.
flavoscutellata ZETT. - *bimaculata* HART.
floricola R.-D. - *vanessae* R.-D.
galii B. B.*, Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 344, (1891); GURSCH., Europa-centr.
 Entom. Nachricht., XXV, 183, f. 5, (1899).
fatua SCHIX., p. p., F. A., I, 484, [*Masicera*] (1862).
gilva HARTIG**), Jahresber. Fortschr. Forstwiss., I, 288, 14, [*Tachina*] Europa-centr.
 (1838); R.-D., Posth., I, 891, 4, (1863); B. B., Denkschr. Akad.
 Wien, LVIII, 344, (1891); MEIG. et WACHTL., Wien, entom. Zeiſg.,
 XIV, 228, 10, [*Zyggobothria*] (1895).
imberbis WIED., Ausser. zweifl. Ins., II, 317, 66, [*Tachina*] (1830); Aegyptus,
 B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 344, (1891).
incedens PAND. - *pelmatoprocta* B. B.
incedens RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV, 47, 8, [*Masicera*] Italia,
 (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV, 22, 5, [*Masicera*] (1861).
inconspicua MEIG. - *bimaculata* HART.
minor RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 218, [*Masicera*] (1865), Italia.
morosa MEIG. - ? *atropivora* R.-D.
nigripalpis MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III, 478, 194, t. V, f. 10, Algeria,
 [*Erorista*] (1849); R.-D., Posth., I, 892, 6, (1863).
nora DUF. - *atropivora* R.-D.
pallidipalpis R.-D., Myod., 123, 3, [*Blondelia*] (1830) et Posth., II, Gallia,
 31, 1, [*Lambertia*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 279, 3,
 [*Phorocera*] (1834) et Suit. à Buff., II, 131, 31, [*Metopia*] (1835).

*) *Deilephila Galii* ROSE.**) *Lymantria dispar* L., *Stauropus fagi* L.; - *Lophyrus lari-*
cis JER., *pallidus* KUG., *pini* L., *rufus* LATH. et *variegatus* HART.

- pelmatoprocta** B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 344. (1891). Europacentr.
incleus PAND. (nec ROXD.), Rev. entom., XV, 58, 14. [*Tachina*]
 (1896); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 402, 12.
 (1900).
- pupiphaga* ROXD. — **vanessae** R.-D.
- quadrinaculata** GÜRSCH., Entom. Nachricht., XXV, 182, f. 3. (1899). Germania.
vanessae R.-D.)*, Myod., 172, (2). (1830), Annal. Soc. entom. France, Europacentr.
 (2), V, 262, 3. (1847), (2), VIII, 158. (1850) et Posth., I, 888, 1. et mer.
 (1863).
- concolor* R.-D., Myod., 172, 4. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille,
 1833, 297, 3. [*Scenometopia*] (1834).
- discrepanda* PAND., Rev. entom., XV, 61, 18. [*Tachina*] (1896);
 VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 402, 13. (1900).
- doris* SCHIN. (nec MEIG.), F. A., I, 476. [*Tachina*] (1862).
- floricola* R.-D., Myod., 172, 3. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille,
 1833, 297, 9. [*Scenometopia*] (1834).
- pupiphaga* ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV, 45, 3. [*Masicera*]
 (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV, 15, 3. [*Blepharipa*] (1861);
 PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVII, 10. [*Masicera*] (1882);
 MIK., Wien. entom. Zeitg., I, 156, nota. [*Blepharipa*] (1882);
 B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 344. (1891); STROBL,
 Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercegov., X, 446. [*Masicera*] (1898);
 GÜRSCH., Entom. Nachricht., XXV, 183. (1899).

D. *Xylotachina*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 342. (1891) et LX, 121. (1893).

ligniperdae B. B.**), Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 343. (1891). Germania.

Winthemia

R.-D., Myod., 173, II. (1830).

Dorbinea R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 272, III. (1847).

A. *Catagonia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 348. (1891) et LX, 122. (1893).

aberrans ROXD., Dipt. ital. Prodr., III, 147, 38. [*Errorista*] (1859); Europacentr.

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 324. [*Pareerrorista*] (1891); et mer.

GÜRSCH., Entom. Nachricht., XXV, 178. (1899); HESDEL, Verh.
 zool.-bot. Ges. Wien, LI, 208, 2. (1901).

*) *Araschnia b. prorsa* L., *Argynnis* sp., *Gastropacha quercifolia* L., *Pyrameis atalanta* L. et *cardui* L., *Trichiura crataegi* L., *Vanessa antiopa* L., *io* L., *urticae* L. et v. *Ichmusa* Box.

**) *Cossus cossus* L.

nemestrina Egg. (*nov* Meig.) ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXIII, 348. (1891); BRACER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 482. (1893).

nemestrina Egg. = **aberrans** Rond.

B. *Chaetolygga*

ROND., Dipt. ital. Prodr., I, 66, 22. [*Chaetolygga*] (1856) et III, 103, 22. [*Chaetolygga*] (1859) em. VERR. ap. Scudd. (1882); GIESCH., Entom. Nachricht., XXV, 185. (1899).

amoena Meig., S. B., IV, 264, 43. [*Tachina*] (1824) et VII, 221, 14. Europa centr. [*Nemorca*] (1838); Macq., Suit. à Buff., II, 100, 4. [*Nemorca*] et mer. (1835); SCHIX., F. A., I, 453. [*Nemorca*] (1862); R.-D., Posth., I, 212, 7. (1863); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 263. (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 184. (1893).

erecta WALK., Ins. Brit., II, 41, 50. [*Tachina*] (1853); VERR., List Brit. Dipt., 2 ed., 24. (1901).

glabrata SCHIX. (*nov* Meig.), F. A., I, 448. [*Nemorca*] (1862).

nigroscutellata SCHIX. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 223. (1893).

pilifera Rond., Dipt. ital. Prodr., III, 110, 6. (1859).

erecta WALK. = **amoena** Meig.

glabrata SCHIX. = **amoena** Meig.

nigroscutellata SCHIX. = **amoena** Meig.

pilifera Rond. = **amoena** Meig.

C. *Winthemia* s. str.

GIESCH., Entom. Nachricht., XXV, 185. (1899).

aestivans FALL. = **quadripustulata** FABR.

analis Macq. = **quadripustulata** FABR.

apicalis Meig.*, S. B., IV, 333, 163. [*Tachina*] (1824) et VII, 256. Europa centr. 42. [*Ecorista*] (1838); SCHIX., F. A., I, 465. [*Ecorista*] (1862); BRISCHKE, Schrift. Naturf. Ges. Danzig, N. F., VI, 6. [*Ecorista*] (1884); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 18. [*Ecorista*] (1892); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 221. [*Chaetolygga*] (1893); PAND., Rev. entom., XIV, 329, 14. [*Macquartia*] (1895).

flavicauda WINTH. ap. B. B. 1893.

auriculata R.-D. = **quadripustulata** FABR.

calocalae R.-D. = **quadripustulata** FABR.

eccepiacae RH. = **quadripustulata** FABR.

ciliata TYL.-TOWNS. = **quadripustulata** FABR.

cilicrura Rond., Dipt. ital. Prodr., III, 107, 3. [*Chaetolygga*] (1859); Europa centr. MEK et WACHL., Wien. entom. Zeitg., XIV, 217, 1. (1895); E. et mer.

CORTI, Bull. Soc. entom. ital., XXIX, 1, 41. [*Chaetolygga*] (1898).

*) *Dianthoccia capsicola* Hb., *Malacosoma neustria* L., *Ortholitha cervinata* SCHIFF., *Saturnia pavonia* L.

- quadripustulata* HART. (nec FABR.), Jahrbesber. Fortschd. Forstwiss., I. 281. 4. [*Tachina*] (1838).
- cilitibia** Rond., Dipt. ital. Prodr., III. 109. 5. [*Chetolyga*] (1859). Italia.
- cinctea* R.-D. = **quadripustulata** FABR.
- crassicornis* R.-D. = **quadripustulata** FABR.
- eruentata** Rond.¹⁾, Dipt. ital. Prodr., III. 106. 1. [*Chetolyga*] (1859); Europa centr. et mer.
SPEISER, III. Zeitschr. f. Entom., V. 277. 18. [*Chaetolyga*] (1900).
- datanae* TYL.-TOWNS. = **quadripustulata** FABR.
- deilephilae* OST.-SACK. = **quadripustulata** FABR.
- dimidiata* R.-D. = **quadripustulata** FABR.
- dispecta* WALK. = **quadripustulata** FABR.
- erythrura** MEIG., S. B., VII. 223. 22. [*Nemoraea*] (1838); SCHN., F. A., Europa centr. et mer.
I. 454. [*Nemoraea*] (1862).
- flavescens* R.-D. = **quadripustulata** FABR.
- floricola* MEIG. = **quadripustulata** FABR.
- illinoensis* ROBERTS. = **quadripustulata** FABR.
- infesta* WILK. = **quadripustulata** FABR.
- leucaniae* KIRKP. = **quadripustulata** FABR.
- ludibunda* R.-D. = **quadripustulata** FABR.
- meditata** MEIG.²⁾, S. B., IV. 331. 158. [*Tachina*] (1824) et VII. 255. Europa centr.
10. [*Ecorista*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 298. 6. [*Scenometopia*] (1834), Suét. à Buff., II. 107. 8. [*Scenometopia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 369. II. t. X. f. II. [*Ecorista*] (1849); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 266. 5. (1847) et Posth., I. 216. 6. (1863).
nobilis R.-D., Myod., 175. 5. (1830) et Posth., I. 212. 6. (1863).
- militaris* WALSH = **quadripustulata** FABR.
- nigripalpis* R.-D. = **quadripustulata** FABR.
- nigrithorax** Egg.³⁾, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 210. [*Nemoraea*] Europa centr. (1861); SCHN., F. A., I. 453. [*Nemoraea*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 264. [*Chaetolyga*] (1891); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 25. (1894).
- nitida* R.-D. (DÖRR.) = **quadripustulata** FABR.
- nitida* R.-D. (WINTH.) = **quadripustulata** FABR.
- nobilis* R.-D. = **meditata** MEIG.
- obscurata* R.-D. = **quadripustulata** FABR.
- Osten-Sackenii* KIRKP. = **quadripustulata** FABR.
- platysaniae* TYL.-TOWNS. = **quadripustulata** FABR.
- quadripustulata** FABR.⁴⁾, Entom. syst., IV. 324. 50. [*Musca A-* Europa.

1) *Dasychira pudibunda* L., *Saturnia pyri* SCHIFF.

2) *Catocala nupta* L.

3) *Saturnia pavonia* L.

4) *Argynnis Aglaja* L., *Catocala nupta* L., *Cucullia artemisiae* HUFN., *Asteris* SCHIFF., *prenanthis* B., *serophilulariae* CAR., *umbratica* L. et *verbasci* L., *Dicrambra vinula* L., *Heliethis armigera* HB., *Mamestra pisi* L., *Plusia* sp., *Saturnia pavonia* L. et *spini* SCHIFF., *Sphinx ligustri* L., *Thais polyxena* SCHIFF., *Urapteryx sambucaria* L.

postulata] (1894) et Syst. Antl., 309. 4. [*Tachina*] (1805); MEG., S. B., IV, 255. 28. [*Tachina*] (1824) et VII, 221. 24. [*Nemorac*] (1838); R.-D., Myod., 175. 7. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2), V, 268. 7. (1847) et Posth., I, 210. 5. (1863); BOUQUÉ, Naturgesch., 60. 43. [*Tachina*] (1834); MACQ., Suit. à Buff., II, 103. 16. [*Nemorac*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 114. 6. [*Nemorac*] (1848); ZETT., Ins. Lapp., 643. 40. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III, 1103. 101. (1844), VIII, 3243. 101. (1849) et XIII, 6099. 101. [*Tachina*] (1859); ROSS., Dipt. ital. Prodr., III, 108. 4. [*Chaetolyga*] (1859); SCHN., F. A., 454. [*Nemorac*] (1862); ROSS., Fiml. Insekt., II, 75. 65. [*Tachina*] (1866); F. LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI, 984. [*Nemorac*] (1866); RILEY, Third Rep. U. S. Entom. Comm., 126. t. I. f. 7. [*Tachina*] (1883); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 264. [*Chaetolyga*] (1891); PAND., Rev. entom., XV, 15. 18. [*Erorista*] (1896); COQUILL., Rev. Tachin. N. A., 125. (1897); JOHNS, ap. SMITH, Ins. N. Jers., 673. f. 318. (1899); WAINW., Entom. Monthly Mag., (2), XII, 283. [*Chaetolyga*] (1901); HOWARD, Insect. Book, 158. f. 87 et t. XXII, f. 4. (1902); STEDM., 34. Rep. Board Agric. Miss., 105. fig. (1902); ALDRICH, Cat. N. A. Dipt., 274. (1905); QUAIN, et BRUES, 50. Bull. U. S. Agric., 124. f. 26. (1905).

aestivans FALL., Vet. Acad. Handl., XXXI, 279. [*Tachina*] (1810) et Dipt. Succ. Musc., 30. 61. [*Tachina*] (1820).

analis MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 124. 20. t. V, f. 12. [*Nemorac*] (1848); SCHN., F. A., I, 451. [*Nemorac*] (1862); R.-D., Posth., I, 212. (1863); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 263. [*Chaetolyga*] (1891).

auriculata R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 269. 9. (1847) et Posth., I, 209. 3. (1863).

catocalae R.-D., Myod., 174. 4. (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2), V, 265. 3. (1847); MACQ., Suit. à Buff., II, 107. 7. [*Scenometopia*] (1835).

cecropiae RUL., Amer. Entom., II, 97. [*Erorista*] (1870).

ciliata TYL.-TOWNS., Trans. am. entom. Soc., XVIII, 363. [*Erorista*] (1891).

cinerea R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 270. 10. (1847).

crassicornis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 266. 4. (1847).

datanca TYL.-TOWNS., Trans. am. entom. Soc., XIX, 288. [*Erorista*] (1892).

deilephilar OST.-SACK., Can. Entom., XIX, 164. [*Tachina*] (1887).

dimidiata R.-D., Posth., I, 215. 11. (1863).

dispecta WALK., Ins. Brit., II, 60. 91. [*Tachina*] (1853); VERR., List Brit. Dipt., 2. ed. [*Chaetolyga*] (1901).

flavescens R.-D., Myod., 174. 3. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2), V, 265. 2. (1847) et Posth., I, 207. 1. (1863).

- floricola* MEG., S. B., VII, 222, 10. [*Nemorca*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 130, 29, t. VI, f. 9. [*Nemoraca*] (1848); SCHN., F. A., I, 455. [*Nemoraca*] (1862); R.-D., Posth., I, 300, 1. [*Epicampocera*] (1863); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 137. (1900).
- illinoensis* ROBERTS., Can. Entom., XXXIII, 286. (1901); HENSEL, Wien. entom. Zeitg., XX, 233. (1901).
- infesta* WILL., Fourt. Rep. St. Entom., III, 65. [*Exorista*] (1884).
- leucaniæ* KIRKPATR., Ohio Agric. Rep., f. 1860, 757. [*Exorista*] (1861).
- ludibunda* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 272, 1. [*Dorbiniæ*] (1847) et Posth., I, 217, 1. [*Dorbiniæ*] (1863).
- militaris* WALSH, Trans. Ill. St. Agr. Soc., IV, 367. [*Senometopia*] (1861).
- nigripalpis* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 269, 8. (1847) et Posth., I, 213, 8. (1863).
- nilida* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 273, 2. [*Dorbiniæ*] (1847) et Posth., I, 218, 2. [*Dorbiniæ*] (1863).
- nilida* R.-D., Posth., I, 214, 10. (1863).
- obscurata* R.-D., Posth., I, 214, 9. (1863).
- Osten-Sackenii* KIRKPATR., Ohio Agr. Rep., f., 1860, 757. [*Exorista*] (1861).
- platysoniæ* TYL.-TOWNS., Trans. am. entom. Soc., XIX, 288. [*Exorista*] (1892).
- rufonotata* BIG., Annal. Soc. entom. France, (6), VIII, 257. [*Chaetolygga*] (1888).
- rufopicta* BIG., Annal. Soc. entom. France, (6), VIII, 257. [*Chaetolygga*] (1888).
- sanguinolenta* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 358 et 367, 8, t. X, f. 8. [*Exorista*] (1849).
- sponsa* R.-D., Posth., I, 209, 4. (1863).
- testacea* R.-D., Posth., I, 216, 13. (1863).
- variëgata* MEG., S. B., IV, 256, 29. [*Tachina*] (1824) et VII, 221, 23. [*Nemorca*] (1838); R.-D., Myod., 174, 2. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2), V, 264, 1. (1847) et Posth., I, 208, 2. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 297, 5. [*Senometopia*] (1834), Suit. à Buff., II, 166, 4. [*Senometopia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 114, 7. [*Nemoraca*] (1848); SCHN., F. A., I, 455. [*Nemoraca*] (1862); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 150. [*Chaetolygga*] (1900).
- viam* R.-D., Myod., 175, 6. (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2), V, 267, 6. (1847).
- vinulæ* R.-D., Myod., 176, 8. (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2), V, 271, 11. (1847); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 358. [*Nemoraca*] (1849).
- quadripustulata* HART. **cilicrura** ROED.
- rufonotata* BIG. = **quadripustulata** FABR.

- rafopicta* BIG. = **quadripustulata** FABR.
sanguinolenta MACQ. = **quadripustulata** FABR.
separata ROXD., Dipt. ital. Prodr., III, 110, 7. [*Chaetolygga*] (1859); EUROPA-centr. et mer.
 PAND., Rev. entom., XV, 16, 19. [*Ecorista*] (1896).
speciosa EGG.†), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI, 209. [*Nemoraea*] EUROPA-centr. et mer.
 (1861); SCHN., F. A., I, 453. [*Nemoraea*] (1862); JAROSCH., Trud. Naturf. Ges. Karkoff, 146, 24. [*Nemoraea*] (1879); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 1, III, t. 59. [*Chaetolygga*] (1889).
sponsa R.-D. = **quadripustulata** FABR.
testacea R.-D. = **quadripustulata** FABR.
variegata MEIG. = **quadripustulata** FABR.
venusta MEIG., S. B., IV, 327, 152. [*Tachina*] (1824) et VII, 221, 17. EUROPA-centr. et mer.
 [*Nemoraea*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 125, 21. [*Nemoraea*] (1848); SCHN., F. A., I, 455. [*Nemoraea*] (1862); R.-D., Posth., I, 215, 12. (1863); ? PAND., Rev. entom., XV, 15, 17. [*Ecorista*] (1896); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 150, (1900).
viaram R.-D. = **quadripustulata** FABR.
vinulae R.-D. = **quadripustulata** FABR.
xanthogastra ROXD.**, Dipt. ital. Prodr., III, 107, 2. [*Chaetolygga*] EUROPA-centr. et mer.
xanthogastra] (1859); SCHN., F. A., I, 452. [*Nemoraea*] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 25. [*Chaetolygga*] (1894).

Carcelia

- R.-D., Myod., 176, III, (1830) et Posth., I, 219, III, (1863).
Bremia R.-D., Posth., I, 243, IV, (1863) *aeq.* ROXD., 1860, Dipt.
Sisyropa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 163, (1889) et LVIII, 344, (1891); GUSCHL., Entom. Nachricht., XXV, 185, (1899).
Stenomacropia MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 296. [*Stenomacropia*] (1834) emend. Seudd., 1882.
amplion R.-D. = **excisa** FALL.
angusta B. B.***), Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 345. [*Sisyropa*] EUROPA-centr.
 (1891); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 22. [*Ecorista*] (1894).
apicalis R.-D. = **excisa** FALL.
arguta R.-D. = **excisa** FALL.
arion R.-D. = **excisa** FALL.
aurifrons R.-D. = **excisa** FALL.
Bercci R.-D. = **excisa** FALL.

*) Lymantria dispar L.

***) Aconicta tridens SCHEFF., Brachyonycha sphinx HUFN., Caticocala sponsa L., Smerinthus ocellata L. et populi L., Sphinx ligustri L.

****) Dasychira pudibunda L., Orgyia gonostigma FABR.

bombycivora R.-D. = **excisa** FALL.

bombylans R.-D. = **gnava** MEIG.

callimorphae R.-D. = **excisa** FALL.

cauora R.-D. = **excisa** FALL.

caulans R.-D. = **excisa** FALL.

canta MACQ. = **excisa** FALL.

cheloniae ROND.*), Dipt. ital. Prodr., III, 138, 23. [*Erorista*] (1859); Europa centr. et mer.

SCHIX., F. A., I, 463. [*Erorista*] (1862); WACHTL., Wien. entom.

Zeitg., I, 278, 38. [*Erorista*] (1882); MEADE, Entom. Monthly

Mag., (2), II, 329. [*Erorista*] (1891); B. B., Denkschr. Akad.

Wien, LVIII, 320. [*Parerorista*] (1891); STROBL., Wien. entom.

Zeitg., XII, 89. [*Erorista*] (1893); COQUILL., Rev. Tachin. N. A.,

92. [*Erorista*] (1897).

? *lateralis* BIG., Annal. Soc. entom. France, (3), VIII, 782.

[*Erorista*] (1860); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI, 38.

[*Erorista*] (1868); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI, 340.

29. [*Parerorista*] (1897).

lucorum MEIG. p. p., S. B., IV, 328, 154. [*Tachina*] (1824) et

VII, 256, 17. [*Erorista*] (1838); B. B., Denkschr. Akad. Wien,

LVIII, 322. (1891) et LX, 222. [*Parerorista*] (1893); STEIN,

Entom. Nachricht., XXVI, 142. (1900); VILLEX., Bull. Soc.

entom. France, 1900, 158, 8. (1900).

rigilans ROND. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 442.

[*Parerorista*] (1891).

clarripennis R.-D. = **excisa** FALL.

excavata ZETT. = **excisa** FALL.

excisa FALL.**), Dipt. Suec. Musc., 32, 67. [*Tachina*] (1820); MEIG., Europa.

S. B., IV, 395, 272. [*Tachina*] (1824) et VII, 256, 43. [*Erorista*]

(1838); ZETT., Dipt. Scand., III, 1130, 127. (1844) et XIII, 6116,

127. [*Tachina*] (1859); SCHIX., F. A., I, 462. [*Erorista*] (1862);

BOESD., Fiml. Insekt., II, 82, 80. [*Tachina*] (1866); WFLP., Entom.

Tijdschr., (2), IV, 152. [*Erorista*] (1869); B. B., Denkschr. Akad.

Wien, LVIII, 345. [*Sisyropa*] (1891); STROBL., Mittheil. Ver.

*) *Ammoconia caecimaacula* FABR., *Aretia caja* L., *Hebe* L., *villica* L., *Hadena secalis* L., *Macrothylacia rubi* L., *Orthosia pista-cina* FABR., *Phragmatobia fuliginosa* L., *Rhyparia purpurata* L., *Spilosoma lubricipeda* L., *Stilpnotia salicis* L. — *Cimex femorata* L., *Pamphilius stellatus* CURST.

**) *Aprostola tripartita* HUFN., *triplasia* L., *Aretia caja* L., *Hebe* L., *villica* L., *Bupalus piniarius* L., *Callimorpha dominula* L., *Cucullia serophulariae* CAP., *Dasychira pudibunda* L., *Endromis versicolora* L., *Hyloicus pinastri* L., *Lymantria dispar* L., *monacha* L., *Malacosoma castrens* L., *neustria* L., *Orgyia antiqua* L., *Phragmatobia fuliginosa* L., *Pterostoma palpina* L., *Pygaera eurtula* L., *Saturnia pyri* SCHIFF., *Sphinx lignistri* L., *Stilpnotia salicis* L., *Thalpochares pannonica* FRK., *Thaumetopoea processionea* L.

Steierm., XXX. 22. [*Erorista*] (1894) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 600. [*Erorista*] (1900); PAND., Rev. entom., XV. 18. 22. [*Erorista*] (1896); WULF et MELL., N. Nauml. list. ned. Dipt., 81. [*Erorista*] (1898).

amphion R.-D., Posth., I. 237. 27. (1863).

apicalis R.-D., Revue Mag. Zool., III. 2. 2. (1851) et Posth., I. 221. 2. (1863).

arguta R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 279. 6. (1847) et Posth., I. 233. 20. (1863).

arion R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 275. 1. (1847), (2). VIII. 163. (1850) et Posth., I. 236. 25. (1863).

aurifrons R.-D., Myod., 182. 19. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 274. 4. [*Dorbini*] et 281. 11. (1847), Posth., I. 224. 6. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 300. 15. [*Stenomictopia*] (1834) et Suit. à Buff., II. 109. 16. [*Stenomictopia*] (1835).

Bereci R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 164. (1850) et Posth., I. 235. 24. (1863).

bombycivora R.-D., Myod., 181. 15. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). V. 280. 8. (1847), Bull. Soc. Yonne, VII. 531. (1853) et Posth., I. 228. 13. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 109. 15. [*Stenomictopia*] (1835).

callimorphae R.-D., Posth., I. 230. 16. (1863).

canora R.-D., Posth., I. 235. 23. (1863).

cantans R.-D., Posth., I. 223. 4. (1863).

canta Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 358 et 378. 28. [*Erorista*] (1849).

claripennis R.-D., Posth., I. 222. 3. (1863).

crevarata ZETT., Dipt. Scand., III. 1131. 128. [*Tachina*] (1844); SCHUM., F. A., I. 462. [*Erorista*] (1862); BOSSD., Fiml. Insekt., II. 83. 81. [*Tachina*] (1866); MÜK., Entom. Nachricht., XII. 203. [*Erorista*] (1886).

?*fulva* FALL., Dipt. Succ. Musc., 32. 66. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV., 399. 180. [*Tachina*] (1824) et VII. 256. 45. [*Erorista*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III. 1162. 163. [*Tachina*] (1844); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 390. 51. [*Erorista*] (1849); BOSSD., Fiml. Insekt., II. 89. 95. [*Tachina*] (1866); STEIN., Entom. Nachricht., XXVI. 137. (1900).

gentilis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 273. 3. [*Dorbini*] (1847) et Posth., I. 229. 14. (1863).

gracilis R.-D., Posth., I. 225. 8. (1863).

laevigata R.-D., Posth., I. 229. 15. (1863).

laevorum MEIG., p. p., F. Rossi. Verzeichn., 51. 10. [*Erorista*] (1848); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 378. 29. t. XII. f. 3. [*Erorista*] (1849); R.-D., Rev. Mag. Zool., III. 1. 1. (1851) et Posth., I. 220. 1. (1863); ROMB., Dipt. ital. Prodr., III. 135. 19. [*Erorista*] (1859); SCHUM., F. A., I. 462. [*Ero-*

rista] (1862); WULP., Entom. Tijdschr., (2), IV, 152. [*Erorista*] (1869); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 345. [*Sisyropa*] (1891); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 328. [*Erorista*] (1891); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 22. [*Erorista*] (1894); GÜRSCHN., Entom. Nachricht., XXV, 185, 15. [*Sisyropa*] (1899); MEIG., Zool. Jahrbüch., XV, 680. [*Erorista*] (1902).

musca R.-D., Posth., I, 227, 11. (1863).

argyiae R.-D., Posth., I, 237, 26. (1863).

placida R.-D., Posth., I, 225, 7. (1863).

puparum R.-D. (*see* FABR.), Myod., 178, 4. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2), V, 278, 4. (1847), (2), VIII, 164. (1850) et Rev. Mag. Zool., III, 2, 1. (1851); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 299, 10. [*Stenomctopia*] (1834) et Suit. à Buff., II, 108, 13. [*Stenomctopia*] (1835).

scutellaris R.-D., Myod., 181, 16. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2), V, 281, 10. (1847) et Posth., I, 232, 18. (1863).

sericea R.-D., Posth., I, 224, 5. (1863).

sonans R.-D., Posth., I, 234, 21. (1863).

sonora R.-D., Posth., I, 226, 9. (1863).

susurrans R.-D., Posth., I, 231, 17. (1863).

tibialis MACQ. ap. BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI, 342, 36. [*Eurygaster*] (1897).

tremula R.-D., Posth., I, 235, 22. (1863).

cernalis R.-D., Myod., 178, 5. (1830) et Posth., I, 232, 19. (1863).

flavicans MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 391, 52, t. XI, f. 24. [*Erorista*] (1849); ROXD., Dipt. ital. Prodr., III, 133, 14. [*Erorista*] (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 322. [*Parerorista*] (1891).

Europa centr.
et mer.

leucophaca ROXD. (*see* MEIG.), Dipt. ital. Prodr., III, 136, 20.

[*Erorista*] (1859); SCHN., F. A., I, 463. [*Erorista*] (1862).

fulva FALL. = ? **excisa** FALL.

gentilis R.-D. = **excisa** FALL.

gnava MEIG., p. p. (*), S. B., IV, 330, 156. [*Tachina*] (1824) et VII, 255, 1. [*Erorista*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 299, 5. [*Stenomctopia*] (1834), Suit. à Buff., II, 108, 11, t. XIV, f. 10. [*Stenomctopia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 367, 9, t. X, f. 9. [*Erorista*] (1849); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 276, 2. (1847), (2), VIII, 164. (1850) et Posth., I, 239. [*Erorista*] 242, 33. (1863); ROXD., Dipt. ital. Prodr., III, 135, 18. [*Erorista*] (1859); SCHN., F. A., I, 462. [*Erorista*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 328. [*Erorista*] (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 322. [*Parerorista*] (1891); PAND., Rev. entom., XV, 18, 23. [*Erorista*] (1896); GÜRSCHN., Entom. Nachricht., XXV, 185, 16. [*Sisyropa*] (1899); STEIN, En-

Europa centr.

*) *Malacosoma neustria* L., *Orgyia antiqua* L., *Stilpnotia salicis* L.

tom. Nachricht., XXVI, 138. (1900); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 158, 9. (1900).

bombylans R.-D., Myod., 177, 2. (1830) et Posth., I, 238, 28. (1863); PAND., Rev. entom., XV, 17, 21. [*Errorista*] (1896).

lucorum MEIG., p. p.

proxima MEIG., S. B., VII, 257, 14. [*Errorista*] (1838); SCHIX., F. A., I, 468. [*Errorista*] (1862); R.-D., Posth., I, 264 et 267, 14. [*Errorista*] (1863); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 147. (1900); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 159, 15. (1900).

puella R.-D., Posth., I, 240, 29. (1863).

rasa MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 368, 10, t. X, f. 10. [*Errorista*] (1849); RONDI., Dipt. ital. Prodr., III, 134, 17. [*Errorista*] (1859).

gracilis R.-D. = **excisa** FALL.

hortalana MEIG. = **lota** MEIG.

ingens B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 346. [*Sisyropa*] (1891). Europacentr.

jucunda MEIG., S. B., VII, 259, 50. [*Errorista*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 382, 36, t. XI, f. 14. [*Errorista*] (1849); ? ROND., Dipt. ital. Prodr., III, 125, 2. [*Errorista*] (1859); SCHIX., F. A., I, 466. [*Errorista*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 35. [*Errorista*] (1892); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 141. (1900); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 160, 24. (1900). Europacentr.

laevigata R.-D. = **excisa** FALL.

lateralis BIG. = ? **cheloniae** ROND.

leucophaea SCHIX. = **flavicans** MACQ.

lota MEIG.)*, S. B., IV, 326, 150. [*Tachina*] (1824) et VII, 255, 9. [*Errorista*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 384, 39, t. XI, f. 17. [*Errorista*] (1849); SCHIX., F. A., I, 464. [*Errorista*] (1862); R.-D., Posth., I, 254, 6. [*Phorocida*] (1863); MEADE, Entom., XIV, 287. [*Errorista*] (1881) et Entom. Monthly Mag., (2), III, 19. [*Errorista*] (1892); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 346. [*Sisyropa*] (1891); STROBL, Wiss. Mittheil. Bosn. Herzeg., VII, 600. [*Errorista*] (1900); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 142. (1900); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 160, 23. (1900). Europacentr.

hortalana MEIG., p. p., S. B., IV, 330, 157. [*Tachina*] (1824) et VII, 255, 13. [*Errorista*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 372, 18, t. X, f. 14. [*Errorista*] (1849); SCHIX., F. A., I, 466. [*Errorista*] (1862); R.-D., Posth., I, 262, 4. [*Aelytia*] (1863); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVI, 44 et 95. [*Errorista*] (1879); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 345. [*Sisyropa*] (1891); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 139. (1900).

*) *Acroneicta alni* L., *psi* L., *Malacosoma neustria* L., *Taenio-campa stabilis* VIEW.

- lacorum* MEIG. = **cheloniae** ROND., **excisa** FALL. et **gnava** MEIG.
musca R.-D. = **excisa** FALL.
orygiae R.-D. = **excisa** FALL.
placida R.-D. = **excisa** FALL.
proxima MEIG. **gnava** MEIG.
puella R.-D. **gnava** MEIG.
puparum R.-D. **excisa** FALL.
rasa MACQ. = **gnava** MEIG.
rutilla ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 132. 13. [*Exorista*] (1859); B. Europacentr.
 B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 320. [*Paraxorista*] (1891). et mer.
scutellaris R.-D. = **excisa** FALL.
sericea R.-D. = **excisa** FALL.
sonans R.-D. = **excisa** FALL.
sonora R.-D. = **excisa** FALL.
sasarrans R.-D. = **excisa** FALL.
Tamara PORTSCH., Hof. Soc. entom. Ross., XVIII. 132. [*Exorista*] Transcaucas.
 (1884).
tibialis MACQ. **excisa** FALL.
tremula R.-D. = **excisa** FALL.
 ? **velox** R.-D., Myod., 182. 20. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). Gallia,
 V. 612. 22. [*Habneria*] (1847) et Posth., I. 243. I. [*Bremia*]
 (1863); MACQ., Suit. à Buff., II. 109. 17. [*Stenomectopia*] (1835).
vernalis R.-D. = **excisa** FALL.
vigilans ROND. = **cheloniae** ROND.

Exorista

MEIG., Illiger's Magaz., II. 280. (1803).

- Actylia* R.-D., Posth., I. 270. VIII. (1863).
Aplomyia R.-D., Myod., 184. V. (1830).
Cynisca R.-D., Posth., I. 200. XI. (1863) nec Adams 1858. Moll.
Drino R.-D., Posth., I. 250. II. (1863).
Ethilla R.-D., Posth., I. 202. XII. (1863).
Habneria R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 608. I.
 [*Habneria*] (1847) emend. MARSCH. 1873.
Macropalpus MEXX., Bull. Soc. entom. France, 1892. CCVIII.
 (1892) nec RATZER. 1844. Hymen.
Paraxorista B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 87. [*Paraxo-*
rista] (1889) et LVIII. 318. (1891).

- abdominalis* R.-D. = **confinis** FALL.
aberrans ROND. ? **tritaeniata** ROND.
acanthina ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 142. 30. (1859). Italia.
acrochaeta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 319 et 325. [*Par-*
exorista] (1891). Austria.

- aemula** MEIG., S. B., IV, 332, 161. [*Tachina*] (1824) et VII, 256, 32. (1838); MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VII, 371, 16. (1849); R.-D., *Posth.*, I, 203, 1. [*Ethilla*] (1863); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, 321. [*Parerorista*] (1891); PASD., *Rev. entom.*, XV, 20, 29. (1896); STEIN, *Entom. Nachricht.*, XXVI, 130. (1900); VILLEN., *Bull. Soc. entom. France*, 1900, 159, 13. (1900).
fractiseta ROXB., *Dipt. ital. Prodr.*, III, 124, 1. (1859).
- affinis** FALL.*), *Vet. Acad. Handl.*, XXXI, 260. [*Tachina*] (1810) et *Dipt. Suec. Musc.*, 28, 57. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV, 327, 153. (1824), VI, 368. [*Tachina*] (1830) et VII, 255, 5, t. LXXII, f. 17-21. (1838); MACQ., *Suit. à Buff.*, II, 106, 5. [*Stenomelopia*] (1835) et *Annal. Soc. entom. France*, (2), VII, 369, 12. (1849); ZETT., *Dipt. Scand.*, III, 1106, 103. (1844) et XIII, 6101, 103. [*Tachina*] (1859); WALK., *Ins. Brit.*, II, 59, 90. [*Tachina*] (1853); SCHIX., *F. A.*, I, 465. (1862); R.-D., *Posth.*, I, 279, 1. [*Huebneria*] (1863); BOSSD., *Fiml. Insekt.*, II, 76, 67. [*Tachina*] (1866); WULF, *Entom. Tijdschr.*, (2), IV, 152. (1869); MEADE, *Entom.*, XIV, 287. (1881) et *Entom. Monthly Mag.*, (2), III, 19. (1892); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, 320. [*Parerorista*] (1891); PASD., *Rev. entom.*, XV, 25, 38. (1896); COQUILL., *Rev. Tachin. N. A.*, 84. (1897); STEIN, *Entom. Nachricht.*, XXVI, 130. (1900); VILLEN., *Bull. Soc. entom. France*, 1900, 159, 14. (1900).
cinereicollis R.-D., *Posth.*, I, 280, 2. [*Huebneria*] (1863).
zdenissa R.-D., *Posth.*, I, 281, 5. [*Huebneria*] (1863).
epipedes WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, IV, 786. [*Tachina*] (1849).
integra R.-D., *Posth.*, I, 281, 5. [*Huebneria*] (1863).
inumbata MEIG., S. B., VII, 192, 15. [*Tachina*] (1838); SCHIX., *F. A.*, I, 479. [*Tachina*] (1862); STEIN, *Entom. Nachricht.*, XXVI, 141. (1900).
nigripes R.-D., *Myod.*, 180, 11. [*Carelia*] (1830) et *Annal. Soc. entom. France*, (2), V, 604, 5. [*Huebneria*] (1847); MACQ., *Soc. Sci. Lille*, 1833, 300, 13. [*Stenomelopia*] (1834) et *Suit. à Buff.*, II, 109, 14. [*Stenomelopia*] (1835).
pratorum R.-D., *Posth.*, I, 281, 3. [*Huebneria*] (1863).
- affinis* HART. **polychaeta** Macq.
- agnata****), ROXB., *Dipt. ital. Prodr.*, III, 144, 32. (1859); SCHIX., *F. A.*, I, 459. (1862); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, 319 et 324. [*Parerorista*] (1891); PASD., *Rev. entom.*, XV, 23, 33. (1896); WULF et MELL., *N. Naamlist ned. Dipt.*, 81. (1898).
- antennata** B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, 319 et 325. [*Parerorista*] (1891).
- argentifera** B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, 322. [*Parerorista*] (1891).

*), *Aeronieta alni* L., *Aretia caja* L., *Lymantria dispar* L., *Pachytelia villosella* O., *Saturnia pavonia* L., *pyti* SCHNEI.

**), *Abraxas grossulariata* L.

- aristella** ROXD., Dipt. ital. Prodr., III, 148, 39, (1859) et Atti Soc. Ital. Sci. Nat., XI, 587, *nota*, 4. [*Masicera*] (1868); XAMB., Le Natur., XXVII, 57, (1905). Europacentr. et mer.
- arvensis* MEIG. = **fimbriata** MEIG.
- arvicola** MEIG., S. B., IV, 338, 170, [*Tachina*] (1824) et VII, 256, 26, (1838); MACQ., Suit. à Buff., II, 110, 20, [*Stenomelopia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 364, 2, t. X, f. 2, (1849); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 610, 16, [*Hachueria*] (1847) et Posth., I, 201, 4, [*Cygnisca*] (1863); SCHN., F. A., I, 465, (1862); STEIX, Entom. Nachricht., XXVI, 132, (1900). Europacentr.
- atra* R.-D. = **confinis** FALL.
- aurca* R.-D. = **confinis** FALL.
- bicinctulata* ZETT. = **confinis** FALL.
- biserialis** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 358 et 379, 30, (1849); SCHN., F. A., I, 461, (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 328, (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 322, [*Paracrorista*] (1891). Europacentr.
- bisetosa** B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 321, [*Paracrorista*] (1891). Europacentr.
- blepharipoda** B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 322, [*Paracrorista*] (1891). Europacentr. et mer.
- hortulana* MEIG. p. p., S. B., IV et VII; VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 158, 2, (1900).
- lota* PAND. (*ucc* MEIG.), Rev. entom., XV, 27, 43, (1896).
- Bohemani* ZETT. = **festiva** MEIG.
- brevifrons** B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 321 et 327, [*Paracrorista*] (1891). Europacentr.
- brevifusa* PAND. = **glaucia** MEIG.
- brevipennis* MEIG. = **fimbriata** MEIG.
- campestris* R.-D. = **confinis** FALL.
- capillata** ROXD.³⁾, Dipt. ital. Prodr., III, 140, 27, (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 323, [*Paracrorista*] (1891). Europacentr. et mer.
- chrysophani* TYL.-TOWNS. = **confinis** FALL.
- cincta** ROXD., Dipt. ital. Prodr., III, 141, 28, (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 325 et 319, [*Paracrorista*] (1891). Europacentr. et mer.
- cincticollis* R.-D. = **affinis** FALL.
- clavellariae** B. B.⁴⁾, Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 320 et 326, [*Paracrorista*] (1891). Austria.
- clavipalpis** PAND., Rev. entom., XV, 12, 14, (1896). Gallia mer.
- cognata** ROXD., Dipt. Ital. Prodr., III, 144, 33, (1859); STEIX, Entom. Nachricht., XIV, 213, 31, (1889). Europacentr. et mer.
- comata** ROXD.⁵⁾, Dipt. ital. Prodr., III, 137, 22, (1859); B. B., Europacentr. et mer.

1) *Geometra vernaria* Hb.

2) *Taeniocampa incerta* HUFN.

3) *Zygaena* sp.

4) *Cimbex femorata* L., *Clavellaria amerinae* L.

5) *Lymantria dispar* L., *Stilpnotia salicis* L.

Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 320. [*Paracrorista*] (1891); MÜK
et WACHTL, Wien. entom. Zeitg., XIV, 230, 13, (1895).

lucorum HART. (nec MEIG.), Jahresber. Fortschr. Forstwiss., I,
290, 17. [*Tachina*] (1838).

commixta ZETT. - ? *fimbriata* MEIG.

confinis FALL.*), Dipt. Succ. Musc., 32, 65. [*Tachina*] (1820); MEIG., Europa.

S. B., IV, 396, 274. [*Tachina*] (1824) et VII, 261, 4. [*Phorocera*]
(1838); MACQ., Suit. à Buff., II, 121, 11. [*Masicera*] (1835), Annal.
Soc. entom. France, (2), VIII, 403, 74, t. XII, f. 13 et 427, 11.
[*Phorocera*] (1850); ZETT., Ins. Lapp., 644, 41. [*Tachina*] (1838)
et Dipt. Scand., III, 1140, 138. [*Tachina*] (1844); ROSS, Dipt.
ital. Prodr., III, 143, 31, (1859); SCHN., F. A., I, 459, (1862);
R.-D., Posth., I, 459, 1. [*Aplomyia*] (1863); BOSSD., Finnl. Insekt.,
II, 85, 85. [*Tachina*] (1866); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I,
278, 36, (1882); STEIN, Entom. Nachricht., XIV, 213, 32, (1889);
B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 321. [*Paracrorista*] (1891);
PAND., Rev. entom., XV, 22, 31, (1896); COQUILL., Rev. Tachin.
N. A., 97, (1897); GÜRSCH., Entom. Nachricht., XXV, 178, 10.
[*Paracrorista*] (1899); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI,
210, 9. [*Paracrorista*] (1901).

abdominalis R.-D., Posth., I, 461, 3. [*Aplomyia*] (1863).

atra R.-D., Posth., I, 463, 8. [*Aplomyia*] (1863).

aurca R.-D., Posth., I, 464, 10. [*Aplomyia*] (1863).

hircupulata ZETT., Dipt. Scand., III, 1133, 131. [*Tachina*] (1844).

campestris R.-D., Posth., I, 462, 4. [*Aplomyia*] (1863).

chrysophani TYL.-TOWNS., Entom. News., II, 197, (1891).

dimidiata R.-D., Posth., I, 465, 12. [*Aplomyia*] (1863).

facialis R.-D., Posth., I, 463, 6. [*Aplomyia*] (1863).

fasciolata R.-D., Posth., I, 462, 5. [*Aplomyia*] (1863).

flaviscutans R.-D., Posth., I, 465, 11. [*Aplomyia*] (1863).

impavida R.-D., Posth., I, 464, 9. [*Aplomyia*] (1863).

integra R.-D., Posth., I, 463, 7. [*Aplomyia*] (1863).

longicornis PERRIS, Mem. Soc. Linn. Lyon, 1852, 62, (1852).

Meigenii R.-D., Posth., I, 466, 14. [*Aplomyia*] (1863).

cabella R.-D., Posth., I, 466, 13. [*Aplomyia*] (1863).

sabulosa R.-D., Myod., 159, 3. [*Phyge*] (1830) et Posth., I, 461.

2. [*Aplomyia*] (1863).

theclarum SCDD., Can. Entom., XIX, 166. [*Tachina*] (1887);

WILL. ap. SCDD., Butterfl. N. Engl., 1920, t. LXXXIX, f.
17-19, (1889).

zonata R.-D., Myod., 159, 1. [*Phyge*] (1830); MACQ., Soc. Sci.
Lille, 1833, 288, 7. [*Masicera*] (1834) et Suit. à Buff., II,
121, 10. [*Masicera*] (1835).

*) *Aporia crataegi* L., *Callophrys rubi* L., *Rhyparia purpurata*
L., *Thecla ilicis* Esp., *Zephyrus quercus* L.

- confundens** ROND.*), Dipt. ital. Prodr., III, 138, 24. (1859). Italia.
- cornuta** ZETT., Dipt. Scand., III, 1121, 118. [*Tachina*] (1844). Europacentr.
- ? *incipennis* HEDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI, 205, V. et sept.
- [*Parevorista*] (1901).
- demissa* R.-D. = ? **affinis** FALL.
- dimidiata* R.-D. = **confinis** FALL.
- dolosa** MEIG., S. B., IV, 394, 270. [*Tachina*] (1824) et VII, 256, 19. Europacentr.
- (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 393, 58, t. XII, f. 4. (1849); SCHN., F. A., I, 467. (1862); R.-D., Posth., I, 241, 32. [*Carclia*] (1863); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 135. (1900).
- dubia** B. B.**), Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 322. [*Parevorista*] Europa mer.
- (1891). Asia min.
- epicydes* WALK. = **affinis** FALL.
- extorris** PAND., Rev. entom., XV, 11, 11. (1896). Europacentr.
- facialis* R.-D. = **confinis** FALL.
- familiaris** MEIG., S. B., IV, 359, 208. [*Tachina*] (1824) et VII, 261. Europacentr.
8. [*Phoroceera*] (1838); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 321. [*Parevorista*] (1891).
- fasciolata* R.-D. = **confinis** FALL.
- ferina** MEIG.**), S. B., VI, 371, 323. [*Tachina*] (1824) et VII, 255, 4. Europacentr.
- (1838); SCHN., F. A., I, 467. (1862); WCLP, Entom. Tijdschr., (2), IV, 152. (1869).
- festiva** MEIG., S. B., IV, 391, 263. [*Tachina*] (1824) et VII, 256, 44. Europacentr.
- (1838); MACQ., Suit. à Buff., II, 117, 4. [*Eurygaster*] (1835) et et sept.
- Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 392, 56, t. XII, f. 3. (1849); SCHN., F. A., I, 467. (1862); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 136. (1900).
- ? *Bohemani* ZETT., Dipt. Scand., III, 1107, 104. (1844) et VIII, 3243, 104. [*Tachina*] (1849).
- fimbriata** MEIG.***), S. B., IV, 337, 168. (1824), VI, 368. [*Tachina*] Europa.
- (1830) et VII, 255, 8. (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 366, 6, t. X, f. 6. (1849); ZETT., Dipt. Scand., III, 1119, 116. (1844), VIII, 3244, 116. (1849), XII, 4698, 116. (1855) et XIII, 6111, 116. [*Tachina*] (1859); WALK., Ins. Brit., II, 58, 88. [*Tachina*] (1853); ROND., Dipt. ital. Prodr., III, 149, 40. (1859); BOSSD., Fönnl. Insekt., II, 80, 75. [*Tachina*] (1866); WCLP, Entom. Tijdschr., (2), IV, 152. (1869); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 320 et 327. [*Parevorista*] (1891); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 327. (1891); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 21. (1894); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900, 160, 19. (1900).

*) *Phragmatobia fuliginosa* L.

**) *Aretia Hebe* L., *Phlogophora scita* Hb., *Hipoerita jacobaeae* L.

***) *Vanessa urticae* L.

****) *Thamnomia Wawaria* L.; — *Clavellaria amerinae* L.

arvensis MEIG., S. B., IV, 337, 169. [*Tachina*] (1824) et VII, 256, 27. (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 365, 5, t. X, f. 5. (1849); ? WALK., Ins. Brit., II, 25, 14. [*Tachina*] (1853); SCHIX., F. A., I, 461. (1862); PASD., Rev. entom., XV, 27, 41. (1896); STEIX, Entom. Nachricht., XXVI, 132. (1900); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 160, 18. (1900).

brevipennis MEIG., S. B., VII, 193, 26. [*Tachina*] (1838); SCHIX., F. A., I, 479. [*Tachina*] (1862); STEIX, Entom. Nachricht., XXVI, 133. (1900).

? *commirata* ZETT., Dipt. Scand., VIII, 3245, obs. [*Tachina*] (1849).

hyalipennis ZETT., Ins. Lapp., 645, 48. [*Tachina*] (1868) et Dipt. Scand., III, 1145, 144. (1844), XIII, 4127, 144. [*Tachina*] (1859); BOSSD., Fiml. Insekt., II, 85, 86. [*Tachina*] (1866).

nemestrina MEIG., S. B., IV, 336, 167. [*Tachina*] (1824) et VII, 255, 7. (1838); MACQ., Suit. à Buff., II, 106, 3. [*Stenomelopia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 375, 24, t. XI, f. 3. (1849); ROXD., Dipt. ital. Prodr., III, 146, 36. (1859); SCHIX., F. A., I, 460. (1862); STEIX, Entom. Nachricht., XXVI, 144. (1900); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 160, 17. (1900).

? *tricingulata* ZETT., Ins. Lapp., 646, 51. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III, 1145, 145. (1844), VIII, 3246, 145. (1849), XII, 4700. (1855) et XIII, 6127, 145. [*Tachina*] (1859); BOSSD., Fiml. Insekt., II, 86, 88. [*Tachina*] (1866).

flavifrons Macq. = **mitis** MEIG.

flaviquamis R.-D. = **confinis** FALL.

floralis MEIG., S. B., VII, 258, 32. (1838); SCHIX., F. A., I, 468. Europacentr. (1862).

fractiseta ROXD. = **aemula** MEIG.

fugax ROXD., Dipt. ital. Prodr., III, 127, 5. (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 322. [*Paracrorista*] (1891). Europacentr. et mer.

glauca MEIG.*), S. B., IV, 325, 149. [*Tachina*] (1824) et VII, 255, 2. (1838); MACQ., Suit. à Buff., II, 109, 18. [*Stenomelopia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 372, 17, t. X, f. 13. (1849); LAC., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, Bull. XLIX, (1849); SCHIX., F. A., I, 466. (1862); B. B., Posth., I, 269, 17. (1863); GIARD, Bull. Soc. entom. France, 1894, CLXXIX, (1894); STEIX, Entom. Nachricht., XXVI, 138. (1900); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 160, 20. (1900); HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XXI, 143, 16. (1902).

brevifusa PASD., Rev. entom., XV, 28, 44. (1896).

glivina PASD. (nec ROXD.), Rev. entom., XV, 24, 36. (1896).

*) *Aeronicta psi* L., *tridens* SCHNEF., *Dasychira pudibunda* L., *Parasemia plantaginis* L. = *Abia sericea* L.

- grossa* B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 323. [*Paracrorista*] (1891); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XIX, 248, 3. (1900); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI, 210, 11. [*Paracrorista*] (1901).
- glirina* PAND. **glauca** MEIG.
- glirina** ROXD.^{*)}, Dipt. ital. Prodr., III, 129, 8. (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 323. [*Paracrorista*] (1891); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 22. (1894). Europacentr. et mer.
- grossa* B. B. **glauca** MEIG.
- hilaris* R.-D. **proxima** MEIG.
- hirtipilis** PAND., Rev. entom., XV, 12, 13. (1896). Gallia mer.
- hortulana* MEIG. **blepharipoda** B. B.
- humiliceps** PAND., Rev. entom., XV, 23, 32. (1896). Gallia mer.
- hyalipennis* ZETT. **fimbriata** MEIG.
- innuata* PAND. **rapida** MEIG.
- imparida* R.-D. **confinis** FALL.
- integra* R.-D. (Apl.) **confinis** FALL.
- integra* R.-D. (Huchn.) **affinis** FALL.
- intermedia** B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 319 et 324. [*Paracrorista*] (1891). Europacentr.
- innubata* MEIG. **affinis** FALL.
- irregularis** B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 323. [*Paracrorista*] (1891). Europacentr.
- latifrons** B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 324. [*Paracrorista*] (1891). Europacentr.
- laxiceps** PAND.**), Rev. entom., XV, 24, 34. (1891). Europacentr.
- linearicornis** ZETT., Dipt. Scand., III, 118, 115. (1844) et VIII, 324, 115. [*Tachina*] (1849). Scandinavia.
- longicornis* PERR. **confinis** FALL.
- loba* PAND. **blepharipoda** B. B.
- lucorum* HART. **comata** ROXD.
- magnicornis** B. B.***), Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 320 et 326. [*Paracrorista*] (1891); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 21. (1894). Europacentr.
- Meigenii* R.-D. **confinis** FALL.
- mitis** MEIG.****), S. B., IV, 335, 165. [*Tachina*] (1824) et VII, 256, 18. (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 297, 4. [*Stenomelopia*] (1834). Suit. à Buff., II, 105, 2. [*Stenomelopia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 385, 41, t. X, f. 24. (1849); SEMX., F. A., I, 467. (1862); R.-D., Posth., I, 268, 15. (1863); WELP., Entom. Tijdschr., (2), IV, 152. (1869); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 319 et 325. [*Paracrorista*] (1891); STEIN, Entom. Nachrichten,

*) *Aeromicta tridens* L.**) *Clavellaria amerinae* L.***) *Cucullia prenanthis* B.****) *Calymnia trapezina* L.

- XXVI, 143. (1900); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 158, 3. (1900); HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XXI, 143, 16. (1902).
flavifrons MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 400, 69, 1, XII, f. 10. (1849); R.-D., Posth., I, 336, 17. [*Phegace*] (1863); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 137. (1900).
temera PAND. (nec MEIG.), Rev. entom., XV, 27, 42. (1896); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 402. (1900).
Weslermanni ZETT., Dipt. Scand., III, 1120, 117. [*Tachina*] (1844); SCHN., F. A., I, 468. (1862); STEIN, Entom. Nachricht., XIV, 214, 42. (1888); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI, 206. (1901).
unestrina MEIG. **fimbriata** MEIG.
nigripes R.-D. = **affinis** FALL.
nigriventris PALM, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV, 417, 8. (1875). Dalmatia.
noctuidica ROND.*), Dipt. ital. Prodr., III, 126, 4. (1859); MEADE, Europacentr. Entom. Monthly Mag., (2), III, 19. (1892). et mer.
obesa ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6101, 105—6. [*Tachina*] (1859); Europ. sept. BONSD., Fiml. Insekt., II, 77, 68. [*Tachina*] (1866).
olfaciens PAND., Rev. entom., XV, 20, 28. (1896). Gallia mer.
parens ROND.**), Dipt. ital. Prodr., III, 145, 34. (1859); MEADE, Europacentr. Entom. Monthly Mag., XIV, 287. (1881) et (2), III, 35. (1892). et mer.
polychaeta MACQ.**), Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 380, 31. Europacentr. t. XI, f. 10. (1849); ROND., Dipt. ital. Prodr., III, 125, 3. (1859); et mer. SCHN., F. A., I, 461. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 320. [*Paracrorista*] (1891); BERTH., Dipt. Hamburg, 36. (1891); PAND., Rev. entom., XV, 25, 37. (1896); GÜRSCH., Entom. Nachricht., XXV, 178, 9. [*Paracrorista*] (1899); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 159. (1900).
affinis HART. (nec FALL.), Jahresber. Forstsch. Forstwiss., I, 290, 16. [*Tachina*] (1838).
porcula ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6103, 106—7. [*Tachina*] (1859); Europacentr. BONSD., Fiml. Insekt., II, 77, 69. [*Tachina*] (1866); PAND., Rev. entom., XV, 19, 26. (1896). et sept.
pratorum R.-D. = **affinis** FALL.
prominens MEIG.***), S. B., VII, 256, 3. (1838); MACQ., Annal. Soc. Europacentr. entom. France, (2), VII, 405, 78, 1, XII, f. 6. (1849); SCHN., F. A., I, 468. (1862); WULF, Entom. Tijdschr., (2), IV, 152. (1869); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 35. (1892).
raiblensis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 319 et 324. [*Paracrorista*] (1891). Europacentr.
rapida MEIG., S. B., IV, 326, 151. [*Tachina*] (1824) et VII, 255, 11. Europacentr.
- *) *Aeronieta tridens* SCHIFF.
 **) *Polia flavicincta* F.
 ***) *Aeronieta tridens* SCHIFF., *Arctia caja* L., *villicia* L., *Orgyia gonostigma* F., *Therapsis evonymaria* SCHIFF., *Vanessa urticae* L.
 ****) *Malacosoma neustria* L.

- (1838); MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VII, 383, 38, 1, XI, f. 16. (1849); STEIN, *Entom. Nachricht.*, XXVI, 148. (1900).
immunita PAND., *Rev. entom.*, XV, 28, 45. (1896).
- recusata** PAND., *Rev. entom.*, XV, 19, 25. (1896). Europa-centr.
- rubrella* R.-D. = **confinis** FALL.
- sabulosa* R.-D. = **confinis** FALL.
- saltuum** MEIG., S. B., IV, 329, 155. [*Tachina*] (1824) et VII, 255, 12. Europa-centr.
 (1838); MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VII, 370, 13, 1, XI, f. 8. (1849); ZETT., *Dipt. Scand.*, XII, 6117, 130-31. [*Tachina*] (1859); SCHN., F. A., I, 465. (1862); R.-D., *Posth.*, I, 268, 16. (1863); PAND., *Rev. entom.*, XV, 20, 27. (1896).
- separata** ROND., *Dipt. ital. Prodr.*, III, 134, 16. (1859). Italia.
- Serrilli* R.-D. = **confinis** FALL.
- setosa** B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, 319 et 325. [*Paracrorista*] (1891). Europa.
- stulta** ZETT., *Dipt. Scand.*, III, 1109, 106. [*Tachina*] (1844); STROBL., *Mittheil. Ver. Steierm.*, XXX, 23 et *nota* (1894); PAND., *Rev. entom.*, XV, 24, 35. (1896). Europa-centr. et sept.
- susurrans** ROND.*), *Dipt. ital. Prodr.*, III, 129, 7. (1859); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, 323. [*Paracrorista*] (1871). Europa-centr. et mer.
- temera** ROND. (*nee* MEIG.**), *Dipt. ital. Prodr.*, III, 149, 41. (1859); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, 320 et 326. [*Paracrorista*] (1891). Europa-centr. et mer.
- theclaram* SCDD. = **confinis** FALL.
- tinicipennis* HEND. = ? **cornuta** ZETT.
- tricingulata* ZETT. = ? **fimbriata** MEIG.
- trifasciata* B. B. = ? **tritaeniata** ROND.
- triseria** PAND., *Rev. entom.*, XV, 26, 39. (1896). Gallia mer.
- trisetata** PAND., *Rev. entom.*, XV, 26, 40. (1896). Gallia mer.
- tritaeniata** ROND.**), *Dipt. ital. Prodr.*, III, 147, 37. (1859); SCHN., F. A., I, 460. (1862); WACHTL., *Wien. entom. Zeitzg.*, I, 278, 37. (1882). Europa-centr. et mer.
- ? *aberrans* ROND., *Dipt. ital. Prodr.*, III, 147, 38. (1859).
- ? *trifasciata* B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, 323. [*Paracrorista*] (1891).
- tultschensis** B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, 319. [*Paracrorista*] (1891). Asia min.
- vivax** ROND., *Atti Soc. ital. Sci. Nat.*, XI, 38. (1868); HENDEL, *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, LI, 207. (1901). Italia.
- Westermanni* ZETT. = **mitis** MEIG.
- zonata* R.-D. = **confinis** FALL.

*) *Acroneicta psi* L., *Lymantria dispar* L., *Zygaena purpuralis* BRÜNN.

**) *Nematus oligospilus* FÖRST.

***) *Callophrys rubi* L., *Pygolopha lugubrana* TR.

Species dubiae vel incerti generis.

- Celea* R.-D., Posth., I. 273. IX. (1863).
Cnossia R.-D., Posth., I. 289. XVI. (1863).
Damonia R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 596. III. (1847).
Elbaea R.-D., Posth., I. 286. XIV. (1863).
Eperia R.-D., Posth., I. 316. XXX. (1863).
Essenia R.-D., Posth., I. 193. VII. (1863).
Eugenia R.-D., Posth., I. 919. III. (1863) *nee* GOULD 1855.
Eumea R.-D., Posth., I. 302. XXIII. (1863).
Euryclea R.-D., Posth., I. 290. XXVII. (1863).
Halesa R.-D., Posth., I. 315. XXIX. (1863).
Herilla R.-D., Posth., I. 317. XXXI. (1863), *nee* ADAMS 1858.
Melibaea R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 613. 2. (1847), *nee* RANG 1829.
Myconia R.-D., Posth., I. 306. XXV. (1863).
Ophina R.-D., Posth., I. 298. XXI. (1863).
Oppia R.-D., Posth., I. 309. XXVII. (1863), *nee* KOCH 1850.
Oria R.-D., Posth., I. 274. X. (1863), *nee* HÜBNER 1816.
Phebella R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IV. 37. VIII. (1846).
Philea R.-D., Posth., I. 314. XXVIII. (1863).
Pholoe R.-D., Posth., I. 297. XX. (1863), *nee* JOUB. 1839.
Phorvula R.-D., Posth., I. 251. III. (1863).
Platynujia R.-D., Myod., 116. VII. (1830).
Sironia R.-D., Posth., I. 305. XXIV. (1863), *nee* HÜBNER 1823.
Smiddtia R.-D., Myod., 183. IV. (1830) et Posth., I. 293. XIX. (1863).
Temesia R.-D., Posth., I. 292. XXVIII. (1863).
Theano R.-D., Posth., I. 256. V. (1863), *nee* LAP. 1840.
Timaria R.-D., Posth., I. 257. VI. (1863).
Thelphusa R.-D., Posth., I. 307. XXVI. (1863).

acris Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 411. 89. t. XII. f. 10. (1849). Europacentr.

acronictae R.-D.*), Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 167. Europacentr.
 [*Huebneria acronictae*] (1850) et Posth., I. 251. I. [*Phorvula*] (1863).

campephaga R.-D., Posth., I. 254. 5. [*Phorvula*] (1863).

rectinervis R.-D., Posth., I. 258. 4. [*Phorvula*] (1863).

*) *Acronicta megacephala* FABR., *tridens* L.

- scutellaris* R.-D., Posth., I, 232, 2. [*Phorevida*] (1863).
subglabra R.-D., Posth., I, 252, 3. [*Phorevida*] (1863).
- acronictarum** Macq.*), Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 403, Europacentr.
 77, t. XII, f. 15, (1849); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II,
 18, (1891).
- aenescens** Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 409, 85, t. Europacentr.
 XII, f. 5, (1849).
- aestivalis** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), IV, 38, 1. [*Phcebellia*] Europacentr.
 (1846) et Posth., I, 277, 1. [*Phcebellia*] (1863).
- aestivalis** R.-D., Myod., 117, 2. [*Platymyia*] (1830) et Posth., I, 192, Europacentr.
 2. [*Platymyia*] (1863); Macq., Suit. à Buff., II, 136, 14. [*Lygdella*]
 (1835).
nitida R.-D., Posth., I, 192, 1. [*Platymyia*] (1863).
- agrestis** R.-D., Myod., 113, 2. [*Lygdella*] (1830), Gallia.
- agrorum** R.-D., Posth., I, 262, 7, (1863), Gallia.
- albibarbis* R.-D. = **fuscipennis** R.-D.
- albicans** R.-D., Posth., I, 316, 1. [*Eperia*] (1863), Gallia.
- amoena** R.-D., Myod., 179, 7. [*Carcelia*] (1830), Annal. Soc. entom. Europacentr.
 France, (2), V, 279, 7. [*Carcelia*] (1847) et Posth., I, 227, 10.
 [*Carcelia*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 300, 14. [*Steno-*
metopia] (1834) et Suit. à Buff., II, 108, 12. [*Stenomectopia*] (1835).
- apicalis** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 605, 8. [*Huebneria*] Gallia.
 (1847) et Posth., I, 259, 1, (1863).
- appendiculata** Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 382, 35, Europacentr.
 t. II, f. 13, (1849).
- appendiculata** R.-D., Posth., I, 194, 1. [*Essenia*] (1863), Gallia.
- appendiculata** R.-D., Posth., I, 307, 1. [*Mycovia*] (1863), Gallia.
- aratoria** Macq., S. B., IV, 338, 171. [*Tachina*] (1824) et VII, 256, 48, Europacentr.
 (1838).
- arctica** ZETT., Ins. Lapp., 645, 47. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., Europ. sept.
 III, 1187, 190. [*Tachina*] (1844).
- ardens** Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 389, 49, t. XI, Europacentr.
 f. 24, (1849).
- arrogans** Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 375, 22, t. XI, Europacentr.
 f. 3, (1849).
- arorum* R.-D. = **Duponcheli** R.-D.
- aurifrons** R.-D.**), Posth., I, 308, 1. [*Tlephasa*] (1863), Gallia.
honesta R.-D., Posth., I, 308, 2. [*Tlephasa*] (1863).
noctuarum R.-D., Posth., I, 309, 3. [*Tlephasa*] (1863).
- aurulenta** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 615, 2. [*Meli-* Gallia.
baca] (1847) et Posth., I, 287, 1. [*Melibaca*] (1863).
cita R.-D., Posth., I, 288, 2. [*Melibaca*] (1863).
obscurata R.-D., Posth., I, 288, 3. [*Melibaca*] (1863).
- bizonata** ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6119, 131 -32. [*Tachina*] (1859), Europ. sept.

*) Acronicta psi L.

**) Mamestra persicariae L.

- Blondeli** R.-D., Myod., 118, 3, [*Platygorgia*] (1830). Gallia.
- Bonsdorffii** Zerr., Dipt. Scand., XII, 6111, 117-18, [*Tachina*] (1853). Europa sept.
- brevis** Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 388, 47, t. XI, f. 21, (1849). Europe centr.
- brunnicornis** Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 271, 7, [*Lydeella*] (1834). Gallia.
Smit. à Buff., II, 134, 6, [*Lydeella*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 406, 80, t. XI, f. 2, (1849).
- caerulescens** Macq., Annal. Soc. Entom. France, (2), VII, 398, 65, (1840). Gallia.
- caesia** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 605, 7, [*Huebneria*] (1847) et Posth., I, 260, 2, (1863). Gallia.
- canepheoga* R.-D. **acronictae** R.-D.
- campestris** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 610, 17, [*Huebneria*] (1847) et Posth., I, 264, 9, (1863). Gallia.
- canescens** Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 391, 54, t. XII, f. 1, (1849). Europe centr.
- cinerascens** R.-D., Myod., 168, 30, [*Phryxer*] (1830). Patria ignota.
- cinerea** R.-D., Posth., I, 257, 1, [*Theca*] (1863). Gallia.
- cita** Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 412, 92, t. XII, f. 20, (1849). Gallia.
- cita* R.-D. = **aurulenta** R.-D.
- coarctata** R.-D., Myod., 163, 17, [*Phryxer*] (1830). Gallia.
- coirensis** Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 410, 87, t. XI, f. 14, (*curiensis*) (1849). Helvetia.
- concaua** Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 398, 66, t. XII, f. 8, (1849). Europe centr.
- consanguinea** Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 387, 46, t. XI, f. 22, (1849); WALK., Ins. Brit., II, 80, 140, [*Tachina*] (1853). Europe centr.
- crassistylum** Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 412, 91, t. XII, f. 19, (1849). Europe centr.
- cueulliae** R.-D.)*, Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 166, [*Huebneria*] (1850). Gallia.
- cuprea** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 595, 2, [*Smidalia capraea*] (1847). Gallia.
- cursoria** R.-D., Posth., I, 314, 1, [*Phileca*] (1863). Gallia.
- decipiens** R.-D., Posth., I, 282, 6, [*Huebneria*] (1863). Gallia.
- demens* R.-D. **lacta** R.-D.
- diffusa** Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 413, 93, t. XII, f. 21, (1849). Europe centr.
- diligens** Zerr., Dipt. Scand., III, 1122, 120, (1841), VIII, 3215, 120, (1849) et XII, 4699, 120, [*Tachina*] (1855); BOSSQ., Fimul. Insekt., II, 80, 76, [*Tachina*] (1866). Europa sept.
- distincta** R.-D., Myod., 179, 9, [*Carrelia*] (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2), V, 603, 3, [*Huebneria*] (1847); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 300, 12, [*Stenomelopia*] (1834) et Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 472, 32, t. XV, f. 1, [*Masicera*] (1850). Europe centr.

*) *Cueullia lychmitis* RAMB.

- diversa** R.-D., Myod., 181. 14. [*Carcelia*] (1830), Annal. Soc. entom. Gallia.
France, (2). V. 608. 14. [*Huebneria*] (1847) et Posth., I. 262. 6.
(1863).
- dubia** R.-D., Myod., 113. 4. [*Lydella*] (1830). Gallia.
- dumetorum** Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 392. 55. t. Europacentr.
XII. f. 2. (1849).
- duplinervis** ZETT., Dipt. Scand., III. 1144. 143. [*Tachina*] (1844). Europa sept.
- Duponcheli** R.-D., Myod., 179. 10. [*Carcelia*] (1830), Annal. Soc. Gallia.
entom. France, (2). V. 603. 4. [*Huebneria*] (1847) et Posth., I.
265. 10. (1863).
arorum R.-D., Posth., I. 266. 12. (1863).
ruralis R.-D., Posth., I. 266. 11. (1863).
subaenea R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 606. 10.
[*Huebneria*] (1847).
- elliptica** Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 408. 83. t. XII. Europacentr.
f. 5. (1849).
- eruceti** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 165. [*Hueb-* Gallia.
neria] (1830).
- ferrugineotibialis** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6104. 106—8. [*Tachina*]
(1859).
- festinans** R.-D., Posth., I. 315. 1. [*Halesa*] (1863). Gallia.
- festiva** R.-D., Myod., 177. 3. [*Carcelia*] (1830), Annal. Soc. entom. Gallia.
France, (2). V. 277. 3. [*Carcelia*] (1847) et Posth., I. 228. 12.
[*Carcelia*] (1863).
- festiva** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 606. 9. [*Huebneria*] Gallia.
(1847) et Posth., I. 260. 3. (1863).
- flavescens** R.-D.*), Myod., 183. 21. [*Carcelia*] (1830), Annal. Soc. Gallia.
entom. France, (2). V. 613. [*Carcelia*] (1847) et Bull. Soc. Yonne,
VII. 531. [*Huebneria*] (1853).
- flavicalyprata** Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 367. 7. Europacentr.
t. X. f. 7. (1849).
- flavipalpis** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 597. 1. [*Dam-* Gallia.
onia] (1847) et Posth., I. 249. 1. [*Damonia*] (1863).
- flavipalpis** R.-D.**), Myod., 169. 34. [*Phryxæ*] (1830), Annal. Soc. Gallia.
entom. France, (2). VIII. 173. [*Phryxæ*] (1850) et Posth., I. 273.
1. [*Celca*] (1863).
- flavipalpis** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 596. 4. [*Smidtia*] Gallia.
(1847) et Posth., I. 258. 1. [*Timaria*] (1863).
- floralis* R.-D. = **fuscipennis** R.-D.
- floricola** R.-D., Myod., 115. 10. [*Lydella*] (1830); Macq., Soc. Sci. Gallia.
Lille, 1833. 272. 12. [*Lydella*] (1834).
- fraterna** Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 400. 70. t. XI. Europacentr.
f. 25. (1849).
- fugax** R.-D., Posth., I. 920. 1. [*Eugenia*] (1863). Gallia mer.

*) *Pyralis* sp.**) *Aretia testudinaria* FOURC.

- silvatica* R.-D., Posth., I, 920, 2. [*Eugenia*] (1863).
- fugitiva** R.-D., Posth., I, 275, 1. [*Oria*] (1863). Gallia.
- fulvifrons** ZETT., Dipt. Scand., XIII, 613, 120—21. [*Tachina*] (1859). Scandinavia.
- fulvipes** R.-D., Myod., 115, 11. [*Lydeella*] (1830); Macq., Soc. Sci. Gallia.
Lille, 1833, 273, 16. [*Lydeella*] (1834) et Suit. à Buff., II, 135, 10.
[*Lydeella*] (1835).
- fulvipes** R.-D., Posth., I, 299, 1. [*Ophina*] (1863). Gallia.
- fuscipennis** R.-D., Myod., 182, 18. [*Carcelia*] (1830), Annal. Soc. Gallia.
entom. France, (2), V, 611, 20. [*Huebneria*] (1847) et Posth., I,
311, 3. [*Oppia*] (1863).
- albibarbis* R.-D., Posth., I, 312, 4. [*Oppia*] (1863).
- floralis* R.-D., Posth., I, 313, 6. [*Oppia*] (1863).
- muscivora* R.-D., Posth., I, 313, 5. [*Oppia*] (1863).
- nigripalpis* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 612, 21.
[*Huebneria*] (1847) et Posth., I, 310, 1. [*Oppia*] (1863).
- tristis* R.-D., Posth., I, 311, 2. [*Oppia*] (1863).
- gagatea** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 602, 4. [*Huebneria*] Gallia.
(1847) et Posth., I, 284, 9. [*Huebneria*] (1863).
- gagatea** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), 616, 5. [*Melibaca*] Gallia.
(1847) et Posth., I, 306, 1. [*Sironia*] (1863).
- genarum** ZETT., Dipt. Scand., III, 1142, 140. [*Tachina*] (1844). Scandinavia.
- gibbicornis** MACQ.*), Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 381, 32, t. Europacentr.
XI, f. 12. (1849).
- grisea** R.-D., Myod., 182, 17. [*Carcelia*] (1830) et Annal. Soc. entom. Gallia.
France, (2), V, 613. [*Carcelia*] (1847).
- griseifrons** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 399, 67, t. Europacentr.
XII, f. 9. (1849).
- habilis** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 413, 94, t. XII. Europacentr.
f. 18. (1849).
- hilaris** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 280, 9. [*Carcelia*] (1847). Gallia.
- honestata* R.-D. = **aurifrons** R.-D.
- hyalinata** ZETT., Dipt. Scand., III, 1187, 191. [*Tachina*] (1844). Scandinavia.
- impavida** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 395, 60, t. Europacentr.
XII, f. 6. (1849); WALK., Ins. Brit., II, 92, 165. [*Tachina*] (1853).
- inclinata** MACQ.**), Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 386, 44, t. Europacentr.
XI, f. 20. (1849).
- insinuans** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 395, 61, t. Europacentr.
XII, f. 4. (1849).
- interna** WALK., Ins. Brit., II, 69, 115. [*Tachina*] (1853). Anglia.
- laeta** R.-D., Posth., I, 271, 1. [*Actylia*] (1863). Gallia.
demens R.-D., Posth., I, 272, 3. [*Actylia*] (1863).
- tranquilla* R.-D., Posth., I, 271, 2. [*Actylia*] (1863).
- larvicola** R.-D.***), Myod., 166, 24. [*Phyrcf*] (1830). Gallia.

*) Cosmotriche potatoaria L.

**) Vanessa polychloros L.

***) Arctia caja L.

- laticella** Macq., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VII, 373, 20, t. X, f. 16. (1849); WALK., *Ins. Brit.*, II, 72, 122. [*Tachina*] (1853). Europacentr.
- lepida** R.-D., *Myod.*, 177, 1. [*Carelia*] (1830) et *Annal. Soc. entom. France*, (2), V, 614, 1. [*Melibaea*] (1847); Macq., *Soc. Sci. Lille*, 1833, 298, 8. [*Stenomectopia*] (1834) et *Suit. à Buff.*, II, 108, 10. [*Stenomectopia*] (1835). Gallia.
- levicula** Macq., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VII, 404, 76, t. XI, f. 3. (1849). Europacentr.
- levis** Macq., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VII, 389, 50, t. XI, f. 23. (1849). Gallia.
- locuples** R.-D., *Posth.*, I, 303, 1. [*Eumca*] (1863). Gallia.
luctuosa R.-D., *Posth.*, I, 304, 3. [*Eumca*] (1863).
marginalis R.-D., *Posth.*, I, 304, 4. [*Eumca*] (1863).
puberula R.-D., *Posth.*, I, 304, 5. [*Eumca*] (1863).
virida R.-D., *Posth.*, I, 303, 2. [*Eumca*] (1863).
- longicornis** Macq., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VII, 411, 90, t. XII, f. 18. (1849). Europacentr.
- luctuosa* R.-D. **locuples** R.-D.
- ludibunda** R.-D., *Annal. Soc. entom. France*, (2), V, 272. [*Dorbina*] (1847). Gallia.
- luteipalpis** R.-D., *Posth.*, I, 290, 1. [*Cnossia*] (1863). Gallia.
- lutescens** Macq., *Soc. Sci. Lille*, 1833, 289, 9. [*Masicera*] (1834). Gallia.
- Macquarti** R.-D., *Myod.*, 163, 16. [*Phryxæ*] (1830); Macq., *Soc. Sci. Lille*, 1833, 289, 10. [*Masicera*] (1834). Gallia.
- macrocera* Macq. = **macrura** R.-D.
- macrura** R.-D., *Myod.*, 178, 6. [*Carelia macroura*] (1830). Gallia.
macrocera Macq., *Soc. Sci. Lille*, 1833, 299, 11. [*Stenomectopia*] (1834); R.-D., *Annal. Soc. entom. France*, (2), V, 278, 5. [*Carelia*] (1847).
- magnicornis** ZETT., *Ins. Lapp.*, 644, 42. [*Tachina*] (1838) et *Dipt. Scand.*, III, 1141, 139. (1844), XII, 6124, 139. [*Tachina*] (1859); BOSSQ., *Finnl. Insekt.*, II, 85, 86. [*Tachina*] (1866). Europa sept.
- major** Macq., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VII, 381, 34, t. XI, f. 8. (1849). Gallia.
- marginalis* R.-D. **locuples** R.-D.
- minuta** Macq., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VII, 386, 43, t. XI, f. 19. (1849). Europacentr.
- minuta** Macq., *Suit. à Buff.*, II, 138, 22. [*Lydella*] (1835). Gallia.
- montana** R.-D.?). *Posth.*, I, 286, 1. [*Elbaea*] (1863). Gallia.
- muscida* R.-D. **fuscipennis** R.-D.
- myioïdea** R.-D., *Myod.*, 114, 7. [*Lydella*] (1830). Gallia.
- myioïdea** R.-D., *Myod.*, 184, 2. [*Smidtia*] (1830), *Annal. Soc. entom. France*, (2), V, 596, 3. [*Smidtia*] (1847) et *Posth.*, I, 296, 4. [*Smidtia*] (1863); Macq., *Soc. Sci. Lille*, 1833, 301, 17. [*Stenomectopia*] (1834). Gallia.

*) *Plusia* sp. (illustris).

- nectarea** MEG., S. B., IV, 392, 265, [*Tachina*] (1824) et VII, 256, 36, (1838). Europaeentr.
- nigricornis** R.-D., Myod., 115, 9, [*Lydella*] (1830). Gallia.
- nigripalpis** R.-D. = **fuscipennis** R.-D.
- nigrita** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 607, 11, [*Haebueria*] (1847) et Posth., I, 283, 8, [*Haebueria*] (1863). Gallia.
- nitens** R.-D., Myod., 185, 1, [*Aplomyia*] (1830). Gallia.
- nitida** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 401, 72, t. XI, f. 3, (1849). Gallia.
- nitida** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 273, [*Dorbini*] (1847). Gallia.
- nitida** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 611, 19, [*Haebueria*] (1847). Gallia.
- nitida** R.-D., Myod., 113, 3, [*Lydella*] (1830). Gallia.
- nitida** R.-D. = **aestivalis** R.-D.
- nitida** R.-D. = **vernalis** R.-D.
- noctuarum** R.-D. = **aurifrons** R.-D.
- notata** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 377, 26, t. XI, f. 6, (1849). Europaeentr.
- notata** R.-D., Posth., I, 285, 11, [*Haebueria*] (1863). Gallia.
- subrotundata** R.-D. (nec 1830), Annal. Soc. entom. France, (2), V, 615, 3, [*Melibaea*] (1847).
- obscurata** R.-D. = **aurulenta** R.-D.
- obsequiosa** R.-D., Posth., I, 292, 1, [*Temesia*] (1863). Gallia.
- ornaticornis** ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6125, 140-41, [*Tachina*] (1859). Scandinavia.
- pallidicornis** BIG., Annal. Soc. entom. France, (6), I, 366, (1881). Gallia.
- pallidipalpis** R.-D., Myod., 114, 8, [*Lydella*] (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 272, 11, [*Lydella*] (1834) et Suit. à Buff., II, 135, 9, [*Lydella*] (1835). Gallia.
- pallidipes** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 610, 18, [*Haebueria*] (1847). Gallia.
- parvula** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 410, 88, t. XI, f. 23, (1849). Gallia.
- pertinax** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 371, 15, (1849). Europaeentr.
- platycera** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 370, 14, t. X, f. 12, (1849). Gallia.
- plusiae** R.-D.^{*)}, Myod., 180, 12, [*Carcelia*] (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2), V, 604, 6, [*Haebueria*] (1847). Gallia.
- puberula** R.-D. = **locuples** R.-D.
- puella** MEG., S. B., VII, 258, 30, (1838). Europaeentr.
- pusilla** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 377, 27, t. XI, f. 7, (1849). Europaeentr.
- pusilla** ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6124, 139-40, [*Tachina*] (1859). Scandinavia.
- rapida** R.-D., Myod., 180, 13, [*Carcelia*] (1830). Gallia.
- rectinervis** R.-D. = **acronictae** R.-D.

*) *Abrostola asclepiadis* SCHULZ.

- rotundaticornis** ZETT., Dipt. Scand., III. 1143. 141. [*Tachina*] (1844). Scandinavia.
rotundicornis SCHIX., F. A., I. 470. (1863).
- rufisquamata** MACQ., Suit. à Buff., II. 136. 13. [*Lydeella*] (1835). Gallia.
- rufiventris** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 380. 32. 1. Gallia.
- rufotibialis** ZETT., Dipt. Scand., XII. 4696. 106-7. (1835) et XIII. Scandinavia.
 6103. 106-7. [*Tachina*] (1859).
- rugifrons** v. ROS., Württemb. Corubl., I. 58. [*Tachina*] (1840). Europacentr.
ruralis R.-D. **Duponcheli** R.-D.
- rustica** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 608. 13. [*Hachnec-* Gallia.
ria] (1847) et Posth., I. 261. 4. (1863).
- scutellaris** R.-D., Myod., 115. 12. [*Lydeella*] (1830); MACQ., Soc. Sci. Gallia.
 Lille, 1833. 273. 17. [*Lydeella*] (1834), Suit. à Buff., II. 135. 11.
 [*Lydeella*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 407. 81.
 1. XI. f. 88. (1849).
- scutellaris* R.-D. (*Phorc.*) **acronictae** R.-D.
- scutellata** MACQ., Suit. à Buff., II. 136. 15. [*Lydeella*] (1835). Gallia.
- sepium** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 375. 23. 1. XI. Gallia.
 f. 4. (1849).
- sepium* R.-D. - **vernalis** R.-D.
- silvatica* R.-D. - **fugax** R.-D.
- simplex** R.-D., Posth., I. 285. 10. [*Hachnecia*] (1863). Gallia.
- singularis** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 396. 63. 1. Europacentr.
 XII. f. 7. (1849).
- sprennda** ZETT., Dipt. Scand., III. 1122. 119. [*Tachina*] (1844). Scandinavia.
- straminifrons** ZETT., Dipt. Scand., III. 1143. 142. [*Tachina*] (1844). Scandinavia.
- sabanea* R.-D. - **Duponcheli** R.-D.
- subglabra* R.-D. **acronictae** R.-D.
- subpruinosa** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6141. 187-88. [*Tachina*] Scandinavia.
 (1859).
- sabrotundata* R.-D. **notata** R.-D.
- superba** R.-D., Myod., 164. 18. [*Prycei*] (1830). Gallia.
- terminalis** MACQ., Suit. à Buff., II. 136. 12. [*Lydeella*] (1815) et Annal. Gallia.
 Soc. entom. France, (2). VII. 396. 62. (1849).
- terminalis** R.-D., Posth., I. 261. 5. (1863). Gallia.
- tibialis** R.-D., Posth., I. 291. 1. [*Eurygela*] (1863). Gallia.
vicida R.-D., Posth., I. 291. 2. [*Eurygela*] (1863).
- tranquilla* R.-D. - **laeta** R.-D.
- tristis* R.-D. **fuscipennis** R.-D.
- uticola** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 383. 37. 1. XI. Europacentr.
 f. 15. (1849).
- velox** R.-D., Posth., I. 317. 1. [*Herilla*] (1863). Gallia.
- vernalis** R.-D., Myod., 183. 1. [*Smidtia*] (1830), Annal. Soc. entom. Gallia.
 France, (2). V. 594. 1. [*Smidtia*] (1847) et Posth., I. 294. 1.
 [*Smidtia*] (1863); MACQ., Suit. à Buff., II. 110. 21. [*Stenomectopia*]
 (1835).
nitida R.-D., Posth., I. 295. 1. [*Smidtia*] (1863).

- sepium* R.-D., Posth., I, 296, 3, [*Smidtia*] (1863).
- villica** ZETT., Ins. Lapp., 644, 45, [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III, 1160, 161, [*Tachina*] (1844); BOXSÖ., Finnl. Insekt., II, 89, 94, [*Tachina*] (1866); MEUNIER, Bull. Soc. entom. France, 1892, CCVIII, [*Macropalpus*] (1892).
- vida** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 385, 42, t. XI, f. 2, (1849). Gallia.
- civida* R.-D. (*Eum.*) — **locuples** R.-D.
- civida* R.-D. (*Eur.*) = **tibialis** R.-D.
- vida** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 602, 2, [*Hachueria*] (1847) et Posth., I, 282, 7, [*Hachueria*] (1863). Gallia.
- volatica** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 414, 95, t. XII, f. 22, (1849); WALK., Ins. Brit., II, 84, 149, [*Tachina*] (1853). Europacentr.
- volucris** R.-D., Posth., I, 250, 1, [*Drino*] (1863). Gallia.
- Winthemi** R.-D., Myod., 148, 4, [*Erycia*] (1830). Gallia.
- zonaria** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 617, 6, [*Melibaca*] (1847) et Posth., I, 298, 1, [*Pholoë*] (1863). Gallia.
- zonata** R.-D., Myod., 185, 2, [*Aplomyia*] (1830). Gallia.
- sp. indet.**, GINSENX., Entom. Nachricht., XI, 3, VII, t. I, f. 4, (1885); MÜK. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXV, 321, 7, (1885) et Entom. Nachricht., XII, 201, 1, (1886). Europacentr.

Phryno

R.-D., Myod., 143, I, (1820) et Posth., I, 540, I, (1863). s. str.

Cyzenis R.-D., Posth., I, 544, II, (1863).

Erorista s. str., B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 87, (1849) et LVIII, 318, (1891).

Lovria R.-D., Posth., I, 896, I, (1863).

agilis R.-D. — **vetula** MEIG.

- alacris** MEIG., S. B., IV, 331, 159, [*Tachina*] (1824) et VII, 256, 20, (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 301, 16, [*Stenomectopia*] (1834); SUIJ. à BUFF., II, 110, 19, [*Stenomectopia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 364, 3, t. X, f. 3, [*Erorista*] (1849); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 609, 15, [*Hachueria*] (1847) et Posth., I, 266, 13, [*Erorista*] (1863); SEMX., F. A., I, 466, [*Erorista*] (1862); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 131, (1900); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 158, 1, (1900). Europacentr. et mer.
- crinita* ROXD., Dipt. ital. Prodr., III, 142, 29, [*Erorista*] (1859); SEMX., F. A., I, 458, [*Erorista*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. I, f. 9, [*Erorista*] (1889) et LVIII, 318, [*Erorista*] (1891); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI, 205, nota [*Erorista*] (1901) et Wien. entom. Zeitg., XXI, 144, 18, [*Erorista*] (1902).

- auriculata* R.-D. **vetula** MEIG.
basalis MEIG. **vetula** MEIG.
branca R.-D. **vetula** MEIG.
cinerella R.-D. **vetula** MEIG.
crinita ROND. **alacris** MEIG.
fulvipes ROND. **vetula** MEIG.
- ? **hemisphaerica** R.-D., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VI, 436, 2. Gallia.
 [*Eurygaster*], *acc.* 1830, (1848) et *Posth.*, I, 545, 1 et II, errata.
 [*Cyzicus*] (1863).
cernalis R.-D., *Posth.*, I, 545, 2. [*Cyzicus*] (1863).
- maga* R.-D. **vetula** MEIG.
pallipes FALL. **vetula** MEIG.
- perturbans** ZETT., *Dipt. Scand.*, III, 1135, 133, (1844) et XII, 4700. Europacentr.
 133. [*Tachina*] (1855); SCHN., *F. A.*, I, 468. [*Erorista*] (1862); et sept.
 BONSD., *Finnl. Insekt.*, II, 83, 83. [*Tachina*] (1866); PAND., *Rev.*
entom., XV, 11, 12. [*Erorista*] (1896).
- popularis** MEIG., *S. B.*, IV, 393, 267. [*Tachina*] (1824) et VII, 256. Europacentr.
 41. [*Erorista*] (1838); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, 318.
 [*Erorista*] (1891).
- ? **rustica** R.-D., *Myod.*, 143, 1, (1830); MACQ., *Soc. Sci. Lille*, 1833. Gallia.
 290, 1, t. IV, f. 9. [*Eurygaster*] (1834) et *Suit. à Buff.*, II, 116.
 1. [*Eurygaster*] (1835).
- cernalis* R.-D. **hemisphaerica** R.-D.
- vetula** MEIG., *S. B.*, IV, 399, 279. [*Tachina*] (1824) et VII, 256, 49. Europacentr.
 [*Erorista*] (1838); MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VII, et mer.
 391, 53, t. XII, f. 1. [*Erorista*] (1849); ROND., *Dipt. ital. Prodr.*,
 III, 132, 12. [*Erorista*] (1859); SCHN., *F. A.*, I, 461. [*Erorista*]
 (1862); R.-D., *Posth.*, I, 541, 1, (1863); JAROSCH., *Trudy Naturf.*
Ges. Karkoff, 1883, 313, 30. [*Erorista*] (1883); MEADE, *Entom.*
Monthly Mag., (2), II, 328. [*Erorista*] (1891); B. B., *Denkschr.*
Akad. Wien, LVIII, 318. [*Erorista*] (1891); PAND., *Rev. entom.*,
 XV, 29, 47. [*Erorista*] (1896).
- agilis* R.-D., *Myod.*, 143, 2, (1830), *Annal. Soc. entom. France*,
 (2), VI, 433, 1, (1848) et *Posth.*, I, 542, 3, 897, 3. [*Loevia*]
 et II, 918, (1863); MACQ., *Suit. à Buff.*, II, 116, 2, t. XIV, f.
 11. [*Eurygaster*] (1835); VILLEX., *Bull. Soc. entom. France*,
 1900, 161. [*Erorista*] (1900).
- auriculata* R.-D., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VI, 434, 2.
 (1848) et *Posth.*, I, 342, 2, (1863).
- basalis* MEIG., *S. B.*, VII, 259, 47. [*Erorista*] (1838).
- branca* R.-D., *Myod.*, 144, 3, (1830), *Annal. Soc. entom. France*,
 (2), VI, 434, 3, (1848) et *Posth.*, I, 898, 4. [*Loevia*] (1863).
- cinerella* R.-D., *Posth.*, I, 897, 2. [*Loevia*] (1863).
- fulvipes* ROND., *Dipt. ital. Prodr.*, III, 131, 11. [*Erorista*] (1859);
 B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, 318. [*Erorista*] (1891).
- maga* R.-D., *Posth.*, I, 896, 1. [*Loevia*] (1863).
- pallipes* p. p. FALL., *Dipt. Suec. Muse.*, 22, 44. [*Tachina*] (1820);

MEIG., S. B., IV, 411, 299. [*Tachina*] (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 290, 2. [*Eurygaster*] (1834) et Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 402, 73, 1, XII, t. 12. [*Eurygaster*] (1849).

Nemorilla

ROD., Dipt. ital. Prodr., I, 66, 21. (1856) et III, 99, 21. (1859).

A. *Pelmatomyia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 88. (1889) et LX, 113. (1893).

patellipalpis PAND. **phalaenaria** ROD.

phalaenaria ROD., Dipt. ital. Prodr., III, 137, 21. [*Exorista fulcurearia*] Europa centr.
(1859); JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XX, 23, 28. [*Exo-* et mer.
rista] (1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. 1, f. 15. (1889)
et LVIII, 436. (1891).

patellipalpis PAND., Rev. entom., XV, 19, 24. [*Exorista*] (1896);
VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900, 402. (1900).

B. *Hemimacqurtia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 102. (1893).

paradoxa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 102. *nota*. (1893). Europa centr.

C. *Nemorilla* s. str.

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 88. (1889) et LXIII, 328. (1891).

Aubaea R.-D., Posth., I, 185, IV. (1863).

Hesione R.-D., Posth., I, 199, X. (1863) *see* Soy. Verm.

Homotoma LLOY, Atti Istit. ven., (3), IX, 4338. [*Omotoma*]
(1864) *see* GUER, 1846. Hem.

Pitthaca R.-D., Posth., I, 188, V. (1863).

Thyella R.-D., Posth., I, 183, III. (1863).

antica ROD. **notabilis** MEIG.

angustipennis MEIG. **maculosa** MEIG.

aristalis ROD., Dipt. ital. Prodr., III, 101, 2. (1859). Italia.

aurulenta R.-D. **maculosa** MEIG.

campestris R.-D. **maculosa** MEIG.

cila R.-D. **maculosa** MEIG.

floralis FALL. **notabilis** MEIG.

floralis PAND. **maculosa** MEIG.

intermixta WALK. **notabilis** MEIG.

intersita WALK. **notabilis** MEIG.

- maculosa** MEIG. (*), S. B., IV. 265. 44. [*Tachina*] (1824) et VII. 222. Europa.
 28. [*Nemorca*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 100. 5. [*Nemorca*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 113. 5. [*Nemorca*] (1848); ROUD., Dipt. ital. Prodr., III. 101. 1. (1859); SCHIX., F. A., I. 454. [*Nemorca*] (1862); LLOY, Atti Istit. ven., (3). IX. 1338. [*Homotoma*] (1864); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. 279. 39. (1882) et V. 307. 5. (1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. I. f. 12. (1889) et LVIII. 328. (1891).
angustipennis MEIG., S. B., IV. 333. 162. [*Tachina*] (1824) et VII. 255. 16. [*Erorista*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 298. 7. [*Stenomelopia*] (1834), Suit. à Buff., II. 107. 1. [*Stenomelopia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 365. 4. t. X. f. 4. [*Erorista*] (1849); WALK., Ins. Brit., II. 74. 127. [*Tachina*] (1853); SCHIX., F. A., I. 466. [*Erorista*] (1862); SREIX, Entom. Nachricht., XXVI. 131. (1900); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900. 158. 6. (1900).
auriculata R.-D., Posth., I. 187. 4. [*Aubaea*] (1863).
campestris R.-D., Posth., I. 186. 2. [*Aubaea*] (1863).
cita R.-D., Posth., 186. 1. [*Aubaea*] (1863).
floralis PAND., Rev. entom., XV. 17. 20. [*Erorista*] (1896).
maculata MEIG. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 433. (1891).
microcera R.-D., Posth., I. 200. 1. [*Hesione*] (1863).
minuta R.-D., Posth., I. 188. 6. [*Aubaea*] (1863).
nigrita R.-D., Posth., I. 187. 5. [*Aubaea*] (1863).
pabulina MEIG., S. B., IV. 358. 207. [*Tachina*] (1824) et VII. 256. 28. [*Erorista*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 374. 21. t. XI. f. 1. [*Erorista*] (1849); R.-D., Posth., I. 184. 1. [*Thyella*] (1863); SREIX, Entom. Nachricht., XXVI. 145. (1900); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900. 158. 5. (1900).
pyralidis R.-D., Posth., I. 186. 3. [*Aubaea*] (1863).
microcera R.-D. **maculosa** MEIG.
minuta R.-D. **maculosa** MEIG.
morosa R.-D. **nebulosa** R.-D.
? **nebulosa** R.-D., Posth., I. 189. 1. [*Pithaeca*] (1863). Gallia.
morosa R.-D., Posth., I. 189. 2. [*Pithaeca*] (1863).
tristis R.-D. Posth., I. 190. 3. [*Pithaeca*] (1863).
nigrita R.-D. **maculosa** MEIG.
notabilis MEIG. (**), S. B., IV. 266. 45. [*Tachina*] (1824) et VII. 222. Europa.
 29. [*Nemorca*] (1838); SCHIX., F. A., I. 454. [*Nemorca*] (1862);

*) *Aerobasis consociella* HB., *Caeocia murinana* HB., *Pseocadia bipunctella* FABR., *Pyralis* sp., *Rhodophaea suaveola* ZK., *Sylepta ruralis* Scop.

**) *Notococlia Uddmanniana* L., *Plusia festucae* L., *Sylepta ruralis* Scop., *Tachyptylia populella* Cl.

WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I, 279, 40, (1882) et V, 307, 4, (1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 328, (1891).

amica RONDI., Dipt. ital. Prodr., III, 102, 3, (1859).

floralis FALL., p. p., Dipt. suec. Musc., 36, 74, [*Tachina*] (1820):

ZETT., Ins. Lapp., 646, 50, [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand.,

III, 1148, 148, (1844) et XIII, 6128, 148, [*Tachina*] (1859):

RONDI., Dipt. ital. Prodr., III, 102, 4, (1859); BOYSD., Fiml.

Insekt., II, 86, 89, [*Tachina*] (1866); MEADE, Entom. Monthly

Mag., (2), II, 265, (1891).

intermixta WALK., Ins. Brit., II, 39, 45, [*Tachina*] (1853).

intersita WALK., Ins. Brit., II, 72, 121, [*Tachina*] (1853).

pabulina MEIG., **maculosa** MEIG.

pumila RONDI., Dipt. ital. Prodr., III, 103, 5, (1859).

Italia.

pyralidis R.-D., **maculosa** MEIG.

tristis R.-D., = **nebulosa** R.-D.

D. *Chaetina*

RONDI., Dipt. ital. Prodr., III, 93, 20, [*Chaetina*] (1857).

Chaetilia RONDI. in litt. ap. RONDI.

fasciata PALM, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV, 416, 7, [*Nemorata*] Dalmatia, (1875).

palpalis RONDI., Dipt. ital. Prodr., III, 98, 1, (1859).

Italia.

soror RONDI., Dipt. ital. Prodr., III, 982, 2, (1859).

Italia.

E. *Alsomyia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 328, (1891) et LX, 113, (1893).

gymnodiscus B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 328, (1891). Europe-centr.

F. *Barcaria*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 88, (1889) et LX, 111, (1893).

mirabilis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 164, t. II, f. 19, (1889). Europe-centr.

Tryphera

MEIG., Syst. Beschreib., VII, 261, 48, (1838).^{*)}

Malpighiana LAOY, Atti Istît. ven., 63, IX, 1340, (1861).

? **Fischeri** GMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII, 103, 132, [*Tachina*] Russia sept., (1834) et XV, 675, (1842).

fulvipes MEIG., S. B., IV, 397, 275, [*Tachina*] (1824) et VII, 261, 5, Europe-centr., (1838).

^{*)} Genus p. p. promiscuum et dubiosum.

- grossicornis** ZETT., Ins. Lapp., 648, 59. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scandinavia.
Scand., III, 1151, 150. (1844), VIII, 3246, 150. [*Tachina*] (1849).
- interruptella** ZETT., Dipt. Scand., III, 1150, 149. [*Tachina*] (1844). Scandinavia.
- lugubris** MEIG.^{*)}, S. B., IV, 370, 227. [*Tachina*] (1824) et VII, 264. Europacentr.
4. (1838); ? Macq., Suit. à Buff., II, 110, 22. [*Stenomacropia*]
(1835); Lioy, Atti Istit. ven., (3), IX, 1340. [*Malpighina*] (1864);
B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. I, f. 17. (1889), V, Bonannia.
? **succincta** MEIG., S. B., VII, 264, 6. (1838); SCHN., F. A., 1525.
(1862); BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 459. (1893).
- succincta** MEIG. ? **lugubris** MEIG.

Paratryphera

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 388. (1891) et LX, 114. (1893).

Handlirschii B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 329. (1891). Alpes.

Epicampocera

Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 414, XVIII, (1849).

A. *Megalochaeta*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 87. (1889) et LVIII, 317. (1891).

ambulans MEIG. **conspersa** MEIG.

barbicultrix PAND. **conspersa** MEIG.

brachystoma B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 317. (1891). Europacentr.

conspersa MEIG., S. B., IV, 263, 41. [*Tachina*] (1824) et VII, 221. Europa.

20. [*Xemorea*] (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2),
VI, 93, 2, t. III, f. 7. [*Polidea*] (1848); STEIN, Entom. Nachricht.,
XXVI, 134. (1900).

ambulans MEIG., S. B., IV, 340, 174. [*Tachina*] (1824) et VII,
256, 38. [*Errorista*] (1838); ? ZETT., Dipt. Scand., III, 1161,
162. [*Tachina*] (1844); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII,
317. (1891).

barbicultrix PAND., Rev. entom., XV, 31, 2. [*Erigone*] (1896);
VULLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 402, 6. (1900).

Eggeri B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 164, t. I, f. 8.
(1889).

Eggeri B. B. = **conspersa** MEIG.

B. *Epicampocera s. str.*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 87. (1889) et LVIII, 317. (1891).

curricornis Macq. - **succincta** MEIG.

*) *Coscinia eribrunum* L., *Scodiona conspersaria* FABR.

- succineta* MEIG.^{*)} S. B., IV, 335, 166, t. XI, f. 9. [*Tachina*] (1824) Europacentr.
et VII, 256, 21. [*Errorista*] (1838); Macq., Annal. Soc. entom. et mer.
France, (2), VII, 415, t. t. XII, f. 23. (1849); Rond., Dipt. ital.
Prodr., III, 150, 1. (1859); SCHN., F. A., I, 457. (1862); R.-D.,
Posth., I, 301, 2. (1863); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II,
324, (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVII, t. I, f. 6, (1889)
et LVIII, 317, (1891); PAND., Rev. entom., XV, 14, 15. [*Errorista*]
(1896).
curricornis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 401,
71, t. XII, f. 11. [*Errorista*] (1849); SCHN., F. A., I, 457.
nola, (1862).

C. *Chaetomyia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 317, (1891) et LX, 112, (1893).

- crassiseta* Rond.^{**}, Dipt. ital. Prodr., III, 134, 15. [*Errorista*] (1859); Europacentr.
B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 317, (1891). et mer.
? iliaca RATZEB., Forstins., II, 125, 3. [*Tachina*] (1844); Mik et
WACHTL, Wien. entom. Zeitg., XIV, 239, f. (1895).
iliaca RATZEB. = ? *crassiseta* Rond.

D. *Eupogona*

ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI, 588, *nola* 2. [*Eipogona*] (1868).^{***})

laticeps PAND. -- *setifacies* Rond.

papilionis BRISCHKE -- *setifacies* Rond.

- setifacies* Rond.^{****}, Dipt. ital. Prodr., IV, 30, 18. [*Masicera*] (1861) Europacentr.
et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV, 52, 21. [*Masicera*] (1861); B. B., et mer.
Denkschr. Akad. Wien, LXI, t. I, f. 14, (1889); PAND., Rev.
entom., XV, 70, 1. [*Bigonichaeta*] (1896); HENDEL, Verh. zool-
bot. Ges. Wien, LI, 204, IV, (1901).

laticeps PAND., Rev. entom., XV, 104, 8. [*Peteina*] (1896).

papilionis BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, VI, 20. [*Ta-
china*] (1885).

Thelymyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 330, (1891) et LX, 115, (1893).

argentifera ZETT. = *demens* ZETT.

argenticera ZETT. -- *demens* ZETT.

- demens* ZETT., Dipt. Scand., III, 1108, 105. [*Tachina*] (1844); B. B., Europacentr.
Denkschr. Akad. Wien, LX, 219, (1893). et sept.

*) *Saturnia pavonia* L.

**) *Lymantria dispar* L., *Thaumetopoea processionea* L.

***) Nomen hoc in nomenclatoribus a Scudder et Waterhouse
editis prorsus desideratur.

****) *Papilio machaon* L.

albiceps ZETT. in litt. ap. ZETT.

argentiſera ZETT. (*ucc* MEIG.), Dipt. Scand., XII, 4699, (1855) et XIII, 6117, 130. [*Tachina*] (1859): BOXSÖ., Fiml. Insekt., II, 83, 82. [*Tachina*] (1866).

argentiſera ZETT., Dipt. Scand., III, 1133, 130. [*Tachina*] (1844).

Locwii B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 331, (1891) et LX, 115, (1893).

Locwii B. B. - **demens** ZETT.

Phryxe

R.-D., Myod., 158, IV, (1830).

Blepharidea ROXB., Dipt. ital. Prodr., I, 67. *nota*, (1856):
B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 88, (1889).

Tricholyga ROXB., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 207, (1865)
et XI, 583, (1868), *ucc* Prodr. I, 68.

A. *Ceratochaeta*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 92, (1889) et LX, 118, (1893).

Hemithava R.-D., Posth., I, 318, XXXII, (1863) *ucc* Dup.
1829, Lep.

caudata ROXB.*), Dipt. ital. Prodr., III, 139, 35. [*Exorista*] (1859): Europa-centr.
B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 338, (1891): PAND., Rev. et mer.
entom., XIV, 336, 4. [*Zenillia*] (1895).

erythrostroma HART.**), Jahresb. Fortschr. Forstwiss., II, 294, 25. Europa-centr.
[*Tachina*] (1838): R.-D., Posth., I, 319, 1. [*Hemithava*] (1863):
Mik et WACHTL, Wien. entom. Zeitg., XIV, 234, 19, (1895).

prima B. B.***), Denkschr. Akad. Wien, LVI, 165, t. II, f. 37, (1889) Europa-centr.
et LVIII, 338, (1891).

secunda B. B.****), Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 338, (1891). Europa-centr.

B. *Pseudophorocera*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 92, (1889) et LX, 118, (1893).

setigera B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 165, t. II, f. 38, (1889). Europa-centr.

*) *Thaumetopoea processionea* L.

**) *Dendrolimus pini* L., *Hyloicus pinastri* L.

***) *Psyche vicicella* SCHIFF.

****) *Thaumetopoea pityocampa* SCHIFF.

C. *Anoxygrampta*

Big., Bull. Soc. entom. France, (5), X, CL. (1880).

Pseudopericharta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 92.
(1889) et LX, 118, (1893).

hirta Big.⁵⁾, Bull. Soc. entom. France, (5), X, CL. (1880); B. B., Europacentr.
Denkschr. Akad. Wien, LX, 100, 41. (1893); BRÄUER, Sitzgsber. et mer.
Akad. Wien, CVII, 505, 93. (1898); HENDEL, Verh. zool.-bot.
Ges. Wien, LI, 207, VII. [*Blepharidea*] (1901).

major B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 338. [*Pseudo-*
pericharta] (1891).

var. rufoscutellata HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI, Russia.
208. (1901).

major B. B. = **hirta** Big.

minor B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 338. [*Pseudopericharta*] Europacentr.
(1891).

rufoscutellata HENDEL = **hirta** Big. *var.*

D. *Phryxæ* s. str.

Blumia R.-D., Posth., I, 468, IV. (1863).

Erinnia R.-D., Posth., I, 467, III. (1863) *em. Scudd.* 1882.

Eurygasterina LLOY, Mti Instil. ven., (3), IX, 1343. (1861)
em. Scudder 1882.

abnormis BRISCHKE = **vulgaris** FALL.

activa R.-D. = **vulgaris** FALL.

acstiva R.-D. = **vulgaris** FALL.

agilis R.-D. = **vulgaris** FALL.

aprita R.-D. = **vulgaris** FALL.

agricola R.-D. = **vulgaris** FALL.

albida R.-D. = **vulgaris** FALL.

ambigua R.-D. = **vulgaris** FALL.

anceps R.-D. = **vulgaris** FALL.

ancilla R.-D. = **vulgaris** FALL.

anilis R.-D. = **vulgaris** FALL.

auria R.-D. = **vulgaris** FALL.

appellata R.-D. = **vulgaris** FALL.

appendiculata R.-D. = **vulgaris** FALL.

aprica R.-D. = **vulgaris** FALL.

aprilina R.-D. = **vulgaris** FALL.

arideacea R.-D. = **vulgaris** FALL.

arvensis R.-D. = **vulgaris** FALL.

athaliæ R.-D. = **vulgaris** FALL.

atrata R.-D. = **vulgaris** FALL.

⁵⁾ *Heterogynis penella* Hb.

- abrata* R.-D. = **vulgaris** FALL.
aulax MACQ. = **vulgaris** FALL.
aurifacies R.-D. = **vulgaris** FALL.
aurifrons R.-D. = **vulgaris** FALL.
aurocincta R.-D. = **vulgaris** FALL.
aurulenta R.-D. = **vulgaris** FALL.
aurulenta bis R.-D. = **vulgaris** FALL.
austera R.-D. = **vulgaris** FALL.
acida R.-D. = **vulgaris** FALL.
basalis R.-D. = **vulgaris** FALL.
Bellicella R.-D. = **vulgaris** FALL.
Berecilla R.-D. = **vulgaris** FALL.
binotata R.-D. = **vulgaris** FALL.
Blondeli R.-D. = **vulgaris** FALL.
boscorum R.-D. = **vulgaris** FALL.
caesia R.-D. = **vulgaris** FALL.
camporum R.-D. = **vulgaris** FALL.
Carreli R.-D. = **vulgaris** FALL.
cauta R.-D. = **vulgaris** FALL.
ciliata R.-D. = **vulgaris** FALL.
cincta R.-D. = **vulgaris** FALL.
cinerella R.-D. = **vulgaris** FALL.
cita R.-D. = **vulgaris** FALL.
claripennis R.-D. = **vulgaris** FALL.
cognata R.-D. = **vulgaris** FALL.
commota R.-D. = **vulgaris** FALL.
compos R.-D. = **vulgaris** FALL.
compta R.-D. = **vulgaris** FALL.
concessa R.-D. = **vulgaris** FALL.
concolor R.-D. = **vulgaris** FALL.
conducta R.-D. = **vulgaris** FALL.
confusa R.-D. = **vulgaris** FALL.
conscia R.-D. = **vulgaris** FALL.
conscuta R.-D. = **vulgaris** FALL.
consentanea R.-D. = **vulgaris** FALL.
consobrina R.-D. = **vulgaris** FALL.
contenta R.-D. = **vulgaris** FALL.
cunctata R.-D. = **vulgaris** FALL.
debita R.-D. = **vulgaris** FALL.
decidua R.-D. = **vulgaris** FALL.
delata R.-D. = **vulgaris** FALL.
delusa R.-D. = **vulgaris** FALL.
depressa R.-D. = **vulgaris** FALL.
diligens R.-D. = **vulgaris** FALL.
discreta R.-D. = **vulgaris** FALL.
distant MACQ. = **vulgaris** FALL.
distincta R.-D. = **vulgaris** FALL.

- dolosa* R.-D. = *vulgaris* FALL.
duroctorum R.-D. = *vulgaris* FALL.
educata R.-D. = *vulgaris* FALL.
Educarsella R.-D. = *vulgaris* FALL.
egena R.-D. = *vulgaris* FALL.
electa R.-D. = *vulgaris* FALL.
elliptica R.-D. = *vulgaris* FALL.
erucastri R.-D. = *vulgaris* FALL.
erecta R.-D. = *vulgaris* FALL.
excitata R.-D. = *vulgaris* FALL.
exilis R.-D. = *vulgaris* FALL.
extrema R.-D. = *vulgaris* FALL.
fallax R.-D. = *vulgaris* FALL.
famula R.-D. = *vulgaris* FALL.
fatua R.-D. = *vulgaris* FALL.
fausta R.-D. = *vulgaris* FALL.
ferrugata R.-D. = *vulgaris* FALL.
fida R.-D. = *vulgaris* FALL.
flavibarbis R.-D. = *vulgaris* FALL.
florisquamis R.-D. = *vulgaris* FALL.
florida R.-D. = *vulgaris* FALL.
frontalis R.-D. = *vulgaris* FALL.
fugilica R.-D. = *vulgaris* FALL.
fuscifrons R.-D. = *vulgaris* FALL.
futilis R.-D. = *vulgaris* FALL.
germana R.-D. = *vulgaris* FALL.
glabrata R.-D. = *vulgaris* FALL.
grata R.-D. = *vulgaris* FALL.
grisella R.-D. = *vulgaris* FALL.
griseus R.-D. = *vulgaris* FALL.
Guerinella R.-D. = *vulgaris* FALL.
heraclei MEIG. = *vulgaris* FALL. var.
hilaris R.-D. = *vulgaris* FALL.
hirsuta OST.-SACK. = *vulgaris* FALL.
honesta R.-D. = *vulgaris* FALL.
hortensis R.-D. = *vulgaris* FALL.
ignota R.-D. = *vulgaris* FALL.
impatiens R.-D. = *vulgaris* FALL.
imprudens R.-D. = *vulgaris* FALL.
invaria R.-D. = *vulgaris* FALL.
inops R.-D. = *vulgaris* FALL.
insidiosa R.-D. = *vulgaris* FALL.
intacta R.-D. = *vulgaris* FALL.
integra R.-D. = *vulgaris* FALL.
judicata R.-D. = *vulgaris* FALL.
jussa R.-D. = *vulgaris* FALL.
lacta R.-D. = *vulgaris* FALL.

- lacrigata* R.-D. **vulgaris** FALL.
lateralis R.-D. **vulgaris** FALL.
larata R.-D. **vulgaris** FALL.
lepida R.-D. **vulgaris** FALL.
levis R.-D. **vulgaris** FALL.
libera R.-D. **vulgaris** FALL.
lubrica R.-D. **vulgaris** FALL.
luctuosa R.-D. **vulgaris** FALL.
lucoria R.-D. **vulgaris** FALL.
maculata R.-D. **vulgaris** FALL.
maesta R.-D. **vulgaris** FALL.
maialis R.-D. = **vulgaris** FALL.
mandata R.-D. = **vulgaris** FALL.
marginalis R.-D. **vulgaris** FALL.
meditata R.-D. = **vulgaris** FALL.
microcera R.-D. **vulgaris** FALL.
miniata R.-D. **vulgaris** FALL.
minuta R.-D. = **vulgaris** FALL.
miseria R.-D. = **vulgaris** FALL.
missa R.-D. = **vulgaris** FALL.
mitis R.-D. = **vulgaris** FALL.
modesta R.-D. = **vulgaris** FALL.
morosa R.-D. = **vulgaris** FALL.
mundata R.-D. = **vulgaris** FALL.
muscida R.-D. = **vulgaris** FALL.
myioidea R.-D. **vulgaris** FALL.
nana R.-D. **vulgaris** FALL.
neglecta R.-D. **vulgaris** FALL.
nemorum R.-D. **vulgaris** FALL.
nigra R.-D. **vulgaris** FALL.
nigrifrons R.-D. **vulgaris** FALL.
nigrita R.-D. **vulgaris** FALL.
nigrita bis R.-D. **vulgaris** FALL.
nitida R.-D. **vulgaris** FALL.
noctuarum R.-D. = **vulgaris** FALL.
notata R.-D. = **vulgaris** FALL.
nyctax R.-D. = **vulgaris** FALL.
nycta R.-D. = **vulgaris** FALL.
objecta R.-D. **vulgaris** FALL.
oblata R.-D. **vulgaris** FALL.
oblita R.-D. **vulgaris** FALL.
oblita bis R.-D. **vulgaris** FALL.
obscurata R.-D. = **vulgaris** FALL.
obsequens R.-D. = **vulgaris** FALL.
obscuta R.-D. **vulgaris** FALL.
occlusa R.-D. **vulgaris** FALL.
offensa R.-D. **vulgaris** FALL.

- officiosa* R.-D. = **vulgaris** FALL.
operata R.-D. = **vulgaris** FALL.
opportuna R.-D. = **vulgaris** FALL.
opposita R.-D. = **vulgaris** FALL.
ostendata R.-D. = **vulgaris** FALL.
pabulina R.-D. = **vulgaris** FALL.
pacifica R.-D. = **vulgaris** FALL.
palesionidea R.-D. = **vulgaris** FALL.
parca MACQ. = **vulgaris** FALL.
pauperata R.-D. = **vulgaris** FALL.
parida R.-D. = **vulgaris** FALL.
picridis R.-D. = **vulgaris** FALL.
placida R.-D. = **vulgaris** FALL.
potatoria R.-D. = **vulgaris** FALL.
praeceps R.-D. = **vulgaris** FALL.
praeceor R.-D. = **vulgaris** FALL.
praefixa R.-D. = **vulgaris** FALL.
praelensis R.-D. = **vulgaris** FALL.
probata R.-D. = **vulgaris** FALL.
prompta R.-D. = **vulgaris** FALL.
properata R.-D. = **vulgaris** FALL.
provida R.-D. = **vulgaris** FALL.
proxima R.-D. = **vulgaris** FALL.
pruinosa R.-D. = **vulgaris** FALL.
puella R.-D. = **vulgaris** FALL.
punctata R.-D. = **vulgaris** FALL.
papirorea R.-D. = **vulgaris** FALL.
pygmaea R.-D. = **vulgaris** FALL.
quadriguttata R.-D. = **vulgaris** FALL.
quadrillum R.-D. = **vulgaris** FALL.
quadrinotata R.-D. = **vulgaris** FALL.
quiesita R.-D. = **vulgaris** FALL.
quiesca R.-D. = **vulgaris** FALL.
rapida R.-D. = **vulgaris** FALL.
rectella R.-D. = **vulgaris** FALL.
relata R.-D. = **vulgaris** FALL.
retusa R.-D. = **vulgaris** FALL.
rotundata R.-D. = **vulgaris** FALL.
rubella R.-D. = **vulgaris** FALL.
ruralis R.-D. = **vulgaris** FALL.
rustica R.-D. = **vulgaris** FALL.
sacpinum R.-D. = **vulgaris** FALL.
scutellaris R.-D. = **vulgaris** FALL.
scutellata R.-D. = **vulgaris** FALL.
scutrice R.-D. = **vulgaris** FALL.
scilata R.-D. = **vulgaris** FALL.
selecta R.-D. = **vulgaris** FALL.

- scutis* R.-D. = **vulgaris** FALL.
serena R.-D. = **vulgaris** FALL.
serra R.-D. = **vulgaris** FALL.
serera R.-D. = **vulgaris** FALL.
signata R.-D. = **vulgaris** FALL.
sibirica R.-D. = **vulgaris** FALL.
silvestris R.-D. = **vulgaris** FALL.
similis R.-D. = **vulgaris** FALL.
sobria R.-D. = **vulgaris** FALL.
socia R.-D. = **vulgaris** FALL.
sodalis R.-D. = **vulgaris** FALL.
solata R.-D. = **vulgaris** FALL.
solers R.-D. = **vulgaris** FALL.
sororella R.-D. = **vulgaris** FALL.
sortila R.-D. = **vulgaris** FALL.
specta R.-D. = **vulgaris** FALL.
stimulata R.-D. = **vulgaris** FALL.
stramineifrons BEISCHKE = ? **vulgaris** FALL.
stridens R.-D. = **vulgaris** FALL.
stygina R.-D. = **vulgaris** FALL.
subrotundata R.-D. = **vulgaris** FALL.
subtilis R.-D. = **vulgaris** FALL.
tenera R.-D. = **vulgaris** FALL.
teneraria R.-D. = **vulgaris** FALL.
tenebricosa R.-D. = **vulgaris** FALL.
terminalis R.-D. = **vulgaris** FALL.
timida R.-D. = **vulgaris** FALL.
tranquilla R.-D. = **vulgaris** FALL.
transita R.-D. = **vulgaris** FALL.
tremula R.-D. = **vulgaris** FALL.
trepida R.-D. = **vulgaris** FALL.
tristis R.-D. = **vulgaris** FALL.
unguiculata HEND., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI, 207, VI. [*Ble-* Europaentr.
pharidea] (1901).
urbana MEIG. = **vulgaris** FALL.
urbana R.-D. = **vulgaris** FALL.
vafra R.-D. = **vulgaris** FALL.
vaga R.-D. = **vulgaris** FALL.
valida R.-D. = **vulgaris** FALL.
vancssæe R.-D. = **vulgaris** FALL.
velox R.-D. = **vulgaris** FALL.
venalis R.-D. = **vulgaris** FALL.
resana R.-D. = **vulgaris** FALL.
vicina R.-D. = **vulgaris** FALL.
vigil R.-D. = **vulgaris** FALL.
villana R.-D. = **vulgaris** FALL.
villica R.-D. = **vulgaris** FALL.

cinosa R.-D. = **vulgaris** FALL.

virgo R.-D. = **vulgaris** FALL.

rolatilis R.-D. = **vulgaris** FALL.

vulgaris FALL.*1. Vet. Acad. Handl., XXXI. 275. [*Tachina*] (1810) et Dipt. suoc. Musc., 30. 62. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV. 391. 264. [*Tachina*] (1824) et VII. 255. 15. [*Erorista*] (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 291. 3. [*Eurygaster*] (1834). Suit. à Buff., II. 118. 7. [*Eurygaster*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 387. 64. 1. XII. f. 7. [*Erorista*] (1849); DAULB., Skand. Ins. sk. og nytta, 318. 216. [*Tachina*] (1837); ZETT., Ins. Lapp., 644. 41. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III. 1139. 137. (1844), XIII. 6123. 137. [*Tachina*] (1859); HART., Jahresb. Fortsch. Forstwiss., I. 293. 23. [*Tachina*] (1838); v. ROS., Württemb. Corbl., I. 57. nota. [*Tachina*] (1840); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 610. [*Masicera*] (1840); WALK., Ins. Brit., II. 85. 151. [*Tachina*] (1853); ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 140. 26. [*Erorista*] (1859) et Atti Soc. ital. Sci. nat., VIII. 207. (1865), XI. 583. 8. [*Tricholyga*] (1868); S. HIN., F. A., I. 458. [*Erorista*] (1862); R.-D., Posth., I. 358. 59. (1863); BOYSD., Finl. Insekt., II. 84. 84. [*Tachina*] (1866); WFLP., Entom. Tijdschr., (2). IV. 152. [*Erorista*] (1869); MEADE., Entom., XIV. 287. (1881), XV. 24. [*Erorista*] (1882) et Entom. Monthly Mag., (2). II. 326. [*Erorista*] (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien., LVI. t. II. f. 18. (1889) et LVIII. 338. [*Blepharidea*] (1891); MIK et WACHTL., Wien. entom. Zeitg., XIV. 233. [*Blepharidea*] (1895); PAND., Rev. entom., XIV. 336. 5 et 337. 5 bis. [*Zenillia*] (1895) et XV. 21. 30. [*Erorista*] (1896); GIARD., Bull. Soc. entom. France, CLXXX. [*Erorista*] (1894); COQUILL., Rev. Tachin. N. A., 93. [*Erorista*] (1897); GÜRSCH., Entom. Nachricht., XXV. 178. II. [*Blepharidea*] (1899); WAINW., Entom. Monthly Mag., (2). XII. 213. [*Blepharidea*] (1901).

abnormis BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, VI. 20. [*Phorocera*] (1885).

*) *Abraxas grossulariata* L., *Adopaea lineola* O., *Aporia crataegi* L., *Araschnia levana* L. et *prosa* L., *Argynnis Lathonia* L., *Arctia Hebe* L., *Boarmia lariciaria* DEL., *Brotolomia meticulosa* L., *Calymnia trapezina* L., *Cosmotriche potatoria* L., *Cuenllia anthemidis* G., *Asteris Scudder*, et *verbasci* L., *Dendrolimus pini* L., *Ephyra linearia* Hb., *Epineuronia cespitis* F., *Euchloë cordaminea* L., *Euplexia lucipara* L., *Hybernia defoliaria* C., *Hyloicus pinastri* L., *Hylophila prasinana* L., *Leucania albipuncta* F. et *lytargyria* Esch., *Mamestra advena* F., *persicariae* L. et *reticulata* Vill., *Melitaea Athalia* Rott., *Metopsilus porcellus* L., *Naenia typica* L., *Parasemia plantaginis* L., *Pieris brassicae* L., *Daphnidae* L. et *rapae* L., *Plusia gamma* L., *Thaumnonoma Wavaria* L., *Thaumetopoea pityocampa* Scudder, et *processionea* L., *Toxocampa pastinum* Tr., *Vanessa Antiopa* L., *Io* L., *urticae* L. et *xanthomelas* Esch., *Zygaena Achilleae* Esch. ab. *Janthina* et *Filipendulae* L. — ? *Procrustes coriaceus* L.

- actica* R.-D., Posth., I, 352, 47. (1863).
- aestiva* R.-D., Posth., I, 335, 16. (1863).
- agilis* R.-D., Myod., 167, 27. (1830) et Posth., I, 350, 44. (1863):
Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 287, 4, t. IV, f. 9. [*Masicera*]
(1834), Suit à Buff., II, 120, 5, t. XIV, f. 12. [*Masicera*]
(1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 399, 68, t.
XII, f. 7. [*Exorista*] (1849): Stenx, Entom. Nachricht., XXXI,
131. (1900).
- agula* R.-D., Posth., I, 425, 176. (1863).
- agricola* R.-D., Posth., I, 398, 130. (1863).
- albida* R.-D., Posth., I, 440, 206. (1863).
- ambigua* R.-D., Posth., I, 390, 116. (1863).
- anceps* R.-D., Posth., I, 342, 30. (1863).
- ancilla* R.-D., Posth., I, 403, 137. (1863).
- anilis* R.-D., Posth., I, 455, 233. (1863).
- anxia* R.-D., Posth., I, 415, 158. (1863).
- appellata* R.-D., Posth., I, 391, 117. (1863).
- appendiculata* R.-D., Posth., I, 340, 25. (1863).
- aprica* R.-D., Posth., I, 337, 19. (1863).
- aprilina* R.-D., Posth., I, 349, 43. (1863).
- ardeacea* R.-D., Posth., I, 433, 191. (1863).
- arvensis* R.-D., Myod., 169, 33. (1830) et Posth., I, 458, 240.
(1863).
- athaliae* R.-D., Myod., 167, 28. (1830) et Posth., I, 326. (1863).
- atrata* R.-D., Posth., I, 399, 131. (1863).
- atrata bis* R.-D., Posth., I, 457, 237. (1863).
- audax* Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 388, 48, t.
XI, f. 16. [*Exorista*] (1849): WALK., Ins. Brit., II, 86, 153.
[*Tachina*] (1853).
- aurifacies* R.-D., Posth., I, 329, 1. (1863).
- aurifrons* R.-D., Posth., I, 349, 42. (1863).
- aurocincta* R.-D., Posth., I, 364, 69. (1863).
- aurulenta* R.-D., Posth., I, 341, 28. (1863).
- aurulenta bis* R.-D., Posth., I, 348, 41. (1863).
- austera* R.-D., Posth., I, 366, 72. (1863).
- arida* R.-D., Posth., I, 437, 200. (1863).
- basalis* R.-D., Posth., I, 418, 165. (1863).
- Belleveilla* R.-D., Posth., I, 382, 102. (1863).
- Berceella* R.-D., Posth., I, 384, 104. (1863).
- binotata* R.-D., Posth., I, 364, 68. (1863).
- Blondeli* R.-D., Myod., 161, 10. (1830), Annal. Soc. entom.
France, (2), V, 616, 4. [*Melibaca*] (1847) et Posth., I, 333, 9.
(1863); Macq., Suit à Buff., II, 122, 13. [*Masicera*] (1835).
- boscorum* R.-D., Posth., I, 398, 129. (1863).
- caesia* R.-D., Posth., I, 384, 105. (1863).
- camporum* R.-D., Posth., I, 344, 34. (1863).
- Carceli* R.-D., Myod., 170, 36. (1830) et Posth., I, 457, 239. (1863).

- cauda* R.-D., Posth., I. 375. 88. (1863).
ciliata R.-D., Myod., 159. 4. (1830) et Posth., I. 405. 141. (1863).
cincta R.-D., Posth., I. 387. 110. (1863).
cinctella R.-D., Posth., I. 360. 61. (1863).
cita R.-D., Posth., I. 395. 125. (1863).
claripennis R.-D., Posth., I. 372. 83. (1863).
cognata R.-D., Posth., I. 408. 146. (1863).
concolor R.-D., Posth., I. 422. 172. (1863).
compos R.-D., Posth., I. 409. 149. (1863).
compta R.-D., Posth., I. 438. 202. (1863).
concessa R.-D., Posth., I. 414. 156. (1863).
concolor R.-D., Posth., I. 334. 12. (1863).
conducta R.-D., Posth., I. 393. 122. (1863).
confusa R.-D., Posth., I. 441. 208. (1863).
conscia R.-D., Posth., I. 353. 49. (1863).
consecuta R.-D., Posth., I. 339. 23. (1863).
conscutanea R.-D., Posth., I. 400. 133. (1863).
consobrina R.-D., Myod., 160. 7. (1830) et Posth., I. 331. 6. (1863).
contenta R.-D., Posth., I. 417. 161. (1863).
concutata R.-D., Posth., I. 353. 50. (1863).
debita R.-D., Posth., I. 380. 97. (1863).
devidua R.-D., Posth., I. 417. 162. (1863).
delata R.-D., Posth., I. 361. 64. (1863).
delusa R.-D., Posth., I. 431. 187. (1863).
depressa R.-D., Myod., 162. 14. (1830) et Posth., I. 394. 123. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 121. 8. [*Masicera*] (1835).
diligens R.-D., Posth., I. 454. 232. (1863).
discreta R.-D., Posth., I. 413. 154. (1863).
distans Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 387. 45. t. XI. f. 21. [*Evorista*] (1849).
distincta R.-D., Posth., I. 435. 196. (1863).
dolosa R.-D., Posth., I. 332. 8. (1863).
damictorum R.-D., Posth., I. 418. 164. (1863).
educata R.-D., Posth., I. 388. 99. (1863).
Edwardsella R.-D., Posth., I. 438. 201. (1863).
egena R.-D., Posth., I. 447. 220. (1863).
electa R.-D., Posth., I. 420. 168. (1863).
elliptica R.-D., Posth., I. 419. 166. (1863).
erucastri R.-D., Posth., I. 412. 153. (1863).
erecta R.-D., Posth., I. 351. 45. (1863).
excitata R.-D., Posth., I. 356. 55. (1863).
exilis R.-D., Posth., I. 446. 216. (1863).
extrema R.-D., Posth., I. 442. 210. (1863).
fallax R.-D., Posth., I. 447. 219. (1863).
famula R.-D., Posth., I. 430. 185. (1863).
fatua R.-D., Posth., I. 374. 86. (1863).

- fausta* R.-D., Posth., I, 416, 159. (1863).
ferrugata R.-D., Posth., I, 452, 228. (1863).
fila R.-D., Posth., I, 416, 160. (1863).
flaribarbis R.-D., Posth., I, 385, 107. (1863).
flarisquamis R.-D., Posth., I, 368, 75. (1863).
florida R.-D., Myod., 166, 25. (1830) et Posth., I, 346, 38. (1863) :
 Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 287, 5. [*Masicera*] (1834), Suit.
 à Buff., H. 120, 4. [*Masicera*] (1835) et Annal. Soc. entom.
 France, (2), VII, 409, 86, t. XI, f. 5. [*Erorista*] (1849) :
 BLANCH., Hist. nat. ins., III, 610. [*Masicera*] (1840).
frontalis R.-D., Myod., 169, 35. (1830) et Posth., I, 323. (1863).
fugitiva R.-D., Posth., I, 411, 151. (1863).
fuscifrons R.-D., Posth., I, 377, 91. (1863).
fulilis R.-D., Posth., I, 441, 209. (1863).
germana R.-D., Posth., I, 334, 13. (1863).
glabrata R.-D., Posth., I, 450, 225. (1863).
grata R.-D., Posth., I, 402, 136. (1863).
grisella R.-D., Posth., I, 339, 24. (1863).
griseuscus R.-D., Myod., 163, 15. (1830) et Posth., I, 343, 31.
 (1863).
Gucinella R.-D., Posth., 456, 236. (1863).
heraclei MEG., S. B., IV, 339, 172. [*Tachina*] (1824) et VII,
 256, 24. [*Erorista*] (1838) : Macq., Suit à Buff., H. 106, 6.
 [*Stenometopia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VII,
 384, 40, t. XI, f. 2. [*Erorista*] (1849) : WALK., Ins. Brit., H.
 59, 92. [*Tachina*] (1853) : SCHN., F. A., I, 466. [*Erorista*]
 (1862) : STREX, Entom. Nachricht., XXVI, 159. (1900) : VILLEN.,
 Bull. Soc. entom. France, 1900, 158, 7. (1900) : HEND., Verh.
 zool.-bot. Ges. Wien, LI, 206. [*Blepharidea*] (1901).
hilaris R.-D., Posth., I, 345, 36. (1863).
hirsuta OST.-SACK., Can. Entom., XIX, 163. [*Erorista*] (1887).
honesta R.-D., Posth., I, 357, 57. (1863).
hortensis R.-D., Posth., I, 371, 81. (1863).
ignota R.-D., Posth., I, 333, 10. (1863).
impatiens R.-D., Posth., I, 453, 28. (1863).
imprudens R.-D., Posth., I, 434, 193. (1863).
innocua R.-D., Posth., I, 397, 128. (1863).
inops R.-D., Posth., I, 386, 108. (1863).
insidiosa R.-D., Posth., I, 338, 22. (1863).
intacta R.-D., Posth., I, 451, 227. (1863).
integra R.-D., Posth., I, 360, 62. (1863).
judicata R.-D., Posth., I, 401, 135. (1863).
jussa R.-D., Posth., I, 396, 126. (1863).
lacta R.-D., Posth., I, 368, 76. (1863).
lacrigata R.-D., Posth., I, 385, 106. (1863).
lateralis R.-D., Rosth., I, 342, 29. (1863).
larata R.-D., Posth., I, 407, 144. (1863).

- lepida* R.-D., Posth., I. 440. 207. (1863).
levis R.-D., Posth., I. 331. 5. (1863).
libera R.-D., Posth., I. 423. 174. (1863).
lubrica R.-D., Posth., I. 332. 7. (1863).
luctuosa R.-D., Posth., I. 340. 26. (1863).
lusoria R.-D., Posth., I. 387. 109. (1863).
maculata R.-D., Posth., I. 344. 33. (1863).
maesta R.-D., Posth., I. 341. 27. (1863).
maialis R.-D., Posth., I. 427. 181. (1863).
mandata R.-D., Posth., I. 361. 65. (1863).
marginalis R.-D., Posth., I. 352. 48. (1863).
meditata R.-D., Posth., I. 423. 173. (1863).
microcera R.-D., Myod., 161. 8. (1830). *Annal. Soc. entom.*
Francee, (2). V. 615. [*Melibæa*] (1847) et Posth., I. 457. 238.
 (1863).
miniata R.-D., Posth., I. 389. 114. (1863).
minuta R.-D., Posth., I. 347. 39. (1863).
misera R.-D., Posth., I. 391. 118. (1863).
missa R.-D., Posth., I. 445. 215. (1863).
milis R.-D., Posth., I. 414. 157. (1863).
modesta R.-D., Posth., I. 426. 179. (1863).
morosa R.-D., Posth., I. 404. 140. (1863).
mauda R.-D., Posth., I. 417. 163. (1863).
muscida R.-D., Posth., I. 392. 120. (1863).
myioidea R.-D., Posth., I. 450. 224. (1863).
vana R.-D., Posth., I. 347. 40. (1863).
neglecta R.-D., Posth., I. 393. 121. (1863).
venorum R.-D., Posth., I. 432. 189. (1863).
nigra R.-D., Posth., I. 448. 221. (1863).
nigrifrons R.-D., Posth., I. 377. 92. (1863).
nigrita R.-D., Posth., I. 330. 4. (1863).
nigrita bis R.-D., Posth., I. 443. 212. (1863).
nitida R.-D., *Annal. Soc. entom. Francee*, (2). V. 611. 19. [*Hid-*
veria] (1847) et Posth., I. 329. 2. (1863).
noctuarum R.-D., Posth., I. 379. 96. (1863).
notata R.-D., Posth., I. 370. 79. (1863).
nyctar R.-D., Posth., I. 422. 171. (1863).
nycta R.-D., Posth., I. 383. 103. (1863).
objecta R.-D., Posth., I. 365. 70. (1863).
oblata R.-D., Posth., I. 434. 194. (1863).
oblita R.-D., Posth., I. 388. 111. (1863).
oblita bis R.-D., Posth., I. 446. 217. (1863).
obscurata R.-D., Posth., I. 453. 230. (1863).
obscurus R.-D., Posth., I. 356. 56. (1863).
obscuta R.-D., Posth., I. 404. 139. (1863).
occlusa R.-D., Posth., I. 468. 1. [*Blamnia*] (1863).
offensa R.-D., Posth., I. 451. 226. (1863).

- officiosa* R.-D., Posth., I, 359, 60. (1863).
operata R.-D., Posth., I, 351, 45. (1863).
opportuna R.-D., Posth., I, 376, 90. (1863).
opposita R.-D., Posth., I, 338, 21. (1863).
ostendata R.-D., Posth., I, 378, 93. (1863).
palulina R.-D., Posth., I, 455, 234. (1863).
pacifica R.-D., Posth., I, 421, 175. (1863).
palesioidea R.-D., Myod., 110, 5. (1830) et Posth., I, 337, 20. (1863).
parallela MEIG., in coll. ap. STEIX, Entom. Nachricht., XXVI, 145. (1900).
parva MACQ., Suit. à Buff., II, 118, 8. [*Eurygaster*] (1835).
pauperata R.-D., Posth., I, 430, 186. (1863).
parida R.-D., Posth., I, 345, 37. (1863).
picridis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 172. (1850) et Posth., I, 374, 85. (1863).
placida R.-D., Posth., I, 428, 183. (1863).
potatoria R.-D., Posth., I, 445, 214. (1863).
praeceps R.-D., Posth., I, 367, 74. (1863).
praeceps R.-D., Posth., I, 371, 82. (1863).
praeformata R.-D., Posth., I, 409, 148. (1863).
pratensis R.-D., Posth., I, 426, 178. (1863).
probata R.-D., Posth., I, 452, 229. (1863).
prompta R.-D., Myod., 162, 12. (1830) et Posth., I, 326. (1863).
properata R.-D., Posth., I, 425, 177. (1863).
provida R.-D., Posth., I, 355, 54. (1863).
proxima R.-D., Posth., I, 408, 147. (1863).
pruinosa R.-D., Posth., I, 448, 222. (1863).
pucella R.-D., Posth., I, 380, 98. (1863).
punctata R.-D., Myod., 167, 29. (1830).
pupivora R.-D., Posth., I, 366, 78. (1863).
pygmaea R.-D., Posth., I, 429, 184. (1863).
quadriguttata R.-D., Posth., I, 378, 94. (1863).
quadrillum R.-D., Posth., I, 439, 203. (1863).
quadrinotata R.-D., Posth., I, 431, 188. (1863).
quiescens R.-D., Posth., I, 336, 18. (1863).
quiescens R.-D., Posth., I, 433, 192. (1863).
rapida R.-D., Posth., I, 428, 182. (1863).
rectella R.-D., Posth., I, 357, 58. (1863).
reclata R.-D., Posth., I, 421, 169. (1863).
reclata R.-D., Posth., I, 439, 204. (1863).
rotundata R.-D., Myod., 160, 6. (1830) et Posth., I, 144, 213. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 288, 8. [*Musivora*] (1834) et Suit. à Buff., 122, 12. [*Musivora*] (1835).
rubrella R.-D., Posth., I, 390, 115. (1863).
ruralis R.-D., Posth., I, 373, 84. (1863).
rustica R.-D., Posth., I, 335, 15. (1863).

- saepium* R.-D., Posth., I. 455, 235. (1863).
scutellaris R.-D., Myod., 162, 13. (1830) et Posth., I. 437, 199.
 (1863); Macq., Stüt. à Buff., II. 121, 9. [*Masicera*] (1835).
scutellata R.-D., Myod., 166, 26. (1830) et Posth., I. 326. (1863).
secutrix R.-D., Posth., I. 382, 101. (1863).
sedata R.-D., Posth., I. 376, 89. (1863).
selecta R.-D., Posth., I. 432, 190. (1863).
senilis R.-D., Posth., I. 355, 53. (1863).
serena R.-D., Posth., I. 406, 143. (1863).
serva R.-D., Posth., I. 388, 112. (1863).
severa R.-D., Posth., I. 420, 167. (1863).
signata R.-D., Posth., I. 330, 3. (1863).
silvatica R.-D., Posth., I. 467, 1. [*Erinia*] (1863).
silvestris R.-D., Posth., I. 401, 134. (1863).
similis R.-D., Myod., 168, 32. (1830) et Posth., I. 362, 67. (1863).
sobria R.-D., Posth., I. 369, 77. (1863).
socia R.-D., Posth., I. 354, 51. (1863).
sodalis R.-D., Posth., I. 367, 73. (1863).
solata R.-D., Posth., I. 427, 180. (1863).
solers R.-D., Posth., I. 379, 95. (1863).
sororella R.-D., Posth., I. 381, 100. (1863).
sortita R.-D., Posth., I. 396, 127. (1863).
specta R.-D., Posth., I. 333, 11. (1863).
stimulata R.-D., Posth., I. 406, 142. (1863).
 ?*stramineifrons* BRISCHKE (nec ZETT.), Schrift. naturf. Ges. Danzig, VI. 17. [*Erorista*] (1885).
stridens ROXB., Dipt. ital. Prodr., III. 140. [*Erorista*] (1856) et
 Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 208. [*Tricholyga*] (1865).
stygia R.-D., Posth., I. 443, 211. (1863).
subrotundata R.-D., Myod., 161, 8. (1830) et Posth., I. 399, 132.
 (1863).
sabulis R.-D., Posth., I. 335, 14. (1863).
temera MEIG., S. B., IV. 392, 266. [*Tachina*] (1824) et VII. 256.
 39. [*Erorista*] (1838).
temeraria R.-D., Posth., I. 345, 35. (1863).
tenebricosa R.-D., Posth., I. 375, 87. (1863).
terminalis MEIG., S. B., IV. 323, 144. [*Tachina*] (1824); WALK.,
 Ins. Brit., II. 47, 63. [*Tachina*] (1853); STEIN, Entom.
 Nachricht., XXVI. 149. (1900).
timida R.-D., Posth., I. 395, 124. (1863).
tranquilla R.-D., Posth., I. 407, 145. (1863).
transita R.-D., Posth., I. 436, 198. (1863).
tremula R.-D., Posth., I. 369, 78. (1863).
trepida R.-D., Posth., I. 370, 80. (1863).
tristis R.-D., Posth., I. 389, 113. (1863).
urbana MEIG., S. B., VII. 198, 61. [*Tachina*] (1838); Macq.,
 Annal. Soc. entom. France, (3), II. 401, 10, t. XIV, f. 9.

- [*Oodigaster*] (1854): SCHN., F. A., I. 479. [*Tachina*] (1862):
 STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 150. (1900).
arbana R.-D., Posth., I. 435. 195. (1863).
cafra R.-D., Posth., I. 403. 138. (1863).
caga R.-D., Posth., I. 436. 197. (1863).
calida R.-D., Posth., I. 354. 52. (1863).
canessae R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 171.
 (1850) et Posth., I. 410. 150. (1863).
celae R.-D., Myod., 168. 31. (1830) et Posth., I. 326. (1863):
 Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 288. 6. [*Masicera*] (1834).
cernialis R.-D., Posth., I. 411. 152. (1863).
cesana R.-D., Posth., I. 392. 119. (1863).
cicina R.-D., Posth., I. 361. 63. (1863).
cigil R.-D., Posth., I. 413. 155. (1863).
villana R.-D., Posth., I. 343. 32. (1863).
villica R.-D., Myod., 161. 11. (1830) et Posth., I. 449. 233.
 (1863).
vinosa R.-D., Posth., I. 421. 170. (1863).
virgo R.-D., Posth., I. 446. 218. (1863).
volatilis R.-D., Posth., I. 362. 66. (1863).

E. *Blepharidopsis*

- B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 329. (1891) et LX. 114. (1893).
Hartigii MÜK et WACHTL*, Wien. entom. Zeitg., XIV. 245. 27. (1895). Europa-centr.
 ?*praeterrisa* ZETT., Dipt. Scand., III. 1123. 121. (1844) et XIII. et sept.
 6114. 121. [*Tachina*] (1859); BOSSQ., Finnl. Insekt., II. 80.
 77. [*Tachina*] (1866).
nemea MEG.**, S. B., IV. 340. 173. [*Tachina*] (1824) et VII. 256. Europa-centr.
 40. [*Exorista*] (1838); SCHN., F. A., 467. [*Exorista*] (1862):
 v. RÖD., Entom. Nachricht., XIV. 221. [*Exorista*] (1888); B. B.
 Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 329. (1891).
praeterrisa ZETT. ? **Hartigii** MÜK et WACHTL.

F. *Catantaria*

- B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 329. (1891) et LX. 114. (1893).
depressariae B. B.***), Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 329. (1891). Europa-centr.

*) *Abraxas grossulariata* L.

**) *Abraxas grossulariata* L., *Phlogophora scita* Hb., *Thyatira*
Batis L.

***) *Depressaria Heydenii* ZELL.

Lomatacantha

ROND., Dipt. ital. Prodr., III, 151, [*Lomatacantha*] (1859) *em.* VERR. ap. SCUD., 1882: *nee* B. B. 1889; BRAUER, Sitzgsber. Wien, CVII, 523, (1898).

A. *Lomatacantha*

Braueri HEND., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI, 199, [*Lomatacantha*] Austria, (1901).

parra ROND., Dipt. ital. Prodr., III, 151, I, [*Lomatacantha*] (1859): Europacentr.
BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 523, (1898); HEND., Verh. et mer.
zool.-bot. Ges. Wien, LI, 199, [*Lomatacantha*] (1901).

B. *Pseudolomatacantha*

HENSEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI, 199, (1901).

pectinata HEND., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI, 201, (1901). Austria.

Zenillia

R.-D., Myod., 152, I, (1830).

Atilia R.-D., Posth., I, 475, II, (1863) *nee* ADAMS 1858.

Clemelis R.-D., Posth., I, 481, I, (1863).

Elpe R.-D., Posth., I, 488, IV, (1863).

Myecrorista B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 331, (1891)
et LX, 120, (1893).

Nilea R.-D., Posth., I, 275, XI, (1863).

Sagaris R.-D., Posth., I, 486, III, (1863) *nee* PANZ. Hym.

Trilochaeta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 92, (1889)
et LX, 118, (1893).

Zelinda R.-D., Posth., I, 485, II, (1863).

albifrons R.-D. **libatrix** PANZ.

alnicola PANZ. **inepta** MEG.

ambulans R.-D. **libatrix** PANZ.

ancilla MEG. **libatrix** PANZ.

aurea R.-D. (Cl.) **libatrix** PANZ.

aurea R.-D. (Z.) **libatrix** PANZ.

aurulenta R.-D. **libatrix** PANZ.

barbatula ROND.^{*)} Dipt. ital. Prodr., III, 115, 3a, [*Ecorista*] (1859). Europacentr.
SCHN., F. A., I, 459, [*Ecorista*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. et mer.
Wien, LVIII, 321 et 331, [*Myecrorista*] (1891); PANZ., Rev.
entom., XIV, 341, 15, (1895).

fibriolata SCHN. (*nee* MEG.), F. A., I, 160, [*Ecorista*] (1862):

*) *Conchylis roseana* Hw. *Nematus geniculatus* Htg.

BEUTHN, Dipt. Hamburgs, 36. [*Erorista*] (1884); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, VI. 17. [*Erorista*] (1885).

ciligera R.-D. = **libatrix** PANZ.

cineraria R.-D. = **libatrix** PANZ.

cinecea R.-D. = **libatrix** PANZ.

discerpta PAND. = **libatrix** PANZ.

fauna MEIG.^{*)}, S. B., IV. 392, 268. (1824), VI. 368. [*Tachina*] (1830) Europa centr.
et VII. 256, 34. [*Erorista*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 121. et mer.
7. [*Masicera*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VII. 408.
84. t. XII. f. 10. [*Erorista*] (1849); RONDI., Dipt. ital. Prodr., III.
130. 9. [*Erorista*] (1859); SCHN., F. A., I. 464. [*Erorista*] (1862);
MEADE, Entom., XV. 24. [*Erorista*] (1882) et Entom. Monthly
Mag., (2). III. 17. [*Erorista*] (1892); JAROSCH., Trudy Naturf.
Ges. Karkoff, 1883. 313. 31. [*Erorista*] (1883); B. B., Denkschr.
Akad. Wien, LVIII. 331. [*Myreorista*] (1891); VILLEN., Bull.
Soc. entom. France, 1900. 159. 11. (1900); STEIN, Entom. Nach-
richt., XXVI. 136. (1900).

? *innocua* R.-D., Posth., I. 276. 1. [*Nileca*] (1863); HEND., Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, LI. 201. *nola*. (1901).

Macquarti R.-D., Myod., 163. 16. [*Phyre*] (1830).

fimbriata SCHN. = **barbatula** RONDI.

flavifrons R.-D. = **libatrix** PANZ.

flavipalpis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 332. [*Myreorista*] Europa centr.
(1891).

flavisquamis R.-D. = **libatrix** PANZ.

floralis R.-D. = **libatrix** PANZ.

florilega R.-D. = **libatrix** PANZ.

fulva SCHN. = **libatrix** PANZ.

fuscifrons R.-D. = **libatrix** PANZ.

grisella RONDI. = **libatrix** PANZ.

inepta MEIG., S. B., IV. 351, 212. [*Tachina*] (1824) et VII. 261. 15. Europa centr.
[*Phorocera*] (1838); R.-D., Posth., I. 488. 1. [*Elpe*] (1863); VILLEN.,

Bull. Soc. entom. France, 1900. 161. 8. (1900).

albicola PAND., Rev. entom., XIV. 346. 23. (1894).

infuscula R.-D. = **libatrix** PANZ.

innocua R.-D. = **fauna** MEIG.

lucigata R.-D. = **libatrix** PANZ.

lethifera PAND., Rev. entom., XIV. 339. 13. (1894).

Gallia mer.

libatrix PAND. = **pullata** MEIG.

X **libatrix** PANZ.^{**)}, Fauna germ., LIV. 12. [*Musca*] (1798); MEIG., S. Europa.

^{*)} *Aeronicta runcicis* L., *Cossus cossus* L., *Euproctis chrysorrhoea* L., *Smerinthus ocellatus* L.

^{**)} *Alrostrata aselepiadis* SCHNEE., *Brephos Nothum* HE., *Dasychira pudibunda* L., *Larentia autumnalis* STRÖM., *Lymantria dispar* L., *Malacosoma neustria* L., *Pygaera pigra* HESX., *Thaumetopoea processionea* L., *Yponomeuta evonymella* L. et *padella* L.

- B., IV, 400, 281, [*Tachina*] (1824) et VII, 256, 46, [*Erorista*] (1838); R.-D., Myod., 153, 1, (1830), Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 168, (1850) et Posth., 1, 472, 2, (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 293, 5, [*Pales*] (1834), Suit. à Buff., II, 112, 26, [*Stenomectopia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), V, 391, 59, 1, XII, f. 5, [*Erorista*] (1847); Zerr., Dipt. Scand., III, 1163, 164, [*Tachina*] (1844); Rond., Dipt. ital. Prodr., III, 131, 10, [*Erorista*] (1859); SCHIX., F. A., 1, 464, [*Erorista*] (1862); BONSP., Finnl. Insekt., II, 90, 96, [*Tachina*] (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), V, 107, [*Erorista*] (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 337, [*Myecrorista*] (1891); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900, 159, 12, (1900).
- albifrons* R.-D., Posth., I, 483, 3, [*Clemelis*] (1863).
- ambulans* R.-D., Posth., I, 477, 4, [*Atilia*] (1863).
- aurilla* MEIG., S. B., VII, 257, 29, [*Erorista*] (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 407, 82, t. XII, f. 17, [*Erorista*] (1849); SCHIX., F. A., 1, 468, [*Erorista*] (1862); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900, 159, 10, (1900); STREIN, Entom. Nachricht., XXVI, 131, (1900).
- aurca* R.-D., Posth., I, 481, 1, [*Clemelis*] (1863).
- aurca* R.-D., Posth., I, 471, 1, (1863).
- aurulenta* R.-D., Posth., I, 485, 1, [*Zelinda*] (1863).
- ciliigera* R.-D., Myod., 154, 3, (1830) et Posth., 1, 482, 2, et II, 920, [*Clemelis*] (1863); Macq., Suit. à Buff., II, 112, 27, [*Stenomectopia*] (1835).
- cincerraria* R.-D., Posth., I, 484, 5, [*Clemelis*] (1863).
- cinerea* R.-D., Posth., I, 487, 3, [*Sagaris*] (1863).
- disceypla* PAND., Rev. entom., XIV, 338, 10, (1894).
- flavifrons* R.-D., Posth., I, 483, 3, [*Clemelis*] (1863).
- flaviscquamis* R.-D., Posth., I, 476, 2, [*Atilia*] (1863).
- floralis* R.-D., Posth., I, 474, 7, (1863).
- florilega* R.-D., Posth., I, 474, 5, (1863).
- fulva* SCHIX., F. A., 1, 462, [*Erorista*] (1863); PAND., Rev. entom., XIV, 338, 11, (1895).
- fuscifrons* R.-D., Posth., I, 485, 6, [*Clemelis*] (1863).
- grisella* ROND., Dipt. ital. Prodr., III, 164, 3, [*Phorocera*] (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 333, [*Myecrorista*] (1891).
- infuscala* R.-D., Posth., I, 474, 6, (1863).
- lucigata* R.-D., Posth., I, 486, 1, [*Sagaris*] (1863).
- lubrica* R.-D., Posth., I, 475, 8, (1863).
- marginalis* R.-D., Posth., I, 487, 2, [*Sagaris*] (1863).
- occlusa* R.-D., Posth., I, 475, 1, [*Atilia*] (1863).
- ochracea* RATZER, Forstlins., III, [*Tachina*] (1811); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 563, [*Myecrorista*] (1891).
- ocypae* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), XIII, 168, (1850).
- perpleca* PAND., Rev. entom., XIV, 338, 9, (1895).

- palatoria* R.-D., Posth., I. 477. 3. [*Milia*] (1863).
praeceps R.-D., Posth., I. 478. 5. [*Milia*] (1863).
ruralis R.-D., Posth., I. 473. 3. (1863).
vernalis R.-D., Posth., I. 463. 4. (1863).
labrica R.-D. — **libatrix** PANZ.
Macquarti R.-D. = **fauna** MEIG.
macrops B. B. *) Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 333. [*Myrecorista*] Europa centr. (1891).
marginalis R.-D. = **libatrix** PANZ.
occlusa R.-D. — **libatrix** PANZ.
ochracea RATZEB. = **libatrix** PANZ.
oculosa PAND., Rev. entom., XIV. 331. 2. (1895). Gallia.
orgyae R.-D. = **libatrix** PANZ.
perplexa PAND. = **libatrix** PANZ.
pexops B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 332. [*Myrecorista*] (1891). Europa centr.
picipes ROXB., Dipt. ital. Prodr., III. 163. 1. [*Phorocera*] (1859). Italia.
polleniella ROXB. = **pullata** MEIG.
potatoria R.-D. = **libatrix** PANZ.
praeceps R.-D. = **libatrix** PANZ.
prospoides B. B. = **pullata** MEIG.
pullata MEIG., S. B., IV. 351. 211. [*Tachina*] (1824) et VII. 261. 3. Europa centr. [*Phorocera*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. et mer. 422. 3. t. XII. f. 10. [*Phorocera*] (1859); R.-D., Posth., I. 676. 2. [*Cacuis*] (1863); STEIN. Entom. Nachricht., XXVI. 148. (1900).
libatrix PAND. (nec PANZ.), Rev. entom., XIV. 339. 12. (1895).
polleniella ROXB., Dipt. ital. Prodr., III. 163. 2. [*Phorocera*] (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 338. [*Tritochaeta*] (1891).
prospoides B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 165. t. II. f. 35. [*Tritochaeta*] (1889).
resinellae GURSCH.**) Entom. Nachricht., XXV. 178. 7. [*Myrecorista*] Germania. (1899).
roscae B. B.***), Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 332. [*Myrecorista*] Europa centr. (1891).
ruralis R.-D. — **libatrix** PANZ.
verecunda ROXB., Dipt. ital. Prodr., III. 165. 5. [*Phorocera*] (1859). Italia.
vernalis R.-D. — **libatrix** PANZ.

Masicera

MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 285. (1834); R.-D., Posth., I. 871. 1. (1863).

bombycivora R.-D. = **silvatica** FALL.

buccata MEIG., S. B., IV. 386. 254. [*Tachina*] (1824) et VII. 240. 5. Europa centr. (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 466. 8.

*) *Pygaera anachoreta* F., *Thaumetopoea processionea* L.

**) *Evetria resinella* L.

***) *Conchyliis roseana* Hw.

(1850); SCHIX., F. A., I. 485. (1862); R.-D., Posth., I. 885. 15. (1863).

Meigenii R.-D., Posth., I. 884. (1863).

campestris R.-D. = **silvatica** FALL.

cuculliae R.-D. = **silvatica** FALL.

facialis R.-D. = **silvatica** FALL.

lasiocampae R.-D. = **silvatica** FALL.

Meigenii R.-D. = **buccata** MEIG.

nigrita R.-D. = **silvatica** FALL.

pavoniae R.-D. = **silvatica** FALL.

† **pratensis** MEIG. *), S. B., IV. 318. 136. [*Tachina*] (1824) et VII. 240.

12. (1838); MACQ., Suit à Buff., II. 115. 40. [*Senonectopia*] (1835);

SCHIX., F. A., I. 483. (1862); R.-D., Posth., I. 884. 16. (1863);

WACHTL., Wien. entom. Zeitg., I. 278. 33. (1882); B. B., Denkschr.

Akad. Wien, LVI. t. I. f. 4. a. (1889) et LVIII. 316. (1891);

MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III. 128. (1892); GUESCH.,

Entom. Nachricht., XXV. 179. (1899); STEIN, Entom. Nachricht.,

XXVI. 147. (1900); MEIJ., Zool. Jahrbüch., XV. 680. f. 49. (1902).

silvatica ROSS. (nec FALL.), Dipt. ital. Prodr., IV. 21. 3. (1861)

et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 426. (1861).

puparam R.-D. = **silvatica** FALL.

quadrimaculata R.-D. = **silvatica** FALL.

scutellaris HART. = **silvatica** FALL.

× **silvatica** FALL. **), Vet. Akad. Handl., XXXI. 274. [*Tachina*] (1810)

et Dipt. succ. Musc., 12. 30. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B. IV.

380. 243. [*Tachina*] (1824) et VIII. 241. 17. t. LXXI. f. 6. 11.

(1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 286. I. (1834), Suit à Buff.,

II. 119. I. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VIII. 470.

26. t. XIV. f. 19—20. (1850); ZETT., Dipt. Scand., III. 1033. 23.

[*Tachina*] (1844); SCHIX., F. A., I. 483. (1862); R.-D., Posth., I.

882. 14. (1863); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 53. 19. [*Tachina*] (1866);

JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff, 1883. 314. 33. (1883);

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. I. f. 4. (1889) et LVIII.

316. (1891); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III. 128. (1892);

PAND., Rev. entom., XV. 62. 20. [*Tachina*] (1896); GUESCH.,

Entom. Nachricht., XXV. 178. 12. (1899); STEIN, Entom. Nachricht.,

XXVI. 149. (1900);

bombycivora R.-D., Myod., 165. 22. [*Phryxe*] (1830) et Posth., I.

878. 9. (1863).

campestris R.-D., Posth., I. 873. 3. (1863).

Europa-centr.
et mer.

Europa.

*) *Cosmotriche* *potatoria* L., *Deilephila* *euphorbiae* L., *Hyloneus* *pinastri* L., *Saturnia* *pyri* SCHIFF. et *spini* SCHIFF., *Smerinthus* *populi* L.

**) *Apopetes* *spectrum* ESP., *Cucullia* *verbasci* L., *Deilephila* *euphorbiae* L., *galii* ROTT. et *vesperilio* ESP., *Dilina* *filiae* L., *Gastropacha* *quercifolia* L., *Lasiocampa* *quercus* L., *Nonagria* *Typhae* TUNG., *Pieris* *brassicae* L., *Saturnia* *pavonia* L., *pyri* SCHIFF. et *spini* SCHIFF., *Sphinx* *ligustri* L.

- cuculliae* R.-D., Posth., I. 878. 10. (1863).
facialis R.-D., Posth., I. 872. 2. (1863).
lasiocampae R.-D., Myod., 164. 19. [*Phryxe*] (1830) et Posth., I. 875. 5. (1863).
nigrita R.-D., Posth., I. 875. 6. (1863).
paroniae R.-D., Myod., 165. 21. [*Phryxe*] (1830) et Posth., I. 880. 12. (1863).
puparam R.-D., Posth., I. 881. 13. (1863).
quadrinaculata R.-D., Posth., I. 879. 11. (1863).
scutellaris HART. (nec FALL.), Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I. 293. 22. [*Tachina*] (1838); MÜK. et WACHTL. Wien. entom. Zeitg., XIV. 232. 16. (1895).
sphingirora R.-D., Myod., 164. 20. [*Phryxe*] (1830) et Posth., I. 876. 7. (1863).
superba R.-D., Myod., 164. 18. [*Phryxe*] (1830) et Posth., I. 872. 1. (1863).
typhaccola R.-D., Myod., 165. 23. [*Phryxe*] (1830) et Posth., I. 877. 8. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 286. 2. (1834) et Suit. à Buff., II. 119. 2. (1835).
vicida R.-D., Posth., I. 874. 4. (1863).
silvatica ROXB. = **pratensis** MEIG.
sphingirora R.-D. = **silvatica** FALL.
superba R.-D. = **silvatica** FALL.
typhaccola R.-D. = **silvatica** FALL.
vicida R.-D. = **silvatica** FALL.

Species dubiae vel incerti generis.

- Gouraldia* R.-D., Rev. Mag. Zool., III. 152. (1851).
Liophora R.-D., Posth., I. 930. IV. [*Lejophora*] (1863).
Nigrina R.-D., Posth., I. 932. V. (1863).
Oebalia R.-D., Posth., II. 414. XXIX. (1863).
Wiedmanina R.-D., Posth., I. 928. III. (1863) nec MEIG., nec ZETT.
Zaïda R.-D., Myod., 150. VI. (1830).
Zorella R.-D., Posth., I. 918. VIII. (1863).
acutangulata Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 478. 40. Europacentr.
 t. XV. f. II. (1850).
agilis R.-D., Myod., 151. 1. [*Zaïda*] (1830) et Posth., I. 917. 3. Gallia.
 [*Gouraldia*] (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 114. 37. [*Stenomel-*
topia] (1835).
anacantha R.-D., Posth., II. 415. 1. [*Oebalia*] (1863). Gallia.
analis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 462. 9. (1850). Europacentr.
angusta Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 469. 23. t. Europacentr.
 XIV. f. 17. (1850); WALK., Ins. Brit., II. 88. 158. [*Tachina*] (1853).
apicata PANZ., Rev. entom., XV. 57. 12. [*Tachina*] (1896). Gallia.

- binolata* R.-D. = *pupivora* R.-D.
Bremii Macq.^{*)}, Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 476, 36, t. XV, Europa-centr.
 f. 7, (1850).
brevis Macq.^{**)}, Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 460, 6, t. XIV, Europa-centr.
 f. 4, (1850); PAND., Rev. entom., XV, 56, 41, [*Tachina*] (1896).
caudigera Rond., Dipt. ital. Prodr., IV, 23, 7, (1861) et Atti Soc. Italia.
 ital. Sci. Nat., IV, 48, 40, (1861).
cespitem Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 473, 30, t. Europa-centr.
 XV, f. 2, (1850).
ciliata Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 294, 1, [*Erycia*] (1834) et Suit. Gallia,
 à Buff., II, 113, 32, t. V, f. 1, [*Stenomelopia*] (1835).
crataegellae R.-D.^{***)}, Myod., 151, 2, [*Zaïda*] (1830); Macq., Soc. Gallia,
 S.-i. Lille, 1833, 295, 4, [*Erycia*] (1834) et Suit. à Buff., II, 115,
 38, [*Stenomelopia*] (1835).
cylindrica Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 475, 35, t. Europa-centr.
 XV, f. 6, (1850).
declivicornis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 480, 42, Gallia,
 t. XV, f. 12, (1850); PAND., Rev. entom., XV, 56, 40, [*Tachina*]
 (1896).
discrepans WALK., Ins. Brit., II, 54, 80, [*Tachina*] (1853), Anglia.
evocata WALK., Ins. Brit., II, 38, 43, [*Tachina*] (1853), Anglia.
falcatae R.-D.^{****)}, Myod., 151, 3, [*Zaïda*] (1830), Gallia.
flavidipennis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 476, 37, Europa-centr.
 t. XV, f. 8, (1850).
flavifrons Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 465, 16, t. Europa-centr.
 XIV, f. 13, (1850).
flavipalpis R.-D., Posth., I, 933, 1, [*Nigrina*] (1863), Gallia.
fuscipennis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 466, 19, t. Europa-centr.
 XIV, f. 14, (1850).
grisea R.-D., Myod., 147, 1, [*Erycia*] (1830), Gallia.
hannoniensis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 481, 46, Europa-centr.
 t. XV, f. 16, (1850).
hirtella R.-D., Posth., I, 929, 1, [*Wiedmania*] (1863), Gallia.
immissa WALK., Ins. Brit., II, 53, 77, [*Tachina*] (1853), Anglia.
incisa WALK., Entom., V, 340, 61, [*Eurygaster*] (1871), **▲**egyptus.
intersceta WALK., Ins. Brit., II, 38, 42, [*Tachina*] (1853), Anglia.
leucomelas WALK., Entom., V, 339, 63, [*Eurygaster*] (1871), Arabia.
lutescens Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 461, 7, t. Europa-centr.
 XIV, f. 5, (1850).
maculifacies Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 462, 11, Europa-centr.
 t. XIV, f. 8, (1850).
media Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 467, 20, t. XIV, Europa-centr.
 f. 15, (1850).

*) Vanessa Io L.

**) Yponomeuta vigintipunctata REIZ.

***) Scoparia crataegella Hb.

****) Drepana falcataria L.

- melaleuca** MEGG., S. B., IV, 401, 283. [*Tachina*] (1824) et VII, 240. Europacentr.
2. (1838).
- micans** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 459, 4, t. XIV. Europacentr.
f. 2. (1850).
- montana** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 479, 41, t. Europacentr.
XIV, f. 22. (1850).
- montium** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 463, 12, t. Europacentr.
XIV, f. 9. (1850).
- multisetosa** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 464, 15, t. Europacentr.
XIV, f. 12. (1850).
- nitens** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 482, 48, t. XV. Europacentr.
f. 18. (1850).
- nitida** R.-D., Posth., I, 931, 1. [*Liophora*] (1863). Gallia.
- pachystyla** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 480, 43, t. Europacentr.
XV, f. 13. (1850).
- parvula** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 488, 59, t. XV. Europacentr.
f. 23. (1850).
- pavida** R.-D., Posth., I, 918, 1. [*Zorella*] (1863). Gallia.
- pinetorum** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 482, 47, t. Europacentr.
XV, f. 17. (1850).
- pubiseta** ZETT., Dipt., Scand., VIII, 3250, *nota*, [*Tachina*] (1849). Patria dubia.
- pulverulenta** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 473, 31. Europacentr.
t. XV, f. 3. (1850).
- pumila** MEGG., S. B., VII, 241, 4. (1838); SCHN., F. A., I, 486. (1862). Europacentr.
- pupivora** R.-D.*), Rev. Mag. Zool., III, 152, 6. [*Gouraldia*] (1851) Gallia.
et Posth., I, 916, 1. [*Gouraldia*] (1863).
binotata R.-D., Rev. Mag. Zool., III, 152, 7. [*Gouraldia*] (1851)
et Posth., I, 917, 2. [*Gouraldia*] (1863).
- retracta** WALK., Ins. Brit., II, 80, 139. [*Tachina*] (1853). Anglia.
- Robertii** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 477, 39, t. Gallia.
XV, f. 10. (1850).
- ruficornis** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 472, 29, t. Europacentr.
XV, f. 1. (1850); SCHN., F. A., I, 484. (1862).
- scutellata** ZETT., Ins. Lapp., 640, 27. [*Tachina*] (1844). Scandinavia.
clypeata ZETT. in litt. ap. ZETT.
nigripes ZETT. in litt. ap. ZETT.
- socia** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 475, 34, t. XV. Europacentr.
f. 5. (1850).
- tessellata** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 468, 21, t. Europacentr.
XIV, f. 16. (1850).
- testaenicornis** ROSD., Atti Soc. ital. Sci. nat., XI, 41. (1868). Italia.
- tibialis** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 435. [*Eurygaster*] Gallia.
(1848).
- unicolor** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 464, 13, t. Europacentr.
XIV, f. 10. (1850).

*) *Cacoecia rosana* L.

- validicornis** ZETT., Ins. Lapp., 640, 29. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scandinavia, Scand., III, 1043, 34. [*Tachina*] (1844).
- virescens** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 465, 17, 1. Europacentr. XIV, f. 9. (1850); SCHEX., F. A., I, 486. (1862).
- viridiventris** MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV, (2), 163, 14, 1. XVII, f. Aegyptus, 8. (1851); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI, 336, 9 et 10. [*nov. gen.*] (1897).

Chaetolya

ROXB., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 372. [*Chaetilya*] (1860) em. B. B., 1889.

Trichodischia Htg., Bull. Soc. entom. France, 1885.

hemistylota PAND. = **setigena** ROXB.

setigena ROXB.^{*)}, Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 372, t. I, f. c. (1860) Europacentr. et Dipt. ital. Prodr., IV, 159. (1861); B. B., Denkschr. Akad. et mer. Wien, LVI, 134, t. X, f. 252. (1889).

hemistylota PAND., Rev. entom., XV, 70, 2. [*Bigonichacta*] (1896).

Ceromasia

ROXB., Dipt. ital. Prodr., I, 71, *nota*, (1856) et IV, 16. (1861).

A. *Thelyconychia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 89. (1889) et LX, 114. (1893).

solivaga ROXB., Dipt. ital. Prodr., IV, 24, 8. [*Masicera*] (1861) et Europacentr. Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV, 48, 11. [*Masicera*] (1861). et mer.

B. *Lophyromyia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 89. (1889) et LX, 114. (1893).

Spinolia R.-D., Posth., II, 41, III. (1863) *nov. Daulb.* 1854, Hym.

clausa B. B. = **inclusa** HAERT.

inclusa HAERT.^{**)}, Jahresber. Fortschr. Forstwiss., I, 285, 12. [*Tachina*] (1838); R.-D., Posth., II, 42, I. [*Spinolia*] (1863); Mik et WACHTL, Wien. entom. Zeitg., XIV, 222. (1895).

clausa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 164, t. II, f. 20. (1889) et LXI, 616. (1894).

lophyri R.-D., Posth., I, 892, 5. [*Starmia*] (1863).

similans SCHEX., F. A., I, 481, *nota*. [*Tachina*] (1862).

similans HAERT. (*nov. MEIG.*), Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I, 284, 11. [*Tachina*] (1838); Mik et WACHTL, Wien. entom. Zeitg., XIV, 222. (1895).

^{*)} *Eurhantlis chrysitaria* Hg.

^{**)} *Lophyrus pallidus* KUG. *pini* L. et *variegatus* HAERT.

lophyri R.-D. = **inclusa** HART.
similans SCHN. = **inclusa** HART.
simulans HART. = **inclusa** HART.

C. *Ceromasia* s. str.

baccatoidea R.-D. = **rutila** MEIG.
ferruginea ROXB. = **rutila** MEIG.
festinans MEIG. = **rutila** MEIG.
floram MACQ. = **rutila** MEIG.
hortensis MEIG. = **rutila** MEIG.
nigripes R.-D. = **rutila** MEIG.
rubrifrons MACQ. = **rutila** MEIG.
rufipes B. B. = **vicinalis** PAND.
rutila MEIG., S. B., IV, 382, 246. [*Tachina*] (1824) et VII, 240, 10. Europaeentr.
 [*Masicera*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, et mer.
 457, 1, t. XIV, f. 1. [*Masicera*] (1850); SCHN., F. A., I, 484.
 [*Masicera*] (1862); R.-D., Posth., I, 544, 5. [*Phryno*] (1863);
 MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 130. [*Masicera*] (1893);
 PAND., Rev. entom., XV, 54, 8. [*Tachina*] (1896); VILLEN., Bull.
 Soc. entom. France, 1900, 161, 4, et 402, 10. (1900); STEIN,
 Entom. Nachricht., XXVI, 148. (1900).
baccatoidea R.-D., Myod., 144, 6. [*Phryno*] (1830).
ferruginea ROXB. (nec MEIG.), Dipt. ital. Prodr., IV, 29, 16.
 [*Masicera*] (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV, 44, 19. (1861).
festinans MEIG., S. B., IV, 384, 251. [*Tachina*] (1824) et VII,
 241, 19. [*Masicera*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France,
 (2), VIII, 471, 28, t. XIV, f. 22. [*Masicera*] (1850); ZETT.,
 Dipt. Scand., III, 1132, 126. (1844) et XIII, 6117, 129.
 [*Tachina*] (1859); SCHN., F. A., I, 465. [*Ecorista*] (1862);
 STROBL, Wien. entom. Zeitg., XV, 90. (1896) et Wiss. Mittheil.
 Bosn. Herzeg., VII, 601. [*Masicera*] (1900); COQUILL., Rev.
 Tachin. N. Amer., 113. [*Masicera*] (1897).
floram MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 460, 5, t.
 XIV, f. 3. [*Masicera*] (1850); ROXB., Dipt. ital. Prodr., IV,
 30, 17. (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV, 44, 20. (1861);
 B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 89, t. II, f. 22. (1889)
 et LVIII, 330. (1891).
hortensis MEIG., S. B., VII, 200, 82. [*Tachina*] (1838); SCHN.,
 F. A., I, 478. [*Tachina*] (1862).
nigripes R.-D., Myod., 144, 4. [*Phryno*] (1830), Annal. Soc.
 entom. France, (2), VI, 440, 6. [*Erythroceca*] et Posth., I,
 601, 1. [*Erythroceca*] (1863); MACQ., Suit. à Buff., II, 117, 3.
 [*Eurygaster*] (1835).*)
rubrifrons MACQ., Suit. à Buff., II, 131, 32. [*Metopia*] (1835);
 STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 148. (1900).

*) Vide infra ad gen. Paranaeera.

17 Ceromasia ferruginea meig. = achyris meig. (1835)

siphonoidea R.-D., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VI, 439, 4, [*Erythroceræ*] (1848).

siphonoidea R.-D. = **rutila** MEIG.

sordidisquama ZETT., *Dipt. Scand.*, III, 1038, 28, (1844) et XII, 4691, 28, [*Tachina*] (1855); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LXI, 622, (1894); WAINWR., *Entom. Monthly Mag.*, (2), XIX, 15, (1903).

Walpii B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, 330, (1891).

vicinalis PAND., *Rev. entom.*, XV, 53, 7, [*Tachina*] (1896). Europacentr.

ruffipes B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, 438, [*uomen nudata*] (1891).

Walpii B. B. = **sordidisquama** ZETT.

D. *Paraphorocera*

B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVI, 90, (1889) et LX, 116, (1893).

♂ *Andrina* R.-D., *Posth.*, I, 835, IV, (1863).

agrestis R.-D. = **senilis** MEIG.

doris MEIG. = ? **senilis** MEIG.

laticincta PERR. = **senilis** MEIG.

myioidea R.-D. = ? **senilis** MEIG.

nitida MACQ. = **senilis** MEIG.

nora PERR. = **senilis** MEIG.

senilis MEIG., S. B., VII, 241, 8, [*Masicera*] (1838) (?); ROXD., *Dipt. Ital. Prodr.*, IV, 25, 10, (1861) et *Atti Soc. ital. Sci. Nat.*, IV, 43, 13, (1861); R.-D., *Posth.*, I, 836, 1, [*Andrina*] (1863); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, 330, (1891); GÜRSCH., *Entom. Nachricht.*, XXV, 185, (1899); HEND., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, LI, 210, 12, (1901). Europacentr. et mer.

agrestis R.-D., *Myod.*, 113, 2, [*Lybella*] (1830) et *Posth.*, I, 857, 4, [*Lybella*] (1863); PAND., *Rev. entom.*, XV, 52, 5, [*Tachina*] (1896); VILLES., *Bull. Soc. entom. France*, 1900, 402, (1900).

♂ *doris* MEIG., S. B., IV, 312, 125, (1824) et VII, 190, 8, (1838); MACQ., *Suit. à Buff.*, II, 115, 39, [*Stenomelopia*] (1835) et *Annal. Soc. entom. France*, (3), II, 399, t. 1, XIV, t. 1, [*Oodigaster*] (1844); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, 330, (1891).

laticincta PERR., *Soc. linn. Lyon*, 1852, 58, [*Masicera*] (1852).

♂ *myioidea* R.-D., *Myod.*, 114, 7, [*Lybella*] (1830) et *Posth.*, I, 856, 2, [*Lybella*] (1863); MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VIII, 468, 22, t. XIV, t. 1, [*Masicera*] (1850); MAYR., *Entom. Monthly Mag.*, (2), III, 128, [*Masicera*] (1893); COQUILL., *Rev. Tachin. N. Amer.*, 111, [*Masicera*] (1897).

nitida MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VIII, 164, II, t. XIV, t. 11, [*Masicera*] (1850); BRATIE., *Sitzgsber. Akad. Wien*, CVI, 339, 19, (1897).

nova PERR., Soc. linn. Lyon, 1852, 58. [*Masicera*] (1852).

lineata B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 165. t. II, f. 29.
(1889) et LVIII, 441. (1891).

lineata B. B. = **senilis** MEIG.

E. *Leptotachina*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 330. (1891) et LX, 114. (1893).

gratiosa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 330. (1891). Europa.

Lydella

R.-D., Myod., 112, V. (1830) et Posth., I, 855, I. (1863).

Auelia R.-D., Posth., I, 868, II. (1863) *nee* HURN, 1826. Lep.

Aporotachina MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), V, 108. (1894).

Blandelia R.-D., Myod., 122, X. (1830).

Cyrtilla R.-D., Posth., II, 31, III (1863) *nee* ROND, 1856. Dipt.

Derodes B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 87, 128. (1889)
et LX, 112. (1893).

Gerraisia R.-D., Posth., II, 36, I. (1863).

Picconia R.-D., Posth., II, 33, IV. (1863).

A. *Allophorocera*

HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI, 203, III. (1901).

auripita B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 316, 335. [*Derodes*] Alpes.
(1891); GIBSCHN., Entom. Nachricht., XXV, 185. [*Derodes*] (1899);

HEND., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI, 203. (1901).

Braueri HEND. in litt. ap. HEND.

B. *Lydella* s. str.

abdominalis R.-D. = **nigripes** FALL.

acanthophora ROND. = **angelicae** MEIG.

aequa STROBL. = **albisquama** ZETT.

agilis MEIG. = **nigripes** FALL.

albisquama ZETT.)*, Dipt. Scand., III, 1037, 27. (1844) et XIII, 6081, Europa.
27. [*Tachina*] (1859); SCHUM., F. A., I, 480. [*Tachina*] (1862);

BOESD., Fönnl. Insekt., II, 55, 23. [*Tachina*] (1866).

aequa STROBL. (*nee* MEIG.), Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 35.
[*Rhinotachina*] (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI,
620. [*Derodes*] (1894).

*) *Ammonoia caecimacula* FABR., *Metopsilus porcellus* L.,
Notodontia tropida ESP.

- carigena* PAND., Rev. entom., XV, 105, 10. [*Peteina*] (1896).
- zeineola* MEG., S. B., IV, 297, 102. (1824) et VII, 190, 7. [*Tachina*] (1838); ? WALK., Ins. Brit., II, 47, 64. [*Tachina*] (1853).
- distachala* PAND., Rev. entom., XV, 102, 6. [*Peteina*] (1896).
- spectabilis* B. B. (nec MEG.), Denkschr. Akad. Wien, LVI, 1. l. f. 5, (1889) et LVIII, 316. [*Decodes*] (1891); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXXI, 124. [*Decodes*] (1895); GÜRSCH., Entom. Nachricht., XXV, 185. [*Decodes*] (1899).
- ambulans** ROXD.²⁾ (nec MEG.), Dipt. ital. Prodr., IV, 29, 15. [*Ceromastia*] (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV, 51, 18. [*Masicera*] (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 316. [*Decodes*] (1891); PAND., Rev. entom., XV, 53, 3. [*Tachina*] (1896).
- angelicae** MEG., S. B., IV, 309, 120. (1824) et VII, 191, 67. [*Tachina*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II, 145, 25. [*Tachina*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 403, 75, t. XII, f. 14. [*Exorista*] (1849); SCHIX., F. A., I, 475. [*Tachina*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 38. [*Tachina*] (1892); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 160, 16. (1900); STEIX, Entom. Nachricht., XXVI, 131. (1900).
- acanthophora* ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV, 28, 14. [*Masicera*] (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV, 50, 17. [*Masicera*] (1861); ? STROBL, Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV, 487. [*Decodes*] (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX, 548. [*Decodes*] (1904).
- sphaecelata* MEG. in lit. ap. B. B.
- spiruligera* ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV, 27, 13. [*Masicera*] (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV, 50, 16. [*Masicera*] (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. VIII, f. 213. (1889) et LVIII, 316. [*Decodes*] (1891); PAND., Rev. entom., XV, 88, 2. [*Plagia*] (1896); STEIX, Entom. Nachricht., XIV, 215, 58. [*Masicera*] (1888).
- ridnata* MEG., S. B., IV, 313, 127. (1824) et VII, 190, 11. [*Tachina*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 409, 18, t. XIV, f. 3. [*Oodiqaster*] (1854); STEIX, Entom. Nachricht., XXVI, 151. (1900).
- bodeusis* MACQ. **nigripes** FALL.
- bibeus* MEG. **nigripes** FALL.
- bipartita* R.-D. **nigripes** FALL.
- baccipennis* MEG. ? **nigripes** FALL.
- campestris* R.-D. **nigripes** FALL.
- easta** ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV, 23, 6. [*Masicera*] (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV, 47, 9. [*Masicera*] (1861); PAND., Rev. entom., XV, 51, 4. [*Tachina*] (1896).
- canta* R.-D. **nigripes** FALL.
- carigena* PAND. **albisquama** ZETT.

²⁾ COSSUS COSSUS L., VILLEN. i. lit.

- cincla* MEIG. ? *albisquama* ZETT.
cinerea (Bl.) R.-D. **nigripes** FALL.
cinerea (L.) R.-D. **nigripes** FALL.
cursoria R.-D. **nigripes** FALL.
cylindrica R.-D. **nigripes** FALL.
disturbata PANZ. **albisquama** ZETT.
labia R.-D. **nigripes** FALL.
Eggeri B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI 128, 169 (1889) et LVIII 316. [*Decodes*] (1891). Europa-centr.
fasciata R.-D. = **nigripes** FALL.
festinans R.-D. = **nigripes** FALL.
floricaga R.-D. = **nigripes** FALL.
fugitiva R.-D. = **nigripes** FALL.
fulgiginosa R.-D. **nigripes** FALL.
fulvicornis R.-D. **nigripes** FALL.
geometrae BRISCHKE **nigripes** FALL.
gratiosa MEIG. **stabulans** MEIG.
griseiceps R.-D. = **nigripes** FALL.
hydrocampae R.-D. **nigripes** FALL.
ignota PERR. **nigripes** FALL.
infantilis RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VII, 218. [*Masicera*] (1865). Italia
inflera BOUCHÉ = **nigripes** FALL.
intercepta MACQ. **lepida** MEIG.
juvenilis RONDI., Dipt. ital. Prodr., IV, 25, 9. [*Masicera*] (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV, 49, 12. [*Masicera*] (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 316. [*Decodes*] (1891) ~ MEAD., Entom. Monthly Mag., (2), III, 129. [*Masicera*] (1892); GÜRSCHN., Entom. Nachricht., XXV, 184. [*Ceromastix*] (1899). Europa.
lepida MEIG., S. B., VII, 191, 14. [*Tachina*] (1838); STREX, Entom. Nachricht., XXVI, 142. (1900); VILLEN., Wien. entom. Zeitg., XXV, 43. [*Ceromastix*] (1906). Europa-centr. et mer.
intercepta MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 469, 21, et XIV, I, 6. [*Masicera*] (1850); RONDI., Dipt. ital. Prodr., IV, 27, 12. [*Masicera*] (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV, 44, 15. [*Masicera*] (1861); MEAD., Entom. Monthly Mag., (2), V, 157. [*Masicera*] (1894); GÜRSCHN., Entom. Nachricht., XXV, 185. [*Decodes*] (1899).
lepida R.-D., Posth., I, 867, 23. (1863).
machateropsis B. B. **nigripes** FALL.
maesta R.-D. = **nigripes** FALL.
modesta R.-D. = **nigripes** FALL.
nigripes FALL.?, Dipt. succ. Musc., I, 24. [*Tachina*] (1820); MEIG.,

*) *Acosmetia caliginosa* Hb., *Agrotis candelarum* STGR., *Bupalus piniarius* L., *Cucullia asteris* SCURR., *Deilephila euphorbiae* L., *Eurhypara notata* L., *Heliothis scutosa* SCURR., *Hybernia* sp., *Mamestra pisi* L., *Miana literosa* Hw., *Ortholitha cervinata* SCURR.

- S. B., IV, 357, 205, (1824) et VII, 191, 55, [*Tachina*] (1838); ZETT., Ins. Lapp., 636, 12, [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III, 1058, 52, (1844), VIII, 3233, 52, (1849) et XIII, 6085, 52, [*Tachina*] (1859); SCHN., F. A., I, 480, [*Tachina*] (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., II, 61, 36, [*Tachina*] (1866).
- abdominalis* R.-D., Myod., 122, 2, [*Blondelia*] (1830) et Posth., II, 29, 3, [*Blondelia*] (1863).
- agilis* MEG., S. B., IV, 307, 118, (1824) et VII, 190, 6, [*Tachina*] (1838); WALK., Ins. Brit., II, 42, 52, [*Tachina*] (1853); SCHN., F. A., I, 477, [*Tachina*] (1862); WACHTL., Wien. entom. Zeig., I, 278, 34, [*Tachina*] (1882); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 39, [*Tachina*] (1892).
- balensis* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), VIII, 481, 45, t. XV, f. 15, [*Masicera*] (1850); SCHN., F. A., I, 485, [*Masicera*] (1862); GERKE, Wien. entom. Zeig., VIII, 221, t. II, f. 1 -2, [*Masicera*] (1889).
- bideus* MEG., S. B., IV, 310, 123, (1824) et VII, 190, 5, [*Tachina*] (1838); SCHN., F. A., I, 476, [*Tachina*] (1862).
- bipartita* R.-D., Posth., II, 34, 1, [*Picconia*] (1863).
- cheeripennis* MEG., S. B., VII, 193, 26, [*Tachina*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 408, 16, t. XIV, f. 4, [*Oodigaster*] (1854); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 38, [*Tachina*] (1892).
- campestris* R.-D., Myod., 114, 6, (1830) et Posth., I, 860, 10, (1863).
- catata* R.-D., Posth., I, 863, 15, (1863).
- cincta* R.-D., Posth., II, 28, 2, [*Blondelia*] (1863).
- cincta* R.-D., Posth., I, 861, 11, (1863).
- cassaria* R.-D., Posth., I, 866, 22, (1863).
- cylindrica* R.-D., Posth., I, 859, 8, (1863).
- dabia* R.-D., (nec FALL.) Myod., 113, 4, (1830).
- fasciata* R.-D., Myod., 123, 4, [*Blondelia*] (1830) et Posth., II, 32, 1, [*Cyrtillia*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 279, 5, [*Phonocera*] (1834) et Suit. à Buff., II, 132, 33, [*Melopia*] (1835).
- festivans* R.-D., Posth., I, 862, 14, (1863).
- floricapa* R.-D., Posth., I, 864, 18, (1863).
- fuliginea* R.-D., Posth., I, 865, 20, (1863).
- fuliginosa* R.-D., Posth., I, 863, 16, (1863).
- falsicornis* R.-D., Posth., I, 855, 1, (1863).
- geomelrae* BEISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, II, 19, [*Tachina*] (1885).

Phragmatobia fuliginosa L., Plusia gamma L., Porthesia similis FÜSS., Tapinostola clymi Tr., Tephroclystia virgaureata DALL., Thaumetopoea pini-vora Tr., Vanessa Io L., polychloros L. et urticae L., Lophyrus sp., Nematus ribesii Scop.

- griseus* R.-D., Myod., 112, 1, (1830) et Posth., I, 857, 3, (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 271, 8, (1834) et Suit. à Buff., II, 135, 7, (1835).
- hydropicæ* R.-D., Myod., 113, 5, (1830) et Posth., I, 865, 19, (1863); Macq., Suit. à Buff., II, 135, 8, (1835).
- quota* PERRIS, Soc. Limb. Lyon, 1852, 62, [*Tachina*] (1852); PAND., Rev. entom., XV, 51, 3, [*Tachina*] (1896); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 402, 8, (1900).
- inflera* BOUCHÉ, Naturgesch., 58, 41, [*Tachina*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., II, 1038, *obscur.* [*Tachina*] (1844).
- machaeropsis* B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 87, [*Derodes*] (1889), LVIII, 316, [*Derodes*] (1891) et LXI, 551, 616, [*Ceromasia*] (1894).
- maesta* R.-D., Posth., I, 866, 21, (1863).
- modesta* R.-D., Posth., I, 858, 6, (1863).
- nitida* R.-D., Myod., 122, 1, [*Blondelia*] (1830) et Posth., II, 28, 1, [*Blondelia*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 278, 1, [*Phococera*] (1834) et Suit. à Buff., II, 131, 30, [*Metopia*] (1835).
- nitida* R.-D., Myod., 113, 3, (1830) et Posth., I, 858, 5, (1863).
- occlusa* R.-D., Posth., I, 868, 1, [*Auctia*] (1863).
- offusca* MEIG., S. B., IV, 308, 119, (1824) et VII, 190, 37, [*Tachina*] (1838).
- omnicara* BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, II, 19, [*Tachina*] (1885).
- opaca* MEIG., S. B., IV, 313, 128, (1824) et VII, 190, 28, [*Tachina*] (1838); SCHIX., F. A., I, 478, [*Tachina*] (1862); ?PAND., Rev. entom., XV, 97, 1, [*Halidayia*] (1896).
- parvica* HARTL., Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I, 283, 10, [*Tachina*] (1838); R.-D., Posth., II, 37, 1, [*Gerraisia*] (1863); MÜK et WACHTL, Wien. entom. Zeitg., XIV, 221, 6 et 241, 1, [*Derodes*] (1895); GÜRSCH., Entom. Nachricht., XXV, 178, 8 et 185, [*Derodes*] (1899).
- palida* SCHIX. (nec MEIG.), F. A., I, 473, [*Tachina*] (1862).
- polychaeta* Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI, 212, [*Tachina*] (1861); SCHIX., F. A., I, 476, [*Tachina*] (1862); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII, 89 et 214, 1, [*Derodes*] (1893).
- praeceps* R.-D., Posth., I, 861, 12, (1863).
- repanda* R.-D., Posth., I, 859, 7, (1863).
- ripae* BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, II, 18, [*Tachina*] (1885).
- setosa* R.-D., Posth., I, 862, 13, (1863).
- terminata* R.-D., Posth., I, 860, 9, (1863).
- timida* R.-D., Posth., I, 864, 17, (1863).
- nitida* R.-D. (Bl.) **nigripes** FALL.
- nitida* R.-D. (L.) **nigripes** FALL.
- occlusa* R.-D. **nigripes** FALL.

- affusca* MEG. = **nigripes** FALL.
aurivora BRISCHKE = **nigripes** FALL.
opaca MEG. = **nigripes** FALL.
pinivora HART. = **nigripes** FALL.
pinivora RATZER,*). FORSTIUS., III, 173, 15. [*Tachina*] (1844): MÜLL. Europacentr.
 et WACHTL., Wien. entom. Zeitg., XIV, 242, 1. [*Derodes*] (1895).
polita SCHN. = **nigripes** FALL.
polychaeta EGG. = **nigripes** FALL.
praeceps R.-D. = **nigripes** FALL.
repanda R.-D. = **nigripes** FALL.
ripae BRISCHKE = **nigripes** FALL.
setosa R.-D. = **nigripes** FALL.
spectabilis B. B. = **albisquama** ZETT.
spinaligera RONDI. = **angelicae** MEG.
stabulans MEG., S. B., IV, 306, 115, (1824) et VII, 191, 19. [*Ta-* Europacentr.
china] (1838): MACQ., Suit. à Buff., II, 145, 23. [*Tachina*] (1835);
 B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 317. [*Derodes*] (1891).
gratiosa MEG., S. B., IV, 312, 126, (1824) et VII, 190, 36.
 [*Tachina*] (1838): MACQ., Annual. Soc. entom. France, 63, II,
 407, 14, t. XIV, f. 11. [*Tachina*] (1854): SCHN., F. A., I,
 478. [*Tachina*] (1862): STEIN, Entom. Nachricht., XXV, 138,
 (1900).
lepida R.-D. = **lepida** MEG.
terminata R.-D. = **nigripes** FALL.
tipida R.-D. = **nigripes** FALL.
riduata MEG., = **angelicae** MEG.
virilis RONDI., Dipt. ital. Prodr., IV, 26, II. [*Masicera*] (1861) et Att. Europacentr.
 Soc. ital. Sci. Nat., IV, 49, 14. [*Masicera*] (1861), XI, 587, nota. et mer.
 5. [*Masicera*] (1868): STEIN, Entom. Nachricht., XIV, 245, 59.
 [*Masicera*] (1888): MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), V, 157.
 [*Masicera*] (1894): WAINWR., Entom. Monthly Mag., (2), XIII,
 226. [*Ceramiasia*] (1902).

Pexomyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 329, (1891) et LX, 111, (1905)

? *Eilesia* R.-D., Posth., I, 598, II, (1863).

- aberrans* Egg., = **rubrifrons** PERR.
discreta R.-D. ? **rubrifrons** PERR.
nodata PASD., = **rubrifrons** PERR.
rubrifrons PERRIS., Soc. Linn. Lyon, 1852, 201. [*Masicera*] (1852): Europacentr.
 B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 329, (1891): BRUCKER, et mer.
 Sitzsber. Akad. Wien, CVII, 543, (1898).

*) *Lymantria dispar* L.,

- aberrans* Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV, 295, [*Roeschia*] (1865).
2-discreta R.-D., Posth., I, 599, 1, [*Edesia*] (1863).
indata PAND., Rev. entom., XV, 55, 9, [*Tachina*] (1896).
rubrifrons R.-D. (nec PERR.), Posth., I, 599, 2, [*Edesia*] (1863).
rubrifrons R.-D. — **rubrifrons** PERR.

Pexopsis

- B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 88, (1889) et LX, 112, (1893).
Entomobia LLOY, Atti Istit. ven., (3), IX, 1342, (1863), nec
 CABAN, 1860, AVES.
Eurygaster MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 289, (1834), nec LAP.
 1833, HEM.; R.-D., Posth., I, 595, 1, (1863).
aprica MEIG., S. B., IV, 384, 250, [*Tachina*] (1834) et VII, 240, 6, Europaentr.
 [*Masicera*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, et mer.
 162, 10, 1, XIV, f. 5, [*Masicera*] (1850); RONDI., Dipt. ital. Prodr.,
 IV, 20, 2, [*Masicera*] (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV, 12,
 5, [*Masicera*] (1861); SCHN., F. A., I, 497, [*Frontina*] (1862);
 R.-D., Posth., I, 596, 1, [*Eurygaster*] (1863); STERN, Entom.
 Nachricht., XXVI, 132, (1900); VILLEN., Bull. Soc. entom. France,
 1900, 162, 5, (1900).
hemisphaerica R.-D., Myod., 144, 5, [*Phryga*] (1830), Annal.
 Soc. entom. France, (2), VI, 436, 2, [*Eurygaster*] (1848) et
 Posth., I, 597, 2, [*Eurygaster*] (1863).
tibialis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 435, 1,
 [*Eurygaster*] (1848); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2),
 VIII, 435, 3, 1, XII, f. 14, [*Frontina*] (1850); SCHN., F. A.,
 I, 496, [*Frontina*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien,
 LVI, 88, 1, 1, f. 16, (1889).
hemisphaerica R.-D. — **aprica** MEIG.
tibialis R.-D. — **aprica** MEIG.

Erycia

- R.-D., Myod., 146, III, (1830) et Posth., I, 900, 1, (1863).
Berallia R.-D., Posth., I, 906, II, (1863).
Baquetia R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 286, VI,
 (1847).
Lupia R.-D., Posth., I, 910, IV, (1863).
Phyga R.-D., Posth., I, 908, III, (1863).
Zaira R.-D., Myod., 150, V, (1830) et Posth., II, 918 (1863).
Zenais R.-D., Myod., 148, IV, (1830).

A. *Conogaster*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 313, (1891) et LX, 111, (1893).

labia Macq. **pruinosa** Mllg.

abilis Rond. **pruinosa** Mllg.

pruinosa Mllg., S. B., IV, 378, 249, [*Fachina*] (1824) et VII, 236, 8. Europaeentr.
[*Myobia*] (1838): Myc., Annal. Soc. entom. France, 63, II, 436. et mer.

H. t. XV, f. 11, [*Myobia*] (1854); Scms., F. A., I, 431, [*Demos-
ticus*] (1862); ? PAND., Rev. entom., XIII, 98, 2, [*Myobia*] (1894);
STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 147, (1900).

labia Macq., Annal. Soc. entom. France, 63, II, 436, 10, t.
XV, f. 6, [*Myobia*] (1854); PAND., Rev. entom., XIII, 100, 1,
[*Myobia*] (1894).

abilis Rond., Dipt. ital. Prodr., IV, 54, 2, [*Viriania*] (1861);
B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 314, (1891).

B. *Ergyia* s. str.

Hemimasiera B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 87, (1892)
et LX, 112, (1893).

agrestis R.-D. **ferruginea** Mllg.

aurifacies R.-D. **ferruginea** Mllg.

aurifrons R.-D. **ferruginea** Mllg.

campestris R.-D. **ferruginea** Mllg.

cinerea R.-D. **ferruginea** Mllg.

concolor R.-D. **ferruginea** Mllg.

conricta R.-D. **ferruginea** Mllg.

dilata Mllg. **ferruginea** Mllg.

fulva Mllg. **ferruginea** Mllg.

fulva Scms. **gyrovaga** Rond.

fera R.-D. **ferruginea** Mllg.

ferruginea Mllg., S. B., IV, 382, 247, [*Fachina*] (1824) et VII, 240. Europa.

3, [*Masicera*] (1838); Myc., Annal. Soc. entom. France, 62, VIII,
459, 3, [*Masicera*] (1850); Scms., F. A., I, 484, [*Masicera*] (1862);
STROMB., Wien, entom. Zeitg., XII, 90, [*Hemimasiera*] (1893) et
Mittteil. Ver. Steierm., XXX, 23, [*Hemimasiera*] (1894); B. B.,
Denkschr. Akad. Wien, LXI, 87, t. I, f. 11, (1889) et LVIII, 327,
[*Hemimasiera*] (1891); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 136,
(1900); VILLES., Bull. Soc. entom. France, 1900, 161, 3, (1900).

agrestis R.-D., Myod., 150, 1, [*Zaira*] (1830) et Posth., I, 911,
I et II, 369, I et 918, [*Zaira*] (1863); Myc., Suit. à Buff.,
II, 111, 31, [*Scenocleptia*] (1835).

aurifacies R.-D., Posth., I, 906, I, [*Baccharis*] (1863).

aurifrons R.-D., Posth., I, 904, 3, (1863).

campestris R.-D., Posth., I, 905, I, (1863).

1) *Eupocis chrysotheca* L., *Melitaea albida* Rond. et *Aurina*
Rott., *Parthesia similis* Fests., *Vanessa* fo. L.

- emerca* R.-D., Posth., I. 904. 2. (1863).
- concolor* R.-D., Posth., I. 908. 3. [*Beraldia*] (1863).
- conciata* R.-D., Posth., I. 913. 3. [*Zenais*] (1863).
- dilata* MEIG., S. B., IV. 387. 257. [*Tachina*] (1824) et VII. 240. 13. [*Masicera*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 408. 17. t. XIV. f. 3. [*Oodigaster*] (1854); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 135. (1900).
- falua* MEIG., S. B., IV. 385. 252. [*Tachina*] (1824) et VII. 240. 7. [*Masicera*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 461. 8. t. XIV. f. 6. [*Masicera*] (1850); R.-D., Posth., I. 903. 1. (1863); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 136. (1900); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900. 161. 1. (1900).
- fera* R.-D., Myod., 149. 2. [*Zenais*] (1830) et Posth., I. 912. 1. [*Zenais*] (1863).
- festivans* MEIG. p. p. (V. *gen.* Ceromasia); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 221. [*Hemimasicera*] (1893); PASD., Rev. entom., XV. 61. 19. [*Tachina*] (1896); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 136. (1900); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900. 161. 2. (1900).
- floralis* R.-D., Posth., I. 905. 6. (1863).
- faribanda* ZETT., Dipt. Scand., III. 1040. 31. [*Tachina*] (1844); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 221. [*Hemimasicera*] (1893).
- grisea* R.-D., Myod., 147. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 113. 33. [*Scnomotopia*] (1835).
- infusata* R.-D., Posth., II. 370. 2. [*Zaira*] (1863).
- limpilupennis* R.-D., Myod., 148. 5. (1830) et Posth., I. 909. 1. [*Phegæa*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 295. 3. (1834).
- murina* HEND., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 202. II. [*Dero-des*] (1901) et Wien. entom. Zeitzg., XXI. 143. 17. [*Hemimasicera*] (1902).
- nusca* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). V. 287. 1. [*Burquetia*] (1847) et ? Posth., II. 374. 3. [*Zaira*] (1863).
- nitida* R.-D., Posth., I. 611. 1. [*Lupia*] (1863).
- properans* ROUD., Dipt. ital. Prodr., III. 127. 6. [*Erorista*] (1859), Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 207. (1865) et XI. 583. [*Tricholyga*] (1868) et Bull. Soc. entom. ital., IV. 211. [*Tricholyga*] (1872); STROM., Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 446. (1898), XIV. 487. [*Masicera*] (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 601. (1900), IX. 547. [*Masicera*] (1904).
- quadrinmaculata* R.-D., Posth., I. 912. 2. [*Zenais*] (1863).
- raficornis* R.-D., Posth., I. 909. 2. [*Phegæa*] (1863).
- rafoscutellata* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 171. 33. t. XV. f. 1. [*Masicera*] (1850); WALK., Ins. Brit., II. 51. 73. [*Tachina*] (1853).
- schistacea* R.-D., Posth., I. 905. 5. (1863).
- scutellaris* R.-D., Myod., 147. 2. (1830).
- sicuta* R.-D., Myod., 149. 3. [*Zenais*] (1830) et Posth., I. 914. 5. [*Zenais*] (1863).

- silvestris* R.-D., Myod., 149, 1. [*Zenais*] (1830) et Posth., I, 913, 1. [*Zenais*] (1863): Macq., Suit. à Buff., II, 111, 36. [*Scenometopia*] (1835).
- raussae* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 170, (1850) et Posth., I, 907, 2. [*Beraldia*] (1863).
- festinans* MEG. p. p. **ferruginea** MEG.
- floralis* R.-D. — **ferruginea** MEG.
- fulvibanda* ZETT. = **ferruginea** MEG.
- grisea* R.-D. — **ferruginea** MEG.
- gyrovaga** ROXD.^{*)}, Dipt. ital. Prodr., IV, 20, 1 et 162. [*Masicera*] (1861), Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV, 45, 4. [*Masicera*] (1861) et Bull. Soc. entom. ital., IV, 212. [*Masicera*] (1872): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 328. [*Hemimasicera*] (1891): PAND., Rev. entom., XV, 57, 13. [*Tachina*] (1896): GUSCUS., Entom. Nachricht., XXV, 179, 13 et 184. [*Hemimasicera*] (1899).
- fulva* SCHN. (nec MEG.) p. p., F. A., I, 484. [*Masicera*] (1862).
E. gen. *Starmia*.
- nigripalpis* MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III, 478, 191, t. V, f. 10. [*Exorista*] (1849): R.-D., Posth., I, 892, 6. [*Starmia*] (1863): STEIN., Entom. Nachricht., XXVI, 144, (1900), *al. s.*
- infusata* R.-D. = **ferruginea** MEG.
- limpidipennis* R.-D. — **ferruginea** MEG.
- marina* HEND. — **ferruginea** MEG.
- musca* R.-D. = **ferruginea** MEG.
- nigripalpis* MACQ. — **gyrovaga** ROXD.
- nitida* R.-D. — **ferruginea** MEG.
- properans* ROXD. — **ferruginea** MEG.
- quadrimaculata* R.-D. — **ferruginea** MEG.
- ruficornis* R.-D. — **ferruginea** MEG.
- rufoscutellata* MACQ. — **ferruginea** MEG.
- schistacea* R.-D. — **ferruginea** MEG.
- scutellaris* R.-D. — **ferruginea** MEG.
- sicula* R.-D. = **ferruginea** MEG.
- silvestris* R.-D. — **ferruginea** MEG.
- raussae* R.-D. — **ferruginea** MEG.

Europaeentr.
et mer.
Africa sept.

C. *Bactromyza*

- B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 329, (1891) et LX, 111, (1895).
- Meigeniopsis* B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 115, (1895).
- Parathryptocera* B. B. in litt. ap. BRÄUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 521 et 542, (1898).
- aurulenta** MEG.^{**)}, S. B., IV, 411, 298. [*Tachina*] (1824) et VII, 211. — Europa.

*) *Doilephila galii* ROETT., Pterogon Proserpina PALL. — *Lophyrus pini* L. et *rufus* KLUG.

***) *Abraxas sylvata* SCOP., *Drepana falcataria* L., *Hyltophila prasinana* L., *Tephroclystia actaeata* WALD., *Yponomeuta padella* L.

16, [*Muscaria*] (1838); BEISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, II, 17, [*Muscaria*] (1835); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 620, [*Trilobacta*] (1894); BRULLÉ, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 521 et 512, (1898).

dubiosa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 115, [*Meigenopsis*] (1893).

scutelligera ZETT., Dipt. Scand., III, 1061, 57, (1811) et XIII, 6087, 57, [*Tachina*] (1859); HEND., Wien. entom. Zeitg., XXI, 141, (1902).

dubiosa B. B. — **aurulenta** MEO.

scutelligera ZETT. — **aurulenta** MEO.

Vibrissina

ROSD., Dipt. ital. Prodr., IV, 35, 43, *a*, (1861).

demissa MEO., S. B., VII, 248, 3, [*Frontina*] (1838); SCHN., F. A., Europa-centr., I, 197, [*Frontina*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 95, t. III, f. 52, (1889).

demissa ROSD. — **turrita** MEO.

muscaria PAND. — **turrita** MEO.

turrita MEO., S. B., IV, 401, 282, [*Tachina*] (1821) et VII, 249, 3, Europa-centr., [*Degeeria*] (1838); ? ROSD., Dipt. ital. Prodr., IV, 43, 3, [*Degeeria*] et met. (1861).

demissa ROSD. (*var.* MEO.), Dipt. ital. Prodr., IV, 37, 1, (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 371, (1891).

muscaria PAND. (*var.* FALL.), Rev. entom., XV, 110, 4, [*Labicilla*] (1896).

Prosopaea

ROSD., Dipt. ital. Prodr., IV, 36, 43, *v*, [*Prosopaea*] (1861), *em.* B. B. 1889

Lurasia R.-D., Posth., II, 409, XXVII, (1863).

Oreshia R.-D., Posth., II, 411, XXVIII, (1863).

A. *Dolichocalan*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 100, (1889) et LX, 115, (1893).

paradoxa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 165, t. IV, f. 71, Europa-mer., (1889) et LVIII, 352, (1891).

stylasa PAND., Rev. entom., XV, 45, 1, [*Roeselia*] (1896).

stylasa PAND. — **paradoxa** B. B.

B. *Prosopaea s. str.*

abbreviata ZETT. — **scutellaris** FALL.

arenaria R.-D., Posth., II, 413, 1, [*Oreshia*] (1863).

Gallia.

- cyrrhata* R. D., Posth., II, 111, f. [*Lucania*] (1863) Gallia
- instabilis* ROED. (1861), B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 91, (1889) et LVIII, 333, (1891); PAND., Rev. entom., XV, 46, 6, [*Roeselia*] (1896); Europe centr. et mer.
- nigricans* Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI, 214, [*Frontina*] (1861); SCHN., F. A., I, 497, [*Frontina*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 91, t. II, f. 30, (1889) et LVIII, 333, (1891); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 178, [*Frontina*] (1892); ?WAINW., Entom. Monthly Mag., (2), XVI, 72, (1905); Europe centr. et mer.
- panicata* SCHN., (nec MEAD.), F. A., I, 492, [*Phorocera*] (1862).
- panicata* SCHN., *nigricans* Egg.
- scutellaris* FALL. (1820), Dipt. succ. Musc., 19, 38, [*Tachina*] (1820); Europa
- MEAD., S. B., IV, 386, 255, [*Tachina*] (1824); ZETT., Dipt. Scand., III, 1051, 44, [*Tachina*] (1844); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 219, (1893); PAND., Rev. entom., XV, 47, 7, [*Roeselia*] (1896);
- abbreviata* ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6083, 45—46, [*Tachina*] (1859); STERN, Entom. Nachricht., XIV, 216, 72, [*Frontina*] (1888); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 334, (1891).

C. *Prosopodes*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 90, (1889) et LX, 110, (1893).

Afzelia R. D., Posth., I, 582, XI, (1863).

- exigua* R. D., Posth., I, 582, I, [*Afzelia*] (1863); Gallia
- fasciata* WILD. (nec FABR.), Ausser, zweifl. Ins., II, 337, 109, [*Fa-* China
- china*] (1830); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 335, (1891).
- fugax* ROED. (1861), Dipt. ital. Prodr., IV, 19, 6, (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 90, t. II, f. 26, (1889) et LVIII, 333, (1891); Europe centr. et mer.
- GIBSON, Entom. Nachricht., XXV, 177, 3, (1899).
- ponoriarum* BIC., ap. BRUCH, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 501, 83, [*Erythrocerus*] (1898).
- ponoriarum* BIC., *fugax* ROED.

Ptychomyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 89, (1889) et LX, 110, (1893).

Bessa R. D., Posth., II, 161, IV, (1863).

Ephya R. D., Posth., II, 156, I, (1863) nec PR. L., I, 109, Com.

(1) *Hippocrita jacobaeae* L.

(2) *Aconista euphorbiae* F., ?*Oenogyna baeticum* RYND. *Oenistis quadra* L.

(3) *Aconista euphrasiae* F., *Orchodia rubiginosa* F.

(4) *Tortrix viridana* L., *Yponomeuta evonymella* L., et mali nella ZILL., *Hemichlora rufa* PANZ.

Hubertia R.-D., Posth., H. 169, VII. (1863).

Lilaea R.-D., Posth., H. 160, III. (1863) *nee* WALK., 1850, Dipt.,
Mik et WACHTL, Wien, entom. Zeitg., XIV. 226. (1895).

Myrsina R.-D., Posth., H. 158, II. (1863).

Obcidea R.-D., Posth., H. 167, VI. (1863).

Osmia R.-D., Posth., H. 166, V. (1863).

Thalpia R.-D., Posth., H. 169, VIII. (1863).

A. *Tachinoptera*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 335. (1894) et LX. 116. (1895).

Eggeri B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 336. (1899). Sicilia.

B. *Ptychomyia* s. str.

ambulatoria R.-D. = **selecta** MEIG.

antocna R.-D. = **selecta** MEIG.

ardeacea R.-D. = **selecta** MEIG.

arazonata R.-D. = **selecta** MEIG.

blanda R.-D. = **selecta** MEIG.

borealis R.-D. = **selecta** MEIG.

caesia R.-D. = **elegans** R.-D.

cognata R.-D. = **selecta** MEIG.

concrecifrons PAND. = **selecta** MEIG.

elegans R.-D., Posth., H. 169, 1. [*Hubertia*] (1863). Galba

caesia R.-D., Posth., H. 171, 2. [*Thalpia*] (1863).

humilis R.-D., Posth., H. 171, 3. [*Thalpia*] (1863).

mera R.-D., Posth., H. 170, 1. [*Thalpia*] (1863).

flavifrons BRISCHKE = **selecta** MEIG.

gracilis R.-D. = **selecta** MEIG.

lilavella R.-D. = **selecta** MEIG.

humilis R.-D. = **elegans** R.-D.

lucta R.-D. = **selecta** MEIG.

lubrica R.-D. = **selecta** MEIG.

Macquarti R.-D. = **selecta** MEIG.

mera R.-D. = **elegans** R.-D.

micromera R.-D. = **selecta** MEIG.

obscurata R.-D., Posth., H. 168, 1. [*Obcidea*] (1863). Galba

palpalis R.-D. = **selecta** MEIG.

parallelata MEIG. = **selecta** MEIG.

pusilla R.-D. = **selecta** MEIG.

secatrix R.-D. = **selecta** MEIG.

selecta MEIG.^{*)}, S. B., IV. 377, 237. [*Tachina*] (1824) et VII. 249. Europa

*) *Acalla cristana* F., *Bupalus pinarius* L., *Oenema detrita* Esp., *Yponomeuta cognatella* Hb. — *Ardis plana* Kl., *Camponiscus*

13. [*Degeeria*] (1838): Macq., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII, 446, 4, t. XIII, f. 15. [*Degeeria*] (1850): SCHN., F. A., I, 535. [*Degeeria*] (1862): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 89, t. II, f. 23. (1889): MÜK. et WACHL., Wien. entom. Zeitg., XIV, 236. [*Lilaca*] (1895): GÄRSCHN., Entom. Nachricht., XXV, 177 (1899): STERN, Entom. Nachricht., XXVI, 148. (1900).
ambulatoria R.-D., Posth., II, 158, 1. [*Myrsina*] (1863).
annona R.-D., Posth., II, 163, 5. [*Lilaca*] (1863).
arideacea R.-D., Posth., II, 159, 2. [*Myrsina*] (1863).
auroannata R.-D., Posth., II, 161, 1. [*Lilaca*] (1863).
blanda R.-D., Posth., II, 165, 2. [*Bessa*] (1863).
borealis R.-D., Myod., 120, 6. [*Phorinia*] (1830) et Posth., II, 164, 8. [*Lilaca*] (1863): Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 270, 6. [*Lydella*] (1834) et Suit. à Buff., II, 126, 10. [*Melopia*] (1835).
cognata R.-D., Posth., II, 163, 6. [*Lilaca*] (1863).
conceivifrons PANZ. (nec ZETT.), Rev. entom., XV, 44, 3. [*Roeschli*] (1896): VULÉN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 402, 7. (1900).
florifrons BRASCHE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, II, 21. [*Degeeria*] (1885): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 621. (1894)
gracilis R.-D., Myod., 119, 2. [*Phorinia*] (1830) et Posth., II, 164, 7. (1863).
hilarella R.-D., Posth., II, 162, 3. [*Lilaca*] (1863).
lacta R.-D., Posth., II, 157, 1. [*Ephyra*] (1863).
lubrica R.-D., Posth., II, 167, 1. [*Osmia*] (1863).
Macquarti R.-D., Myod., 119, 4. [*Phorinia*] (1830) et Posth., II, 161, 2. [*Lilaca*] (1863): Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 270, 5. [*Lydella*] (1834) et Suit. à Buff., II, 125, 9. [*Melopia*] (1835).
micromera R.-D., Myod., 119, 3. [*Phorinia*] (1830) et Posth., II, 157, 1. [*Ephyra*] (1863).
palpalis R.-D., Posth., II, 166, 3. [*Bessa*] (1863).
parallela MEG., S. B., IV, 377, 238. [*Tachina*] (1824) et VII, 249, 1. [*Degeeria*] (1838): Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 272, 13. [*Lydella*] (1834). Suit. à Buff., II, 137, 16. [*Lydella*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII, 453, 17, t. XIII, f. 14. [*Degeeria*] (1850): SCHN., F. A., I, 535. [*Degeeria*] (1862): WÜR., Entom. Tijdschr., (2). IV, 153. [*Degeeria*] (1869): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 571. (1894). STERN, Entom. Nachricht., XXVI, 145. (1900).
pasilla R.-D., Posth., II, 159, 3. [*Myrsina*] (1863).
secatrix R.-D., Posth., II, 165, 1. [*Bessa*] (1863).
teutheredinam HARR., Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I, 295, 26 [*Tachina*] (1838).

luridiventris FALL., *Lophyrus polytomus* HARR., *Monophadnus rosarum* BASCH., *Nematus appendiculatus* HARR., *geniculatus* HARR., *miliaris* PANZ. et *virescens* HARR., *Priophorus padi* L.

- tincta* MEIG., S. B., IV, 378, 239. [*Tachina*] (1824) et VII, 249, 7. [*Melopia*] (1838): MACQ., Suit. à Buff., II, 122, 14. [*Masi-cera*] (1835): ZELT., Dipt. Scand., III, 1030, 20, (1844), VIII, 3228, 20, (1849) et XIII, 6080, 20. [*Tachina*] (1859): STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 26, (1894): GÄRSCHN., Entom. Nachricht., XXV, 177, (1899).
- trépida* R.-D., Posth., II, 162, 4. [*Lilaca*] (1863).
- teubredinam* HART. **selecta** MEIG.
- tincta* MEIG. **selecta** MEIG.
- trépida* R.-D. **selecta** MEIG.

Genera incerti loci.

- Auromyia* R.-D., Posth., I, 850, VI, [*Lucmya*] (1863) *cu* SCUD. 1882.
- Edomyia* R.-D., Posth., I, 841, II, (1863) *cu*.
- Erytaca* R.-D., Posth., I, 847, IV, (1863).
- Faedorin* R.-D., Posth., I, 848, V, (1863).
- Gimmerthalia* R.-D., Posth., I, 851, VII, [*Gimmerthalia*] *cu* MARSH. (1863).
- Oswaldia* R.-D., Posth., I, 840, 1, (1863).
- Phacelima* R.-D., Posth., I, 842, III, (1863).
- astivalis* R.-D. **honesta** R.-D.
- agrestis** R.-D., Posth., I, 841, 1, [*Edomyia*] (1863). Gallia.
- campestris* R.-D. - **neglecta** R.-D.
- clausa** R.-D., Posth., I, 850, 1, [*Lucmyia*] (1863). Gallia
- excitata* R.-D. - **honesta** R.-D.
- flaripalpis* R.-D. **honesta** R.-D.
- flaripennis* R.-D. - **muscaria** R.-D.
- honesta** R.-D., Posth., I, 842, 1, [*Phacelima*] (1863). Gallia
- astivalis* R.-D., Posth., I, 843, 2, [*Phacelima*] (1863).
- excitata* R.-D., Posth., I, 844, 5, [*Phacelima*] (1863).
- flaripalpis* R.-D., Posth., I, 843, 3, [*Phacelima*] (1863).
- laeta* R.-D., Posth., I, 845, 7, [*Phacelima*] (1863).
- honesta* R.-D., Posth., I, 844, 4, [*Phacelima*] (1863).
- cavalis* R.-D., Posth., I, 846, 8, [*Phacelima*] (1863).
- solers* R.-D., Posth., I, 847, 9, [*Phacelima*] (1863).
- vesana* R.-D., Posth., I, 845, 6, [*Phacelima*] (1863).
- jucunda** R.-D., Posth., I, 848, 1, [*Erytaca*] (1863). Gallia.
- laeta* R.-D. = **honesta** R.-D.
- muscaria** R.-D., Posth., I, 840, 1, [*Oswaldia*] (1863). Gallia.
- flaripennis* R.-D., Posth., I, 841, 2, [*Oswaldia*] (1863).
- acbulosa* R.-D. **honesta** R.-D.
- neglecta** R.-D., Posth., I, 849, 1, [*Faedorin*] (1863). Gallia
- campestris* R.-D., Posth., I, 849, 2, [*Faedorin*] (1863)

- officiosa* R.-D., *Posth.*, I, 852, 1, [*Gimnerthalia*] (1863). Gallia
curalis R.-D., *honesta* R.-D.,
sabars R. D., *honesta* R.-D.,
vesana R. D., *honesta* R.-D.

Staurochaeta

B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVI, 90, (1889) et LX, 116, (1893).

A. *Pentangia*

B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVI, 90, (1889) et LX, 116, (1893).

parva B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVI, 164, 1, II, f. 25, (1889). Europe-centr.

B. *Staurochaeta* s. str.

albocingulata FALL., *Dipt. suae. Muse.*, 16, 30, [*Tachina*] (1820); Europa
Mémo. S. B., IV, 376, 236, [*Tachina*] (1824) et VII, 219, 10
 [*Degeeria*] (1838); *Zerr., Dipt. Scand.*, III, 1054, 47, (1844) et
 XIII, 6084, 47, [*Tachina*] (1859); *Myco., Annal. Soc. entom.*
 France, (2), VIII, 449, 10, [*Degeeria*] (1859); *Bonsp., Fland.*
Insekt., II, 59, 34, [*Tachina*] (1866); *MEAD., Entom. Monthly*
Mag., (2), V, 158, [*Banahaeria*] (1894); *PANZ., Rev. entom.*
 XV, 111, 5, [*Latrillia*] (1896); *STALS, Entom. Nachricht.*, XXVI
 13, [*Degeeria*] (1900).

anthomyiaria ROSD., *Dipt. ital. Prodr.*, IV, 42, *nuda*, [*Degeeria*]
 (1861).

gracilis ECO., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XI, 214, [*Banahaeria*]
 (1861); *Scars., F. A.*, I, 496, [*Banahaeria*] (1867).

B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVI, 90, 1, II, f. 27, (1889).

anthomyiaria ROSD., *albocingulata* FALL.

gracilis ECO., *albocingulata* FALL.

C. *Parergania*

B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVI, 91, (1889) et LX, 116, (1893).

vibrissata ROSD., *Dipt. ital. Prodr.*, IV, 108, 1, [*Erynaia*] (1861). Europe-centr.
 et mer.

Cestonia

ROSD., *Dipt. ital. Prodr.*, IV, 105, 63, *o.* (1861).

eimeraria ROSD., *Dipt. ital. Prodr.*, IV, 106, 1, (1861). *PANZ., Rev. Entom.*
entom., XV, 111, 4, [*Erynaia*] (1896). Europe-centr.

(= *Monobolus* paripart.) L.

Frontina

MEIG., S. B., VII, 247, 35, (1838); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 90, (1889).

aaronitens HAERT. **laeta** MEIG.

laeta MEIG.⁹⁾, S. B., IV, 331, 245. [*Tachina*] (1824) et VII, 248, 1. Europa.

t. LXXI, f. 21—25, (1838); MACQ., Suit. à Buff., II, 129, 24.

[*Metopia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 433, 1.

t. XII, f. 5, (1850); WALK., Ins. Brit., II, 79, 136. [*Tachina*]

(1853); ROSD., Dipt. ital. Prodr., IV, 36, 2, (1861); SEMS., F. A.,

I, 497, (1862); R.-D., Posth., I, 580, 1, (1863); WILF., Entom.

Tijdschr., (2), IV, 143, (1869); GERCKE, Wien entom. Zeitg.,

VIII, 221, (1888); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 90, t. II,

f. 28, (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 177, (1892);

Mik et WACHTL, Wien entom. Zeitg., XIV, 233, (1895); PAND.,

Rev. entom., XV, 48, 8. [*Roeselia*] (1896); HEND., Verh. zool.-bot.

Ges. Wien, LI, 209, 6, (1901).

aaronitens HAERT., Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I, 294, 24.

[*Tachina*] (1838).

lactabilis ZETT., Dipt. Scand., III, 1049, 42. [*Tachina*] (1844).

testacea R.-D., Myod., 106, 6. [*Latreillia*] (1830); MACQ., Soc.

Sci. Lille, 1833, 282, 15. [*Pharocera*] (1834) et Suit. à Buff.,

II, 124, 3. [*Metopia*] (1835); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI,

150, (1900).

lactabilis ZETT. **laeta** MEIG.

? **latifascia** WALK., Entom., V, 340, 65, (1871).

Aegyptus.

testacea R.-D. **laeta** MEIG.

sp. ind. LOEW, Berlin entom. Zeitschr., XII, 386, 16, (1868).

Cilicia.

Erynnia

R.-D., Myod., 125, XIII, (1830).

Fallenia MEIG., S. B., VII, 265, 49, (1838) *var.* MEIG. 1820. Dipt.

Schembria ROSD., Dipt. ital. Prodr., IV, 110, (1861).

antennata ROSD., Dipt. ital. Prodr., IV, 109, 3, (1861).

Italia.

aristata ROSD., Dipt. ital. Prodr., IV, 109, 2, (1861).

Italia.

coracina MEIG., S. B., IV, 418, 311. [*Tachina*] (1824) et VII, 265, 2, t.

Europeacentr.

LXXII, f. 45—48. [*Fallenia*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom.

France, (3), III, 45, t. II, f. 15. [*Fallenia*] (1855); SEMS., F. A., I,

527. [*Fricaldzкия*] (1862).

longicornis R.-D. - **meridionalis** ROSD.

meridionalis ROSD., Dipt. ital. Prodr., IV, 111, 1. [*Schembria*] (1861).

Ins. Melita.

? *longicornis* B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXIII, 401. [*Schem-*

bria] (1891).

⁹⁾ *Malacosoma castrensis* L., *Smerinthus ocellata* L.

nitida R.-D.*), Myod., 125, 1, (1830) et Posth., I, 927, 1, (1863); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV, 110, 4, (1861) et Nota d. galle dell'Olmo, t. I, f. 1-8, (1870); JAROSCH., Truly naturf. Ges. Karkoff, XX, 27, 31, (1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. V, f. 103, (1889); PAND., Rev. entom., XV, 119, (1896).

pectiolata Macq., Suit. à Buff., II, 132, 35, [*Metopia*] (1835).

pectiolata Macq., **nitida** R.-D.

Campylochaeta

ROND., Dipt. ital. Prodr., III, 169, 27, B, [*Campylochaeta*] (1859).

A. *Fvivaldzkia*

SCHN., Wien. entom. Monatschr., V, 143, (1861).

Hypochaeta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 93, (1889) et LX, 117, (1893).

distincta MEIG.**), S. B., 413, 302, (1824), VI, 368, [*Tachina*] (1830) et VII, 263, 2, [*Doria*] (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 281, 11, [*Phorocera*] (1834) et Suit. à Buff., II, 129, 22, [*Metopia*] (1835); SCHN., F. A., I, 494, nota, [*Phorocera*] (1862); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 135, (1900).

longicornis SCHN. *ance* FALL., F. A., I, 527, (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 93, t. H, f. 39, [*Hypochaeta*] (1889); COCHILL., Rev. Tachin. N. A., 65, [*Hypochaeta*] (1897).

longicornis FALL., Vet. Akad. Handl., XXXI, 282-39, [*Tachina*] (1810) et Dipt. succ. Musc., 31, 63, [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV, 417, 310, [*Tachina*] (1826) et VII, 265, 1, [*Fallenia*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III, 1157, 157, (1844) et XIII, 6131, 157, [*Tachina*] (1859); BOSSQ., Fiml. Insekt., II, 88, 92, [*Tachina*] (1866).

longicornis SCHN., **distincta** MEIG.

B. *Campylochaeta* s. str.

obscura FALL., Vet. Akad. Handl., XXXI, 281, [*Tachina*] (1810) et Dipt. succ. Musc., 29, 59, [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV, 396, 273, [*Tachina*] (1821); ? Macq., Suit. à Buff., II, 120, 6, [*Masicera*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., III, 1125, 123, [*Tachina*] (1844); SCHN., F. A., I, 490, [*Phorocera*] (1862).

patherina ZETT., Dipt. Scand., III, 1158, 159, [*Tachina*] (1844);

SCHN., F. A., I, 493, [*Phorocera*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 223, (1893).

*) *Galeruca calnariensis* DITTS.

**) *Lithosia unita* Hb., *Pygaera eurtula* L.

praeceor MEIG., S. B., IV, 390, 262. [*Tachina*] (1824) et VII, 261, 13. [*Phorocera*] (1838): MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VIII, 431, 17, t. XII, f. 6. [*Phorocera*] (1850): SCHN., F. A., I, 492. [*Phorocera*] (1862): STEIN, *Entom. Nachricht.*, XXVI, 146. (1900).

schistacea ROND. (*nec* MEIG.), *Dipt. ital. Prodr.*, III, 170, 1. (1859); JAROSCH., *Trudy naturf. Ges. Karkoff*, 1883, 316, 35. [*Phorocera*] (1883); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVI, 93, t. II, f. 44. (1889); PAND., *Rev. entom.*, XIV, 332, 3. [*Phorocera*] (1895).

pantherina ZETT. **obscura** FALL.

praeceor MEIG. **obscura** FALL.

schistacea ROND. **obscura** FALL.

Ptesiomyia

B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LX, 117 et 202. (1893).

microstoma B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LX, 202. (1893). Algeria.

Gaedia

MEIG., S. B., VII, 216, 19. (1838).

connexa MEIG., S. B., IV, 366, 219. [*Tachina*] (1824) et VII, 216, 1. t. LXX, f. 1—5. (1838); ROND., *Dipt. ital. Prodr.*, IV, 113, 2. Europe centr. et mer.

(1861); SCHN., F. A., I, 487. (1862); R.-D., *Posth.*, I, 762, 1. (1863); JAROSCH., *Trudy naturf. Ges. Karkoff*, XIX, 12, 20. (*sep.*) (1885); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVI, t. II, f. 32. (1889); PAND., *Rev. entom.*, XV, 121, 4. [*Erynnia*] (1896).

distincta Egg., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XI, 213. (1861); SCHN., F. A., I, 487. (1862). Europe centr. et mer.

parmensis ROND., *Dipt. ital. Prodr.*, IV, 113, 1. (1861) et *Atti Soc. ital. Sci. Nat.*, VIII, 221. (1865).

parmensis ROND. **distincta** Egg.

Phorinia

R.-D., *Myod.*, 118, VIII. (1830) et *Posth.*, I, 491, 1. (1863).

A. *Phorinia* s. str.

Doria ROND. (*nec* MEIG.), *Dipt. ital. Prodr.*, III, 173, 28, a. (1859).

Eretria R.-D., *Posth.*, I, 492, II. (1863).

Hersilia R.-D., *Posth.*, I, 499, IV. (1863) *nec* SAV.

Haesa R.-D., *Posth.*, I, 498, III. (1863).

- agilis* R.-D. **aurifrons** R.-D.
albifrons R.-D. **aurifrons** R.-D.
aurifrons R.-D.^{*)}, Myod., 118, 1. (1830) et Posth., 1. 491, 1. (1863); Europa, Macq., Suit. à Buff., II, 125, 8. [*Melopia*] (1835).
agilis R.-D., Posth., 1. 497, 9. [*Ectetria*] (1863).
albifrons R.-D., Posth., 1. 493, 2. [*Ectetria*] (1863).
blanda R.-D., Posth., 1. 495, 5. [*Ectetria*] (1863).
cinctea R.-D., Posth., 1. 501, 1. [*Hersilia*] (1863).
delecta Meig., S. B., VII, 262, 17. [*Phorocera*] (1838); Schu., F. A., 1. 492. [*Phorocera*] (1862); R.-D., Posth., 1. 499, 2. [*Haesa*] (1863); VULLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900, 161, 7. (1900); SREIN, Entom. Nachrichten., XXVI, 174. (1900).
excitata R.-D., Posth., 1. 492, 1. [*Ectetria*] (1863).
festiva R.-D., Posth., 1. 497, 10. [*Ectetria*] (1863).
flarisquamis R.-D., Posth., 1. 498, 1. [*Haesa*] (1863).
floralis R.-D., Posth., 1. 502, 3. [*Hersilia*] (1863).
hilaris R.-D., Posth., 1. 491, 3. [*Ectetria*] (1863).
humilis R.-D., Posth., 1. 498, 11. [*Ectetria*] (1863).
minor R.-D., Myod., 119, 5. (1830) et Posth., 1. 496, 7. [*Ectetria*] (1863).
nigripalpis Rond., Dipt. ital. Prodr., III, 174, 1. [*Doria*] (1859); JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XIX, 13, 21. [*Phorocera*] (1885); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. II, 1. 42. [*Doria*] (1889); PAXA., Rev. entom., XIV, 342, 16. [*Zenillia*] (1895); GUESCH., Entom. Nachricht., XXV, 177. [*Doria*] (1899).
obscurata R.-D., Posth., 1. 495, 6. [*Ectetria*] (1863).
prorocatrix R.-D., Posth., 1. 496, 8. [*Ectetria*] (1863).
sibirica R.-D., Posth., 1. 502, 2. [*Hersilia*] (1863).
velox R.-D., Posth., 1. 494, 4. [*Ectetria*] (1863).
blanda R.-D. **aurifrons** R.-D.
cinctea R.-D. **aurifrons** R.-D.
delecta Meig. **aurifrons** R.-D.
excitata R.-D. **aurifrons** R.-D.
festiva R.-D. **aurifrons** R.-D.
flarisquamis R.-D. **aurifrons** R.-D.
floralis R.-D. **aurifrons** R.-D.
hilaris R.-D. **aurifrons** R.-D.
humilis R.-D. **aurifrons** R.-D.
minor R.-D. **aurifrons** R.-D.
nigripalpis Rond. **aurifrons** R.-D.
obscurata R.-D. **aurifrons** R.-D.
prorocatrix R.-D. **aurifrons** R.-D.
sibirica R.-D. **aurifrons** R.-D.
velox R.-D. **aurifrons** R.-D.

*) *Agrotis brunnea* F.

B. *Amphichaeta*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 91, (1889) et LX, 117, (1893).

bicineta MEIG., S. B., IV, 381, 244, [*Tachina*] (1824) et VII, 240, 1, Europaceentr.
[*Masicera*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II, 137, 19, [*Lydella*]
(1835); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 91, t. II, f. 34, (1889).

Diplostichus

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 93, (1889) et LX, 118, (1893).

A. *Diplostichus s. str.*

abnormis B. B. — **janithrix** HART.

janithrix HART.?), Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I, 289, 15, [*Ta-* Europaceentr.
china] (1838); R.-D., Myod., I, 270, 18, [*Exorista*] (1863); MÜK
et WACHRL., Wien, entom. Zeitg., XIV, 229, 11, (1895).

abnormis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 617, (1894).

teuthredinum B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 165, t. II, f.
41, (1889) et LXI, 617, (1894).

teuthredinum B. B. — **janithrix** HART.

B. *Phonomyia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 119, (1893).

micronyx B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 203, 98, (1893).

Compsilura

BOUCHÉ, Naturg. d. Insekt., I, 58, (1834); MÜK, Wien, entom. Zeitg., XIV, 52, (1894).

Doria MEIG., S. B., VII, 263, 47, (1838); MACQ., Annal. Soc.
entom. France, (2), VI, 98, XIV, (1848); R.-D., Posth.,
I, 534, 1, (1863).

Machaerea RONDO., Dipt. ital. Prodr., III, 159, 26, B, (1859).

acronyctae BÉ — **concinata** MEIG.

antipis R.-D. — **concinata** MEIG.

apricans R.-D. — **concinata** MEIG.

ardeacca R.-D. — **concinata** MEIG.

bombylicora R.-D. — **concinata** MEIG.

cajue R.-D. — **concinata** MEIG.

*) *Lophyrus fepetorum* HART., Hercyniae HART., pini L., simili
lis HART., variegatus HART. et virens KLUG.

- concinata** MEG.?, S. B., IV, 412, 301, [*Tachina*] (1821) et VII, 263, 1, LXXII, f. 34—39, [*Doria*] (1838): BOUCHE, Naturg., 57, 39, 1, V, f. 15—19, [*Tachina*] (1834): MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 280, 9, [*Phorocera*] (1834). Suit. à Buff., II, 128, 19, [*Metopia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 98, 1, t. IV, f. 5, [*Doria*] (1848): HAERL., Jahresh. Fortschr. Forstwiss., I, 296, 27, [*Tachina*] (1838): WALK., Ins. Brit., II, 88, 156, [*Tachina*] (1853): SCHN., F. A., I, 489, [*Phorocera*] (1862): R.-D., Posth., I, 536, 1, [*Doria*] (1863): WULF, Entom. Tijdschr., (2), IV, 114 et 153, [*Phorocera*] (1864): ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI, 583, nota, 5, [*Phorocera*] (1868): MEADE, Entom., XIV, 288, (1881), XV, 24, [*Phorocera*] (1882) et Entom. Monthly Mag., (2), III, 210, [*Phorocera*] (1882): WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I, 278, 29, [*Phorocera*] (1882): BERTOLINI, Almanacco Trento, 19, f. 33, [*Tachina*] (1886): GERCKE, Wien. entom. Zeitg., VIII, 220, [*Phorocera*] (1889): WACHTL et KOES, Die Nonne, 25, (1893): MIK, Wien. entom. Zeitg., XIII, 52, 26, (1894): MIK et WACHTL, Wien. entom. Zeitg., XIV, 236, (1895): PAND., Rev. entom., XIV, 335, 3, [*Zenillia*] (1895): WULF et MELL., Naamlist, 83, [*Phorocera*] (1898): GIBSCHN., Entom. Nachricht., XXV, 178, 6, (1899): MELL., Zool. Jahrbüch., XV, 680, f. 50, [*Phorocera*] (1901).
- acragyctae* BOUCHE, Naturg., 57, 40, [*Tachina*] (1834).
- antiopis* R.-D., Myod., 134, 9, [*Phorocera*] (1830).
- apricans* R.-D., Myod., 133, 4, [*Phorocera*] (1830) et Posth., I, 508, (1863): MACQ., Suit. à Buff., II, 128, 17, [*Metopia*] (1835).
- arileacea* R.-D., Posth., I, 538, 2, [*Doria*] (1863).
- bombycivora* R.-D., Myod., 136, 14, [*Phorocera*] (1830) et Posth., I, 509 et 533, [*Phorocera*] (1863).

*) *Abraxas grossulariata* L., *Acroneicta aceris* L., *alni* L., *euspis* Hb., *megacephala* F., *rumicis* L. et *tridens* SCHIFF., *Araschnia levana* L. et *prorsa* L., *Arctia caja* L., *Attacus Cynthia* L., *Catocala promissa* ESP., *Craniophora ligustri* FABR., *Cucullia lactucae* ESP. et *verbasci* L., *Dasychira pudibunda* L., *Difina tiliae* L., *Diloba caeruleocephala* L., *Dipterygia scabriuscula* L., *Drymonia chaonia* Hb., *Euproctis chryssorrhoea* L., *Hyloicus pinastri* L., *Libythea celtis* LICH., *Lymantria dispar* L. et *monacha* L., *Macrothylacia rubi* L., *Mamestra brassicae* L., *oleracea* L. et *persicariae* L., *Malacosoma neustria* L., *Oeonistis quadra* L., *Phalera bucephala* L., *Pieris brassicae* L. et *rapae* L., *Plusia festucae* L. et *gamma* L., *Poecilocampa populi* L., *Porthesia similis* FÜSSL., *Pygaera anachoreta* F., *Pyraucis atalanta* L., *Smerinthus populi* L., *Spilosoma lubricipeda* L. et *menthastri* ESP., *Stauropus fagi* L., *Stilpnotia salicis* L., *Taeniocampa stabilis* VIEW., *Thaumetopoea proceSSIONEA* L. et *pitycampa* SCHIFF., *Timandra amata* L., *Trachea atriplicis* L., *Vanessa antiopa* L., *Io* L., *urticae* L. et *xanthomelas* ESP., *Yponomeuta padella* L. — *Cimbex humeralis* FOURC., *Trichiocampus viminalis* FABR.

- cajac* R.-D., Myod., 135, 12. [*Phorocera*] (1830) et Posth., I, 509 et 533. [*Phorocera*] (1863).
- flavifrons* R.-D., Rev. Mag. Zool., III, 6, 9. [*Phorocera*] (1851).
- flavipennis* R.-D., Myod., 136, 15. [*Phorocera*] (1830) et Posth., I, 509 et 533. (1863); Macq., Suit. à Buff., II, 128, 20. [*Metopia*] (1835).
- gracilis* R.-D., Myod., 136, 16. [*Phorocera*] (1830) et Posth., I, 509 et 533. (1863).
- Guerini* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 178. [*Phorocera*] (1850).
- iorora* R.-D., Myod., 135, 10. [*Phorocera*] (1830).
- meditabunda* MEG., S. B., VII, 263, 3. [*Doria*] (1838); SCHN., F. A., I, 493. [*Phorocera*] (1862); R.-D., Posth., I, 538, 3. [*Doria*] (1863); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 143. (1900).
- munda* MEG., S. B., IV, 395, 271. [*Tachina*] (1824) et VII, 261, 16, t. LXXII, f. 28—33. [*Phorocera*] (1838); WULF, Entom. Tijdschr., (2), IV, 144. [*Phorocera*] (1864); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 148. (1900); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 161, 4. (1900).
- myioidea* R.-D., Myod., 135, 13. [*Phorocera*] (1830) et Posth., I, 509 et 533. (1863).
- nileus* R.-D., Myod., 134, 7. [*Phorocera*] (1830) et Posth., I, 509 et 533. (1863).
- noctuarum* R.-D., Myod., 134, 6. [*Phorocera*] (1830) et Posth., I, 509 et 533. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 280, 8. [*Phorocera*] (1834) et Suit. à Buff., II, 128, 18. [*Metopia*] (1835).
- picridis* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 179. [*Phorocera*] (1850).
- prosaе* R.-D., Myod., 134, 8. [*Phorocera*] (1830).
- pusilla* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 181. [*Phorocera*] (1850).
- pygmaea* R.-D., Myod., 135, 11. [*Phorocera*] (1830).
- servicentris* ROXD., Dipt. ital. Prodr., III, 159, 1. (1859) et IV, 159. [*Machaerua*] (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. II, f. 33. [*Machaerua*] (1889).
- stipida* WULF (*ae* MEG.), Entom. Tijdschr., (2), IV, 144. [*Phorocera*] (1864); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 224. (1893).
- taeniata* MEG., S. B., IV, 389, 260. [*Tachina*] (1824) et VII, 261, 11. [*Phorocera*] (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 429, 14, t. XII, f. 4. [*Phorocera*] (1850); STEIN, Entom. Nachricht., XXV, 149. (1900); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 161, 4. (1900); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV, 488. [*Phorocera*] (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX, 548. [*Phorocera*] (1904).
- varia* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 134. [*Phorocera*] (1850).

flavifrons R.-D. **concinata** MEIG.
flavipennis R.-D. **concinata** MEIG.
gracilis R.-D. -- **concinata** MEIG.
Guerini R.-D. **concinata** MEIG.
iorora R.-D. **concinata** MEIG.
meditabunda MEIG. -- **concinata** MEIG.
monda MEIG. -- **concinata** MEIG.
myioides R.-D. **concinata** MEIG.
nitens R.-D. -- **concinata** MEIG.
noctuarum R.-D. -- **concinata** MEIG.
picidis R.-D. -- **concinata** MEIG.
prosaæ R.-D. -- **concinata** MEIG.
pusilla R.-D. -- **concinata** MEIG.
pygææ R.-D. **concinata** MEIG.
servicentris ROSE. -- **concinata** MEIG.
stipida WOLF **concinata** MEIG.
tacuinata MEIG. -- **concinata** MEIG.
varia R.-D. -- **concinata** MEIG.

Pales

R.-D., Myod., 154, II. (1830) *nov* MEIG. 1800. Dipt.

Phorocera B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 93. (1889).

aeneiventris BIG., Bull. Soc. zool. France, 1891, 277. [*Phorocera*] Ins. Canar. (1891).

acstuanus MEIG. -- **pavida** MEIG.
Bellierella R.-D. -- **pavida** MEIG.
Blondeli R.-D. -- **pumicata** MEIG.
braconius R.-D. -- **pumicata** MEIG.
cacralescens R.-D. **pavida** MEIG.
campicola R.-D. -- **pavida** MEIG.
cilipeda ROSE. **pavida** MEIG.

cyanea MACQ., Hist. nat. Can. Webb, Entom., I, 111, 59. [*Eurygaster*] Ins. Canar. (1838) et Dipt. exot., III, 215, (58), I. [*Eurygaster*] (1843).

crucastri R.-D. **pavida** MEIG.
festiva R.-D. **pavida** MEIG.
floræa R.-D. **pavida** MEIG.
humilis R.-D. **pavida** MEIG.
lyalinata R.-D. **pavida** MEIG.
integra R.-D. **pavida** MEIG.
internæa WALK. **pavida** MEIG.
irreguata R.-D. **pavida** MEIG.
lacrigata R.-D. **pavida** MEIG.
lateralis R.-D. **pavida** MEIG.
maculata R.-D. **pavida** MEIG.
molesta R.-D. **pavida** MEIG.

- pavida** MEIG.*) (*ucc* HLL.), S. B., IV, 398, 279. [*Tachina*] (1824) et VII, 261, 12. [*Phorocera*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II, 125, 6. [*Melospia*] (1835) et *Annal. Soc. entom. France*, (2), VIII, 430, 16, t. XII, f. 5. [*Phorocera*] (1850); SCHIX., F. A., I, 492. [*Phorocera*] (1862); R.-D., *Posth.*, I, 522, 4. (1863); STEIN, *Entom. Nachricht.*, XXVI, 146. (1900); VILLEX., *Bull. Soc. entom. France*, 1900, 161, I et 402. (1900); SROBEL, *Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg.*, XIV, 488. [*Phorocera*] (1902) et *Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg.*, IX, 548. [*Phorocera*] (1904).
- aestivans* MEIG., S. B., VII, 261, 10. [*Phorocera*] (1838); MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VIII, 431, 18, t. XII, f. 3. [*Phorocera*] (1850); SCHIX., F. A., I, 492. [*Phorocera*] (1862); R.-D., *Posth.*, I, 530, 19. (1863); STEIN, *Entom. Nachricht.*, XXVI, 130. (1900); VILLEX., *Bull. Soc. entom. France*, 1900, 161, 6. (1900).
- Bellierella* R.-D., *Posth.*, I, 519, 1. (1863).
- caeruleescens* R.-D., *Posth.*, I, 529, 15. (1863).
- campicola* R.-D., *Posth.*, I, 523, 5. (1863).
- cilipeda* ROXD., *Dipt. ital. Prodr.*, III, 167, 7. [*Phorocera*] (1859); SCHIX., F. A., I, 492. [*Phorocera*] (1862); WACHTL, *Wien. entom. Zeitg.*, I, 278, 30. [*Phorocera*] (1882); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LXI, t. II, f. 40. (1889) et LXIII, 338. [*Phorocera*] (1891); MEADE, *Entom. Monthly Mag.*, (2), III, 212. [*Phorocera*] (1892).
- crucastri* R.-D., *Posth.*, I, 526, 11. (1863).
- festiva* R.-D., *Posth.*, I, 523, 6. (1863).
- florca* R.-D., *Myod.*, 155, 1. (1863).
- humilis* R.-D., *Posth.*, I, 526, 10. (1863).
- hyalinata* R.-D., *Posth.*, I, 525, 8. (1863).
- integra* R.-D., *Posth.*, I, 527, 12. (1863).
- internera* WALK., *Ins. Brit.*, II, 62, 98. [*Tachina*] (1853).
- irrequieta* R.-D., *Posth.*, I, 529, 17. (1863).
- laevigata* R.-D., *Annal. Soc. entom. France*, (2), V, 285, 4. (1847) et *Posth.*, I, 521, 3. (1863).
- lateralis* R.-D., *Posth.*, I, 529, 16. (1863).
- maculata* R.-D., *Posth.*, I, 528, 14. (1863).
- modesta* R.-D., *Posth.*, I, 530, 18. (1863).
- processionae* RATZEB., *Forstins.*, II, 125, 2. [*Tachina*] (1844); MIK et WACHTL, *Wien. entom. Zeitg.*, XIV, 238, 23. [*Phorocera*] (1895).
- punicata* MACQ. (*ucc* MEIG.), *Annal. Soc. entom. France*, (2),

*) *Acroneicta tridens* SCHIFF., *Agrotis stigmatica* HB. et *xanthographa* F., *Attacus Cynthia* L. et *Imula* F., *Eriogaster catrix* L., *Euproctis chrysoorthoca* L., *Orgyia ericae* GARM., *Panolis griseovariegata* GOEZE, *Plusia gamma* L., *Thaumetopoea processionea* L. — *Emphytus cingillum* KUGG.

VIII, 426, 10, 1, XII, f. 11. [*Phorocera*] (1850); GIER., Annal. Soc. entom. France, (4), IV, 155. [*Phorocera*] (1876); PAND., Rev. entom., XIV, 337, 7. [*Zenillia*] (1895).

strenua R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 283, 1. (1847) et Posth., I, 520, 2. (1863).

petrosa R.-D. **pumicata** MEIG.

processionaria RATZEL. **pavida** MEIG.

pumicata Macq. **pavida** MEIG.

pumicata MEIG.*, S. B., IV, 397, 276. [*Tachina*] (1824) et VII, 201. Europe.

9. [*Phorocera*] (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 292, 1, 1, IV,

f. 10. (1834) et Suit. à Buff., II, 111, 23. [*Scenometopia*] (1835);

ZETT., Dipt. Scand., III, 1128, 126. (1844) et XIII, 6115, 126.

[*Tachina*] (1859); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), V, 284,

2. (1847) et Posth., I, 527, 13. (1863); ROSS., Dipt. ital. Prodr.,

III, 166, 6. [*Phorocera*] (1859); BONSP., Finnl. Insekt., II, 81, 79.

[*Tachina*] (1866); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I, 278, 31. [*Pho-*

rocera] (1882); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), V, 159. [*Pho-*

rocera] (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 338. [*Pho-*

rocera] (1893); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 148. (1900);

VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 161, 2. (1900).

Blondeli R.-D., Myod., 156, 4. (1830) et Annal. Soc. entom.

France, (2), V, 286, 5. (1847); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833,

293, 2. (1834) et Suit. à Buff., II, 111, 24. [*Scenometopia*] (1835).

braconicus R.-D., Myod., 156, 6. (1830).

petrosa R.-D., Myod., 155, 2. (1830), Annal. Soc. entom. France,

(2), V, 284, 3. (1847) et Posth., I, 525, 9. (1863).

rafiscutellaris ZETT., Dipt. Scand., III, 6115, 126—27. [*Tachina*]

(1859).

speculanda PAND., Rev. entom., XIV, 338, 8. [*Zenillia*] (1895).

vernalis R.-D., Myod., 156, 3. (1830), Annal. Soc. entom. France,

(2), V, 285, 1. (1847) et Posth., I, 524, 7. (1863).

viridescens R.-D., Myod., 156, 5. (1830) et Annal. Soc. entom.

France, (2), V, 285, 1. (1847).

rafiscutellaris ZETT. **pumicata** MEIG.

speculanda PAND. **pumicata** MEIG.

strenua R.-D. **pavida** MEIG.

vernalis R.-D. **pumicata** MEIG.

viridescens R.-D. **pumicata** MEIG.

Parasetigena

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 339. (1891) et LX, 120. (1895).

Duponchelia R.-D., Posth., I, 531, III. (1863), *per* ZELL. 1817, LXX.

agilis Macq. ? **segregata** ROSS.

infusata R.-D. **segregata** ROSS

*) *Thaumetopoea processionea* L.

media PAND. **segregata** Rond.

nigrofasciata Strobl., Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hercegov., XIV, 488. Dalmatia.

[*Phorocera*] (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercegov., IX, 548.

[*Phorocera*] (1904).

segregata Rond.^{?)}, Dipt. ital. Prodr., III, 181, 7. [*Chetogena*] (1859); Europa centr.

Scux., F. A., I, 491. [*Phorocera*] (1862); Mik, Wien. entom. et mer.

Zeitung, XI, 117, 3. [*Duponchelia*] (1892); B. B., Denkschr. Akad.

Wien, LX, 189, 51. (1893); Mik et Wacziarg, Wien. entom. Zeitung,

XIV, 247, 28. [*Duponchelia*] (1895); PAND., Rev. entom., XIV,

342, 18. [*Zenillia*] (1895); VILLEN., Wien. entom. Zeitung, XXV,

43. [*Phorocera*] (1905).

zagilis Macq. (*ucc* R.-D.), Suit. à Buff., II, 126, 11. [*Mecoptia*]

(1835); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 131. (1900).

infusata R.-D., Posth., I, 532, 2. [*Duponchelia*] (1863).

media PAND. (*ucc* Rond.), Rev. entom., XIV, 342, 17. [*Zenillia*]

(1895); VILLEN., Wien. entom. Zeitung, XXV, 43. [*Phorocera*]

(1906).

silvestris R.-D., Posth., I, 531, 1. [*Duponchelia*] (1863).

silvestris R.-D. = **segregata** Rond.

Bothria

Rond., Dipt. ital. Prodr., I, 68, 27. (1856) et XIII, 167, 27. A. [*Botria*]

(1859) *em.* B. B., 1889.

A. *Bothria s. str.*

frontosa Meig. — **obliquata** Fall.

obliquata Fall.^{*)}, Vet. Acad. Handl., XXXI, 281. [*Tachina*] (1810) Europa.

et Dipt. succ. Musc., 24, 49. [*Tachina*] (1820); Meig., S. B., IV,

263, 40. [*Tachina*] (1824); Zett., Dipt. Scand., III, 1097, 94.

(1844) et VIII, 3241, 94. [*Tachina*] (1849); B. B., Denkschr.

Akad. Wien, LX, 221 et 223. (1893).

frontosa Meig., S. B., IV, 388, 259. [*Tachina*] (1824) et VII,

261, 1. [*Phorocera*] (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France,

(2), VIII, 425, 9. t. XII, f. 10. [*Phorocera*] (1850); Walk,

Ins. Brit., II, 83, 147. [*Tachina*] (1853); Scux., F. A., I, 491.

[*Phorocera*] (1862); R.-D., Posth., I, 533, 5. [*Salia*] (1863);

Strobl., Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 27. (1894); Stein,

Entom. Nachricht., XXVI, 137. (1900); Villen., Bull. Soc.

entom. France, 1900, 161, 3. (1900).

pascuorum Rond., Dipt. ital. Prodr., III, 168, 1. (1859); Scux.,

F. A., I, 491. [*Phorocera*] (1862); Jarosch., Trudy naturf.

Ges. Karkoff, 1883, 317, 37. [*Phorocera*] (1883); B. B., Denk-

*) *Lymantria dispar* L. et *monacha* L. — *Lophyrus pini* L.

**) *Mesogona acetosellae* F.

schr. Akad. Wien, LVI. 1. II. f. 45, (1889); PAND., Rev. entom., XIV, 340, 11. [*Zenillia*] (1895).

pascuorum ROXD. — *obliquata* FALL.

B. *Leptochaeta*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 95, (1889) et LX, 119, (1893).

ptiloparia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 165, t. III, f. 59. Europ. centr. [*ptiloparcia*] (1889).

Lecanipus

ROXD., Dipt. ital. Prodr., III, 156, 26. 1. [*Lecanipa*] (1859) *em.* B. B., 1893.

patelliferus ROXD., Dipt. ital. Prodr., III, 158, 1. (1859); JAROSCH., Europ. centr. Trudy naturf. Gos. Karkoff, 1883, 317, 38. [*Phorocera*] (1883); — et meo. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 95, t. III, f. 49, (1889); PAND., Rev. entom., XIV, 333, 4. [*Phorocera*] (1895).

Phorocera

R.-D., Myod., 131, XVI, (1830) et Posth., I, 504, 1. (1863).

A. *Phorocera* s. str.

Chaetogena ROXD., Dipt. ital. Prodr., I, 68, 28, (1856) et III, 172, 28. [*Chaetogena*] (1859) *emend.* SCDD., 1882.

Seliyena B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 91, (1889) et LX, 119, (1893).

agilis R.-D. **assimilis** FALL.

apicalis R.-D. **assimilis** FALL.

arborea R.-D. **assimilis** FALL.

+ **assimilis** FALL. (*), Vet. Akad. Handl., XXXI, 282. [*Tachina*] (1819) Europa. et Dipt. succ. Musc., 28, 58. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV, 388, 258. [*Tachina*] (1820) et 261, 7. (1838); ZETT., Dipt. Scand., III, 1121, 122. (1844) et XIII, 6111, 122. [*Tachina*] (1859); GÄM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX, 63, 187, 1. (1847); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 423, 4, t. XII, f. 7. (1850); WALK., Ins. Brit., II, 82, 144. [*Tachina*] (1853); ROXD., Dipt. ital. Prodr., III, 177, 1. [*Chaetogena*] (1859); SCHW., F. A., I, 191. (1862); R.-D., Posth., I, 509, 1. (1863); BOSSD., Finkl. Insekt., II, 81, 78. [*Tachina*] (1876); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI,

*) *Araschnia levana* L. et *prosa* L., *Cossus cossus* L., *Cneculia verbasci* L., *Dasychira pudibunda* L., *Manestra brassicae* L., *Saturnia pavonia* L., *Thaumetopoea processionea* L. ? *Ortalis stabilis* R.-D.

- t. III, f. 46, [*Scligena*] (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 211, (1892); PASD., Rev. entom., XIV, 330, 1, (1895).
- agilis* R.-D., Myod., 132, 1, (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 280, 7, (1834) et Suit. à Buff., II, 127, 16, (*bis*) [*Metopia*] (1835).
- apicalis* R.-D., Posth., I, 513, 5, (1863).
- arborca* R.-D., Posth., I, 514, 6, (1863).
- bellatrix* ZETT., Dipt. Scand., VII, 3241, 94-95, [*Tachina*] (1849); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 220, (1893).
- Bercei* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 177, (1850).
- eualliae* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 177, (1850).
- cylindrica* R.-D., Myod., 137, 20, (1830) et Posth., I, 509, (1863).
- fera* R.-D., Myod., 133, 5, (1830) et Posth., I, 511, 2, (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 278, 2, (1834).
- fusca* R.-D., Posth., I, 512, 3, (1863).
- gramma* MEIG., S. B., IV, 390, 261, [*Tachina*] (1824) et VII, 261, 5, (1838); GÜMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV, 675, (1842); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 420, 1, t. XII, f. 13, (1850); ROXB., Dipt. ital. Prodr., III, 178, 3, [*Chetogena*] (1859); R.-D., Posth., I, 516, 9, (1863); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 138, (1900).
- hadenae* R.-D., Rev. Mag. Zool., III, 7, 10, (1851).
- leucaria* BOUCHÉ in litt. ap. ZETT.
- limpidipennis* R.-D., Myod., 137, 19, (1830).
- minuta* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 424, 7, t. XII, f. 7, (1850).
- orgyiae* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 176, (1850).
- ortalidis* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 175, (1850).
- rapida* MACQ., Suit. à Buff., II, 663, [*Metopia*] (1835).
- rapida* R.-D., Myod., 132, 2, (1830) et Posth., I, 508, (1863).
- scutellaris* R.-D., Myod., 133, 3, (1830) et Posth., I, 513, 4, (1863).
- sericea* R.-D., Posth., I, 515, 7, (1863).
- tescellata* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 274, 19, [*Lydella*] (1834). Suit. à Buff., II, 134, 5, [*Lydella*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 423, 5, t. XII, f. 7, (1850); R.-D., Posth., I, 517, 10, (1863); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 149, (1900).
- velox* R.-D., Myod., 137, 18, (1830).
- vernalis* R.-D., Myod., 137, 17, (1830) et Posth., I, 515, 8, (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 281, 10, (1834) et Suit. à Buff., II, 129, 21, [*Metopia*] (1835); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 151, (1900).
- var. caesifrons* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 424, 6, t. XII, f. 7, (1850); SCHN., F. A., I, 490, (1862); JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff, 1883, 315, 34, (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 339, [*Scligena*] (1891); MEADE, Entom. Europa.

Monthly Mag., (2), III, 211, (1892); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 27, [*Schigena*] (1894).

var. grandis RONDI., Dipt. ital. Prodr., III, 178, 2, [*Chetogenea*] (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 339, [*Schigena*] (1891); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 149, (1900). Europa centr. et mer.

bellatrix ZETT. = **assimilis** FALL.

Bersei R.-D. = **assimilis** FALL.

caesiformis MACQ. = **assimilis** FALL. *var.*

caecilliae R.-D. = **assimilis** FALL.

cylindrica R.-D. = **assimilis** FALL.

fera R.-D. = **assimilis** FALL.

flavipalpis PALM, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV, 418, 9, (1875). Dalmatia.

fusca R.-D. = **assimilis** FALL.

gramma MEIG. = **assimilis** FALL.

grandis RONDI. = **assimilis** FALL. *var.*

hadenae R.-D. = **assimilis** FALL.

limpidipennis R.-D. = **assimilis** FALL.

minuta MACQ. = **assimilis** FALL.

orygiae R.-D. = **assimilis** FALL.

ortulidis R.-D. = **assimilis** FALL.

rapida MACQ. = **assimilis** FALL.

rapida R.-D. = **assimilis** FALL.

scutellaris R.-D. = **assimilis** FALL.

sericea R.-D. = **assimilis** FALL.

tessellata MACQ. = **assimilis** FALL.

velox R.-D. = **assimilis** FALL.

vernalis R.-D. = **assimilis** FALL.

B. *Egygeria*

SCHIX., Wien. entom. Monatschr., V, 143, (1861) et F. A., I, 488, 267, (1862).

Lomatocantha B. B. (*var.* RONDI.), Denkschr. Akad. Wien, LVI, 98, (1889), LX, 124, (1891) et LXI, 558, (1894).

clausa ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6121, 132—133, [*Tachina*] (1859). Scandinavia.

fasciata EGG.^{*)}, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI, 388, [*Fallenia*] (1856); Europa centr.

SCHIX., F. A., I, 488, (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 94, t. III, l. 47, (1889).

parra B. B. (*var.* RONDI.^{**)}, Denkschr. Akad. Wien, LVI, 98, (1889), Europa centr.

LX, 124, (1891) et LXI, 558, [*Lomatocantha*] (1894); BAVIER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 523, (1898).

pectinata ZETT., Dipt. Scand., III, 1158, 158, [*Tachina*] (1844). Scandinavia.

vibrissata ZETT., Ins. Lapp., 641, 13, [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., Europa sept.

III, 1163, 165, [*Tachina*] (1844); BOSSD., Finsl. Insekt., II, 90, 97, [*Tachina*] (1866).

*) *Cucullia umbratica* L., *Deilephila euphorbiae* L., *Lasiocampa trifolii* Esp.

**) *Eurhantlis chrysitaria* Hc.

C. Salia

- R.-D., Myod., 108, III, (1830) et Posth., I, 552, II, (1863).
Spongosia ROXB., Dipt. ital. Prodr., III, 182, 28. *C. [Spongosia]* (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 94, (1889).
echinura R.-D.⁵⁾, Myod., 109, 3, (1830) et Posth., I, 555, 4, (1863); Europa-centr.;
 Mik, Wien, entom. Zeitg., XIII, 59, 24, (1894); Mik et WACHN., et mer.
 Wien, entom. Zeitg., XIV, 247, 29, (1895).
flaribarbata BRUSCHKE, Schrift. natur⁶⁾, Ges. Danzig, N. F. VI, 21, (1885); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 620, (1894).
flarocincta R.-D., Posth., I, 554, 3, (1863).
occlusa ROXB., Dipt. ital. Prodr., III, 183, I. *[Spongosia]* (1859);
 B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 94, t. III, f. 48. *[Spongosia]* (1889); PANZ., Rev. entom., XIV, 343, 19. *[Zenillia]* (1895).
penicillaris ROXB., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI, 39. *[Chetogenia]* (1868).
rebor R.-D., Myod., 108, 2, (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 269, 2. *[Lygdella]* (1834) et Suit. à Buff., II, 134, 2. *[Lygdella]* (1835).
flaribarbata BRUSCHKE = **echinura** R.-D.
flarocincta R.-D. = **echinura** R.-D.
occlusa ROXB. = **echinura** R.-D.
penicillaris ROXB. = **echinura** R.-D.
rebor R.-D. = **echinura** R.-D.

Species dubiae vel incerti generis.

- Charidea* R.-D., Posth., I, 557, III, (1863) *nee* CURT, 1825, LEP.
Goedartia R.-D., Posth., I, 565, VI, (1863).
Haglaca R.-D., Posth., I, 563, V, (1863).
Helophoria R.-D., Myod., 156, III. *[Elaphoria]* (1830) *em.* SCUD., 1887.
Isucmia R.-D., Posth., I, 585, I, (1863) *nee* KUG.
Lygibaca R.-D., Posth., I, 551, I, (1863).
aestivalis R.-D. = **villica** R.-D.
angusta Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 228, 13, t. XII, Europa-centr.,
 f. 7, (1850).
arcuata Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 272, 10. *[Lygdella]* (1834). Gallia.
aristata ROXB., Dipt. ital. Prodr., IV, 162, 10, (1861). Italia.
atripalepis ROXB., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI, 583, 4, (1868). Italia.
nigripalepis ROXB., Dipt. ital. Prodr., IV, 161, 9, (1861).
bombycivora R.-D.⁷⁾, Myod., 108, 1. *[Salia]* (1830) et Posth., I, 553, Gallia.

⁵⁾ *Lasiocampa quereus* L. et *trifolii* L., *Saturnia pyri* SCURF.

⁶⁾ *Lasiocampa trifolii* L.

- l.* [*Salia*] (1863): Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 209, 1. [*Lydella*] (1834) et Suit. à Buff., II, 133, 1. t. XIV, f. 14. [*Lydella*] (1835); BLANCH., Hist. nat. Ins., III, 610. [*Tachina*] (1840).
- brunnicornis** Macq., Suit. à Buff., II, 134, 6. [*Lydella*] (1835). Gallia.
- caeruleonigra** PERRIS, Soc. Linn. Lyon, 1852, 64. [*Doria*] (1852). Gallia.
- campestris* R.-D. **villica** R.-D.
- cinerea** Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 273, 14. [*Lydella*] (1834) et Gallia.
Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 429, 15. t. XII, f. 9. (1850).
- conducta* R.-D. = **villica** R.-D.
- coxalis** R.-D., Posth., I, 558, 1. [*Chariclea*] (1863). Gallia.
- curvinervis** PORRECH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI, 275. (1882). Rossia mer.
- dalecarlica** ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6132, 165-66. [*Tachina*] Scandinavia.
(1859).
- elongata** Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 421, 2. t. XII, Gallia.
f. 1. (1850).
- exsecta** WALK., Ins. Brit., II, 298. [*Tachina*] (1853). Anglia.
intersecta WALK. (bis), Ins. Brit., II, 76, 130. [*Tachina*] (1853).
- flavifrons** Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 281, 12. [*Phorocera*] (1834). Gallia.
- flavisquamis* R.-D. = **myioidea** R.-D.
- frontalina** R.-D., Posth., I, 564, 1. [*Hayduca*] (1863). Gallia.
- fuscipennis** Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 275, 21. [*Lydella*] (1834). Gallia.
Gouraldi R.-D. = **myioidea** R.-D.
- insuscepta** WALK., Ins. Brit., II, 50, 70. [*Tachina*] (1853). Anglia.
- interrupta** Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 271, 9. t. IV, f. 7. [*Lydella*] Gallia.
(1834).
- intersecta* WALK. = **exsecta** WALK.
- lata** ZETT.*), Dipt. Scand., III, 1126, 124. [*Tachina*] (1844). Scandinavia.
- mobilis** ZETT., Dipt. Scand., III, 1165, 167. (1844) et XIII, 6133, 167. Scandinavia.
[*Tachina*] (1859): SCHUM., F. A., I, 493. (1862); BOSSO., Fiml.
Ins-kt., II, 91, 99. [*Tachina*] (1866).
- mundula** ZETT., Dipt. Scand., III, 1159, 160. [*Tachina*] (1844). Scandinavia.
- myioidea** R.-D.**), Myod., 157, 1. [*Helophoria*] (1830); ? Macq., Soc. Gallia.
Sci. Lille, 1833, 294, 6. [*Pales*] (1834) et Suit. à Buff., II, 112,
29. [*Senometopia*] (1835).
- flavisquamis* R.-D., Myod., 157, 2. [*Helophoria*] (1830); Macq.,
Suit. à Buff., II, 113, 30. [*Senometopia*] (1835).
- Gouraldi* R.-D., Rev. Mag. Zool., III, 6, 8. [*Helophoria*] (1851).
- nigripalpis* ROXB. **atripalpis** ROXB.
- parvula** ROXB., Dipt. ital. Prodr., IV, 161, 8. (1861). Italia.
- praeceor* R.-D. **tibialis** R.-D.
- pratensis* R.-D. **villica** R.-D.
- pubibunda** FISCHER, ap. GÜMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I, 138. Rossia.
[*Tachina*] (1829), IV, 351. [*Tachina*] (1832) et XV, 675. (1812).
- pusilla** Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 273, 15. [*Lydella*] (1834). Gallia.

*) *Lophyrus pini* L.**) *Cacoecia rosana* L.

- rubrifrons** Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 279, 4. (1834). Gallia.
rufipalpis Meig., S. B., VII, 262, 18. (1838); Schm., F. A., I, 492. Europacentr.
 (1862).
squamiflava Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 274, 18. [*Lydella*] (1834). Gallia.
squamosa Zett., Dipt. Scand., III, 1164, 166. [*Tachina*] (1844); Scandinauia.
 BOSSD., Fönl. Insekt., II, 91, 98. [*Tachina*] (1866).
stupida Meig., S. B., IV, 413, 303. [*Tachina*] (1824) et VII, 263, 4. ? Germania.
 [*Doria*] (1838).
temeraria R.-D., Posth., I, 551, 1. [*Lylibaca*] (1863). Gallia.
tomentosa R.-D., Posth., I, 552, 2. [*Lylibaca*] (1863).
terminalis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 274, 20. [*Lydella*] (1834). Gallia.
tessellata Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 293, 3. [*Pales*] (1834). Gallia.
tibialis R.-D., Posth., I, 566, 1. [*Goedartia*] (1863). Gallia.
pratcor R.-D., Posth., I, 567, 2. [*Goedartia*] (1863).
tomentosa R.-D. **temeraria** R.-D.
trizonata Zett., Dipt. Scand., III, 1166, 168. [*Tachina*] (1844); BOSSD., Scandinauia.
 Fönl. Insekt., II, 92, 119. [*Tachina*] (1866).
varipalpis Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 425, 8, 4. Gallia.
 XII, f. 12. (1850).
villica R.-D., Myod., 147, 3. [*Erycia*] (1830) et Posth., I, 585, 1. Gallia.
 [*Ismenia*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 295, 2. [*Erycia*]
 (1834).
aeclivalis R.-D., Posth., I, 585, 2. [*Ismenia*] (1863).
campestris R.-D., Posth., I, 586, 3. [*Ismenia*] (1863).
conducta R.-D., Posth., I, 586, 4. [*Ismenia*] (1863).
prolensis R.-D., Posth., I, 587, 5. [*Ismenia*] (1863).

Meigenia

R.-D., Myod., 198, IV, (1830).

Diplomera Loov, Atti Istit. ven., (3), IX, 1349. (1863).

Spilosia Rond., Dipt. ital. Prodr., I, 66, 23. (1856) et III, 111.
 27. [*Spyglosia*] (1859) em. Scudd. 1882.

Tentiviera PAND., Rev. entom., XV, 32. (1896).

A. *Mystacella*

WULF, Biolog. centr. amer., II, 51. (1890).

- majuscula** Rond., Dipt. ital. Prodr., III, 112, 1. [*Spyglosia*] (1859); Europacentr.
 Schm., F. A., I, 471. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, et mer.
 t. I, f. 1, a. (1889) et LVIII, 310. (1891); WULF, Biol. centr.
 amer., II, 51. nota. (1890); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2),
 V, 157. (1894); PAND., Rev. entom., XV, 28, 46. [*Erorista*] (1895).

*) *Thyatira* Batis L.

?*trimaculata* MEIG., S. B., IV, 357, 206, [*Tachina*] (1824) et VII, 229, 9, [*Macquartia*] (1838).

trimaculata MEIG. = ? *majuscula* ROED.

B. *Meigenia* s. str.

acnescens MACQ. = **bisignata** MEIG.

aestivalis R.-D. = **bisignata** MEIG.

agilis R.-D. = **floralis** FALL.

albocincta MACQ. = **floralis** FALL.

aprica ZETT. = **bisignata** MEIG.

arliccaea R.-D. = **bisignata** MEIG.

arida R.-D. = **floralis** FALL.

arvicola R.-D. = **floralis** FALL.

atrata R.-D. = **floralis** FALL.

bicolor MACQ. = **floralis** FALL.

bimaculata MACQ. = **floralis** FALL.

binotata R.-D. = **bisignata** MEIG.

✧ **bisignata** MEIG.^{*)}, S. B., IV, 322, 143, (1824) et VII, 190, 16, [*Tachina*] (1838); R.-D., Myod., 200, 4, (1830) et Posth., I, 1086, 38, (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 258, 3, [*Tachina*] (1834), Suit. à Buff., II, 147, 34, [*Tachina*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 483, 49, t. XV, f. 19, [*Masicera*] (1850); ZETT., Dipt. Scand., III, 1147, 147, (1844) et XII, 4700, 147, [*Tachina*] (1858); ROED., Dipt. ital. Prodr., III, 113, 2, [*Spilosia*] (1859); SCHN., F. A., I, 472, (1862); WCLF., Entom. Tijdschr., (2), IV, 153, (1864); BUGNON, Bull. Soc. entom. Vaud., XVII, 17, t. I, II, (1880); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, t. I, f. 1, b, (1889) et LVIII, 310, (1891); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 97, (1892).

acnescens MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 485, 54, t. XV, f. 21, [*Masicera*] (1850); SCHN., F. A., I, 485, [*Masicera*] (1862).

aestivalis R.-D., Posth., I, 1079, 16, (1863).

aprica ZETT., Ins. Lapp., 640, 28, [*Tachina*] (1838).

arliccaea R.-D., Posth., I, 1085, 36, (1863).

binotata R.-D., Posth., I, 1090, 43, (1863).

bipunctata W. in litt. ap. ZETT.

borealis R.-D., Myod., 199, 3, (1830) et Posth., I, 1085, 37, (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 257, 1, [*Tachina*] (1834) et Suit. à Buff., II, 147, 33, [*Tachina*] (1835).

?*hubcata* MEIG., S. B., IV, 386, 254, [*Tachina*] (1824) et VII, 210, 5, [*Masicera*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France,

*) ? *Gymnocyba canella* Hb. = *Athalia spinarum* F. = *Agelastica alni* L., *Chrysomela varians* F., *Gonioctena rufipes* PAYK. et *sexpunctata* F., *Lina tremulae* FABR.

- (2), VIII, 466, 18, t. XIV, f. 12. [*Masicera*] (1850); SCHIX., F. A., I, 485. [*Masicera*] (1862); R.-D., Posth., I, 883, 15. [*Masicera*] (1863); STEIX, Entom. Nachricht., XXVI, 133, (1900).
- campestris* R.-D., Posth., I, 1077, 23, (1863).
- cinerea* MACQ. (nec FALL.), Suit. à Buff., II, 138, 21. [*Lytlella*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 488, 60, t. XV, f. 11. [*Masicera*] (1850).
- consobrina* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 484, 52, t. XV, f. 16. [*Masicera*] (1850).
- cylindrica* R.-D., Myod., 199, I, (1830) et Posth., I, 1088, 40, (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 258, 2. [*Tachina*] (1834) et Suit. à Buff., II, 147, 32. [*Tachina*] (1835).
- discolor* ZETT., Dipt. Scand., III, 1061, 54, (1844) et VIII, 3234, 54. [*Tachina*] (1849); BOSSD., Fiml. Insekt., II, 62, 38. [*Tachina*] (1866).
- dorsalis* MEIG., S. B., IV, 325, 148, (1824) et VII, 190, 17. [*Tachina*] (1838); WALK., Ins. Brit., II, 46, 62. [*Tachina*] (1853); SCHIX., F. A., I, 478. [*Tachina*] (1862); STEIX, Entom. Nachricht., XXVI, 136, (1900).
- duclorani* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 487, 57, t. XIV, f. 18. [*Masicera*] (1850).
- errans* MEIG., S. B., IV, 323, 145. [*Tachina*] (1824) et VII, 241, 18. [*Masicera*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 480, 44, t. XV, f. 14. [*Masicera*] (1850).
- flava* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 258, 4. [*Tachina*] (1834).
- flavescens* R.-D., Myod., 200, 6, (1830); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 486, 55, t. XV, f. 22. [*Masicera*] (1850); SCHIX., F. A., I, 485. [*Masicera*] (1862).
- griseus* R.-D., Myod., 199, 2, (1830).
- hilaris* R.-D., Posth., I, 1082, 31, (1863).
- hortorum* R.-D., Posth., I, 1076, 22, (1863).
- immaculata* R.-D., Myod., 200, 5, (1830); STROM., Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 19, (1894).
- innocua* R.-D., Posth., I, 1083, 33, (1863).
- latipennis* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 487, 58, t. XV, f. 20. [*Masicera*] (1850); SCHIX., F. A., I, 485. [*Masicera*] (1862).
- maesta* R.-D., Posth., I, 1076, 21, (1863).
- mutabilis* PAND. (nec FALL.), Rev. entom., XV, 49, 2. [*Tachina*] (1896).
- obscurella* R.-D., Posth., I, 1080, 29, (1863).
- opaca* R.-D., Posth., I, 1078, 25, (1863).
- pacifica* R.-D., Posth., I, 1084, 35, (1863).
- palustris* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 485, 52, t. XV, f. 20. [*Masicera*] (1850).
- pauperata* R.-D., Posth., I, 1088, 39, (1863).

pratensis R.-D., Posth., I, 1090, 42, (1863).

pratensis R.-D., Posth., I, 1083, 34, (1863).

quadrisignata R.-D., Posth., I, 1089, 41, (1863).

trimaeculata RUPERTSE. (nec MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XX, 842, [*Macquartia*] (1870); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 562, (1894).

vernalis R.-D., Myod., 200, 7, (1830) et Posth., I, 1088, 30, (1863).

viatica R.-D., Posth., I, 1082, 32, (1863).

borealis R.-D. = **bisignata** MEIG.

buccata MEIG. = ? **bisignata** MEIG.

campestris R.-D. = **bisignata** MEIG.

cinebra MACQ. = **bisignata** MEIG.

cincrella R.-D. = **floralis** FALL.

clausina ROND. = **floralis** FALL.

concolor R.-D. = **floralis** FALL.

conneca R.-D. = **floralis** FALL.

consobrina MACQ. = **bisignata** MEIG.

cylindrica R.-D. = **bisignata** MEIG.

derivata R.-D. = **floralis** FALL.

discolor ZETT. = **bisignata** MEIG.

dispecta PAND. = **incana** FALL.

dorsalis MEIG. = **bisignata** MEIG.

duclorum MACQ. = **bisignata** MEIG.

egens EGG. = **incana** FALL.

errans MEIG. = **bisignata** MEIG.

exilis R.-D. = **floralis** FALL.

flava MACQ. = **bisignata** MEIG.

flavescens R.-D. = **bisignata** MEIG.

♂ **floralis** FALL.³⁾, p. p., Vet. Akad. II in II, XXXI, 282, [*Tachina*] (1810) Europa.
 et Dipt. succ. Musc., 36, 74, [*Tachina*] (1820), *c. gen. Nemocilla* :
 MEIG., S. B., 304, 112, (1024) et VII, 190, 39, [*Tachina*] (1838);
 R.-D., Myod., 201, 8, (1830) et Posth., I, 1065, 1, (1863); MACQ.,
 Soc. Sci. Lille, 1833, 258, 5, [*Tachina*] (1834) et Suit. à Buff., II,
 148, 36, [*Tachina*] (1835); ROND., Dipt. ital. Prodr., III, 111, 3,
 [*Spilosia*] (1859); SCHN., F. A., I, 472, (1862); B. B., Denkschr.
 Akad. Wien, LVIII, 311, (1891); MEAD., Entom. Monthly Mag.,
 (2), III, 97, (1892).

agilis R.-D., Posth., I, 1074, 18, (1863).

albocincta MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 486,
 56, t. XV, f. 21, [*Masicera*] (1850).

ardua R.-D., Posth., I, 1070, 11, (1863).

arvicola R.-D., Posth., I, 1079, 27, (1863).

atrata R.-D., Posth., I, 1075, 20, (1863).

bicolor MACQ., Suit. à Buff., II, 118, 38, [*Tachina*] (1835); LAOY,
 Atti Ist. ven., (3), IX, 1319, [*Diplomera*] (1863).

³⁾ *Crioceris quatuordecimpunctata* FABE.

- bimaculata* MEIG., S. B., VII. 195. 40. [*Tachina*] (1838); MACQ.,
Annal. Soc. entom. France, (3). II. 405. 12. t. XIV. f. 10.
[*Oodigaster*] (1864).
- cinerella* R.-D., Posth., I. 1066. 2. (1863).
- clausina* ROXB., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 581. 2. [*ponen-
nulum*] (1868).
- concolor* R.-D., Posth., I. 1067. 5. (1863).
- connera* R.-D., Posth., I. 1080. 28. (1863).
- devicta* R.-D., Posth., I. 1072. 13. (1863).
- exilis* R.-D., Posth., I. 1068. 7. (1863).
- grata* R.-D., Posth., I. 1073. 16. (1863).
- grisella* R.-D., Posth., I. 1069. (1863).
- impatiens* R.-D., Posth., I. 1071. 12. (1863).
- infima* R.-D., Posth., I. 1069. 8. (1863).
- intacta* R.-D., Posth., I. 1072. 14. (1863).
- lateralis* R.-D., Posth., I. 1075. 19. (1863).
- luctuosa* R.-D., Posth., I. 1074. 17. (1863).
- minuta* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 469. 25.
t. XIV. f. 18. [*Masicera*] (1850).
- ? *mutabilis* FALL., Vet. Akad. Handl., XXXI. 282. [*Tachina*]
(1810) et Dipt. suæc. Muse., 16. 31. [*Tachina*] (1820); MEIG.,
S. B., IV. 403. 285. [*Tachina*] (1824); ZETT., Ins. Lapp., 638.
19. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III. 1059. 53. (1844).
VIII. 3234. 53. (1849) et XIII. 6085. 53. [*Tachina*] (1859);
BOSSD., Fiml. Insekt., II. 61. 37. [*Tachina*] (1866); ? MEADE,
Entom. Monthly Mag., (2). II. 327. [*Erorista*] (1891).
- nana* R.-D., Myod., 201. 11. (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille,
1833. 259. 7. [*Tachina*] (1834).
- nitida* R.-D., Myod., 201. 10. (1830) et Posth., I. 939. 4. [*Elodia*]
(1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 259. 6. [*Tachina*] (1834).
Suit. à Buff., II. 148. 37. [*Tachina*] (1835) et Annal. Soc.
entom. France, (2). VIII. 464. 14. t. XIV. f. 11. [*Masicera*]
(1850).
- obscuripes* R.-D., Posth., I. 1067. 4. (1863).
- parva* R.-D., Myod., 201. 9. (1830); MACQ., Annal. Soc. entom.
France, (2). VIII. 489. 61. t. XV. f. 24. [*Masicera*] (1850);
? MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). 129. [*Masicera*] (1892).
- parvula* R.-D., Posth., I. 1068. 6. (1863).
- ponila* R.-D., Posth., I. 1070. 10. (1863).
- pygmaea* R.-D., Posth., I. 1066. 3. (1863).
- quadrinaculata* MACQ., Suit. à Buff., II. 148. 39. [*Tachina*]
(1835) Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 484. 50. t. XV.
f. 19. [*Masicera*] (1850); SROBL. Mittheil. Ver. Steierm.,
XXX. 19. (1894); STERN, Entom. Nachricht., XXVI. 148.
(1900).
- quinta* R.-D., Posth., I. 1077. 24. (1863).
- virgo* R.-D., Posth., I. 1073. 15. (1863).

- grandigena** PAND., Rev. entom., XV, 49, 1. [*Tachina*] (1896). Gallia.
?nobilis R.-D., Posth., I, 1091, 44. (1863).
- grata* R.-D. = **floralis** FALL.
- grisella* R.-D. = **floralis** FALL.
- griseus* R.-D. = **bisignata** MEIG.
- hilaris* R.-D. = **bisignata** MEIG.
- horlorum* R.-D. = **bisignata** MEIG.
- immaculata* R.-D. = **bisignata** MEIG.
- impatiens* R.-D. = **floralis** FALL.
- incana** FALL., Vet. Acad. Handl., XXXI, 282. [*Tachina*] (1810) et Europa.
 Dipt. succ. Musc., 20, 40. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV, 385, 253. (1824) et VII, 191, 54. [*Tachina*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III, 1062, 55. [*Tachina*] (1844); BOXSÖ., Finnl. Insekt., II, 62, 39. [*Tachina*] (1866); HEND., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI, 209, 4. (1901).
- cinerea* FALL., p. p., vide *Viviania*.
- dispecta* PAND., Rev. entom., XV, 106, 11. [*Pelcinea*] (1896).
- cygnus* Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI, 213. [*Masicera*] (1861); SCHIX., F. A., I, 484. [*Masicera*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 310. (1891); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 129. [*Masicera*] (1892).
- oryrhina* PAND., Rev. entom., XV, 32, 3. [*Tenuicera*] (1896).
- infima* R.-D. = **floralis** FALL.
- innocua* R.-D. = **bisignata** MEIG.
- intacta* R.-D. = **floralis** FALL.
- lateralis* R.-D. = **floralis** FALL.
- lalipennis* MACQ. = **bisignata** MEIG.
- luctuosa* R.-D. = **floralis** FALL.
- maesta* R.-D. = **bisignata** MEIG.
- minuta* MACQ. = **floralis** FALL.
- mutabilis* FALL. = ? **floralis** FALL.
- mutabilis* PAND. = **bisignata** MEIG.
- nana* R.-D. = **floralis** FALL.
- nitida* R.-D. = **floralis** FALL.
- nobilis* R.-D. ? **grandigena** PAND.
- obscurella* R.-D. = **bisignata** MEIG.
- obscuripes* R.-D. = **floralis** FALL.
- opaca* R.-D. = **bisignata** MEIG.
- oryrhina* PAND. = **incana** FALL.
- pacifica* R.-D. = **bisignata** MEIG.
- palustris* MACQ. = **bisignata** MEIG.
- parca* R.-D. = **floralis** FALL.
- parvula* R.-D. = **floralis** FALL.
- pauperata* R.-D. = **bisignata** MEIG.
- pratensis* R.-D. = **bisignata** MEIG.
- pruinosa* R.-D. = **bisignata** MEIG.
- pumila* R.-D. = **floralis** FALL.

pygmaea R.-D. **floralis** FALL.
quadrinaculata MACQ. **floralis** FALL.
quadrisingata R.-D. **bisignata** MEIG.
quarta R.-D. **floralis** FALL.
trinaculata RUPERTSE. **bisignata** MEIG.
cernalis R.-D. **bisignata** MEIG.
ciatica R.-D. — **bisignata** MEIG.
virgo R.-D. = **floralis** FALL.

Viviania

ROSD., Dipt. ital. Prodr., IV. 48 et 53. 45. *b.* (1861).

Bionmyia COQUILL., Rev. Tachin. N. A., 81. (1897) *nov* R.-D. 1830.

Fabricia MEIG., S. B., VII. 250. 38. (1838). *nov* BLAINV. 1828.
 VERM., *nov* R.-D. 1830. Dipt.

atricolor ZETT. = **cinerea** FALL.

austera MEIG. = **cinerea** FALL.

cinerea FALL.^{*)}, Vet. Akad. Handl., XXXI. 283. [*Tachina*] (1810) et Europa.
 Dipt. succ., Musc., 20. 39. [*Tachina*] (1830); MEIG., S. B., IV.
 417. 309. [*Tachina*] (1824) et VII. 241. 9. [*Masicera*] (1838);
 ZETT., Dipt. Scand., III. 1043. 35. [*Tachina*] (1844); SCHN., F.
 A., I. 485 et *nota*. [*Masicera*] (1862); BONSD., Finnl. Insekt., II.
 56. 26. [*Tachina*] (1866); SINTEX., Wien. entom. Zeitg., VIII. 144.
 [*Masicera*] (1889); PAND., Rev. entom., XV. 105. 9. [*Petivina*]
 (1896).

atricolor ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6082. 36. *obs.* [*Tachina*]
 (1859).

austera MEIG., S. B., IV. 383. 249. [*Tachina*] (1824) et VII.
 248. 2. [*Frontina*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France.
 (2). VII. 434. 2. t. XII. f. 16. [*Frontina*] (1850); SCHN., F.
 A., I. 496. *nota*. [*Frontina*] (1862); B. B., Denkschr. Akad.
 Wien, LX. 220. (1893); STEIN., Entom. Nachricht., XXVI.
 132. (1900).

incompta MEIG., S. B., IV. 324. 147. (1824) et VII. 191. 53.
 [*Tachina*] (1838); STEIN. Entom. Nachricht., XXVI. 140. (1900).
pacta MEIG., S. B., IV. 324. 146. [*Tachina*] (1824) et VII. 250.
 I. t. LXXI. f. 36—40. [*Fabricia*] (1838); WINTH., Isis. 1831.
 VII. [*Tachina*] (1831); BOE. Kröy. nat. Tidskr., (1). II. 234.
 [*Tachina*] (1838); ? ZETT., Dipt. Scand., III. 1038. 29. [*Ta-*
china] (1844); WALK., Ins. Brit., II. 52. 75. [*Tachina*] (1853);
 ROSD., Dipt. ital. Prodr., IV. 54. 1. (1861); SCHN., F. A., I.
 497. [*Frontina*] (1862); ? BONSD., Finnl. Insekt., II. 55. 21.

^{*)} *Aeglastica alni* L., *Carabus cancellatus* HAERT., *clathratus* L.,
gemmatus L., *glabratus* F., *hortensis* L., *violaceus* L., *Procrustes*
coriaceus L., *Zabrus tenebrioides* F.

[*Tachina*] (1866): DESER, LOGES, Bull. Soc. entom. France, 1865, XLIII. (1865): ? CHOLODK., Zool. Anz., VII. 316. [*Tachina*] (1884): BRAUER, Entom. Nachricht., X. 363. (1884), Zool. Anz., VII. 316. (1884), Ann. Mag. Nat. Hist., (5), XIV. 74. (1884) et Wien. entom. Zeitg., VIII. 221. (1889): MEIX., Entom. Modd., I. 114. [*Tachina*] (1888): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LV. 1. 1. f. 2. (1889) et LVIII. 312. (1891): GERCKE, Wien. entom. Zeitg., VIII. 221. [*Frontina*] (1889): PORTA, Atti Soc. nat. Modena, (4), II. 39. (1900): STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 145. (1900).

proxima EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 212. [*Masicera*] (1861): SCHIX., F. A., I. 484. [*Masicera*] (1862).

usta ZETT. (acc. WIED.), Dipt. Scand., III. 1044. 36. [*Tachina*] (1844): ? WALK., Ins. Brit., II. 39. 44. [*Tachina*] (1853).

incompta MEIG. = **cinerea** FALL.

pacta MEIG. = **cinerea** FALL.

proxima EGG. = **cinerea** FALL.

usta ZETT. = **cinerea** FALL.

Leucostoma

MEIG., Illiger's Magaz., II. 280. (1803).

Calyptia R.-D., Posth., II. 59. III. (1863).

Calyptidia R.-D., Posth., II. 920. (1863).

Celia R.-D., Myod., 255. III. (1830).

Psalida ROXD., Dipt. ital. Prodr., I. 76. 59. (1856) et IV. 91. 59. (1861).

? *Pseudalophora* PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 283. (1881).

agile R.-D. = **aterrimum** VILL.

anale MEIG. = **aterrimum** VILL.

anomalon SISTEN., Stettin. entom. Zeitg., LVII. 154. 3. (1897).

Europa centr.

anthracinum MEIG., S. B., IV. 289. 90. [*Tachina*] (1824) et VII. 212.

Europa centr.

3. (1838): MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III. 191. 2. 1.

IV. 1. 2. (1855): R.-D., Posth., II. 920. 3. [*Dionaea*] (1863).

apicale ROND. = **aterrimum** VILL.

aterrimum VILL., Entom. linn., III. 548. 390. [*Musca*] (1789).

Europa centr.

agile R.-D., Myod., 255. 1. [*Celia*] (1830): MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 245. 2. [*Labigastera*] (1834).

et mer.

anale MEIG., S. B., IV. 290. 91. [*Tachina*] (1824) et VII. 212.

2. (1838): MACQ., Suit. à Buff., II. 178. 20. [*Melanophora*]

(1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), III. 191. 1. 1. IV.

f. 1. (1855): SCHIX., F. A., I. 543. (1862): R.-D., Posth., II.

919. 2. [*Dionaea*] (1863): PAND., Rev. entom., XIII. 80. 8.

[*Clairvillia*] (1891): ? WILF., Biol. centr. amer., II. 206. 1.

(1890): GRIMSH., Fauna Hawaii., III. (1). 20. (1901).

apicale ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV. 93. 2. [*Psalida*] (1861).

breve ROSSI, Fauna etr., II. 306. 1505. [*Musca*] (1790); ILIAC., Rossi Fauna etr., II. 468. 1505. [*Musca*] (1807); ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV. 92. 1. [*Psalida*] (1861).

erythrocerum R.-D., Myod., 256. 4. [*Celia*] (1830).

tetapterum MEIG., S. B., IV. 290. 92. t. XI. f. 25. [*Tachina*] (1824) et VII. 212. 1. (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 179. 21. [*Melanophora*] (1835) et Annal. Soc. entom. France. (3). III. 192. 5. t. IV. f. 5. (1855); SCHN., F. A., I. 543. (1862); R.-D., Posth., II. 61. 1. [*Celia*] (1863); ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 44 et 591. nota. 2. [*Psalida*] (1868); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 150. (1900).

brevipetiolatum MACQ., Annal. Soc. entom. France. (3). III. 195. 11. Europacentr. t. IV. f. 11. (1855).

breve ROSSI = **aterrimum** VILL.

caminiarium WALK. = **simplex** FALL.

erythrocerum R.-D. = **aterrimum** VILL.

flavidipenne MACQ., Annal. Soc. entom. France. (3). III. 194. 8. t. Europacentr. IV. f. 8. (1855).

meridianum ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 43. [*Psalida*] (1868); Europa mer. MINÁ PAL., Nat. sicil., XIV. 17. 4. [*Psalida*] (1896).

pubens PAND., Rev. entom., XIII. 79. 6. [*Claïrillia*] (1894).

minus MACQ. = ? **simplex** FALL.

minus R.-D. = **simplex** FALL.

occlusum R.-D., Posth., II. 60. 1. [*Calyptia*] (1863). Gallia.

parvum PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 282. [*Psudatophora*] Caucasus. (1881).

phaeopterum MEIG., S. B., IV. 288. 85. [*Tachina*] (1824) et VII. 212. 5. (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 164. 5. [*Cassidocnigia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France. (3). III. 193. 6. t. IV. f. 6. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6163. 4—5. (1859); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 146. (1900). Europacentr.

pubens PAND. = **meridianum** ROXD.

rapidum R.-D. = **simplex** FALL.

simplex FALL., Dipt. succ. Rhizom., 8. 10. [*Ocyptera*] (1820); MEIG., Europa. S. B., IV. 289. 89. [*Tachina*] (1824) et VII. 212. 4. (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 178. 19. [*Melanophora*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., III. 1235. 5. (1844); WALK., Ins. Brit., II. 35. 35. [*Tachina*] (1853); ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV. 94. 3. [*Psalida*] (1861); SCHN., F. A., I. 543. (1862); R.-D., Posth., II. 919. 1. [*Dionaea*] (1863); BOSSQ., Finnl. Insekt., II. 117. 1. (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. XI. f. 292. [*Psalida*] (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). III. 236. (1892); PAND., Rev. entom., XIII. 80. 7. [*Claïrillia*] (1894).

caminiarium WALK., Ins. Brit., II. 35. 36. [*Tachina*] (1853).

? *minus* MACQ. (nec R.-D.), Annal. Soc. entom. France. (3). III. 195. 9. t. IV. f. 9. (1855).

minus R.-D., Myod., 256, 3. [*Clelia*] (1830) et Posth., II, 63, 3.
[*Clelia*] (1863); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II,
740, 1. t. XVI, f. 3. [*Clelia*] (1854); SCHIX., F. A., 1, 543.
(1862); STROBL, Programm Seitenst., XIV, 19. (1880).

rapidum R.-D., Myod., 255, 2. [*Clelia*] (1830) et Posth., II, 62,
2. [*Clelia*] (1863).

tetrapterum MEIG. = *aterrimum* VILL.

Dionaea

R.-D., Myod., 253, 1. (1830).

Cassidomyia MACQ., Suit. à Buff., II, 162, 20. [*Cassidomyia*]
(1835) *em* SCUDD., 1882.

Labidogaster MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 244. [*Labidogaster*]
(1834) *em*. B. B., 1889.

Labidopyge B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 144. (1889)
et LX, 155. (1893).

Medorilla ROXB., Dipt. ital. Prodr., I, 74, 52. (1856) et IV,
77, 52. (1861); in SCUDDER *desideratur*!

Pyragrara ROXB., Dipt. ital. Prodr., IV, 87, *nola*. (1861).

agilis MACQ. = *aurifrons* MEIG.

algira MACQ., Dipt. exot., III, 223. (66), 1. [*Labidogaster*] (1843). Algeria.

atra R.-D. = *nitidula* MEIG.

aurifrons MEIG., S. B., IV, 295, 99. (1824) et VII, 190, 30. [*Tachina*]
(1838); MACQ., Suit. à Buff., II, 142, 12. [*Tachina*] (1835) et
Annal. Soc. entom. France, (3), II, 394, 40, 1. XIII, f. 23. [*Ta-*
china] (1854); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 132. (1900). Europa centr.
et mer.

agilis MACQ. (*acc* R.-D.), Suit. à Buff., II, 165, 9. [*Cassidomyia*]
(1835); MEIG., S. B., VII, 228, 2. [*Labidogaster*] (1838);
ROXB., Dipt. ital. Prodr., IV, 91, 4. [*Labidogaster*] (1861);
B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 144. [*Labidogaster*]
(1889).

aurulans R.-D., Myod., 254, 2. (1830) et Posth., II, 56, 3.
(1863); PAXD., Rev. entom., XIII, 78, 4. [*Chalcivillia*] (1894).

binotata R.-D., Posth., II, 56, 4. (1863).

zevratia MEIG., S. B., VII, 194, 32. [*Tachina*] (1838); SCHIX.,
F. A., I, 477. [*Tachina*] (1862); v. RÖD., Entom. Nachricht.,
X, 254. [*Tachina*] (1884); B. B., Denkschr. Akad. Wien,
LXI, 575 et 620. (1894); GIESCH., Wien. entom. Zeitg.,
XVII, 153, 2. [*Labidogaster*] (1898).

florisquamis R.-D., Posth., II, 57, 5. (1863).

subfasciata ROXB., Dipt. ital. Prodr., IV, 78, 1. [*Medorilla*]
(1861).

aurulans R.-D. = *aurifrons* MEIG.

binotata R.-D. = *aurifrons* MEIG.

cassidae DUF. = **forcipata** MEIG.

corsicana B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 411. [*Labidogaster*] Corsica. (1891), *nomen nudum!*

erratica MEIG. = ? **aurifrons** MEIG.

flavisquamis R.-D. = **aurifrons** MEIG.

forcipata MEIG.*), S. B., IV, 272, 59. [*Tachina*] (1824) et VII, 228, I, t. LXX, f. 36-39. [*Labidogaster*] (1838): MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 245, I, t. IV, f. 3. [*Labidogaster*] (1834), Suit. à Buff., II, 164, 8, t. XIV, f. 21. [*Cassidomyia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), II, 738, I, t. XVI, f. 1. [*Labidogaster*] (1854): ROND., Dipt. ital. Prodr., IV, 90, 3. [*Labidogaster*] (1861): SCHIX., F. A., I, 436. [*Labidogaster*] (1862): R.-D., Posth., II, 54, I. (1863): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 144. [*Labidogaster*] (1889): STEIX, Wien. entom. Zeitg., XIX, 247, 2. [*Labidogaster*] (1900) et Entom. Nachricht., XXVI, 137, (1900); HEND., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI, 208, 3. [*Labidogaster*] (1901).

cassidae DUF., Ann. Sci. nat., VIII, 45. [*sive nomine*] (1826) et IX, 249, t. XI, f. 3. [*Ocyptera*] (1827): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 568. (1894).

forcipata R.-D. (*nov* MEIG.), Myod., 233, I. (1830).

lineata R.-D., Posth., II, 55, 2. (1863).

Rondanii PASD., Rev. entom., XIII, 77, 2. [*Clairvillia*] (1891).

uncinata ROND., Dipt. ital. Prodr., IV, 90, *nota*. [*Pygagrura*] (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI, 42. [*Labidogaster*] (1868).

forcipata R.-D. = **forcipata** MEIG.

grandis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 144. [*Labidogaster*] Europa centr. (1889).

intermedia MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 739, 2, t. XVI, f. 2. [*Labidogaster*] (1854); SCHIX., F. A., I, 436. [*Labidogaster*] (1862).

lineata R.-D. = **forcipata** MEIG.

nitidula MEIG.**), S. B., IV, 297, 101. (1824) et VII, 190, 42. [*Tachina*] (1830): MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 262, 16. [*Tachina*] (1834), Suit. à Buff., II, 142, 11. [*Tachina*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), II, 394, 41, t. XIII, f. 24. [*Tachina*] (1854): SMITH, Trans. entom. Soc. London, (2), II, 82. [*Tachina*] (1880): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 558. [*Labidogaster*] (1894): STEIX, Wien. entom. Zeitg., XIX, 247, 2. (1900) et Entom. Nachricht., XXVI, 144. (1900).

atra R.-D., Myod., 194, 29. [*Tachina*] (1830).

thoracica PASD. (*nov* MEIG.), Rev. entom., XIII, 72, 9. [*Phania*] (1894).

pauciseta ROND., Dipt. ital. Prodr., IV, 89, 2. [*Labidogaster*] (1861): JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XX, 21, 26. [*Labidogaster*]

*) *Cassida viridis* L.

**) *Saperda populnea* L.

(1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 114, t. XI, f. 293, 3. [*Labidogaster*] (1889); PAND., Rev. entom., XIII, 77, 3. [*Clairvillia*] (1894).

Rondanii PAND. = **forcipata** MEIG.

setifacies RONDI., Dipt. ital. Prodr., IV, 88, 1. [*Labidogaster setifacies*] (1861); JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff, 1883, 310, 25. [*Labidogaster*] (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. XI, f. 293, l. 2. [*Labidogaster*] (1889); PAND., Rev. entom., XIII, 79, 5. [*Clairvillia*] (1894).

Europacentr.
et mer.

subfasciata RONDI. = **aurifrons** MEIG.

thoracica PAND. = **nitidula** MEIG.

uncinata RONDI. = **forcipata** MEIG.

Clairvillia

R.-D., Myod., 234, XII, (1830).

Phanionomyia R.-D., Myod., 254, II. [*Phanomya*] (1830) *em.* B. B. 1889.

biguttata MEIG., S. B., IV, 320, 139, (1824) et VII, 191, 48. [*Tachina*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II, 148, 35. [*Tachina*] (1835); SCHN., F. A., I, 513. [*Redtenbacheria*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVII, t. XI, f. 293, 4. [*Phanionomyia*] (1889) et LX, 206, 107. [*Phanionomyia*] (1893); PAND., Rev. entom., XIII, 76, 1. (1894); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 133, (1900); HEND., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI, 208. [*Phanionomyia*] (1901).

Europacentr.
et mer.

bimaculata R.-D., Posth., II, 58. [*Phanionomyia*] (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 220. [*Phanionomyia*] (1893).

dispar RONDI., Dipt. ital. Prodr., I, 75, (1856) et IV, 86, 1. (1861).

forcipata R.-D., Posth., II, 186, 1. (1863).

musca R.-D., Myod., 254, 1. [*Phanionomyia*] (1830) et Posth., II, 58, 1. [*Phanionomyia*] (1863); MACQ., Suit. à Buff., II, 164, 6. [*Cassidomyia*] (1835).

pusilla R.-D. (*ovæ* MEIG.), Myod., 234, 1. (1830).

bimaculata R.-D. **biguttata** MEIG.

dispar RONDI. **biguttata** MEIG.

flavipalpis RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI, 603, 1. (1868); MENA Sicilia. PAL., Nat. sicil., XIV, 18, 8. (1896).

forcipata R.-D. **biguttata** MEIG.

musca R.-D. **biguttata** MEIG.

pusilla R.-D. **biguttata** MEIG.

Brullaea

R.-D., Posth., I. 773. (1863); Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 51. 8. (1906).

Clairvillia SEMS. (nec R.-D.), F. A., I. 417. 235. (1862); B. B.,
Denkschr. Akad. Wien, LVI. 144. (1889) et LX. 206. (1893).

longicornis HEND. — ?**ocypterina** SEMS.

ocypterina SEMS., F. A., I. 418. ♀ nec ♂. [*Clairvillia*] (1862); Europacentr.
JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XX. 46. 23. [*Clairvillia*] et mer.
(1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 144. t. XI. f. 293.
5. (1889) et LX. 206. [*Clairvillia*] (1893); STROBL, Wiss. Mittheil.
Bosn. Hereceg., VII. 598. [*Clairvillia*] (1900); HEND., Verh. zool-
bot. Ges. Wien, LI. 208. [*Clairvillia*] (1901).

?*longicornis* HEND., Verh. zool-bot. Ges. Wien, LI. 209. [*Clair-
villia*] (1901).

ocypteroidea R.-D., Posth., I. 773. 1. (1863).

ocypteroidea R.-D. — **ocypterina** SEMS.

Anurogyna

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 144. (1889) et LX. 155. (1893).

dispar B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 145. (1889). Europacentr.

Graphogaster

ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 46. (1868).

?*Hyalomyiodes* TYL.-TOWNS., Psyche, 1893. 429. (1893).

Paracyrillia STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 95. (1893).

maculata STROBL. — **vestita** ROSD.

punctata B. B. — ?**vestita** ROSD.

vestita ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 46. (1868); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 387. (1891). Europa mer.

maculata STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 95. [*Paracyrillia*]
et 214. 5. (1893), Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hereceg., X.
448. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hereceg., VII. 602. (1900).

?*punctata* B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 388. (1891);
STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 214. (1893).

Ceracia

ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 221. (1865); Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 51. 5. (1906).

Ceratia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 112. (1889) et
LX. 160. (1893) nec ADAMS 1852.

mucronifera ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 222. (1865); B. Europa mer.,
B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 125. [*Ceratia*] (1889). Ins. Canar.

Acomyia

R.-D., Myod., 202. 5. [*Acomyia*] (1830), *em.* ScDD. 1882.

Aucylocera Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 24.
[*Acylocera*] (1855), *em.* Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XVI, 309, *nota*, (1866).

Oncyhocera Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 736 —
737, [*Oncovicera*] (1854), *em.* Mik, Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, XVI, 309, *nota* (1866).

acuticornis MEG.*), S. B., IV, 320, 140, (1824) et VII, 191, 59, Europa.
[*Tachina*] (1838); Macq., Suit. à Buff., II, 146, 27, [*Tachina*]
(1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), II, 389, 31, t. XIII, f. 17,
[*Tachina*] (1854); SEMS., F. A., I, 475, [*Tachina*] (1862); PASD.,
Rev. entom., XIII, 99, [*Mysiobia*] (1894); STEIX, Entom. Nachricht.,
XXVI, 130, (1900).

albivirens ZETT., Dipt. Scand., III, 1064, 58, (1844) et VIII, 3235,
58, [*Tachina*] (1849).

angulicornis ZETT., Dipt. Scand., III, 1186, 189, (1844) et VIII,
3251, 189, [*Tachina*] (1849).

fasciopalpis PERR., Soc. Linn. Lyon, 1852, 64, [*Mysiobia*] (1852).
grisca Kow. (*nec* ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII,
221, 10, fig. [*Aucylocera*] (1868).

grisca ZETT., Ins. Lapp., 633, 2, [*Xysta*] (1838) et Dipt. Scand.,
IV, 1261, 2, (1845), VIII, 3262, 2, [*Xysta*] (1849); SEMS.,
F. A., I, 408, [*Xysta*] (1862); STEIX, Entom. Nachricht., XIV,
217, 106, [*Aucylocera*] (1888); STROHM, Mittheil. Ver. Steierm.,
XXX, 30, (1894).

myioidea R.-D., Myod., 203, 3, (1830).

nigra Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 24, t. I, f. 5,
[*Aucylocera*] (1855); SEMS., F. A., I, 528, [*Aucylocera*] (1862);
PASD., Rev. entom., XIII, 99, [*Mysiobia*] (1894).

oblonga R.-D., Myod., 202, 1, (1830); Macq., Suit. à Buff., II,
146, 28, [*Tachina*] (1835).

rafitibia v. Ros., Württemb. Corrbll., I, 57, [*Tachina*] (1840).

sabratunda R.-D., Myod., 202, 2, (1830); Macq., Soc. Sci. Lille,
1833, 267, (131), 30, [*Tachina*] (1834); MEG., S. B., VII, 199,
62, [*Tachina*] (1838); ROSD., Dipt. ital. Prodr., IV, 81, 1,
(1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, t. VIII, f. 215,
(1889); PASD., Rev. entom., XIII, 99, 3, [*Mysiobia*] (1894);
BERLESE, Riv. patol. veget., IV, 352, [*sine nomine*] (1901);
RUBAGA, Bull. entom. Agrar., 1902, (VIII), I, (1902).

albivirens ZETT. **acuticornis** MEG.

angiostoma B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXIII, 308, (1891). Helvetia.

angulicornis ZETT. **acuticornis** MEG.

*) *Aceridium lincola* F.

- cinerea** MÜK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI, 309, 6. [*Ancyllocera*] Austria mer.
(1866); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 30. (1894).
- fasciipalpis* PERR. **acuticornis** MEIG.
- grisea* KOW. = **acuticornis** MEIG.
- grisea* ZETT. = **acuticornis** MEIG.
- myioidea* R.-D. **acuticornis** MEIG.
- nigra* Macq. = **acuticornis** MEIG.
- oblonga* R.-D. = **acuticornis** MEIG.
- rafitibia* v. Ros. = **acuticornis** MEIG.
- ? **striginervis** ZETT., Ins. Lapp., 633, 1. [*Xysta*] (1838) et Dipt. Scand., Scandinavia.
IV, 1260, 1. (1845) et XI, 4318, 1. [*Xysta*] (1855); WALLGR.,
Entom. Tidskr., I, 17, 1. [*Xysta*] (1880).
- subrotunda* ROXB. = **acuticornis** MEIG.

Podotachina

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 350. (1891) et LX, 124. (1893).

- sorbillans** WIED., Ausser. zweifl. Ins., II, 311, 54. [*Tachina*] (1830); Ins. Canar.
Macq., Webb Hist. nat. Can., Ent. I, 111, 60. [*Masicera*] (1838);
B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 350. (1891).

Tachina

MEIG., Illiger's Magaz., II, 280. (1803).

- Faunia* R.-D., Myod., 279. (1830).
- Oodigaster* Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 397. (1854).
- Tachinomyia* TYL.-TOWN., Trans. am. entom. Soc., XIX, 96.
(1892).

A. *Tachina* s. str.

Eutachina B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 98. (1889) et
LX, 123. (1893).

- affinis* R.-D. = **larvarum** L.
- albifrons** ROXB., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 214. (1865). Italia.
- arcensis* R.-D. = **larvarum** L.
- brucorum** ROXB., Dipt. ital. Prodr., III, 197, 2. (1859) et Atti Soc. Italia.
ital. Sci. Nat., VIII, 212. (1865).
- chrysalidarum** ROXB., Dipt. ital. Prodr., III, 196, 1. (1859) et Atti Italia.
Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 212. (1865).
- civilis* PAND. = **fallax** MEIG.
- decidua** PAND., Rev. entom., XV, 64, 22. (1896). Gallia.
- delicatula* R.-D. = **larvarum** L.
- disjuncta* WALK. = **larvarum** L.
- erucarum* SCHRANK = **larvarum** L.

- fallax** MEIG., S. B., IV, 321, 142. (1824) et VII, 190, 18. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 379, 10, t. XIII, f. 1. (1854); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 136. (1900).
civilis PAND. (nec ROXB.), p. p., Rev. entom., XV, 63, 21. (1896).
Winnertzi B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 225. (1893) et LXI, 622. [*Eatachina*] (1893); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 401. (1900).
- fasciata* FALL. = **larvarum** L.
- festinata* R.-D. = **larvarum** L.
- flavescens* MEIG. = **larvarum** L.
- flaviceps* MACQ. = **larvarum** L.
- flavidipennis** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 405, 11, t. XIII, f. 15. [*Oodigaster*] (1854); ROXB., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI, 40. (1868).
 Sardinia.
- glossatorum** ROXB., Dipt. ital. Prodr., III, 202, 7. (1859).
 Italia.
- grandis** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI, 213. [*Baumhauecia*] (1861); SCHN., F. A., I, 495. [*Baumhauecia*] (1862).
 Austria.
- grandis* R.-D. = **larvarum** L.
- hispida* R.-D. = **larvarum** L.
- illustris** MEIG., S. B., IV, 293, 97. (1824) et VII, 190, 27, t. LXVIII, f. 31—36. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 260, 11. (1824).
 Suit à Buff., II, 141, 6. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), II, 391, 36, t. XIII, f. 21. (1854); ROXB., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 215. (1865); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 140. (1900).
 Europa centr. et mer.
- impotens** ROXB., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 214. (1865).
 Italia.
- laeta* R.-D. = **larvarum** L.
- laeta* R.-D. (*bis*) = **larvarum** L.
- larvarum** L.*), Syst. nat., X, 596. [*Musca*] (1758), XII, II, 992. [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1839. [*Musca*] (1761); SCOP., Entom. carn., 331, 888. [*Musca*] (1763); O. F. MÜLL., Fauna Friedrichsd., 736. [*Musca*] (1764); DEG., Mem. Ins., VI, 14, 4. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI, 23, 4. [*Musca*] (1783); SCHRANK, Enum. ins., 461, 937. [*Musca*] (1781) et Fauna boica, III, 119.

*) *Aeronicta rumicis* L., *Agrotis praecox* L., *Aretia caja* L. et *villica* L., *Catocala fraxini* L., *Cosmotriche potatoaria* L., *Cucullia prenanthis* B., *Dasychira fascelina* L., *Deilephila galii* Rott. et *euphorbiae* L., *Dendrolimus pini* L., *Gastropacha quercifolia* L., *Lasiocampa quereus* L., *Lymantria dispar* L. et *monacha* L., *Macroglossa stellatarum* L., *Macrothylacia rubi* L., *Malacosoma castrensis* L. et *neustria* L., *Mamestra brassicae* L., *Melitaea didyma* O., *Metopisilus porcellus* L., *Oenieria detrita* Esp., *Olethreutes Hercyniana* Tr., *Orgyia ericae* GRAM. et *gonostigma* F., *Orthosia humilis* F., *Panolis griseovariegata* GOEZE, *Papilio Machaon* L., *Plusia Iota* L., *Saturnia pyri* SCHNEF., *Stilponia salicis* L., *Vanessa Antiope* L., *Io* L., *polychloros* L. et *urticae* L., *Yponomeuta evonymella* L., *Lophyrus pini* L., *Pamphilius stellatus* CURS.

2443. [*Musca*] (1803): FABR., Spec. Ins., II. 442. 34. [*Musca*] (1786), Entom. syst., IV. 326. 59. [*Musca*] (1794) et Syst. Anth., 300. 81. [*Musca*] (1805): GMEL., Syst. nat., V. 2846. 78. [*Musca*] (1788): ROSSI, Fauna etr., II. 305. 1503. [*Musca*] (1790): CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 311. 980. [*Musca*] (1798): ILLIG., Rossi Fauna etr., II. 467. 1503. [*Musca*] (1807): MEIG., S. B., IV. 295. 100. (1824) et VII. 190. 19. (1838): NEWM., Mag. nat. Hist., V. 252. (1832): MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 261. 13. t. IV. f. 7. (1834), Suit. à Buff., II. 141. 8. t. XIV. f. 15. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 376. 2. t. XIII. f. 2. (1854): SIEB., Wiegmn. Archiv., IV. 198. 10. (1838): HART., Jahrb. Fortsch. Forstwiss., I. 282. 9. (1838): BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 611. (1840): ZETT., Ins. Lapp., 634. 2. (1838) et Dipt. Scand., III. 1015. 3. (1844): ROXD., Dipt. ital. Prodr., III. 198. 3. (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 213. 65. (1865): SCHIX., F. A., I. 474. (1862): R.-D., Posth., I. 962. 4. (1863): WULF., Entom. Tijdschr., (2). IV. 153. (1864): BOSSD., Finnl. Insekt., II. 47. 3. (1866): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. t. IV. f. 64. [*Eutachina*] (1889): MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). III. 36. (1892): GIARD, Bull. Soc. entom. France, 1894. CLXXX. (1894): MIK et WACHTL, Wien. entom. Zeitg., XIV. 220. 5. [*Eutachina*] (1895): PAND., Rev. entom., XV. 64. 23. (1896): MELL., Zool. Jahrbüch., XV. 680. f. 48. (1901).

affinis R.-D., Myod., 193. 23. (1830).

arvensis R.-D., Myod., 194. 27. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 142. 10. (1835).

delicatula R.-D., Posth., I. 971. 18. (1863).

disjuncta WALK., Ins. Brit., II. 44. 58. (1853).

erucarum SCHRANK, Fauna boica, 119. 2444. [*Musca*] (1803).

extensa ZETT. in litt. ap. ZETT.

fasciata FALL. (nec FABR.), Dipt. succ. Musc., 5. 4. (1820): MEIG., S. B., VII. 191. 7. [et IV. 295]. (1838): ZETT., Dipt. Scand., III. 1013. 1. (1844); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 46. 1. (1866): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 428. [*Tricholyga*] (1891).

festinata R.-D., Posth., I. 970. 16. (1863).

flavescens MEIG., S. B., IV. 294. 98. (1824) et VII. 190. 2. (1838): MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 261. 12. (1834). Suit. à Buff., II. 141. 7. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 377. 6. t. XIII. f. 4. (1854): SIEB., Wiegmn. Archiv., IV. 197. 8. (1838): ZETT., Dipt. Scand., III. 1014. 2. (1844): WALK., Ins. Brit., II. 26. 17. (1853): BOSSD., Finnl. Insekt., II. 46. 2. (1866): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 221. [*Chaetotachina*] (1893); STREX, Entom. Nachricht., XXVI. 137. (1900). *flaviceps* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 376. 3. t. XII. f. 2. (1854).

grandis R.-D., Posth., I. 963. 5. (1863).

- bispala* R.-D., Myod., 189, 9, (1830) et Posth., I, 964, 7, (1863).
lacta R.-D., Myod., 193, 22, (1830).
lacta R.-D. (*var.* 1830), Posth., I, 965, 8, (1863).
littoralis R.-D., Myod., 189, 8, (1830) et Posth., I, 964, 6, (1863).
macrocera R.-D., Myod., 188, 6, (1830) et Posth., I, 959, 1, (1863); Macq., Suit. à Buff., II, 141, 4, (1835).
macroGLOSSae R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 169, (1850).
marginalis R.-D., Posth., I, 971, 17, (1863).
melancholica R.-D., Posth., I, 970, 15, (1863).
Moreti R.-D., Bull. Soc. Sci. Young, VII, 534, (1853) et Posth., I, 966, 11, (1863).
? nigrifrons BRISCKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, N. F. VI, 18, (1885).
nigrolineata WALK., Ins. Brit., II, 85, 150, (1852).
nobilis R.-D., Posth., I, 965, 9, (1863).
praepotens MEIG., S. B., IV, 292, 95, (1824) et VII, 190, 1, (1838); Macq., Suit. à Buff., II, 141, 5, (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), II, 375, 1, 1, XIII, 1, 1, (1854); R.-D., Posth., I, 968, 14, (1863); ROSSI, Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 214, (1865); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 146, (1900).
paella R.-D., Posth., I, 966, 10, (1863).
rapida R.-D., Myod., 187, 1, (1830); Macq., Suit. à Buff., II, 140, 2, (1835).
rabescens R.-D., Myod., 188, 4, (1830) et Posth., I, 961, 3, (1863).
rustica FALL., Vet. Acad. Handl., XXXI, 282, (1810) et Dipt. succ. Musc., 5, 5, (1820).
rustica R.-D. (*var.* FALL.), Myod., 189, 7, (1830).
scutellaris R.-D., Myod., 188, 3, (1830) et Posth., I, 967, 12, (1863).
silvestris R.-D., Myod., 194, 28, (1830).
suavis R.-D., Myod., 191, 17, (1830).
tridactyla R.-D., Posth., I, 968, 13, (1863).
vagans R.-D., Myod., 187, 2, (1830).
vicina R.-D., Myod., 193, 24, (1830).
villica R.-D., Myod., 188, 5, (1830) et Posth., I, 958, 2, (1863); LAROCHE, Annal. Soc. entom. France, (4), 1, 232, fig. (1861).
latifrons ROSSI, Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 215, (1865); MEYER, Europaeentr. Entom. Monthly Mag., (2), III, 37, (1892). et mer.
littoralis R.-D. **larvarum** L.
macrocera R.-D. **larvarum** L.
macroGLOSSae R.-D. **larvarum** L.
marginalis R.-D. **larvarum** L.
marginella MEIG., S. B., VII, 193, 25, (1838); ? Macq., Annal. Soc. Europaeentr.

† *Euproctis chrysocephala* L., *Zygona bipendulae* L.

- entom. Francee, 65, II, 378, S. t. XIII, t. 6, (1854); SCHN., F. A., I, 473, (1862); STROBL, Programm Seitenst., XIV, 61, (1880).
- melancholica* R.-D. larvarum L.
- Moceti* R.-D. larvarum L.
- nigripennis* BRISCHKE ?larvarum L.
- nigrolineata* WALK. larvarum L.
- nobilis* R.-D. larvarum L.
- noctuarum** ROSIG., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 213, (1865); Europa-centr.
MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 37, (1892). et mer.
- paucipennis* MEIG. larvarum L.
- paella* R.-D. larvarum L.
- rapida* R.-D. larvarum L.
- rubescens* R.-D. larvarum L.
- ruffrons** MUGG., Annal. Soc. entom. Francee, 65, III, 384, 20, t. XIII, Europa-centr.
t. 7, (1854); ROSIG., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI, 59, (1868). et mer.
- rustica* FALL. larvarum L.
- rustica* R.-D. larvarum L.
- scutellaris* R.-D. larvarum L.
- sibirica* R.-D. larvarum L.
- suave* R.-D. larvarum L.
- spinicosta** PALM., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV, 419, 10, (1875); Tirolia.
- stimulans** MEIG., S. B., IV, 305, 114, (1824) et VII, 190, 31, (1838); Germania.
- triplata* R.-D. larvarum L.
- vagus* R.-D. larvarum L.
- vicia* R.-D. larvarum L.
- vidua** MEIG.?, S. B., IV, 315, 131, (1824) et VII, 190, 28, (1838); Europa-centr.
SCHN., F. A., I, 474, (1862); WALT., Entom. Tijdschr., (2), IV, 153, (1864).
- villia* R.-D. larvarum L.
- Wimmeri* B. B. fallax MEIG.

B. *Chaetotachina*

- B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 98, (1889) et LX, 123, (1890).
- Adenia* R.-D., Posth., I, 1041, VII, (1863).
- Bipedia* R.-D., Posth., I, 1048, IX, (1863).
- Chealora* R.-D., Posth., I, 1047, VIII, (1863), *acc.* PER. L., 1810, MOLL.
- Eribea* R.-D., Posth., I, 1033, VI, (1863).
- Esiba* R.-D., Posth., I, 1063, XII, (1863).
- Futilla* R.-D., Posth., I, 1049, X et II, 918, (1863).
- Gaabilia* R.-D., Posth., I, 1062, XI, (1863).

*) Cosmotriche potatorum L.

*) Macrothylacia rubi L.

Walkeria R.-D., Posth., I, 995, IV, (1863) *acc* FLEM, 1828.
Zelleria R.-D., Posth., I, 984, III, (1863) *acc* STANT, 1849, LEP.
Zellersiedtia R.-D., Posth., I, 1024, V, (1863) *acc* ROSS, 1856,
 Dipt.

- abdominalis* R.-D. **rustica** MEG.
agrorum R.-D. **rustica** MEG.
alacer MACQ. **rustica** MEG.
albiceps R.-D. **rustica** MEG.
albida R.-D. **rustica** MEG.
albifrons MACQ. **rustica** MEG.
albifrons R.-D. **rustica** MEG.
amica R.-D. **rustica** MEG.
anceps R.-D. **rustica** MEG.
ancilla R.-D. **rustica** MEG.
ardecata R.-D. **rustica** MEG.
arrogum R.-D. **rustica** MEG.
atrata R.-D. **rustica** MEG.
atlar R.-D. **rustica** MEG.
aubeus MACQ. **rustica** MEG.
augur R.-D. **rustica** MEG.
aurea R.-D. **rustica** MEG.
auriceps MEG., S. B., IV, 293, 96, (1824) et VII, 190, 4, (1838); Europa centr.
 MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 260, 10, (1834) et Suit. à Buff., II,
 140, 3, (1835); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 220, (1893).
aurifacies R.-D. **rustica** MEG.
aurifrons R.-D. **rustica** MEG.
blandula R.-D. **rustica** MEG.
blandula R.-D. **rustica** MEG.
brericornis MACQ. **rustica** MEG.
caesia R.-D. **rustica** MEG.
campestris R.-D. **rustica** MEG.
capax R.-D. **rustica** MEG.
cila R.-D. **rustica** MEG.
clavicornis R.-D. **rustica** MEG.
compax R.-D. **rustica** MEG.
contenta R.-D. **rustica** MEG.
contracta R.-D. **rustica** MEG.
convoluta R.-D. **rustica** MEG.
causoria R.-D. (*Ec.*) **rustica** MEG.
causoria R.-D. (*Fal.*) **rustica** MEG.
caputescens R.-D. **rustica** MEG.
delicatula R.-D. **rustica** MEG.
diaphanipennis R.-D. **rustica** MEG.
discreta R.-D. **rustica** MEG.
distincta R.-D. **rustica** MEG.
diversa R.-D. **rustica** MEG.

- dominula* R.-D. **rustica** MEG.
edax R.-D. **rustica** MEG.
erissa R.-D. **rustica** MEG.
exilis R.-D. **rustica** MEG.
facialis R.-D. **rustica** MEG.
fallax R.-D. **rustica** MEG.
fausta R.-D. **rustica** MEG.
ferax R.-D. **rustica** MEG.
festiva R.-D. **rustica** MEG.
flarago R.-D. **rustica** MEG.
flaricans R.-D. (*Fal.*) **rustica** MEG.
flaricans R.-D. (*Walk.*) **rustica** MEG.
flariformis MACQ. **rustica** MEG.
flaripalpis MACQ. **rustica** MEG.
floralis R.-D. **rustica** MEG.
florum R.-D. **rustica** MEG.
fugax R.-D. **rustica** MEG.
fabricornis R.-D. **rustica** MEG.
fabrica R.-D. **rustica** MEG.
funebris R.-D. **rustica** MEG.
gagalina R.-D. **rustica** MEG.
gentilis R.-D. **rustica** MEG.
germana R.-D. **rustica** MEG.
grisea R.-D. **rustica** MEG.
grisescens MEG., S. B., VII, 197, 56. (1824) et VII, 191, 56. (1838); Europaeentr.
 SCHN., F. A., I, 476. (1862).
grossaria R.-D. (*Er.*) **rustica** MEG.
grossaria R.-D. (*Walk.*) **rustica** MEG.
hilarella R.-D. **rustica** MEG.
hilaris R.-D. **rustica** MEG.
honesta R.-D. **rustica** MEG.
hortorum R.-D. **rustica** MEG.
inavis R.-D. **rustica** MEG.
incana R.-D. **rustica** MEG.
impinata R.-D. **rustica** MEG.
insidiosa R.-D. **rustica** MEG.
intacta R.-D. **rustica** MEG.
irrorata R.-D. (*Id.*) **rustica** MEG.
irrorata R.-D. (*Fal.*) **rustica** MEG.
jejana R.-D. **rustica** MEG.
jocax R.-D. **rustica** MEG.
juvenilis R.-D. **rustica** MEG.
lucris R.-D. **rustica** MEG.
lucrarum R.-D. **rustica** MEG.
lateralis R.-D. **rustica** MEG.
luta R.-D. **rustica** MEG.
limpida R.-D. **rustica** MEG.

- lubrica* R.-D. **rustica** MEG.
ludibrina R.-D. **rustica** MEG.
ludibunda MACQ. **rustica** MEG.
lucoria MEG. **rustica** MEG.
lutescens R.-D. **rustica** MEG.
maculata R.-D. **rustica** MEG.
maesta R.-D. **rustica** MEG.
melancholica R.-D. **rustica** MEG.
menula R.-D. **rustica** MEG.
minax R.-D. **rustica** MEG.
misera R.-D. **rustica** MEG.
monita R.-D. **rustica** MEG.
morosa R.-D. **rustica** MEG.
monta R.-D. (*Ful.*) **rustica** MEG.
monta R.-D. (*Walk.*) **rustica** MEG.
musca R.-D. **rustica** MEG.
nigra R.-D. **rustica** MEG.
nigricans Egg., Verh. zool.-b. t. Ges. Wien, XI, 211. (1861); SCHN., Europ. entom. F. A., I, 475. (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), V, 108. (1894).
nitens R.-D. **rustica** MEG.
nitida R.-D. **rustica** MEG.
nyctax R.-D. **rustica** MEG.
obscurata R.-D. **rustica** MEG.
olivacea R.-D. **rustica** MEG.
pacifica R.-D. **rustica** MEG.
pagana R.-D. **rustica** MEG.
paupercata R.-D. **rustica** MEG.
perria R.-D. **rustica** MEG.
polita MEG., S. B., IV, 314, 430. (1821) et VII, 190, 23. (1838). Germania.
politoria R.-D. **rustica** MEG.
procer R.-D. **rustica** MEG.
profuga R.-D. **rustica** MEG.
propinqua R.-D. **rustica** MEG.
puella R.-D. **rustica** MEG.
purpur R.-D. **rustica** MEG.
putilla MACQ. **rustica** MEG.
putilla R.-D. **rustica** MEG.
quiesca R.-D. (*Ful.*) **rustica** MEG.
quiesca R.-D. (*Walk.*) **rustica** MEG.
rapax R.-D. **rustica** MEG.
rectinervis MACQ. **rustica** MEG.
repula R.-D. **rustica** MEG.
rubrifrons R.-D. **rustica** MEG.
rustica MEG. (?) (*acc.* FALLÉ, S. B., VII, 193, 21. (1838); MACQ., Annal. Europa,

(2) *Valk.* = *Lasiocampa quercus* L., *Malacosoma neustria* L., *Stilpnodia*

Soc. entom. France, (3), II, 377, 5, t. XIII, f. 3, (1854); Rond., Dipt. ital. Prodr., III, 200, 5, (1859); SCHIN., F. A., I, 474, (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. IV, f. 65, (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 37, (1892); PASD., Rev. entom., XV, 65, 24, (1896); COQUILL., Revis. Tachin. N. A., 189, (1897); ALDR., Cat. Dipt. N. A., 471, (1905).

abdominalis R.-D., Myod., 190, 12, (1830) et Posth., I, 1022, 48, [*Walkeria*] (1863).

agrorum R.-D., Posth., I, 1013, 36, [*Walkeria*] (1863).

alacer Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 390, 31, t. XIII, f. 20, (1854).

albiceps R.-D., Posth., I, 1036, 6, [*Eribea*] (1863).

albida R.-D., Myod., 192, 19, (1830) et Posth., I, 1001, 11, [*Walkeria*] (1863).

albifrons Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 389, 30, t. XIII, f. 16, (1854).

albifrons R.-D., Posth., I, 1024, 1, [*Zetterstedtia*] (1863).

amica R.-D., Posth., I, 1027, 6, [*Zetterstedtia*] (1863).

anceps R.-D., Posth., I, 996, 3, [*Walkeria*] (1863).

ancilla R.-D., Posth., I, 1047, 1, [*Cleodora*] (1863).

arleoaca R.-D., Posth., I, 1009, 27, [*Walkeria*] (1863).

arorum R.-D., Posth., I, 1063, 1, [*Esila*] (1863).

atrata R.-D., Myod., 195, 32, (1830) et Posth., I, 1008, 25, [*Walkeria*] (1863).

auar R.-D., Posth., I, 992, 14, [*Zelleria*] (1863).

auleus Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 385, 23, t. XIII, f. 2, (1854).

augur R.-D., Posth., I, 1034, 1, [*Eribea*] (1863).

aurca R.-D., Myod., 191, 16, (1830) et Posth., I, 1017, 42, [*Walkeria*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 265, 23, (1834).

aurifacies R.-D., Posth., I, 1061, 22, [*Fatilia*] (1863).

aurifrons R.-D., Myod., 190, 10, (1830) et Posth., I, 999, 10, [*Walkeria*] (1863).

blanda R.-D., Posth., I, 1060, 21, [*Fatilia*] (1863).

blandula R.-D., Posth., I, 1016, 40, [*Walkeria*] (1863).

brevicornis Macq. (nec 1838), Annal. Soc. entom. France, (3), II, 379, 9, t. XIII, f. 7, (1854); R.-D., Posth., I, 1048, 1, [*Bigotia*] (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 424, (1891).

caesia R.-D., Posth., I, 1032, 13, [*Zetterstedtia*] (1863).

campestris R.-D., Myod., 190, 11, (1830) et Posth., I, 1001, 12, [*Walkeria*] (1863).

salicis L., Vanessa polychloros L. — Allantus arcuatus Fonsr., Rhogastera viridis L., Tenthredo flava Poda, Tenthredopsis Coqueberti Kurg et sentellaris F.

- capax* R.-D., Posth., I, 987, 4. [*Zelleria*] (1863).
- cita* R.-D., Posth., I, 1010, 30. [*Walkeria*] (1863).
- claripennis* R.-D., Myod., 192, 20, (1830) et Posth., I, 995, 2.
[*Walkeria*] (1863).
- compur* R.-D., Posth., I, 1008, 24. [*Walkeria*] (1863).
- contenda* R.-D., Posth., I, 998, 7. [*Walkeria*] (1863).
- contraria* R.-D., Posth., I, 997, 6. [*Walkeria*] (1863).
- enuclata* R.-D., Posth., I, 1006, 21. [*Walkeria*] (1863).
- cursoria* R.-D., Posth., I, 1038, 10. [*Eribea*] (1863).
- carsoria* R.-D., Posth., I, 1051, 6. [*Fatilia*] (1863).
- cyanescens* R.-D., Posth., I, 997, 5. [*Walkeria*] (1863).
- delicatula* R.-D., Posth., I, 1016, 41. [*Walkeria*] (1863).
- diaphanipennis* R.-D., Myod., 191, 13, (1830) et Posth., I, 1032,
14. [*Zetterstedtia*] (1863).
- discreta* R.-D., Posth., I, 1018, 44. [*Walkeria*] (1863).
- distincta* R.-D., Myod., 191, 15, (1830) et Posth., I, 1012, 34.
[*Walkeria*] (1863).
- diversa* R.-D., Myod., 193, 25, (1830) et Posth., I, 1005, 18.
[*Walkeria*] (1863).
- dominata* R.-D., Posth., I, 1062, 1. [*Gaubilina*] (1863).
- edar* R.-D., Posth., I, 994, 18. [*Zelleria*] (1863).
- emissa* R.-D., Posth., I, 1009, 26. [*Walkeria*] (1863).
- erilis* R.-D., Posth., I, 1002, 13. [*Walkeria*] (1863).
- facialis* R.-D., Posth., I, 1030, 11. [*Zetterstedtia*] (1863).
- fallax* R.-D., Posth., I, 990, 10. [*Zelleria*] (1863).
- fausta* R.-D., Posth., I, 1017, 43. [*Walkeria*] (1863).
- ferax* R.-D., Posth., I, 991, 12. [*Zelleria*] (1863).
- festiva* R.-D., Myod., 192, 21, (1830) et Posth., I, 998, 8. [*Wal-*
keria] (1863); Macq., Suit. à Buff., II, 142, 9, (1835).
- flarago* R.-D., Posth., I, 1054, 10. [*Fatilia*] (1863).
- flaricans* R.-D., Posth., I, 1049, 1. [*Fatilia*] (1863).
- flaricans* R.-D., Posth., I, 1003, 14. [*Walkeria*] (1863).
- flarifrons* Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 386, 24,
t. XIII, f. 41, (1854); BRACHER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI,
351, 83, (1897).
- flaripalpis* Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 382, 16,
t. XIII, f. 2. [*flaripalpis*] (1854).
- floralis* R.-D., Posth., I, 1050, 3. [*Fatilia*] (1863).
- florum* R.-D., Myod., 192, 18, (1830) et Posth., I, 1010, 29.
[*Walkeria*] (1863).
- fugax* R.-D., Posth., I, 989, 9. [*Zelleria*] (1863).
- fulvicornis* R.-D., Posth., I, 1023, 50. [*Walkeria*] (1863); B. B.,
Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 429, (1891).
- fulvida* R.-D., Posth., I, 1025, 3. [*Zetterstedtia*] (1863).
- fuehris* R.-D., Posth., I, 1042, 3. [*Idenia*] (1863).
- gagalina* R.-D., Posth., I, 1040, 14. [*Eribea*] (1863).
- gentilis* R.-D., Posth., I, 1014, 37. [*Walkeria*] (1863).

- germana* R.-D., Myod., 191, 14, (1830) et Posth., I, 1029, 9, [*Zetterstedtia*] (1863).
- grisea* R.-D., Myod., 195, 31, (1830) et Posth., I, 1044, 6, [*Adenia*] (1863).
- grossioria* R.-D., Posth., I, 1039, 13, [*Eribea*] (1863).
- grossioria* R.-D., Posth., I, 1021, 46, [*Walkeria*] (1863).
- hilarella* R.-D., Posth., I, 1007, 23, [*Walkeria*] (1863).
- hilaris* R.-D., Posth., I, 1004, 17, [*Walkeria*] (1863).
- honesta* R.-D., Posth., I, 1035, 4, [*Eribea*] (1863).
- hortorum* R.-D., Posth., I, 1050, 4, [*Futilia*] (1863).
- inanis* R.-D., Posth., I, 1031, 12, [*Zetterstedtia*] (1863).
- incana* R.-D., Posth., I, 1055, 12, [*Futilia*] (1863).
- inguinata* R.-D., Posth., I, 1057, 16, [*Futilia inguinata*] (1863).
- insidiosa* R.-D., Posth., I, 1013, 35, [*Walkeria*] (1863).
- intacta* R.-D., Posth., I, 1041, 5, [*Adenia*] (1863).
- irrorata* R.-D., Posth., I, 1042, 1, [*Adenia*] (1863).
- irrorata* R.-D., Posth., I, 1053, 9, [*Futilia*] (1863).
- jéjuna* R.-D., Posth., I, 1003, 15, [*Walkeria*] (1863).
- joear* R.-D., Posth., I, 985, 1, [*Zelleria*] (1863).
- juvenilis* R.-D., Posth., I, 1037, 7, [*Eribea*] (1863).
- lacris* R.-D., Posth., I, 1005, 19, [*Walkeria*] (1863).
- larvarum* R.-D. (*acc* L.), Posth., I, 1018, 45, [*Walkeria*] (1863).
- lateralis* R.-D., Posth., I, 999, 9, [*Walkeria*] (1863).
- lata* R.-D., Posth., I, 995, 1, [*Walkeria*] (1863).
- limpida* R.-D., Posth., I, 1011, 32, [*Walkeria*] (1863).
- lubrica* R.-D., Posth., I, 1059, 18, [*Futilia*] (1863).
- lubrificata* R.-D., Posth., I, 1039, 12, [*Eribea*] (1863).
- lubibanda* Macq., Annal. Soc. entom. France, 63, H, 383, 18, t. XIII, f. 8, (1854).
- lusoria* MEG., S. B., IV, 309, 121, (1824) et VII, 193, 22, (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 266, 26, (1834) et Suit. à Buff., H, 144, 19, (1835); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 142, (1900).
- lutescens* R.-D., Posth., I, 1054, 11, [*Futilia*] (1863); REUFER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII, 506, 36, (1899).
- maculata* R.-D., Posth., I, 1035, 3, [*Eribea*] (1863).
- maesta* R.-D., Posth., I, 1041, 16, [*Eribea*] (1863).
- melancholica* R.-D., Posth., I, 1038, 9, [*Eribea*] (1863).
- mendar* R.-D., Posth., I, 993, 17, [*Zelleria*] (1863).
- minar* R.-D., Posth., I, 987, 6, [*Zelleria*] (1863).
- misera* R.-D., Posth., I, 1012, 33, [*Walkeria*] (1863).
- monila* R.-D., Posth., I, 1007, 22, [*Walkeria*] (1863).
- morosa* R.-D., Posth., I, 1037, 8, [*Eribea*] (1863).
- munda* R.-D., Posth., I, 1055, 13, [*Futilia*] (1863).
- munda* R.-D., Posth., I, 1009, 28, [*Walkeria*] (1863).
- musca* R.-D., Posth., I, 996, 4, [*Walkeria*] (1863).
- nigra* R.-D., Myod., 195, 30, (1830) et Posth., I, 1045, 8, [*Adenia*] (1863).

- nitens* R.-D., Posth., I, 1028, 7, [*Zetterstedtia*] (1863).
- nitida* R.-D., Posth., I, 1051, 5, [*Futilia*] (1863).
- noyae* R.-D., Posth., I, 987, 5, [*Zelleria*] (1863): BRÄUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI, 352, 84, (1897).
- obscurata* R.-D., Posth., I, 1062, 23, [*Futilia*] (1863).
- olivacea* R.-D., Posth., I, 1057, 15, [*Futilia*] (1863).
- pacifica* R.-D., Posth., I, 1023, 49, [*Walkeria*] (1863).
- pagana* R.-D., Posth., I, 1034, 2, [*Eribea*] (1863).
- paupercata* R.-D., Posth., I, 1011, 31, [*Walkeria*] (1863).
- perria* R.-D., Posth., I, 1059, 19, [*Futilia*] (1863).
- polatoria* R.-D., Posth., I, 1046, 9, [*Adenia*] (1863).
- procar* R.-D., Posth., I, 990, 11, [*Zelleria*] (1863).
- profuga* R.-D., Posth., I, 1046, 10, [*Adenia*] (1863).
- propinqua* R.-D., Posth., I, 1043, 4, [*Adenia*] (1863).
- puella* R.-D., Posth., I, 1040, 15, [*Eribea*] (1863).
- pugnax* R.-D., Posth., I, 988, 7, [*Zelleria*] (1863).
- pumila* Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 387, 26, t. XIII, f. 11, (1854).
- pumila* R.-D., Posth., I, 1026, 4, [*Zetterstedtia*] (1863).
- quinta* R.-D., Posth., I, 1053, 8, [*Futilia*] (1863).
- quinta* R.-D., Posth., I, 1021, 47, [*Walkeria*] (1863): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 438, (1891).
- rapax* R.-D., Posth., I, 986, 3, [*Zelleria*] (1863).
- rectinervis* Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 383, 19, t. XIII, f. 10, (1854).
- regula* R.-D., Posth., I, 1006, 20, [*Walkeria*] (1863).
- rubrifrons* R.-D., Posth., I, 1056, 14, [*Futilia*] (1863).
- sagax* R.-D., Posth., I, 992, 15, [*Zelleria*] (1863).
- schistacea* R.-D., Posth., I, 1038, 11, [*Eribea*] (1863).
- scutellaris* R.-D., Posth., I, 1004, 16, [*Walkeria*] (1863).
- sequax* R.-D., Posth., I, 993, 16, [*Zelleria*] (1863).
- simulans* Meig.^{*)}, S. B., IV, 307, 116, (1824) et VII, 192, 20, (1838): Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 262, 14, (1834) et Annal. Soc. entom. France, (3), II, 378, 7, t. XIII, f. 5, (1854): RATZEL, Forstins., III, 172, (1844): STREIS, Entom. Nachricht., XXVI, 149, (1900).
- sordida* R.-D., Posth., I, 1025, 2, [*Zetterstedtia*] (1863).
- spinosula* TYL.-TOWNS., Trans. Am. entom. Soc., XVIII, 353, (1891).
- spinulosa* R.-D., Posth., I, 1029, 8, [*Zetterstedtia*] (1863).
- specta* R.-D., Posth., I, 1042, 2, [*Adenia*] (1863).
- sabtilis* R.-D., Posth., I, 1052, 7, [*Futilia*] (1863).
- temerata* R.-D., Posth., I, 1060, 20, [*Futilia*] (1863): BRÄUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII, 507, 37, (1899).
- temer* R.-D., Posth., I, 989, 8, [*Zelleria*] (1863).

^{*)} Recte nomen istud, loco *rustica* Meig., adoptandum erit.

lethalcalcarata TYL.-TOWNS., TRANS. AM. ENTOM. SOC., XIX, 283, (1892).

leves R.-D., Posth., I, 1050, 2. [*Falitia*] (1863).

calata R.-D., Posth., I, 994, 19. [*Zelleria*] (1863).

relor R.-D., Posth., I, 1036, 5. [*Eribea*] (1863).

centralis R.-D., Posth., 1015, 38. [*Walkeria*] (1863).

cecar R.-D., Posth., I, 986, 2. [*Zelleria*] (1863).

cernalis R.-D., Posth., I, 1026, 5. [*Zetterstedtia*] (1863).

cesana R.-D., Posth., I, 1058, 17. [*Falitia*] (1863).

rigil R.-D., Posth., I, 1045, 7. [*Adecia*] (1863).

vittata MACQ., ANNAL. SOC. ENTOM. FRANCE, (3), II, 377, I, 1, XIII, f. 2. (1854).

vicar R.-D., Posth., I, 991, 13. [*Zelleria*] (1863).

vicida R.-D., Posth., I, 1015, 39. [*Walkeria*] (1863).

valueris R.-D., Posth., I, 1030, 10. [*Zetterstedtia*] (1863).

sagax R.-D. **rustica** MEIG.

schistacea R.-D. **rustica** MEIG.

scutellaris R.-D. **rustica** MEIG.

sequax R.-D. **rustica** MEIG.

simulans MEIG. **rustica** MEIG.

sordida R.-D. **rustica** MEIG.

spinulata TYL.-TOWNS. **rustica** MEIG.

spinalosa R.-D. **rustica** MEIG.

specta R.-D. **rustica** MEIG.

sabulis R.-D. **rustica** MEIG.

temerata R.-D. **rustica** MEIG.

tenax R.-D. **rustica** MEIG.

lethalcalcarata TYL.-TOWNS. **rustica** MEIG.

leves R.-D. **rustica** MEIG.

vagabunda MEIG., S. B., IV, 310, 122, (1824) et VII, 191, 50, (1838); Europaeanti; MACQ., ANNAL. SOC. ENTOM. FRANCE, (3), II, 390, 33, t. XIII, f. 19, (1854); SCHN., F. A., I, 476, (1862).

calida R.-D. **rustica** MEIG.

relor R.-D. **rustica** MEIG.

centralis R.-D. **rustica** MEIG.

cecar R.-D. **rustica** MEIG.

cernalis R.-D. **rustica** MEIG.

cesana R.-D. **rustica** MEIG.

rigil R.-D. **rustica** MEIG.

vittata MACQ. **rustica** MEIG.

vicar R.-D. **rustica** MEIG.

vicida R.-D. **rustica** MEIG.

valueris R.-D. **rustica** MEIG.?)

v. plebeja FALL. et *socialis* MEIG., apud B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXIII, 403, (1894), in hoc genere locatae, mihi ignotae; prima in gen. *Demoliceus* quaerenda.

C. *Microtachina*

Mik. Wien. entom. Zeitg., XI, 116, 1, (1892).

Aeromera Loew, Atti Istit. ven., (3), IX, 1350, (1861).

Guercinia R.-D., Myod., 196, III, (1830).

Himera R.-D., Posth., I, 1124, II, (1863).

Staegetia R.-D., Posth., I, 972, II, (1863) *acc* Rond., 1856, Dipt.

aestivalis R.-D. **erucarum** Rond.

angusta Macq. **erucarum** Rond.

angustifasciata Macq. **erucarum** Rond.

apicata R.-D. **erucarum** Rond.

ardelio R.-D. **erucarum** Rond.

atrata R.-D. **erucarum** Rond.

boscorum R.-D. **erucarum** Rond.

camporum R.-D. **erucarum** Rond.

canescens R.-D. **erucarum** Rond.

celer Macq. **erucarum** Rond.

celer Macq. (*bis*) **erucarum** Rond.

chrysellæ R.-D. **erucarum** Rond.

cineca R.-D. **erucarum** Rond.

clausa Macq. **erucarum** Rond.

cyana R.-D. **erucarum** Rond.

elongata R.-D. **erucarum** Rond.

erucarum Rond., i. Dipt. ital. Prodr., III, 201, 6, (1859); SCHN., F. Europæentr. A., I, 174, (1862); MEYER, Entom. Monthly Mag., (2), III, 37, et mer. (1892); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII, 91, (1893); Mik et WACHL, Wien. entom. Zeitg., XIV, 248, 30, (1895).

aestivalis R.-D., Posth., I, 978, 11, [*Staegetia*] (1863).

angusta Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 381, 14, t. XIII, f. 2, (1854).

angustifasciata Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 380, 12, t. XIII, f. 2, (1854).

apicata R.-D., Posth., I, 1125, 3, [*Himera*] (1863).

ardelio R.-D., Posth., I, 981, 17, [*Staegetia*] (1863).

atrata R.-D., Posth., I, 983, 21, [*Staegetia*] (1863).

boscorum R.-D., Posth., I, 974, 3, [*Staegetia*] (1863).

camporum R.-D., Posth., I, 974, 4, [*Staegetia*] (1863).

canescens R.-D., Posth., I, 981, 16, [*Staegetia*] (1863).

celer R.-D., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 380, 11, t. XIII, f. 8, (1854).

celer Macq. (*bis*), Annal. Soc. ent. m. France, (3), II, 385, 22, t. XIII, f. 8, (1854).

chrysellæ R.-D., Posth., I, 973, 2, [*Staegetia*] (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 125, (1891).

*) *Zygaena* sp. — *Cladius comari* STEN.

- cinerea* R.-D., Posth., I, 980, 14. [*Stacyeria*] (1863).
- clausa* Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 266, 28, (1834) et Suit. à Buff., II, 144, 20, (1835); Loey, Atti Istit. ven., (3), IX, 1350. [*Aeromera*] (1864); SREIN, Entom. Nachricht., XXVI, 133, (1900).
- egea* R.-D., Posth., I, 976, 7. [*Stacyeria*] (1863).
- elongata* R.-D., Posth., I, 975, 6. [*Stacyeria*] (1863).
- faciata* R.-D., Posth., I, 984, 22. [*Stacyeria*] (1863).
- festiva* R.-D., Myod., 196, 1. [*Guerinia*] (1830) et Posth., I, 1122, 1. [*Guerinia*] (1863).
- flavicalypteralis* Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 382, 15, t. XIII, f. 2, (1854).
- flavida* R.-D., Posth., I, 977, 10. [*Stacyeria*] (1863).
- floralis* R.-D., Posth., I, 977, 9. [*Stacyeria*] (1863).
- gagata* R.-D., Myod., 198, 6. [*Guerinia*] (1830) et Posth., I, 1124, 4. [*Guerinia*] (1863); Macq., Suit. à Buff., II, 147, 31, (1835).
- grisea* R.-D., Posth., I, 1123, 2. [*Guerinia*] (1863).
- lateralis* R.-D., Posth., I, 972, 1. [*Stacyeria*] (1863).
- luteifrons* RATZEB. in litt.
- Meigenii* R.-D., Posth., I, 1126, 4. [*Himera*] (1863).
- micans* R.-D., Posth., I, 1123, 3. [*Guerinia*] (1863).
- minuta* MEG., S. B., IV, 307, 117, (1824) et VII, 190, 10, (1838); SCHN., F. A., I, 473, (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 191, 65 et 222, (1893).
- musca* R.-D., Myod., 197, 2. [*Guerinia*] (1830).
- muscivora* R.-D., Posth., I, 975, 5. [*Stacyeria*] (1863).
- nana* R.-D., Myod., 197, 5. [*Guerinia*] (1830) et Posth., I, 1125, 2. [*Himera*] (1863); Macq., Suit. à Buff., II, 147, 30, (1835).
- ovata* R.-D., Posth., I, 983, 20. [*Stacyeria*] (1863).
- occlusa* R.-D., Posth., I, 982, 18. [*Stacyeria*] (1863).
- pallipalpis* Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 259, 8, (1834) et Suit. à Buff., II, 146, 29, (1835).
- pratensis* R.-D., Myod., 194, 26, (1830) et Posth., I, 979, 13. [*Stacyeria*] (1863).
- pusilla* Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 391, 35, t. XIII, f. 20, (1854).
- pygmaea* Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 259, 9, (1834).
- rusticana* R.-D., Posth., I, 982, 19. [*Stacyeria*] (1863).
- schistella* R.-D., Posth., I, 978, 12. [*Stacyeria*] (1863).
- scutellaris* R.-D., Posth., I, 1125, 1. [*Himera*] (1863).
- serena* R.-D., Posth., I, 977, 8. [*Stacyeria*] (1863).
- villana* R.-D., Posth., I, 980, 15. [*Stacyeria*] (1863).
- vivax* R.-D., Myod., 197, 3. [*Guerinia*] (1830).
- Wiedemii* R.-D., Myod., 197, 4. [*Guerinia*] (1830).
- faciata* R.-D. **erucarum** ROXB.
- festiva* R.-D. **erucarum** ROXB.

- flavicalypteralata* Macq. **erucarum** Rond.
flavida R.-D. **erucarum** Rond.
floralis R.-D. **erucarum** Rond.
gagatea R.-D. **erucarum** Rond.
grisea R.-D. **erucarum** Rond.
lateralis R.-D. **erucarum** Rond.
Meigenii R.-D. **erucarum** Rond.
micans R.-D. **erucarum** Rond.
minuta Meig. ?**erucarum** Rond.
musca R.-D. **erucarum** Rond.
muscida R.-D. **erucarum** Rond.
nana R.-D. **erucarum** Rond.
nigrita R.-D. **erucarum** Rond.
nympharum Rond., Dipt. ital. Prodr., III, 292, 8, (1859); Strobl, Europacentr. Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 28, (1894). et mer.
occlusa R.-D. **erucarum** Rond.
pullipalpis Macq. **erucarum** Rond.
pratensis R.-D. **erucarum** Rond.
pusilla Macq. **erucarum** Rond.
pygmaea Macq. **erucarum** Rond.
rusticana R.-D. **erucarum** Rond.
schistella R.-D. **erucarum** Rond.
scutellaris R.-D. **erucarum** Rond.
serena R.-D. **erucarum** Rond.
villana R.-D. **erucarum** Rond.
vivax R.-D. **erucarum** Rond.
Wiedemii R. D. **erucarum** Rond.

D. *Philolachina*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 350, (1891) et LX, 123, (1893).

- civilis** Rond., Dipt. ital. Prodr., III, 199, 4, (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 212, (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 350, (1891); PAND., p. p., Rev. entom., XV, 63, 21, (1896); VILLAN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 101, (1900). Europacentr. et mer.

Species dubiae vel incerti generis.

Leptostyla Loey, Atti Istit. ven., 65, IX, 1350, (1864).

- accidens** WALK., Ins. Brit., II, 89, 160, (1853). Anglia.
Admete WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 743, (1849). Anglia.
agnita Meig., S. B., VII, 200, 73, (1838). Germania.
albiceps Macq., Annal. Soc. entom. France, 65, II, 387, 27, t. XIII, t. B, (1854). Gallia.
Amasia Meig., S. B., VII, 194, 31, (1838); SCHN., F. A., I, 179, (1862). Europacentr.
Ambivius WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 751, (1849). Anglia.

- Amphiro** WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 749, (1849). Anglia.
- apicalis** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 403, 8, t. XIV, Europe-centr.
f. 8. [*Oodigaster*] (1854); SCHN., F. A., I, 480, (1862).
- arcuata** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 274, 21, (1834) et Annal. Soc. Gallia,
entom. France, (3), II, 390, 32, t. XIII, f. 18, (1854).
- augens** WALK., Ins. Brit., II, 73, 124, (1853). Anglia.
- bilineata** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 396, 44, t. XIII, Gallia,
f. 27, (1854).
- bipartita** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 267, 29, (1834). Gallia.
- brevicornis** MACQ., Hist. nat. Cam. Webb, Ent., I, 112, 61, (1838) et Ins. Camar.
Dipt. exot., III, 219, (62), I, (1843).
- Broteus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 763, (1849). Anglia.
- brunnipalpis** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 263, 18, (1834). Gallia.
- caeruleifrons** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 392, 38, Gallia,
t. XIII, f. 22, (1854).
- caesifrons** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 404, 9, t. XIV, Gallia,
f. 3. [*Oodigaster*] (1854).
- Cerceis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 747, (1849). Anglia.
- certans** WALK., Ins. Brit., II, 74, 125, (1853). Anglia.
- cingulata** ZETT., Dipt. Scand., III, 1174, 177, (1844). Scandinavia.
- Clymene** WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 784, (1849). Anglia.
- collecta** WALK., Ins. Brit., II, 298, (1853). Anglia.
neglecta WALK. (*bis*), Ins. Brit., II, 79, 138, (1853).
- comitata** WALK., Ins. Brit., II, 55, 83, (1853). Anglia.
- comosa** WALK., Ins. Brit., II, 75, 128, (1853). Anglia.
- computa** WALK., Ins. Brit., II, 64, 103, (1853). Anglia.
- confecta** WALK., Ins. Brit., II, 298, (1853). Anglia.
defecta WALK. (*bis*), Ins. Brit., II, 46, 61, (1853).
- constans** WALK., Ins. Brit., II, 75, 129, (1853). Anglia.
- contempta** WALK., Ins. Brit., II, 77, 133, (1853). Anglia.
- Crisia** WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 738, (1849). Anglia.
- cuneicornis** ZETT., Dipt. Scand., III, 1080, 77, (1844); BONSO., Finl. Scandinavia,
Insekt., II, 68, 52, (1866).
- cyrtoneurina** ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6135, 177-78, (1859). Scandinavia.
- defecta** WALK., Ins. Brit., II, 27, 18, (1853). Anglia.
defecta WALK. (*bis*) — **confecta** WALK.
- delitescens** WALK., Ins. Brit., II, 73, 123, (1853). Anglia.
- demissa** WALK., Ins. Brit., II, 78, 135, (1853). Anglia.
- demota** WALK., Ins. Brit., II, 61, 96, (1853). Anglia.
- denotans** WALK., Ins. Brit., II, 77, 132, (1853). Anglia.
- Dinieie** WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 771, (1849). Anglia.
- dispuncta** WALK., Ins. Brit., II, 57, 87, (1853). Anglia.
- distantipennis** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 401, 4, t. Gallia,
XIV, f. 2. [*Oodigaster*] (1854).
- distenta** WALK., Ins. Brit., II, 55, 82, (1853). Anglia.
- distermina** WALK., Ins. Brit., II, 61, 95, (1853). Anglia.
- divulsa** WALK., Ins. Brit., II, 45, 59, (1853). Anglia.

- domator** WALK., *Ins. Brit.*, II, 62, 97, (1853). Anglia.
- Doryeus** WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, IV, 765, (1849). Germania.
- effecta** WALK., *Ins. Brit.*, II, 51, 74, (1853). Anglia.
- emissa** WALK., *Ins. Brit.*, II, 49, 68, (1853). Anglia.
- enodata** WALK., *Ins. Brit.*, II, 57, 86, (1853). Anglia.
- enotata** WALK., *Ins. Brit.*, II, 48, 67, (1853). Anglia.
- erecta** WALK., *Ins. Brit.*, II, 76, 131, (1853). Anglia.
- erogata** WALK., *Ins. Brit.*, II, 54, 79, (1853). Anglia.
- evidens** WALK., *Ins. Brit.*, II, 42, 54, (1853). Anglia.
- evoluta** WALK., *Ins. Brit.*, II, 40, 48, (1853). Anglia.
- exagens** WALK., *Ins. Brit.*, II, 60, 93, (1853). Anglia.
- excensa** WALK., *Ins. Brit.*, II, 66, 108, (1853). Anglia.
- excessa** WALK., *Ins. Brit.*, II, 65, 105, (1853). Anglia.
- exclusa** WALK., *Ins. Brit.*, II, 298, (1853). Anglia.
- interclusa* WALK. (*bis*), *Ins. Brit.*, II, 48, 66, (1853).
- exilistyla** MACQ., *Suit. à Buff.*, II, 144, 21, (1835); *Loov. Att. Inst.*, Gallia,
vol., (3), IX, 1350, [*Leptostyla*] (1864).
- expetita** WALK., *Ins. Brit.*, II, 33, 38, (1853). Anglia.
- expedita* SCHN., *F. A.*, I, 481, (1832).
- expleta** WALK., *Ins. Brit.*, II, 55, 81, (1853). Anglia.
- fasciata** MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (3), II, 497, 15, t. XIII, Gallia,
t. 20, [*Oodigaster*] (1854).
- fissa** WALK., *Ins. Brit.*, II, 51, 72, (1853). Anglia.
- flexa** WALK., *Ins. Brit.*, II, 78, 89, (1853). Anglia.
- futilis** ZETT., *Dipt. Scand.*, III, 1036, 26, (1844), VIII, 3229, 23, (1849) Europ. sept.
et XIII, 6080, 26, (1859); *Bonsd., Fund. Insc.*, II, 54, 22, (1866).
- Gimmerthali** FISCH. ap. GERM., *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, VII, Rossia,
104, (1834).
- gracilistylum** MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (3), II, 396, 45, t. Europa-centr.,
XIII, t. 28, (1854).
- Hartigii** RATZEB., *Fopstids.*, III, (1844). Germania.
- hirta** MACQ., *Soc. Sci. Lille*, 1833, 265, 24, (1834). Gallia.
- incisa** MACQ., *Soc. Sci. Lille*, 1833, 263, 19, (1834). Gallia.
- infensans** WALK., *Ins. Brit.*, II, 88, 157, (1853). Anglia.
- infestans** WALK., *Ins. Brit.*, II, 91, 163, (1853). Anglia.
- infixa** WALK., *Ins. Brit.*, II, 70, 116, (1853). Anglia.
- inflexicornis** MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (3), II, 397, 46, t. Gallia,
XIII, t. 29, (1854).
- inoperta** WALK., *Ins. Brit.*, II, 86, 152, (1853). Anglia.
- inquilina** WALK., *Ins. Brit.*, II, 87, 151, (1853). Anglia.
- insedata** WALK., *Ins. Brit.*, II, 87, 155, (1853). Anglia.
- intacta** WALK., *Ins. Brit.*, II, 43, 55, (1853). Anglia.
- intaminata** WALK., *Ins. Brit.*, II, 48, 65, (1853). Anglia.
- intereedens** WALK., *Ins. Brit.*, II, 31, 28, (1853). Anglia.

- interclusa* WALK., Ins. Brit., II, 32, 30, (1853). Anglia.
interclusa WALK. (*bis*) — *exclusa* WALK.
interlatens WALK., Ins. Brit., II, 35, 37, (1853). Anglia.
invaria WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 780, (1849). Gallia.
involuta WALK., Ins. Brit., II, 53, 78, (1853). Anglia.
Ipthime WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 781, (1849). Gallia.
larvincola RATZEB.^{*)}, Forstins., III, (1844). Germania.
levicula MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 386, 25, 1, XIII, f. 12, (1854). Gallia.
Lindemanni GEMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII, 402, (1834). Rossia.
ludio ZETT., Dipt. Scand., VIII, 323f. 51, 52, (1848). Scandinavia.
marginella WIED., Ausser, zweifl. Ins., II, 330, 80, (1850). Nubia.
Medoacus WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 746, (1849). Anglia.
Megaleas WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 739, (1849). Anglia.
Menapis WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 769, (1849). Scandinavia.
Menestho WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 783, (1849). Anglia.
mera WALK., Ins. Brit., II, 65, 106, (1853). Anglia.
micans MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 403, 7, 1, XIV, f. 7, (1854). Gallia.
monacha RATZEB.^{*)}, Forstins., III, (1844). Germania.
motor WALK., Ins. Brit., II, 71, 118, (1853). Anglia.
multans WALK., Ins. Brit., II, 82, 143, (1853). Anglia.
munita WALK., Ins. B. G., II, 82, 145, (1853). Anglia.
nana WALK., Ins. Brit., II, 39, 46, (1853). Anglia.
neglecta WALK. (*bis*) — *collecta* WALK.
neustriæ RATZEB.^{*)}, Forstins., III, (1844). Germania.
nexa WALK., Ins. Brit., II, 63, 101, (1853). Anglia.
nigrisquama ZETT., Ins. Lapp., 63, 24, (1838) et Dipt. Scand., III, 106f. 62, (1844). Scandinavia.
nitidiventris MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 384, 13, 1, XIII, f. 10, (1854). Gallia.
nitidiventris ZETT. (*nee* MACQ.), Dipt. Scand., XIII, 607f. 2 — 3, (1859). Scandinavia.
notata WIED., Ausser, zweifl. Ins., II, 653, 8, (1830). Nubia.
Nymphidius WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 751, (1849). Anglia.
objecta WALK., Ins. Brit., II, 78, 134, (1853). Anglia.
oblonga MACQ., Suit. à Buff., II, 146, 28, (1835); Mem., S. B., VII, 199, 63, (1838). Gallia.
obsidiana WIED., Ausser, zweifl. Ins., II, 341, 112, (1830). Nubia.
Olizon WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 753, (1849). Anglia.
Opiter WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 776, (1849). Gallia.
pagana MEIG., S. B., VII, 196, 44, (1838); SCHN., F. A., I, 479, (1862). Europacentr.

*) *Lymantria dispar* L.

**) *Lymantria dispar* L.

**) *Malacosoma neustria* L.

- pallidipalpis** MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (3), II, 411, 21, 1. Gallia.
XIII. f. 2. [*Oodigaster*] (1854).
- Pamesos** WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, IV, 744. (1849). Anglia.
- parasita** MEIG., S. B., VI, 370, 319. (1830) et VII, 190, 13. (1838): Europa-centr.
SCHN., F. A., I, 479. (1862).
- particeps** WALK., *Ins. Brit.*, II, 41, 49. (1853). Anglia.
- pavida** ILLIG., *Rossi Fauna etc.*, II, 465. (1807). Europa-centr.
- perpingens** WALK., *Ins. Brit.*, II, 67, 110. (1853). Anglia.
- pertinens** WALK., *Ins. Brit.*, II, 43, 56. (1853). Anglia.
- pertracta** WALK., *Ins. Brit.*, II, 49, 60. (1853). Anglia.
- petiolinervis** ZETT., *Dipt. Scand.*, XIII, 6126, 142—43. (1859) Scandinavia.
- Philonis** WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, IV, 751. (1849). Anglia.
- piniperdae** RATZEB.*, *Fopstins.*, III, 174, t. X, f. 7. [*Tachina*] (1844). Germania.
- Pitho** WALK., *List Dipt. Brit. Mus.*, IV, 740. (1849). Anglia.
- pubicornis** ZETT., *Ins. Lapp.*, 639, 23. (1838) et *Dipt. Scand.*, III, 1172, 174. (1844). Scandinavia.
- pusilla** MACQ., *Soc. Sci. Lille*, 1833, 265, 25. (1834). Gallia.
- pyrrhocera** WIED., *Ausser. zweifl. Ins.*, II, 311, 60. (1830). Nubia.
- quadricincta** WALK., *Ins. Brit.*, II, 84, 148. (1853). Anglia.
- quadrinotata** MEIG., S. B., IV, 279, 69. (1824). Germania.
quadrinota SCHN., F. A., I, 480. (1862).
- reclusa** WALK., *Ins. Brit.*, II, 32, 29. (1853). Anglia.
- refecta** WALK., *Ins. Brit.*, II, 50, 71. (1853). Anglia.
- reformata** WALK., *Ins. Brit.*, II, 63, 99. (1853). Anglia.
- rejecta** WALK., *Ins. Brit.*, II, 79, 137. (1853). Anglia.
- reventa** WALK., *Ins. Brit.*, II, 70, 117. (1853). Anglia.
- rubriscutellata** MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (3), II, 410, 20.
t. XIII. f. 29. [*Oodigaster*] (1854). Gallia.
- sannio** ZETT., *Dipt. Scand.*, III, 1020, 9. (1844); *Boxsd., Finnl. Insekt.*, II, 48, 7. (1866). Europa sept.
- senta** WALK., *Ins. Brit.*, II, 68, 113. (1853). Anglia.
- semizonata** ZETT., *Dipt. Scand.*, VIII, 3235, 63—64. (1848). Scandinavia.
- separata** WALK., *Ins. Brit.*, II, 67, 111. (1853). Anglia.
- socia** WIED., *Ausser. zweifl. Ins.*, II, 654, 9. (1830). Nubia.
- spathulaecornis** ZETT., *Dipt. Scand.*, III, 1065, 59. (1844). Scandinavia.
spathulaeformis ZETT., *Ins. Lapp.*, 637, 14. (1838).
- spathulaeformis* ZETT. **spathulaecornis** ZETT.
- speculatrix** MEIG., S. B., VII, 196, 43. (1838). Germania.
- stabulans** WALK. (*over* MEIG.), *Ins. Brit.*, II, 28, 20. (1853). Anglia.
- stachiptera** MACQ., *Soc. Sci. Lille*, 1833, 264, 20. (1834). Gallia.
- subfasciata** MEIG., S. B., VII, 195, 35. (1838); SCHN., F. A., I, 478. Europa-centr.
(1862).
- taenionota** MEIG., S. B., VI, 370, 320. (1830) et VII, 190, 24. (1838). Europa-centr.
taeniota SCHN., F. A., I, 479. (1862).
- taeniota* SCHN. **taenionota** MEIG.

*) *Panolis griseovariegata* GOEZE.

- Telestho** WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 747, (1849). Anglia.
tenax MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 410, 19, t. XIV, f. Gallia.
 12. [*Oodigaster*] (1854).
testaceolateralis MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 395, 42, Gallia.
 t. XIII, f. 25, (1854).
Titormus WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 755, (1849). Anglia.
torta WALK., Ins. Brit., II, 64, 104, (1853). Anglia.
trina WIED., Ausser, zweif. Ins., II, 313, 58, (1830). Nubia.
Tyche WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 738, (1849). Anglia.
unicingulata BOSSD., Fintl. Ins., II, 88, 93, (1866). Finlandia.
vallata MEG., S. B., VII, 197, 45, (1838). Germania.
velox MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 382, 17, t. XIII, f. Gallia.
 9, (1854).
vicina ZERR., Dipt. Scand., VIII, 3224, 52—53, (1818). Scandinavia.
vilis ZERR., Dipt. Scand., III, 1032, 22, (1844); BOSSD., Fintl. Insekt., Europa sept.
 II, 53, 18, (1866).
villicornis ZERR., Dipt. Scand., VIII, 3249, 174—75, (1848). Scandinavia.
virginea MEG., S. B., VII, 199, 64, (1838). Germania.
vivida MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 384, 21, t. XIII, f. Gallia.
 8, (1854).
xanthaspis WIED., Ausser, zweif. Ins., II, 314, 59, (1830). Nubia.

Tricholyga

ROD., Dipt. ital. Prodr., I, 68, 29, (1856) et II, 184, 29, [*Thrycolyga*] (1859) *nee!* Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 208, (1865) et XI, 583, (1868), *em.* VERR., ap. SCDD, 1882.

Scolia R.-D., Posth., I, 255, IV, (1863), *nee* HEBB, 1816, LEP.

- ? **albiceps** MEG., S. B., IV, 334, 164, (1824) et VII, 261, 2, [*Phoro-* Germania.
cerat] (1838); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 403 et 422.
 [*Masicera*] (1891).
bombycis WULF. **bombyceum** BECH.
bombyceum BECH.?, Ind. Mus. Notes, I, 77, t. V, f. 1, (1889) et II, Japonia.
 164, (1893).
bombycis WULF., Entom. Tijdschr., 1893, LXI, (1893).
corsica B. B.?, Denkschr. Akad. Wien, LXI, 579, (1894). Corsica.
deligata PAYD., Rev. entom., XV, 6, 6, [*Erarista*] (1896). Gallia mer.
grandis ZERR.**, Dipt. Scand., III, 1088, 85, [*Tachina*] (1844); Europa.
 BOSSD., Fintl. Insekt., II, 71, 56, [*Tachina*] (1866); STREX., Entom. Transcaaspiä.
 Nachricht., XIV, 361, (1888); v. RÖB., Wien. entom. Zeitg., VIII,

*) *Attaeus lunula* F., *Sericaria mori* L.

**) *Lophyrus* sp.

***) *Arctia caja* L., *Mamestra oleacea* L., *pisi* L., *Saturnia pavonia* L., *pyri* SCHEFF., *spini* SCHEFF., *Sphinx ligustri* L., *Thaume- topoea pityocampa* SCHEFF., *Vanessa io* L.

231. (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 49. [*Erorista*] (1892).

lasiommata Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870, 58, 81. [*Tachina*] (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II, 309, 468. [*Tachina*] (1871); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 431. (1891); STROBL, Wiss. Mittheil. Bosn. Herzeg., VII, 600. (1900).

major ROHD., Dipt. ital. Prodr., III, 185, 1. (1859); WACUTL, Wien. entom. Zeitg., I, 279, 41. (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. IV, f. 66. (1899); PAND., Rev. entom., 6, 5. [*Erorista*] (1896); VILLEN., Wien. entom. Zeitg., XXV, 43. (1906).

paroniae ZETT., Dipt. Scand., III, 1091, 88. (1846) et XIII, 6095, 88. [*Tachina*] (1859); v. RÖD., Wien. entom. Zeitg., VII, 95. III. [*Erorista*] (1888).

placida R.-D., Posth., I, 255, 1. [*Scolia*] (1863).

saturnae R.-D., Posth., I, 256, 2. [*Scolia*] (1863).

lasiommata Lw. **grandis** ZETT.*)

major ROHD. = **grandis** ZETT.

minima ROHD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 209. (1865).

minor ROHD., Dipt. ital. Prodr., III, 186, 2. (1859).

nova ROHD., Dipt. ital. Prodr., III, 187, 3. (1859).

obumbrata PAND., Rev. entom., XV, 7, 7. [*Erorista*] (1896).

paroniae ZETT. **grandis** ZETT.

placida R.-D. **grandis** ZETT.

saturnae R.-D. **grandis** ZETT.

Italia.

Italia.

Italia.

Gallia mer.

Stomatomyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 99. (1889) et LX, 124. (1893).

acuminata ROHD., Dipt. ital. Prodr., III, 180, 5. [*Chetogena*] (1859); EUROPA-CENTR. JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff, 1883, 316, 36. [*Phorocera*] et MER. (1883); PAND., Rev. entom., XIV, 344, 21. [*Zenillia*] (1895).

filipalpis ROHD.**), Dipt. ital. Prodr., III, 179, 4. [*Chetogena*] (1859); EUROPA-CENTR. SCHN., F. A., I, 490. [*Phorocera*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. et MER. Wien, LVI, t. IV, f. 68. (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 210. [*Phorocera*] (1892); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII, 91. (1893); PAND., Rev. entom., XIV, 344, 20. [*Zenillia*] (1895); CHAPM., Entom. Monthly Mag., (2), XIII, 111. (1902).

media ROHD., Dipt. ital. Prodr., III, 181, 6. [*Chetogena*] (1859). Italia.

*) *insiqua* MEIG. sp. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 443. (1891) est specie signota, postea tuncquam Cap. b. spei incola declarata.

**) *Oreopsyche atra* L., *Pachytelia unicolor* HUG.

Rhinometopia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 124 et 207. (1893).

paradoxa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 208. (1893).

Rossia mer.

Perichaeta

ROSD., Dipt. ital. Prodr., III, 152. (1859).

Polychaeta ROSD., Dipt. ital. Prodr., I, 67. [*Policheta*] (1859)

nee MACQ. 1850. Dipt.

fuehris ZETT. **unicolor** FALL.

inaequalis ROSD. **unicolor** FALL.

unicolor FALL.*), Dipt. succ. Musc., 35, 73. [*Tachina*] (1820); MEG., Europa.

S. B., IV, 398, 277. [*Tachina*] (1824) et VII, 261, 19. [*Phorocera*]

(1838); ZETT., Ins. Lapp., 647, 54. [*Tachina*] (1838) et Dipt.

Scand., III, 1166, 169. [*Tachina*] (1844); MACQ., Annal. Soc.

entom. France, (2), VIII, 432, 19, t. XII, f. 8. [*Phorocera*] (1850);

ROSD., Dipt. ital. Prodr., III, 153, 1. (1859); SCHN., F. A., I,

493. [*Phorocera*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t.

IV, f. 70. (1889) et LVIII, 352. (1891); MEADE, Entom. Monthly

Mag., (2), III, 211. [*Phorocera*] (1892); PARD., Rev. entom., XIV,

333, 5. [*Phorocera*] (1895).

fuehris ZETT., Ins. Lapp., 647, 58. [*Tachina*] (1838).

inaequalis ROSD., Dipt. ital. Prodr., I, 67. [*Polychaeta*] (1856).

Monochaeta

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 131. (1889) et LX, 127. (1893).

albicans FALL., Vet. Akad. Handl., XXXI, 270. [*Tachina*] (1810) et Europa.

Dipt. succ. Musc., 35, 74. [*Tachina*] (1820); MEG., S. B., IV,

415, 306. [*Tachina*] (1824) et VII, 256, 37. [*Erorista*] (1838);

ZETT., Dipt. Scand., III, 1134, 132. (1844) et XIII, 6120, 132.

[*Tachina*] (1859); WALK., Ins. Brit., II, 91, 164. [*Tachina*] (1853);

SCHN., F. A., I, 467. [*Erorista*] (1862); MEADE, Entom. Monthly

Mag., (2), III, 17. [*Erorista*] (1892); B. B., Denkschr. Akad.

Wien, LX, 219. (1893).

leucophaca MEG., S. B., IV, 414, 304. [*Tachina*] (1824) et VII,

256, 35. [*Erorista*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III, 1191,

obs. [*Tachina*] (1844); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2),

VII, 393, 57, t. XI, f. 22. [*Erorista*] (1849); B. B., Denkschr.

Akad. Wien, LVI, t. IX, f. 225. (1889); MEADE, Entom.

Monthly Mag., (2), III, 17. [*Erorista*] (1892); VILLES., Bull.

Soc. entom. France, 1900, 158, 4. (1900).

*) *Nematus septentrionalis* L.

perlaeans ZETT., Dipt. Scand., III, 1135, 133. [*Tachina*] (1814);
SCHIX., F. A., I, 468. [*Exorista*] (1862); MEADE, Entom.
Monthly Mag., (2), III, 17. [*Exorista*] (1892).
schistacea MEIG., S. B., IV, 414, 305. [*Tachina*] (1814).

Unicophava MEIG. = **albicans** FALL.

perlbans ZETT. = **albicans** FALL.

schistacea MEIG. = **albicans** FALL.

Pseudopachystylum

Mik, Wien, entom. Zeitg., X, 208, (1891).

angulatum B. B. = **goniaeoides** ZETT.

Bremii SCHIX. = **goniaeoides** ZETT.

goniaeoides ZETT.*), Ins. Lapp., 639, 22. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Europa.
Scand., III, 1966, 60. [*Tachina*] (1844); B. B., Denkschr. Akad.
Wien, LX, 221, (1893).

angulatum B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 101, t. IV, f.
79. [*Pachystylum*] (1889).

Bremii SCHIX. (nec MACQ.), F. A., I, 440. [*Pachystylum*] (1862);
WACHTL, Arb. ent. Lab. Forstl. Ver. Wien, 1878, 11. [*Pachy-*
stylum] (1878); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 126.
(1893).

stricticeps PAND., Rev. entom., XV, 99, 1. [*Pelcina*] (1896).

Wachtlü Mik, Wien, entom. Zeitg., X, 208, (1891).

stricticeps PAND. = **goniaeoides** ZETT.

Wachtlü Mik = **goniaeoides** ZETT.

Archiclops

Bischof, Akad. Anz. Wien, 1900, XII, (1900) et Sitzgsber. Akad. Wiss. Wien, CIX,
496, (1900).

carthaginiensis Bischof, Akad. Anz. Wien, 1900, XII, (1900) et Algeria.
Sitzgsber. Akad. Wien, CIX, 497, f. 5, (1900).

Brachychaeta

ROND., Dipt. ital. Prodr., IV, 36, 43, d. [*Brachicheta*] (1861).

Descroidya MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 179. [*Des-*
roidia] (1892).

fusca MEADE = **spinigera** ROND.

spinigera ROND., Dipt. ital. Prodr., IV, 38, f. (1861); JAROSCH., Europacentr.
et mer.

*) Teste DRE, *Villeneuve*, species haec *T. illustris* MEIG. est.

— Pamphilus vafer L.

Trudy naturf. Gos. Karkoff, 1883. 317. 39. (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 1. V. f. 107. (1889).

fusca MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III. 179. [*Desroidya*] (1892); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 189. 49. (1893); VERR., List Brit. Dipt., 2 ed., 24. (1901).

?*strigata* MEIG., S. B., IV. 375. 235. [*Tachina*] (1824) et VII. 249. 6. [*Degeeria*] (1838); MACQ., Annal. Soc.⁶ entom. France, (2), VIII. 445. 3. t. XIII. f. 11. [*Degeeria*] (1850); ROND., Dipt. ital. Prodr., IV. 43. 1. [*Degeeria*] (1861).

strigata MEIG. — ? **spinigera** ROND.

Baumhaueria

MEIG., S. B., VII. 251. 39. (1838).

Pachycephala LIQV., Atti Istit. ven., (3), IX. 1343. (1864) *nov*
SWAINS. AVES.

angusticornis RATZEB. **goniaeformis** MEIG.

cuculliae R.-D. **goniaeformis** MEIG.

goniaeformis MEIG. (*), S. B., IV. 416. 307. [*Tachina*] (1824) et VII. Europa.

251. 1. t. LXXI. f. 41 - 45. (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 118. 9. [*Eurygaster*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., III. 1051. (1844) et XII. 4692. 43 - 44. [*Tachina*] (1858); SCHN., F. A., I. 495. (1862); R.-D., Posth., I. 758. 3. (1863); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 219 et 220. (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 1. V. f. 105. (1889); MIK et WACHTL, Wien. entom. Zeitg., XIV. 241. (1895); PAND., Rev. entom., XV. 122. 5. [*Erynnia*] (1896).

angusticornis RATZEB., Forstins., III. 173. 12. [*Tachina*] (1844);

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 575. (1894).

cuculliae R.-D., Posth., I. 757. 1. (1863).

reclinervis R.-D., Posth., I. 759. 4. (1863).

saturniae R.-D., Posth., I. 757. 2. (1863).

reclinervis R.-D. — **goniaeformis** MEIG.

saturniae R.-D. — **goniaeformis** MEIG.

Histochaeta

ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 171. 27. C. [*Istocheta*] (1859) *em.* VERR. ap. SCDD., 1882.

Latvillia s. *str.* R.-D., Posth., I. 570. VIII. (1863).

Lespesia R.-D., Posth., I. 567. VII. (1863).

Thelymorpha B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 107. (1889)
et LX. 126. (1893).

*) *Cucullia scrophulariae* CAP., *Eriogaster lanestris* L., *Saturnia pyri* SCHFF.

albifrons R.-D. **marmorata** FABR.
aperta Egg. = **marmorata** FABR.
campestris R.-D. = **marmorata** FABR.
ciliata R.-D. **marmorata** FABR.
 cuculliae R.-D. = **marmorata** FABR.
frontalis SCHN. **marmorata** FABR.
frontosa RONN. = **marmorata** FABR.
hirsuta MACQ. = **marmorata** FABR.
hirta R.-D. = **marmorata** FABR.
imperatoriae MACQ. **marmorata** FABR.
lurricola R.-D. = **marmorata** FABR.
macrochaeta RONN. **marmorata** FABR.

marmorata FABR.*), Syst. Anth., 300, 84. [*Musca*] (1805); RONN., Europa,

Dipt. ital. Prodr., IV, 38, 3. [*Frontina*] (1861); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 178. [*Banahauceria*] (1892); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXIII, 74, 230. [*Frontina*] (1892); PAND., Rev. entom., XV, 112, 7. [*Latreillia*] (1896).

albifrons R.-D., Myod., 105, 4. [*Latreillia*] (1830) et Posth., I, 572, 2. [*Latreillia*] (1863).

aperta Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V, 11. [*Banahauceria*] (1855).

campestris R.-D., Myod., 105, 3. [*Latreillia*] (1830) et Posth., I, 572, 1. [*Latreillia*] (1863).

ciliata R.-D., Posth., I, 569, 1. [*Lespesia*] (1863).

cuculliae R.-D., Myod., 107, 8. [*Latreillia*] (1830) et Posth., I, 575, 6. [*Latreillia*] (1863); MACQ., Suit. à Buff., II, 124, 4. [*Melopia*] (1835).

frontalis SCHN., F. A., I, 495. [*Banahauceria*] (1862).

frontosa RONN., Dipt. ital. Prodr., III, 171, 1. (1859).

hirsuta MACQ., Suit. à Buff., II, 124, 2. [*Melopia*] (1835).

hirta R.-D., Myod., 106, 7. [*Latreillia*] (1830) et Posth., I, 574, 5. [*Latreillia*] (1863).

imperatoriae MACQ., Suit. à Buff., II, 123, 1. [*Melopia*] (1835); BLANCH., Hist. nat. Ins., III, 610. [*Melopia*] (1840).

lurricola R.-D., Myod., 166, 24. [*Phygae*] (1830).

macrochaeta RONN., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 211. (1865).

minor R.-D., Myod., 107, 10. [*Latreillia*] (1830) et Posth., I, 576, 8. [*Latreillia*] (1863).

rubetra R.-D., Posth., I, 574, 4. [*Latreillia*] (1863).

silvestris R.-D., Myod., 107, 9. [*Latreillia*] (1830) et Posth., I, 575, 7. [*Latreillia*] (1863).

veriginosa FALL., Dipt. succ. Musc., 12, 21. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV, 379, 212. [*Tachina*] (1824); MACQ., Soc.

*), *Aretia caja* L., *Quensellii* PAYK., *villiea* L., *Cucullia verbani* L., *Lymnautria dispar* L., *Malacosoma neu-tria* L., *Gonioctena rufipes* PAYK.

Sci. Lille, 1833, 287, 3. [*Masicera*] (1834) et Suit à Buff., H. 120, 3. [*Masicera*] (1835); HART., Jahresb. Forstchr. Forstwiss., I, 293, 31. [*Tachina*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III, 1050, 43. (1844) et XIII, 6083, 43. [*Tachina*] (1859); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V, 11. [*Baumhaueria*] (1855); SCHN., F. A., I, 495. [*Baumhaueria*] (1862); R.-D., Postl., I, 573, 3. [*Latrecillia*] (1863); WULF, Entom. Tijdschr., (2), IV, 153. [*Baumhaueria*] (1869); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I, 278, 28. [*Baumhaueria*] (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. V, f. 106. (1889) et LX, 193, 77. [*Thelymorpha*] (1893); MEIG et WACHTL, Wien. entom. Zeitg., XIV, 231, 15. [*Thelymorpha*] (1895); MEIG., Annal. Soc. scient. Bruxelles, XIX, 20, 2. [*Baumhaueria*] (1895); MELL., Zool. Jahrbüch., XV, 681. [*Baumhaueria*] (1900).

minor R.-D. — **marmorata** FABR.

rubetra R.-D. — **marmorata** FABR.

silvestris R.-D. — **marmorata** FABR.

verliginosa FALL. — **marmorata** FABR.

Uclesia

GIRSCHN., Wien. entom. Zeitg., XX, 69. (1901).

fumipennis GIRSCHN.*), Wien. entom. Zeitg., XX, 70, t. I, f. 1—3. Hispania. (1901).

Atractochaeta

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 100. (1889) et LX, 125 et 240. (1893).

graeca B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 100, t. IV, f. 73. (1889) Graecia. et LX, 240. (1893).

Germaria

R.-D., Myod., 83, I. (1830).

Illigera MEIG., S. B., VII, 247, 34. (1838) *nce* R.-D. 1830. Dipt.

angustata ZETT., Dipt. Scand., III, 1198, 7. (1844) et XII, 4703, 7. Europacentr. [*Gonia*] (1858). et sept.

latifrons R.-D. — **ruficeps** FALL.

ruficeps FALL., Dipt. succ. Musc., 4, 3. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., V, 5, 8. (1826), VI, 373. [*Gonia*] (1830) et VII, 247, t. t. LXXI, f. 16—20. [*Illigera*] (1838); CURR., Brit. Entom., 533. [*Gonia*] (1832); ZETT., Dipt. Scand., III, 1197, 6. [*Gonia*] (1844); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), III, 284, t. t. VI, f. 1.

*) *Chondrostega vandalicia* MILL.

[*Migera*] (1835); ROSS., Dipt. ital. Prodr., III, 28, 1. (1859); SCHN., F. A., 1, 441. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., II, 102, 6. [*Gonia*] (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. IV, f. 71. (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 125. (1891); COCCI, Bull. Soc. entom. ital., XXIX, 3, 30. (1896).

latifrons R.-D., Myod., 83, 1. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2), IX, 320, 1. (1851) et Posth., 1, 754, 1. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 311, 2. [*Thryptocera*] (1834) et Suit. à Buff., II, 88, 1. [*Thryptocera*] (1835); BLANCH., Hist. nat. Ins., III, 609. [*Gonia*] (1840).

sabulosa WFLR., Entom. Tijdschr., (2), IV, 146, t. IV, f. 6—9. (1869). Europacentr.
sorbillans Macq., Hist. nat. Can. Webb, Ent., 1, 110, 57. [*Thryptocera*] (1838) et Dipt. exot., III, 209, (52), 1, t. V, f. 6. [*Thryptocera*] (1853). V, gen. *Podolachina*, Ins. Canar.

Pachystylum

Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 132. (1848).

Chaetomera B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 99. (1889) et LX, 124—125. (1893).

albescens PASD. — **Bremii** Macq.

Bremii Macq.*), Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 133, 1, t. VI, f. 11. (1848); WACHTL., Arb. Labor. Wien, 1. (1878); MÜK., Wien. entom. Zeitg., X, 212. (1891) et XI, 245. (1892); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CI, (1892); HEND., Wien. entom. Zeitg., 145, 21. (1902). Europacentr. et mer.

albescens PASD., Rev. entom., XV, 86. (1896).

fimipennis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 165, t. IV, f. 72. [*Chaetomera*] (1889) et LX, 126. [*Chaetomera*] (1893).

? **fasciatum** PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI, 276. (1881); Rossia occid.
 MÜK., Wien. entom. Zeitg., X, 212. (1891).

fimipennis B. B. — **Bremii** Macq.

Barychaeta

Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI, 49, 1. (1906).

Pachychaeta PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI, 278.

[*Pachychaeta*] (1881), *see* Lw., 1845, Dipt.

Jaroschewskyi PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI, 278. (1881). Rossia mer.

*) Pamphilus valer L.

Gonia

MEIG., Hliger's Magaz., II, 280, (1803).

Isomera R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), IX, 315, II, (1851).

Pissemysia R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), IX, 318, IV, [*Pisomyia*] (1851).

Reaumaria R.-D., Myod., 79, III, (1830).

Redia R.-D., Myod., 74, I, [*Rhedia*] (1830).

Spallanzania R.-D., Myod., 78, II, (1830).

A. *Onychogonia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 100, (1889) et LX, 125, (1893).

Cervini BIG. — **flaviceps** ZETT.

corsica SCHN., ap. B. B.*), Denkschr. Akad. Wien, LXI, 565, (1891). Corsica.
flaviceps ZETT.**), Ins. Lapp., 632, 2, (1838) et Dipt. Scand., III, Europa sept.,
 1196, 5, (1844); SCHN., F. A., I, 443, (1862); BOSSD., Finnl. Alpes.
 Insekt., II, 101, 5, (1866); KOW., Wien. entom. Zeitg., VII, 3, 1,
 (1888); PAXD., Rev. entom., XV, 85, (1893); HEXD., Verh. zool-
 bot. Ges. Wien, LI, 210, 10, (1901).

Cervini BIG., Annal. Soc. entom. France, (6), I, 365, [*Germaria*]
 (1888); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 510, 119,
 (1897).

interrupta ROXD., Dipt. ital. Prodr., III, 32, 2, (1859) et Atti
 Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 196, (1865); KOW., Wien. entom.
 Zeitg., VII, 4, 2, (1888); PAXD., Rev. entom., XV, 85, (1896).

interrupta ROXD. — **flaviceps** ZETT.

B. *Gonia s. str.*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 100, (1889) et LX, 125, (1893).

albifrons WALK. — **capitata** DEG.

atra MEIG., S. B., V, 7, 12, (1826); MACQ., Suit. à Buff., 86, 7, (1835) Europacentr.
 et Annal. Soc. entom. France, (2), III, 280, 6, t. V, f. 12, (1855); et mer.
 R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), IX, 318, 1, [*Pissemysia*]
 (1851) et Posth., I, 751, 1, [*Pissemysia*] (1863); SCHN., F. A., I,
 441, (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg., VII, 4, 3, (1888); PAXD.,
 Rev. entom., XV, 84, 8, (1896).

bicincta MEIG., S. B., VII, 245, 15, (1838); MACQ., Annal. Soc.
 entom. France, (2), III, 281, 9, t. V, f. 16, (1855); ROXD.,
 Dipt. ital. Prodr., III, 32, 1, (1859); R.-D., Posth., I, 740, 10,
 * [*Reaumaria*] (1863).

*) *Orgyia Trigotephras* B. var. *corsica* B.

**) *Aretia cervini* FALL., *Mamestra glauca* HB.

- fascipennis* R.-D., Posth., I, 742, 13. [*Reaumaria*] (1863).
- vicina* R.-D., Myod., 76, 3. [*Relia*] (1830) et Posth., I, 552, 2. [*Pissungia*] (1863): Macq., Suit. à Buff., II, 86, 8. (1834); Meig., S. B., VII, 246, 18. (1838).
- auriceps** Meig., S. B., V, 5, 7. (1826); Kow., Wien. entom. Zeitg., Germania, VII, 13, 3. (1888).
- bicipeta* Meig., **atra** Meig.
- Blondeli* R.-D., **fasciata** Meig.
- bombylans* R.-D., - **capitata** Deo.
- capitata** Deo^{*)}, Mem. ins., VI, 23, 2, 1. I, 3. [*Musca*] (1766) et ed. Götze, VI, 12, 2. [*Musca*] (1782); Vial., Entom. Linn., III, 524, 293. [*Musca*] (1783); Fall., p. p., Dipt. suer. Musc., II, 18. [*Tachina*] (1820); Meig., S. B., V, 3, 1. (1826); Cur., Brit. entom., 533, 1. (1834); Zett., Ins. Lapp., 632, 1. (1835) et Dipt. Scand., III, 1192, 1. (1844); Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV, 797. (1849); Ross., Dipt. ital. Prodr., III, 37, 7. (1859) et N. Annul. Sci. Bologna, (3), II, 171, 7. (1860); Bossu., Finl. Insekt., II, 100, 1. (1866); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII, 10, 11. (1888); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 1. IV, 1. 75. (1889); Meade. Entom. Monthly Mag., (2), II, 93. (1891); Coquil., Rev. Tachin. N. A., 133. (1897).
- albifrons* Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV, 793. (1849).
- bombylans* R.-D., Myod., 76, 5. [*Relia*] (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 315. (179), 2. (1824) et Suit. à Buff., II, 85, 2. (1835); Meig., S. B., VII, 245, 10. (1838); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII, 14, 6. (1888).
- evul* Will., Can. Entom., XIX, 11. (1887).
- frontosa* Say, Journ. Acad. N. Sci. Philad., VI, 175. (1829) et Compl. Writ., II, 375. (1859).
- lurida* Rossi (*var* Fall.), Fauna cfr., II, 303, 1198. [*Musca*] (1790); Illig., Rossi Fauna cfr., II, 464, 1198. [*Musca*] (1807).
- ?*microceps* Motsch., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXXII, (2), 501. (1859).
- philadelphica* Macq., Dipt. exot., II, 3, 208. (51). (1842).
- sequax* Will., Can. Entom., XIX, 12. (1887).
- trifaria* Zell., Isis, 1842, 841, 1. (1842); Schus., F. A., I, 112. (1862); Giesch., Entom. Nachricht., IX, 204. (1883); Meade. Entom. Monthly Mag., (2), II, 94. (1891).
- vaca* Meig., S. B., V, 4, 5. (1826); Schus., F. A., I, 111. (1862); Macq., Annul. Soc. entom. France, (2), III, 279, 1. 1. V, 1. II. (1855); Janson., Trudy naturf. Ges. Karkoff, 1883, 311, 26. (1883).
- vaca* R.-D., Posth., I, 736, 4. [*Reaumaria*] (1863); Kow., Wien. entom. Zeitg., VIII, 15, 11. (1888).
- vittata* R.-D., Annul. Soc. entom. France, (2), IX, 312, 3. [*Reaumaria*] (1851) et Posth., I, 835, 3. [*Reaumaria*] (1863).

*) *Agrotis praecox* L.

- capitata* FALL. = **capitata** DEG. et **fasciata** MEIG.
- capitata* R.-D. = **ornata** MEIG.
- capitata* WALK. = **divisa** MEIG.
- cilipeda** ROSS, Dipt. ital. Prodr., III. 35. 5. (1859); KOW., Wien. entom. Zeitg., VII. 9. 10. (1888). Europaeentr. et mer.
- Descoidyi* R.-D. = **fasciata** MEIG.
- diversa* R.-D. = **ornata** MEIG.
- divisa** MEIG., S. B., V. 4. 4. (1826); ZELL., Isis, 1842. 845. 4. (1842); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4703. *obs.* (1858); SCHN., F. A., I. 442. (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg., VII. 8. 9. (1888); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 93. (1891); PAND., Rev. entom., XV. 82. 4. (1896).
- capitata* WALK. (*nee* DEG.), Ins. Brit., II. 13. 1. t. XI. f. 8. (1853).
- ?vittata* MEIG., S. B., V. 3. 3. (1826); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 279. 3. t. V. f. 9. (1845); SCHN., F. A., I. 444. (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg., VII. 13. 1. (1888).
- crul* WILL. = **capitata** DEG.
- fasciata** MEIG. (*nee* WIED. 1819.*), S. B., V. 6. 10. t. XLII. f. 10. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 86. 5. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 281. 8. t. V. f. 15. (1845); ZELL., Isis, 1842. 844. 3. (1842); ZETT., Dipt. Scand., III. 1195. 3. (1844) et VIII. 3252. 3. (1849); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 313. 4. [*Reaumuria*] (1851) et Posth., I. 737. 5. [*Reaumuria*] (1863); ROSS, Dipt. ital. Prodr., III. 33. 3. (1859); SCHN., F. A., I. 442. (1862) et Novara Dipt., 329. (1868); BOSSD., Fönnl. Insekt., II. 101. 3. (1866); v. RÖN., Entom. Nachricht., XIII. 87. (1887); WILL., Can. Entom., XIX. 9. (1887); KOW., Wien. entom. Zeitg., VII. 7. 6. (1888); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 93. (1891); PAND., Rev. entom., XV. 82. 5. (1896).
- Blondeli* R.-D., Myod., 80. 3. [*Reaumuria*] (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 315. 4. [*Isomera*] (1851) et Posth., I. 745. 1. [*Isomera*] (1863); KOW., Wien. entom. Zeitg., VII. 15. 9. (1888).
- capitata* FALL. p. p.
- Descoidyi* R.-D., Myod., 275. [*Reaumuria*] (1830).
- ruficeps* CURT., Brit. entom., 533. (1832); WALK., Ins. Brit., II. 13. 2. (1853).
- sieda* R.-D., Myod., 76. 4. [*Redia*] (1830) et Posth., I. 744. 17. [*Reaumuria*] (1863); KOW., Wien. entom. Zeitg., VII. 15. 10. (1888).
- simplex* ZELL., Isis, 1842. 846. 5. (1842); SCHN., F. A., I. 444. (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg., VII. 15. 12. (1888).
- Focrsteri** MEIG.**), S. B., VII. 245. 16. (1838); SCHN., F. A., I. 442. Europa.

*) *Bombus terrestris* L., *Podalirius retusus* KIRB.

**) ? *Aretia caja* L.

(1862); v. RÖD., Entom. Nachricht., XIII, 87. (1887); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII, 5, 4. (1888); STEBECK, Wien. entom. Zeitg., VII, 218. (1888) et Entom. Nachricht., XVI, 206. (1890); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 93. (1891).

picca R.-D., Myod., 78, 1. [*Spallanzania*] (1830), Annal. Soc. entom. France, (2), IX, 314, 5. [*Reaumuria*] (1851) et Posth., I, 747, 1. [*Spallanzania*] (1833); Macq., Suit. à Buff., II, 87, 11. (1835); MEIG., S. B., VII, 246, 20. (1838); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII, 14, 8. (1888).

suggesta PAND., Rev. entom., XV, 80, 1. (1896).

frontosa SAY = **capitata** DEG.

fulca R.-D. = **ornata** MEIG.

fuscipennis R.-D. = **atra** MEIG.

guttata WALK., Entom., V, 341, 67. (1871).

Arabia.

incerta BIG., Explor. Tunisie, Dipt. 10. (1888).

Tunisia.

insecta WALK., Entom., V, 342, 68. (1871).

Arabia.

lateralis ZELL. = **ornata** MEIG.

lurida ROSSI = **capitata** DEG.

lusitanica MEIG., S. B., VI, 373, 13. (1838); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII, 14, 5. (1888).

Lusitania.

maculipennis EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII, 783. (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII, 8, 8. (1888); PAND., Rev. entom., XV, 85. (1896).

Europa mer.,
Asia min.

maritima PERR. = **ornata** MEIG.

melanura R.-D. = **ornata** MEIG.

microceps MOTSCH. = ? **capitata** DEG.

nercosa MEIG. = ? **ornata** MEIG.

Olivierii R.-D., Myod., 82, 6. [*Reaumuria*] (1830) et Posth., I, 739, 8. [*Reaumuria*] (1863); Macq., Suit. à Buff., II, 87, 9. (1835).

Aegyptus.

ornata MEIG.?), S. B., V, 3, 2. (1826); Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), III, 278, 2. (1845); ROXD., Dipt. ital. Prodr., III, 36, 6. (1859); JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XIX, 11, 19. (1885); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII, 11, 12. (1888); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 94. (1891).

Europa.

capitata R.-D., Myod., 80, 1. [*Reaumuria*] (1830), Annal. Soc. entom. France, (2), IX, 310, 1. [*Reaumuria*] (1851) et Posth., I, 733, 1. [*Reaumuria*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 314. (178), I, t. V, f. 8. (1834), Suit. à Buff., II, 85, 1, t. XIV, f. 4. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), III, 277, 1, t. V, f. 8. (1845); BLANCH., Hist. nat. Ins., III, 609. (1840); SCHN., F. A., I, 443. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. IV, f. 75. (1889).

diversa R.-D., Myod., 77, 7. [*Redia*] (1830).

fulca R.-D., Myod., 77, 8. [*Redia*] (1830).

lateralis ZELL., Isis, 1842, 843, 2. (1842); ZETT., Dipt. Scand.,

*) *Agrotis praecox* L., *vestigialis* ROTT.

- III, 1194, 2. (1844); ROSB., Dipt. ital. Prodr., III, 38, 8. (1859); BOSSD., Fiml. Insekt., II, 109, 2. (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 94. (1891).
- maritima* PERR., Soc. Linn. Lyon, II, 493. (1850); KOW., Wien. entom. Zeitg., VII, 16, 15. (1888); BRACER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI, 352, 87. (1897).
- melanura* R.-D., Myod., 81, 4. [*Reaumuria*] (1830) et Posth., I, 743, 15. [*Reaumuria*] (1863); MACQ., Suit. à Buff., II, 86, 3. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), III, 279, 5, 4, V, f. 13. (1845); MEIG., S. B., VII, 245, 11. (1833); KOW., Wien. entom. Zeitg., VII, 14, 7. (1888); BRACER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI, 353, 91. (1897).
- nercessa* MEIG., S. B., V, 4, 6. (1826); SEMS., F. A., I, 444. (1862); KOW., Wien. entom. Zeitg., VII, 13, 2. (1888).
- testacea* R.-D., Myod., 75, 2. [*Redia*] (1830).
- vernalis* R.-D., Myod., 75, 1. [*Redia*] (1830) et Posth., I, 741, 16. [*Reaumuria*] (1863).
- philadelphica* MACQ. - **capitata** DEG.
- picca* R.-D., **Foersteri** MEIG.
- puncticornis** MEIG., S. B., V, 6, 9. (1826); MACQ., Soc. Sci. Lille, Europacentr. 1833, 315, 3. (1834) et Suit. à Buff., II, 86, 4. (1835); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), IX, 312, 2. [*Reaumuria*] (1854) et Posth., I, 835, 2. [*Reaumuria*] (1863); KOW., Wien. entom. Zeitg., VII, 13, 4. (1888).
- ruficeps* CURT. **fasciata** MEIG.
- sequax* WILL. **capitata** DEG.
- sicala* R.-D. **fasciata** R.-D.
- simplex* ZELL. **fasciata** MEIG.
- suggesta* PAND. - **Foersteri** MEIG.
- testacea* R.-D. **ornata** MEIG.
- trifaria* ZELL. **capitata** DEG.
- vacua* MEIG. **capitata** DEG.
- vacua* R.-D. **capitata** DEG.
- vernalis* R.-D. **ornata** MEIG.
- vicina* R.-D. **atra** MEIG.
- virescens** R.-D., Posth., I, 741, 12. [*Reaumuria*] (1863). Aegyptus.
- vittata* MEIG. ? **divisa** MEIG.
- vittata* R.-D. **capitata** DEG.

C. *Rhynchogonia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 192, 72. (1893).

algerica B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 193. (1893). Algeria.

Cnephalia

ROSD., Dipt. ital. Prodr., I, 62, 10, (1856) et III, 39, 10, (1859).

Pseudogonia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 100, (1889)
et LX, 125, (1893).

Spallanzania ROSD. (nec R.-D.), Dipt. ital. Prodr., III, 40, (1859).

albisquama ROSD., Dipt. ital. Prodr., III, 44, 5, (1859) et IV, 156, Italia,
4, (1861).

alpestris ROSD. **hebes** FALL.

atra R.-D. **fasciata** WIED.

biscliosa B. B. **bucephala** MEIG.

bucephala MEIG. (S. B.), IV, 252, 23, [*Tachina*] (1824); SCHUM., F. Europaeentr.
A., I, 445, (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. IV, f. et mer.,
78, (1889); SNOW, Kans. Univ. Quat., III, 178, (1895). Africa sept.,

biscliosa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 353, (1891), LX,
222, (1893) et LXI, 518, (1894); BRAUER, Sitzgsber. Akad.
Wien, CIV, 592, (1894); SNOW, Kans. Univ. Quat., III, 178,
(1895).

hebes ROSD. (nec FALL.), Dipt. ital. Prodr., III, 42, 2, [*Spallanz-*
ania] (1859) et IV, 156, 1, (1861); WALK., Biol. centr. amer.,
II, 45, 1, (1890); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 353,
3, (1891) et LX, 222, [*Spallanzania*] (1893); BRAUER, Sitzgsber.
Akad. Wien, CIV, 592, (1894); COQUILL., Rev. Tachin. N. A.,
135, [*Spallanzania*] (1897); PAND., Rev. entom., XV, 80, 2,
[*Gonia*] (1896).

pauca SNOW, Kans. Univ. Quat., III, 182, (1895).

rectistylum MACQ., Dipt. exot., 2 Suppl., 81, (65), 9, t. III, f.
6, [*Gonia*] (1817); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI, 355,
95, [*Spallanzania*] (1897).

capensis R.-D. **fasciata** WIED.

capitata MACQ. **fasciata** WIED.

cinerascens ROSD., Dipt. ital. Prodr., III, 34, 4, [*Gonia*] (1859); Europaeentr.
KOW., Wien. entom. Zeitg., VII, 7, 7, [*Gonia*] (1888); B. B., et mer.,
Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. IV, f. 76, [*Pseudogonia*] (1889);
PAND., Rev. entom., XV, 83, 6, [*Gonia*] (1896); BRAUER, Sitzgsber.
Akad. Wien, CVI, 353, 92, [*Pseudogonia*] (1897).

classellata MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), III, 283, 11,
t. V, f. 14, [*Gonia*] (1855); ROSD., Dipt. ital. Prodr., III, 41,
1, [*Spallanzania*] (1859); KOW., Wien. entom. Zeitg., VII,
16, 14, [*Gonia*] (1888).

capitata ROSD. **hebes** FALL.

fasciata WILD., Zool. Mag., III, 25, 37, [*Gonia*] (1819) et Ausser. Ins. Canar.
zweil. Ins., II, 344, 2, [*Gonia*] (1830); MACQ., Dipt. exot., III,

*) *Agrotis segetum* SCHUM., *Phragmatobia fuliginosa* L.

206. (49). 1. [*Gonia*] (1853); SCHUS., Novara Dipt., 329. 107. [*Gonia*] (1868).
atra R.-D., Myod., 78. 9. [*Redia*] (1830).
capensis R.-D., Myod., 77. 6. [*Redia*] (1830).
capitata MACQ., Hist. nat. Can. Webb, Entom., I. 111. 58. [*Gonia*] (1838).
nigra MACQ., Dipt. exot., III. 206. (49). 2. [*Gonia*] (1846); RIC., Ann. Mag. N. Hist., (7). VII. 107. [*Pseudogonia*] (1901).
- fasciventris** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 280. 7. [*Gonia*] (1855); KOW., Wien. entom. Zeitg., VII. 16. 13. [*Gonia*] (1888). Europa mer., Ins. Canar.
- fuscisquama** ROXD., Dipt. ital. Prodr., III. 44. 6. (1859) et IV. 156. 5. (1861). Italia.
- gallica* R.-D. — **hebes** FALL.
- hebes** FALL., Dipt. succ. Musc., II. 19. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., V. 7. 11. [*Gonia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 86. 6. [*Gonia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 281. 10. t. V. f. 10. [*Gonia*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., III. 1196. 4. [*Gonia*] (1844); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 317. 1. [*Spallanzania*] (1851) et Posth., I. 748. 2. [*Spallanzania*] (1863); SCHUS., F. A., I. 444. [*Gonia*] (1862); BOSSD., Finkl. Insekt., II. 101. 4. [*Gonia*] (1866); KOW., Wien. entom. Zeitg., VII. 5. 5. [*Gonia*] (1888); BRACER, Sitzgsber. Akad. Wien, CIV. 593. [*Ongchogonia*] (1895).
alpestris ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV. 155. [*Spallanzania*] (1861).
cognata ROXD., Dipt. ital. Prodr., III. 38. 9. [*Gonia*] (1859) et IV. 154. [*Spallanzania*] (1861); PASD., Rev. entom., XV. 84. 7. [*Gonia*] (1896).
gallica R.-D., Myod., 79. 2. [*Spallanzania*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 87. 10. [*Gonia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 246. 19. [*Gonia*] (1858).
nulifacies MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 315. (179). 4. [*Gonia*] (1834); MEIG., S. B., VII. 246. 17. [*Gonia*] (1838).
parisiaca R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 315. 2. [*Isomera*] (1851) et Posth., I. 746. 2. [*Isomera*] (1863).
- hebes* ROXD. — **bucephala** MEIG.
- montana** ROXD., Dipt. ital. Prodr., III. 43. 3. [*Spallanzania*] (1859) et IV. 156. 3. (1861). Italia.
- multisetosa** ROXD., Dipt. ital. Prodr., III. 43. 4. (1859), IV. 156. 2. (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 196. (1865); JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XX. 22. 27. (1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 353. (1891). Europacentr. et mer.
- nigra* MACQ. — **fasciata** WIED.
- nulifacies* MACQ. — **fasciata** WIED.
- pausa* SNOW — **bucephala** MEIG.
- parisiaca* R.-D. — **hebes** FALL.
- rectistylum* MACQ. — **bucephala** MEIG.
- tessellata* MACQ. — ?**cinerascens** ROXD.

Plagia

MEIG., S. B., VII. 201. 6. (1838); R.-D., Posth., I. 823. 1. (1863).

Cyrtophlebia ROXD., Dipt. ital. Prodr., I. 68. 30. (1856), II. 13. (1857) et III. 187. 30. [*Cyrtophlocha*] (1859), em. B. B. 1882.

buccata B. B.*), Denkschr. Akad. Wien, LXI. 618. [*Cyrtophlebia*] Europa centr. (1894).

elata MEIG., S. B., VII. 201. 6. t. LXVIII. f. 42. (1838); SCHIX., F. Europa centr. A., I. 439 et nota. (1862); PAND., Rev. entom., XIV. 345. 22. et mer. [*Zenillia*] (1895); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 136. (1900).

nigripalpis ROXD. = **uricola** MEIG.

uricola MEIG.**), S. B., IV. 299. 104. [*Tachina*] (1824) et VII. 201. Europa. 5. (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 142. 13. [*Tachina*] (1835);

ZETT., Dipt. Scand., III. 1093. 90. [*Tachina*] (1844); ? WALK.,

Ins. Brit., II. 49. 69. [*Tachina*] (1853); ROXD., Dipt. ital. Prodr.,

III. 188. 1. [*Cyrtophlebia*] (1859) et Bull. Soc. entom. ital., IV.

212. [*Cyrtophlebia*] (1871); SCHIX., F. A., I. 437. (1862); R.-D.,

Posth., I. 825. 2. (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t.

V. f. 81. (1889) et LXIII. 354. [*Cyrtophlebia*] (1891); MEADE,

Entom. Monthly Mag., (2), II. 153. (1891); PAND., Rev. entom.,

XV. 8. 8. [*Erorista*] (1896); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI.

148. (1900).

nigripalpis ROXD., Dipt. ital. Prodr., III. 189. 2. [*Cyrtophlebia*] (1859); SCHIX., F. A., I. 437. (1862).

stenoptera MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 268. 32. [*Tachina* *senoptera*] (1834).

villosa R.-D., Posth., I. 824. 1. (1863).

stenoptera MACQ. = **uricola** MEIG.

villosa R.-D. **uricola** MEIG.

Voria

R.-D., Myod., 195. II. (1830).

A. *Voria* s. str.

Plagia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 101. (1889) et LX. 147. (1893).

ambigua FALL.**), Vet. Akad. Handl., XXXI. 275. 26. [*Tachina*] Europa. (1810) et Dipt. succ. Muse., 7. 10. [*Tachina*] (1820); ZETT., Dipt.

*) *Caradrina taraxaci* Hb.

***) *Apoestes spectrum* Esp., *Euelidia glyphica* L., *Mi Cn.*,

Mamestra serena F.

****) *Epinetronia popularis* F., *Plusia gamma* L.

Scand., III, 1017, 5. [*Tachina*] (1844); SCHIX., F. A., I, 438. [*Plagia*] (1862); BOSSD., Fiml. Insekt., II, 47, 5. [*Tachina*] (1866); WULF, Entom. Tijdschr., (2), IV, 47, 152. [*Plagia*] (1869); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. IV, f. 80, (1889) et LVIII, 354. [*Plagia*] (1891).

interrupta ZETT., Dipt. Scand., III, 1020, 8. [*Tachina*] (1844).

ambigua MEIG., **curvinervis** ZETT.

aurifluae WULF*), Entom. Tijdschr., (2), IV, 137, t. 1, IV, f. 1. [*Plagia*] (1869). Europa centr.

? *setosa* BRUSCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, N. F. VI, 21.

[*Plagia*] (1869).

curvicornis ZETT., **curvinervis** ZETT.

curvinervis ZETT.**), Dipt. Scand., III, 1018, 6. (1844) et XIII, 6074. Europa centr. et sept.
6. [*Tachina*] (1859); SCHIX., F. A., I, 438. [*Plagia*] (1862); BOSSD., Fiml. Insekt., II, 48, 6. [*Tachina*] (1886); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 154. [*Plagia*] (1891).

ambigua MEIG. (nec FALL.), S. B., IV, 298, 103, t. XI, f. 31. [*Tachina*] (1824) et VII, 201, 1. [*Plagia*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 96, 3, t. IV, f. 3. [*Plagia*] (1848).

curvicornis ZETT., Dipt. Scand., III, 1080, 77. [*Tachina*] (1844); SCHIX., F. A., I, 438. [*Plagia*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 220. [*Plagia*] (1893).

impressa WULF, Entom. Tijdschr., (2), IV, 139, 2, t. IV, f. 2. [*Plagia*] (1869). Europa centr.

interrupta ZETT. = **ambigua** FALL.

latifrons R.-D., **ruralis** FALL.

operosa R.-D., **ruralis** FALL.

ruralis FALL.**), Vet. Akad. Handl., XXXI, 265, 6. [*Tachina*] (1810) Europa.

et Dipt. succ. Muse., 5, 6. [*Tachina*] (1820); ZETT., Ins. Lapp., 634, 3. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III, 1016, 4. (1844), XIII, 6073, 4. [*Tachina*] (1859); R.-D., Rev. Mag. Zool., III, 4, 5. (1851) et Posth., I, 828, 2. (1863); ROXD., Dipt. ital. Prodr., III, 192, 1. [*Plagia*] (1859); SCHIX., F. A., I, 438. [*Plagia*] (1862); BOSSD., Fiml. Insekt., II, 47, 4. [*Tachina*] (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. IV, f. 80, a. (1889) et LVIII, 354. [*Plagia*] (1891); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 153. [*Plagia*] (1891).

latifrons R.-D., Myod., 196, 1. (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 268, 31. [*Tachina*] (1834) et Suit. à Buff., II, 140, 1. [*Tachina*] (1835).

operosa R.-D., Posth., I, 827, 1. (1863).

*) *Porthesia similis* FRESSL.

***) *Epiblema sordidana* Hb., *Taenioecampa incerta* HCFX., *stabilis* VIEW.

****) *Anarta myrtilli* L., *Aretia Hebe* L., *Mamestra brassicae* L., *Plusia chrysitis* L., *Gamma* L., *Pyrameis atalanta* L.

transversa Macq., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 96, 2. t. IV, f. 4. [*Plagia*] (1848).

verticalis MEIG., S. B., IV, 299, 105. [*Tachina*] (1824) et VII, 201, 2. t. LXVIII, f. 37—41. [*Plagia*] (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 263, 17. [*Tachina*] (1834), Suit. à Buff., II, 143, 14. [*Tachina*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 95, 1. t. IV, f. 1. [*Plagia*] (1848); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 151, (1900).

setosa BRISCHKE = ? *aurifluae* WULF.

transversa Macq. = *ruralis* FALL.

verticalis MEIG. = *ruralis* FALL.

B. *Paraplagia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 354, (1891) et LX, 147, (1893).

Atrichia R.-D., Myod., 111, IV. [*Athyrcia*] (1830) *em.* SCDD, 1882, *nec* SCHRANK 1803, Dipt.

Blepharigena ROND., Dipt. ital. Prodr., I, 69, 31, (1856) et III, 190, 31, (1859) *var. hybrida*.

erythroceræ R.-D. = ? *ruficornis* ZETT.

flavescens R.-D. = *trepida* MEIG.

flavipalpis R.-D. = *trepida* MEIG.

Hilfi STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV, 486. [*Plagia*] Bosnia. (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX, 546. [*Plagia*] (1904).

Macquarti R.-D. = *trepida* MEIG.

nigripalpis R.-D. = *trepida* MEIG.

nigrita R.-D. = *trepida* MEIG.

ruficornis ZETT.*), Dipt. Scand., III, 1019, 7. [*Tachina*] (1844); SCHN., F. A., I, 439. [*Plagia*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 224, (1893). Europacentr. et sept.

? *erythroceræ* R.-D., Myod., 111, 1. [*Athyrcia*] (1830) et Posth., I, 830, 1. [*Athyrcia*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833,

276, 1. t. IV, f. 8. [*Athyrcia*] (1834) et Suit. à Buff., II, 137,

17. [*Lydella*] (1835); PAND., Rev. entom., XV, 41, 2, (1896).
? *rufipalpis* ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 211. [*Blepharigena*] (1865).

rufipalpis ROND. = ? *ruficornis* ZETT.

subcincta ZETT. = *trepida* MEIG.

trepida MEIG.**), S. B., IV, 300, 106. [*Tachina*] (1824) et VIII, 201, 3. [*Plagia*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III, 1025, 14, (1844) et XIII, 6077, 14. [*Tachina*] (1859); ROND., Dipt. ital. Prodr., III, 191, 2. [*Blepharigena*] (1859); SCHN., F. A., I, 438. [*Plagia*]

*) *Cucullia lucifuga* Hb.

***) *Apopostes spectrum* Esp., *Epineuronia popularis* F. — *Lophyrus pini* HAET.

(1862); BOSSD., Finl. Insekt., II, 50, II, [*Tachina*] (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 154, [*Plagia*] (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 354, (1891); PAND., Rev. entom., XV, 42, 3, (1896).

flavescens R.-D., Myod., 112, 2, [*Albrycia*] (1830) et Posth., I, 831, 2, [*Albrycia*] (1863).

flavipalpis R.-D., Posth., I, 832, 3, [*Albrycia*] (1863).

Macquarti R.-D., Posth., I, 833, 5, [*Albrycia*] (1863).

nigripalpis R.-D., Posth., I, 835, 7, [*Albrycia*] (1863).

nigrita R.-D., Posth., I, 832, 4, [*Albrycia*] (1863).

subcincta ZETT., Dipt. Scand., III, 1026, 15, [*Tachina*] (1844); SCHN., F. A., I, 439, [*Plagia*] (1862); BOSSD., Finl. Insekt., II, 50, 12, [*Tachina*] (1866).

vulgaris R.-D., Posth., I, 834, 6, [*Albrycia*] (1863).

calgaria R.-D. **trepida** MEIG.

C. *Klugia*

R.-D., Posth., I, 787, I, (1863).

Plagia s. str. PAND., Rev. entom., XIII, 45, IX, (1894).

Ptiloparia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 101, (1889) et LX, 147, [*Ptiloparcia*] (1893).

albisea R.-D. = **marginata** MEIG.

marginata MEIG., S. B., IV, 301, 107, t. XLI, f. 31, [*Tachina*] (1824) Europa, et VII, 201, 4, [*Plagia*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III, 1079, 76, [*Tachina*] (1844); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), III, 97, 4, t. IV, f. 2, [*Plagia*] (1845); ROSSD., Dipt. ital. Prodr., III, 191, I, [*Blepharigena*] (1859); SCHN., F. A., I, 438, [*Plagia*] (1862); R.-D., Posth., I, 788, 1, (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. V, f. 82, (1889) et LVIII, 354, [*Ptiloparia*] (1891); PAND., Rev., XV, 88, 1, [*Plagia*] (1896).

albisea R.-D., Posth., I, 789, 3, (1863).

occulata MEIG., S. B., VII, 198, 60, [*Tachina*] (1838); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 145, (1900).

palpalis R.-D., Posth., I, 789, 2, (1863).

occulata MEIG. = **marginata** MEIG.

palpalis R.-D. = **marginata** MEIG.

Anachaetopsis

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 106, (1889) et LX, 148, (1893).

Brachycoelia MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 260, 40, I, (1892).

? *Rhynchomyia* FÖRST. ap. KALTENB., Pflanzenf., 320, 10, [*Rhynchomyia*] (1874) nec R.-D. 1830, Dipt.

morio FALL., Dipt. succ. Musc., 18, 34, [*Tachina*] (1820); ZETT., Ins. Europa e, etc.

- Lapp., 639, 26. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III, 1076, 73. [*Tachina*] (1844); SCHN., F. A., I, 539. [*Scopolia*] (1862).
nigra FÖRST. - ?**ocypterina** ZETT.
ocypterina ZETT.*), Ins. Lapp., 639, 25. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III, 1077, 74. (1844), XIII, 6099, 74. [*Tachina*] (1859); SCHN., F. A., I, 539. [*Scopolia*] (1862); BOSSB., Finnl. Insekt., II, 67, 50. [*Tachina*] (1866); WULF, Entom. Tijdschr., (2), IV, 153. [*Scopolia*] (1869); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. V, f. 102. (1889); MEADE, Entom., XIV, 288. [*Scopolia*] (1881) et Entom. Monthly Mag., (2), III, 260. [*Brachycoelia*] (1892); PAND., Rev. entom., XV, 119, 2. [*Erynnia*] (1896).
 ?*nigra* FÖRST. ap. KALTENB., Pflanzenl., 320, 10. [*Rhytachomyia*] (1874).

Wagneria

R.-D., Myod., 126, XIV, (1830).

Aeria R.-D., Posth., I, 809, XI, (1863).

Brachystylum Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 736. (1854) et (3), III, 199. (1855).

Carbonia R.-D., Posth., I, 808, X, (1863).

Oulea R.-D., Posth., I, 810, XII, (1863) *nee* Er. 1820, Col.

Phoricharta Rond., Dipt. ital. Prodr., IV, 8. (1861).

Ramonda R.-D., Posth., I, 790, II, (1863).

Scopolia R.-D., Myod., 268, VI, (1830) *nee* HFB. 1816, Lep.

Stephania R.-D., Posth., I, 807, IX, (1863) *nee* GRÆN. 1852, Lep.

A. *Wagneria* s. str.

Phoricharta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 106. (1889) et LX, 148. (1893).

- anacantha** Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII, 275, 3. [*Scopolia*] (1847). Asia min.
angusticornis Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII, 271, 2. [*Scopolia*] (1847). Sicilia.
borealis ZETT., Ins. Lapp., 627, 1. [*Ocyptera*] (1838) et Dipt. Scand., III, 1243, 5. [*Scopolia*] (1844). Europa sept.
carbonaria MEIG. **prunaria** ROND.
carbonaria PAND. **fuliginaria** ROND.
carbonaria PANZ., Fauna germ., LIV, 15. [*Musca*] (1798); FALL., Dipt. succ. Muse., 8, 9. [*Ocyptera*] (1820); R.-D., Myod., 269, 2. [*Scopolia*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., III, 1239, 1. (1844) et XIII, 6167, 1. [*Scopolia*] (1859); WALK., Ins. Brit., II, 92, 166. [*Tachina*]

*) *Eterophorus lithodaetylus* Tr., *microdaetylus* Hb., *tephrodaetylus* Hb.

(1853); RONDI., Dipt. ital. Prodr., IV, 101, 3. [*Phorichaeta*] (1861); SEMX., F. A., I, 540. [*Scopolia*] (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., II, 119, 1. [*Scopolia*] (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 259. [*Scopolia*] (1892); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 133. (1900).

costata FALL.*), Dipt. succ. Musc., 8, 8. [*Ocyptera*] (1820); MEIG., S. B., IV, 419, 314. [*Tachina*] (1824) et VII, 252, 1, t. LXXI, f. 46—50. [*Scopolia*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III, 1240, 4. [*Scopolia*] (1844); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 197, 3, t. IV, f. 14. [*Scopolia*] (1855); SEMX., F. A., I, 540. [*Scopolia*] (1862); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 134. (1900).

fasciata R.-D., Posth., I, 794, 3. (1863).

gagatea R.-D., Myod., 126, 1. (1830) et Posth., I, 793, 1. (1863); MACQ., Suit. à Buff., II, 125, 7. [*Metopia*] (1835).

heterocera R.-D., Posth., I, 811, 1. [*Ocalea*] (1863); BRACER, Sitzsber. Akad. Wien, CVII, 511, 122. [*Phorichaeta*] (1897); *impatiens* R.-D., Posth., I, 809, 1. [*Carbania*] (1863).

lugens MEIG., S. B., IV, 419, 313. [*Tachina*] (1824) et VII, 252, 3, t. LXXI, f. 51. [*Scopolia*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 230, 10. [*Melanophora*] (1834), Suit. à Buff., II, 176, 10. [*Melanophora*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), III, 196, 1, t. IV, f. 12. [*Scopolia*] (1855); ZETT., Dipt. Scand., III, 1243, 6. [*Scopolia*] (1844); RONDI., Dipt. ital. Prodr., IV, 101, 4. [*Phorichaeta*] (1861); SEMX., F. A., I, 540. [*Scopolia*] (1862); R.-D., Posth., I, 805, 1. [*Scopolia*] (1863); BOSSD., Finnl. Insekt., II, 120, 4. [*Scopolia*] (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. V, f. 101. [*Phorichaeta*] (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 260. [*Scopolia*] (1892); PANB., Rev. entom., XV, 125, 3. [*Scopolia*] (1896); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 142. (1900).

luperinae R.-D., Posth., I, 794, 2. (1863).

palpalis R.-D., Posth., I, 795, 4. (1863).

parasita R.-D., Myod., 270, 5. [*Scopolia*] (1830) et Posth., I, 806, 2. [*Scopolia*] (1863).

rapestris R.-D., Myod., 269, 1. [*Scopolia*] (1830) et Posth., I, 806, 3. [*Scopolia*] (1863); MACQ., Suit. à Buff., II, 175, 8. [*Melanophora*] (1835); MEIG., S. B., VII, 232, 6. [*Scopolia*] (1838).

viatica R.-D., Myod., 269, 3. [*Scopolia*] (1830).

cunctiae R.-D. = **fasciata** R.-D.

cunctans MEIG.**), S. B., IV, 419, 312. [*Tachina*] (1824) et VII, 252, 2. [*Scopolia*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III, 1242, 4. [*Scopolia*] (1844); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 197, 2, t. IV, f. 13. [*Scopolia*] (1855); SEMX., F. A., I, 540. [*Scopolia*] (1862);

*) *Caradrina superstes* Tr., *Plusia deaurata* Esr.

**) *Agrotis* sp., *Grammesia trigrammica* HERR.

- BOUSD., Finnl. Insekt., II, 120, 3. [*Scopolia*] (1866); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 45. [*Phorichaeta*] (1894); PAND., Rev. entom., XV, 126, 4. [*Scopolia*] (1896); GIRSCHN., Entom. Nachricht., XXV, 178, 4. [*Phorichaeta*] (1899).
- fasciata** R.-D.*), Posth., I, 790, 1. [*Ramonda*] (1863). Gallia.
cuculliae R.-D., Posth., I, 791, 2. [*Ramonda*] (1863).
flarisquamis R.-D., Posth., I, 791, 3. [*Ramonda*] (1863).
- fasciata* R.-D. (Wagn.) **costata** FALL.
flarisquamis R.-D. = **fasciata** R.-D.
- fuliginaria** ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV, 100, 1. [*Phorichaeta*] (1861). Europa mer.
carbonaria PAND. (nec PANZ.), Rev. entom., XV, 127, 6. [*Scopolia*] (1896).
- fulvicornis** MACQ., Suit. à Buff., II, 176, II. [*Melanophora*] (1835); Europa centr.
 MEIG., S. B., VII, 252, 7. [*Scopolia*] (1838); ROXD., Atti Soc. ital. et mer.
 Sci. Nat., VIII, 220. [*Phorichaeta*] (1865).
- gagata* R.-D. = **costata** FALL.
- gravicornis** Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII, 273, 1. [*Scopolia*] (1847). Sicilia.
- Handlirschi** B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 356. [*Phorichaeta*] Tirolia.
 (1891).
- heterocera* R.-D. = **costata** FALL.
- impatiens* R.-D. = **costata** FALL.
- lacrimans** ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV, 101, 5. [*Phorichaeta*] (1861). Italia.
- latifrons** ZETT.*), Dipt. Scand., III, 1244, 7. [*Scopolia*] (1844); Europa centr.
 SCHN., F. A., I, 540. [*Scopolia*] (1862); WULF, Entom. Tijdschr., et sept.
 (2), IV, 153. [*Scopolia*] (1869).
- lentis** MEIG., S. B., IV, 317, 134. [*Tachina*] (1824) et VII, 208, 6. Europa centr.
 [*Clista*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 41. et mer.
 4, t. II, f. 10. [*Clista*] (1855); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI,
 142. (1900); VULLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 381, 1. (1900).
trivincta ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV, 103, 8. [*Phorichaeta*]
 (1861); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 259. [*Scopolia*]
 (1892); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 225. [*Phorichaeta*]
 (1893); PAND., Rev. entom., XV, 124, 1. [*Scopolia*] (1896).
- lugens* MEIG. **costata** FALL.
- laperinae* R.-D. **costata** FALL.
- meridionalis** R.-D., Posth., I, 808, 1. [*Stephania*] (1863). Gallia.
- nigra** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 200, t. I, IV, f. 17. Belgium.
 [*Brachystylawa*] (1855).
- nitida** R.-D.**), Posth., I, 810, 1. [*Arcia*] (1863). Gallia.
- nudioculata** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 46, 2, t. II, Gallia.
 f. 16. [*Fallenia*] (1855).
- ocypterata** FALL., Vet. Acad. Handl., XXXI, 272. [*Tachina*] (1810) Europa centr.
 et Dipt. suec. Mus., 17, 32. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV, et sept.

*) *Cucullia blattariae* ESP.**) *Leucania lythargyria* ESP.***) *Caradrina alsines* BRUNN., *Orthosia circumlaris* HUFN.

416. 308. [*Tachina*] (1824); ZETT., Dipt. Scand., III. 1055. 48. [*Tachina*] (1844).
- ovata** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 198. 5. t. IV. f. 16. Gallia.
[*Scopolia*] (1855).
- palpalis* R.-D. = **costata** FALL.
- parasita* R.-D. = **costata** FALL.
- picta** ZETT., Dipt. Scand., III. 1241. 3. [*Scopolia*] (1844); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 119. 2. [*Scopolia*] (1866). Europacentr.
et sept.
- ?*rafipes* R.-D., Myod., 269. 4. [*Scopolia*] (1830) et Posth., I. 806. 4. [*Scopolia*] (1863); MACQ., Suit. à Buff., II. 176. 12. [*Melanophora*] (1835); MEIG., S. B., VII. 252. 8. [*Scopolia*] (1838); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 611. [*Melanophora*] (1840).
- plorans** RONB., Dipt. ital. Prodr., IV. 102. 6. [*Phorichaeta*] (1861). Falia.
- prunaria** RONB., Dipt. ital. Prodr., IV. 100. 2. [*Phorichaeta*] (1861) Europacentr.
et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 591. nota. 3. [*Phorichaeta*] (1868); et mer.
PAND., Rev. entom., XV. 127. 5. [*Scopolia*] (1896).
- carbonaria* MEIG. (nec PASZ.), S. B., IV. 420. 315. [*Tachina*] (1824) et VII. 252. 4. [*Scopolia*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 230. 9. [*Melanophora*] (1834), Suit. à Buff., II. 176. 9. [*Melanophora*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 198. 4. t. IV. f. 15. [*Scopolia*] (1855).
- rafipes* R.-D. = ?**picta** ZETT.
- rapestris* R.-D. = **costata** FALL.
- spathulata** FALL., Dipt. succ. Musc., 7. 9. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV. 369. 225. [*Tachina*] (1824); ZETT., Dipt. Scand., III. 1031. 21. [*Tachina*] (1844). Europacentr.
et sept.
- succincta** MEIG., S. B., VII. 252. 5. [*Scopolia*] (1838); ? RONB., Dipt. ital. Prodr., IV. 102. 7. [*Phorichaeta*] (1861); SCHN., F. A., I. 541. [*Scopolia*] (1862); ? PAND., Rev. entom., XV. 125. 2. [*Scopolia*] (1896). Europacentr.
et mer.
- tricincta* RONB. = **lentis** MEIG.
- vialica* R.-D. = **costata** FALL.

B. *Petinops*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 356. (1891) et LX. 148. (1893).

- Schnabli** B. B.*), Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 356. (1891). Europacentr.
var. **Tiefii** STROMB., Tief's Nachl., 56. (1900). et mer.

Petina

MEIG., S. B., VII. 214. 17. [*Petina*] (1838) *emend.*

- erinceus** FABR.**), Entom. syst., IV. 328. 68. [*Musca*] (1796) et Syst. Europa.
Antl., 311. 10. [*Tachina*] (1805); FALL., Vet. Acad. Handl., XXXI.

*) *Ecerita ludicra* Hb., Phragmatobia fuliginosa L.

**) *Cucullia asteris* SCURF., *Plusia gamma* L. — *Spilograpta alternata* FALL.

275. [*Tachina*] (1810) et Dipt. suæc. Musc., 15, 28. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV, 345, 183. [*Tachina*] (1824) et VII, 214, I, t. LXIX, f. 76-60, (1838); MACQ., Suit. à Buff., II, 166, 2. [*Sericocera crinocœca*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), III, 44, t. II, f. 14, (1835); ZETT., Dipt. Scand., III, 1078, 75. [*Tachina*] (1844); SCHUS., F. A., I, 439, (1862); BONSP., Fimml. Insekt., II, 67, 51. [*Tachina*] (1866); JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karloff, XIX, 10, 18, (1885); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. X, f. 270, (1889) et LVIII, 387, (1891); PAND., Rev. entom., XV, 100, 2, (1896).

stylata B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 387, (1891).

Groenlandie.

Melizoneura

ROSD., Dipt. ital. Prodr., IV, 8. [*Melisonœura*] (1861).

Actia MEIG., S. B., VII, 254, 43, (1838) *new* R.-D., 1830, Dipt.

Melia R.-D., Myod., 101, V, (1830) *new* BULL., 1820, Crust.

✓ **albipennis** R.-D., Myod., 102, I, [*Melia*] (1830) et Posth., I, 706, I, Europe centr. et mer.
 [*Melia*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 249, (113), 10.
 [*Myiobia*] (1834) et Suit. à Buff., II, 158, 8. [*Myiobia*] (1835);
 MEIG., S. B., VII, 255, 2. [*Actia*] (1838); SCHUS., F. A., I, 523.
 [*Melia*] (1862); KARSCH., Berl. entom. Zeitschr., XXX, 136. [*Melia*]
 (1885); PAND., Rev. entom., XV, 89. [*Melia*] (1896).

? **leucoptera** MEIG., S. B., IV, 356, 203. [*Tachina*] (1824) et VII, 354, Europe centr. et mer.
 I, t. LXXII, f. 11-16. [*Actia*] (1835); MACQ., Suit. à Buff., II,
 92, 14. [*Tryplocera*] (1835); LW., 20, Ber. Naturf. Ver. Augsb.,
 43. [*Actia*] (1869); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. VII,
 f. 139. [*Melia*] (1889).

zonaria LW., Stettin. entom. Zeitg., VIII, 275, 1. [*Actia*] (1847). Sicilia.

Melanomelia

STROB., Wien. entom. Zeitg., XVIII, 215, (1899).

aterrima STROB., Wien. entom. Zeitg., XVIII, 215, III, (1899). Hispania.

Ptychoneura

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 101, (1889) et LX, 118, 152, (1893)

✓ **cylindrica** FAVI., Vet. Akad. Handl., XXXI, 279. [*Tachina*] (1810) Europe.
 et Dipt. suæc. Musc., 8, 43. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV,
 375, 231. [*Tachina*] (1821) et VII, 233, 24. [*Millogramma*] (1831);
 MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 276, 3. [*Ubricia*] (1834) et Suit. à
 Buff., II, 138, 20. [*Uydella*] (1835); ZETT., Ins. Lapq., 635, 8.
 [*Tachina*] (1838); Dipt. Scand., III, 1207, 8, (1841) et VIII, 3254.

8. [*Millogramma*] (1818); PAND., Rev. entom., XIV, 305, 5. [*Melopia*] (1895); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 134, (1900).

Picciolii ROHD., Dipt. ital. Prodr., III, 229, 9. [*Sphixcaputa*] (1859).*)

flavitarcella ZETT. **rufitarsis** MEIG.

Picciolii ROHD. — **rufitarsis** MEIG.

praeclusa PAND., Rev. entom., XIV, 305, 4. [*Melopia*] (1895).

rufitarsis ZETT. **rufitarsis** MEIG.

rufitarsis MEIG., S. B., IV, 410, 296. [*Tachina*] (1824); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. V, f. 96, (1889) et LX, 224, (1893).

flavitarcella ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6079, 19—22. [*Tachina*] (1859).

rufitarsis ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6078, 19—21. [*Tachina*] (1859); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 152. [*Melopia*] (1892).

Germania.

Europa.

Phytomyptera

ROHD., N. Ann. Sci. Nat. Bologna, (2), III, 25, (1845).

× **nitidiventris** ROHD.**), N. Ann. Sci. Nat. Bologna, (2), III, 25, (1845), Europa centr. Dipt. ital. Prodr., III, 20, 1, (1859) et Bull. Soc. entom. ital., IV, et mer.

108, 1, (1871); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. V, f. 89, (1889) et LX, 186, 37, (1893); PAND., Rev. entom., XV, 90, (1896); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hereceg., XIV, 489, (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hereceg., IX, 549, (1904).

nigra MEIG. in litt. ap. STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 144, (1900).

var. unicolor ROHD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 195, (1865) et Bull. Soc. entom. ital., IV, 108, 2, (1871); MK, Wien. entom. Zeitzg., XI, 182, 8, (1892).

unicolor ROSE. — **nitidiventris** ROHD. *var.*

vaccinii SIXTENS., Stettin. entom. Zeitzg., LVIII, 152, 2, (1897).

Europa sept.

Rhacodineura

ROHD., Dipt. ital. Prodr., IV, 31, *nova*, (1861). *emend.*

Roeselia R.-D., Myod., 145, II, (1830) *nov* HERZ, 1816, Lep.

agrestis R.-D. **antiqua** MEIG.

antiqua MEIG.**), S. B., IV, 412, 300. [*Tachina*] (1824) et VII, 253, Europa.

t. t. LXXII, f. 6—10. [*Roeselia*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 291, 4. [*Eurygaster*] (1834) et Suit. à Buff., II, 117, 5.

*) *dolenda* MEIG. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 410, (1891) *nihil ignota*.

**) *Conchylis cebraea* HERZ., *Polychrosis botrana* SCHEFF.

***) *Forticula tomis* KOL. — *Taenioecampa miniosa* F.

[*Eurygaster*] (1835): ZETT., Dipt. Scand., III, 1056, 50. (1844) et XII, 4694, 50. [*Tachina*] (1850): R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 447, 6. [*Roeseelia*] (1848) et Posth., I, 608, 3. [*Roeseelia*] (1863): WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 782. [*Tachina*] (1849) et Ins. Brit., II, 90, 162. [*Tachina*] (1850): SEMM., F. A., I, 516. [*Roeseelia*] (1862): GERCKE, Wien. entom. Zeitg., VIII, 249. [*Roeseelia*] (1889): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. V, f. 94. (1889) et LVIII, 355. [*Roeseelia*] (1891): STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 44. [*Roeseelia*] (1894): RODZIANKO, Hor. Soc. entom. Ross., XXXI, 72. [*Roeseelia*] (1897): STRIX, Entom. Nachricht., XIV, 217, 86. (1900): MELL., Zool. Jahrbüch., XV, 688. [*Roeseelia*] (1900): HEND., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI, 209, 6. [*Roeseelia*] (1901): WAINWR., Entom. Monthly Mag., (2), XVI, 203. [*Roeseelia*] (1905).

agrestis R.-D., Myod., 146, 2. [*Roeseelia*] et Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 447, 7. [*Roeseelia*] (1848).

arcensis R.-D., Myod., 145, 1. [*Roeseelia*] (1830).

cylindrica R.-D., Myod., 146, 3. [*Roeseelia*] (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 446, 4. [*Roeseelia*] (1848).

flavescens R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 445, 2. [*Roeseelia*] (1848).

flavipes R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 448, 2. [*Roeseelia*] (1848) et Posth., I, 607, 2. [*Roeseelia*] (1863).

flavisquamis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 445, 3. [*Roeseelia*] (1848) et Posth., I, 609, 4. [*Roeseelia*] (1863).

fulripes R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 437, 1. [*Erythrocerat*] (1848).

interperta R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 444, 1. [*Roeseelia*] (1848).

pullipes FALL., p. p., Dipt. succ. Musc., 22, 44, *var.* [*Tachina*] (1820); ZETT., Dipt. Scand., III, 1055, 49. (1844) et XII, 4693, 49. [*Tachina*] (1850); ?WALK., Ins. Brit., II, 90, 161. [*Tachina*] (1853); ROND., Dipt. ital. Prodr., IV, 32, 1. [*Roeseelia*] (1861); R.-D., Posth., I, 606, 1. [*Roeseelia*] (1863); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 96. [*Roeseelia*] (1892); PAND., Rev. entom., XV, 43, 1. [*Roeseelia*] (1896); WAINWR., Entom. Monthly Mag., (2), XVI, 203. [*Roeseelia*] (1905).

sibirica R.-D., Myod., 146, 4. [*Roeseelia*] (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 446, 5. [*Roeseelia*] (1848); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 291, 5. [*Eurygaster*] (1833) et Suit. à Buff., II, 117, 6. [*Eurygaster*] (1835).

arcensis R.-D. *antiqua* MEG.

breviseria PAND., Rev. entom., XV, 46, 5. [*Roeseelia*] (1896).

Gallia.

rectangula PAND., Rev. entom., XV, 106, 12. [*Pelcinea*] (1896).

cylindrica R.-D. *antiqua* MEG.

flavescens R.-D. *antiqua* MEG.

flavipes R.-D. *antiqua* MEG.

flaviscutis R.-D. = **antiqua** MEIG.

fulvipes R.-D. = **antiqua** MEIG.

hypenomeutae B. B. = **yponomeutae** ROXD.

interrupta R.-D. = **antiqua** MEIG.

pallipes FALL. p. p. = **antiqua** MEIG.

rectangula PAND. = **breviseria** PAND.

sibirica R.-D. = **antiqua** MEIG.

yponomeutae ROXD.)*, Dipl. ital. Prodr., IV, 33, 2. [*Rooselia*] (1861). Europacentr.
hypenomeutae B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 572. [*Rooselia*] (1894). et mer.

Erythroceras

R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 436, III. (1848).

Curtisia R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 440, IV. (1848).

Eryphe R.-D., Posth., I, 609, VI. (1863).

Eurythaea R.-D., Posth., I, 603, IV. (1863).

Parancaera B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 355. (1891), LX, 151, 152. (1893) et LXI, 619. (1894).

carinthiaca STROBL. = **longicornis** B. B.

cinerea R.-D. = ?**longicornis** B. B.

fulvescens R.-D. = **longicornis** B. B.

leptotrichopa STROBL. = **pauciseta** B. B.

longicornis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 355. (1891) et Europacentr. LXI, 618. [*Parancaera*] (1894); STROBL, Wiss. Mittheil. Bosn. Herzeg., VII, 603. [*Parancaera*] (1900).

carinthiaca STROBL., Tief's Nachl., 55. [*Parancaera*] (1900).

?*cinerea* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 439, 5. (1848); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 505, 87. [*Parancaera*] (1897).

?*fulvescens* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 440, 7. (1848) et Posth., I, 602, 3. (1863).

?*ruralis* R.-D., Posth., I, 601, 2. (1863).

pauciseta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 618. [*Parancaera*] (1894). Europacentr. *leptotrichopa* STROBL. (nec B. B.), Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 44. [*Urophylla*] (1894).

pectiolata R.-D., Posth., I, 610, 1. [*Eryphe*] (1863).

regula R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 441, 1. [*Curtisia*] Gallia. (1848) et Posth., I, 602, 4. (1863).

ruralis R.-D. = ?**longicornis** B. B.

scutellaris R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 438, 3. (1848) Gallia. et Posth., I, 604, 1. [*Eurythaea*] (1863).

varipes STROBL., Tief's Nachl., 55. [*Parancaera*] (1900). ?

*) *Yponomeuta cognatella* HB., *malinella* Z.

Bucentes

LATR., Gen. crust. ins., IV, 333, (1809).

Siphona MEIG., Illiger's Mag., II, 281, (1803); SPEER., Zeitschr. wiss. Insekt., I, 461, (1905).

analis MEIG., S. B., IV, 157, 5, t. XXXVII, f. 24, [*Siphona*] (1824); Europa.
 St. FARG. SERV., Enc. méth., X, 502, (1825).

maculata STAEG. ap. ZETT., Dipt. Scand., VIII, 3212, 4, [*Siphona*] (1849).

analis R.-D. = **geniculata** DEG.

chaetolyga RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 194, [*Siphona*] Italia,
chaetolyga] (1865).

cinctea LATR. = **geniculata** DEG.

cinctea MEIG. = ?**geniculata** DEG.

clausa R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 209, 12, [*Siphona*] Gallia,
 (1850) et Posth., I, 698, 10, (1863).

consimilis R.-D. = **geniculata** DEG.

× **cristata** FABR.^{*)}, Syst. Antl., 281, 9, [*Stomorvys*] (1805); STAEG. ap. Europa,
 ZETT., Dipt. Scand., VIII, 3212, 5, [*Siphona*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., XII, 4685, 1—2, [*Siphona*] (1858); SCHN., F. A., I, 521, [*Siphona*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 126, [*Siphona*] (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. V, f. 83, [*Siphona*] (1889); PAXD., Rev. entom., XIII, 408, 3, [*Siphona*] (1894).

geniculata FALL. (nec DEG.), Dipt. succ. Haemat., 5, 2, [*Stomorvys*] (1818); MEIG., S. B., IV, 155, 1, [*Siphona*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 620, 1, [*Siphonia*] (1838) et Dipt. Scand., III, 989, 1, [*Siphona*] (1841).

tachinaria MEIG., S. B., IV, 156, 3, t. XXXVII, f. 25, [*Siphona*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 94, 3, [*Siphona*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), III, 294, [*Siphona*] (1845); R.-D., Posth., I, 696, (1863).

dorsalis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 410, [*Siphona*] (1891); Europa-centr.
 est nomen nudum.

flavifrons STAEG. ap. ZETT., Dipt. Scand., VIII, 3211, 2, [*Siphona*] Europa-centr.
 (1849); SCHN., F. A., I, 522, [*Siphona*] (1862); BECH., Denkschr. et sept.
 Akad. Wien, XLV, t. IV, f. 25, (1882).

fuscicornis R.-D. = **geniculata** DEG.

✓ **geniculata** DEG.^{**)}, Mem. ins., VI, 20, 15, t. II, f. 19—23, [*Musca*] Europa,
 (1776) et ed. Götze, 38, 15, [*Musca*] (1782); VALL., Entom. lin., III, 526, 299, [*Musca*] (1789); St. FARG. SERV., Enc. méthod., X, 501, (1825); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 309, 1, [*Siphona*] (1831).

*) *Mamestra pisi* L., *Plusia gamma* L., *Pyrausta aurata* Scop., *Thaumetopoea pityocampa* Scop. — ?*Anthomyia nigrirarsis* BRUNCKE, *Tipula maxima* PODA.

**) *Agrotis plecta* L., *Mamestra brassicae* L.

Suit. à Buff., II. 93. 1. t. XIV. f. 6. [*Siphona*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 294. 1. t. VI. f. 13. [*Siphona*] (1845); Bocche, Naturg., 208. 3. [*Siphona*] (1834); R.-D., Myod., 91. 1. [*Siphona*] (1830). Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 202. 1. [*Siphona*] (1850) et Posth., I. 692. 1. (1863); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 680. (1849) et Ins. Brit., II. 12. 1. t. XI. f. 7. (1853); STAEG. ap. ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3210. 1. [*Siphona*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6064. 1. [*Siphona*] (1859); ROXD., Dipt. ital. Prodr., III. 10. 1. [*Siphona*] (1859); SCHN., F. A., I. 521. [*Siphona*] (1862); BOSSO., Fiml. Insekt., II. 35. 1. [*Siphona*] (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 126. [*Siphona*] (1891); PAND., Rev. entom., XIII. 108. 2. [*Siphona*] (1891); COQUILL., Rev. Tachin. N. A., 76. [*Siphona*] (1897).

analis R.-D., Myod., 92. 3. [*Siphona*] (1830). Annal. Soc. entom.

France, (3). VIII. 206. 7. [*Siphona*] (1850) et Posth., I. 696.

6. (1863); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3210. [*Siphona*] (1849).

cinerea LATR., Gen. crust. ins., IV. 339. (1809) et Cons. gén.,

444. (1810); LAM., Anim. s. vert., III. 394. 1. (1816); Macq.,

Soc. Sci. Lille, 1833. 309. 2. t. V. f. 5. [*Siphona*] (1834) et

Suit. à Buff., II. 94. 2. [*Siphona*] (1835).

? *cinerea* MEG., S. B., IV. 156. 2. [*Siphona*] (1824); R.-D., Myod.,

91. 2. [*Siphona*] (1830); ROXD., Dipt. ital. Prodr., III. 11. 2.

[*Siphona*] (1859).

consimilis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 205. 6.

[*Siphona*] (1850) et Posth., I. 694. 3. (1863).

fascicornis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 205. 5.

[*Siphona*] (1850) et Posth., I. 696. 7. (1863).

illinoënsis TYL.-TOWNS., Trans. Amer. entom. Soc., XVIII. 368.

[*Siphona*] (1891).

Meigenii ST. FARG. SERV., Enc. méthod., X. 501. (1825).

minuta FABR., Syst. Antl., 282. 17. [*Stomoxys*] (1805); STAEG.

ap. ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3211. 3. [*Siphona*] (1849);

PAND., Rev. entom., XIII. 108. 5. [*Siphona*] (1894).

nigrorittata MEG., S. B., IV. 157. 4. [*Siphona*] (1824); ST.

FARG. SERV., Enc. méthod., X. 501. (1825).

pasilla R.-D., Myod., 92. 4. [*Siphona*] (1830). Annal. Soc. entom.

France, (2). VIII. 203. 4. [*Siphona*] (1850) et Posth., I. 698.

9. (1863).

quadrinota ROXD., Dipt. ital. Prodr., III. 10. (*lapsus*) (1859).

quadrinotata R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 203.

2. [*Siphona*] (1850) et Posth., I. 694. 2. (1863).

tristis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 203. 3.

[*Siphona*] (1850) et Posth., I. 695. 4. (1863).

urbana HARR., Expos. engl. Ins., 153. t. XLV. f. 85. [*Musca*]

(1776).

geniculata FALL. = *cristata* FABR.

grandistyla PAND., Rev. entom., XIII. 108. 1. [*Siphona*] (1894).

Gallia mer.

- humeralis* R.-D. **testacea** R.-D.
illinoensis TYL.-TOWNS. **geniculata** DEG.
maculata ZETT. **analis** MEIG.
maculipennis MEG., S. B., VI, 365, 6. [*Siphona*] (1830); MACQ., Europaeentr.
 Suitt. à Buff., II, 94, 4. [*Siphona*] (1835).
Meigenii ST. FARG. SERV. **geniculata** DEG.
melanocera R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 206, 8. Gallia.
 [*Siphona*] (1850) et Posth., I, 697, 8. (1863).
minuta FABR. **geniculata** DEG.
nigrovittata MEIG. **geniculata** DEG.
oculata PAND., Rev. entom., XIII, 108, 4. [*Siphona*] (1894). Germania.
palpina ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6064, 1—3. [*Siphona*] (1859). Scandinavia.
pauciseta ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 193. [*Siphona*] (1865). Italia.
pusilla R.-D. **geniculata** DEG.
quadrisepta ROND. **geniculata** DEG.
quadrinotata R.-D. **geniculata** DEG.
securicornis EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV, 296. [*Thyptocera*] (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 439. [*Siphona*] (1891). Austria.
silvatica R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 208, 11. [*Siphona*] (1850) et Posth., I, 699, 11. (1863). Gallia.
tachinaria MEIG. **cristata** FABR.
testacea R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 207, 9. [*Siphona*] (1850) et Posth., I, 695, 5. (1863). Gallia.
 humeralis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 207, 10. [*Siphona*] (1850) et Posth., I, 700, 12. (1863).
tristis R.-D. **geniculata** DEG.
arbana FABR. **geniculata** DEG.

Blepharomyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 105. (1889) et LX, 149. (1893).

- amplicornis* ZETT. **pagana** MEIG.
incerta MEADE **pagana** MEIG.
pagana MEG., S. B., IV, 362, 213. [*Tachina*] (1824) et VII, 260, 1. Europaeentr.
 [*Harrisia*] (1835); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 145. (1900). et sept.
 amplicornis ZETT., Dipt. Scand., III, 1152, 151. (1844) et XIII, 6129, 151. [*Tachina*] (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, I, V, t. 98. (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 326. [*Erarista*] (1891); STROLL, Mittheil. Ver. Stierm., XXX, 45. (1894); PAND., Rev. entom., XIV, 328, 13. [*Mesquaritia*] (1895).
 incerta MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), VIII, 223. [*Phorocera*] (1897); AUSLÉN, Entom. Monthly Mag., (2), IX, 35. (1898); GRIMSH., The Natur., 1898, 103. [*Phorocera*] (1898); VERR., List Brit. Dipt., ed. 2, 25. (1901).

Neaera

R.-D., Myod., 84. III. (1830).

Glaucophana B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 354. (1891) et LX. 149. (1893).

Thopsia R.-D., Posth., I. 689. VIII. (1863) *nee* ALB. 1860. Moll.

- albicollis** MEG., S. B., IV. 350. 193. [*Tachina*] (1824) et VII. 243. 12. [*Thryptocera*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 290. 9. t. VI. f. 9. [*Thryptocera*] (1845); R.-D., Posth., I. 690. 1. [*Thopsia*] (1863); STEIX, Entom. Nachricht., XXVI. 131. (1900).
immaculata R.-D., Myod., 85. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 89. 5. [*Thryptocera*] (1835).
laticornis MEG., S. B., IV. 351. 194. [*Tachina*] (1824) et VII. 243. 4. [*Thryptocera*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 89. 6. [*Thryptocera*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). III. 286. 2. t. VI. f. 5. [*Thryptocera*] (1845); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 188. 1. (1850) et Posth., I. 670. 1. (1863); ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., II. 185. 1. (1859) et Dipt. ital. Prodr., IV. 154. (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 90. (1889) et LX. 187. [*Glaucophana*] (1893); PAND., Rev. entom., XV. 90. 1. (1896); STEIX, Entom. Nachricht., XXVI. 141. (1900).
- amasiae** B. B.*), Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 355. [*Glaucophana*] (1891); MÜK, Wien. entom. Zeitg., XI. 184. II. (1892). Europa mer., Asia min.
- atra** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 189. 2. (1850) et Posth., I. 671. 2. (1863); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). V. 73. (1896). Europacentr.
- immaculata* R.-D. - **albicollis** MEG.
laticornis MEG. - **albicollis** MEG.
- longiradix** PAND., Rev. entom., XV. 91. 2. (1896). Europacentr.

Parastauferia

POKOR., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 3. (1893).

- alpina** POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 4. (1893). Alpes.

Digonochaeta

- ROXD., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (2). III. 25. [*Bigonicheta*] (1845) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 577. [*Bigonicheta*] (1868) *em.* VERR., ap. SEVDD. 1882.

Ramburia R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 189. V. (1851).

Trichoneura LLOY, Atti Istit. ven., (3). IX. 1341. (1864) *nee* Lw. 1845. Dipt.

* Depressaria veneficiella ZELL.

A. *Goniocera*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 354, (1891) et LX, 149, (1893).

schistacea B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 354, (1891). Europa-centr.B. *Digonochaeta* s. str.B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 103^z, (1889) et LX, 150, [*Bigonichaeta*] (1893).*Marietti* ROSS. **setipennis** FALL.**setipennis** FALL.*), Vet. Acad. Handl., XXXI, 270, [*Tachina*] (1810) Europa.

et Dipt. succ. Musc., 19, 37, [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV, 349, 191, [*Tachina*] (1824) et VII, 242, 1, t. LXXI, f. 12-15, [*Thryptocera*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 293, 4, [*Pales*] (1834) et Annal. Soc. entom. France, (2), III, 285, 1, t. VI, f. 4, [*Thryptocera*] (1845); ZEFF., Dipt. Scand., III, 1082, 79, (1844), VIII, 3229, 79, (1849) et XI, 4314, 79, [*Tachina*] (1858); LAW., Stettin. entom. Zeitg., XI, 379, [*Tachina*] (1850); BOHEM., Vet. Akad. Handl., VII, 211, (1850) et VIII, 154, [*Tachina*] (1851); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), IX, 189, 1, [*Rambaria*] (1851) et Posth., I, 727, 1, [*Rambaria*] (1863); ROSS., Dipt. ital. Prodr., III, 26, 1, (1859); SCHM., F. A., I, 518, [*Thryptocera*] (1862); BOSSD., Fönnl. Insekt., II, 69, [*Tachina*] (1866); WULF, Entom. Tijdschr., (2), IV, 153, [*Thryptocera*] (1869); MEADE, Entom., XV, 24, [*Thryptocera*] (1882); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII, 76, (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. V, f. 87, (1889); PAND., Rev. entom., XV, 71, 3, (1896); WULF et MEIG., N. Naamlijst ned. Dipt., 85, [*Thryptocera*] (1898).

articulata MEIG. in litt. ap. B. B.

Marietti ROSS., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (2), III, 25, (1845) et Dipt. ital. Prodr., III, 26, 2, (1859); JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XIX, 13, 22, [*Thryptocera*] (1885).

spinipennis MEIG.*²), S. B., IV, 350, 192, [*Tachina*] (1824) et VII, 243, 7, [*Thryptocera*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II, III, 25, Europa-centr. et mer.

[*Scenometopia*] (1835); BOHEM., Naturgesch., 59, 12, [*Tachina*] (1834); WALK., Ins. Brit., II, 89, 159, [*Tachina*] (1853); SCHM., F. A., I, 518, nota, [*Thryptocera*] (1862); LOY, Atti Istit. ven., (3), IX, 1341, [*Trichocera*] (1864); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 128, (1891).

zonata MEIG., S. B., VII, 243, 2, [*Thryptocera*] (1838). Germania.

*¹) *Grapholitha strobilella* L., *Notodonta trepida* Esch., *Pheosia tremula* CL. ? *Forficula auricularia* L.

*²) *Lasineampa quereus* L., *Panolis griseovariegata* GORTZ.

Actia

R.-D., Myod., 85, IV, (1830).

Caenis R.-D., Posth., I, 675, IV, (1863) *nee* STEPH. 1836.
Neuropt.*Ceranthia* R.-D., Myod., 88, VI, (1830).*Ceromyia* R.-D., Myod., 86, V, (1830).*Cerophora* R.-D., Posth., I, 700, X, (1863) *nee* D'ORB. 1842. Moll.*Elfia* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 190, (1850).*Entomophaga* LIOY, Atti Istit. ven., (3), IX, 1332, (1864).*Gymnophthalma* LIOY, Atti Istit. ven., (3), IX, 1341, (1864).*Herbstia* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), IX, 184, II,
(1851) *nee* EDW. 1834. Crust.*Lythia* R.-D., Posth., I, 707, XIV, (1863).*Osmava* R.-D., Myod., 84, II, (1830).*Peribaca* R.-D., Posth., I, 720, III, (1863).*Talmonia* R.-D., Posth., I, 704, XII, (1863).*Thryptocera* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 310, (1834).*Vafcellia* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 191, III,
(1850).**A. Actia s. str.***Gymnoparia* B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 103, (1889)
et LX, 150, [*Gymnoparcja*] (1893).*abdominalis* R.-D. == **fulvipes** R.-D.*americana* TYL.-TOWNS. -- **pilipennis** FALL.**anomala** ZETT., Dipt. Scand., VIII, 3213, 2 et 3231, *obs.* 2, [*Siphonaf*] Europa.
(1849); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 219 et 220, [*Gymno-*
paria] (1893); PAND., Rev. entom., XIII, 112, 9, [*Thryptocera*]
(1894).**antennalis** RONDI., Dipt. ital. Prodr., III, 16, 5, [*Thryptocera*] (1859), Italia.**apicalis** R.-D.)*, Posth., I, 721, 1, [*Peribaca*] (1863), Gallia.*flavicornis* R.-D., Posth., I, 721, 2, [*Peribaca*] (1863).*minuta* R.-D., Posth., I, 722, 3, [*Peribaca*] (1863).**aristalis** RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 194, [*Thryptocera*] Italia.
(1865).**atra** MACQ., Suit. à Buff., H, 91, 10, [*Thryptocera*] (1835), Gallia mer.**biarticulata** MEXX., Bull. Soc. entom. France, 1895, CCXCV, [*Thrypto-*
cera] (1895), Belgium.**bicolor** MACQ. (*nee* MEIG.), Soc. Sci. Lille, 1833, 312, 4, [*Thrypto-*
cera] (1834), Gallia.*) *Toxocampa pastinum* Tr.

- bicolor** MEIG.^{*)}, S. B., IV, 354, 199. [*Tachina*] (1824) et VII, 243. Europa.
 10. [*Thryptocera*] (1838); RATZEB., Forstins., III, 172. [*Tachina*]
 (1844); MACQ., Suit. à Buff., II, 89, 4, t. XIV, f. 5. [*Thryptocera*]
 (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), III, 288, 6, t. VI, f. 8.
 [*Thryptocera*] (1845); ZETT., Dipt. Scand., VIII, 3231, 41—42.
 [*Tachina*] (1849); WALK., Ins. Brit., II, 67, 109. [*Tachina*] (1853);
 SCHIX., F. A., I, 519. [*Thryptocera*] (1862); R.-D., Posth., I, 383,
 3 et II, 918. [*Ceromyia*] (1863); LIOY, Atti Istit. ven., (3), IX,
 1332. [*Entomophaga*] (1864); BOSSD., Fimml. Insekt., II, 59, 32.
 [*Tachina*] (1866); MEADE, The entom., XV, 140. [*Thryptocera*]
 (1882) et Entom. Monthly Mag., (2), II, 127. [*Thryptocera*] (1891);
 STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 42. [*Thryptocera*] (1894);
 PAND., Rev. entom., XIII, 112, 7. [*Thryptocera*] (1894); STRIX,
 Entom. Nachricht., XXVI, 133, (1900).
testacea R.-D., Myod., 88, 4. [*Ceromyia*] (1830) et Annal. Soc.
 entom. France, (2), VIII, 199, 8. [*Ceromyia*] (1850); MACQ.,
 Soc. Sci. Lille, 1833, 312, 6, t. V, f. 6. [*Thryptocera*] (1834)
 et Suit. à Buff., II, 90, 8. [*Thryptocera*] (1835).
- Bigoti** MILL.^{**}), Ann. Soc. Linn. Lyon, XI, 385, t. XLVI. [*Morinia*] Gallia.
 (1864); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 563. [*Thryptocera*]
 (1894).
- ciliata** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 134, 10, t. VI, f. Helvetia.
 12. [*Thryptocera*] (1848).
- cinerea** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 313, 8. [*Thryptocera*] (1834). Gallia.
cingalata R.-D. - ?**frontalis** MACQ.
- claripennis** R.-D., Posth., I, 716, 6. [*Thryptocera*] (1863). Gallia.
- crassicornis** MEIG.^{***}), S. B., IV, 351, 195. [*Tachina*] (1824) et VII, Europa.
 243, 6. [*Thryptocera*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II, 114, 35.
 [*Senomctopia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), III, 286,
 3, t. VI, f. 6. [*Thryptocera*] (1845); ZETT., Dipt. Scand., III, 1046,
 38. [*Tachina*] (1844); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), IX,
 181, 2. [*Thryptocera*] (1851) et Posth., I, 713, 2. [*Thryptocera*]
 (1863); SCHIX., F. A., I, 518. [*Thryptocera*] (1862); LIOY, Atti
 Istit. ven., (3), IX, 1341. [*Gynonophthalma*] (1864); BOSSD., Fimml.
 Insekt., II, 57, 28. [*Tachina*] (1866); WACHTL, Wien. entom. Zeitg.,
 I, 277, 24. [*Thryptocera*] (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien,
 LVI, t. V, f. 88, (1889) et LVIII, 355. [*Gynonoparia*] (1891);
 MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 127. [*Thryptocera*] (1891);
 STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 42. [*Thryptocera*] (1894);
 PAND., Rev. entom., XIII, 110, 3. [*Thryptocera*] (1894); STRIX,
 Entom. Nachricht., XXVI, 134, (1900).

) *Lasiocampa quereus* L., *Scardia boleti* F., *Tephroclystia*
denotata Hb.

*) *Tortrix promibana* Hb.

**) *Depressaria Heydenii* ZELL., *Evetria buhiana* SCHIFF., *resinella* L., *Tortrix viridana* L.

- curvicornis** MEIG., S. B., VII, 254, 5. [*Roeselia*] (1838); SCHN., F. A., I, 520. [*Thryptocera*] (1862). Europa centr.
- discicornis** PAND., Rev. entom., XIII, 109, 2. [*Thryptocera*] (1894). Gallia mer.
- erythroceræ** R.-D., Myod., 87, 1. [*Ceromyia*] (1830), Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 194, 1. [*Ceromyia*] (1850) et Posth., I, 682, 2. [*Ceromyia*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 312, 5. [*Thryptocera*] (1834) et Suit. à Buff., II, 90, 5. [*Thryptocera*] (1835). Gallia.
- exaculeata** PAND., Rev. entom., XIII, 113, 11. [*Thryptocera*] (1894). Germania.
- exoleta** MEIG.)*, S. B., IV, 353, 197. [*Tachina*] (1824) et VII, 243, 11. [*Thryptocera cæsoleta*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II, 89, 3. [*Thryptocera*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), III, 289, 8, t. VI, f. 10. [*Thryptocera*] (1845); SCHN., F. A., I, 520. [*Thryptocera*] (1862); R.-D., Posth., I, 717, 8. [*Thryptocera*] (1863); LLOY, Atti Istit. ven., (3), IX, 1332. [*Entomophaga*] (1864); ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 194. [*Thryptocera*] (1865) et Bull. Soc. entom. ital., IV, 210. [*Thryptocera*] (1872); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 42. [*Thryptocera*] (1894); MIK, Wien. entom. Zeitg., XIV, 102. [*Thryptocera*] (1895); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 136. (1900).**) Europa centr.
- flavicornis** R.-D., Posth., I, 708, 1. [*Lythia*] (1863). Gallia.
- flavicornis* R.-D. (Per.) — **apicalis** R.-D.
- flavipalpis** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 135, 11. Helvetia.
[*Thryptocera*] (1848).
- flavipes* R.-D. — **fulvipes** R.-D.
- flavisquamis** R.-D., Rev. Mag. Zool., III, 3, 3. [*Thryptocera*] (1851), Annal. Soc. entom. France, (2), IX, 181, 1. [*Thryptocera*] (1851) et Posth., I, 712, 1. [*Thryptocera*] (1863). Gallia.
- fracticornis** MEIG., S. B., VII, 243, 3. [*Thryptocera*] (1838). Germania.
- frontalis** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), III, 289, 7, t. VI, f. 3. [*Thryptocera*] (1845); SCHN., F. A., I, 518. [*Thryptocera*] (1862); BIG., Annal. Soc. entom. France, (6), II, 9. [*Thryptocera*] (1882); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 128. (1891). Europa.
- ?cingulata* R.-D., Myod., 86, 1. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 190, 1. [*Elfia*] (1850) et Posth., I, 673, 1. [*Elfia*] (1863); MACQ., Suit. à Buff., II, 92, 15. [*Thryptocera*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VIII, 3250. (1849).
- lamia* MEIG., S. B., VII, 254, 4. [*Roeselia*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III, 1083, 80. [*Tachina*] (1844); ROSD., Dipt. ital. Prodr., IV, 152, 2. (1861); BOSSD., Finnl. Insekt., II, 69, 53. [*Tachina*] (1866); PAND., Rev. entom., XIII, 110, 5. [*Thryptocera*] (1894).
- lamina* SCHN., F. A., I, 518. [*Thryptocera*] (1862).

*) Polia flavicincta F.

**) fimbriata MEIG., ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 410. [*Gynoparia*] (1891) *mihî ignota*.

- obscurella* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), IX, 187, 2. (1851) et Posth., I, 724, 2. (1863).
- pilipennis* R.-D., Myod., 86, 2. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2), IX, 186, 1. (1851) et Posth., I, 723, 1. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 313, 9, t. V, l. 7. [*Thryptocera*] (1834) et Suit. à Buff., II, 92, 16. [*Thryptocera*] (1835); HART., p. p., Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I, 291, 18. [*Tachina*] (1838).
- vitripennis* Roxb., Dipt. ital. Prodr., I, 60. (1856), III, 19, 1. (1859) et IV, 152, 1. (1861).
- fulvipes** R.-D., Myod., 88, 1. [*Cerauthia*] (1830), Ann. Soc. ent. France, (2), VIII, 200, 1. [*Cerauthia*] (1850) et Posth., I, 685, 1. [*Cerauthia*] (1863); Macq., Suit. à Buff., II, 91, 11. [*Thryptocera*] (1835). Gallia.
- abdominalis* R.-D., Myod., 87, 2. [*Cerauthia*] (1830), Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 197, 5. [*Cerauthia*] (1850) et Posth., I, 687, 3. [*Cerauthia*] (1863); Macq., Suit. à Buff., II, 90, 6. [*Thryptocera*] (1835).
- flavipes* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 200, 1. [*Cerauthia*] (1848).
- grisea* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 198, 6. [*Ceromyia*] (1850) et Posth., I, 688, 5. [*Cerauthia*] (1863).
- microcera* R.-D., Myod., 88, 5. [*Ceromyia*] (1830), Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 199, 7. [*Ceromyia*] (1850) et Posth., I, 689, 6. [*Cerauthia*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 312, 7. [*Thryptocera*] (1834) et Suit. à Buff., II, 91, 9. [*Thryptocera*] (1835).
- poducina* R.-D., Myod., 89, 2. [*Cerauthia*] (1830), Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 191, 1. [*Vafrellia*] (1850) et Posth., I, 674, 1. [*Vafrellia*] (1863).
- rubrifrons* R.-D., Myod., 87, 3. [*Ceromyia*] (1830), Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 197, 4. [*Ceromyia*] (1850) et Posth., I, 686, 2. [*Cerauthia*] (1863); Macq., Suit. à Buff., II, 90, 7. [*Thryptocera*] (1835).
- virida* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 196, 3. [*Ceromyia*] (1850) et Posth., I, 687, 4. [*Cerauthia*] (1863).
- funesta** R.-D., Posth., I, 701, 1. [*Cerophora*] (1863). Gallia.
- grisea* R.-D. (*Cer.*) = **fulvipes** R.-D.
- ?**grisea** R.-D., Myod., 84, 1. [*Osmata*] (1830), Annal. Soc. entom. France, (2), IX, 188, 1. [*Osmata*] (1851) et Posth., I, 725, 1. [*Osmata*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 311, 3. [*Thryptocera*] (1834) et Suit. à Buff., II, 88, 2. [*Thryptocera*] (1835). Gallia.
- humeralis** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), IX, 183, 5. [*Thryptocera*] (1851), Rev. Mag. Zool., III, 3, 4. [*Thryptocera*] (1851) et Posth., I, 716, 7. [*Thryptocera*] (1863). Gallia.
- infantula** Zett.†), Dipt. Scand., III, 1047, 39. [*Tachina*] (1814); Europacentr. et sept.

†) *Evetria resinella* L., *Grapholitha cosmophorana* Tr., *Scrivillana* Dyr.

BOSSD., Finnl. Insekt., II, 58, 29. [*Tachina*] (1866); WOLF et MELL., N. Naamlist ned. Dipt., 85. [*Thryptocera*] (1898).

lamia MEIG. = **frontalis** Macq.

lamina SCHIS. = **frontalis** Macq.

ludibunda R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 195, 2. Gallia.
[*Ceromyia*] (1850) et Posth., I, 681, 1. [*Ceromyia*] (1863).

maculiventris BOH. = **pictiventris** ZETT.

magica MEIG., S. B., IV, 355, 201. [*Tachina*] (1824) et VII, 253, 3. Europacentr.
[*Roeselia*] (1838); Macq., Suit. à Buff., II, 92, 13. [*Thryptocera*] (1835); SCHIS., F. A., I, 520. [*Thryptocera*] (1862); KARSCH, Berl. entom. Zeitschr., XXX, 135. (1886).

microcera R.-D. = **fulvipes** R.-D.

minuta R.-D. = **apicalis** R.-D.

minutissima ZETT., Dipt. Scand., III, 1069, 64. [*Tachina*] (1844); Europacentr.
BOSSD., Finnl. Insekt., II, 63, 41. [*Tachina*] (1866); MEADE, et sept.
Entom. Monthly Mag., (2), III, 127. [*Thryptocera*] (1892).

nigrifrons R.-D., Posth., I, 714, 4. [*Thryptocera*] (1863). Gallia.

nigrina MEIG., S. B., IV, 355, 202, t. XL, f. 32. [*Tachina*] (1824) et Europacentr.
VII, 253, 2. [*Roeselia*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III, 1070, 65. et sept.
(1844) et VIII, 3237, 65. [*Tachina*] (1849); BOSSD., Finnl. Insekt., II, 64, 42. [*Tachina*] (1866).

nigripalpis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), IX, 182, 3. Gallia.
[*Thryptocera*] (1851) et Posth., I, 714, 3. [*Thryptocera*] (1863).

obscurella R.-D. = **frontalis** Macq.

palpalis ROXD. = **pilipennis** FALL.

pictiventris ZETT., Dipt. Scand., XII, 4691, 36. [*Tachina*] (1853). Scandinavia.
maculiventris BOH. (nec ZETT.), Acta Holmiae, 1851, 201. [*Tachina*] (1851).

pilipennis FALL. (*), Vet. Acad. Handl., XXXI, 275. [*Tachina*] (1810) Europa.
et Dipt. suec. Musc., 18, 35. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV, 352, 196. [*Tachina*] (1824) et VII, 243, 8. [*Thryptocera*] (1838); Macq., Suit. à Buff., II, 113, 31. [*Scenometopia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), III, 287, 4, t. VI, f. 7. [*Thryptocera*] (1845); HART., p. p., Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I, 291, 18. [*Tachina*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III, 1045, 37. [*Tachina*] (1844); RATZER, Forstins., III, 172, 10. [*Tachina*] (1844); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), IX, 182, 4. [*Thryptocera*] (1851) et Posth., I, 715, 5. [*Thryptocera*] (1863); ROXD., Dipt. ital. Prodr., III, 14, 2. [*Thryptocera*] (1859); SCHIS., F. A., I, 519. [*Thryptocera*] (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., II, 57, 27. [*Tachina*] (1866); WOLF, Entom. Tijdschr., (2), IV, 153. [*Thryptocera*] (1869); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I, 278, 26. [*Thryptocera*] (1882); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 127. [*Thryptocera*] (1891);

*) *Depressaria costosa* Hw., *litorella* Hb., *scopariella* HEIN., *Eucetia buoliana* SCHEFF., *resinella* L., *Olethreutes Schulziana* F., *Tortrix viridana* L., *Yponomeuta evonymella* L.

- PAND., Rev. entom., XIII. 110. 4. [*Thryptocera*] (1896); MIK ET WACHTEL, Wien. entom. Zeitg., XIV. 231. [*Gymnopaeria*] (1895); COQUILL., Rev. Tachin. N. A., 59. (1897); COCCHI, Bull. Soc. entom. ital., XXIX. 3. 29. [*Thryptocera*] (1898); WULF ET MELL., N. Nammlist ned. Dipt., 85. [*Thryptocera*] (1898); GIBBSCH., Entom. Nachricht., XXV. 177. 2. [*Gymnopaeria*] (1899); MELL., Zool. Jahrbüch., XV. 681. [*Tryptocera*] (1901).
- americana* TYL.-TOWNS., Can. Entom., XXIV. 69. [*Thryptocera*] (1892).
- palpalis* RONDI., Dipt. ital. Prodr., III. 14. 3. [*Thryptocera*] (1859).
- ? resinellae* SCHIRANK, Beitr. z. Naturg., 42. 1. [*sine nomine*] (1776) et Enum. ins., 478. 973. [*Musca*] (1781); VILL., Entom. Linn., III. 546. 378. [*Musca*] (1789).
- pilipennis* R.-D. = **frontalis** MACQ.
- podacina* R.-D. = **fulvipes** R.-D.
- pomonellae** SCHNABL ET MOKRZ*, Rev. russe d'entom., 1903. 211. Tannia.
[*Thryptocera*] (1903).
- prasinanae** WULF**, Entom. Tijdschr., (2). IV. 151. t. IV. f. 20. Hollandia.
[*Thryptocera*] (1869).
- prompta** R.-D.***, Posth., I. 676. 1. [*Cucanis*] (1863). Gallia.
- resinellae* SCHIRANK = ? **pilipennis** FALL.
- rubrifrons* R.-D. = **fulvipes** R.-D.
- rufina** ZETT., Ins. Lapp., 641. 33. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III. 1048. 41. (1844), VIII. 3231. 41. [*Tachina*] (1849); BOSSD., Fönnl. Insekt., II. 58. 31. [*Tachina*] (1866); PAND., Rev. entom., XIII. 112. [*Thryptocera*] (1894). Europa.
- Schineri** STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXXI. 125. [*Gymnopaeria*] Austria.
(1895).
- securicornis* SCHN. (nec Egg.) in coll.
- scutellaris** RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 195. [*Thryptocera*] Italia.
(1865).
- selecta** PAND., Rev. entom., XIII. 112. 8. [*Thryptocera*] (1894). Gallia mer.
- Siebeckii** SINTEN., Stettin. entom. Zeitg., LVIII. 151. 1. [*Thryptocera*] Russia sept.
(1897).
- silacea** MEG., S. B., IV. 355. 209. [*Tachina*] (1824) et VII. 243. 9. Europacentr.
[*Thryptocera*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). III. et mer.
287. 5. t. VI. f. 2. [*Thryptocera*] (1845); RONDI., Dipt. ital. Prodr., III. 13. 1. [*Thryptocera*] (1859); SCHN., F. A., I. 518. [*Thryptocera*] (1862); R.-D., Posth., I. 718. 9 [*Thryptocera*] (1863); PAND., Rev. entom., XIII. 111. 6. [*Thryptocera*] (1894).
- siphonoides** STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXXIV. 235. [*Thryptocera*] Austria.
(1898).

*) *Carpocapsa pomonella* L.**) *Hylophila prasinana* L.***) *Tenthredo* sp.?

- spatulata** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 190, 2. [*Elfia*] Gallia.
(1850) et Posth., I, 673, 2. [*Elfia*] (1863).
- testacea** R.-D. — **bicolor** MEIG.
- tibialis** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), IX, 185, 1. [*Herbstia*] Europacentr.
(1851) et Posth., I, 720, 1. [*Herbstia*] (1863); ROXB., Dipt. ital. et mer.
ital. Prodr., III, 15, 4. [*Thryptocera*] (1859); STROB., Wien. entom.
Zeig., XII, 94. [*Thryptocera*] (1893); PAND., Rev. entom., XIII,
109, 1. [*Thryptocera*] (1894); BRACER, Sitzgsber. Akad. Wien,
CVII, 505, 85. (1897).
- tibialis** R.-D., Posth., I, 705, 1. [*Talmonia*] (1863). Gallia.
- viripennis** ROXB. — **frontalis** MACQ.
- virida** R.-D. — **fulvipes** R.-D.
- zonella** ZETT., Dipt. Scand., III, 1068, 63. (1844) et VIII, 3235, 63. Scandinavia.
[*Tachina*] (1849).

B. *Thryptocera*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 102. (1889) et LX, 150. (1893).

- latifrons** MEIG., S. B., IV, 365, 217. [*Tachina*] (1824) et VII, 243, 5. Europacentr.
[*Thryptocera*] (1838); SCHN., F. A., I, 519. [*Thryptocera*] (1862); et mer.
B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. V, f. 84. [*Thryptocera*]
(1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), V, 72. [*Thryptocera*]
(1894); PAND., Rev. entom., XV, 103, 7. [*Pelcina*] (1896).
- securicornis** STROB. (nec Egg.), Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 42. Austria.
(1894), XXXI, 125. [*Thryptocera*] (1895) et Tief's Nachl., 57.
[*Thryptocera*] (1900); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 621.
(1894).
- versicolor** FALL.*), Dipt. succ. Muse., 19, 36. [*Tachina*] (1820); MEIG., Europa.
S. B., IV, 354, 198. [*Tachina*] (1824) et VII, 243, 13. [*Thrypto-*
ceras] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III, 1047, 40. (1844), VIII, 3230,
40. (1849) et XII, 4692, 40. [*Tachina*] (1858); BOSSD., Finl.
Insekt., II, 58, 30. [*Tachina*] (1866); STROB., Mittheil. Ver.
Steierm., XXX, 43. [*Thryptocera*] (1894).

Clausicella

ROXB., Dipt. ital. Prodr., I, 61, 5. (1856) et III, 21, 5. (1859).

A. *Clausicella* s. str.

- suturata** ROXB., Dipt. ital. Prodr., III, 22, 1. (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. V, f. 86. (1889); PAND., Rev. entom., Europacentr.
et mer.
XIII, 113, 10. [*Thryptocera*] (1894).
- suturalis** B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 354. (1891).

*) *Drepana lacertinaria* L.

B. *Histoglossa*

Rosa, Dipt. ital. Prodr., I, 77, 62, (1856) et IV, 101, 62, [*Istoglossa*] (1861) *em.* Scrup.
puella Roso., Dipt. ital. Prodr., I, 77, (1856) et IV, 101, 1, (1861). Italia.

Helocera

R.-D., Posth., I, 702, XI, [*Elloceria*] (1863) *em.* Mik 1883.

Stauféria B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 105, (1889) et LX, 151, (1893).

delecta Meig., S. B., IV, 349, 190, [*Tachina*] (1824) et VII, 243, 14. Europa.

6 v. d. l.
 [*Thryptocera*] (1838); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII, 182, 5, (1883) et Wien. entom. Zeitg., XI, 55, 100 et 110 (1892); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. V, f. 85, (1889) et LX, 114, 95, [*Stauféria*] (1893) et Wien. entom. Zeitg., XI, 108, [*Stauféria*] (1892).

diaphana B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 166, t. V, f. 99, [*Stauféria*] (1889) et LVIII, 443, (1891).

Kowarzi Now., Verh. nat. Ver. Brünn, VI, 94, [*Thryptocera*] (1868).

macrocera R.-D., Posth., I, 703, 1, (1863).

maculicentris Zett., Dipt. Scand., VIII, 3236, 63—64, [*Tachina*] (1849).

diaphana B. B. = **delecta** Meig.

Kowarzi Now. = **delecta** Meig.

macrocera R.-D. = **delecta** Meig.

maculicentris Zett. = **delecta** Meig.

Admontia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 101, (1889) et LX, 150, (1893).

Hypercheilina Schm., p. p., F. A., I, 536, 298, (1862).

amica Meig.⁵⁾ S. B., VII, 250, 12, [*Degeeria*] (1838); Schm., F. A., I, 535, [*Degeeria*] (1862); SERNI, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 43, (1891).

podomyia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 166, t. V, f. 92, (1889).

blanda Fall., Dipt. succ. Muse., 15, 29, [*Tachina*] (1820); Meig., S. B., IV, 101, 287, [*Tachina*] (1821) et VII, 219, 16, [*Degeeria*] (1838); Mège, Soc. Sci. Lille, 1833, 282, 11, [*Phorocera*] (1834); Suif, à Buff., II, 130, 27, [*Metopia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2) VIII, 150, 11, [*Degeeria*] (1850); Zett., Dipt. Scand.,

⁵⁾ *Tipula* sp.

III, 1073, 69, (1844), VIII, 3237, 69, (1849) et XIII, 6089, 69, [*Tachina*] (1859); R.-D., Posth., I, 947, 2, [*Medina*] (1863); BOSSD., Fiml. Insekt., II, 66, 46, [*Tachina*] (1866); SCHN., F. A., I, 534, [*Deggeeria*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 181, [*Deggeeria*] (1892).

Carceli R.-D., Myod., 140, 3, [*Medina*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 130, 28, [*Metopia*] (1835).

tristis R.-D., Myod., 140, 5, [*Medina*] (1830).

Winthemi R.-D., Myod., 140, 4, [*Medina*] (1830).

Carceli R.-D. = **blanda** FALL.

cincta PERR. = **metopina** SCHN.

cylindrica PAND. = **metopina** SCHN.

metopina SCHN., F. A., I, 537, [*Hyperectina*] (1862).

cincta PERR., Soc. Linn. Lyon, 1852, 62, [*Metopia*] (1852);

PAND., Rev. entom., XV, 113, 8, [*Latreillia*] (1896); VILLEN.,

Wien. entom. Zeïtg., XXV, 44, [*Metopia*] (1906).

cylindrica PAND. (nec R.-D.), Rev. entom., XV, 114, 10, [*Latreillia*] (1896).

podomyia B. B. = **amica** MEIG.

tristis R.-D. = **blanda** FALL.

Winthemi R.-D. = **blanda** FALL.

Europa centr.
et mer.

Trichoptaria

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 103, (1889) et LX, 151, [*Trichoptarcia*] (1893).

Dalii MEADE = **seria** MEIG.

macalisquama ZETT. = **seria** MEIG.

seria MEIG.*), S. B., IV, 408, 294, [*Tachina*] (1824) et VII, 249, 4, Europa centr.

[*Deggeeria*] (1838); SCHN., F. A., I, 535, [*Deggeeria*] (1862); WEYENB., et sept.

Tijdschr. Entom., (2), VII, LVIII, [*Deggeeria*] (1872); B. B.,

Denkschr. Akad. Wien, LVI, 103, t. V, f. 91, (1889); PAND.,

Rev. entom., XV, 114, 9, [*Latreillia*] (1896).

Dalii MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), V, 159, [*Deggeeria*]

(1894); VEER., List Brit. Dipt., 2 edit., 25, [*Urophylla*] (1901).

macalisquama ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6088, 67—68, [*Tachina*]

(1844).

Urophylla

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 104, (1889) et LX, 151, (1893).

leptotrichopa B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 104 et 106, t. Europa centr.

V, f. 93, (1889).

*) *Ctenophora pectinicornis* L., *Niphura atrata* L., *ruficornis* MEIG.

Craspedothrix

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 150. (1893).

acuta STROBL. **vivipara** B. B.

vivipara B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 209, 112. (1893); STROBL, *Europaeentr.*
Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 124. (1894).

acuta STROBL. (*acc* MEIG.), Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 29.
[*Polidea*] (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 620.
(1894).

Neaeropsis

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 151. (1893).

incurva ZETT., Dipt. Scand., III, 1033, 56. (1844) et NII, 6086, 56. *Europa.*
[*Tachina*] (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 222. (1893).

laticornis SCHIX. (*acc* MEIG.), F. A., I, 517. [*Thryplocera*] (1862);
B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 187. (1893).

lephrodes PAXE., Rev. entom., XV, 120, 8. [*Erynnia*] (1896).

laticornis SCHIX. **incurva** ZETT.

lephrodes PAXE. = **incurva** ZETT.

Discochaeta

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 104. (1889) et LX, 151-152. (1893).

cognata SCHIX. = **evonymellae** RATZEL.

evonymellae RATZEL.^{*)}, Forstins., III, 172. [*Tachina*] (1844); WACHTL, *Europaeentr.*
Wien. entom. Zeitg., VIII, 57, 1. [*Thryplocera*] (1889).

cognata SCHIX., F. A., I, 519. [*Thryplocera*] (1862); WACHTL,
Wien. entom. Zeitg., I, 278, 25. [*Thryplocera*] (1882); MEADE,
Entom. Monthly Mag., (2), II, 127. [*Thryplocera*] (1891);
Mk., Wien. entom. Zeitg., XIV, 93, 35. [*Thryplocera*] (1895).

incana B. B.^{**)}, Denkschr. Akad. Wien, LXIII, 355. (1891). *Austria.*

lithobii GARD.^{***)}, Annal. Soc. entom. France, 1893 et Le Natur., *Gallia.*
(2), 154, 178. [*Thryplocera*] (1893).

Arrhinomyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 105. (1889) et LX, 151, 152. (1893).

?*Afrellia* R.-D., Posth., I, 933, VI. (1863).

?*Elodia* R.-D., Posth., I, 936, VIII. (1863).

*) *Hypena rostralis* L., *Yponomeuta evonymella* L., *malinella*
ZELL., *padella* L., *rorella* L.

**) *Drepana cultraria* F.

***) *Lithobius* sp.

- Gravenhorstia* R.-D., Posth., I. 924, I. (1863) *see* DREWS 1836.
 ? *Ligeria* R.-D., Posth., I. 935, VII. (1863).
 ? *Vanzenia* R.-D., Posth., I. 941, X. (1863).
 ? *Westwodia* R.-D., Posth., I. 940, IX. [*Westwodia*] (1863)
see BRULLE.
- atrifida* PAND. = **tragica** MEIG.
atra R.-D., Posth., I. 941, I. [*Westwodia*] (1863). Gallia.
flavisquamis R.-D., Posth., I. 941, 2. [*Westwodia*] (1863).
fasciolata R.-D. = **gagatea** R.-D.
flavipalpis R.-D., Posth., I. 942, 1. [*Vanzenia*] (1863). Gallia.
flavisquamis R.-D. = **atra** R.-D.
gagatea R.-D., Posth., I. 938, 1. [*Elodia*] (1863). Gallia.
fasciolata R.-D., Posth., I. 938, 2. [*Elodia*] (1863).
pygmaea R.-D., Posth., I. 939, 3. [*Elodia*] (1863).
innoxia MEIG., S. B., IV. 405, 288. [*Tachina*] (1824) et VII. 240, 11. Europacentr.
 [*Masicera*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII. 484, 51, t. XV, f. 16. [*Masicera*] (1850); R.-D., Posth., I. 926, 2. [*Gravenhorstia*] (1863); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 140. (1900); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 162, 6. (1900).
longicornis R.-D., Posth., I. 925, 1. [*Gravenhorstia*] (1863).
leucomelas MEIG., S. B., IV. 379, 241. [*Tachina*] (1824) et VII. 261. Europacentr.
 6. [*Phorocera*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 129, 23. [*Metopia*] et mer.
 (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VIII. 428, 12, t. XII, f. 2. [*Phorocera*] (1850); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 142. (1900); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 161, 5. (1900).
longicornis R.-D. = **innoxia** MEIG.
nigrita R.-D., Posth., I. 931, 1. [*Afrellia*] (1863). Gallia.
petiolata R.-D. (*), Posth., I. 936, 1. [*Ligeria*] (1863). Gallia.
pygmaea R.-D. = **gagatea** R.-D.
separata MEIG., S. B., IV. 406, 290. [*Tachina*] (1824) et VII. 249. Europacentr.
 14. [*Degeeria*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 131, 29. [*Metopia*] et mer.
 (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VIII. 452, 16, t. XIII, f. 14. [*Degeeria*] (1850); ROXB., Dipt. ital. Prodr., IV. 45, 7. [*Degeeria*] (1861); SCHUS., F. A., I. 534. [*Degeeria*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. V, f. 97. (1889); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 44. [*Admontia*] (1894); PAND., Rev. entom., XV. 109, 2. [*Latreillia*] (1896).
tragica MEIG., S. B., IV. 408, 293. [*Tachina*] (1824) et VII. 249, 5. Europacentr.
 [*Degeeria*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII. 453, 18, t. XIII, f. 14. [*Degeeria*] (1850); ROXB., Dipt. ital. Prodr., IV. 45, 6. [*Degeeria*] (1861); SCHUS., F. A., I. 535. [*Degeeria*] (1862). et mer.
atrifida PAND., Rev. entom., XV. 44, 2. [*Roelsia*] (1896).

* teste PAND., Rev. entom., XV. 119. (1896) species haec *Anachactopsis ocypterina* ZETT. est.

Parahypostena

STROBL, Wien, entom. Zeitg., XVIII, 213. (1899).

diversipes STROBL, Wien, entom. Zeitg., XVIII, 213, 140. (1899). Hispania.

Hypostena

MEIG., S. B., VII, 239, 29. (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 22. (1855).

chaetigastra RONDI., Dipt. ital. Prodr., IV, 84, 2. (1861). Italia.

convexinervis MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 23, 4, 1. Gallia.
I. f. 4. (1855).

cylindracea ZETT. = **procera** RONDI.

fraeticornis MEIG., S. B., VII, 243, 3. (1838); SCHN., F. A., I, 519. Europaeentr.
[*Thryptocera*] (1862).

incisuralis MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 22, 2, 1, f. f. Europaeentr.
2. (1855). et mer.

plavigena PAND., p. p., Rev. entom., XV, 143, 5. [*Melanophora*]
(1896).

plavigena PAND. = **incisuralis** MACQ. et **procera** RONDI.

procera RONDI. (nec MEIG.), Dipt. ital. Prodr., IV, 84, 3. (1859); Europa.

SCHN., F. A., I, 537. (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2),
III, 150. (1892); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, t. V, f. 100.
(1889).

?*cylindracea* ZETT., Dipt. Scand., III, 1067, 61. [*Tachina*] (1814);
BOESD., Fiml. Insect., II, 63, 40. [*Tachina*] (1866); ? PAND.,
Rev. entom., XV, 107, 13. [*Peteina*] (1896).

selinervis SCHN. = **setiventris** MACQ.

setiventris MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 23, 3, 1, f. f. Europaeentr.
3. (1855); RONDI., Dipt. ital. Prodr., IV, 83, 1. (1861). et mer.

selinervis SCHN., F. A., I, 537. (1862).

signifera COQUILL., Proc. Unit. Stat. Museum, XXI, 331. (1898). Japonia.

vittigera COQUILL., Proc. Unit. Stat. Museum, XXI, 332. (1898). Japonia.

Microphana

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 355. (1891) et LX, 151. (1893).

minuta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 355. (1891). Europaeentr.

Urophyllodes

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 152. (1893).

hemichaeta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 101. [*Urophylla*] Europaeentr.
(1889).

Dexiinae.

Degeeria

MEIG., S. B., VII, 249, 37. (1838).

Amadoria B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 106. (1889) et
LVIII, 306. (1891).

Medina R.-D., p. p., Myod., 138, XVII. (1830).

Mollia R.-D., Posth., I, 949, II. (1863).

Velocia R.-D., Posth., I, 950, III. (1863).

ambulatoria MEIG. — **luctuosa** MEIG.

collaris FALL., Dipt. succ. Muse., 15, 27. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV, 403, 286. [*Tachina*] (1824) et VII, 249, 7, t. LXXI, f. 31—35. (1838); MACQ., Suit. à Buff., II, 130, 26. [*Metopia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 448, 8, t. XIII, f. 12. (1850); ZETT., Ins. Lapp., 637, 16. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III, 1072, 68. [*Tachina*] (1844); ROSS., Dipt. ital. Prodr., IV, 44, 5. (1861); SCHN., F. A., I, 534. [*Degeeria*] (1862); BOSSD., Fiml. Insekt., II, 65, 45. [*Tachina*] (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. VIII, f. 208. (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 180. (1892); PAND., Rev. entom., XV, 108, 1. [*Latreillia*] (1896); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 133. (1900).

cylindrica R.-D., Myod., 180, 2. [*Medina*] (1830) et Posth., I, 947, 1. [*Medina*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 282, 13. [*Phorocera*] (1834).

cylindroidea MACQ., Suit. à Buff., II, 130, 35. [*Metopia*] (1835).

ornata MEIG., S. B., VII, 249, 8. (1838); ZETT., Dipt. Scand., III, 1071, 67. [*Tachina*] (1844); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 448, 9, t. XIII, f. 13. (1850); SCHN., F. A., I, 534. (1862); BOSSD., Fiml. Insekt., II, 65, 44. [*Tachina*] (1866); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 145. (1900).

cylindrica R.-D. — **collaris** FALL.

cylindroidea MACQ. — **collaris** FALL.

debilitata PAND. — **muscaria** FALL.

dexiaria ROSS., Dipt. ital. Prodr., IV, 44, 4. (1861).

funchris MEIG. — **luctuosa** MEIG.

halterata ZETT. — **luctuosa** MEIG.

infusata FALL. = **muscaria** FALL.

luctuosa MEIG.*), S. B., IV, 347, 186. [*Tachina*] (1824) et VII, 203, 5, t. LXIX, f. 7—12. [*Medoria*] (1838); R.-D., Myod., 140, 6. [*Medina*] (1830); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 28, 2, t. I, f. 9. [*Medoria*] (1855); SCHN., F. A., I, 549. [*Medoria*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 222. (1893).

luctuosa MEIG. — **luctuosa** MEIG.

luctuosa MEIG. — **luctuosa** MEIG.

luctuosa MEIG. — **luctuosa** MEIG.

luctuosa MEIG. — **luctuosa** MEIG.

luctuosa MEIG. — **luctuosa** MEIG.

luctuosa MEIG. — **luctuosa** MEIG.

luctuosa MEIG. — **luctuosa** MEIG.

luctuosa MEIG. — **luctuosa** MEIG.

luctuosa MEIG. — **luctuosa** MEIG.

*) *Acalla maccana* TR., *Epiblema sordidana* Hb.

- ambulatoria* MEIG., S. B., IV, 407, 291. [*Tachina*] (1824) et VII, 249, 9. (1838); MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VIII, 447, 6. (1850); STEIN, *Entom. Nachricht.*, XXVI, 131. (1900).
- fanchris* MEIG., S. B., VI, 371, 321. [*Tachina*] (1830); STEIN, *Entom. Nachricht.*, XXVI, 138. (1900).
- hallectata* ZETT., *Dipt. Scand.*, XIII, 6089, 72—73. [*Tachina*] (1859).
- melorina* SCHN., F. A., I, 538. [*Hypostena*] (1862); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVI, 106, t. V, f. 104. [*Amecloria*] (1889); MEADE, *Entom. Monthly Mag.*, (2), III, 150. [*Hypostena*] (1892); BRAUER, *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XLIII, 459. (1895).
- pulehella* MEIG., S. B., IV, 406, 289. [*Tachina*] (1824) et VII, 249, 15. (1838); MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VIII, 454, 19. (1850); RONDI., *Dipt. ital. Prodr.*, IV, 46, 8. (1861); MEADE, *Entom. Monthly Mag.*, (2), III, 181. (1892) et (2), V, 158. (1894); STEIN, *Entom. Nachricht.*, XXVI, 147. (1900).
- melorina* SCHN. - **luctuosa** MEIG.
- minor* PERE. - ?**muscaria** FALL.
- muscaria** FALL., *Ver. Acad. Handl.*, XXXI, 274. [*Tachina*] (1810) et *Dipt. succ. Musc.*, 14, 26. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV, 402, 284. [*Tachina*] (1824) et VII, 249, 2. (1838); MACQ., *Suit. à Bull.*, II, 132, 34. [*Melopia*] (1835) et *Annal. Soc. entom. France*, (2), VIII, 444, 2, t. XIII, f. 10. (1850); ZETT., *Dipt. Scand.*, III, 1052, 45. (1841) et VIII, 3232, 45. [*Tachina*] (1849); RONDI., *Dipt. ital. Prodr.*, IV, 43, 2. (1861); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVI, t. V, f. 95. (1889) et LVIII, 355. [*Discochaeta*] (1891); MEADE, *Entom. Monthly Mag.*, (2), III, 182. (1892); STROBL., *Mittheil. Ver. Steierm.*, XXX, 44. [*Admontia*] (1894); *Mik. Wien. entom. Zeitg.*, XIV, 93, 35. (1895); STEIN, *Entom. Nachricht.*, XXVI, 143. (1900).
- debilitata* PAND., *Rev. entom.*, XV, 110, 3. [*Latreillia*] (1896).
- infuscata* FALL., *Dipt. succ. Musc.*, 14, 25. [*Tachina*] (1820).
- ?*minor* PERE., *Soc. Linn. Lyon*, 1852, 59. (1852).
- ornata* MEIG. - **collaris** MEIG.
- pulehella* MEIG. - **luctuosa** MEIG.

Species dubiae vel incerti generis.

- albicincta** ZETT., *Ins. Lapp.*, 638, 17. [*Tachina*] (1838) et *Dipt. Scand.*, III, 1075, 71. (1841) et XIII, 6089, 71. [*Tachina*] (1859). Scandinavia.
- albifrontalis** GRAM., *Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc.*, XV, 674. (1842). Russia.
- albomaculata** MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VIII, 446, 5. (1850); SCHN., F. A., I, 535. (1862). Europe-centr.
- caerulescens** MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VIII, 451—43. (1850); SCHN., F. A., I, 536. (1862). Europe-centr.

- convexifrons** ZETT., Dipt. Scand., III. 1074. 70. (1844) et VIII. 3238. Europa sept.
70. [*Tachina*] (1849); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 66. 48. [*Tachina*]
(1866).
- cursoria** R.-D., Posth., I. 951. 1. [*Velocia*] (1863). Gallia.
parida R.-D., Posth., I. 951. 2. [*Velocia*] (1863).
- decorata** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3237. 69—70. (1849) et XIII. Europa sept.
6089. 69—70. [*Tachina*] (1859); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 66. 47.
[*Tachina*] (1866).
- delicatula* R.-D. = **obscura** R.-D.
- fasciata** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 444. 1. t. XIII. Europa centr.
f. 16. (1850); ROXB., Dipt. ital. Prodr., IV. 42. nota. (1861).
- fascinans** MEIG.*), S. B., VII. 350. 11. (1838); MACQ., Annal. Soc. Europa centr.
entom. France, (2). VIII. 447. 7. t. XIII. f. 15. (1850); SCHN.,
F. A., I. 536. (1862); WULF et MEIL., N. Nauml. ned. Dipt., 87.
(1898).
- flavicans** GOCH.**), André, Spec. hym. Eur. Alg., I. (1882). Gallia.
- flavisquamis** MACQ. (*nee* R.-D.), Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. Gallia.
452. 15. t. XIII. f. 15. (1850).
- fuscanipennis** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 450. 12. Europa centr.
(1850); SCHN., F. A., I. 536. (1862).
- grandicornis** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3237. 66. [*Tachina*] (1849); Europa centr.
SCHN., F. A., I. 535. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 64. 43. et sept.
[*Tachina*] (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). III. 181.
(1892).
laticornis ZETT. (*nee* MEIG.), Dipt. Scand., III. 1070. 66. [*Ta-*
china] (1844).
- hystrix** ZETT., Dipt. Scand., III. 1053. 46. [*Tachina*] (1844); BOSSD., Europa.
Finnl. Insekt., II. 59. 33. [*Tachina*] (1866); PAXD., Rev. entom.,
XV. 112. 6. [*Latreillia*] (1896).
- incisuralis** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 451. 14. t. Europa centr.
XIII. f. 9. (1850).
- laticornis* ZETT. = **grandicornis** ZETT.
- minima** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 455. 21. (1850); Europa centr.
SCHN., F. A., I. 536. (1862).
- obscura** R.-D., Posth., I. 949. 1. [*Mollia*] (1863). Gallia.
delicatula R.-D., Posth., I. 949. 2. [*Mollia*] (1863).
- parida* R.-D. = **cursoria** R.-D.
- pygmaea** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 454. 20. (1850); Europa centr.
SCHN., F. A., I. 536. (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2).
III. 182. (1892).
- semicineta** ZETT., Ins. Lapp., 638. 18. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Europa sept.
Scand., III. 1075. 72. [*Tachina*] (1844); BOSSD., Finnl. Insekt.,
II. 67. 49. [*Tachina*] (1866).

*) *Hylotoma rosae* L.**) *Nematus ribesii* Scop.

Pelatachina

MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), V, 109. (1894).

Hyria R.-D., Posth., I, 1100, III, (1863) *nee* LAM, 1819, Moll.

aestiva MEIG. = **tibialis** FALL.

aestivalis MACQ. = **tibialis** FALL.

incompleta PAND. = **tibialis** FALL.

melaleuca MEIG. = ?**tibialis** FALL.

tibialis FALL.*), Vet. Acad. Handl., XXXI, 276. [*Tachina*] (1810) et Europa.

Dipt. succ. Muse., 13, 23. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV, 278, 67. (1824) et VII, 191, 47. [*Tachina*] (1838); ZETT., Ins. Lapp., 637, 14. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III, 1057, 51. [*Tachina*] (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 747. [*Tachina*] (1849); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 439, 16, t. XV, f. 3. [*Myiobia*] (1854); SCHN., F. A., I, 477. [*Tachina*] (1862); R.-D., Posth., I, 1102, 1. [*Hyria*] (1863); BONSD., Finnl. Insekt., II, 60, 35. [*Tachina*] (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. VIII, f. 214. (1889) et LX, 192. [*Hyria*] (1893); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 39. [*Tachina*] (1892) et (2), V, 109. (1894); MECX., Bull. Soc. entom. France, 1893, CCLXXIV. [*Hyria*] (1893); PAND., Rev. entom., XV, 95. [*Thiria*] (1896).

aestiva MEIG., S. B., IV, 278, 68. [*Tachina*] (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 262, 15. [*Tachina*] (1834); WALK., Ins. Brit., II, 27, 19. [*Tachina*] (1853).

aestivalis MACQ., Suit. à Buff., II, 145, 24. [*Tachina*] (1835); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 130. [*Hyria*] (1900).

incompleta PAND., Rev. entom., XV, 102, 5. [*Peteina*] (1896).

?*melaleuca* MEIG., S. B., VII, 237, 9. [*Myiobia*] (1838); SCHN., F. A., I, 514. [*Myiobia*] (1862); BRACER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 458. (1893).

Succingulum

PAND., Rev. entom., XIII, 52, IV, (1894) et XV, 148. (1896).

transvittatum PAND., Rev. entom., XV, 148. (1896).

Gallia mer.

Trigonospila

POKORN., Wien. entom. Zeitg., V, 191. (1886).

pieta Pok., Wien. entom. Zeitg., V, 191, I, (1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. VIII, f. 209. (1889). Styria.

*) *Mamestra oleracea* L., *Vanessa urticae* L.

Atylomyia

BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 524. (1898).

Loewii BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 525. (1898).

Germania.

Atylostoma

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 138. (1889) et LX. 129. (1893).

tentaculatum PAND. — **tricolor** MIK.

tricolor MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 257. 4. f. 1—3. Europacentr.

[*Leskia*] (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 138. t. X. et mer.
f. 271. (1889).

tentaculatum PAND., Rev. entom., XIII. 103. 7. [*Mgiobia*] (1894).

Petagnia

ROSD., Dipt. ital. Prodr., I. 61. 6. (1856) et III. 23. 6. (1859).

occlusa ROSD. = **subpetiolata** ROSD.

subpetiolata ROSD., Dipt. ital. Prodr., III. 24. 1. (1859); SEMM., F. Europacentr.

A., I. 527. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 129. t. et mer.
VIII. f. 220. (1889).

occlusa ROSD., Dipt. ital. Prodr., I. 61. (1856) *nomen nudum*.

Emporomyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 373. 380. (1891) et LX. 134. (1893).

Kaufmanni B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 380. (1891).

Alpes.

Chaetoptilia

ROSD., Dipt. ital. Prodr., V. 166. *nota*. [*Chaetoptilia*] (1862); B. B., Denkschr. Akad.

Wien, LVIII. 381. (1891) et LX. 135. (1893).

puella ROSD., Dipt. ital. Prodr., V. 169. 3. [*Ptilops*] (1862); B. B., Europacentr.

Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 381. (1891). et mer.

Anthracomyia

ROSD., Dipt. ital. Prodr., I. 87. 18. (1856) et V. 146. 18. (1862) et Atti Soc. ital. Sci.

Nat., XI. 50. (1868).

elliptica MACQ. = **melanoptera** FALL.

fuscipennis R.-D. = **melanoptera** FALL.

Govi ROSD. = **melanoptera** FALL.

- melanoptera** FALL., Vet. Acad. Handl., XXXI, 253, [*Musca*] (1810) Europa.
 et Dipt. succ. Musc., 52, 34, [*Musca*] (1823); MEIG., S. B., V, 36, 4, [*Deria*] (1824) et VII, 275, 1, [*Morinia*] (1838); ZETT., Ins. Lapp., 654, 7, [*Musca*] (1838) et Dipt. Scand., III, 1272, 9, (1844), XIII, 6174, 9, [*Deria*] (1859); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 36, 3, t. II, f. 4, [*Morinia*] (1855); ROND., Dipt. ital. Prodr., V, 147, 1, (1862); SEMS., F. A., I, 551, [*Morinia*] (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., II, 129, 9, [*Deria*] (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 110, t. VI, f. 115, [*Morinia*] (1889); PAND., Rev. entom., XV, 142, 3, [*Melanophora*] (1896).*)
elliptica MACQ. ap. BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII, 526, 242, [*Cyrtoneura*] (1899).
fuscipennis R.-D., Myod., 265, 2, [*Morinia*] (1830).
Geni ROND., Dipt. ital. Prodr., I, 87, (1856) et V, 148, 2, (1862).
roralis SCHRANK (*nee* L.), Fauna boi., III, 138, 2502, [*Volucella*] (1803).
rolor R.-D., Myod., 265, 1, [*Morinia*] (1830) et Posth., I, 1129, 1, [*Morinia*] (1863); MACQ., Suit. à Buff., II, 174, 3, [*Melanophora*] (1835); ? MEIG., S. B., VII, 276, 6, [*Morinia*] (1838); ? ROND., Dipt. ital. Prodr., V, 160, 1, [*Morinia*] (1862); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 150, (1900).
roralis SCHRANK = **melanoptera** FALL.
rolor R.-D. = **melanoptera** FALL.

Metopostena

- ROND., Dipt. ital. Prodr., V, 161, *nota*, [*Metopisena*] (1862) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI, 50, (1868) *emend.*
celer ROND., Dipt. ital. Prodr., V, 161, 2, [*Morinia*] (1862), Italia.

Loewia

- ENG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI, 386, (1856); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 526, (1898).
Trichogena ROND., Dipt. ital. Prodr., I, 65, *nota*, [*Thrychogena*] (1856) *var. hybrida*.
brevicornis BRAUER **brevifrons** ROND.
brevifrons ROND., Dipt. ital. Prodr., I, 65, *nota*, [*Thrychogena*] (1856) Europa centr. et mer.
 et III, 86, 1, [*Macquartia*] (1859); SEMS., F. A., I, 528, (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 261, (1892); PAND., Rev. entom., XV, 4, 3, [*Exorista*] (1896); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 525, (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn.

*) *glabricula* MEIG. in litt. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 205, 106, *est nomen nudum*.

- Herceg., X. 449. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 602. (1900).
- brevicornis* BRACER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 525. (1898).
- setibarba* B. B. (*nov* Egg.). Denkschr. Akad. Wien, LVI. 108. 1. VI. f. 3. (1889), LVIII. 358 et 381. (1891) et LX. 135. (1893).
- intermedia** BRACER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 526. (1898). Austria.
- petiolata** R.-D., Myod., 258. 4. [*Dufouria*] (1830) et Posth., II. 74. Gallia.
1. [*Silbermannia*] (1863); PAND., Rev. entom., XIV. 318. 2. [*Silbermannia*] (1895).
- puncticeps** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6139. 183—184. [*Tachina*] Scandinavia.
(1859).
- setibarba* B. B. = **brevifrons** ROED.
- setibarba** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 386. (1856); SCHN., Europaentr.
F. A., I. 528. (1862); STROBL, Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., et mer.
VII. 602. (1900).
- setigena** PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 280. (1882). Russia occid.

Macquartia

R.-D., Myod., 204. I. (1830).

Albinia R.-D., Myod., 209. V. (1830).

Amedea R.-D., Myod., 207. II. (1830).

Bebricia R.-D., Posth., I. 1112. V. (1863).

Cleonier R.-D., Posth., I. 1097. II. (1863).

Jarctia R.-D., Posth., I. 1115. VI. (1863).

Pherecida R.-D., Posth., I. 1118. VII. (1863).

aenea WALK. = **dispar** FALL.

affinis SCHN. = **chalconota** MEIG.

agraria R.-D. = **grisea** FALL.

albicalyptrata MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). II. 746. 4. t. Europaentr.
XVI. f. 11. [*Zophomyia*] (1853).

atrata MEIG. = ? **chalconota** MEIG.

atripes MEIG., S. B., VII. 229. 14. (1838); SCHN., F. A., I. 529. (1862). Europaentr.

brachyccera R.-D. = **dispar** FALL.

buccalis R.-D., Myod., 210. I. [*Albinia*] (1830); Macq., Soc. Sci. Europaentr.
Lille, 1833. 242. (106). 7. [*Erebria*] (1834) et Suit. à Buff., II. 161.
10. [*Zophomyia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 231. 22. (1838).

cacelbs ROED. = **chalconota** MEIG.

carbonaria R.-D., Posth., I. 1108. 6. (1863).

chalconota MEIG.)*, S. B., IV. 270. 53. [*Tachina*] (1824) et VII. 229. Europa.
8. (1838); ZETT., Dipt. Scand., III. 1179. 182. (1844) et XIII.
6138. 182. [*Tachina*] (1859); ROXO., Dipt. ital. Prodr., III. 90. 6

*) *Chrysomela varians* F. — *Sylepta ruralis* Scop.

- (1859); SCHN., F. A., I. 530. (1862); BOSSD., Fimil. Insekt., II. 95. 106. [*Tachina*] (1866); PAND., Rev. entom., XIV. 323. 7. (1895).
affinis SCHN., F. A., I. 531. (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). V. 107. (1894).
atrata MEIG. (nec FALL.), S. B., IV. 270. 52. [*Tachina*] (1824) et VII. 229. 3. (1838); R.-D., Posth., I. 1117. [*Jarctia*] (1863); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 132. (1900).
cacels ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 87. 2. (1859).
flaripalpis R.-D., Posth., I. 1116. 2. [*Jarctia*] (1863).
germanica R.-D., Myod., 205. 4. (1830) et Posth., I. 1115. 1. [*Jarctia*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 242. (106). 8. [*Erebica*] (1834) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 749. 10. t. XVI. f. 17. [*Zophomyia*] (1854); MEIG., S. B., VII. 232. 23. (1838).
major SCHN., F. A., I. 531. (1862).
nitida ZETT., Ins. Lapp., 646. 52. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III. 1180. 183. (1844), XIII. 6139. 183. [*Tachina*] (1859); ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 88. 3. (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 205. (1865); SCHN., F. A., I. 532. (1862); BOSSD., Fimil. Insekt., II. 96. 107. [*Tachina*] (1866); WULP, Entom. Tijdschr., (2). IV. 153. (1869); RUPERTSB., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XX. 842. (1870); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 156. (1891).
tristis MEIG., S. B., IV. 271. 55. [*Tachina*] (1824) et VII. 229. 6. (1838); v. SIER., Wiegmn. Archiv., IV. 198. 12. [*Tachina*] (1838); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 150. (1900).
varipalpis MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 746. 3. t. XVI. f. 10. [*Zophomyia*] (1854).
viridescens R.-D., Myod., 206. 5. (1830) et Posth., I. 1117. 3. [*Jarctia*] (1863).
- ciliaris** ZETT., Dipt. Scand., III. 1178. 181. [*Tachina*] (1844); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 156. (1891). Europacentr. et sept.
- clausa** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 747. 6. t. XVI. f. 13. [*Zophomyia*] (1854). Europacentr.
- clausicella** ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 205. (1865). Falia.
- corusca** WALK. (nec MEIG.), Ins. Brit., II. 30. 25. [*Tachina*] (1853). Anglia.
- dispar** FALL., Dipt. succ. Musc., 31. 64. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV. 359. 209. [*Tachina*] (1824); ZETT., Dipt. Scand., III. 1138. 136. (1844) et XIII. 6122. 136. [*Tachina*] (1859); ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 89. 5. (1859); SCHN., F. A., I. 529. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 129. t. VIII. f. 221. b. (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 157. (1891); PAND., Rev. entom., XIV. 324. 8. (1895). Europa.
- avea* WALK. (nec MEIG.), Ins. Brit., II. 29. 24. [*Tachina*] (1853).
brachycera R.-D., Myod., 206. 7. (1830) et Posth., I. 1114. 2. [*Behricia*] (1863); MACQ., Soc. S. i. Lille, 1833. 241. (105). 4. [*Erebica*] (1834); MEIG., S. B., VII. 231. 20. (1838).

born
 Bern

dispar R.-D. (nec FALL.), Posth., I. 1106. 3. (1863).

flavipes MEIG., S. B., IV. 280. 71. [*Tachina*] (1824) et VII. 229. 25. (1838); SCHN., F. A., I. 530. (1862).

fulvipes R.-D., Posth., I. 1105. 2. (1863).

imperfecta R.-D., Posth., I. 1107. 5. (1863).

micans R.-D., Posth., I. 1107. 4. (1863).

ochropus MEIG., S. B., VII. 230. 15. (1838); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 145. (1900).

rubripes R.-D., Myod., 205. 3. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 160. 4. [*Zophomyia*] (1835).

rufipes FALL., Dipt. suec. Musc., 33. 68. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV. 269. 51. [*Tachina*] (1824) et VII. 229. 1. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 160. 5. [*Zophomyia*] (1835).

tibialis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 747. 5. t. XVI. f. 12. [*Zophomyia*] (1854).

tibialis R.-D., Posth., I. 1111. 9. (1863)

viridana R.-D., Posth., I. 1104. 1. (1863).

dispar R.-D. = **dispar** FALL.

echinalis PAND. = **praeifica** MEIG.

egea R.-D. = **grisea** FALL.

egeus MEIG. = **grisea** FALL.

fascicularis PAND. = **praeifica** MEIG.

flavescens R.-D. = **grisea** FALL.

flavipalpis R.-D. = **chalconota** MEIG.

?**flavipennis** Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 750. 12. t. Europaentr. XVI. f. 19. [*Zophomyia*] (1854).

flavipes MEIG. = **dispar** FALL.

fulvipes R.-D. = **dispar** FALL.

fumata ZETT., Dipt. Scand., III. 1117. 114. [*Tachina*] (1844). Scandinavia.

genistae PAND. = **occlusa** ROND.

germanica R.-D. = **chalconota** MEIG.

grisea FALL., Vet. Acad. Handl., XXXI. 269. 15. [*Tachina*] (1810) Europa.

et Dipt. suec. Musc., 20. 41. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV. 279. 70. [*Tachina*] (1824); ZETT., Dipt. Scand., III. 1184. 187. (1844) et VIII. 3251. 187. [*Tachina*] (1849); SCHN., F. A., I. 531. (1862); R.-D., Posth., I. 1099. 1. [*Cleanice*] (1863); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 206. (1865); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 156. (1891); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 31. (1894); PAND., Rev. entom., XIV. 326. 10. (1895).

agraria R.-D., Posth., I. 1120. 2. [*Pherecida*] (1863).

egea R.-D., Posth., I. 1099. [*Cleanice*] (1863).

egeus MEIG., S. B., IV. 275. 63. [*Tachina*] (1824) et VII. 229. 2. (1838); R.-D., Myod., 205. 2. (1830) et Posth., I. 1119. 1. [*Pherecida*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 240. 3. [*Erebina*] (1834), Suit. à Buff., II. 160. 3. [*Zophomyia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 749. 9. t. XVI. f. 16. [*Zophomyia*] (1854).

- flavescens* R.-D., Myod., 204, 1. (1830).
- ?**grisescens** R.-D., Myod., 206, 8. (1830) et Posth., I. 1104. (1863). Gallia.
- ?**gymnophthalma** Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 751. Europacentr.
14. t. XVI. f. 21. [*Zophomyia*] (1854).
- imperfecta* R.-D. = **dispar** FALL.
- laeta** R.-D., Posth., I. 1110. 8. (1863). Gallia.
- ?**longipennis** PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 280. (1882). Caucasus.
- major* SCHN. = **chalconota** MEG.
- micans* R.-D. = **dispar** FALL.
- microcera** R.-D., Myod., 206, 6. (1830) et Posth., I. 1113. 1. [*Behricia*] Gallia.
(1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 241. (105). 5. [*Erebria*] (1835)
et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 745. 1. t. XVI. f. 8.
[*Zophomyia*] (1854); MEG., S. B., VII. 231. 21. (1838).
- modesta* Macq. = **verecunda** WOLF.
- nitida* ZETT. = **chalconota** MEG.
- ?**nudiculata** Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 752. 16. t. Europacentr.
XVI. f. 23. [*Zophomyia*] (1854).
- ?**nudistylum** Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 751. 13. t. Europacentr.
XVI. f. 20. [*Zophomyia*] (1854).
- occlusa** ROSS.*), Dipt. ital. Prodr., III. 89. 4. (1859); SCHN., F. A., Europacentr.
I. 528. [*Loecia*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 1. et mer.
VIII. f. 221. a. (1889); PAND., Rev. entom., XIV. 325. 9. (1895)
et XV. 10. 10. [*Exorista*] (1896); STROBL., Glasnik Zem. Mus.
Bosn. Hereceg., X. 449. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hereceg.,
VII. 603. (1900); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 98. 582.
(1901).
- genistae* PAND., Rev. entom., XIV. 318. 3. [*Silbermannia*] (1895).
- ochropus* MEG. = **dispar** FALL.
- olivaceomaculata** PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 279. Caucasus.
(1882).
- ?**peridicularis** Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 752. Europacentr.
15. t. XVI. f. 22. [*Zophomyia*] (1854).
- praeifica** MEG.**), S. B., IV. 271. 57. [*Tachina*] (1824) et VII. 229. Europacentr.
4. (1838); REPETSK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XX. 842. (1870); et mer.
?STEIN, Entom. Nachricht., XI. 309. (1885) et XXVI. 146. (1900).
- echinalis* PAND., Rev. entom., XIV. 320. 2. (1895).
- fascicularis* PAND., Rev. entom., XIV. 320. 3. (1895).
- rotundicornis** ZETT., Ins. Lapp., 641. 31. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Europa sept.
Scand., III. 1156. 156. [*Tachina*] (1844); BOSSO., Fiml. Insekt.,
II. 87. 91. [*Tachina*] (1866).
- cabripes* R.-D. = **dispar** FALL.
- rufipes* FALL. = **dispar** FALL.
- scutellaris** R.-D., Myod., 207. 1. [*Ameletta*] (1830); Macq., Surt. à Gallia.
Buff., II. 161. 9. [*Zophomyia*] (1835); MEG., S. B., VII. 232. 21.
(1838).

*) Goniocetena litura F.

**) Chrysomela varians F., ?Lina tremulae L.

- spinicincta** MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II. 155. (1891). Anglia.
- strigifrons** ZETT., Ins. Lapp., 645. 46. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Europa sept.
Scand., III. 1136. 134. [*Tachina*] (1844).
- tenebricosa** MEIG., S. B., IV. 270. 54. [*Tachina*] (1824) et VII. 229. Europa centr.
5. (1838); SCHIX., F. A., I. 531. (1862); MEADE, Entom. Monthly et mer.
Mag., (2), II. 155. (1891); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 149.
(1900).
- tibialis* MACQ. = **dispar** FALL.
- tibialis* R.-D. = **dispar** FALL.
- tricincta** MEIG., S. B., IV. 563. 215. [*Tachina*] (1824) et VII. 229. Europa centr.
14. (1838); SCHIX., F. A., I. 533. (1862).
- tristis* MEIG. = **chalconota** MEIG.
- umbrosa** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6122. 136—37. [*Tachina*] (1859); Europa centr.
STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 31. (1894). et sept.
- ? **vagabunda** MEIG., S. B., VII. 224. 27. [*Nemoraca*] (1838); SCHIX., Europa centr.
F. A., I. 455. [*Nemoraca*] (1862).
- varipalpis* MACQ. = **chalconota** MEIG.
- ? **verecunda** WULF, Entom. Tijdschr., (2), IV. 144. [*Erorista*] (1869). Europa centr.
modesta MACQ. (nec MEIG.), Soc. Sci. Lille, 1833. 276. 2. [*Athri-*
cia] (1834), Suit. à Buff., II. 137. 18. [*Lydella*] (1835) et
Annal. Soc. entom. France, (2), VII. 405. 79. t. XII. f. 10.
[*Erorista*] (1849); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 404
et 434. (1891).
- vetusta** MEIG., S. B., IV. 347. 187. [*Tachina*] (1824); SCHIX., F. A., Europa centr.
I. 478. [*Tachina*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX.
191. (1893).
- villica** R.-D., Posth., I. 1111. 10. (1863). Gallia.
- viridana* R.-D. = **dispar** FALL.
- viridescens* R.-D. = **chalconota** MEIG.
- viridulans** WALK., Ins. Brit., II. 29. 23. [*Tachina*] (1853).*) Anglia.

Macroprosopa

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 109. (1889) et LX. 136. (1893).

- atrata** FALL., Vet. Acad. Handl., XXXI. 268. [*Tachina*] (1810) et Europa.
Dipt. succ. Musc., 34. 71. [*Tachina*] (1820); ZETT., Ins. Lapp.,
646. 53. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III. 1181. 184. (1844)
et XIII. 6141. 184. [*Tachina*] (1859); WALK., Ins. Brit., II. 74.
126. [*Tachina*] (1853); ROXD., Dipt. ital. Prodr., III. 88. *nota*.
[*Macquartia*] (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 205. [*Mac-*
quartia] (1865); SCHIX., F. A., I. 531. [*Macquartia*] (1862); BOXSÖ.,
Finnl. Insekt., II. 96. 108. [*Tachina*] (1866); B. B., Denkschr.
Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 114. (1889); PAND., Rev. entom., XIV.
321. 4. [*Macquartia*] (1895).

*) *chlorus*, *decipiens* et *vernalis* MEIG., ap. B. B., Denkschr.
Akad. Wien, LVIII. 404. (1891) *nomina nuda videntur*.

corusca MEG., p. p., S. B., IV, 273, 61, (1824) et VII, 191, 16, [*Tachina*] (1838); MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (3), II, 401, 5, t. XIV, f. 5, [*Oodigaster*] (1854); STEIN, *Entom. Nachricht.*, XXVI, 134, (1900).

flavicalyprata MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (3), II, 748, 8, t. XVI, f. 15, [*Zophomyia*] (1854).

corusca MEG. = **atrata** FALL.

flavicalyprata MACQ. = **atrata** FALL.

Minella

R.-D., *Myod.*, 299, IV, (1830).

Philops ROND., *Dipt. ital. Prodr.*, II, 13, (1857) et V, 165, 22, b, (1862).

adolescens ROND. — **nigrita** FALL.

acnea MEG. — **nigrita** FALL.

atra EGG., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, VI, 389, [*Clista*] (1856). Austria.

corinna MEG. = **nigrita** FALL.

✓ **chalybeata** MEG., S. B., IV, 271, 56, [*Tachina*] (1824) et VII, 229, Europa.

7. [*Macquartia*] (1838); MACQ., *Suit. à Buff.*, II, 161, 8, [*Zophomyia*] (1835) et *Annal. Soc. entom. France*, (3), II, 748, 7, t. XVI, f. 14, [*Zophomyia*] (1854); BLANCH., *Hist. nat. ins.*, III, 611, [*Myiobia*] (1840); ZETT., *Dipt. Scand.*, III, 1182, 185, (1844), VIII, 3251, 185, (1849) et XIII, 6141, 185, [*Tachina*] (1859); WALK., *Ins. Brit.*, II, 30, 26, [*Tachina*] (1853); SCHN., *F. A.*, I, 532, [*Macquartia*] (1862); ROND., *Dipt. ital. Prodr.*, V, 171, 6, [*Philops*] (1862); BOSSD., *Finnl. Insekt.*, II, 97, 109, [*Tachina*] (1866); MEADE, *Entom. Monthly Mag.*, (2), II, 156, [*Macquartia*] (1891); STEIN, *Entom. Nachricht.*, XXVI, 133, (1900).

? *promans* HARR., *Expos. engl. Ins.*, 143, t. XLII, f. 47, [*Musca*] (1776).

fulvicornis ZETT., *Dipt. Scand.*, VIII, 3247, 156—57, [*Tachina*] (1849). Scandinavia.

infans ROND., *Dipt. ital. Prodr.*, V, 170, 4, [*Philops*] (1862). Italia.

✓ **nigrita** FALL., *Ver. Acad. Handl.*, XXXI, 269, [*Tachina*] (1810) et Europa.

1 1. *Dipt. succ. Musc.*, 35, 72, [*Tachina*] (1820); MEG., S. B., IV, 274, 62, [*Tachina*] (1824) et VII, 230, 16, [*Macquartia*] (1838); ZETT., *Dipt. Scand.*, III, 1183, 186, (1844), XIII, 4702, 186, (1855) et XIII, 6141, 186, [*Tachina*] (1859); SCHN., *F. A.*, I, 532, [*Macquartia*] (1862); ROND., *Atti Soc. ital. Sci. Nat.*, VIII, 206, [*Macquartia*] (1865); BOSSD., *Finnl. Insekt.*, II, 97, 110, [*Tachina*] (1866); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVI, t. IX, f. 221, [*Philops*] (1889); PAND., *Rev. entom.*, XIV, 322, 5, [*Macquartia*] (1895); STEIN, *Entom. Nachricht.*, XXVI, 111, (1900).

adolescens ROND., *Dipt. ital. Prodr.*, V, 171, 5, [*Philops*] (1862).

acnea MEG., p. p., S. B., IV, 273, 60, [*Tachina*] (1824); MACQ.,

Soc. Sci. Lille, 1833, 241, 6, [*Ercbia*] (1834). *Suit. à Buff.*,

- H. 161. 7. [*Zophomyia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). H. 750. H. t. XVI. f. 18. [*Zophomyia*] (1854); R.-D., Posth., I. 1109. 7. [*Macquartia*] (1863).
- corinna* MEIG., S. B., VII. 230. 17. [*Macquartia*] (1838); SCHIX., F. A., I. 533. [*Macquartia*] (1862); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 134. [*coria*] (1900).
- nitida* R.-D., Myod., 209. 1. [*Minella*] (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 240. (104). 2. [*Erebina*] (1834), Suit. à Buff., II. 160. 2. [*Zophomyia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). H. 743. 3. t. XVI. f. 6. [*Erebina*] (1854); MEIG., S. B., VII. 228. 2. [*Erebina*] (1838).
- nitidiuscula* ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6129. 152-53. [*Tachina*] (1859).
- nitens** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4315. 176-77. [*Tachina*] (1852); B. Scandinavia. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 223. [*Philops*] (1893).
- nitida* R.-D. — **nigrita** FALL.
- nitidiuscula* ZETT. — **nigrita** FALL.
- nubilis** ROXB., Dipt. ital. Prodr., V. 168. 1. [*Philops*] (1862); PANB., Europa mer. Rev. entom., XIV. 323. 6. [*Macquartia*] (1895).
- ridua* ROXB., Dipt. ital. Prodr., V. 169. 2. [*Philops*] (1862).
- promans* HARR. — **?chalybeata** MEIG.
- rufipalpis** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). H. 746. 2. t. XVI. Europa centr. f. 9. [*Zophomyia*] (1854).*)
- ridua* ROXB. — **nubilis** ROXB.

Hyalurgus

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 136. (1893).

- crucigerus* ZETT. — **lucidus** MEIG.
- diaphanus* FALL. — **lucidus** MEIG.
- flavidus* MEIG. — **?lucidus** MEIG.
- lucidus** MEIG., S. B., IV. 268. 50. [*Tachina*] (1824) et VII. 229. 19. Europa. [*Macquartia*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 104. 20. [*Nemoraea*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., III. 1176. 179. (1844) et XIII. 6137. 179. [*Tachina*] (1859); SCHIX., F. A., I. 529. [*Macquartia*] (1862); BOXS., Finkl. Insekt., II. 94. 101. [*Tachina*] (1866).
- crucigerus* ZETT., Ins. Lapp., 648. 61. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III. 1177. 180. [*Tachina*] (1844); BOXS., Finkl. Insekt., II. 95. 105. [*Tachina*] (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 129. [*Macquartia*] (1889).
- decipiens* WINTH. in coll. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 220. (1893).
- diaphanus* FALL. (nec FABR. 1805), Dipt. succ. Musc., 33. 69.

*) *semiclavacea* B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 405. [*Philops*] (1891) est nomen nudum.

[*Tachina*] (1820): PAND., Rev. entom., XIV, 328, 12. [*Macquartia*] (1895).
 ?*flavida* MEIG., S. B., IV, 369, 226. [*Tachina*] (1824) et VII, 264, 2. [*Tryphera*] (1838): MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 179, 2, t. III, f. 2. [*Tryphera*] (1855): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 221, (1893); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 30. [*Macquartia*] (1894): STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 137, (1900).

Steiniella

BERG, Cenniun. Mus. nac. Buenos Aires, I, 76, (1897).

Steiniia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 136, (1893) *nee* DIES, 1866, Prot.

calida MEIG.³), S. B., IV, 268, 49. [*Tachina*] (1824) et VII, 229, 18. Europe.
 [*Macquartia calida*] (1838): PAND., Rev. entom., XIV, 327, 11.
 [*Macquartia*] (1895): STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 133, (1900).

protuberans ZETT., Dipt. Scand., III, 116, 113, (1844) et XIII, 6107, 113. [*Tachina*] (1859): SCHEIN., F. A., I, 455. [*Xenoraca*] (1862): BONSD., Fennl. Insekt., II, 79, 74. [*Tachina*] (1866): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 186, 33. [*Steiniia*] (1893): BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXXII, 97, 573. [*Steiniia*] (1901).

congenita ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6109, 113—14. [*Tachina*] (1859). Scandinavia.

piliceps ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6110, 113—15. [*Tachina*] (1859). Scandinavia.

protuberans ZETT. **calida** MEIG.

Parahyria

BISCHOF, Akad. Anz. Wien, 1900, XII, (1900) et Sitzgsber. Akad. Wien, CIX, 491 (1900).

inflata BISCHOF, Akad. Anz. Wien, XII, (1900) et Sitzgsber. Akad. Algeria.
 Wien, CIX, 495, f. 4, (1900).

Zophomyia

MACQ., Suit. à Buff., II, 159, 19, (1836)

Aceruia ROSD., Dipt. ital. Prodr., II, 13, (1857) et IV, 2, 17, (1859).

Erebria R.-D., Myod., 207, III, (1839) *nee* DERM., 1818, Lep.

flavipalpis MACQ. **temula** SCOP.

flavipennis R.-D. **temula** SCOP.

*1 ?*Lina populi* L., *tremulae* L.

grossa SCHRANK = **temula** Scop.

temula Scop., Entom. carn., 330, 885. [*Musca*] (1763); VILL., Entom. Linn., III, 513, 258. [*Musca*] (1789); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 240, t. I, IV, f. 2. [*Erebia*] (1834) et Suit. à Buff., II, 159, t. I, XIV, f. 20. (1835); R.-D., Myod., 208, 1. [*Erebia*] (1830); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI, 411. [*Erebia*] (1856) et F. A., I, 436. (1862); ?, Annal. Soc. entom. Belg., 1878, CXXXII, (1878); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. VII, f. 170. (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 266. (1891); PAND., Rev. entom., XIV, 319, 1. [*Macquartia*] (1895).

flaripalpis Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 743, 4, t. XVI, f. 7. [*Erebia*] (1854); STROBL., Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV, 508. (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX, 570. (1904).

flaripennis R.-D., Myod., 208, 2. [*Erebia*] (1830).

grossa SCHRANK (*acc* L.), Enum. insect., 461, 936. [*Musca*] (1781).

tremula L., Syst. nat., XII, II, 991, 77. [*Musca*] (1767); FABR., Spec. ins., II, 442, 32. [*Musca*] (1781). Entom. syst., IV, 325, 56. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 310, 9. [*Tachina*] (1805); GMEL., Syst. nat., V, 2846, 77. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. Linn., III, 483, 195. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etc., II, 304, 1500. [*Musca*] (1790); SCHRANK, Fauna boica, III, 118, 2440. [*Musca*] (1803); HLLIG., Fauna etc. Rossi, II, 465, 1500. [*Musca*] (1807); FALL., Vet. Acad. Handl., XXXI, 270. [*Tachina*] (1810) et Dipt. succ. Musc., 34, 70. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV, 272, 58. [*Tachina*] (1824) et VII, 227, 1. [*Erebia*] (1838); ARR. et GERM., Fauna insect. Europae, XIII, 25. [*Tachina*] (1831); ZETT., Dipt. Scand., III, 1152, 152. (1844), XII, 4701, 152. (1835) et XIII, 6129, 152. [*Tachina*] (1859); WALK., Ins. Brit., II, 31, 27, t. XI, f. 9. [*Tachina*] (1853); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 742, 1, t. XVI, f. 4. [*Erebia*] (1854); RONB., Dipt. ital. Prodr., III, 83, 1. [*Arewnia*] (1859); BOSSN., Föml. Insekt., II, 87, 90. [*Tachina*] (1866).

tremulae R.-D., Posth., I, 1097, 1. [*Erebia*] (1863).

vicina Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 742, 2, t. XVI, f. 5. [*Erebia*] (1854); BRACER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI, 371, 145. [*Arewnia*] (1897).

tremula L. = **temula** Scop.

tremulae R.-D. = **temula** Scop.

vicina MACQ. = **temula** Scop.

Rhamphina

Macq., Suit. à Buff., II, 94, 6. (1835).

Albertia ROXB., N. Annal. Sci. nat. Bologna, X, 37. (1843)
nee Dra. 1838, Rot.

Eleone R.-D., Posth., II, 350, II. (1863).

haustellata R.-D. = **pedemontana** MEIG.

pedemontana MEIG., S. B., IV, 159, I, t. XXXVIII, f. 5. [*Stomoxys*] Europa centr.
 (1824) et VII, 265, I, t. LXXII, f. 49–53. (1838); Macq., Suit. et mer.
 à Buff., II, 95, I, t. XIV, f. 7. (1835) et Annal. Soc. entom.
 France, (2), VI, 87, I, t. III, f. 1. (1848); ROXB., N. Annal. Sci.
 nat. Bologna, X, 37, t. I, f. 4–5. [*Albertia*] (1843) et Dipt. ital.
 Prodr., IV, 115, I. (1861); SCHN., F. A., t. 432. (1862); B. B.,
 Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. X, f. 255 (1889); PASD., Rev.
 entom., XV, 138. (1896).

haustellata R.-D., Posth., II, 351, I. [*Eleone*] (1863); B. B.,
 Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 431. (1891).

Gymnoglossa

Mik, Wien. entom. Zeitg., XVII, 211, V. (1888).

transsylvanica Mik, Wien. entom. Zeitg., XVII, 213, t. III, f. 8–10. Hungaria.
 (1888).

Sarromyia

POKORŃ., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 5. (1893).

nubigena Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 5. (1893). Alpes.

Elachipalpus

ROXB., N. Annal. Sci. nat. Bologna, (3), II, 169. (1850).

longirostris ROXB. (*nee* Macq. 1843, *nee* 1845), N. Annal. Sci. nat. Europa mer.,
 Bologna, (3), II, 169. (1850); B. B., Denkschr. Akad. Wien, Asia min.
 LVI, 134. (1889) et LX, 137. (1893).

Masistylum

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 125, 138. (1893).

arcuatum Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII, 1240, III. [*Pachy-* Europa centr.
stylum] (1863) et Wien. entom. Zeitg., XI, 182, 6 et 245. [*Pachy-*
chystylum] (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 101.
 [*Pachystylum*] (1889) et LX, 126 et 186, 36. (1893). Bayer.
 Sitzgsber. Akad. Wien, CI, 190. [*Pachystylum*] (1893).

Brenii MİK (*succ* Macq.), Wien. entom. Zeitg., X. 206. [*Pachystylum*] (1891).

Brenii MİK **arcuatum** MİK.

Demoticus

Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 442. (1854).

Entomobosca LLOY, Atti Istit. ven., (3). IX. 1350. (1863).

aequus MEIG., S. B., VII. 237. 7. [*Myiobia*] (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 435. 8. t. XV. f. 10. [*Myiobia*] (1854);

SCHIX., F. A., I. 515. [*Myiobia*] (1862); PAND., Rev. entom., XIII. 99. (1894); STEIX, Entom. Nachricht., XXVI. 130. (1900).

hospes MEIG., S. B., VII. 237. 10. [*Myiobia*] (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 435. 9. t. XV. f. 10. [*Myiobia*] (1854); SCHIX., F. A., I. 515. [*Myiobia*] (1862); PAND., Rev. entom., XIII. 102. 6. [*Myiobia*] (1894); STEIX, Entom. Nachricht., XXVI. 130. (1900).

arcuatus Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 432. 5. t. XV. f. 8. [*Myiobia*] (1854). Europacentr.

hospes MEIG. = **aequus** MEIG.

nigricans RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 220. (1865). Italia,

plebejus FALL., Vet. Acad. Handl., XXXI. 273. [*Tachina*] (1810) et Europa.

Dipt. succ. Musc., 13. 22. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV. 343. 180. (1824) et VII. 191. 71. [*Tachina*] (1838); Macq., Soc. Sci. Lille. 1833. 264. 22. [*Tachina*] (1834), Suit. à Buff., II. 143. 17. [*Tachina*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 443. 1. t. XV. f. 17. (1854); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 673. [*Tachina*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., III. 1034. 24. [*Tachina*] (1844); RONDI., Dipt. ital. Prodr., IV. 56. 1. (1861); SCHIX., F. A., I. 433. (1862); BONSD., Fönnl. Insekt., II. 54. 20. [*Tachina*] (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 249. (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 92. (1891); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 35. (1894); PAND., Rev. entom., XV. 66. 2. [*Aphria*] (1896).

spectabilis MEIG., S. B., IV. 311. 124. (1824) et VII. 190. 9. [*Tachina*] (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 266. 27. [*Tachina*] (1834), Suit. à Buff., II. 145. 26. [*Tachina*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 388. 28. t. XIII. f. 14. [*Tachina*] (1854); LLOY, Atti Istit. ven., (3). IX. 1350. [*Entomobosca*] (1863); STEIX, Entom. Nachricht., XXVI. 149. (1900).

pulverulentus Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 433. 6. t. XV. f. 9. [*Myiobia*] (1854). Europacentr.

spectabilis MEIG. = **plebejus** FALL.

Rhinotachina

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 135, (1889) et LX, 139, (1893).

- atra** ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV, 49, 1, [*Myiobia*] (1861). Italia.
- demotica* EGG. = **modesta** MEIG.
- grisea* PERR. = **modesta** MEIG.
- modesta** MEIG., S. B., IV, 383, 248, [*Tachina*] (1824) et VII, 257, 25, [*Exorista*] (1838); WOLF, Entom. Tijdschr., (2), IV, 144, [*Exorista*] (1869); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 143, (1900), *demotica* EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI, 211, [*Tachina*] (1861); SCHN., F. A., I, 475, [*Tachina*] (1862).
- grisea* PERR., Soc. lin. Lyon, 1852, 59, [*Masicera*] (1852).
- nupera* ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV, 50, [*Myiobia*] (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 219, [*Myiobia*] (1865).
- ryclina* ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV, 51, 3, [*Myiobia*] (1861); PAND., Rev. entom., XV, 101, 4, [*Peteina*] (1896).
- sybarita* MEIG., S. B., VII, 198, 57, [*Tachina*] (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 388, 29, t. XIII, f. 15, [*Tachina*] (1854); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. X, f. 256, (1889).
- retasta* Macq. (nec MEIG.), Annal. Soc. entom. France, (3), II, 441, 18, t. XV, f. 4, [*Myiobia*] (1854); ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV, 50, 2, [*Myiobia*] (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 442, (1891); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), V, 110, [*Myiobia*] (1894); PAND., Rev. entom., XV, 66, 1, [*Aphria*] (1896).
- nupera* ROXD. = **modesta** MEIG.
- proletaria** EGG. (*), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X, 799, [*Deria*] (1860); Austria.
- SCHN., F. A., I, 561, [*Deria*] (1862).
- ryclina* ROXD. = **modesta** MEIG.
- sybarita* MEIG., **modesta** MEIG.
- retasta* Macq., **modesta** MEIG.

Pseudodemoticus

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 139, (1893).

- geniculatus** ZETT., Dipt. Scand., III, 1039, 30, (1814) et XIII, 6081, 30, [*Tachina*] (1859); BOSSD., Fiml. Insekt., II, 56, 25, [*Tachina*] (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 221, (1893). Europaeentr. et sept.

Sesiophaga

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 384, (1891) et LX, 139, (1893).

- cinerea* MEADE. ? **glirina** ROXD.
- glirina** ROXD. (**), Dipt. ital. Prodr., IV, 51, 1, [*Myiobia*] (1861). B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 384, (1891). Europaeentr. et mer.

*) *Sesia* sp.

**) *Sesia empififormis* Esp., *leucospiformis* F. r.

zeinerea MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), V. 71. [*Bithia*] (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 622. (1894).

rubescens R.-D. in litt. ap. BRÄUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 508, 103. [*Cynthia*] (1898).

rubescens R.-D. = **glirina** ROND.

Bithia

R.-D., Posth., I. 770. III. (1863).

Cynthia R.-D., Posth., I. 769. II. (1863) *nee* FABR. 1808. Lep.

Hystriehoneura B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 135. (1889) et LX. 139. (1893).

Sarcobia LLOY, Atti Istit. ven., (3), X. 62. (1865).

argyreata MEIG. = ? **spretta** MEIG.

cognata EGG. = **spretta** MEIG.

discreta ROND. = **spretta** MEIG.

frontata BONEM. = **spretta** MEIG.

pudica R.-D., Posth., I. 769. I. [*Cynthia*] (1863).

Gallia.

spretta MEIG., S. B., IV. 343. 179. [*Tachina*] (1824) et VII. 236. 3. Europa.

[*Myiobia*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 248. 7. [*Myiobia*] (1834), Suit. à Buff., II. 158. 7. [*Myiobia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), II. 440. 17. t. XV. f. 15. [*Myiobia*] (1854); SCHN., F. A., I. 434. [*Demolicus*] (1862); R.-D., Posth., I. 771. I. (1863); LLOY, Atti Istit. ven., (3), X. 62. [*Sarcobia*] (1865); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), V. 71. (1894); STEIS, Entom. Nachricht., XXVI. 149. (1900).

?*argyreata* MEIG., S. B., IV. 316. 133. (1824) et VII. 191. 68.

[*Tachina*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II. 392. 37. t. XIII. f. 4. [*Tachina*] (1854); EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 10. [*Panzeria*] (1855); STEIS, Entom. Nachricht., XXVI. 132. (1900).

cognata EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 387. [*Tachina*] (1856).

discreta ROND., Dipt. ital. Prodr., IV. 52. 5. [*Myiobia*] (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 427. (1891).

frontata BONEM., Vet. Acad. Handl., 1852. 200. [*Tachina*] (1852);

ZETT., Dipt. Scand., XII. 4690. 24—25. [*Tachina*] (1853);

SCHN., F. A., I. 434. [*Demolicus*] (1862); B. B., Denkschr.

Akad. Wien, LVI. 135. t. X. f. 257. [*Hystriehoneura*] (1889);

MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), V. 92. [*Demolicus*] (1891)

et (2), V. 71. (1894); PAND., Rev. entom., XV. 101. 3. [*Pe-*

leina] (1896).

Plagiopsis

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 134. (1889) et LX. 138. (1893).

soror ZETT., Dipt. Scand., III. 1035. 15. [*Tachina*] (1844); EGG., Europa.

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 388. [*Tachina*] (1856); SCHN.,

F. A., I. 433. [*Demolitus*] (1862); BONSD., Finnl. Insekt., II. 54. 21. [*Tachina*] (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 248. (1889).

rhipias PAND., Rev. entom., XV. 68. 4. [*Aphria rypphas*] (1896).

Aphria

R.-D., Myod., 89. VII. (1830).

Olivieria MEIG., S. B., VII. 266. 51. (1838) nec R.-D. 1830. Dipt.

Rhyncosia MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 87. X. (1848).

abdominalis R.-D. = **longirostris** MEIG.

basilaris MACQ. = **longirostris** MEIG.

longilingua ROND., Dipt. ital. Prodr., IV. 58. 2. (1861); JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff., 1883. 309. 24. (1883); CORTI, Bull. Soc. entom. ital., XXV. 39. 58. (1892); HEND., Wien. entom. Zeitg., XXI. 146. 22. (1902). Europa mer.

longirostris MEIG., S. B., IV. 315. 132. [*Tachina*] (1824) et VII. 266. I. t. LXXIII. f. 1—6. [*Olivieria*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 95. 2. [*Rhamphina*] (1835); Annal. Soc. entom. France, (2). III. 291. I. t. VI. f. 11. [*Aphria*] (1845) et (2). VI. 88. I. t. III. f. 2. [*Rhyncosia*] (1848); ROND., N. Annal. Sci. nat. Bologna, X. 38. t. I. f. 5—6. [*Rhamphina*] (1843) et Dipt. ital. Prodr., IV. 58. 1. (1861); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3228. 25—26. (1849) et VIII. 6080. 25—26. [*Tachina*] (1859); WALK., Ins. Brit., II. 56. 84. [*Tachina*] (1853); SCHN., F. A., I. 432. (1862); R.-D., Posth., I. 767. 1. (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 250. (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). II. 91. (1891); PAND., Rev. entom., XV. 68. 3. (1896). Europa.

abdominalis R.-D., Myod., 89. I. (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 310. I. [*Thryptocera*] (1834) et Suit. à Buff., II. 91. 12. [*Thryptocera*] (1835).

basilaris MACQ., Suit. à Buff., II. 663. [*Thryptocera*] (1835).

lunbaris MEIG., S. B., IV. p. VIII et 236. [*Tachina*] (1824); ? B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 407. [*Plagiopsis*] (1891).

Servilli R.-D., Myod., 90. 2. (1830) et Posth., I. 768. 2. (1863); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 292. 2. t. VI. f. 12. [*Servilli*] (1845).

lunbaris MEIG. **longirostris** MEIG.

Servilli R.-D. **longirostris** MEIG.

suavissima Cw., Stuttin. entom. Zeitg., VIII. 259. I. [*Oliviera*] (1817). Italia mer.

Macrotarsina

SEMIS., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 4. *nota*. (1857).

Braueria SEMIS., Wien. entom. Monatschr., V. 142. (1861).

Zelleria EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 385. (1856) *nee*
STANT. 1849. Lep.

longimana EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 385. [*Zelleria*] Europa mer.
(1856); SEMIS., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 4. [*Zelleria*]
(1857) et F. A., I. 511. [*Braueria*] (1862); ROSD., Dipt. ital.
Prodr., IV. 61. 1. [*Zelleria*] (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien,
LVI. 134. t. X. f. 254. [*Braueria*] (1889).

Zelleri SEMIS., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 4. *nota*. (1857).

Zelleri SEMIS. = **longimana** EGG.

Fischeria

R.-D., Myod., 101. IV. (1830).

Proboscista ROSD. in litt. ap. ROSD., Dipt. ital. Prodr., IV.
60. (1861).

bicolor R.-D.*, Myod., 101. I. (1830), Annal. Soc. entom. France, Europa centr.
(2), VI. 477. 1. (1848) et Posth., II. 341. 1. (1863); MACQ., Suit. et mer.
à Buff., II. 157. 3. [*Myiobia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 239. 15.
[*Myiobia*] (1838); ROSD., Dipt. ital. Prodr., IV. 60. 1. (1861);
SEMIS., F. A., I. 513. [*Leskia*] (1862); B. B., Denkschr. Akad.
Wien, LVI. 135. t. X. f. 260. (1889).

calligata ROSD. in litt. ap. ROSD., Dipt. ital. Prodr., IV. 60.
[*Proboscista*] (1861).

flava O. G. COSTA, Atti Accad. Napoli, V. 2. 90. 8. t. I. f. 5.
[*Stomoxys*] [(1835) 1844].

longirostris MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II. 431. 4.
t. XV. f. 7. [*Myiobia*] (1854); PAND., Rev. entom., XIII. 107.
15. [*Myiobia*] (1894).

flava O. G. COSTA = **bicolor** R.-D.

longirostris MACQ. = **bicolor** R.-D.

Leskia

R.-D., Myod., 100. III. (1830).

Pyrrhosia ROSD., Dipt. ital. Prodr., I. 73. 48. (1856) et IV.
62. 48. [*Pyrrhosia*] (1861).

aurea FALL.**, Dipt. succ. Musc., 21. 42. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. Europa.

*) *Alophia combustella* H. S., *Salebria palumbella* F.

***) *Evetria buoliana* SCHNEE., *Sciapteron tabaniformis* ROTT.,
Sesia conopiformis ESP., *formicaeformis* ESP., *ichneumoniformis* L.,
vespiformis L.

B., IV. 341. 175. [*Tachina*] (1824) et VII. 236. 1. t. LXX. f. 51—54. [*Myiobia*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 247. 2. [*Myiobia*] (1834), Suit. à Buff., II. 157. 2. [*Myiobia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 429. 1. t. XV. f. 4. [*Myiobia*] (1854); ZETT., Dipt. Scand., III. 1167. 170. [*Tachina*] (1844); F. ROSS, Verzeichn., 51. 1. [*Myiobia*] (1848); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 460. 1. (1848) et Posth., II. 299. 1. (1863); ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV. 69. 7. [*Pyrrhosia*] (1861); SCHN., F. A., I. 513. (1862); BOXS., Finnl. Insekt., II. 92. 101. [*Tachina*] (1866); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. 278. 27. (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 259. [*Pyrrhosia*] (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). III. 95. (1892); PAND., Rev. entom., XIII. 104. 8. [*Myiobia*] (1894); ALESSANDR., Boll. Soc. zool. ital., IX. [*Pyrrhosia*] (1900).

flavescens R.-D., Myod., 100. 1. (1830) et Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 461. 2. (1848).

flavescens R.-D. = **aurea** FALL.

Myiobia*)

R.-D., Myod., 98. II. [*Myiobia*] (1830) *em.* VERR. ap. SCUDD.

Anthoeca ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV. 8. [*Anthoica*] (1861) *em.*

Biomysia ROXD., Dipt. ital. Prodr., I. 72. *nota.* (1856) *nee* R.-D. 1830.

Chrenia R.-D., Posth., II. 335. IV. (1863).

? *Hebia* R.-D., Myod., 98. I. (1830).

Micromyiobia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 385. (1889) et LX. 439. [*Micromyobia*] (1893) *emend.*

Orillia R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 474. IV. (1848).

Solieria R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 461. III. (1848).

aestivalis R.-D. = **inanis** FALL.

albispumilis R.-D. = **inanis** FALL.

apicalis R.-D. = **fenestrata** MEIG.

aurata R.-D. = **inanis** FALL.

auriceps R.-D. = **inanis** FALL.

binotata R.-D. = **inanis** FALL.

brunnica R.-D. = **fenestrata** MEIG.

campestris R.-D. = **inanis** FALL.

ciliger R.-D. = **inanis** FALL.

cinerascens R.-D. = **fenestrata** MEIG.

cinerea R.-D. (*Heb.*) = **flavipes** R.-D.

*) Nomen *Myiobia* R.-D. 1830 in *Myiobia* emendatum, a *Myiobia* Heyden 1826 non rejectum est.

- cinerea* R.-D. (*Sol.*) **fenestrata** MEIG.
congregata PAND. **rectinervis** R.-D.
carrinervis R.-D. — **fenestrata** MEIG.
delicata R.-D., Posth., II. 339. 5. [*Orillia*] (1863). Gallia.
diaphana ROND., Dipt. ital. Prodr., IV. 66. 3. [*Pyrhrosia*] (1861); Europacentr.
 STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 36. [*Micromyiobia*] (1894). et mer.
montana B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 385. [*Micro-*
myiobia] (1891).
ruficrus PAND. (*nec* R.-D.), Rev. entom., XIII. 105. 12. (1894).
vacua ROND., Dipt. ital. Prodr., IV. 67. 4. [*Pyrhrosia*] (1861).
dimidiata R.-D. = **inanis** FALL.
distracta PAND., Rev. entom., XIII. 98. 1. (1894). Gallia mer.
elongata R.-D. = **inanis** FALL.
femoralis R.-D. — **fenestrata** MEIG.
femorata MACQ. = **inanis** FALL.
fenestrata MEIG., S. B., IV. 344. 181. [*Tachina*] (1824) et VII. 236. Europacentr.
 6. (1838); SCHM., F. A., I. 514. (1862); MEADE, Entom. Monthly et mer.
 Mag., (2). III. 94. (1892).
apicalis R.-D., Posth., II. 321. 4. [*Solieria*] (1863).
brannicosa R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 470. 14.
 [*Solieria*] (1848) et Posth., II. 333. 20. [*Solieria*] (1863).
cinerascens R.-D., Myod., 99. 4. (1830) et Annal. Soc. entom.
 France, (2). VI. 470. 16. [*Solieria*] (1848).
cinerea R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 470. 15.
 [*Solieria*] (1848) et Posth., II. 328. 14. [*Solieria*] (1863).
carrinervis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 475. 1.
 [*Orillia*] (1848) et Posth., II. 337. 2. [*Orillia*] (1863).
femoralis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 469. 13.
 [*Solieria*] (1848) et Posth., II. 323. 7. [*Solieria*] (1863).
flavescens R.-D., Posth., II. 329. 15. [*Solieria*] (1863).
fusca R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 468. 12.
 [*Solieria*] (1848) et Posth., II. 316. 15. (1863); PAND., Rev.
 entom., XIII. 105. 10. (1894).
immaculata R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 461. 4.
 [*Solieria*] (1848) et Posth., II. 332. 19. [*Solieria*] (1863).
maculata R.-D., Posth., II. 324. 8. [*Solieria*] (1863).
nana R.-D., Myod., 100. 5. (1830), Annal. Soc. entom. France,
 (2). VI. 473. 20. [*Solieria*] (1848) et Posth., II. 328. 13.
 [*Solieria*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 249. (113). 9.
 (1834); MEIG., S. B., VII. 239. 14. (1838).
obscuripes R.-D., Posth., II. 334. 21. [*Solieria*] (1863).
pulverulenta R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 471. 17.
 [*Solieria*] (1848).
rustica R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 464. 5. [*Soli-*
eria] (1848) et Posth., II. 325. 10. [*Solieria*] (1863).
vaga R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 457. 4. (1848)
 et Posth., II. 331. 18. [*Solieria*] (1863).

- festiva** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI. 462. 2. [*Solicria*] Gallia.
(1848) et Posth., H. 316. 16. (1863); PAND., Rev. entom., XIII.
-106. 13. (1894).
ruralis R.-D., Posth., H. 314. 13. (1863).
- flavescens* R.-D. **fenestrata** MEIG.
- flucida* Macq. = **inanis** FALL.
- ? **flavipes** R.-D., Myod., 98. 1. [*Hebia*] (1830), Annal. Soc. entom. Gallia.
France, (2), VI. 442. 1. [*Hebia*] (1848) et Posth., I. 578. 2. [*Hebia*]
(1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 246. 1. (1834) et Suit. à
Buff., H. 156. 1. (1835); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 611. (1840).
cinerea R.-D., Posth., I. 579. 3. [*Hebia*] (1863).
- pectiolata* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI. 442. 2.
[*Hebia*] (1848) et Posth., I. 578. 1. [*Hebia*] (1863).
- flavisquamis* R.-D. = **inanis** FALL.
- fragilis* R.-D. = **inanis** FALL.
- frontalis** Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II. 439. 15. t. XV. Gallia.
t. 14. (1854).
- fulripalpis* R.-D. = **inanis** FALL.
- fuscata* R.-D. = **fenestrata** MEIG.
- gagatea** R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI. 463. 3. [*Solicria*] Gallia.
(1848) et Posth., H. 331. 17. [*Solicria*] (1863).
- germanica* R.-D. **inanis** FALL.
- immaculata* R.-D. = **fenestrata** MEIG.
- inanis** FALL., Vet. Acad. Handl., XXXI. 270. [*Tachina*] (1810) et Europa.
Dipt. succ. Musc., 21. 43. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV.
342. 177. [*Tachina*] (1824) et VII. 236. 2. (1838); Macq., Soc.
Sci. Lille, 1833. 247. 3. t. IV. f. 2. (1834), Suit. à Buff., H. 157.
t. 1. XIV. f. 19. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), II.
430. 2. t. XV. f. 5. (1854); ZETT., Dipt. Scand., III. 1168. 171.
[*Tachina*] (1844); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI.
467. H. [*Solicria*] (1848); WALK., Ins. Brit., H. 64. 102. [*Ta-*
china] (1853); ROSS., Dipt. ital. Prodr., IV. 67. 5. [*Pyrrhosia*]
(1861); SCHIX., F. A., I. 515. (1862); MEADE, Entom. Monthly
Mag., (2), III. 94. (1892); STROB., Mittheil. Ver. Steierm., XXX.
86. (1894); PAND., Rev. entom., XIII. 105. 9. (1894).
- aestivalis* R.-D., Posth., H. 308. 6. (1863).
- albispumis* R.-D., Posth., H. 312. 10. (1863).
- aurata* R.-D., Posth., H. 310. 8. (1863).
- auriceps* R.-D., Posth., H. 336. 1. [*Orillia*] (1863).
- birotata* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI. 462. 1.
[*Solicria*] (1848) et Posth., H. 320. 3. [*Solicria*] (1863).
- campestris* R.-D., Posth., H. 322. 5. [*Solicria*] (1863).
- ciliifera* R.-D., Posth., H. 335. 1. [*Chremia*] (1863).
- dimidiata* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI. 471. 18.
[*Solicria*] (1848) et Posth., H. 330. 16. [*Solicria*] (1863).
- elongata* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2), VI. 465. 6.
[*Solicria*] (1848) et Posth., H. 319. 2. [*Solicria*] (1863).

- femorata* Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 248. (112). 5. (1834);
MEIG., S. B., VII. 238. 11. (1838).
- flavida* Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 431. 3. t. XV. f. 6. (1854).
- flaviquamis* R.-D., Posth., II. 312. 11. (1863).
- fragilis* R.-D., Myod., 98. 1. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 455. 1. (1848) et Posth., II. 301. 1. (1863); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 370. 141. (1897).
- fulvipalpis* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 456. 2. (1848).
- germana* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 467. 10. [*Solieria*] (1848).
- lateralis* Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 248. (112). 6. (1834) et Suit. à Buff., II. 158. 5. (1835); MEIG., S. B., VII. 238. 12. (1838); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 473. [*Solieria*] (1848).
- modesta* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 466. 9. [*Solieria*] (1848).
- modesta* R.-D. (*nec* 1848), Posth., II. 325. 9. [*Solieria*] (1863).
- nitens* R.-D., Myod., 100. 6. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 473. 2. [*Solieria*] (1848) et Posth., II. 317. 17. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 248. (112). 8. (1824) et Annal. Soc. entom. France, (3). II. 434. 7. t. XV. f. 14. (1854); MEIG., S. B., VII. 238. 13. (1838).
- pacifica* MEIG., S. B., IV. 342. 178. [*Tachina*] (1824) et VII. 236. 4. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 247. 4. (1834) et Suit. à Buff., II. 158. 6. (1835); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 474. [*Solieria*] (1848); WALK., Ins. Brit., II. 63. 100. [*Tachina*] (1853); SCHIN., F. A., I. 515. (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). III. 95. (1892).
- palpalis* R.-D., Posth., II. 326. 11. [*Solieria*] (1863).
- pellucida* R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 476. 3. [*Orillia*] (1848) et Posth., II. 339. 4. [*Orillia*] (1863).
- prægnata* R.-D., Posth., II. 307. 5. (1863).
- pratensis* R.-D., Posth., II. 309. 7. (1863).
- profuga* R.-D., Posth., II. 327. 12. [*Solieria*] (1863).
- rectinervis* R.-D., Posth., II. 307. 4. (1863).
- rafferus* R.-D., Myod., 99. 3. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 465. 7. [*Solieria*] (1848) et Posth., II. 313. 12. (1863).
- scutellaris* R.-D., Posth., II. 310. 9. (1863).
- segregata* ROXB., Dipt. ital. Prodr., IV. 65. 1. [*Pyrrhosia*] (1861), PAND., Rev. entom., XIII. 105. 11. (1894); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 370. 140. (1897).
- sublitca* R.-D., Myod., 99. 2. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 456. 3. (1848) et Posth., II. 302. 2. (1863); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 371. 144. (1897).
- testacea* R.-D., Myod., 275. (1830), Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 458. 5. (1848) et Posth., II. 305. 3. (1863).

- testacea* R.-D., Posth., II. 319. 1. [*Soliceria*] (1863).
vicina R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 466. 8. [*Soliceria*] (1848).
villana R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 459. 6. (1848)
 et Posth., II. 315. 14. (1863).
villica R.-D., Posth., II. 323. 6. [*Soliceria*] (1863).
lateralis Macq. — **inanis** FALL.
 ? **lestremensis** Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 437. 13. Gallia.
 t. XV. f. 13. (1854).
longipes MEIG., S. B., IV. 341. 176. [*Tachina*] (1824) et VII. 236. 5. Europacentr.
 (1838); WALK., Ins. Brit., II. 66. 107. [*Tachina*] (1853); ? ROND., et mer.
 Dipt. ital. Prodr., IV. 68. 6. [*Pyrrhosia*] (1861); SCHM., F. A.,
 I. 515. (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). III. 91. (1892).
maculata R.-D. = **fenestrata** MEIG.
micans Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 442. 19. t. XV. Gallia.
 f. 16. (1854).
modesta R.-D. 1848. = **inanis** FALL.
modesta R.-D. 1863. — **inanis** FALL.
montana SCHM. = **diaphana** ROND.
nana R.-D. — **fenestrata** MEIG.
nigra R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 472. 19. [*Soliceria*] Gallia.
 (1848).
nitens R.-D. = **inanis** FALL.
nitidiventris Macq., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 438. 14. t. Helvetia.
 XV. f. 5. (1854).
obscuripes R.-D. = **fenestrata** MEIG.
pacifica MEIG. = **inanis** FALL.
palpalis R.-D. = **inanis** FALL.
pellucida R.-D. = **inanis** FALL.
petiolata R.-D. = **flavipes** R.-D.
pisciventris PAND., Rev. entom., XIII. 101. 5. (1894). Gallia mer.
praegnata R.-D. = **inanis** FALL.
pratensis R.-D. = **inanis** FALL.
profuga R.-D. = **inanis** FALL.
puberulenta R.-D. = **fenestrata** MEIG.
pumila Macq.*), Annal. Soc. entom. France, (3). II. 437. 12. t. XV. Europacentr.
 f. 12. (1854); LCC., Annal. Soc. entom. France, (6). VIII. 102. (1888); GERCKE, Wien. entom. Zeitg., VIII. 220. (1889).
rectinervis R.-D. 1863. = **inanis** FALL.
rectinervis R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VI. 475. 2. [*Orillia*] Europa mer.
 (1848) et Posth., II. 358. 3. [*Orillia*] (1863); PAND., Rev. entom., XIII. 106. 14. (1894).
congregata ROND., Dipt. ital. Prodr., IV. 65. 2. [*Pyrrhosia*]
 (1861).
vulgaris PAND. — **diaphana** ROND.

*) *Crioceris asparagi* L.

- rafiferus* R.-D. = **inanis** FALL.
ruralis R.-D. = **festiva** R.-D.
rustica R.-D. = **fenestrata** MEG.
scutellaris R.-D. = **inanis** FALL.
segregata ROND. = **inanis** FALL.
sablutea R.-D. = **inanis** FALL.
testacea R.-D. (*Myl.*) = **inanis** FALL.
testacea R.-D. (*Sol.*) = **inanis** FALL.
tibialis v. Ros., Württemb. Corubl., I. 58. (1840). Germania.
vaca ROND. = **diaphana** ROND.
vaga R.-D. = **fenestrata** MEG.
vicina R.-D. = **inanis** FALL.
villana R.-D. = **inanis** FALL.
villica R.-D. = **inanis** FALL.*

Rhynchista

- ROND., Dipt. ital. Prodr., IV. 9. (1861) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 206. (1865).
 ? *Feria* R.-D., Myod., 309. 4. (1830). ? -
Proboscina ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 88. 22. (1856) *ucc.* AUD. Pol.
griseicollis MEG. = ? **prolixa** MEG.
monticola PAND. = **prolixa** MEG.
nitida R.-D. = ? **prolixa** MEG.
prolixa MEG.**, S. B., IV. 363. 214. [*Tachina*] (1824) et VII. 229. Europa.
 13. [*Macquartia*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III. 1185. 188. (1844) et XIII. 6143. 188. [*Tachina*] (1859); ROND., Dipt. ital. Prodr., V. 164. 3. (1862); SCHN., F. A., I. 532. [*Macquartia*] (1862); BOSSD., Fiml. Insekt., II. 97. 111. [*Tachina*] (1866); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. 277. 23. [*Macquartia*] (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. t. X. f. 258. (1889) et LVIII. 384. (1891); PAND., Rev. entom., XV. 39. [*Erigone*] (1896).
 ? *griseicollis* MEG., S. B., IV. 365. 218. (1824) et VIII. 191. 70. [*Tachina*] (1838).
monticola PAND. (*ucc.* Egg.), Rev. entom., XV. 39. 15. [*Erigone*] (1896).
 ? *nitida* R.-D., Myod., 310. 2. [*Feria*] (1830) et Posth., II. 359. 1. [*Feria*] (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 435. (1891).
 ? *rubescens* R.-D., Myod., 310. 1. [*Feria*] (1830).
spinosa ZETT., Ins. Lapp., 648. 62. [*Tachina*] (1838).
rubescens R.-D. = ? **prolixa** MEG.
spinosa ZETT. = **prolixa** MEG.

*) *grisea*, *latifrons* et *tergestina* SCHN. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 407. (1891), nomina nuda sunt.

**) *Pyranta porphyralis* SCHIFF.

Eriothrix

MEIG., Illiger's Magaz., II, 280. (1803); PAND., Rev. entom., XIII, 38, 1. (1894).

Olivieria R.-D., Myod., 228, VI. (1830).

Panzeria MEIG., S. B., VII, 232, 26. (1838) *var.* R.-D. 1830. Dipt.

Proboscina RONDI., Dipt., ital. Prodr., I, 88, 22. (1856).

apenninus PAND. = **latifrons** B. B.

apenninus RONDI., Dipt., ital. Prodr., V, 161, 2. [*Rhyrachista*] (1862); Europaeentr.
Mik., Wien. entom. Zeitg., IX, 176, 79. [*Rhyrachista*] (1894); B. B.,
et mer.
B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 385. [*Olivieria*] (1891); BRACER,
Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 529, 4. [*Olivieria*] (1898).

apertus EGG. = **rufomaculatus** DEG.

fuscipennis MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III, 480, 199, t. VI, f. Algeria.
2. [*Scricocera*] (1849).

lateralis FABR. = **rufomaculatus** DEG.

latifrons BRACER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 529, 3. [*Olivieria*] Europaeentr.
(1898).

apenninus PAND. (*var.* RONDI.), Rev. entom., XV, 39, 14. [*Erigone*]
(1896).

longipes RONDI. = **monticola** EGG.

minor GIMM. = **rufomaculatus** DEG.

monticola EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI, 387. [*Macquartia*] Europaeentr.
(1856); SCHN., F. A., I, 530. [*Macquartia*] (1862); Mik., Wien.
et mer.
entom. Zeitg., IX, 156, 76. [*Rhyrachista*] (1890); B. B., Denkschr.
Akad. Wien, LVIII, 385. [*Olivieria*] (1891); BRACER, Sitzgsber.
Akad. Wien, CVII, 527. [*Olivieria*] (1898).

longipes RONDI., Dipt., ital. Prodr., I, 88. [*Proboscina*] (1856) et
V, 163, 1. [*Rhyrachista*] (1862); PAND., Rev. entom., XV, 39.
[*Erigone*] (1896).

reslitino HARR. = **rufomaculatus** DEG.

rufomaculatus DEG., Ins., VI, 28, 7, 1, f. 9. [*Musca*] (1776) et Europa.
et Götze, VI, 15, 7. [*Musca*] (1782); VULL., Entom. linl., III,
525, 296. [*Musca*] (1789); RONDI., Dipt., ital. Prodr., IV, 120, 1.
[*Olivieria*] (1861); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), II, 266.
[*Olivieria*] (1891); PAND., Rev. entom., XIV, 314. (1895).

albifrons L. in coll. ap. HALD., Stettin. entom. Zeitg., XII, 143.
[*Musca*] (1851).

apertus EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V, 10. [*Panzeria*]
(1845).

lateralis FABR., Spec. ins., II, 113, 37. [*Musca*] (1781), Entom.
syst., IV, 328, 68. [*Musca*] (1794) et Syst. Anth., 311, 8.
[*Oxyptera*] (1805); ? POND., Ins. Mus. graec., 117. [*Musca*]
(1761); GIMM., Syst. Nat., V, 2817, 211. [*Musca*] (1788);
ROSSI, Fauna etc., II, 307, 1508. [*Musca*] (1790); DON., Brit.
Ins., I, 62, 1, XXXI, f. 3. [*Musca*] (1792); SCHRANK, Fauna
boica, III, 119, 2115. [*Musca*] (1803); LATR., Hist. nat. crust.

- ins., XIV, 378, 1. [*Ocyptera*] (1895) et Nouv. Dict. Hist. nat., 2. ed., XXIII, 209, [*Ocyptera*] (1820); ILLIG., Fauna etc. Rossi, II, 469, 1508, [*Musca*] (1807); OL., Encycl. méthod., VIII, 424, [*Ocyptera*] (1811); FALL., Vet. Acad. Handl., XXXI, 285, 44, [*Tachina*] (1810) et Dipt. succ. Musc., 36, *nata*, [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV, 283, 78, [*Tachina*] (1824) et VII, 232, 1, t. LXX, f. 45—50, [*Panzeria*] (1838); R.-D., Myod., 228, 1, [*Olivieria*] (1830) et Posth., II, 104, 1, [*Olivieria*] (1863); HART., Jahresh. Fortschr. Forstwiss., I, 281, 6, [*Tachina*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 238, 5, 1, IV, f. 1, [*Sericocera*] (1834) et Suit. à Buff., II, 168, 9, [*Sericocera*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., III, 1188, 192, (1844) et XIII, 6143, 192, [*Tachina*] (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 793, [*Tachina*] (1849) et Ins. Brit., II, 34, 34, [*Tachina*] (1853); SCHIX., F. A., I, 435, [*Olivieria*] (1862); BOSSD., Fiml. Insekt., II, 98, 112, [*Tachina*] (1866); EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V, 9, [*Panzeria*] (1855); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 221, [*Olivieria*] (1865); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV, t. IV, f. 30, [*Olivieria*] (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. X, f. 266, (1889) et LVIII, 385, [*Olivieria*] (1891); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 36, [*Olivieria*] (1894); MIK et WACHTEL, Wien. entom. Zeitg., XIV, 218, 3, [*Olivieria*] (1895); BRÄUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 528, 2, [*Olivieria*] (1898).
minor GIMM., Programm Riga, II, [*Panzeria*] (1847) et Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX, (3), 186, 1, [*Panzeria*] (1847).
resilino HARR., Expos. engl. ins., 36, t. IX, f. 5, [*Musca*] (1776).
sanguineus MEIG., S. B., IV, 283, 77, [*Tachina*] (1824) et VII, 232, 2, [*Panzeria*] (1838); SCHIX., F. A., I, 435, [*Olivieria*] (1862).
tachinarius FALL., Dipt. succ. Rhizom., 6, 4, [*Ocyptera*] (1820).
sanguineus MEIG. — **rufomaculatus** DEG.
tachinarius FALL. — **rufomaculatus** DEG.

Marsilia

- ROND., Dipt. ital. Prodr., IV, 116, 66, [*Marsilia*] (1861), *emend.* SCDD.
collina ROND., Dipt. ital. Prodr., IV, 117, 1, (1861). Italia.
vallina ROND., Dipt. ital. Prodr., IV, 117, 2, (1861). Italia.

Trafoia

- B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 142 et 193, 76, (1893).
monticola B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 142, (1893). Alpes,
uncinervis PAND., Rev. entom., XV, 38, 13, [*Erigone*] (1896). Pyrenaei.
uncinervis PAND. = **monticola** B. B.

Bonannia

ROND., Dipt. ital. Prodr., IV, 118, 66. *b.* (1861).

- foliacea** PASD., Rev. entom., XIV, 316, 2. (1895). Gallia mer.
longimana PASD., Rev. entom., XIV, 317, 3. (1895). Gallia mer.
monticola ROND., Dipt. ital. Prodr., IV, 119, 1. (1861); PASD., Rev. Europaentr.
 entom., XIV, 315, 1. (1895); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, et mer.
 1900, 402. (1900).

Phoenicella

R.-D., Posth., I, 302, VII. [*Phenicellia*] (1863) *emend.* MÜK 1895.

Tachinella PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI, 281. (1881).

- haematodes** MEIG.*), S. B., IV, 267, 46. [*Tachina*] (1824) et VII. Europaentr.
 229, 10. [*Macquartia*] (1838); B. B., Denkschr. Akad. Wien, et mer.
 LXV, 109, 4. VI, f. 113. [*Tachinella*] (1889); MÜK et WACHTEL,
 Wien. entom. Zeitg., XIV, 218, 4. (1895).
Meigenii PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI, 281. [*Ta-*
chinella] (1881).
nigra HART., Jahresb. Fortsch. Forstwiss., I, 282, 7. [*Tachina*]
 (1838); R.-D., Posth., I, 303, 1. (1863).
nigripennis MEIG., S. B., IV, 267, 47. [*Tachina*] (1824) et VII.
 229, 11. [*Macquartia*] (1838).
Meigenii PORTSCH. — **haematodes** MEIG.
nigra HART. — **haematodes** MEIG.
nigripennis MEIG. — **haematodes** MEIG.

Cylindromyiopsis

BEZZI, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI, 144. (1906).

Cylindrogaster ROND., Dipt. ital. Prodr., IV, 9 et 136, 71.
 (1861) *nee* STÅL 1855 ORTHOPT.

Cylindropsis BEZZI, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI, 49.
 3. (1906) *nee* FARVEL Col.

Cylindrosoma ROND., Dipt. ital. Prodr., I, 79, 71. (1856) *nee*
 TSCHEDI 1838 Rept.

- corsica** B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 107. [*Cylindrogaster*] Corsica,
 (1891), *nomen nudum*.
sanguinea ROND. (*nee* MEIG.), Dipt. ital. Prodr., IV, 137, 1. [*Cylindro-* Europa mer.
gaster] (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXV, 136, 4. N. E.
 265. [*Cylindrogaster*] (1889).

*), *Arctia hebe* L.

Minthodes

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 136. (1889) et LX, 142. (1893).

pictipennis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 170, t. X, f. 264. Asia min. (1889).

Pseudomintho

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 136. (1889) et LX, 142. (1893).

brevipennis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 169, t. X, f. 263. Asia min. (1889).

Lophosia

MEIG., S. B., IV, 216. CXLV. (1824) et VII, 240, 30. (1838).

fasciata MEIG., S. B., IV, 216, 1, t. XI, f. 1-4. (1824); Macq., Soc. Europa. Sci. Lille, 1833, 217, 1, t. III, f. 3. (1834) et Suit. à Buff., II, 182, 1, t. XV, f. 1. (1835); v. Ros., Württemb. Corbl., I, 57. (1840); ZETT., Dipt. Scand., III, 1215, 1. (1814) et XII, 4704, *nola*. (1855); APEZ, Oesterlind. Mittheil., X, 168. (1849); SEMX., F. A., I, 449. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. X, f. 275. (1889); PAND., Rev. entom., XIII, 74. (1894).

Ocypterula

ROSD., Dipt. ital. Prodr., I, 78, 67. (1856) et IV, 121, 67. (1861).

Aubaca (bis) R.-D., Posth., II, 182, III. (1863).

costalis Lw., Stettin. entom. Zeitg., V, 268, 11. [*Ocypterula*] (1844). Asia min.

cylindrica FALL. - **pusilla** MEIG.

gracilis Lw. - **pusilla** MEIG.

interrupta ZETT. - **pusilla** MEIG.

pusilla MEIG., S. B., IV, 214, 6. [*Ocypterula*] (1824); Macq., Soc. Sci. Europa.

Lille, 1833, 216, 4. [*Ocypterula*] (1834) et Suit. à Buff., II, 186, 6.

[*Ocypterula*] (1835); Lw., Stettin. entom. Zeitg., VI, 175. [*Ocypterula*]

(1845); ROSD., Dipt. ital. Prodr., IV, 122, 1. (1861) et Archiv.

zool. Modena, I, 274, 1, t. XI, f. 1-3. (1861); SEMX., F. A., I,

414. [*Ocypterula*] (1862); BOSSD., Fiml. Insekt., II, 113, 4. [*Ocy-*

terula] (1866); PAND., Rev. entom., XIII, 63, 9. [*Ocypterula*] (1894);

VILLEX., Wien. entom. Zeitg., XXII, 38. [*Ocypterula*] (1903).

cylindrica FALL., Dipt. suec. Rhizom., 5, 2. [*Ocypterula*] (1820).

gracilis Lw., Stettin. entom. Zeitg., V, 266, 10. [*Ocypterula*] (1844).

interrupta ZETT. (*nec* MEIG.), Dipt. Scand., III, 1222, 3. (1844)

et XIII, 6159, 3. [*Ocypterula*] (1859); R.-D., Posth., II, 183, 1.

[*Aubaca*] (1863); BOSSD., Fiml. Insekt., II, 112, 3. [*Ocypterula*]

(1866).

Ocyptera

LATR., Hist. nat. Crust. Ins., IV. (1802) et XIV. 378. (1805).

Cylindromyia MEIG., Illig. Mag., II. 280. (1803).

Parthenia R.-D., Myod., 231. VIII. (1830).

- alpestris** ROXD., Archiv. zool. Modena, I. 274. 3. (1861) et Dipt. ital. Alpes.
Prodr., IV. 126. 3. (1861); PAND., Rev. entom., XIII. 61. (1894). Pyrenaei.
- auriceps** MEIG., S. B., VII. 215. 3. (1838); STEIN, Entom. Nachricht., Europeacentr.
XXVI. 132. (1900); VILLEX., Wien. entom. Zeitg., XXII. 40. 5. et mer.
(1903).
- caerulata* Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 239. 8. (1844); SCHN.,
F. A., I. 417. (1862); VILLEX., Wien. entom. Zeitg., XXII.
38. (1903).
- interrupta* SCHN., p. p., F. A., I. 414. (1862).
- Massinii* ROXD., Archiv. zool. Modena, I. 273. 1. (1861) et
Dipt. ital. Prodr., IV. 125. 1. (1861); PAND., Rev. entom.,
XIII. 63. 7. (1894).
- Piccioli* ROXD., Archiv. zool. Modena, I. 275. 6. (1861) et
Dipt. ital. Prodr., IV. 128. 6. (1861).
- auriceps* ROXD. **intermedia** MEIG.
- ✓ **bicolor** OL.?, Encycl. méthod., VIII. 423. 3. (1814); DUF., Annal. Europeacentr.
Sci. nat., X. 259. t. XI. f. 2. (1827); MÆQ., Soc. Sci. Lille, 1833. et mer.
215. 1. (1834) et Suit. à Buff., II. 185. 1. t. XV. f. 4. (1835); 2. Asia min.
Diet. pict. d'hist. nat., VI. 186. t. 415. f. 2. (1836—39); WESTW.,
Introd., II. 567. f. 131. 16—19. (1840); BLANCH., Hist. nat. ins.,
III. 612. (1810); ROXD., Archiv. zool. Modena, I. 273. 2. t. XI.
f. 3—7. (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 125. 2. (1861); SCHN.,
F. A., I. 413. (1862); R.-D., Posth., II. 177. 1. (1863); B. B.,
Denkschr. Akad. Wien, LXI. t. X. f. 272. (1889); PAND., Rev.
entom., XIII. 60. 3. (1894).
- coccinea* MEIG., S. B., IV. 211. 1. (1824) et VII. 216. (1838);
Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 231. 1. (1844); VILLEX., Wien.
entom. Zeitg., XXII. 40. 6. (1903).
- pentatomae* R.-D., Myod., 229. 1. (1830).
- Boscii** R.-D., Myod., 232. 2. [*Parthenia*] (1830) et Posth., II. 182. 2. Europa.
[*Parthenia*] (1863); MÆQ., Suit. à Buff., II. 186. 5. (1835); MEIG.,
S. B., VII. 215. 10. (1838).
- cylindrica* FABR. (non DEGE.), Syst. Anth., 313. 2. (1805); R.-D.,
Myod., 231. 1. [*Parthenia*] (1830) et Posth., II. 181. 1.
[*Parthenia*] (1863); MÆQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 216. 3.
(1834) et Suit. à Buff., II. 186. 4. (1836); ZIEGL., Dipt. Scand.,
III. 1221. 2. (1814); WALK., Ins. Brit., II. 9. 2. (1853); ROXD.,
Archiv. zool. Modena, I. 275. 5. (1861) et Dipt. ital. Prodr.,
IV. 127. 5. (1861); SCHN., F. A., I. 417. (1862); BOSSA,

*) *Rhaphigaster grisea* FABR.

Finnl. Insekt., II. 112. 2. (1866); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 134. (1900); VILLEN., Wien. entom. Zeitg., XXII. 40. 4. (1903).

praeceps ROSSI (*nec* SCOP.), Faun. etr., II. 307. 1507. [*Musca*] (1790); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 469. 1507. [*Musca*] (1807).
radicum FABR. ap. R.-D. 1830.

- brassicaria** FABR., Syst. entom., 877. 25. [*Musca*] (1775), Spec. insect., II. 443. 35. [*Musca*] (1786), Entom. syst., IV. 327. 63. (1794) et Syst. Anth., 312. 1. (1805); SCHAEFF., Icon. insect., t. 118. f. 4. [—] (1766); GMEL., Syst. nat., V. 2847. 209. [*Musca*] (1788); ROSSI, Fauna etr., II. 306. 1506. [*Musca*] (1790); CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 312. 982. [*Musca*] (1798); SCHELL., Genr. Monch. Dipt., 62. t. III. f. 1—2. [*Musca*] (1803); LATR., Gen. crust. ins., IV. 343. (1804), Hist. nat. crust. ins., XIV. 378. 2. (1805) et Cons. gén., 444. (1810); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II. 469. 1506. [*Musca*] (1807); FALL., Dipt. succ. Rhizom., 5. 1. (1820); MEIG., S. B., IV. 211. 2. t. XXXIX. f. 29. (1824); LAM., Anim. s. vert., III. 362. 6. [*Musca*] (1830); R.-D., Myod., 230. 4. (1830) et Posth., II. 177. 2. (1863); CURT., Brit. entom., 629. 1. (1832); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 215. 2. t. III. f. 2. (1834) et Suit. à Buff., II. 185. 2. (1835); LW., Stettin. entom. Zeitg., V. 234. 4. (1844) et VI. 180. 1. (1845); ZETZ., Dipt. Scand., III. 1220. 1. (1844) et XIII. 6158. 1. (1859); F. ROSSI, Verzeichn., 49. 2. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 693. (1849) et Ins. Brit., II. 9. t. XI. f. 4. (1853); ROSD., Archiv. zool. Modena, I. 274. 4. (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 127. 4. (1861); SCHIN., F. A., I. 416. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 112. 1. (1866); PAND., Rev. entom., XIII. 61. 5. (1894); VILLEN., Wien. entom. Zeitg., XXII. 39. V. et 40. 7. (1903).
- cylindrica* DEG., Ins., VI. 30. 9. t. I. f. 12—14. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI. 16. 9. [*Musca*] (1782); VILL., Entom. linn., III. 525. 297. [*Musca*] (1789).
sequis PANZ. (*nec* L.), Fauna germ., XXII. 22. [*Syrphus*] (1794).
- brevicornis** LW., Stettin. entom. Zeitg., V. 237. 6. (1844); SCHIN., F. A., I. 416. (1862). Europa centr.
- coarctata* LW. = **auriceps** MEIG.
- coccinea* MEIG. = **bicolor** OL.
- crassa** LW., Stettin. entom. Zeitg., VI. 178. 14. (1845). Europa mer.
- cylindrica* DEG. = **brassicaria** F.
- cylindrica* FABR. = **Boscii** R.-D.
- cylindrica* MEIG. = **intermedia** MEIG.
- dimidiata** OL., Encycl. méthod., VIII. 424. (1811). Italia.
- excisa* LW. — **intermedia** MEIG.
- fascipennis** LW., N. Beitr., II. 20. 43. (1854). Candia.
- hungarica** VILLEN., Wien. entom. Zeitg., XXII. 38. III. (1903). Hungaria.
- intermedia** MEIG., S. B., IV. 212. 3. (1824); R.-D., Myod., 231. 5. (1830) et Posth., II. 179. 3. (1863); LW., Stettin. entom. Zeitg., V. 236. 5. (1844); SCHIN., F. A., I. 416. (1862); STEIN, Entom. et mer.

- Nachricht., XXVI. 141. (1900); VILLEX., Wien. entom. Zeitg., XXII. 40. 3. (1903).
- auriceps* ROHD. (nec MEIG.), Archiv. zool. Modena, I. 276. 7. (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 129. 7. (1861).
- cylindrica* MEIG. (nec DEG.), S. B., IV. 213. 4. t. XXXIX. f. 28. (1824); WISS., Stettin. entom. Zeitg., VI. 35. (1845).
- excisa* LW., Dipt. Beitr., I. 19. 1. (1845); ROHD., Archiv. zool. Modena, I. 277. 9. (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 130. 9. (1861); SCHN., F. A., I. 415. (1862); PAND., Rev. entom., XIII. 62. 6. (1894).
- interrupta** MEIG., S. B., IV. 213. 5. (1824); WISS., Stettin. entom. Zeitg., VI. 35. (1845); SCHN., p. p., F. A., I. 414. (1862); VILLEX., Wien. entom. Zeitg., XXII. 39. 2. (1903). Europaeentr. et mer.
- setulosa* LW., Stettin. entom. Zeitg., V. 237. 7. (1845); PAND., Rev. entom., XIII. 63. 8. (1894); VILLEX., Wien. entom. Zeitg., XXII. 38. (1903).
- morio* BRULL. = **nigrita** MEIG.
- Massinii* ROHD. = **auriceps** MEIG.
- nigrita** MEIG., S. B., IV. 214. 7. (1824). Europa mer.
- morio* BRULLÉ, Exped. Morée, III. 314. 685. (1834); SCHN., F. A., I. 417. (1862).
- pentatomae* R.-D. = **bicolor** OL.
- Picciolii* ROHD. = **auriceps** MEIG.
- pilipes** LW., Stettin. entom. Zeitg., V. 233. 3. (1844); SCHN., F. A., I. 415. (1862); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 92. (1893); PAND., Rev. entom., XIII. 61. 4. (1894). Europaeentr. et mer.
- tineticornis* ROHD., Archiv. zool. Modena, I. 276. 8. (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 129. 8. (1861); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 493. 1. (1898).
- trinacrina* BIG., Annal. Soc. entom. France, (5). VIII. 42. 1. (1878); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 493. 2. (1898).
- praeceps* ROSSI = **Boscii** R.-D.
- robusta** LW., Zeitschr. Gesammt. Naturwiss., XLIII. 418. 15. (1874). Transcaaspia.
- rufipes** MEIG., S. B., IV. 215. 8. (1824); SCHN., F. A., I. 412. (1862); PAND., Rev. entom., XIII. 59. 2. (1894); VILLEX., Wien. entom. Zeitg., XXII. 40. 8. (1903). Europaeentr. et mer.
- scalaris** LW., Stettin. entom. Zeitg., V. 240. 9. (1844); SCHN., F. A., I. 417. (1862); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 92. (1893). Europaeentr. et mer.
- scapularis** LW., Stettin. entom. Zeitg., VI. 183. (1845). Europa mer.
- seguis* PASZ. **brassicaria** FABR.
- setulosa* LW. **interrupta** MEIG.
- tineticornis* ROHD. **pilipes** LW.
- trinacrina* BIG. **pilipes** LW.
- xylotina** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 801. (1860); SCHN., F. A., I. 415. (1862). Europaeentr.

Exogaster

ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 78. 69. (1856) et IV. 131. 69. (1861).

carinata LAW., Stettin. entom. Zeitg., VI. 176. 13. [*Ocyptera*] (1845). Europa mer.

carinata ROND. — **rufifrons** LAW.

rubida LAW., N. Beitr., II. 19. 42. [*Ocyptera*] (1854); SCHIX., F. A., I. 413. [*Ocyptera*] (1862). Europa mer.

rufifrons LAW., Stettin. entom. Zeitg., V. 232. 2. [*Ocyptera*] (1844); SCHIX., F. A., I. 413. [*Ocyptera*] (1862); PASZ., Rev. entom., XIII. 59. 1. [*Ocyptera*] (1894). Europa mer.

carinata ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 78. (1856) et IV. 131. 1. (1861) et Archiv. zool. Modena, I. 277. 1. t. XI. f. 8—10. (1861).

var. testacea VILLEN., Wien. entom. Zeitg., XXII. 39. IV. (1903). Europa mer.

testacea VILLEN. — **rufifrons** LAW. *var.*

Mintho

R.-D., Myod., 216. VI. (1830).

Wiedemannia MEIG., S. B., VII. 253. 41. (1838) *nov. ZETT.* 1837. Dipt.

algira MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 480. 198. t. VI. f. 3. Algeria. [*Scricocera*] (1849).

cincla O. F. MÜLL. — **praeceps** SCOP.

compressa FABR. — **praeceps** SCOP.

compressa SCHELL. — **rufiventris** FALL.

hystrix OL. — **praeceps** SCOP.

Isapis WALK. — ? **Isis** WIED.

Isis WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 304. 42. [*Tachina*] (1830); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 431. (1891).

? *Isapis* WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 848. [*Deria*] (1849).

lacera ROND., N. Annal. Sci. nat. Bologna, (2). VIII. 70. 3. t. I. f. 1—3. (1847) et Dipt. ital. Prodr., IV. 136. 3. (1861); JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff., XX. 29. 33. (1886). Europa mer.

lateralis PASZ. — **rufiventris** FALL.

larida SCHIRASK — **rufiventris** FALL.

? **obscuripennis** R.-D., Myod., 217. 2. (1830). Patria ignota.

praeceps SCHIX. — **rufiventris** FALL.

praeceps SCOP.?), Entom. cara., 333. 894. [*Musca*] (1763); VILL., Entom. linn., III. 514. 263. [*Musca*] (1789); ROND., N. Annal. Sci. nat. Bologna, (2). VIII. 69. 1. (1847) et Dipt. ital. Prodr., IV. 133. 1. (1861); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 412. Europa mer., Asia min.

*) *Polia polymita* L.

(1856); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 137. (1889); PAND., Rev. entom., XV, 147, 1. (1896).

cincta O. F. MULL., ap. ALL., Mém. soc. royal. Turin, III, 198. [*Musca*] (1766); GIORNA, Calend. entom. Torino, 109. [*Musca*] (1791); LESSONA, Annal. Acad. Agric. Torino, XVI, 59. (sep.) (1873).

compressa FABR., Entom. syst., IV, 327, 64. [*Musca*] (1794) et Syst. Anth., 314, 5. [*Oxyptera*] (1805); GUEL., Syst. nat., V, 2847, 210. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., 532, 322. [*Musca*] (1789); LW., Stettin. entom. Zeitzg., VIII, 251, 1. [*Wiedemannia*] (1847); SCHUS., F. A., I, 557. (1862).

chylrice OUL., Encycl. méthod., VIII, 424. [*Oxyptera*] (1811).

rafa FABR. ap. MEG., S. B., V, 41. [*Oxyptera*] (1826).

vittata O. G. COSTA, Atti Accad. Napoli, V, (2), 94, 12, 4, II, 1, 3. [*Oxyptera*] [(1835) 1844].

rafa FABR. **praeceps** Scop.

rufiventris FALL., Vet. Acad. Handl., 1816, 241, 16. [*Musca*] (1816) Europa-centr. et Dipt. suoc. Musc., 41, 8. [*Tachina*] (1821); LW., Stettin. entom. Zeitzg., VIII, 251, 2. [*Wiedemannia*] (1847); ZERR., Dipt. Scand., VIII, 3264, 14-15. [*Deria*] (1890); BOSSQ., Finnl. Insekt., II, 132, 14. [*Deria*] (1866).

Europa-centr. et sept.

compressa SCHELL. (nec FABR.), Genr. Mouch. Dipt., 62. [*Musca*] (1803); LLIG., Fauna str. Rossi, II, 469. [*Musca*] (1807); OUL., Encycl. méthod., VIII, 424. [*Oxyptera*] (1811); MEG., S. B., V, 41, 13. [*Deria*] (1826) et VII, 253, 1, 1. LXXII, 1, 1-5. [*Wiedemannia*] (1838); R.-D., Myod., 216, 1. (1839); MYOQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 239, 6. [*Sericovera*] (1834) et Suit. à Buff., II, 469, 10. [*Sericovera*] (1835); ZERR., Ins. Lapp., 652, 1. [*Musca*] (1838) et Dipt. Scand., III, 1277, 14. [*Deria*] (1811); ROXB., N. Annal. Sci. nat. Bologn., (2), VIII, 70, 2. (1817) et Dipt. ital. Prodr., IV, 131, 2. (1861); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 845. [*Deria*] (1853); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 137, 1, X, 1, 268. (1889); PAND., Rev. entom., XV, 147, 2. (1896).

lateralis PANZ. (nec FABR.), Faun. germ., VII, 22. [*Musca*] (1793); SCHELL., Genr. Mouch. Dipt., 1, III, 1, 3. [*Musca*] (1803); LLIG., Fauna str. Rossi, II, 470. [*Musca*] (1807).

larida SCHUSK. (nec FABR.), Fauna boica, III, 2483. [*Volucella*] (1803).

praeceps SCHUS. (nec Scop.), F. A., I, 556. (1862).

catillas HARR., Expos. engl. Ins., 86, 1, XXIV, 1, 20. [*Musca*] (1776).

catillas HARR. ? **rufiventris** FALL.

? **Thala** WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 845. [*Deria*] (1849).

Morocco

vittata O. G. COSTA **praeceps** Scop.

Phyllomyia

R.-D., Myod., 213, II. [*Phyllomyia*] (1830).

Melania MEIG., S. B., VII, 274, 6. (1838) *nee* LAW, 1816, Moll.

Melanota ROXO., Dipt. ital. Prodr., II, 43. (1857) et V, 162, 23. (1862).

? *Microptera* R.-D., Myod., 212, I. (1830).

Phorophylla R.-D., Myod., 213, III. (1830).

Sericocera MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 236. (1834).

bifasciata MEIG. = **volvulus** FABR.

cylindrica FALL. = **volvulus** FABR.

nitida R.-D. ? **volvulus** FABR.

palpata R.-D. **volvulus** FABR.

procera MEIG. = **volvulus** FABR.

volvulus FABR., Entom. syst., IV, 328, 67. [*Masca*] (1794) et Syst. Europa. 2

Antl., 314, 7. [*Ocyptera*] (1805); OL., Encycl. méthod., VIII, 425.

[*Ocyptera*] (1811); MEIG., S. B., V, 35, 2, t. XLIII, f. 19. [*Deria*] (1826) et VII, 275, 1, t. LXXII, f. 23—28. [*Melania*] (1838):

R.-D., Myod., 213, I. (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 237, 1, t. III, f. 10. [*Sericocera*] (1834) et Suit. à Buff., II, 165, 3. [*Sericocera*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 653, 3. [*Masca*] (1838) et Dipt.

Scand., III, 1271, 8. [*Deria*] (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 845. [*Deria*] (1849) et Ins. Brit., II, 96, 3. [*Deria*] (1853):

ROXO., Dipt. ital. Prodr., V, 173, 1. [*Melanota*] (1862); SCHIX., F. A., I, 555. [*Melania*] (1862); BOSSO., Fiml. Insekt., II, 129, 8. [*Deria*] (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. VIII, f. 219. [*Melanota*] (1889); PAND., Rev. entom., XV, 145, 8. [*Melanophora*] (1896).

bifasciata MEIG., S. B., V, 35, 1. [*Deria*] (1826) et VII, 275, 4.

[*Melania*] (1838); SCHIX., F. A., I, 555. [*Melania*] (1862).

cylindrica FALL., Vct. Acad. Handl., 1816, 242, 23. [*Masca*] (1816) et Dipt. suec. Muse., 43, 13. [*Masca*] (1821).

? *nitida* R.-D., Myod., 212, I. [*Microptera*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 165, 1. [*Sericocera*] (1835).

palpata R.-D., Myod., 214, I. [*Phorophylla*] (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 237, (101), 2. [*Sericocera*] (1834) et Suit. à Buff., II, 167, 4, t. XIV, f. 22. [*Sericocera*] (1835); MEIG., S. B., VII, 275, 3. [*Melania*] (1838).

procera MEIG., S. B., IV, 410, 297. [*Tachina*] (1824) et VII, 239, 1, t. LXXI, f. 1—5. [*Hypostena*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 22, 1, t. I, f. 1. [*Hypostena*] (1855); STEIX., Entom. Nachricht., XXVI, 147. (1900).

Thelaira

R.-D., Myod., 214, IV, (1830).

abdominalis R.-D. = *nigripes* FABR.*bifasciata* MEIG. = *nigripes* FABR.*bifasciata* R.-D. = *nigripes* FABR.*claripennis* R.-D. = *nigripes* FABR.*intocula* ROND. = *nigripes* FABR.*lateralis* FALL. = *nigripes* FABR.*leucozona* PANZ. = *nigripes* FABR.*maculata* R.-D. = *nigripes* FABR.*nigripes* FALL. = *nigripes* FABR.**nigripes** FABR.¹ Entom. syst., IV, 319, 3, [*Musca*] (1794) et Syst. Europa.

Antl., 293, 47, [*Musca*] (1805); PANZ., Fauna germ., CIV, 48, [*Musca*] (1809); MEIG., S. B., V, 33, 8, (1826) et VII, 270, 3, [*Devia*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II, 167, 6, [*Scricocera*] (1835); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 845, [*Devia*] (1849) et Ins. Brit., II, 96, 4, t. XII, f. 2, [*Devia*] (1853); ROND., Dipt. ital. Prodr., V, 176, 2, (1862); R.-D., Posth., I, 779, 4, (1863); STROMB., Mittheil. Ver. Stierm., XXX, 34, (1894); PANZ., R. v. entom., XV, 448, (1896); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII, 506, 35, (1899).

abdominalis R.-D., Myod., 215, 1, (1830).*amona* MEIG. in coll. ap. STRAS., Entom. Nachricht., XXVI, 131, [*Devia*] (1900).*bifasciata* MEIG., S. B., VII, 270, 2, (nec V) [*Devia*] (1838).*bifasciata* R.-D., Myod., 215, 2, (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 238, 4, [*Scricocera*] (1834) et Suit. à Buff., II, 168, 7, [*Scricocera*] (1835); MEIG., S. B., VII, 270, 2, [*Devia*] (1838).*claripennis* R.-D., Posth., I, 781, 5, (1863).*intocula* ROND., Dipt. ital. Prodr., V, 175, 1, (1862).*lateralis* FALL., Vet. Acad. Handl., 1816, 213, [*Musca*] (1816) et Dipt. suec. Musc., 12, II, [*Musca*] (1824).*leucozona* PANZ., Fauna germ., CIV, 49, [*Musca*] (1809); MEIG., S. B., V, 37, 7, (1826) et VII, 270, 1, [*Devia*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 237, 3, [*Scricocera*] (1834) et Suit. à Buff., II, 167, 5, [*Scricocera*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., III, 1266, 1, (1814), VIII, 3263, 1, (1849) et XIII, 6173, 1, [*Devia*] (1859); ROND., Dipt. ital. Prodr., V, 176, 3, (1862); SCHEU., F., A., I, 554, (1862); R.-D., Posth., I, 778, 3, (1863); BOSSQ., Fiml. Insekt., II, 127, 1, [*Devia*] (1866); WAGNER, Wien.

(*Aretia* caju L., *Cneullia* seropulariae Cuv., *Dianthocia* capsineola Hb., *Macrothylacia* rubi L., *Metopsilus* porcellus L., *Oenogyna* corsicum RAMB., *Phragmatobia* fuliginosa L., *Smerinthus* populi L., *Spilosoma* lubricipeda L.

entom. Zeitg., I. 277, 22. (1882); How., Insect Book, t. XXII, f. 24. (1902).

maculata R.-D., Posth., I. 777, 2. (1863).

nigrina FALL., Vet. Acad. Handl., 1816, 243. [*Musca*] (1816) et Dipt. succ. Musc., 42, 12. [*Musca*] (1821).

calida R.-D., Posth., I. 776, 1. (1863).

calida R.-D. = **nigripes** FABR.

Fortisia

[ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV. 94, 60. *a*. (1860)]; B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 108. (1889) et LX. 187. (1893); BEZZI, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 53, 13. (1906).

foeda MEIG., S. B., IV. 282, 74. [*Tachina*] (1824) et VII. 208, 3. Europacentr. [*Clista*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 170, 4. [*Philocera*] (1835) et mer. et Annal. Soc. entom. France, (3), III. 41, 5. t. II, f. 11. [*Clista*] (1855); SCHIX., F. A., I. 542. [*Clista*] (1862); JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff., XIX. 45, 25. [*Phortisia*] (1885); ? B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI, f. 112. (1889); POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 572. [*Clista*] (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III. 234. (1892); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 510, 118. (1898); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 137. (1900); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900, 382, 6. (1900).

muscina SCHIX., F. A., I. 542. [*Clista*] (1862).

phaeda ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV. 95, 1. (1860).

phacoptera R.-D., Posth., I. 1136, 5. [*Melanophora*] (1862);

PARD., Rev. entom., XV. 136, 10. [*Phyto*] (1896).

muscina SCHIX. — **foeda** MEIG.

phaeda ROXD. = **foeda** MEIG.

phacoptera R.-D. = **foeda** MEIG.

Cyrillia

ROXD., Dipt. ital. Prodr., I. 80, 73. (1856) et IV. 142, 75. [*Cyrillia*] (1860); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 543. (1898).

? *Arrallia* R.-D., Posth., II. 72, III. (1863).

? *Dufouria* R.-D., Myod., 257, V. (1830).

? *Phericia* R.-D., Posth., II. 70, II. (1863).

? *Silbermannia* R.-D., Posth., II. 73, IV. [*Silbermannia*] (1863),
em. Scud.

angustifrons ROXD., Dipt. ital. Prodr., I. 80. (1856) et IV. 142, 1. Europacentr. (1860); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 543. (1898). et mer.

? *clausa* R.-D., Myod., 258, 3. [*Dufouria*] (1830) et Posth., II. 71, 1. [*Phericia*] (1863); MACQ., Suit. à Buff., II. 163, 1.

- [*Cassidamnyia*] (1835): PAND., Rev. entom., XIV, 317, 1.
 [*Silbermannia*] (1895).
- aperta** R.-D., Myod., 258, 1. [*Dufouria*] (1830) et Posth., II, 68, 1. Gallia.
 [*Dufouria*] (1863).
catala R.-D., Posth., II, 70, 5. [*Dufouria*] (1863).
flavcola R.-D., Posth., II, 69, 4. [*Dufouria*] (1863).
floralis R.-D., Posth., II, 68, 2. [*Dufouria*] (1863).
grata R.-D., Posth., II, 69, 3. [*Dufouria*] (1863).
unda R.-D., Myod., 258, 2. [*Dufouria*] (1830): MACQ., Soc. Sci.
 Lille, 1833, 243, 1. [*Rhinophora*] (1834).
- atra** R.-D., Posth., II, 73, 1. [*Arallia*] (1863). Gallia.
- catala* R.-D. = **aperta** R.-D.
- clausa* R.-D. = ?**angustifrons** ROSE.
- flavcola* R.-D. = **aperta** R.-D.
- floralis* R.-D. = **aperta** R.-D.
- grata* R.-D. = **aperta** R.-D.
- unda* R.-D. = **aperta** R.-D.

Paratrixa

- B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 357, (1889) et LX, 158, (1893).
- polonica** B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 357, (1891). Europacentr.

Redtenbacheria

- SCHEX., Wien. entom. Monatschr., V, 143, (1861).
- insignis** Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI, 215, (1861); SCHEX., Europacentr.
 F. A., I, 512, (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. V,
 f. 108, (1889) et LXI, 618, (1894).

Thrixion

- B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 108, (1889) et LX, 157, (1893).
- aberrans** SCHEX., F. A., I, 522. [*Phytomyptera*] (1862); ROSE., Bull. Europacentr.
 Soc. entom. ital., IV, 108, 3. [*Phytomyptera*] (1871); B. B., Denkschr.
 Akad. Wien, LVI, t. VI, f. 110, (1889).
- Halidayanum** ROSE,¹⁾ Bull. Soc. entom. ital., IV, 108, 1. [*Phyto-* Europamer.
myptera] (1871); MÜLL. WIEN., entom. Zeitung, XI, 183, (1892);
 B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 222, (1893); PASTR., La Cellule,
 XV, 7 - 290, t. I, VI, (1898).

1) *Leptynia hispanica* BOE.

Trixa

MEIG., S. B., IV, 222, CXLVII. (1824).

Amsteinia BREM ap. AM STEIN, Jahresb. naturf. Ges. Graub., (2), III, 99. (1858).

Crameria R.-D., Myod., 59, 1. (1830) *nee* HEBB., 1816, Lep.

Murana MEIG. in litt. ap. MEIG. 1824.

Semiomyia BREM in litt. ap. MACQ. 1848.

Trixa PAND., Rev. entom., XIII, 47, XIV. (1894).

alpina MEIG.*), S. B., IV, 223, 1. (1824); MACQ., Suit. à Buff., II, Europa, 97, 2. (1835); SCHN., F. A., I, 446. (1862); BRUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII, 78. (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. VI, f. 109. (1889); MEALE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 78. (1892); PAND., Rev. entom., XV, 94, 1. (1896).

caeruleseens MEIG., S. B., IV, 224, 2, t. XL, f. 16. (1824); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 100, 1, t. IV, f. 8. (1848); ROSS., Dipt. ital. Prodr., III, 232, 2. (1859); R.-D., Posth., II, 373, 2. (1863).

ferruginea MEIG., S. B., IV, 224, 4. (1824); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 101, 3, t. IV, f. 9. (1848); R.-D., Posth., II, 374, 4. (1863); BOSSD., Fiml. Insekt., II, 101, 3. (1868).

lapponica ZETT., Ins. Lapp., 629, 1. (1838).

limbata ZETT., Ins. Lapp., 630, 3. (1838) et Dipt. Scand., III, 1200, 1. (1844); SCHN., F. A., I, 447, *nota*. (1862); BOSSD., Fiml. Insekt., II, 103, 1. (1868).

Amsteinii MACQ. - **oestroidea** R.-D.

caeruleseens MACQ. - **oestroidea** R.-D.

caeruleseens MEIG. - **alpina** MEIG.

dorsalis MEIG. - ? **oestroidea** R.-D.

ferruginea MEIG. - **alpina** MEIG.

grisea MEIG., S. B., IV, 224, 3. (1824); MACQ., Suit. à Buff., II, 97, Europa-centr., 3. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 101, 2, t. IV, f. 10. (1848); R.-D., Posth., II, 376, 6. (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 222. (1893).

Imhoffii MACQ. - **oestroidea** R.-D.

lapponica ZETT. - **alpina** MEIG.

limbata ZETT. - **alpina** MEIG.

obscura ZETT. - **scutellata** NEWM.

oestroidea R.-D.**), Myod., 60, 1. [*Crameria*] (1830), Annal. Soc. entom. France, (2), IV, 21, 1. (1846) et Posth., II, 372, 1. (1863); MACQ., Suit. à Buff., II, 97, 4. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 102, 4, t. IV, f. 7. (1848), (2), VIII, VIII, (1850);

*) Scarabacidae coprophagae?

**) ? Cheimatomia boreata L.

- Mégn.*, S. B., VII, 188, 7, (1838); ZETT., *Dípt. Scand.*, III, 1201, 3, (1844); ROSS., *Dípt. ital. Prodr.*, III, 232, 1, (1859); SCHUS., F. A., I, 447, (1862); BOSSQ., *Finnl. Insekt.*, II, I, 1, 4, (1868); FRATER, *Denkschr. Akad. Wien*, XLVII, 78, (1883); v. RÖB., *Entom. génev.*, V, 117, (1889); MEYER, *Entom. Monthly Mag.*, (2), III, 77, (1892); *Mus. Wien. entom. Zeitg.*, XVII, 171, 85, (1898).
Amsteinii MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VI, 103, 6, (1848).
catulescens MACQ. (*op. Mégn.*), *Soc. Sci. Lille*, 1833, 308, 1, 1, V, 1, 4, (1834) et *Suit. à Buff.*, II, 96, 1, t. XIV, f. 8, (1835); BLANCH., *Hist. nat. ins.*, III, 610, (1840).
dorsalis ? *Mégn.*, S. B., IV, 225, 5, (1824); MACQ., *Suit. à Buff.*, II, 97, 5, (1837) et *Annal. Soc. entom. France*, (2), VI, 104, 7, t. IV, f. 12, (1848); TH. APERTZ, *Mittheil. aus d. Oesterl.*, XII, 70, (1857); WALK., *Ins. Brit.*, II, 100, 2, (1853); ZETT., *Dípt. Scand.*, XII, 470, *obs.*, (1855); SCHUS., F. A., I, 447, (1862); R.-D., *Posth.*, II, 575, 5, (1863); PASQU., *Rev. entom.*, XV, 91, 2, (1896).
Imhoffii MACQ., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VI, 102, 5, 1, IV, f. 6, (1848).
ivatis BREM in litt. ap. MACQ. [*Scuticomyia*] (1848).
parisiensis R.-D., *Posth.*, II, 574, 3, (1863).
parvipennis BREM ap. AM. STREIN, *Jahresb. naturf. Ges. Graub.*, (2), III, 93, [*Amsteinia*] (1858).
variegata ? *Mégn.*, S. B., IV, 225, 6, (1824); MACQ., *Suit. à Buff.*, II, 98, 6, (1835) et *Annal. Soc. entom. France*, (2), VI, 104, 8, t. IV, f. 11, (1848); WALK., *Ins. Brit.*, II, 100, 1, t. XII, f. 3, (1853); R.-D., *Posth.*, II, 576, 7 et 920, (1863).
parisiensis R.-D. = *oestroidea* R.-D.
parvipennis BREM = *oestroidea* R.-D.
Schummelii ROTLEM., *Verh. Ver. schles. Ges. nat. Kult.*, Germania, 1836, 86, (1837).
scutellata NEWM., *Entom. Mag.*, I, 507, (1833); WALK., *Ins. Brit.*, Europaentr. et sept., II, 101, 3, (1853); MEYER, *Entom. Monthly Mag.*, (2), III, 78, (1892).
obscura ZETT., *Ins. Lapp.*, 630, 2, (1838) et *Dípt. Scand.*, III, 1201, 2, (1844); BOSSQ., *Finnl. Insekt.*, II, 103, 2, (1868).
variegata *Mégn.* = *oestroidea* R.-D.

Chaetostevenia

- BRAUER, *Sitzgsber. Akad. Wien*, CIV, 601, (1895) et CVII, 520, (1898).
Fischeri BRAUER, *Sitzgsber. Akad. Wien*, CIV, 601, (1895), Italia.
parthenopea ROSS., *Dípt. ital. Prodr.*, IV, 115, 2, [*Stercenia*] (1860); Italia.
 BRAUER, *Sitzgsber. Akad. Wien*, CIV, 601, (1895) et CVII, 520, (1898).
maculata STROBL (*op. FALL.*), *Mittheil. Ver. Steierm.*, XXX, 52, [*Stercenia*] (1894); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LXI, 621, [*Catharasia*] (1894).

Myiostoma

R.-D., Myod., 327, XVI. [*Myiostoma*] (1830).

A. *Myiostoma* s. str.

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 118, (1889) et LX, 172, (1893).

microcerum R.-D., Myod., 327, 1, (1830) et Posth., II, 361, 1, (1863): Europa-centr.
Macq., Suit. à Buff., II, 218, 2, t. XV, f. 21, [*Homalogastr*] et mer. (1835).

?*patruclis* PAND., Rev. entom., XV, 155, 2, [*Deria*] (1896).

pectinatum B. B. (nec MEG.), Denkschr. Akad. Wien, LX, 222, (1893).

patruclis PAND. = ?**microcerum** R.-D.

pectinatum B. B. = **microcerum** R.-D.

B. *Homalostoma*

ROSD., Dipt. ital. Prodr., V, 58, 3, b. [*Omalostoma*] (1862) *cm.* SCUD.

alivarians PAND. = **forte** ROSD.

forte ROSD., Dipt. ital. Prodr., V, 59, 1, (1862).

Europa-centr.

alivarians PAND., Rev. entom., XV, 156, 4, [*Deria*] (1896).

et mer.

robustum ROSD., Dipt. ital. Prodr., V, 60, (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 224, (1893).

robustum ROSD. = **forte** ROSD.

Billaea

R.-D., Myod., 328, XVII. (1830).

A. *Gymnobasis*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 120, (1889) et LX, 174, (1893).

marilima SEMX. = **microcera** ROSD.

microcera ROSD. (nec R.-D.), Dipt. ital. Prodr., V, 54, 1, [*Myiostoma*] Europa-centr.
(1862). et mer.

marilima SEMX., F. A., t. 563, [*Phorostoma*] (1862); PAND.

Rev. entom., XV, 155, 3, [*Deria*] (1896).

scutellaris R.-D., Myod., 327, 2, [*Myiostoma*] (1830) et Posth., II, Gallia.

362, 2, [*Myiostoma*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 187, 1.

t. II, f. 3, [*Homalogastr*] (1834).

B. *Gymnodexia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 364, (1891) et LX, 173, (1893).

Steinii B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 364, (1891).

Hungaria.

triangulifera ZETT., Dipt. Scand., III, 1269, 6, [*Deria*] (1844); SEMX., Europa.

F. A., I, 562. [*Phorostoma*] (1862); BOSSO, Fund. Insekt., II, 128, 6. [*Deria*] (1868); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 331 et 341. (1894); PAVS., Rev. entom., XV, 157, 6. [*Deria*] (1896).

C. Billaea s. str.

Sirostoma Rossi, Dipt. ital. Prodr., V, 3 et 5, 2, *b*. (1862).

grisea R.-D. = **pectinata** Meig.

lata Egg. = **pectinata** Meig.

pectinata Meig., S. B., V, 43, 17. [*Deria*] (1826); SCHNEF, F. A., I, 562. [*Phorostoma*] (1862). Europ. ent.,
et met.

grisea R.-D., Myod., 328, 4. (1830); Mæg., Soc. Sci. Lille, 1833, 187, 2. [*Homalogaster*] (1824) et Suit. à Bull., II, 249, 3. [*Homalogaster*] (1835); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 222. (1893).

lata Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI, 390. [*Deria*] (1856); BRÄUER, Sitzgsber. Akad. Wien, LXXXVIII, 876, t. II, f. 13-19. [*Phorostoma*] (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. VII, f. 163. [*Sirostoma*] (1889); PAVS., Rev. entom., XV, 157, 5. [*Deria*] (1896).

triangulifera Rossi, *in* Zettl., Dipt., ital. Prodr., V, 55, 1. [*Sirostoma*] (1861).

triangulifera Rossi, = **pectinata** Meig.

D. Homalogaster

Mæg., Soc. Sci. Lille, 1833, 187. [*Omalogaster*] (1834).

? *Murchia* R. D., P. th., II, 396, IX. (1863).

Phorostoma Rossi, *in* R.-D., Dipt., ital. Prodr., I, 83, 3. (1876) et V, 56, 3, *a*. (1862).

? *Tilesia* R.-D., Posth., II, 366, IX. (1863).

frontalis R.-D., Posth., II, 366, 1. [*Tilesia*] (1863).

Gallie
Caucas.

intermedia PETERSEN, Høv. Soc. entom. Ross., XVI, 49. [*Phorostoma*] (1882); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 431. [*Phorostoma*] (1894).

Caucas.

microphthalma Lw. = **subrotundata** Rossi.

microsculptata PETERSEN = **subrotundata** Rossi.

subrotundata Rossi, Dipt. ital. Prodr., V, 55, 1. [*Phorostoma*] (1861). Europ. ent.
Caucas.

microphthalma Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVIII, 43-45. [*Phorostoma*] (1870); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 433. [*Phorostoma*] (1894).

(?) *Rh. oblongus* subobtus L.

nigrofasciata PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XV, 158, (1881)
et XVI, 138. [*Phorostoma*] (1882); B. B., Denkschr. Akad.
Wien, LVIII, 135, [*Phorostoma*] (1891).

synophthalma R.-D., Postr., II, 367, 1. [*Morcia sinophthalma*] Gallia.
(1863).

E. *Aerapidomyia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 118, (1889), LVIII, 367, (1891) et LX, 165, 173,
(1893).

adelpha LW. = **irrorata** MEIG.

fortis PAND. = **irrorata** MEIG.

irrorata MEIG.?, S. B., V, 44, 18, [*Deria*] (1826); STERN, Entom. Europa cente.
Nachricht., XXVI, 141, (1900). et mer.

adelpha LW., Berlin, entom. Zeitschr., XVII, 45, 1, [*Phoro-*
stoma] (1873); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 521,
(1891).

fortis PAND. (nec RONDI), Rev. entom., XV, 167, 1. [*Hemulo-*
stoma] (1896).

parvula PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI, 138, [*Phoro-*
stoma] (1882); WACHTEL, Wien, entom. Zeitg., V, 307, [*Pho-*
rostoma] (1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 367,
(1891); GIBSCH., Entom. Nachricht., XXV, 177, 1, (1899).

parvula PORTSCH. = **irrorata** MEIG.

Morphomyia

ROND., Dipt. ital. Prodr., I, 83, 1. [*Morphomyia*] (1856) et V, 47, (1862).

caliendrata ROND., Dipt. ital. Prodr., V, 49, 1, (1862); B. B., Denkschr. Europa mer.
Akad. Wien, LVIII, 389, (1891); PAND., Rev. entom., XV,
169, 1, (1896).

circumflexa ZETZ. = **tachinoides** FALL.

pellucens EGG. = **tachinoides** FALL.

tachinoides FALL., Vet. Acad. Handl., 1816, 244, [*Musca*] (1816) et Europa.
Dipt. succ. Musc., II, 17, [*Musca*] (1822); ROND., Dipt. ital.
Prodr., V, 50, 2, (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII,
389, (1891); PAND., Rev. entom., XV, 169, 2, (1896).

circumflexa ZETZ., Dipt. Scand., III, 1170, 173, [*Tachina*] (1844);
ROND., Fimil. Insekt., II, 93, 102, [*Tachina*] (1868).

pellucens EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X, 799, [*Deria*]
(1830); SCHM., F. A., I, 564, [*Deria*] (1862); PORTSCH., Hor.
Soc. entom. Ross., XVI, 145, (1882); STERN., Sitzgsber. Dorp.
Nat. Ges., 1889, 52, 15, [*Deria*] (1889).

† *Saperda populnea* F.

Syntomocera

- SCHEIN., Wien, entom. Monatschr., V, 113, (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 118, (1889) et LX, 173, (1893).
- biseriatis* POIRSON., Hor. Soc. entom. Ross., XVI, 139, [*Decia*] (1882). Caucasus.
- breviciliata* PASAD., Rev. entom., XV, 153, [*Decia*] (1896). Gallia mer.
- cristata* WALK., *petiolata* BOSSD.
- graeca* V. ROU., Sitzgsber. Dorpat, naturf. Ges., 1887, 230, [*Deciomorpha*] (1887). Graecia.
- petiolata* BOSSD., Fennl. Insekt., II, 131, 13, [*Decia*] (1866); POIRSON., Hor. Soc. entom. Ross., XVI, 115, (1882); V. ROU., Sitzgsber. Dorp. naturf. Ges., 1887, 227, [*Deciomorpha*] (1887); SCHEIN., Sitzgsber. Dorp. naturf. Ges., 1889, 53, 17, [*Deciomorpha*] (1889); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 223, (1893).
- cristata* WALK. (see MING.) Ins. Brit., II, 35, 2, [*Decia*] (1853); ROSD., Dipt. ital. Prodr., V, 63, 1, [*Deciomorpha*] (1862); SCHOHL, Wien, entom. Zeitg., XVIII, 217, 133, (1899); PASAD., Rev. entom., XV, 153, 1, [*Decia*] (1896).
- streophagina* SCHEIN. in litt. ap. BRATER.

Estheria

R.-D., Myod., 305, 1, (1830).

Dinera MING., S. B., VII, 268, 3, (1838) see R.-D., 1830.

- angustifrons* POIRSON., Hor. Soc. entom. Ross., XVI, 141, [*Synthlipsis*] (1882). Caucasus.
- Bohemani* ROSD., Dipt. ital. Prodr., V, 84, 1, [*Zocia*] (1862) et Ann. Soc. ital. Sci. Nat., IV, 114, 4, [*Zocia*] (1861); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXIII, 121, (1891). Europa.
- cristata* ZETT. (see MING.) Dipt. Scand., III, 1279, 16, [*Decia*] (1811); PASAD., Rev. entom., XV, 165, 2, [*Zocia*] (1896).
- cristata* MING., S. B., V, II, 11, [*Decia*] (1826) et VII, 269, 1, 1, LXVIII, 1, 13-17, [*Dinera*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 188, 1, [*Dinera*] (1834) et Suit. à Buff., II, 210, 1, 1, XV, 1, 16, [*Dinera*] (1834); BLANCH., Hist. nat. ins., III, 613, [*Decia*] (1849); WALK., List. Dipt. Brit. Mus., IV, 836, [*Decia*] (1849); R.-D., Posth., II, 348, 1, (1863); V. ROU., Sitzgsber. Dorp. nat. Ges., 1887, 231, [*Dinera*] (1887).
- floralis* R.-D., Myod., 307, 1, (1830) et Posth., II, 350, 1, (1863).
- fuscicornis* EGGER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV, 293, [*Zocia*] (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXIII, 130, (1891).
- impudicium* R.-D., Myod., 306, 3, (1830) et Posth., II, 349, 2, (1863); PASAD., Rev. entom., XV, 165, 1, [*Zocia*] (1896).
- pallidicornis* BRATER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII, 508, 54 (1899).
- vicini* R.-D., Myod., 307, 5, (1830).

- cristata* ZIEFF. = **Bohemani** ROHD.
floralis R.-D. = **cristata** MEG.
fuscicornis Egg. = **cristata** MEG.
imperatoriae R.-D. = **cristata** MEG.
pallicornis Lw., Schrift. nat. Ges. Moskau, 1870, 58, 77. [*Dinera*] Transcaepia.
 (1870) et Beschreib. europ. Dipt., III, 237, 152. [*Dinera*] (1873);
 v. Rohd., Sitzgsber. Dap. nat. Ges., 1887, 232. [*Dinera*] (1887).
pallidicornis BRALER = **cristata** MEG.
vicina R.-D. = **cristata** MEG.

Dolichodexia

- B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 118, (1889) et LX, 172, (1893).
rufipes B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 167, (1889), Hungaria.

Myxodexia

- B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 363, (1891) et LX, 173, (1893).
Neotropidomyia TYL.-TOWNS., Trans. amer. entom. Soc., XIX,
 96, (1892).
Tropidomyia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 119, (1889)
 see WILL., 1888, Dipt.
macronychia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 167. [*Tropido-* Rhodus.
myia] (1889). Syria.

Dexiomorpha

- ROHD., Dipt. ital. Prodr., I, 84, 4, (1856) et V, 60, 4. [*Dexiomorpha*] (1862) *em.*
 v. Rohd., 1887.
acuta PORRICH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI, 141. [*Syptomocera*] Caucasus.
 (1882).
decolor PAYD. = ?**picata** MEG.
litoralis ROHD., Dipt. ital. Prodr., V, 65, 3, (1862); B. B., Denkschr. Europa mer.
 Akad. Wien, LVIII, 363, (1891).
maritima ROHD. = **picata** MEG.
picata MEG., S. B., V, 44, 19, (1826) et VII, 271, 5. [*Dexia*] (1838). Europaeentr.
 SCHN., F. A., I, 563. [*Syptomocera*] (1862); B. B., Denkschr. et mer.
 Akad. Wien, LVI, I, VII, E, 162, (1889) et LVIII, 363, (1891);
 STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII, 103, (1893).
decolor PAYD., Rev. entom., XV, 153. [*Dexia*] (1896).
maritima ROHD., Dipt. ital. Prodr., V, 64, 2, (1862); PORRICH.,
 Hor. Soc. entom. Ross., XVI, 145, (1882).
tricolor PORRICH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI, 140. [*Syptomocera*] Caucasus.
 (1882).

Dexia

Meig., S. B., V, 33, CLX, (1826).

Catilia R.-D., Myod., 310, V, (1830).

Dexilla Westw., Introd., II, App. 140, (1840).

Ida R.-D., Posth., II, 389, XVI, (1863) *see* JAGG., 1836.

- ?**atripes** Meig., S. B., VII, 272, 19, (1838). Europa-centr.
nigrripes Macq. (*see* FABR.), Suit. à Buff., II, 214, 11, (1835).
- cincta** R.-D., Myod., 312, 4, (1830). Gallia.
- cincta* R.-D. **rustica** FABR.
- ?**dolens** ZETT., Ins. Lapp., 654, 5, [*Musca*] (1838) et Dipt. Scand., II, 1275, 12, (1844); BOSSD., Föind. Insekt., II, 131, 12, (1866). Europa sept.
- ?**fingens** WALK., Ins. Brit., II, 98, 7, (1853). Anglia.
- flavipes** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Museum, XXI, 322, (1898). Japonia.
- gracilis** R.-D., Myod., 313, 5, (1830) et Posth., II, 389, 4, (1863). Gallia.
- grisea* R.-D. **rustica** FABR.
- griseoscutus* R.-D. **rustica** FABR.
- ?**hirsuta** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 192, (56), 7, (1834) et Suit. à Buff., II, 213, 6, (1835); Meig., S. B., VII, 271, 16, (1838); ROXB., Dipt. Ital. Prodr., V, 88, (1862). Gallia.
- ?**Hyala** WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 849, (1849). Gallia.
- interrupta* Macq. **rustica** FABR.
- lyrata* ZETT. **rustica** FABR.
- marmorata** Meig., S. B., VII, 270, 4, (1838). Hispania.
- nigra* Macq. **nitida** R.-D.
- nigrripes* Macq. **atripes** Meig.
- ?**nitida** R.-D., Myod., 311, 1, [*Catilia*] (1830). Gallia.
nigra Macq., Suit. à Buff., II, 213, 8, (1835); Meig., S. B., VII, 272, 18, (1838); SEAB., Kröyers nat. Tidsskr., IV, 202, (1812).
- petiolata* R.-D. **rustica** FABR.
- plebeja* FABR. ?**rustica** FABR.
- rustica** FABR., Spec. ins., II, 140, 23, [*Musca*] (1781), Entom. syst., IV, 322, 41, [*Musca*] (1794) et Syst. Anth., 296, 64, [*Musca*] (1805); GALL., Syst. nat., V, 2812, 187, [*Musca*] (1788); VAILL., Entom. him., III, 1-2, 183, [*Musca*] (1789); ROSS, Mand., II, 65, 535, [*Musca*] (1794); Meig., S. B., V, 46, 22, (1826); R.-D., Myod., 311, 1, (1830) et Posth., II, 385, 1, (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 190, 1, 3, II, 1, 4, (1834) et Suit. à Buff., II, 211, 1, (1835); BOSSON., Hist. nat. ins., III, 613, (1840); ZETT., Dipt. Scand., 1265, 2, (14) et VIII, 3263, 2, (1849); WALK., Ins. Brit., II, 97, 5, (1853); ROXB., Dipt. Ital. Prodr., V, 75, 2, (1862); SCHW., F. A., I, 560, (1821); BOSSD., Föind. Insekt., II,

(1) *Melobanthe vulgaris* L., *Rhizotrogus solidinialis* F.

126, 2. (1866); BOYS, Entom. Medd., IV, 130, 1, 1. (1893); PAND., Rev. entom., XV, 160, 10. (1896).

cinerea R.-D., Posth., II, 357, 9. [*Dinera*] (1863).

grisea R.-D., Myol., 314, 7. (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 191, (55), 3. (1834) et Suit. à Buff., II, 212, 4. (1835); MEIG., S. B., VII, 271, 15. (1838); ROXB., Dipt. ital. Prodr., V, 75, 1. (1862).

griseiceps R.-D., Posth., II, 356, 8. [*Dinera*] (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 224. (1893).

latirapula MACQ., Suit. à Buff., II, 213, 7. (1835); MEIG., S. B., VII, 272, 17. (1838).

lycala ZETT., Dipt. Scand., III, 1265, var. *b*. (1844).

pubolata R.-D., Posth., II, 389, 1. [*Ida*] (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 436. (1891).

plebeja FABR., Spec. ins., II, 440, 25. [*Musca*] (1781). Entom. syst., IV, 322, 49. [*Musca*] (1794) et Syst. Anl., 296, 63. [*Musca*] (1805); VILL., Entom. linn., III, 482, 182. [*Musca*] (1789).

testacea MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 191, (55), 4. (1834) et Suit. à Buff., II, 212, 5. (1835); MEIG., S. B., VII, 271, 14. (1838).

testacea MACQ. - **rustica** F.

vacua FALL., Vet. Acad. Handl., 240, 10. [*Musca*] (1816) et Dipt. succ. Musc., 42, 10. [*Musca*] (1822); MEIG., S. B., V, 46, 23. (1826) et VI, 374. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 212, 3. (1835); ZETT., Dipt. Scand., III, 1265, 3. (1844); WALK., Ins. Brit., II, 97, 3. (1853); ROXB., Dipt. ital. Prodr., V, 76, 3. (1862); SEMX., F. A., I, 560. (1862); R.-D., Posth., II, 388, 3. (1863); BOSSO., Fiml. Insekt., II, 127, 3. (1866); PAND., Rev. entom., XV, 160, 9. (1896). Europa.

Dexiosoma

ROXB., Dipt. ital. Prodr., I, 85, 9. (1856) et V, 84, 9. (1862).

caninum FABR., Spec. ins., II, 440, 24. [*Musca*] (1781). Entom. syst., IV, 321, 38. [*Musca*] (1794) et Syst. Anl., 296, 60. [*Musca*] (1805); GMEL., Syst. nat., V, 2842, 185. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III, 481, 181. [*Musca*] (1789); ROSSI, Mant. ins., 65, 537. [*Musca*] (1794); FALL., Dipt. succ. Musc., II, 9. [*Musca*] (1822); MEIG., S. B., V, 47, 24, t. XLIII, f. 17. [*Deria*] (1826); R.-D., Myol., 313, 6. [*Deria*] (1830); GÜMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV, 675. [*Deria*] (1842); ZETT., Ins. Lappi., 653, 2. [*Musca*] (1838) et Dipt. Scand., III, 1263, 1. [*Deria*] (1844); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 191, 2. [*Deria*] (1834) et Suit. à Buff., II, 212, 2, t. XV, f. 17. [*Deria*] (1835); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 813. [*Deria*] (1849) et Ins. Brit., II, 98, 8. [*Deria*] (1853); ROXB., Dipt. ital. Prodr., V, 85, 2. (1862); SEMX., F. A., Europa.

l. 560. [*Devia*] (1862): BOSSG., Finnl. Insekt., II, 126, 1. [*Devia*] (1866): PAND., Rev. entom., XV, 164, 2. [*Microphthalma*] (1896): *collets* HARR., Expos. engl. ins., St. t. XXV, f. 12. [*Musca*] (1776).

pusillum (WILK.) B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 362. (1894). Europaeum
collets HARR. caninum FABR.

Microphthalma

Macq., Dipt. exot., II, (3), 211, (84), 4. (1843).

Amesia R.-D., Posth., II, 363, VII. (1863) *see* DRSO, 1840 Lep.

disjuncta WIED., Anl. entom., 45, 88. [*Tachina*] (1824) et AUSER, Europaeum
 zweif. Lts., II, 235, 24. [*Tachina*] (1830): COQUILL., Rev. Tachin. et mer.

N. A., Lts. (1897) et Journ. N. York Soc., VII, 218. (1899):
 HOW., Insect Book, t. XXII, f. 25. (1902): ALONCH, Cat. N. A.
 Dipt., 482. (1905).

✓ — *europaea* EGGER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X, 801. (1850)
 2 *schm.*, F. A., I, 565. (1862): PAND., Rev. entom., XV, 163,
 I. (1896).

flavescens BIG., Annal. Soc. entom. France, (6), I, 369. [*Deviosoma*]
soma] (1881).

longifacies ROXB., Dipt. ital. Prodr., V, 85, 1. [*Deviosoma*]
 (1862): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, t. VII, f. 148.
 (1889).

michiganensis TYL.-TOWNS., Trans. am. entom. Soc., XIX, 111.
 [*Megaprosopus*] (1892).

nigra MACQ., Dipt. exot., II, (3), 242, (85), 1, t. X, f. 2. (1843):
 WILK., Trans. am. entom. Soc., XIII, 396. (1886).

trifasciata SAY, Journ. Acad. Philad., VI, 174. [*Millogramma*]
 (1823) et Compl. Writ., II, 363. [*Millogramma*] (1859).

tricoides WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 760. [*Tachina*]
 (1849).

vaciabilis R.-D., Posth., II, 361, 1. [*Amesia*] (1863): B. B.,
 Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 342. (1894).

europaea EGGER, disjuncta WIED.

flavescens BIG., disjuncta WIED.

longifacies ROXB., disjuncta WIED.

michiganensis TYL.-TOWNS., disjuncta WIED.

nigra MACQ., disjuncta WIED.

trifasciata SAY, disjuncta WIED.

tricoides WALK., disjuncta WIED.

vaciabilis R.-D., disjuncta WIED.

Prosenia

ST. FARG. SERV., Encycl. méthod., X, 500, (1825).

- Pangustifrons** MEADE, Wien. entom. Zeiſg., XI, 114, [*Aphria*] (1899) Anglia.
 et Entom. Monthly Mag., (2), V, 70, [*Aphria*] (1894); B. B.,
 Denkschr. Akad. Wien, LX, 219, [*Rhinolachina*] (1893); VERR.,
 List Brit. Dipt. sec. ed., 26, (1904).
- epicurea* ROXD., **longirostris** Egg.
grisea FABR. = **sybarita** FABR.
irrilans PANZ., **sybarita** FABR.
longipes GMEL., **sybarita** FABR.
- longirostris** Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X, 798, (1860); SCHN., Europaeente.
 F. A., I, 558, (1862); BECH., Denkschr. Akad. Wien, XLV, 1, et mer.
 IV, f. 26, (1882).
epicurea ROXD., Archiv. Zool., I, 281, 2, t. XI, f. 10, A, (1861).
 Dipt. ital. Prodr., V, 71, 2, (1862) et Atti Soc. ital. Sci. Nat.,
 XI, 597, (1868); BRACHER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII, 507,
 41, (1899).
- luculliana** ROXD., Archiv. Zool., I, 281, 3, (1860) et Dipt. ital. Prodr., Italia.
 V, 72, 3, (1862).
- siberita* auct. = **sybarita** auct.
- sybarita** FABR., Syst. entom., 798, 2, [*Stomoxys siberita*] (1775), Spec. Europa.
 ins., II, 467, 3, [*Stomoxys*] (1788), Entom. syst., IV, 394, 4,
 [*Stomoxys*] (1794) et Syst. Antl., 280, 4, [*Stomoxys*] (1805);
 GMEL., Syst. nat., V, 2894, 2, [*Stomoxys*] (1788); VALL., Entom.
 lin., III, 583, 17, [*Conops*] (1789); PREYSSL., Mayers Samml.
 Phys. Aufsätze, II, 45, [*Conops*] (1792); LYRA, Gen. crust. ins.,
 IV, 339, [*Stomoxys*] (1809); FALL., Dipt. succ. Haemat., 5, 1,
 [*Stomoxys*] (1818); MEIG., S. B., IV, 169, 2, t. XXXVIII, f. 1—4,
 [*Stomoxys*] (1824) et VII, 277, 1, t. LXXIII, f. 35—40, (1838);
 ST. FARG. SERV., Encycl. méth., X, 500, (1825); R-D., Myod.,
 317, 1, (1830) et Posth., II, 391, 1, (1893); MACQ., Soc. Sci. Lille,
 133, 194, 1, (1834); CURR., Brit. entom., VIII, 665, [*Stomoxys*]
 (1836); ZETT., Dipt. Scand., III, 984, 1, (1844) et XII, 4681, 1,
 (1835); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III, 681, [*Stomoxys*] (1849)
 et Ins. Brit., II, 93, 1, t. XII, f. 1, (1853); ROXD., Archiv. Zool.,
 I, 280, f. t. XI, f. 10, B, (1860) et Dipt. ital. Prodr., V, 70, f.
 (1862); SCHN., F. A., I, 558, (1862); BOYD., Fiml. Insekt., II,
 32, 1, (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, t. VIII, f.
 196, (1889); PAND., Rev. entom., XV, 161, II, [*Deria*] (1896).
grisea FABR., Entom. syst., IV, 394, 2, [*Stomoxys*] (1794) et
 Syst. Antl., 279, 2, [*Stomoxys*] (1805); SCHALL., Geogr. Mouch.
 Dipt., 82, 1, XVII, f. 2, [*Stomoxys*] (1803).
irrilans PANZ. (nec L.), Fauna germ., V, 24, [*Stomoxys*] (1793);
 LYRA, Anim. s. vert., III, 395, 2, [*Stomoxys*] (1816).
longipes GMEL., Syst. nat., V, 2892, 7, [*Stomoxys*] (1788).
siberica MACQ., Suit. à Buff., II, 208, 1 et 579, 1, XV, f. 11
 (1835); BLANCH., Hist. nat. ins., III, 613, (1840).

Rhynchodinera

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 126. (1889) et LX. 175. (1893).

- cinerascens** B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 168. (1889). Europa mer.
lata Macq., Luc. Explor. Alger. Zool., 483, 208, t. VI. f. 5. [*Deria*] Algeria.
 (1848).

Mochlosoma

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 126. (1889) et LX. 175. (1893).

- Simonyi** B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 370. (1891). Canariae.

Paraprosena

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 127. (1889) et LX. 175. (1893).

- Waltlii** B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 169. (1889). Hispania.

Dinera

R.-D., (Myod., 307, II.) Posth., II. 352, III. (1863).

Aria R.-D., Myod., 309, III. (1830).

albida R.-D. = **grisescens** FALL.

arida R.-D. = **grisescens** FALL.

cinerea Macq. = **grisescens** FALL.

cristata SCHN. = **grisescens** FALL.

cylindrica R.-D. = **grisescens** FALL.

flavicornis MEIG., S. B., V. 42, 15. [*Deria*] (1826) et VII. 269, 2. Europacentr.
 [*Dinera*] (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 189, 2. (1834) et
 Suit. à Buff., II. 210, 3. (1835); R.-D., Posth., II. 353, 1. (1863);
 v. Röd., Sitzgsber. Dorp. nat. Ges., 1887, 232. (1887); STREX, Entom.
 Nachricht., XXVI. 137. (1900).

fulvipes R.-D., Myod., 308, 1. (1830).

fulvicrus R.-D. = **grisescens** FALL.

fulvipes R.-D. = **flavicornis** MEIG.

grisea R.-D. = **grisescens** FALL.

grisescens FALL., Vet. Acad. Handl., 1816, 243. [*Musca*] (1816) et Europa.

Dipt. succ. Musc., 44, 16. [*Musca*] (1822); MEIG., S. B., V. 45,

21. (1826), VI. 374. [*Deria*] (1830); Macq., Suit. à Buff., II.

211, 4. [*Deria*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., III. 1278, 15. (1844)

et XIII. 6176, 15. [*Deria*] (1859); SCHN., F. A., I. 557. (1862);

BONSD., Finkl. Insekt., II. 133, 15. [*Deria*] (1866); JAROSCH,

Trudy nat. Ges. Karkoff., XII. 121, 63. (1878); v. Röd., Sitzgsber.

Dorp. nat. Ges., 1887, 232. (1887); B. B., Denkschr. Akad.

Wien, LVI. t. VIII. f. 203. (1889) et LX. 221. (1893); PAND.,

- Rev. entom., XV, 162, 12. [*Deria*] (1896); STRIS, Entom. Nachricht., XXVI, 439, (1900).
- albida* R.-D., Posth., II, 355, 7, (1863).
- arida* R.-D., Posth., II, 355, 6, (1863).
- cinerea* MACQ., Suit. à Buff., II, 211, 5, (1835); MEIG., S. B., VII, 269, 4, (1838).
- cristata* SCHN. (nec MEIG.), F. A., I, 557, (1862).
- cylindrica* R.-D., Myod., 308, 4, (1830) et Posth., II, 354, 4, (1863).
- fulvicrus* R.-D., Myod., 309, 1, [*Aria*] (1830) et Posth., II, 358, 1, [*Aria*] (1863); MACQ., Suit. à Buff., II, 219, 4, [*Homalogaster*] (1835).
- grisea* R.-D., Myod., 308, 2, (1830) et Posth., II, 354, 3, (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 189, (53), 3, (1834); MEIG., S. B., VII, 269, 3, (1838).
- pygmaea* R.-D., Myod., 309, 5, (1830) et Posth., II, 354, 5, (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 189, (53), 4, (1834); MEIG., S. B., VII, 269, 5, (1838).
- rufifrons* ROND., Dipt. ital. Prodr., V, 67, 1, (1862).
- Zetterstedtii* R.-D., Posth., II, 353, 2, (1863).
- nigripes** MACQ., Luc. Explor. Alger. Zool., III, 484, 209, t. VI, f. 6, Algeria, (1848).
- pygmaea* R.-D. = **grisescens** FALL.
- rufifrons* ROND. = **grisescens** FALL.
- Zetterstedtii* R.-D. = **grisescens** FALL.*)

Myiocera

R.-D., Myod., 328, XVIII, [*Myocera*] (1830).

- ? *Adenia* R.-D., Posth., II, 403, XXII, (1863).
- Amyelaea* R.-D., Posth., II, 404, XXIII, (1863).
- Arenia* R.-D., Posth., II, 920, (1863).
- ? *Asbella* R.-D., Posth., II, 398, XIX, (1863).
- ? *Nicava* R.-D., Posth., II, 399, XX, (1863).
- Phorostoma* R.-D., Myod., 326, XV, (1830).

anthophila R.-D. = **carinifrons** FALL.

apicalis R.-D. = **ferina** FALL.

calcium R.-D. = **ferina** FALL.

carinifrons FALL., Vet. Acad. Handl., 1816, 243, 15, [*Musca*] (1816) Europa, et Dipt. succ. Musc., 44, 15, [*Musca*] (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 192, 6, [*Deria*] (1834) et Suit. à Buff., II, 214, 10, [*Deria*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 653, 4, [*Musca*] (1838) et Dipt.

* *clausa* SCHN., ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 417, (1891) est nomen nudum.

- Scand., III. 1270. 7. (1844), XII. 4708. 7. [*Deria*] (1855); ROSS., Dipt. ital. Prodr., V. 78. 2. (1862); SCHIX., F. A., I. 559. [*Deria*] (1862); R.-D., Posth., II. 395. 4. (1863); BOSSD., Fiml. Insekt., II. 128. 7. [*Deria*] (1866); PAND., Rev. entom., XV. 159. 8. [*Deria*] (1896); HEND., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 209. 5. (1901).
- anthophila* R.-D., Myod., 330. 3. (1830) et Posth., II. 397. 6. (1863).
- fera* R.-D., Myod., 330. 4. (1830).
- griseus* R.-D., Myod., 330. 6. (1830).
- nomada* R.-D., Myod., 330. 5. (1830) et Posth., II. 394. 3. (1863).
- squalida* R.-D., Posth., II. 396. 5. (1863).
- vaga* R.-D., Posth., II. 397. 7. (1863).
- carinifrons* MEIG. = **ferina** FALL.
- curvipes** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6175. 13-14. [*Deria*] (1859). Scandinavia.
- fera* R.-D. = **carinifrons** FALL.
- ferina** FALL. (*), Vet. Acad. Handl., 1816. 242. 14. [*Musca*] (1816) et Dipt. suec. Musc., 43. 14. [*Musca*] (1822); MEIG., S. B., V. 42. 16. [*Deria*] (1826); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 192. 5. [*Deria*] (1834) et Suit. à Buff., II. 213. 9. [*Deria*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., III. 1268. 5. (1844) et XII. 4708. 5. [*Deria*] (1855); ROSS., Dipt. ital. Prodr., V. 78. 1. (1862); SCHIX., F. A., I. 560. [*Deria*] (1862); R.-D., Posth., II. 393. 1. (1863); BOSSD., Fiml. Insekt., II. 128. 5. [*Deria*] (1866); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 76. [*Deria*] (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VIII. 205. (1889); PAND., Rev. entom., XV. 158. 7. [*Deria*] (1896); HEND., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI. 209. 5. (1901).
- apicalis* R.-D., Posth., II. 394. 2. (1863).
- calvium* R.-D., Myod., 329. 2. (1830).
- carinifrons* MEIG. (nec FALL.), S. B., V. 45. 20. [*Deria*] (1826).
- longipes* R.-D., Myod., 329. 1. (1830); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 222. (1893).
- subrotunda* R.-D., Myod., 327. 1. [*Pharostoma*] (1830).
- subrotundata* MACQ., Suit. à Buff., II. 218. 1. [*Homalogaster*] (1835).
- griseus* R.-D. = **carinifrons** FALL.
- longipes* R.-D. = **ferina** FALL.
- ? **masiceraeformis** PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 283. [*Deria*] (1882). Caucasus.
- nomada* R.-D. = **carinifrons** FALL.
- ? **palpata** R.-D., Posth., II. 401. 1. [*Vicua*] (1863). Gallia.
- ? **ruficornis** R.-D., Posth., II. 399. 1. [*Isbella*] (1863). Gallia.
- serva** R.-D., Posth., II. 404. 1. [*Amyclaea*] (1863). Gallia.

*) ? *Dorcus parallelepipedus* F.

squalida R.-D. = **carinifrons** FALL.

subrotunda R.-D. = **ferina** FALL.

subrotundata MACQ. = **ferina** FALL.

vaga R.-D. = **carinifrons** FALL.

? **volucris** R.-D., Posth., II. 403. 1. [*Adenia*] (1863).

Gallia.

Zeuxia

MEIG., S. B., V. 8. CLI. (1826).

Ptilocera R.-D., Myod., 221. III. (1830). *nee* WIED. 1820. Dipt.

cinerea MEIG., S. B., V. 8. 1. t. XLII. f. 11–13. (1826); MACQ., Suit. Europacentr.
à Buff., II. 209. 1. t. XV. f. 15. (1835); SCHN., F. A., I. 565. et mer.
(1863); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 142. 1. (1861) et
Dipt. ital. Prodr., V. 83. 4. (1862); PAND., Rev. entom., XV.
166. 3. (1896).

conica R.-D., Myod., 222. 2. [*Ptilocera*] (1830) et Posth., II.
384. 4. [*Ptilocera*] (1863); ? PAND., Rev. entom., XV. 132. 6.
[*Phyto*] (1896).

palpalis R.-D., Myod., 222. 1. [*Ptilocera*] (1830) et Posth., II.
383. 3. [*Ptilocera*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 235.
10. [*Ptilocera*] (1834).

rubetra R.-D., Posth., II. 382. 1. [*Ptilocera*] (1863); B. B.,
Denkschr. Akad. Wien. LX. 224. (1893).

conica R.-D. = **cinerea** MEIG.

latifrons PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 140. (1882).

Caucasus.

nigricornis R.-D., Posth., II. 383. 2. [*Ptilocera*] (1863).

Gallia.

palpalis R.-D. = **cinerea** MEIG.

Palumbii ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 226. (1865); MINÀ Sicilia.
PAL., Nat. sicil., XIV. 19. 10. (1896).

parmensis ROND. = **tessellata** EGG.

rubetra R.-D. = **cinerea** MEIG.

subapennina ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 143. 2. (1861) et Europamer.
Dipt. ital. Prodr., V. 82. 3. (1862); STRON., Wiss. Mittheil. Bosn.
Herzeg., VII. 606. (1900).

tessellata EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 798. (1860); SCHN., Europacentr.
F. A., I. 565. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 1. et mer.
VIII. f. 174. (1889).

parmensis ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., IV. 143. 3. (1861),
XI. 597. (1868) et Dipt. ital. Prodr., V. 81. 2. (1862).

tergestina SCHN. in litt. ap. ROND.

Peyritschia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 121. (1889) et LX. 164. (1893).

Eggeria ROND., Dipt. ital. Prodr., V. 87. 9. *bis*. (1862) *nee*
SCHN., 1861. Dipt.

- distans** WIED., Ausser. zweifl. Ins., H. 380. 20. [*Deria*] (1830); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 413. [*Zexria*] et 427. (1891). Algeria.
- erythaea** Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 389. [*Deria*] (1856); SCHIX., F. A., I. 564. [*Syptomocera*] (1862); ROXD., Dipt. ital. Europacentr. et mer.
Prodr., V. 88. 1. [*Egyeria*] (1862); JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff, 1883. 321. 45. [*Syptomocera*] (1883).
- nigricornis** Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 800. [*Deria*] (1860); SCHIX., F. A., I. 564. [*Syptomocera*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 168. (1889). Europacentr. et mer.

Tapinomyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 121. (1889) et LX. 164. (1893).

- piliseta** B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 168. (1889). Austria.

Ptilozeuxia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 123. (1889) et LX. 165. (1893).

- brachycera** B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 368. (1891). Europacentr. et mer.
brevicornis Egg. (*nec* WIED. 1830), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 800. [*Deria*] (1860); SCHIX., F. A., I. 564. [*Syptomocera*] (1862).

Paramorinia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 367. (1891) et LX. 165. (1893).

- cincta** B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 368. (1891). Tirolia.

Rhinomorinia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 123. (1889) et LX. 165. (1893).

- claripennis** SCHIX. (*nec* R.-D.), F. A., I. 554. [*Nyctia*] (1862); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 514. (1898). Europacentr.
- ?**corvina** MEIG., S. B., VII. 205. 9. [*Medoria*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 28. t. 1. f. 8. [*Medoria*] (1855); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 206. [*Morinia*] (1893); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 33. (1894); STEIX, Entom. Nachricht., XXVI. 134. (1900). Europacentr.
- minor* STROBL. **sarcophagina** SCHIX.
- puberula** ZERR., Ins. Lapp., 654. 6. [*Musca*] (1838) et Dipt. Scand., III. 1276. 13. (1844), XIII. 6174. 13. [*Deria*] (1859); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 367. (1891). Europacentr. et sept.
- sarcophagina** SCHIX., F. A., I. 552. [*Morinia*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VIII. f. 184. (1889). Europacentr. et mer.

- minor* STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 33. [*Morinia*] (1894).
- velox* PAND., Rev. entom., XV. 168. 1. [*Morinia*] (1896).
- trifasciata** MACQ., Suit. à Buff., II. 174. 2. [*Melanophora*] (1835) et Annal. Soc. entom. France. (3). III. 181. 1. [*Anthracia*] (1855); MEIG., S. B., VII. 274. 5. [*Nyctia*] (1838); SCHN., F. A., I. 551. [*Morinia*] (1862); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herce., XIV. 489. [*Morinia*] (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX. 550. [*Morinia*] (1904).
- velox* PAND. = **sarcophagina** SCHN.
- ? **vernalis** MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 95. 11. [*Melanophora*] (1834) et Suit. à Buff., II. 176. 13. [*Melanophora*] (1835); MEIG., S. B., VII. 274. 6. [*Nyctia*] (1838).*

Europacentr.
et mer.

Gallia.

Sarcotachina

PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 277. (1882).

- subcylindrica** PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 277. (1882) et XVIII. 132. (1884); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 368. (1891).

Rossia mer.

Rhinophorinae.

Plesina

MEIG., S. B., VII. 244. 16. (1838).

? *Feburia* R.-D., Myod., 256. IV. (1830).

Plesioneura MACQ., Annal. Soc. entom. France. (3). II. 736. (1854) et (3). III. 180. (1855).

brevicornis ZETT. = **maculata** FALL.

florentina ROND., Dipt. ital. Prodr., IV. 146. 3. [*Stevenia*] (1861). Italia.

incisuralis MACQ., Annal. Soc. entom. France. (3). III. 180. l. t. III. f. 4. [*Plesioneura*] (1855). Gallia.

liturata Lw. = **maculata** FALL.

maculata FALL., Dipt. succ. Rhizom., 6. 5. [*Ocyptera*] (1820); MEIG., S. B., IV. 286. 82. [*Tachina*] (1824) et VII. 210. 4. [*Rhinophora*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 171. 8. [*Philocera*] (1835) et Annal. Soc. entom. France. (3). III. 187. 4. t. III. f. 11. [*Rhinophora*] (1855); ZETT., Dipt. Scand., III. 1232. 1. (1844) et XIII. 6163. 1. [*Leucostoma*] (1855); ROND., Dipt. ital. Prodr., IV. 147. 4. [*Stevenia*] (1861); SCHN., F. A., I. 545. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 123. [*Stevenia*] (1889); MEADE,

Europa.

*) *obscura* MEIG., S. B., V. 32. 30. [*Sarcophaga*] (1826) et VII. 276. 5. [*Morinia*] (1838), *see* B. B. est *Morellia curvipes* MACQ.

- Entom. Monthly Mag., (2), III, 235. (1892); PAND., Rev. entom., XV, 137, 11. [*Phyto*] (1896).
- brevicornis* ZETT., Dipt. Scand., III, 1233, 2. [*Leucostoma*] (1844).
- liturata* Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII, 260, 1. (1847).
- ? *rapida* R.-D., Myod., 272, 1. [*Feburia*] (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 244, 5. [*Rhinophora*] (1834) et Suit. à Buff., II, 164, 7. [*Cassidaemyia*] (1835).
- umbratica* MEIG. (nec FALL.), S. B., IV, 287, 83. [*Tachina*] (1824) et VII, 212, 10. [*Leucostoma*] (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 191, 3, t. IV, f. 3. [*Leucostoma*] (1855); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 150. (1900).
- nubilipennis** Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII, 261, 2. (1847). Italia.
- parmensis** ROSD., Dipt. ital. Prodr., IV, 145, 1. [*Stevenia*] (1861). Italia.
- phalerata** MEIG., S. B., IV, 285, 80. [*Tachina*] (1824) et VII, 214, 1. Patria ignota.
t. LXIX, f. 53—55. (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 201, t. IV, f. 18. (1855); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 146. (1900).
- rapida* R.-D. — ? **maculata** FALL.
- ruficornis** Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 192, 4, t. IV, f. 4. [*Leucostoma*] (1855). Gallia.
- sicula** ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI, 47. [*Stevenia*] (1868); Sicilia.
MINÀ PAL., Nat. sicil., XIV, 18, 5. [*Stevenia*] (1896).
- umbratica* MEIG. = **maculata** FALL.

Tromodesia

ROSD., Dipt. ital. Prodr., I, 87, 17. (1856) et V, 141, 17. (1862).

- vibripennis** ROSD., Dipt. ital. Prodr., I, 87. (1856) et V, 145, 1. Europa mer. (1862).
- vibripennis* STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV, 490. [*Morinia*] (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX, 550. [*Morinia*] (1904).
- vibripennis* STROBL = **vibripennis** ROSD.

Stevenia

R.-D., Myod., 220, II. (1830).

Ptilocera Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 232. (1834).

Ptilocerina Macq., Suit. à Buff., II, 664. (1835).

Ptilochaeta ROSD., Dipt. ital. Prodr., II, 13. (1857).

Trichoneura LOV., Atti Istit. ven., (3), X, 68. [*Trisoncra*] (1865) *em.* SCDD, 1882, *nec* Lw. 1845. Dipt.

A. *Stevensia* s. str.

- Hyperaca* R.-D., Posth., II. 379. XIII. (1863).
- Ptilochaeta* B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 121. (1889)
et LX. 161. (1893).
- abdominalis* R.-D. = **femoralis** ROED.
- abramentaria* ROED. = **umbratica** FALL.
- Bertei** ROED., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 227. [*Ptilocera*] (1865). Italia.
- bicincta** MEIG., S. B., VII. 240. 2. [*Rhinophora*] (1838); SCHIX., F. A., I. 548. [*Phyto*] (1862); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 99. [*Rhinophora*] (1893). Europacentr.
- ?tomentosa* R.-D., Myod., 220. 1. (1830) et Posth., II. 378. 1. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 234. 5. t. III. f. 9. [*Ptilocera*] (1834) et Smit. à Buff., II. 171. 6. [*Ptilocera*] (1835).
- caucasica** PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XI. 28. [*Rhinophora*] (1875). Caucasus.
- deceptricula** Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 267. 6. [*Rhinophora*] (1847). Europacentr.
- distinguenda** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 308. 5. [*Rhinophora*] (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 443. [*Ptilochaeta*] (1891). Europa mer.
- Fausti** PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XI. 27. [*Rhinophora*] (1875). Caucasus.
- femoralis** ROED. (nec MEIG.), Dipt. ital. Prodr., V. 138. 2. [*Ptilochaeta*] (1862); SCHIX., F. A., I. 546. [*Rhinophora*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VII. f. 171. [*Ptilochaeta*] (1889); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 99. [*Rhinophora*] (1893); PAND., Rev. entom., XV. 134. 9. [*Phyto*] (1896). Europacentr. et mer.
- abdominalis* R.-D., Posth., II. 380. 1. [*Hyperaca*] (1863).
- hyalinata** ZETT., Dipt. Scand., III. 1231. 2. [*Rhinophora*] (1844). Scandinavia.
- laeviventris** Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 268. 7. [*Rhinophora*] (1847). Rhodus.
- lateralis** MACQ., Luc. Explor. Alger. Zool., III. 481. 201. t. VI. f. 1. [*Ptilocera*] (1849). Algeria.
- lugubris* ZETT. = **umbratica** FALL.
- nigripennis* R.-D. = **umbratica** FALL.
- nitens* R.-D. = **umbratica** FALL.
- obscuripennis** Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 264. 3. [*Rhinophora*] (1847); SCHIX., F. A., I. 547. [*Rhinophora*] (1862). Europacentr.
- pallidicornis** Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 270. 9. [*Rhinophora*] (1847). Asia min.
- Rondanii* PAND. = **umbratica** FALL.
- signata** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 307. 4. [*Rhinophora*] (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 439. [*Ptilochaeta*] (1891). Europacentr. et mer.
- simplicissima* Lw. = **umbratica** FALL.
- Tacchettii** ROED., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 227. [*Ptilochaeta*] (1865). Italia.

tomentosa R.-D. = **bicincta** MEIG.

triangulata Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 263. 2. [*Rhinophora*] Rhodus. (1847).

umbratica FALL.*), Dipt. succ. Rhizom., 7. 6. [*Ocyptera*] (1820): Europe.
MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 234. 6. [*Ptilocera*] (1834) et Suit. à Buff., II. 171. 7. [*Ptilocera*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., III. 1230. 1. (1844) et XIII. 6162. 1. [*Rhinophora*] (1839); v. Röd., Entom. Nachricht., XIV. 219. [*Rhinophora*] (1888); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 99. [*Rhinophora*] (1893); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 571. [*Rhinophora*] (1894).

atramentaria ROXD. (nec MEIG.), Dipt. ital. Prodr., V. 136. 4. [*Ptilochaeta*] (1862).

lugubris ZETT., Dipt. Scand., XII. 4706. 1-8. [*Rhinophora*] (1855).

nigripennis R.-D., Myod., 221. 3. (1830).

nitens R.-D., Myod., 221. 2. (1830) et Posth., II. 378. 2. (1863).

Rondanii PAND., Rev. entom., XV. 131. 5. [*Phyto*] (1896).

simplicissima Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 270. 10. [*Rhinophora*] (1847); SCHN., F. A., I. 546. [*Rhinophora*] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 52. [*Rhinophora*] (1894); PAND., Rev. entom., XV. 131. 4. [*Phyto*] (1896).

velox R.-D., Myod., 221. 4. (1830) et Posth., II. 379. 3. (1863).

velox R.-D. = **umbratica** FALL.**)

B. *Ptilocerina*

Rhinophora B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 365. (1891) et LX. 161. (1893) nec R.-D. 1830.

atramentaria MEIG.***), S. B., IV. 291. 93. [*Tachina*] (1824) et VII. 210. 3. [*Rhinophora*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 172. 9. [*Ptilocera*] (1835); v. Ros., Württemb. Corubl., I. 57. nota. [*Tachina*] (1840); ? WALK., Ins. Brit., II. 36. 39. [*Tachina*] (1853); SCHN., F. A., I. 547. [*Rhinophora*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 365. [*Rhinophora*] (1891); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2) III. 234. [*Rhinophora*] (1892); PAND., Rev. entom., XV. 131. [*Phyto*] (1896).

? *femorialis* MEIG., S. B., IV. 291. 94. [*Tachina*] (1824) et VII. 210. 1. t. LXIX. f. 35-39. [*Rhinophora*] (1838); MACQ.,

Annal. Soc. entom. France, (3) III. 185. 1. t. III. f. 8. [*Rhinophora*] (1855); STEIN, Entom. Nachricht., XXIV. 136. (1900).
interlapsa WALK., Ins. Brit., II. 37. 41. [*Tachina*] (1853).

*) *Callidium violaceum* L.

**) *distans* MEIG. ap. B. B., LVIII. 413. [*Ptilochaeta*] (1891) est nomen nudum.

***) ? *Oniscus asellus* L.

- melanura* MEIG. ap. STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 143. (1900).
?merulina Scop., Entom. carn., 344. 928. [*Musca*] (1763);
 SCHRANK, Enum. insect., 477. 971. [*Musca*] (1781); VILL.,
 Entom. linn., III. 520. 280. [*Musca*] (1789).
- Bertolinii** ROSS., Dipt. ital. Prodr., V. 140. 5. [*Ptilochaeta*] (1862); Europa centr.
 STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 52. [*Rhinophora Bertolinii*] et mer.
 (1894).
- cilipennis* MACQ. = **melania** MEIG.
- deceptor** Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 266. 5. [*Rhinophora*] Sicilia.
 (1847).
- femoralis* MEIG. = ?**atramentaria** MEIG.
- fuscipennis* MACQ. = **melania** MEIG.
- Galeazzii** ROSS., Dipt. ital. Prodr., V. 141. 6. [*Ptilochaeta*] (1862). Italia.
- inornata** Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 271. 11. [*Rhinophora*] Europa centr.
 (1847); SCHN., F. A., I. 546. [*Rhinophora*] (1862).
- interlapsa* WALK. = **atramentaria** MEIG.
- lucidiventris** Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 269. 8. [*Rhinophora*] Ephesus.
 (1847).
- melania** MEIG., S. B., V. 40. 12. [*Deria*] (1826); Macq., Soc. Sci. Europa.
 Lille, 1833. 235. 7. [*Ptilocera*] (1834), Suit. à Buff., II. 172. 10.
 [*Ptilocera*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 188. 6.
 t. V. f. 13. [*Rhinophora*] (1855); WALK., Ins. Brit., II. 68. 112.
 [*Tachina*] (1853); ROSS., Dipt. ital. Prodr., V. 139. 4. [*Ptilo-*
chaeta] (1862); SCHN., F. A., I. 547. [*Rhinophora*] (1862); STROBL,
 Wien. entom. Zeitg., XII. 99. [*Rhinophora*] (1893).
- cilipennis* MACQ., Suit. à Buff., II. 172. 12. t. XIV. f. 23. [*Ptilo-*
cera] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 186. 2.
 t. III. f. 9. [*Rhinophora*] (1855); MEIG., S. B., VII. 211. 8.
 [*Rhinophora*] (1838); LLOY, Atti Istit. ven., (3). X. 68. [*Tri-*
choucra] (1865); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 133. (1900).
- fuscipennis* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 186. 3.
 t. III. f. 10. [*Rhinophora*] (1855).
- obliqua* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 188. 7. t.
 III. f. 14. [*Rhinophora*] (1855).
- perpendicularis* MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 188.
 8. t. III. f. 15. [*Rhinophora*] (1855).
- rectangularis* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 235. (99). 9. [*Ptilo-*
cera] (1834), Suit. à Buff., II. 172. 11. [*Ptilocera*] (1835) et
 Annal. Soc. entom. France, (3). III. 187. 5. t. III. f. 12.
 [*Rhinophora*] (1855); MEIG., S. B., VII. 211. 7. [*Rhinophora*]
 (1838); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 148. (1900).
- merulina* Scop. = ?**atramentaria** MEIG.
- obliqua* MACQ. = **melania** MEIG.
- Passerinii** ROSS., Dipt. ital. Prodr., V. 138. 3. [*Ptilochaeta*] (1862). Italia.
- perpendicularis* MACQ. = **melania** MEIG.
- rectangularis* MACQ. = **melania** MEIG.
- subpellucida** Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 265. 4. [*Rhinophora*] Europa mer.
 (1847).

Styloneuria

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 365. (1891) et LX. 161. (1893).

Mannii B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 365. (1891) et LXI. 619. (1894). Europ. mer.,
Ins. Cauc.

Frauenfeldia

Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 297. (1865).

Trichogena ROSS., Dipt. ital. Prodr., I. 88. 20. (1856) et V. 157. 20. c. [*Trichogena*] (1862), var. *hybrida*!

barbata MEIG. = **rubricosa** MEIG.

hirticornis ZETT. = **rubricosa** MEIG.*)

nigritarsis ZETT. = **rubricosa** MEIG.

rubricosa MEIG., S. B., IV. 305. 113. [*Tachina*] (1824) et VII. 210. 10. [*Rhinophora*] (1838); SCHN., F. A., I. 548. [*Phyto*] (1862); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 297. (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 121. t. VII. f. 172. (1889) et LX. 223. (1893); BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 499. (1893); AUSTEN, Entom. Monthly Mag., (2). IX. 81. (1898). Europa.

barbata MEIG., S. B., VI. 371. 322. [*Tachina*] (1824) et VII. 210. 12. [*Rhinophora*] (1838); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 132. (1900).

hirticornis ZETT., Dipt. Scand., III. 1172. 175. (1844), VIII. 3250. 175. (1849) et XIII. 6134. 175. [*Tachina*] (1859); BOSSD., Fönnl. Insekt., II. 93. 103. [*Tachina*] (1866); PASD., Rev. entom., XV. 171. 1. [*Sarcophila*] (1896); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900. 403. 17. (1900).

nigritarsis ZETT., Dipt. Scand., III. 1169. 172. (1841) et VIII. 3249. [*Tachina*] (1849).

tachiniformis ZETT., Dipt. Scand., III. 1280. 17. (1814) et VIII. 3266. [*Deria*] (1849); SCHN., F. A., I. 565. *nota*. (1862).

tarsalis BOHEM. ap. ZETT., VIII. 3250. [*Tachina*] (1849).

trilineata MEIG., S. B., IV. 281. 72. [*Tachina*] (1824) et VII. 207. 8. [*Cistogaster*] (1848); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 150. (1900).

Traugii ROSS., Dipt. ital. Prodr., I. 88. (1856) et V. 157. 1. [*Trichogena*] (1862).

tachiniformis ZETT. = **rubricosa** MEIG.

tarsalis BOHEM. = **rubricosa** MEIG.

trilineata MEIG. = **rubricosa** MEIG.

Traugii ROSS. = **rubricosa** MEIG.

*) *monticola* SCHUMM. ap. B. B., LVIII. 413. (1881). *est nomen nudum.*

Melanophora

MEIG., Hlig. Magaz., II, 279. (1830).

Hlygeria R.-D., Myod., 273. IX. (1830).

Pugkallia R.-D., Myod., 270. VII. (1830).

appendiculata MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 102. 2. Sicilia.
t. IV, f. 20. (1855); ROSS., Dipt. ital. Prodr., V, 143. (1862).

atra R.-D. (*Ill.*) = **roralis** L.

atra R.-D. (*Mel.*) = **roralis** L.

atra VILL. = **roralis** L.

distincta R.-D. = **roralis** L.

festiva R.-D. = **roralis** L.

fuliginosa R.-D. = **rubricornis** R.-D.

grossificationis L. = **roralis** L.

helicivora GOUR.*), Annal. Soc. entom. France, (2), I, 77. t. II. n. Gallia.
III, f. 1—2. (1843).

intercentum HARR. = **roralis** L.

minor R.-D. = **roralis** L.

nigerrima MACQ. = **roralis** L.

plumigera WIED., AUSSER. zweifl. Ins., II, 342. 114. [*Tachina*] (1830); Aegyptus.
B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 437. (1891).

pygmaea MACQ. = **roralis** L.

riparia R.-D. = **rubricornis** R.-D.

roralis L.**), Syst. nat., X, 597. (1758). Faun. suec., 1846. [*Musca*] Europa.
(1761) et Syst. nat., XII, II, 993. 85. [*Musca*] (1767); ? SCOP.,
Entom. carn., 332. 890. [*Musca*] (1763); MILL., Fauna Fridr.,
83. 739. [*Musca*] (1762); FABR., Syst. entom., 779. 32. [*Musca*]
(1775), Spec. insect., II, 444. 44. [*Musca*] (1781), Entom. syst.,
IV, 330. 76. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 304. 102. [*Musca*] (1803);
GMELL., Syst. nat., V, 2848. 85. [*Musca*] (1788); VILL., Entom.
linn., III, 490. 203. [*Musca*] (1789); SCHRANK, Enum. insect., 463.
941. [*Musca*] (1781) et Fauna boi., III, 120. 2446. [*Musca*] (1803);
ROSSI, Mant. Ins., II, 67. 545. [*Musca*] (1794); CEDERH., Faunae
ingr. Prodr., 312. 984. [*Musca*] (1798); FALL., Dipt. suec. Rhi-
zom., 7. 7. (1820); MEIG., S. B., IV, 284. 79. [*Tachina*] (1824)
et VII, 213. t. LXIX, f. 46—52. (1838); R.-D., Myod., 272. 1.
(1830) et Posth., I, 1134. 1. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833.
231. 13. t. III, f. 8. (1834), Suit. à Buff., II, 178. II, t. XIV, f.
24. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), III, 202. I, t. IV,
f. 19. (1855); ZETT., Dipt. Scand., III, 1237. 1. (1844); F. ROSSI,
Verzeichn., 49. 1. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 795.
[*Tachina*] (1849) et Ins. Brit., II, 33. 31. t. XI, f. 11. [*Tachina*]
(1853); HAL., Stettin. entom. Zeitg., XII, 144. (1851); SCHN.,

*) *Helix conspurcata* DRAP.

**) ?*Asopia farinalis* L.

- Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI, 411. (1856) et F. A., I, 553. (1862);
 ROSS., Dipt. ital. Prodr., V, 143. 1. (1862); BOSSQ., Finnl. Insekt., II,
 118. 1. (1866); WULP., Tijdschr. Entom., XII, 184. (1869); v. RÖD.,
 Ent. Nachricht., XIV, 220. (1888); B. B., Denkschr. Akad. Wien,
 LVI, t. VI, f. 121. (1889); PAND., Rev. entom., XV, 140. 1. (1896).
atra R.-D., Myod., 274. 1. [*Illigeria*] (1830) et Posth., I, 1137.
 1. (1863).
atra R.-D., Myod., 272. 3. (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833.
 232. (96). 14. (1834); MEIG., S. B., VII, 213. 2. (1838); SCHN.,
 F. A., I, 553. (1862); VERR., Entom. Monthly Mag., XXII,
 230. 68. (1886).
atra VILL., Entom. linn., III, 551. 398. [*Musca*] (1789).
distincta R.-D., Myod., 273. 5. (1830) et Posth., I, 1135. 3. (1863).
festiva R.-D., Myod., 272. 4. (1830).
grossificationis L., Syst. nat., X, 599. (1758), Fauna suec., 1865.
 [*Musca*] (1761) et Syst. nat., XII, II, 996. 109. [*Musca*] (1767);
 FABR., Syst. entom., 785. 64. [*Musca*] (1775), Spec. ins., II, 451.
 83. [*Musca*] (1781), Entom. syst., IV, 351. 161. [*Musca*] (1794)
 et Syst. Antl., 324. 42. [*Tephritis*] (1803); SCHRAAK, Enum.
 insect., 470. 954. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst. nat., V, 2855.
 109. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III, 500. 225. [*Musca*]
 (1786); ROSSI, Fauna etr., II, 315. 1533. [*Musca*] (1790);
 DOXOV., Brit. ins., XII, 71. 4. 419. [*Musca*] (1807); CEDERH.,
 Faunae ingr. Prodr., 317. 1002. [*Musca*] (1798); ILLIG., Rossi
 Fauna etr., II, 480. 1533. [*Musca*] (1807).
intercentum HARR., Expos. engl. ins., 144. t. 42. f. 57. [*Musca*]
 (1776).
minor R.-D., Myod., 274. 2. [*Illigeria*] (1830) et Posth., I, 1138.
 2. [*Illigeria*] (1863).
nigerrima MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 232. 15. (1834) et Suit.
 à Buff., II, 179. 22. (1835).
pygmaea MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 203. 3. 1.
 IV, f. 21. (1855).
rubescens R.-D., Myod., 273. 6. (1830) et Posth., I, 1135. 4.
 (1863); MACQ., Suit. à Buff., II, 178. 18. (1835); MEIG., S.
 B., VII, 213. 3. (1838); LW., Stettin. entom. Zeitg., II, 26. 5.
 (1841).
violacea R.-D., Myod., 272. 2. (1830) et Posth., I, 1135. 2. (1863).
rubescens R.-D. *roralis* L.
rubricornis R.-D., Myod., 270. 1. [*Paykallia*] (1830) et Posth., I, Gallia.
 1132. 1. [*Paykallia*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 231. 12.
 (1834) et Suit. à Buff., II, 177. 15. (1835).
fuliginosa R.-D., Myod., 271. 3. [*Paykallia*] (1830).
riparia R.-D., Myod., 271. 2. [*Paykallia*] (1830) et Posth., I,
 1133. 2. [*Paykallia*] (1863); MACQ., Suit. à Buff., II, 177. 16.
 (1835).
violacea R.-D. = *roralis* L.

Phyto

R.-D., Myod., 248. I. (1830).

? *Novia* R.-D., Myod., 240. VI. (1830).*Sarvia* ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV. 140. (1860) *nee* OREN 1816.

- adolescens** ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV. 139. 1. (1860). Italia.
- aperta** STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 50 et 125. (1894); B. Styria.
B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 619. (1894); BRAUER, Sitzgsber.
Akad. Wien, CVII. 544. (1898).
- brunnicornis** MACQ., Suit. à Buff., II. 172. 13. [*Ptilocera*] (1835); Gallia.
MEIG., S. B., VII. 211. 9. [*Rhinophora*] (1838).
- claripennis** R.-D., Posth., I. 819. 1. [*Koekia*] (1863); PAND., Rev. Gallia mer.
entom., XV. 130. 3. (1896).
- cylindrica* R.-D. = **melanocephala** MEIG.
- discrepans** PAND., Rev. entom., XV. 132. 7. (1896). Gallia mer.
- gagatea** R.-D., Posth., II. 49. 2. (1863). Gallia.
- genibarbis** MEIG., S. B., VI. 372. 324. [*Tachina*] (1830) et VII. 240. Germania.
11. [*Rhinophora*] (1838).
- intercepta* WALK. = **melanocephala** MEIG.
- maura* PERR. = **melanocephala** MEIG.
- melanocephala** MEIG., S. B., IV. 281. 73. [*Tachina*] (1824) et VII. Europacentr.
212. 12. [*Leucostoma*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 170. 1. et mer.
14 - [*Ptilocera*] (1835); ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV. 141. 1. [*Sarvia*]
(1860); SCHIX., F. A., I. 548. (1862); R.-D., Posth., II. 48. 1.
(1863); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 588. [*Sarvia*]
(1880); GOBERT, Catal. Dipt. France, 60. (1887); MEADE, Entom.
Monthly Mag., (2). III. 326. (1892); PAND., Rev. entom., XV.
133. 8. (1896); STREX, Wien. entom. Zeitg., XIX. 248. (1900) et
Entom. Nachricht., XXVI. 143. (1900).
- ? *cylindrica* R.-D., Myod., 241. 1. [*Novia*] (1830); MACQ., Suit.
à Buff., II. 170. 3. [*Ptilocera*] (1835).
- intercepta* WALK., Ins. Brit., II. 34. 33. [*Tachina*] (1853).
- maura* PERR., Soc. Linn. Lyon, 1852. 64. [*Clista*] (1852).
- nigra* R.-D., Myod., 289. 1. (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833.
233. 1. [*Ptilocera*] (1834) et Suit. à Buff., II. 170. 2. [*Ptilo-
cera*] (1835); ? SCHIX., F. A., I. 548. (1862); MEADE, Entom.
Monthly Mag., (2). III. 236. (1892).
- nigrifacies* PERR., Soc. Linn. Lyon, 1852. 63. [*Thryphera*] (1852).
- nigrogriseus* R.-D., Myod., 249. 2. (1830) et Posth., II. 50.
3. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 233. 2. [*Ptilocera*] (1834).
- palpalis* R.-D., Myod., 249. 3. (1830).
- prompta* R.-D., Myod., 249. 4. (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille,
1833. 233. 3. [*Ptilocera*] (1834).
- nigra* R.-D. = **melanocephala** MEIG.
- nigrifacies* PERR. = **melanocephala** MEIG.
- nigrogriseus* R.-D. = **melanocephala** MEIG.

- obscuripennis** MEIG., S. B., 212, 7. [*Leucostoma*] (1838); SEMX., F. A., I, 548, (1862). Germania.
- palpalis* R.-D. = **melanocephala** MEIG.
- parvicornis** MEIG., S. B., IV, 282, 75. [*Tachina*] (1824) et VII, 207, 9. [*Cistogaster*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 234, 4. [*Philocera*] (1834) et Suit. à Buff., II, 171, 5. [*Philocera*] (1835); SEMX., F. A., I, 548, (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, t. VI, f. 120, (1889); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 146, (1900). Europacentr.
- petiolata** R.-D., Posth., II, 50, 4, (1863). Gallia mer.
- prompta* R.-D. = **melanocephala** MEIG.
- submetallica** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 189, 9, t. III, f. 16, [*Rhinophora*] (1855); PAND., Rev. entom., XV, 128, 1, (1896). Gallia.
- tonsa** Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII, 262, 1, [*Rhinophora*] (1847). Sicilia.

Litophasia

GIRSEUX, Zeitschr. Naturwiss., LX, 6, (1887).

- hyalipennis** FALL., Dipt. succ. Rhizom., 4, 3. [*Therrea*] (1820); MEIG., S. B., IV, 199, 25. [*Phasia*] (1824); ZETZ., Dipt. Scand., III, 1252, 8, (1844) et XIII, 6169, 8. [*Phasia*] (1859); ROXB., Dipt. ital. Prodr., IV, 148, nota. [*Stereocia*] (1861); WALLENGR., Entom. Tidskr., I, 20, 10. [*Utophora*] (1880); PAND., Rev. entom., XIII, 83, (1894). Europa.

Clytho

R.-D., Myod., 375, 1, (1830), HALD., Stettin. entom. Zeitg., XXX, 20, (1869).

Halidayae Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI, 383, (1856).

argentea Egg. = **argentea** R.-D.

- argentea** R.-D., Myod., 376, 2, (1830) et Posth., II, 587, 2, (1863). Europacentr.
- argentea* Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI, 385. [*Halidayae*] (1856); SEMX., F. A., I, 511. [*Halidayae*] (1862).

aurea Egg. = **aureulenta** R.-D.

- aureulenta** R.-D., Myod., 376, 1, (1830) et Posth., II, 586, 1, (1863); MACQ., Suit. à Buff., II, 232, 12. [*Agria*] (1835). Europacentr. et mer.
- aurea* Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI, 384. [*Halidayae*] (1856); SEMX., F. A., I, 510. [*Halidayae*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, t. VI, f. 126. [*Halidayae*] (1889); PAND., Rev. entom., XV, 98, 2. [*Halidayae*] (1896).

Rondania

R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 192. IV. (1850).

Dysthrira PAND., Rev. entom., XIII. 47. XIII. (1894) et XV. 91. XIII. (1896).

Microtricha MIK., Wien. entom. Zeitg., VI. 269. 43. (1887).

Stylomyia WULP., Tijdschr. entom., (2). IV. (XII). 149. (1869),
nec WESTW. 1850. Dipt.

caullata R.-D. = **dimidiata** MEIG.

dimidiata MEIG., S. B., IV. 366. 220. t. XII. f. 26. [*Tachina*] (1824) Europa-centr.
et VII. 207. 2. [*Cistogaster*] (1838); STEIN, Entom. Nachricht., et mer.
XXVI. 135. (1900).

caullata R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 193. 1. (1850); ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 13. *nola*. (1859); BRÄUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 508. 108. (1898) et Berlin. entom. Zeitschr., XXXVIII. (1898).

notata R.-D., Posth., I. 679. 2. (1863).

notiventris PAND., Rev. entom., XV. 92. [*Dysthrira*] (1896).

parvula MEIG. ap. STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 146. [*Mecodoria*] (1900).

punctulata WULP., Tijdschr. entom., (2). IV. 150. t. IV. f. 15—19. [*Stylomyia*] (1869); MIK., Wien. entom. Zeitg., VI. 269. 43. [*Microtricha*] (1887); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 122. (1889) et LVIII. 358. [*Microtricha*] (1891); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 51. [*Microtricha*] (1894).

notata R.-D. = **dimidiata** MEIG.

notiventris PAND. = **dimidiata** MEIG.

punctulata WULP. = **dimidiata** MEIG.

Ancistrophora

MIK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 997. (1865).

hungarica THALII. = **Mikii** SCHN.

Mikii SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 997. (1865); B. B., Europa-centr.,
Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 261. (1889). Alpes.

hungarica THALII., Term. Füzet., XX. 145. [*Himantostoma*] (1897).

Rhinophora

R.-D., Myod., 258. VI. (1830).

Clista MEIG., S. B., VII. 208. 12. (1838); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 136. (1889) et LX. 161. (1893).

Kirbya R.-D., Myod., 267. V. (1830).

- Kockia* R.-D., Posth., I. 818. XVI. (1863).
- Microchilosia* Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II. 736. (1854) et (3), III. 183. [*Microchilosia*] (1855).
- ? *Rhinomyia* R.-D., Myod., 123. 11. [*Rhinomya*] (1830).
- aberrans** Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 272. 1. [*Clista*] (1847). Sicilia.
- acnescens* ZETT. = **lepida** MEIG.
- diversa** MEIG., S. B., VII. 208. 5. [*Clista*] (1838); SCHN., F. A., I. 542. [*Clista*] (1862). Germania.
- ebennia** R.-D., Posth., I. 819. 2. [*Kockia*] (1863). Gallia mer.
- ? **gagatea** R.-D., Myod., 124. 1. [*Rhinomyia*] (1830) et Posth., II. 39. Gallia.
1. [*Rhinomyia*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 279. 6. [*Phorocera*] (1834) et Suit. à Buff., II. 132. 36. [*Metopia*] (1835).
- gagatea* R.-D. = **gagatina** MEIG.
- gagatina** MEIG., S. B., IV. 287. 84. [*Tachina*] (1824) et VII. 212. 9. Europacentr.
[*Leucostoma*] (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 163. 3. [*Cassidarmyia*] (1835); R.-D., Posth., II. 6. 2. (1863).
gagatea R.-D., Myod., 259. 2. (1830).
hollentota R.-D., Myod., 260. 5. (1830) et Posth., I. 7. 3. (1863).
metallica R.-D., Myod., 259. 3. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 243. 3. (1834).
pusilla R.-D., Myod., 260. 6. (1830) et Posth., II. 7. 4. (1863).
tessellata R.-D., Myod., 259. 4. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 243. 4. (1834) et Suit. à Buff., II. 163. 3. [*Cassidarmyia*] (1835); MEIX., Ann. Soc. sci. Bruxelles, XIX. 21. 3. (1895).
- heteropaipa** Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), III. 42. 7. t. II. Gallia.
f. 13. [*Clista*] (1855).
- hiemalis* R.-D. = **maerens** MEIG.
- hollentota* R.-D. = **gagatina** MEIG.
- humeralis** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 609f. 78—79. [*Tachina*] (1859). Scandinavia.
- ignola* B. B. — **lepida** MEIG.
- inera** MEIG., S. B., VII. 209. 7. [*Clista*] (1838); Macq., Annal. Soc. Hispania.
entom. France, (3), III. 38. 1. t. II. f. 7. [*Clista*] (1855); VULLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900. 382. 4. (1900).
- ? **Lamberti** R.-D.*), Annal. Soc. entom. France, (2), IX. 26. [*Rhino-* Gallia.
myia] (1851) et Posth., II. 40. 2. [*Rhinomyia*] (1863).
- lepida** MEIG., S. B., IV. 289. 88. [*Tachina*] (1824) et VII. 218. 8. t. Europa.
LXIX. f. 40—45. [*Leucostoma*] (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), III. 195. 10. t. IV. f. 10. [*Leucostoma*] (1855); SCHN., F. A., I. 548. [*Phyto*] (1862); v. RÖD., Wien. entom. Zeitg., VII. 95. I. et 251. (1888); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 142. (1900); WAINWR., Entom. Monthly Mag., (2), XII. 214. [*Clista*] (1901).
acnescens ZETT., Dipt. Scand., III. 1234. 3. (1841) et VIII. 3258. 3. [*Leucostoma*] (1849); SCHN., F. A., I. 548. [*Phyto*] (1862); STEIN, Wien. entom. Zeitg., VII. 201. I. [*Leucostoma*] (1888); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III. 234. [*Clista*] (1892).

*) *Chrysomela graminis* L.

- ignota* B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 169. t. X. f. 262.
[*Clista*] (1889).
- laetosa* p. p. MEIG., S. B., IV. 347. 186. [*Tachina*] (1824) V.
gen. *Degerria*.
- lucellata* PAND., Rev. entom., XV. 137. 12. [*Phylo*] (1896):
VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900. 403. 16. (1900).
- laetosa* MEIG. p. p. = **lepida** MEIG.
- lugubrina** ZETT., Dipt. Scand., III. 1084. 78. (1844) et VIII. 3239. Scandinavia.
78. [*Tachina*] (1849).
- metallica* R.-D. = **gagatina** MEIG.
- maerens** MEIG., S. B., VI. 369. 317. [*Tachina*] (1830) et VII. 208. 2. Europa.
t. LXIX. f. 30-34. [*Clista*] (1838): MACQ., Annal. Soc. entom.
France, (3). III. 40. 3. t. II. f. 9. [*Clista*] (1855): ROXB., Dipt.
ital. Prodr., IV. 97. 1. [*Clista*] (1861): SCHN., F. A., I. 542.
[*Clista*] (1862): MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). III. 233.
[*Clista*] (1892): PAND., Rev. entom., XV. 129. 2. [*Phylo*] (1896):
STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 142. (1900): VILLEN., Bull. Soc.
entom. France, 1901. 382. 5. (1901).
- hiemalis* R.-D., Myod., 268. 2. [*Kirbya*] (1830) et Posth., I. 817.
2. [*Kirbya*] (1863).
- vernalis* R.-D., Myod., 268. 1. [*Kirbya*] (1830) et Posth., I. 817.
1. [*Kirbya*] (1863): MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 231. 11.
[*Melanophora*] (1834) et Suit. à Buff., II. 176. 13. [*Melano-*
phora] (1835).
- nigripennis** R.-D., Myod., 259. 1. (1830) et Posth., II. 5. 1. (1833): Gallia.
MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 243. 2. t. IV. f. 1. (1834) et Suit. à
Buff., II. 163. 4. [*Cassidaemyia*] (1835).
- nitida** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 184. 1. t. III. f. 7. Gallia.
[*Microchilosia*] (1855).
- praecox** R.-D., Posth., I. 818. 3. [*Kirbya*] (1863). Gallia mer.
- provida** MEIG., S. B., IV. 341. 182. [*Tachina*] (1824) et VII. 208. 4. Europacentr.
[*Clista*] (1838): MACQ., Suit. à Buff., II. 144. 18. [*Tachina*] (1835)
et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 39. 2. t. II. f. 8. [*Clista*]
(1855): SCHN., F. A., I. 542. [*Clista*] (1862): STEIN, Entom.
Nachricht., XXVI. 147. (1900): VILLEN., Bull. Soc. entom. France,
1900. 382. 3. (1900).
- pusilla* R.-D. = **gagatina** MEIG.
- suffusa** MEIG., S. B., IV. 368. 224. [*Tachina*] (1824). Germania.
- lucellata* PAND. = **lepida** MEIG.
- lucellata* R.-D. = **gagatina** MEIG.
- venosa** MEIG., S. B., IV. 288. 86. [*Tachina*] (1824) et VII. 212. 11. Europacentr.
[*Leucostoma*] (1838): ZETT., Dipt. Scand., III. 1234. 4. (1844) et
et sept.
XIII. 6163. 4. [*Leucostoma*] (1859).
- vernalis* R.-D. = **maerens** MEIG.

Sarcophaginae.

Parasarcophila

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 366. (1891) et LX, 162. (1893).

rufipes Macq., Hist. nat. Can. Webb Entom., I, 113, 68. [*Agria*] Aegyptus, (1838) et Dipt. exot., III, 265. (108), 3. [*Agria*] (1843): B. B., Ins. Canar. Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 359 et 366. (1891).

Tephromyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 366. (1891) et LX, 162. (1893).

Gesneria R.-D., Myod., 378, III, (1830) *see* H'fex, 1816, Lep.

?*Myiorrhina* R.-D., Myod., 383, IV, [*Myorrhina*] (1830).

?**albida** Macq., Suit. à Buff., II, 230, 6. [*Agria*] (1835): MEIG., S. Gallia, B., VII, 281, 44. [*Sarcophaga*] (1838).

albifrons R.-D. = **grisea** MEIG.

agrestis R.-D. = **grisea** MEIG.

aurifacies R.-D. = **grisea** MEIG.

brunicans R.-D. = **grisea** MEIG.

campestris R.-D. = **grisea** MEIG.

?**campestris** R.-D., Myod., 383, 1. [*Myiorrhina*] (1830) et Posth., II, Gallia, 407, 1. [*Myiorrhina*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 184, 6. [*Agria*] (1834) et Suit. à Buff., II, 231, 11. [*Agria*] (1835).

cincta R.-D. = **grisea** MEIG.

claripennis R.-D. = **grisea** MEIG.

erythrocerca R.-D. = **grisea** MEIG.

floralis R.-D. = **grisea** MEIG.

fuliginosa R.-D. = **grisea** MEIG.

fulvifrons R.-D. = **grisea** MEIG.

grisea MEIG., S. B., V, 18, 5. [*Sarcophaga*] (1826); Macq., Suit. à Buff., II, 224, 4. [*Sarcophaga*] (1835); SEMX., F. A., I, 573. et mer.

[*Sarcophaga*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 363.

[*Sarcophaga*] et 366. (1891); CORTI, Bull. Soc. entom. ital., XXIX,

141, 62. [*Sarcophaga*] (1897); PAND., Rev. entom., XV, 176, 2.

[*Sarcophaga*] (1896); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900,

363, 5. (1900).

albifrons R.-D., Myod., 381, 9. [*Gesneria*] (1830) et Posth., II,

595, 9. [*Gesneria*] (1863); Macq., Suit. à Buff., II, 231, 8.

[*Agria*] (1835); MEIG., S. B., VII, 281, 47. [*Sarcophaga*] (1838).

agrestis R.-D., Myod., 382, 24. [*Gesneria*] (1830) et Posth., II,

598, 16. [*Gesneria*] (1863).

aurifacies R.-D., Myod., 382, 13. [*Gesneria*] (1830) et Posth.,

II, 598, 15. [*Gesneria*] (1863).

brunicans R.-D., Myod., 379, 2. [*Gesneria*] (1830) et Posth., II,

592. 2. [*Gesneria*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 184. (48). 3. [*Agria*] (1834) et Suit. à Buff., II. 231. 7. [*Agria*] (1835); MEIG., S. B., VII. 281. 45. [*Sarcophaga*] (1838).
- campestris* R.-D., Myod., 380. 6. [*Gesneria*] (1830) et Posth., II. 594. 6. [*Gesneria*] (1863).
- cinerea* R.-D., Myod., 379. 4. [*Gesneria*] (1830) et Posth., II. 593. 4. [*Gesneria*] (1863).
- claripennis* R.-D., Myod., 379. 3. [*Gesneria*] (1830) et Posth., II. 593. 3. [*Gesneria*] (1863).
- erythroeca* R.-D., Myod., 378. 1. [*Gesneria*] (1830) et Posth., II. 591. 1. [*Gesneria*] (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 230. 5. [*Agria*] (1835); MEIG., S. B., VII. 280. 43. [*Sarcophaga*] (1838).
- floralis* R.-D., Myod., 381. 12. [*Gesneria*] (1830) et Posth., II. 597. 14. [*Gesneria*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 184. (48). 5. [*Agria*] (1834); MEIG., S. B., VII. 281. 46. [*Sarcophaga*] (1838).
- fuliginosa* R.-D., Myod., 382. 15. [*Gesneria*] (1830).
- fulvifrons* R.-D., Posth., II. 597. 13. [*Gesneria*] (1863).
- grisea* R.-D., Myod., 380. 7. [*Gesneria*] (1830) et Posth., II. 594. 7. [*Gesneria*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 184. 4. [*Agria*] (1834).
- grisella* R.-D., Posth., II. 595. 10. [*Gesneria*] (1863).
- luteifrons* R.-D., Myod., 381. 10. [*Gesneria*] (1830) et Posth., II. 596. 11. [*Gesneria*] (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 231. 9. [*Agria*] (1835); MEIG., S. B., VII. 282. 48. [*Sarcophaga*] (1838).
- musca* R.-D., Myod., 381. 11. [*Gesneria*] (1830) et Posth., II. 596. 12. [*Gesneria*] (1863).
- rapida* R.-D., Myod., 379. 5. [*Gesneria*] (1830) et Posth., II. 593. 5. [*Gesneria*] (1863).
- riparia* R.-D., Myod., 380. 8. [*Gesneria*] (1830) et Posth., II. 595. 8. [*Gesneria*] (1863).
- ruralis* R.-D., Posth., II. 599. 18. [*Gesneria*] (1863).
- rustica* R.-D., Posth., II. 599. 17. [*Gesneria*] (1863).
- grisea* R.-D. = **grisea** MEIG.
- grisella* R.-D. = **grisea** MEIG.
- luteifrons* R.-D. = **grisea** MEIG.
- musca* R.-D. = **grisea** MEIG.
- pusilla** Macq., Suit. à Buff., II. 231. 10. [*Agria*] (1835); MEIG., S. B., VII. 282. 49. [*Sarcophaga*] (1838); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 50. [*Sarcophila*] (1868). Europacentr. et mer.
- rapida* R.-D. = **grisea** MEIG.
- redempta** PAND., Rev. entom., XV. 177. 3. [*Sarcophaga*] (1896). Europacentr.
- riparia* R.-D. = **grisea** MEIG.
- ruralis* R.-D. = **grisea** MEIG.
- rustica* R.-D. = **grisea** MEIG.

Sarcophaga

MEIG., Syst. Beschreib., V. 14, CLIV. (1826).

Agria R.-D., Myod., 376. 2. (1830).*Bellieria* R.-D., Posth., II. 432. III. (1863).*Bercaca* R.-D., Posth., II. 549. XIII. (1863).*Calyptia* R.-D., Posth., II. 576. XV. (1863).*Erichsonia* R.-D., Posth., II. 481. VII. (1863).*Hartigia* R.-D., Posth., II. 521. IX. (1863).*Listeria* R.-D., Posth., II. 600. IV. (1863).*Malsautia* R.-D., Posth., II. 557. XIV. (1863).*Myiophora* R.-D. (Myod. 337. III.), Posth., II. 499. VIII.
[*Myiophora*] (1863) *em.* SCUD.*Phorella* R.-D., Myod., 362. IV. (1830).*Pierrelia* R.-D., Posth., II. 422. I. (1863).*Ravinia* R.-D., Posth., II. 434. IV. (1863).*Scaligeria* R.-D., Posth., II. 476. VI. (1863).*Serraisia* R.-D., Posth., II. 429. II. (1863).*Sphaerogaster* LIOY, Atti Istit. ven., (3), IX. 889. [*Sfacrogaster*]
(1864) *nee* DEL. COL.*abdominalis* R.-D. — **melanura** MEIG.**adolescens** ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 388. 21. (1860) et Europa centr.
Dipt. ital. Prodr., V. 117. 22. (1862); MEADE, Entom. Monthly et mer.
Mag., XII. 263. 11. (1876).**aequipalpis** THOMS., Dipt. Eugen., 534. 148. (1858).

Madera.

aestivalis R.-D. (*Er.*) = **haemorrhoea** MEIG.*aestivalis* R.-D. (*Mgi.*) = **haemorrhoea** MEIG.*aestivalis* R.-D. (*Pierre.*) = **carnaria** L.**affinis** FALL.*), Vet. Acad. Handl., 230. [*Musca*] (1816) et Dipt. succ. Europa.
Musc., 39. 4. [*Musca*] (1820); MEIG., S. B., V. 30. 27. 1. XLIII.
f. 10. (1826); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 183. 1. [*Agria*] (1834)
et Suit. à Buff., II. 229. 1. [*Agria*] (1835); RATHER., Forstins.,
III. 175. (1844); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1293. 13. (1845) et XIII.
6179. 13. (1859); ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 381. 18.
(1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 115. 19. (1862); SCHN., F. A., I.
574. (1862); R.-D., Posth., II. 588. 1. [*Agria*] (1863); BOSSD.,
Finnl. Insekt., II. 138. 10. (1866); WACHTL, Wien. entom. Zeitg.,
I. 277. 20. (1882) et VII. 277. (1888); MEADE, Entom. Monthly
Mag., XII. 264. 12. (1876); BRISCHKE, Schrift. nat. Ges. Danzig,*) *Lasiocampa pini* L., *Oeneria dispar* L., *Psilura monacha*
L., *Yponomeuta cognatella* Tr., *padella* L. et *rorella* Hb. — *Mono-*
stegia luteola Klg. *Pachytylus migratorius* F.

- N. F., VI, 2, 18. (1885); ALESSANDR., Boll. Soc. Zool. Rom., IV, 100. (1895); MINGAZZ., Zool. medica, 288. (1898).
- arcensis* R.-D., Posth., II, 454, 23. (1863).
- bichuvis* PAND., Rev. entom., XV, 173, 5. [*Sarcophila*] (1896).
- gesnerioidea* R.-D., Myod., 377, 6. [*Agria*] (1830) et Posth., II, 590, 6. [*Agria*] (1863).
- grisea* R.-D., Myod., 377, 2. [*Agria*] (1830) et Posth., II, 258, 2. [*Agria*] (1863).
- grisescens* R.-D., Myod., 377, 3. [*Agria*] (1830) et Posth., II, 589, 3. [*Agria*] (1863).
- mamillata* PAND., Rev. entom., XV, 172, 4. [*Sarcophila*] (1896).
- procar* R.-D., Posth., II, 453, 22. (1863).
- punctata* R.-D., Myod., 377, 1. [*Agria*] (1830).
- punctulata* R.-D., Myod., 377, 4. [*Agria*] (1830) et Posth., II, 590, 5. [*Agria*] (1863).
- quinquecittata* HART., Jahresb. Fortschr. Forstwiss., I, 303. (1837).
- cittata* BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien. XLVII, 75. (1883).
- affinis* R.-D. = **carnaria** L.
- afia* R.-D. = **carnaria** L.
- agilis* R.-D. (*Berc.*) = **haemorrhoidalis** FALL.
- agilis* R.-D. (*Pierr.*) = **erythrura** MEIG.
- agilis* R.-D. (*Sarc.*) = **carnaria** L.
- agnata** ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 385, I. (1860) et Dipt. Europa centr. ital. Prodr., V, 102, I. (1862); ? PAND., Rev. entom., XV, 194, 37. (1896).
- atropos* SCHN. (*occ* MEIG.), F. A., I, 569. (1862).
- agraria* R.-D. (*Berc.*) = **haemorrhoidalis** FALL.
- agraria* R.-D. (*Mgi.*) = **carnaria** L.
- agrestis* R.-D. = **lineata** FALL.
- agricola* MEADE = **hirticus** PAND.
- agricola* R.-D. = **carnaria** L.
- albicans* R.-D. = **haemorhoa** MEIG.
- albiceps** MEIG.*), S. B., V, 22, 8. (1826); MACQ., Soc. Sci. Lille, Europa, 1833, 179, 5. (1834) et Suif. à Bufl., II, 226, 13. (1835); ZETT., Dipt. Scand., III, 1288, 5. (1844) et VIII, 3267. (1849); RATZEB., Forstins., III, 175. (1844); WALK., Ins. Brit., II, 103, 3. (1853); SCHN., F. A., I, 570. (1862); BONSD., Finkl. Insekt., II, 136, 5. (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., XII, 260, 2. (1876); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII, 100. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 57. (1894).
- cyathisans* PAND., Rev. entom., XV, 191, 31. (1896); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 363, 8 et 403, 19. (1900); DE ROS., Mém. Soc. Linn. N. France, XI, t. I, f. 6, 18, t. II, f. 30. (1903).

*) *Lasiocampa pini* L., *Psilura monacha* L. — *Oryctes nasicornis* L.

- pauciseta* KRAM. (*unc* PAND.), Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V, 331, 2, f. II. (1905).
- albiceps* ZETT. (1838) = **melanura** MEIG.
- albida* R.-D. (*Muls.*) = **melanura** MEIG.
- albida* R.-D. (*Sarc.*) = **carnaria** L.
- albidipennis* R.-D. = **melanura** MEIG.
- albidula* R.-D. = **haemorrhoidalis** FALL.
- albipennis** GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV, 676. (1847). Russia.
- ambigua* KRAM. = **tuberosa** PAND.
- ambulatoria* R.-D. = **carnaria** L.
- ambulatoria* R.-D. = **haemorrhoea** MEIG.
- amita** RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 291, 28. (1860) et Dipt. Europa mer.
ital. Prodr., V, 122, 29. (1862); STROBL., Wien. entom. Zeitg.,
XII, 102. (1893); ? PAND., Rev. entom., XV, 180, 9. (1896).
- anceps* R.-D. = **carnaria** L.
- ancilla** RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 226. (1865). Italia.
- angustata* R.-D. = **carnaria** L.
- auria* R.-D. = **haemorrhoea** MEIG.
- appendiculata* KRAMER = **similis** MEADE.
- apricata* R.-D. = **carnaria** L.
- aprilis* R.-D. = **carnaria** L.
- aratrix** PAND., Rev. entom., XV, 191, 30. (1896); DE ROS., Mém. Europa centr.
Soc. Libr. N. France, XI, t. I, f. 7, 19, t. II, f. 31. (1903). et mer.
Kantzei KRAMER, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V, 13, f. II.
(1905).
- arbores* R.-D. = **haemorrhoea** MEIG.
- arcipes** PAND., Rev. entom., XV, 184, 18. (1896). Gallia mer.
- ardacca* R.-D. (*Eri.*) = **haemorrhoea** MEIG.
- ardacca* R.-D. = **melanura** MEIG.
- arcensis* R.-D. (*Eri.*) = **dissimilis** MEIG.
- arcensis* R.-D. (*Phor.*) = **carnaria** L.
- arcensis* R.-D. (*Sarc.*) = **affinis** FALL.
- aricola* R.-D. = **melanura** MEIG.
- arorum* MEIG. = **sinuata** MEIG.
- arorum* RONDI. = **depressifrons** ZETT.
- arorum* R.-D. = **nigriventris** MEIG.
- atra* R.-D. (*Muls.*) = **melanura** MEIG.
- atra* R.-D. (*Pierre.*) = **nigriventris** MEIG.
- atrata* R.-D. (*Phor.*) = **carnaria** L.
- atrata* R.-D. (*Sarc.*) = **carnaria** L.
- atropos* KRAMER = **striata** FABR.
- atropos* MEIG. = **carnaria** L.
- atropos* SCHIN. = **agnata** RONDI.
- aurata* R.-D. = **carnaria** L.
- aurca* R.-D. = **erythrura** MEIG.
- aurifacies* R.-D. = **carnaria** L.
- auriflua* R.-D. = **carnaria** L.

- balanina** PAND., Rev. entom., XV, 180, 8, (1896). Gallia mer.
Bezzii CORTI = **sinuata** MEIG.
birlanis PAND. = **affinis** FALL.
bipunctata R.-D., Myod., 377, 5, [*Agria*] (1830) et Posth., II, 589. Gallia.
 4. [*Agria*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 183, (47), 2.
 [*Agria*] (1834); MEIG., S. B., VII, 280, 40, (1838).
blanda R.-D. = **melanura** MEIG.
Blondeli R.-D. = **haemorrhoidalis** FALL.
Boisduvalii R.-D. = **carnaria** L.
brunifacies R.-D. = **carnaria** L.
brunisquamis R.-D. = **melanura** MEIG.
caeruleseens ZETT. = **carnaria** L.
caesia R.-D. (*Muls.*) = **haemorrhoea** MEIG.
caesia R.-D. (*Sarc.*) = **carnaria** L.
calliste B. B.*), Denkschr. Akad. Wien, LXI, 572, (1894). Asia min.
campestris R.-D. (*Er.*) = **haemorrhoea** MEIG.
campestris R.-D. (*Muls.*) = **haemorrhoea** MEIG.
campestris R.-D. (*Myl.*) = **haematodes** MEIG.
camporum R.-D. = **melanura** MEIG.
Carceii R.-D. (*Cal.*) = **melanura** MEIG.
Carceii R.-D. (*Sarc.*) = **carnaria** L.
carnaria L.**), Syst. nat., X, 596. [*Musca*] (1758), XII, II, 790, 68. Europa.
 [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1832. [*Musca*] (1761); RÉAUM.,
 Mém. Ins., IV, t. XXIX, f. 2—8, [—] (1738); KRAML, Diss. ins.
 dan., 28. [*Musca*] (1760); PODA, Ins. Mus. graec., 117. [*Musca*]
 (1761); O. F. MÜLL., Faun. Frids., 83, 731. [*Musca*] (1764) et Zool.
 dan. Prodr., 173, 2102. [*Volucella*] (1776); FABR., Syst. entom.,
 773, 4. [*Musca*] (1775), Spec. ins., II, 436, 4. [*Musca*] (1781),
 Entom. syst., IV, 313, 1. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 284, 4.
 [*Musca*] (1805); SCHRANK, Enum. ins., 456, 927. [*Musca*] (1783)
 et Fauna boi., III, 2849, 133. [*Volucella*] (1803); GMEL., Syst.
 nat., V, 2840, 68. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III, 470,
 151. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etr., II, 300, 1488. [*Musca*]
 (1790); DWIG., Prim. faunae Mosqu., 175, 639. [*Musca*] (1802);
 CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 308, 968. [*Musca*] (1798); SHAW,
 Gen. zool., VI, 385, t. 107, f. sup. [*Musca*] (1806); LATR., Hist.
 nat. crust. ins., XIV, 381, 4. [*Musca*] (1804) et Gen. crust. ins.,
 IV, 345, (1809); ILLIG., Rossi Fauna etr., II, 461, 1488. [*Musca*]
 (1807); FALL., Vet. Acad. Handl., 236. [*Musca*] (1816) et Dipt.
 suec. Muse., 38, 1. [*Musca*] (1822); MEIG., S. B., V, 18, 6, (1826);
 BOTCHÉ, Naturg., 60, 44, (1834); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833,
 178, 2, t. II, f. 2, (1834) et Suit. à Buff., II, 226, 10, (1835);
 STER., Wiegmann Archiv., IV, 191, (1838); R.-D., Myod., 347, 31.
 [*Myiophora*] (1830) et Posth., II, 444, 9, (1863); ZETT., Ins. Lapp.,

*) Saga serrata F.

**) Homo sapiens L.

649. 1. (1838) et Dipt. Scand., IV. 1284. 1. (1815) et VII. 3266. 1. (1849); WESM., Bull. Acad. Bruxelles, 1837. 319. (1837); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 614. t. IV. f. 10. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 830. (1849) et Ins. Brit., II. 102. f. 1. t. XI. f. 5. (1853); ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 378. 3. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 103. 3. (1862); SCHUN., F. A., I. 570. (1862); BONSD., Finnl. Insekt., II. 135. 1. (1866); PACK., Proc. Boston Soc., XVI. 335. t. III. f. 7. (1874); BRANDT, Hor. Soc. entom. Ross., XV. t. I. f. 1., t. II. f. 29., t. III. f. 33. (1879); MEADE, Entom. Monthly Mag., XII. 219. 1. f. 1. (1876); SUCROW, Hensing. Zeitschr. org. Phys., II. t. XIV. f. 43. (1828); OST-SACK., Trans. entom. Soc. London, 1884. 491. 2. (1884); WEINL., Zeitschr. Wiss. Zool., XXI. t. XII. f. 62. 64. (1899); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 100. (1893), Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 55. (1894) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herzeg., VII. 606. (1900); PAXD., Rev. entom., XV. 190. 29. (1896); WARD., Zool. Anzeig., 1898. 291. f. 4. (1898); HUBER, Bibliogr. Jena, 7. (1899); VULLEN., Bull. Soc. entom. France, 1899. 27. f. 1. (1899) et 1900. 363. 6. (1900); JOHNS. ap. SMITH., Ins. New Jers., 676. f. 319. (1899); LEON., Inutti nocivi, III. 325. f. 171. (1900); DE ROS., Mém. Soc. linn. N. France, XI. t. I. f. 1—5, t. II. f. 28. (1903); BISCHOP, Mittheil. Tour. Club Wien, XV. 6. 38. (1903); KRAMER, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V. 13. f. 1. (1905).

aestivalis R.-D., Posth., II. 422. 1. [*Pierretia*] (1863).

affinis R.-D., Myod., 356. 65. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 470. 56. (1863).

afra R.-D., Posth., II. 464. 43. (1863).

agilis R.-D., Posth., II. 455. 26. (1863).

agraria R.-D., Posth., II. 515. 32. [*Myiophora*] (1863).

agricola R.-D., Myod., 353. 52. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 467. 49. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 180. (14). 7. (1834) et Suit. à Buff., II. 227. 16. (1835); MEG., S. B., VII. 278. 33. (1838); ? ZETT., Dipt. Scand., III. 1290. 8. (1844) et VII. 3267. 8. (1849); ? ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 380. 11. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 109. 11. (1862); ? BOXSD., Finnl. Insekt., II. 137. 7. (1866); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 56. (1894).

albida R.-D., Posth., II. 446. 12. (1863).

ambulatoria R.-D., Posth., II. 471. 57. (1863).

anceps R.-D., Posth., II. 557. 13. [*Bercaca*] (1863).

angustata R.-D., Posth., II. 506. 13. [*Myiophora*] (1863).

apricata R.-D., Posth., II. 556. 12. [*Bercaca*] (1863).

aprilis R.-D., Myod., 355. 59. [*Myiophora*] (1830).

arvensis R.-D., Myod., 362. 1. [*Phorella*] (1830) et Posth., II. 530. 1. [*Phorella*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 182. (46). 15. (1834) et Suit. à Buff., II. 228. 24. (1835); MEG., S. B., VII. 279. 39. (1838).

- atrata* R.-D., Myod., 363. 4. [*Phorella*] (1830) et Posth., II. 534. 8. [*Phorella*] (1863).
- atrata* R.-D., Myod., 349. 40. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 461. 38. (1863).
- atropos* MEG., S. B., V. 23. 10. t. XLIII. f. 7. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 227. 15. (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1287. 4. (1845); ROND., Dipt. ital. Prodr., V. 101. (1862); BOXSÖ., Finn. Insekt., II. 133. 4. (1866); PORRSEN., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 3. (sep.) (1881) et XXI. 17. (1885); MEADE, Entom. Monthly Mag., XII. 260. 3. (1876); STROBL., Wien. entom. Zeitzg., XII. 100. (1893) et Wiss. Mittheil. Steierm., XXX. 56. (1894); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900. 363. 10. (1900); MELI., Zool. Jahrbüch., XV. 681. f. 51. (1902).
- aurata* R.-D., Posth., II. 445. 10. (1863).
- aurifacies* R.-D., Myod., 354. 55. [*Myiophora*] (1830).
- auriflua* R.-D., Posth., II. 457. 29. (1863).
- Boisdavalii* R.-D., Posth., II. 465. 46. (1863).
- brunnifacies* R.-D., Myod., 348. 34. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 462. 40. (1863).
- caerulescens* ZETT., Dipt. Scand., IV. 1284. 2. (1845); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 378. 2. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 102. 2. (1862); BOXSÖ., Finn. Insekt., II. 136. 2. (1866).
- caesia* R.-D., Posth., II. 452. 20. (1863).
- Carceli* R.-D., Myod., 348. 35. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 469. 53. (1863).
- chrysofacies* R.-D., Posth., II. 506. 14. [*Myiophora*] (1863).
- ciliatula* R.-D., Posth., II. 455. 25. (1863).
- claripennis* R.-D., Posth., II. 509. 20. [*Myiophora*] (1863).
- claripennis* R.-D., Posth., II. 456. 27. (1863).
- collinaris* R.-D. (nec 1830), Posth., II. 516. 36. [*Myiophora*] (1863).
- colossus* Scop., Entom. carn., 327. 874. [*Musca*] (1763); VILL., Entom. linn., III. 474. 159. [*Musca*] (1789); SCARUS., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 410. (1856).
- compar* R.-D., Myod., 354. 57. [*Myiophora*] (1830).
- conica* R.-D., Myod., 355. 60. [*Myiophora*] (1830).
- corsilana* R.-D., Posth., II. 518. 39. [*Myiophora*] (1863).
- cursoria* R.-D., Posth., II. 458. 31. (1863).
- dumeti* R.-D., Posth., II. 508. 17. [*Myiophora*] (1863).
- errans* R.-D., Posth., II. 514. 31. [*Myiophora*] (1863).
- erratica* R.-D., Posth., II. 447. 13. (1863).
- fallax* R.-D., Posth., II. 475. 66. (1863).
- festiva* R.-D., Posth., II. 512. 27. [*Myiophora*] (1863).
- florca* R.-D., Myod., 352. 47. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 550. 2. [*Bercaca*] (1863).
- florida* R.-D., Posth., II. 454. 24. (1863).

- floridula* R.-D., Posth., II, 551, 3. [*Berecua*] (1863).
florum R.-D., Myod., 362, 2. [*Phorella*] (1830).
frontalis R.-D., Posth., II, 507, 15. [*Myiophora*] (1863).
frontalis R.-D., Posth., II, 468, 52. (1863).
fugax R.-D., Posth., II, 512, 26. [*Myiophora*] (1830).
fuliginosa R.-D., Myod., 349, 38. [*Myiophora*] (1830) et Posth.,
 II, 501, 3. [*Myiophora*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833,
 179. (43), 3. (1834) et Suit. à Buff., II, 226, 11. (1835); MEG.,
 S. B., VII, 278, 31. (1838).
fulvescens R.-D., Posth., II, 504, 10. [*Myiophora*] (1863).
fulvipalpis R.-D., Posth., II, 532, 4. [*Phorella*] (1863).
funebris R.-D., Posth., II, 500, 1. [*Myiophora*] (1863).
fuscifacies R.-D., Posth., II, 520, 44. [*Myiophora*] (1863).
Geoffroyi R.-D., Posth., II, 458, 30. (1863).
germana R.-D., Posth., II, 511, 25. [*Myiophora*] (1863).
grisea R.-D., Myod., 353, 51. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II,
 472, 59. (1863).
griseiceps R.-D., Myod., 359, 77. [*Myiophora*] (1830) et Posth.,
 II, 511, 24. (1863); BRÄUER, Sitzgsber. Akad. Wien. CVII,
 514, 149. (1898).
herbaria R.-D., Posth., II, 508, 18. [*Myiophora*] (1863).
herbaria R.-D., Posth., II, 459, 33. (1863).
hilaris R.-D., Posth., II, 471, 58. (1863).
humilis R.-D., Posth., II, 473, 62. (1863).
hyalipennis R.-D., Posth., II, 473, 63. (1863).
integra R.-D., Posth., II, 520, 43. [*Myiophora*] (1863).
intermedia R.-D., Myod., 349, 37. [*Myiophora*] (1830) et Posth.,
 II, 462, 39. (1863).
labialis R.-D., Posth., II, 532, 5. [*Phorella*] (1863).
lacta R.-D., Posth., II, 555, 10. [*Berecua*] (1863).
lativasa R.-D., Myod., 361, 68. [*Myiophora*] (1830); Macq., Suit.
 à Buff., II, 227, 18. (1835); MEG., S. B., VII, 279, 35. (1838).
limpida R.-D., Posth., II, 425, 7. [*Pierretia*] (1863).
livens R.-D., Myod., 350, 43. [*Myiophora*] (1830).
livida R.-D., Myod., 350, 42. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II,
 460, 35. (1863).
lugubris R.-D., Posth., II, 476, 67. (1863).
lucoria R.-D., Posth., II, 515, 33. [*Myiophora*] (1863).
lucoria R.-D., Posth., II, 468, 51. (1863).
Macquarti R.-D., Posth., II, 514, 30. [*Myiophora*] (1863).
maesta R.-D., Posth., II, 452, 21. (1863).
melanura R.-D., Posth., II, 428, 13. [*Pierretia*] (1863).
misera R.-D., Posth., II, 504, 11. [*Myiophora*] (1863).
nilis R.-D., Posth., II, 466, 48. (1863).
modesta R.-D., Posth., II, 472, 60. (1863).
montana R.-D., Posth., II, 518, 40. [*Myiophora*] (1863).
monticola R.-D., Posth., II, 517, 37. [*Myiophora*] (1863).

- morio* R.-D., Posth., II. 555. 9. [*Bercaca*] (1863).
- morio* R.-D., Myod., 363. 6. [*Phorella*] (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 229. 15. (1835); MEIG., S. B., VII. 279. 36. (1838).
- muscaria* R.-D., Posth., II. 533. 6. [*Phorella*] (1863).
- myioides* R.-D., Posth., II. 459. 32. (1863).
- nebulosa* R.-D., Posth., II. 511. 23. [*Myiophora*] (1863).
- nigra* R.-D., Myod., 349. 39. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 448. 15. (1863).
- nigrita* R.-D., Posth., II. 474. 65. (1863).
- nitens* R.-D., Posth., II. 520. 45. (1863).
- obscura* R.-D., Posth., II. 503. 7. [*Myiophora*] (1863).
- obscurella* R.-D., Posth., II. 503. 8. [*Myiophora*] (1863).
- obscuricauda* R.-D., Myod., 354. 54. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 450. 18. (1863).
- palatina* R.-D., Posth., II. 509. 19. [*Myiophora*] (1863).
- pallidipes* R.-D., Posth., II. 507. 16. [*Myiophora*] (1863).
- paludosa* R.-D., Posth., II. 500. 2. [*Myiophora*] (1863).
- pascuorum* R.-D., Posth., II. 505. 12. [*Myiophora*] (1863).
- pauperata* R.-D., Posth., II. 531. 3. [*Phorella*] (1863).
- praecox* R.-D., Posth., II. 465. 45. (1863).
- pratensis* R.-D., Posth., II. 448. 14. (1863).
- pratensis* R.-D., Posth., II. 502. 6. [*Myiophora*] (1863).
- propinqua* R.-D., Posth., II. 445. 11. (1863).
- quadrata* Bosc, Naturgesch., 62. 45. (1834).
- Ramburii* R.-D., Posth., II. 466. 47. (1863).
- riparia* R.-D., Posth., II. 517. 38. (1863).
- rubescens* R.-D., Myod., 359. 76. [*Myiophora*] (1830).
- rubiginosa* R.-D., Myod., 343. 17. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 501. 4. [*Myiophora*] (1863).
- ruricola* R.-D., Posth., II. 472. 61. (1863).
- sibirica* R.-D., Posth., II. 519. 42. [*Myiophora*] (1863).
- sordida* R.-D., Myod., 350. 41. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 428. 14. [*Pierrelia*] (1863).
- sordida* R.-D., Posth., II. 474. 64. (1863).
- soror* R.-D., Myod., 347. 32. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 464. 44. (1863).
- specialis* R.-D., Myod., 356. 63. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 460. 36. (1863).
- sponsa* R.-D., Posth., II. 556. 11. [*Bercaca*] (1863).
- squalens* R.-D., Myod., 356. 64. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 461. 37. (1863).
- squalens* R.-D., Posth., II. 426. 9. [*Pierrelia*] (1863).
- squalida* R.-D., Myod., 362. 3. [*Phorella*] (1830) et Posth., II. 531. 2. [*Phorella*] (1863).
- squamigera* R.-D., Myod., 352. 50. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 470. 55. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 180. (44). 6. (1834) et Suit. à Buff., II. 226. 14. (1835); MEIG., S. B., VII. 278. 32. (1838).

- squamosa* R.-D., Myod., 351. 46. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 449. 16. (1863).
- subnitens* R.-D., Myod., 358. 71. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 510. 22. [*Myiophora*] (1863).
- temeraria* R.-D., Posth., II. 519. 41. [*Myiophora*] (1863).
- tenebricosa* R.-D., Posth., II. 450. 17. (1863).
- tessellata* R.-D., Posth., II. 467. 50. (1863).
- tetrella* R.-D., Posth., II. 513. 29. [*Myiophora*] (1863).
- tristis* R.-D., Posth., II. 463. 42. (1863).
- vaga* R.-D., Posth., II. 504. 9. [*Myiophora*] (1863).
- vagans* R.-D., Posth., II. 516. 35. [*Myiophora*] (1863).
- vagus* R.-D., Posth., II. 463. 41. (1863).
- variegata* Scop., Entom. carn., 326. 869. [*Musca*] (1763).
- velox* R.-D., Posth., II. 459. 34. (1863).
- vernalis* R.-D., Myod., 356. 62. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 456. 28. (1863).
- vernalis* R.-D., Posth., II. 426. 8. [*Pierretia*] (1863).
- villana* R.-D., Myod., 351. 45. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 451. 19. (1863).
- virgo* R.-D., Posth., II. 469. 54. (1863).
- vivipara* Deg., Mem. Ins., VI. 31. 8. t. III. f. 18. [*Musca*] (1776) et ed. Götze, VI. 63. 8. [*Musca*] (1781); VILL., Entom. linn., III. 480. 177. [*Musca*] (1789).
- chaetalis* R.-D. = **haemorrhoea** MEIG.
- chrysiifacies* R.-D. = **carnaria** L.
- ciliatula* R.-D. = **carnaria** L.
- cinerea* R.-D. = **melanura** MEIG.
- claripennis* R.-D. (*Er.*) = **haemorrhoea** MEIG.
- claripennis* R.-D. (*Hart.*) = **dissimilis** MEIG.
- claripennis* R.-D. (*Myi.*) = **carnaria** L.
- claripennis* R.-D. (*Sav.*) = **carnaria** L.
- clathrata** MEIG.*), S. B., V. 25. 14. (1826); Macq., Suit. à Buff. II. 227. 20. (1835); Rond., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 381. 20. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 116. 21. (1862); MEALE, Entom. Monthly Mag., XII. 263. 10. (1876); MÜK, Wien. entom. Zeitg., IX. 153. 75. (1890); PORTSCH., Par. Orthopt., 23. *nola*. (1894); KÉSEK, D'HERC., Comptes rendus, CXVIII. 1106. (1894), Rev. scient., (4). I. 663. (1894) et Ann. Mag. Nat. Hist., (6). XIV. 74. (1894).
- clavatus* PAND., Rev. entom., XV. 196. 40. (1894).
- nigraus* PAND., Rev. entom., XV. 202. 53. (1896).
- clavatus* PAND. = **clathrata** MEIG.
- cochlearis* PAND. = **ungulata** PAND.

*) *Aceridium aegyptium* L., *Stauronotus maroccanus* F. = *Epeira cornuta* KOCH (ova).

- cognata** ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 585. 4. (1860) et Dipt. Ital. Prodr., V. 104. 4. (1862). Melita.
- collinaris** R.-D. (1830) = **erythrura** MEIG.
- collinaris** R.-D. (1863) = **carnaria** L.
- colossus** Scop. = **carnaria** L.
- commendata** R.-D. = **haemorrhoidalis** FALL.
- compur** R.-D. = **carnaria** L.
- concolor** R.-D. = **dissimilis** MEIG.
- congrua** PAND., Rev. entom., XV. 200. 50. (1896). Gallia mer.
- conica** R.-D. = **carnaria** L.
- consanguinea** ROXD. (*), Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 392. 35. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 127. 36. (1862); PAND., Rev. entom., XV. 187. 24. (1896); MK. Wien. entom. Zeitg., XVII. 162. 20. (1898). Europacentr. et mer.
- consobrina** R.-D. = **melanura** MEIG.
- consobrina** ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 291. 29. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 122. 30. (1862); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 101. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 61. (1894). Europacentr. et mer.
- contempta** R.-D. = **haemorrhhoa** MEIG.
- contigua** R.-D. = **haemorrhhoa** MEIG.
- crassimargo** PAND., Rev. entom., XV. 195. 38. (1896). Germania.
- crassipalpis** Macq., Hist. nat. Can. Webb Ent., I. 112. 62. (1838) et Dipt. exot., III. 255. (98). 3. (1843). Ins. Canar.
- crocata** R.-D. = **erythrura** MEIG.
- cruenta** PAND. = **frenata** PAND.
- cruentata** MEIG., S. B., V. 28. 23. (1826); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 181. 11. (1834) et Suit. à Buff., II. 225. 6. (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1298. 18. (1845) et VIII. 3268. 18. (1849); WALK., Ins. Brit., II. 104. 7. (1833); ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 383. 31. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 124. 32. (1862); SCHN., F. A., I. 571. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 139. 13. (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., XII. 266. 18. (1876); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 62. (1894); VILLEN, Bull. Soc. entom. France, 1900. 364. 19 et 403. 18. (1900). Europa.
- raficauda** ZETT., Ins. Lapp., 650. 4. (1838).
- cucullans** PAND., Rev. entom., XV. 179. 7. (1896). Gallia mer.
- cucullata** R.-D. = **melanura** MEIG.
- cultellata** PAND., Rev. entom., XV. 186. 21. (1896). Gallia mer.
- cursoria** R.-D. = **carnaria** L.
- cursoria** R.-D. (*Er.*) = **dissimilis** MEIG.
- cursoria** R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.
- cyathisans** PAND. = **albiceps** MEIG.
- dalmatina** SCHN., F. A., I. 571. (1862); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 101. (1893). Dalmatia.
- depressifrons** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1293. 12. (1845); SCHN., F. A., I. 573. (1862). Europa.

*1) *Harpactor iracundus* Po.

arcorum ROXB. (*acc* MEIG.), Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 381, 16, (1860) et Dipt. ital. Prodr., V, 114, 17, (1862); PAND., Rev. entom., XV, 204, 58, (1896); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900, 364, 13 et 403, 22, (1900).

despecta R.-D. — **dissimilis** MEIG.

discifera PAND., Rev. entom., XV, 196, 41, (1896).

Gallia mer.
Europa.

dissimilis MEIG., S. B., V, 25, 15, (1826); Macq., Suit. à Buff., II, 228, 21, (1835); MEADE, Entom. Monthly Mag., XII, 264, 14, (1876); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900, 364, 14, (1900).

arvensis R.-D., Myod., 358, 71, [*Mgiophora*] (1830) et Posth., II, 495, 28, [*Erichsonia*] (1863).

claripennis R.-D., Posth., II, 524, 6, [*Hartigia*] (1863).

concolor R.-D., Posth., 523, 5, [*Hartigia*] (1863).

cursoria R.-D., Posth., II, 494, 26, [*Erichsonia*] (1863).

despecta R.-D., Myod., 363, 5, [*Phorella*] (1830) et Posth., II, 528, 15, [*Hartigia*] (1863).

dissoluta PAND., Rev. entom., XV, 201, 51, (1896); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900, 21, (1900).

flavescens R.-D., Posth., II, 522, 3, [*Hartigia*] (1863).

fuscipennis R.-D., Posth., II, 528, 14, [*Hartigia*] (1863).

fuscipennis R.-D., Myod., 361, 83, [*Mgiophora*] (1830) et Posth., II, 497, 32, [*Erichsonia*] (1863).

grisea R.-D. (*bis*), Myod., 361, 86, [*Mgiophora*] (1830).

grisella R.-D., Posth., II, 498, 33, [*Erichsonia*] (1863).

grisella R.-D., Posth., II, 525, 9, [*Hartigia*] (1863).

hilaris R.-D., Posth., II, 496, 29, [*Erichsonia*] (1863).

infusca R.-D., Posth., II, 497, 31, [*Erichsonia*] (1863).

lugubris R.-D., Posth., II, 529, 16, [*Hartigia*] (1863).

morio R.-D., Posth., II, 499, 35, [*Erichsonia*] (1863).

myioidea R.-D., Posth., II, 525, 8, [*Hartigia*] (1863).

nana R.-D., Myod., 361, 87, [*Mgiophora*] (1830) et Posth., II, 498, 34, [*Erichsonia*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 180, (44), 9, (1834) et Suit. à Buff., II, 228, 22, (1835); MEIG., S. B., VII, 278, 34, (1838).

nigricans R.-D., Myod., 360, 82, [*Mgiophora*] (1830) et Posth., II, 496, 30, [*Erichsonia*] (1863).

nigricauda R.-D., Posth., II, 494, 25, [*Erichsonia*] (1863).

obscuripennis R.-D., Myod., 359, 75, [*Mgiophora*] (1830) et Posth., II, 523, 10, [*Hartigia*] (1863).

offuscata MEIG., S. B., V, 26, 16, (1826); SEMS., F. A., I, 572, (1862); PAND., Rev. entom., XV, 201, 52, (1896); STROB., Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 60, (1891).

opaca R.-D., Posth., II, 523, 4, [*Hartigia*] (1863).

selinensis ROXB., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 390, 25, (1860) et Dipt. ital. Prodr., V, 120, 26, (1862); STROB., Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 61, (1891).

sistoria R.-D., Posth., II, 522, 1, [*Hartigia*] (1863).

- socia* R.-D., Posth., II. 526. 11. [*Hartigia*] (1863).
sordida R.-D., Posth., II. 527. 12. [*Hartigia*] (1863).
strenua R.-D., Posth., II. 521. 1. [*Hartigia*] (1863).
tenella R.-D., Posth., II. 529. 16. [*Hartigia*] (1863).
tristis R.-D., Posth., II. 527. 13. [*Hartigia*] (1863).
viatrix R.-D., Posth., II. 495. 27. [*Erichsonia*] (1863).
villana R.-D., Posth., II. 524. 7. [*Hartigia*] (1863).
dissoluta PAND. = **dissimilis** MEIG.
duocli R.-D. = **carnaria** L.
ebrachiata PAND., Rev. entom., XV. 182. 15. (1896). Gallia mer.
edar WALK. = **melanura** MEIG.
egena R.-D. = **erythrura** MEIG.
errans R.-D. = **carnaria** L.
erratica R.-D. = **carnaria** L.
erythrocerca R.-D. = **erythrura** MEIG.
erythrophthalma STROBL. = **setipennis** ROND.
erythrura MEIG., S. B., V. 3. 26. (1826); ZETT., Dipt. Scand., IV. Europa.
 1300. 21. (1845); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 384. 34.
 (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 126. 35. (1862); SEMX., F. A., I.
 572. (1862); BOXSÖ., Finnl. Insekt., II. 140. 16. (1866); STROBL.,
 Wien. entom. Zeitg., XII. 102. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm.,
 XXX. 63. (1894); PAND., Rev. entom., XV. 177. 4. (1896).
agilis R.-D., Myod., 343. 19. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II.
 427. 11. [*Pierretia*] (1863).
aurea R.-D., Posth., II. 434. 1. [*Racivia*] (1863).
collinaria R.-D., Myod., 345. 26. [*Myiophora*] (1830).
crocata R.-D., Myod., 343. 16. [*Myiophora*] (1830) et Posth.,
 II. 432. 5. [*Serraisia*] (1863).
egena R.-D., Posth., II. 431. 2. [*Serraisia*] (1863).
erythrocerca R.-D., Posth., II. 429. 1. [*Serraisia*] (1863).
gagatica R.-D., Posth., II. 431. 3. [*Serraisia*] (1863).
lusatica KRAM., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V. 332. 5. f.
 IV. (1905) et VI. 63. (1906).
luteicauda R.-D., Posth., II. 431. 4. [*Serraisia*] (1863).
riparia R.-D., Myod., 345. 24. [*Myiophora*] (1830).
Schineri BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXIII. 67. 205. (1891).
strenua R.-D., Posth., II. 549. 1. [*Bervaea*] (1863).
evonymellae BOUCHÉ*, Naturgesch., 208. 4. (1834). Germania.
excuticulata PAND., Rev. entom., XV. 202. 54. (1896). Gallia mer.
exuberans PAND. = **tuberosa** PAND.
fulcata PAND., Rev. entom., XV. 185. 20. (1896). Europacentr.
fallax R.-D. = **carnaria** L.
festiva R.-D. = **carnaria** L.
filia ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 386. 5. (1860) et Dipt. ital. Europacentr.
 Prodr., V. 105. 5. (1862); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXX. et mer.

*) Yponomeuta evonymella L.

56. (1894): PAND., Rev. entom., XV, 197, 42. (1896): Du Ros.,
Mém. Soc. linn. N. France, XI, t. I, f. 12, 24., t. II, f. 36. (1903):
KRAM., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V, 331. (1905).
- flavescens* R.-D. (*Hart.*) = **dissimilis** MEIG.
flavescens R.-D. (*Muls.*) = **melanura** MEIG.
flavidula R.-D. = **melanura** MEIG.
flavinervis R.-D. = **haemorrhoea** MEIG.
florea R.-D. = **carnaria** L.
florida R.-D. = **carnaria** L.
floridula R.-D. = **carnaria** L.
floram R.-D. = **carnaria** L.
fossoria PAND., Rev. entom., XV, 178, 6. (1896). Gallia mer.
frenata PAND., Rev. entom., XV, 182, 13. (1896). Europacentr.
crucata PAND., Rev. entom., XV, 181, 12. (1896). et mer.
frontalis R.-D. (*Mgi.*) = **carnaria** L.
frontalis R. D. (*Sar.*) = **carnaria** L.
fugar R.-D. (*Mgi.*) = **carnaria** L.
fugar R.-D. (*Scal.*) = **haemorrhoidalis** FALL.
fuliginosa R.-D. (*Cal.*) = **melanura** MEIG.
fuliginosa R.-D. (*Er.*) = **haemorrhoea** MEIG.
fuliginosa R.-D. (*Mgi.*) = **carnaria** L.
fuligo R.-D. = **melanura** MEIG.
fulvrescens R.-D. = **carnaria** L.
fulvicauda MEADE, Entom. Monthly Mag., XXV, 28. (1888); KRAM., Europacentr.
 Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V, 331. [*fulvicaudis*] (1907).
fulvipalpis MACQ., Dipt. exot., III, 255. (98). 2. t. XII, f. 7. (1843). Sinai.
fulvipalpis R.-D. (*Phor.*) = **carnaria** L.
fulvipalpis R.-D. (*Sar.*) = **haemorrhoidalis** FALL.
fuebris R.-D. = **carnaria** L.
fuscifacies R.-D. = **carnaria** L.
fuscipennis R.-D. (*Er.*) = **dissimilis** MEIG.
fuscipennis R.-D. (*Hart.*) = **dissimilis** MEIG.
gagalea R.-D. = **erythrura** MEIG.
Geoffroyi R.-D. = **carnaria** L.
germana R.-D. = **carnaria** L.
gesnerioides R.-D. = **affinis** FALL.
grisea R.-D. (*Agr.*) = **affinis** FALL.
grisea R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.
grisea R.-D. (*Mgi.*) = **dissimilis** MEIG.
grisella R.-D. (*Er.*) = **dissimilis** MEIG.
grisella R.-D. (*Hart.*) = **dissimilis** MEIG.
grisescens R.-D. (*Agr.*) = **affinis** FALL.
grisescens R.-D. (*Mgi.*) = **carnaria** L.
haematodes MEIG.*, S. B., V, 29, 25. (1826); MACQ., Soc. Sci. Lille, Europa.
 1833, 182, 14. (1834) et Suit. à Buff., II, 225, 8. (1835); ZETT.,

*) Chrysochraon dispar FIEB.

- Ins. Lapp., 650. 5. (1838) et Dipt. Scand., IV. 1299. 20. (1845) et XIII. 6180. 20. (1859); ROXB., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 384. 36. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 128. 37. (1862); SEMX., F. A., I. 572. (1862); R.-D., Posth., II. 435. 2. [*Ravinia*] (1863); BOXS., Finnl. Insekt., II. 140. 15. (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., XII. 266. 19. (1876); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 185. (1893); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 102. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 63. (1894); PAND., Rev. entom., XV. 176. 1. (1896); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900. 364. 21. (1900); KRAM, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 63. (1906).
campestris R.-D., Myod., 346. 30. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 443. 7. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 184. 48. 6. [*Apria*] (1834) et Suit. à Buff., II. 231. 11. [*Ligia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 282. 50. (1838).
haemorrhoidalis FALL. p. p.
hebes R.-D., Posth., II. 436. 3. [*Ravinia*] (1863).
hemisphaerica R.-D., Myod., 346. 28. [*Myiophora*] (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 181. 45. 13. (1834); MEIG., S. B., VII. 279. 37. (1838).
horticola R.-D., Myod., 346. 29. [*Myiophora*] (1830).
limpidipennis R.-D., Myod., 346. 27. [*Myiophora*] (1830).
parva R.-D., Posth., II. 427. 10. [*Pieretia*] (1863).
sulcata R.-D., Posth., II. 437. 4. [*Ravinia*] (1863).

haematura R.-D. = **haemorrhoidalis** FALL.

- haemorrhhoa** MEIG.*), S. B., V. 29. 24. (1826); R.-D., Myod., 344. 21. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 481. 1. [*Erichsonia*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 181. 12. (1834) et Suit. à Buff., II. 225. 7. (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1298. 19. (1845); WALK., Ins. Brit., II. 104. 8. (1853); ROXB., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 382. 26. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 121. 27. (1862); SEMX., F. A., I. 571. (1862); BOXS., Finnl. Insekt., II. 140. 14. (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., XII. 267. 20. (1876); MÜK, Wien. entom. Zeitg., IX. 153. 75. (1890); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 63. (1894); PAND., Rev. entom., XV. 188. 11. (1896); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900. 364. 20. (1900).
aestivalis R.-D., Posth., II. 490. 17. [*Erichsonia*] (1863).
aestivalis R.-D., Myod., 344. 22. [*Myiophora*] (1830).
albicans R.-D., Myod., 345. 25. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 488. 12. [*Erichsonia*] (1863).
ambulatoria R.-D., Posth., II. 486. 8. [*Erichsonia*] (1863).
anxia R.-D., Posth., II. 493. 25. [*Erichsonia*] (1863).
arborca R.-D., Posth., II. 498. 19. [*Erichsonia*] (1863).
ardeacea R.-D., Posth., II. 486. 9. [*Erichsonia*] (1863).
caesia R.-D., Posth., II. 573. 24. [*Mulsantia*] (1863).
campestris R.-D., Posth., II. 484. 4. [*Erichsonia*] (1863).

*) *Helix hortensis* MÜLL.

- campestris* R.-D., Posth., II, 398, 1. [*Mulsantia*] (1863).
chaetalis R.-D., Posth., II, 484, 5. [*Erichsonia*] (1863).
claripennis R.-D., Posth., II, 490, 16. [*Erichsonia*] (1863).
contempta R.-D., Myod., 343, 18. [*Myiophora*] (1830) et Posth.,
 II, 493, 24. [*Erichsonia*] (1863).
configua R.-D., Posth., II, 492, 21. [*Erichsonia*] (1863).
flavinevis R.-D., Posth., II, 493, 22. [*Erichsonia*] (1863).
fuliginosa R.-D., Posth., II, 487, 10. [*Erichsonia*] (1863).
incauta R.-D., Posth., II, 573, 25. [*Mulsantia*] (1863).
inconstans R.-D., Posth., II, 491, 20. [*Erichsonia*] (1863):
 BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 513, 148. (1898).
labialis R.-D., Posth., II, 485, 6. [*Erichsonia*] (1863).
musca R.-D., Posth., II, 487, 11. [*Erichsonia*] (1863).
oralis R.-D., Posth., II, 485, 7. [*Erichsonia*] (1863).
pilosa R.-D., Posth., II, 483, 3. [*Erichsonia*] (1863).
procar R.-D., Posth., II, 489, 15. [*Erichsonia*] (1863).
Reginaldi R.-D., Posth., II, 574, 26. [*Mulsantia*] (1863).
rustica R.-D., Posth., II, 488, 13. [*Erichsonia*] (1863).
sanguinolenta Macq., Suit. à Buff., II, t. XVI, f. 2. (1835).
ambripennis R.-D., Posth., II, 489, 14. [*Erichsonia*] (1863).
calida R.-D., Posth., II, 482, 2. [*Erichsonia*] (1863).
varinervis R.-D., Posth., II, 491, 18. [*Erichsonia*] (1863).

haemorrhoidalis FALL.*), Vet. Acad. Handl., 236. [*Musca*] (1816) et Europa.

- p. p., Dipt. subc. Musc., 39, 2. [*Musca*] (1820); GEOFFR., Ins.,
 II, 527, 65. [—] (1762); HARR., Expos. o. gl. Ins., t. XXV, f. 14.
 [*Musca*] (1776); MEIG., S. B., V, 28, 22. (1826); R.-D., Myod., 340, 7.
 [*Myiophora*] (1830), Posth., II, 552, 6. [*Bercata*] (1863) et Annal.
 Soc. entom. France, VII, (1849); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833,
 181, 10. (1834) et Suit. à Buff., II, 224, 5. (1835); BOUCHÉ,
 Naturgesch., 63, 46. (1834); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1297, 17.
 (1845) et VIII, 3268, 17. (1849); WALK., Ins. Brit., II, 104, 6.
 (1853); ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 384, 33. (1860) et
 Dipt. ital. Prodr., V, 126, 34. (1862); BERTOL., Mem. Accad. Sci.
 Bologna, XII, 4, 2. (1862); SCHN., F. A., I, 571. (1862); LOXSD.,
 Finnl. Insekt., II, 139, 12. (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag.,
 XII, 265, 16. (1876); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII, 102.
 (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 62. (1894).
agilis R.-D., Posth., II, 552, 5. [*Bercata*] (1863).
agrarica R.-D., Posth., II, 554, 8. [*Bercata*] (1863).
albida R.-D., Posth., II, 513, 28. [*Myiophora*] (1863).
Blondeli R.-D., Myod., 344, 20. [*Myiophora*] (1830) et Posth.,
 II, 592, 5. [*Myiophora*] (1863).
convexata R.-D., Posth., II, 526, 31. [*Myiophora*] (1863).
fugax R.-D., Posth., II, 488, 9. [*Scaligeria*] (1863).
fulvipalpis R.-D., Posth., II, 442, 5. (1863).

*) *Pachytylus migratorius* F.

- haematara* R.-D., Posth., II, 551, 4. [*Berecua*] (1863).
inclita R.-D., Posth., II, 443, 8. (1863).
iners R.-D., Posth., II, 439, 2. (1863).
meditata R.-D., Posth., II, 576, 30. [*Malsantia*] (1863).
Meigenii R.-D., Posth., II, 442, 6. (1863).
nitida R.-D., Posth., II, 510, 21. [*Myiophora*] (1863).
nurus RONP., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 392, 30. (1860) et
 Dipt. ital. Prodr., V, 124, 31. (1862); MEADE, Entom. Monthly
 Mag., XII, 266, 17, f. 3. (1876); HAGEN., Canad. Entom.,
 1881, 147, 3. (1881); STROB., Wien. entom. Zeitg., XII, 101.
 (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 61. (1894); PAND.,
 Rev. entom., XV, 185, 19. (1896); VILLEN., Bull. Soc. entom.
 France, 1900, 364, 18. (1900).
oralis R.-D., Posth., II, 554, 7. [*Berecua*] (1863).
pabularum R.-D., Posth., II, 441, 4. (1863).
praeceps R.-D., Posth., II, 480, 7. [*Scaligeria*] (1863).
squalida R.-D., Myod., 342, 15. [*Myiophora*] (1830).
villica R.-D., Myod., 340, 8. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II,
 440, 3. (1863).
Zetterstedtii R.-D., Posth., II, 439, 1. (1863).
harpar PAND. = **tuberosa** PAND.
hebes R.-D. = **haematodes** MEIG.
hemisphaerica R.-D. = **haematodes** MEIG.
herbaria R.-D. (*Myi.*) = **carnaria** L.
herbaria R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.
hilaris R.-D. (*Er.*) = **dissimilis** MEIG.
hilaris R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.
hirticus PAND., Rev. entom., XV, 193, 34. (1896); Du Ros., Mém. Europe centr.
 Soc. lin. N. France, XI, t. I, f. 11, 23, t. II, f. 35. (1903). et mer.
agricola MEADE (*nov* R.-D.), Entom. Monthly Mag., XII, 261, 6.
 (1876).
nocera KRAM. (*nov* RONP.), Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog.,
 V, 331, 1, f. 1. (1905).
hirtipes WIED., Ausser. zweifl. Ins., II, 361, 13. (1830). Aegyptus.
horticola R.-D. = **haematodes** MEIG.
humilis MEIG. = **nigriventris** MEIG.
humilis R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.
humilis R.-D. (*Scal.*) = **melanura** MEIG.
hyalipennis R.-D. = **carnaria** L.
hystrix PAND., Rev. entom., XV, 180, 10. (1896). Gallia mer.
incauta R.-D. = **haemorrhoea** MEIG.
incisilobata PAND. = **striata** F.
inclita R.-D. = **haemorrhoidalis** FALL.
inconstans R.-D. = **haemorrhoea** MEIG.
inermis STROB. = **pumila** MEIG.
iners R.-D. = **haemorrhoidalis** FALL.
infantula RONP., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 388, 17. (1860) et Europe centr.
 et mer.

- Dipt. ital. Prodr., V, 114, 18, (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XII, 265, 15, (1876); PAND., Rev. entom., XV, 200, (1896).
- infuscula* R.-D. = **dissimilis** MEIG.
- integra* R.-D. = **carnaria** L.
- intermedia* R.-D. = **carnaria** L.
- juvenis** ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 388, 17, (1860) et Dipt. ital. Prodr., V, 114, 18, (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XII, 263, 9, (1876); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII, 101, (1893). Europacentr. et mer.
- Kantzei* KRAM. = **aratrix** PAND.
- labialis* R.-D. (*Er.*) = **haemorrhoea** MEIG.
- labialis* R.-D. (*Phor.*) = **carnaria** L.
- laciniata* PAND. = **subulata** PAND.
- laeta* R.-D. = **carnaria** L.
- laticornis** MEIG., S. B., V, 27, 19, (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 228, 23, (1835); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 380, 14, (1860) et Dipt. ital. Prodr., V, 111, 14, (1862); LLOY, Atti Istit. ven., (3), IX, 889, [*Sphaerogaster*] (1864); MEADE, Entom. Monthly Mag., XII, 262, 7, (1876); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 59, (1894). Europacentr. et mer.
- laticrus* R.-D. = **carnaria** L.
- latigena* PAND. = **pumila** MEIG.
- laeta* R.-D. = **melanura** MEIG.
- limpida* R.-D. = **carnaria** L.
- limpidipennis* R.-D. = **haematodes** MEIG.
- lineata** FALL.*, Vet. Acad. Handl., 238, [*Musca*] (1816) et Dipt. succ. Musc., 40, 5, [*Musca*] (1820); MEIG., S. B., V, 26, 17, (1826); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1294, 14, (1845) et XIII, 6179, 14, (1859); WALK., Ins. Brit., II, 103, 5, (1853); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 381, 19, (1860) et Dipt. ital. Prodr., V, 116, 20, (1862); SCHN., F. A., I, 573, (1862); BOSSD., Finl. Insekt., II, 139, II, (1866); MEADE, Entom., XIV, 286, (1884); PAND., Rev. entom., XV, 206, 62, (1896). Europa.
- agrestis* R.-D., Posth., II, 600, 1, [*Listeria*] (1863).
- lapidosa* ZETT., in litt.
- livens* R.-D. = **carnaria** L.
- livida* R.-D. = **carnaria** L.
- lugubris* R.-D. (*Hart.*) = **dissimilis** MEIG.
- lugubris* R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.
- lusatica* KRAM. = **erythrura** MEIG.
- lusoria* R.-D. (*Myl.*) = **carnaria** L.
- lusoria* R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.
- luteicauda* R.-D. = **erythrura** MEIG.
- Macquarti* R.-D. = **carnaria** L.
- maderensis** SCHN., Novara Dipt., 312, 62, [*Cynomyia*] (1868); B. Madeira, B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 133, (1894).
- mamillata* PAND. = **affinis** FALL.

*) *Stauronotus cruciatus* F.

macula R.-D. = **carnaria** L.

maialis R.-D. = **melanura** MEIG.

matertera RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 387, 9. (1860) et Dipt. Ital. Prodr., V, 108, 9. (1862); JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XX, 30, 35. (1886). Europa mer.

maura R.-D. = **nigriventris** MEIG.

meditata R.-D. = **haemorrhoidalis** FALL.

Meigenii R.-D. = **haemorrhoidalis** FALL.

melanura MEIG., S. B., V, 23, 11. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 227, 17. (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1288, 6. (1845) et XIII, 6178, 8. (1859); RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 379, 8. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V, 107, 8. (1862); WALK., Ins. Brit., II, 103, 4. (1853); SCHN., F. A., I, 574. (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., II, 137, 6. (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., XII, 261, 5, f. 2. (1876); PAND., Rev. entom., XV, 194, 35. (1896); VILLEN., Bull. Soc. entom. ital. France, 1900, 363, 11. (1900); DU ROS., Mém. Soc. linn. N. France, XI, t. I, f. 10, 22, t. II, f. 34. (1903); KRAM., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V, 14, f. III. (1905). Europa,
Japonia.

abdominalis R.-D., Myod., 354, 56. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II, 561, 6. [*Mulsantia*] (1863).

albiceps ZETT. (*nec* MEIG.), Ins. Lapp., 650, 3. (1838).

albida R.-D., Posth., II, 567, 14. [*Mulsantia*] (1863).

albidipennis R.-D., Myod., 358, 74. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II, 570, 18. [*Mulsantia*] (1863).

ardeacea R.-D., Posth., II, 478, 3. [*Scaligeria*] (1863).

arvicola R.-D., Myod., 355, 58. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II, 569, 17. [*Mulsantia*] (1863).

atra R.-D., Posth., II, 560, 5. (1863).

blanda R.-D., Posth., II, 572, 22. [*Mulsantia*] (1863).

brunnisquamis R.-D., Posth., II, 479, 5. [*Scaligeria*] (1863).

camporum R.-D., Myod., 359, 78. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II, 562, 9. [*Mulsantia*] (1863).

Carceli R.-D., Posth., I, 576, 1. [*Calyptia*] (1863).

cinerea R.-D., Myod., 355, 61. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II, 433, 2. [*Bellieria*] (1863).

consobrina R.-D., Posth., II, 570, 19. [*Mulsantia*] (1863).

cucullata R.-D., Posth., II, 567, 13. [*Mulsantia*] (1863).

edar WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 832. (1849).

flavescens R.-D., Myod., 361, 85. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II, 571, 21. [*Mulsantia*] (1863).

flavidula R.-D., Posth., II, 573, 23. [*Mulsantia*] (1863).

fuliginosa R.-D., Posth., II, 577, 2. [*Calyptia*] (1863).

fuligo R.-D., Posth., II, 479, 6. [*Scaligeria*] (1863).

humilis R.-D., Posth., II, 479, 4. [*Scaligeria*] (1863).

lauta R.-D., Posth., II, 558, 2. [*Mulsantia*] (1863).

maialis R.-D., Myod., 357, 70. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II, 477, 2. [*Scaligeria*] (1863).

- myioides* R.-D., Posth., II, 477, 1. [*Scaligeria*] (1863).
nigripennis R.-D., Posth., II, 563, 10. [*Mulsantia*] (1863).
obscura R.-D., Myod., 357, 69. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II, 561, 7. [*Mulsantia*] (1863).
pellis R.-D., Posth., II, 575, 29. [*Mulsantia*] (1863).
percia R.-D., Posth., II, 480, 8. [*Scaligeria*] (1863).
praeceps R.-D., Posth., II, 562, 8. [*Mulsantia*] (1863).
praticola R.-D., Posth., II, 569, 16. [*Mulsantia*] (1863).
rubricornis R.-D., Posth., II, 433, 1. [*Bellieria*] (1863).
rustica R.-D., Myod., 348, 36. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II, 559, 3. [*Mulsantia*] (1863).
sericea R.-D., Myod., 352, 48. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II, 568, 15. [*Mulsantia*] (1863).
sollicitata R.-D., Posth., II, 574, 27. [*Mulsantia*] (1863).
specta R.-D., Posth., II, 575, 29. [*Mulsantia*] (1863).
striata R.-D. (nec F.), Myod., 352, 49. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II, 565, 12. [*Mulsantia*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 179, 4. (1834) et Suit. à Buff., II, 226, 12. (1835); Semx., F. A., 1, 570. (1862); Muk, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII, 187, 6. (1883).
tenchricosa R.-D., Posth., II, 560, 4. [*Mulsantia*] (1863).
tristis R.-D., Posth., II, 564, 11. [*Mulsantia*] (1863).
vaga R.-D., Posth., II, 571, 20. [*Mulsantia*] (1863).
melanura R.-D. = **carnaria** L.
minima ROXB., Dipt. ital. Prodr., V, 113, 16. (1862); PAND., Rev. Italia. entom., XV, 198. (1896).
minuta R.-D. = **nigriventris** MEG.
misera R.-D. = **carnaria** L.
mitis R.-D. = **carnaria** L.
modesta R.-D. = **carnaria** L.
montana R.-D. = **carnaria** L.
monticola R.-D. = **carnaria** L.
morio R.-D. (*Ber.*) = **carnaria** L.
morio R.-D. (*Er.*) = **carnaria** L.
morio R.-D. (*Phor.*) = **carnaria** L.
musca R.-D. = **haemorrhoea** MEG.
muscaria R.-D. = **carnaria** L.
myioides R.-D. (*Hart.*) = **dissimilis** MEG.
myioides R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.
myioides R.-D. (*Scal.*) = **melanura** L.
nana R.-D. = **dissimilis** L.
nebulosa R.-D. = **carnaria** L.
neglecta KRAM. = **scoparia** PAND.
nepos ROXB., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 290, 27. (1860) et Dipt. Italia. ital. Prodr., V, 121, 28. (1862).
nigra R.-D. = **carnaria** L.
nigrons PAND. = **clathrata** MEG.

- nigricans* R.-D. = **dis similis** MEIG.
- nigricauda* R.-D. = **dis similis** MEIG.
- nigrifrons* R.-D. = **melanura** MEIG.
- nigrita* R.-D. = **carnaria** L.
- nigriventris** MEIG., S. B., V. 27. 21. (1826); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 380. 15. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 112. 15. (1862); SCHN., F. A., I. 572. (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XII. 262. 8. (1876); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 101. (1883) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 59. (1894); PAND., Rev. entom., XV. 203. 56. (1896). Europa.
- arvorum* R.-D., Myod., 361. 84. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 427. 12. [*Pierretia*] (1863).
- atra* R.-D., Myod., 360. 88. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 424. 5. [*Pierretia*] (1863).
- humilis* MEIG., S. B., V. 27. 20. (1826); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900. 364. 16. (1900).
- maura* R.-D., Posth., II. 425. 6. [*Pierretia*] (1863).
- minuta* R.-D., Posth., II. 533. 7. [*Phorella*] (1863).
- praecox* R.-D., Posth., II. 423. 2. [*Pierretia*] (1863).
- rusticana* R.-D., Posth., II. 424. 4. [*Pierretia*] (1863).
- vivida* R.-D., Myod., 358. 73. [*Myiophora*] (1830) et Posth., II. 423. 3. [*Pierretia*] (1863).
- nitens* R.-D. = **carnaria** L.
- nitida* R.-D. = **haemorrhoidalis** FALL.
- nora* SIEBKE = **striata** FABR.
- noverca* KRAM. = **hirticus** PAND.
- noverca** ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 386. 7. (1860) et Dipt. ital. Prodr., V. 107. 7. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 56. (1894); PAND., Rev. entom., XV. 198. 45. (1896); DU ROS., Mém. Soc. linn. N. France, XI. t. I. f. 9. 21., t. II. f. 33. (1903). Europeacentr. et mer.
- nubica** JAENN., Abh. Senckenb. Ges., VI. 380. (72). 94. (1867). Nubia.
- nurus* ROND. = **haemorrhoidalis** FALL.
- obscura* R.-D. (*Myi.*) = **carnaria** L.
- obscura* R.-D. (*Muls.*) = **melanura** MEIG.
- obscurella* R.-D. = **carnaria** L.
- obscuricanda* R.-D. = **carnaria** L.
- obscuripennis* R.-D. = **dis similis** MEIG.
- occatrix** PAND., Rev. entom., XV. 178. 5. (1896). Gallia mer.
- offuscata* MEIG. = **dis similis** MEIG.
- opava* R.-D. = **dis similis** MEIG.
- oralis* R.-D. (*Berc.*) = **haemorrhoidalis** FALL.
- oralis* R.-D. (*Er.*) = **haemorrhoea** MEIG.
- pabulina* R.-D. = **carnaria** L.
- pabulorum* R.-D. = **haemorrhoidalis** FALL.
- pallidipes* R.-D. = **carnaria** L.
- paludosa* R.-D. = **carnaria** L.

- parca* R.-D. = **haematodes** MEIG.
- parcula* ROND. = **puerula** ROND.
- pascentium* R.-D. = **carnaria** L.
- pauciseta* KRAM. = **albiceps** MEIG.
- pauciseta** PAND., Rev. entom., XV, 182, 14. (1896). Germania.
- pauperata* R.-D. = **carnaria** L.
- pellex* R.-D. = **melanura** MEIG.
- pernix* HARR. = ? **striata** FABR.
- perris* R.-D. = **melanura** MEIG.
- petiolata* PAND. = **setipennis** ROND.
- pilosa* R.-D. = **haemorrhoea** MEIG.
- praeceps* R.-D. (*Muls.*) = **melanura** MEIG.
- praeceps* R.-D. (*Scal.*) = **haemorrhoidalis** FALL.
- praeceps* R.-D. (*Pierr.*) = **nigriventris** MEIG.
- praeceps* R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.
- pratensis* R.-D. = **carnaria** L.
- praticola* R.-D. (*Muls.*) = **melanura** MEIG.
- praticola* R.-D. (*Myl.*) = **carnaria** L.
- privigna* PAND. = **striata** FABR.
- privigna** ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 387, 10. (1860) et Dipt. Europa centr.
ital. Prodr., V, 109, 10. (1862); MÜLL., Dipt. Bernst., 71. (1887); et mer.
STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 56. (1894).
- procar* R.-D. (*Er.*) = **haemorrhoea** MEIG.
- procar* R.-D. (*Sar.*) = **affinis** FALL.
- propinqua* R.-D. = **carnaria** L.
- protuberans** PAND., Rev. entom., XV, 187, 23. (1896). Gallia mer.
- proxima* ROND. = **pumila** MEIG.
- puerula** ROND., Dipt. ital. Prodr., V, 119, 24. (1862); PAND., Rev. Europa mer.
entom., XV, 201. (1896); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII,
514, 150. (1898).
- parcula* ROND. (*nec* WIED.), Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 389,
23. (1860).
- pumila** MEIG., S. B., V, 24, 12. (1826); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1291, Europa.
9. (1845); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 380, 12. (1860) et
Dipt. ital. Prodr., V, 110, 12. (1862); SCHN., F. A., I, 569. (1862);
BOESD., Finnl. Insekt., II, 137, 8. (1866); STROBL, Mittheil. Ver.
Steierm., XXX, 58. (1894); PAND., Rev. entom., XV, 198, 46.
(1896); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 364, 12. (1900),
inermis STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 63. (1894).
- taligena* PAND., Rev. entom., XV, 199, 47. (1896).
- proxima* ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 392, 32. (1860) et
Dipt. ital. Prodr., V, 125, 33. (1862); STROBL, Mittheil. Ver.
Steierm., XXX, 63. (1894); PAND., Rev. entom., XV, 183, 17.
(1896).
- punctata* R.-D. = **affinis** FALL.
- punctulata* R.-D. = **affinis** FALL.

- pygmaea** ZETT., *Dipt. Scand.*, IV, 1302, 24, (1815) et XIII, 6181, 24, (1859). Scandinavia.
- quadrata* BOUCHE = **carnaria** L.
- quinquevittata* HART. = **affinis** FALL.
- Ramburii* R.-D. = **carnaria** L.
- Reginaldi* R.-D. = **haemorrhoea** MEIG.
- riparia* R.-D. (1863) = **carnaria** L.
- riparia* R.-D. (1830) = **erythrura** MEIG.
- rostrata** PAND., *Rev. entom.*, XV, 203, 55, (1896); De Ros., *Mém.* Europacentr. Soc. lin. N. France, XI, t. I, f. 15., t. II, f. 27, 39, (1903).
- rubescens* R.-D. = **carnaria** L.
- rubiginosa* R.-D. = **carnaria** L.
- rubicornis* R.-D. = **melanura** MEIG.
- ruficauda* ZETT. = **cruentata** MEIG.
- rufipes** WIED., *Ausser. zweifl. Ibs.*, II, 362, 14, (1830). Aegyptus.
- ruricola* R.-D. = **carnaria** L.
- rustica* R.-D. (*Er.*) = **haemorrhoea** MEIG.
- rustica* R.-D. (*Muls.*) = **melanura** MEIG.
- rusticana* R.-D. = **nigriventris** MEIG.
- sanguinolenta* MACQ. = **haemorrhoea** MEIG.
- Schineri* Bezzi = **erythrura** MEIG.
- scoparia** PAND., *Rev. entom.*, XV, 189, 26, (1896). Europacentr.
neglecta KRAM., *Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog.*, V, 14, f. V, et mer.
 et 329, (1905).
- sericea* R.-D. = **melanura** MEIG.
- selinervis* Rond. = **dissimilis** MEIG.
- setipennis** Rond., *Atti Soc. ital. Sci. Nat.*, III, 389, 22, (1860) et Europacentr.
Dipt. ital. Prodr., V, 118, 23, (1862); MEADE, *Entom. Monthly et mer.*
Mag., XII, 264, 13, (1876); STROBL, *Wien. entom. Zeitg.*, XII, 101, (1893) et *Mittheil. Ver. Steierm.*, XXX, 59, (1894); PAND.,
Rev. entom., XV, 200, 49, (1896); BRAUER, *Sitzgsber. Akad. Wien*, CVII, 514, 153, (1898).
erythrophthalma STROBL, XIV, Programm Seitenst., 20, (1880);
 Mik, *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XXXI, 348, (1881).
petiolata PAND., *Rev. entom.*, XV, 199, 48, (1896).
- silvatica* R.-D. = **carnaria** L.
- similis** MEADE, *Entom. Monthly Mag.*, XII, 261, 4, (1876); Ost-Sack., Europacentr.
Cat. N. Amer. Dipt., 2 ed., 257, (1878); HAGEN., *Canad. Entom.*, et mer.
 1881, 149, 19, (1881); Mik, *Dipt. Herstein*, 74, (1887); PAND.,
Rev. entom., XV, 193, 33, (1896).
appendiculata KRAM., *Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog.*, V, 332,
 4, f. V, (1905).
- sinuata** MEIG., S. B., V, 22, 9, (1826); ZETT., *Dipt. Scand.*, IV, 1289, Europa.
 7, (1845) et VIII, 3207, 7, (1849); SCHIN., F. A., I, 574, (1862);
 PAND., *Rev. entom.*, XV, 188, 25, (1896); VILLEN., *Bull. Soc. entom. France*, 1900, 364, 1, (1900); De Ros., *Mém. Soc. lin. France*, XI, t. I, f. 8, 20, t. II, f. 32, (1903).

arvorum MEIG., S. B., V, 21, 13. (1826); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 180, 8, (1834) et Suit. à Ruff., II, 227, 49, (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1292, 11, (1845) et VIII, 3268, 11, (1849); BOSSD., Finnl. Insekt., II, 138, 9, (1866).

Bezzii COENI, Bull. Soc. entom. ital., XXIX, 140, 59, (1897); Mhk., Wien. entom. Zeitg., XVII, 60, 71, (1898); STROBL, Tief's Nachl., 52, (1900); KRAM., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V, 331, (1905).

sistoria R.-D. **dissimilis** MEIG.

socia R.-D. **dissimilis** MEIG.

socrus RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 387, 13, (1860) et Dipt. ital. Prodr., V, 111, 13, (1862); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII, 101, (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 58, (1894); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 514, 151, [*socius*] (1898). Europacentr. et mer.

solicitata R.-D. **melanura** MEIG.

sordida R.-D. (*Hart.*) **dissimilis** MEIG.

sordida R.-D. (*Picr.*) = **carnaria** L.

sordida R.-D. (*Sar.*) = **carnaria** L.

soror R.-D. **carnaria** L.

soror RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 386, 6, (1860) et Dipt. ital. Prodr., V, 106, 6, (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 57, (1894); PAND., Rev. entom., XV, 203, 57, (1896); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 513, 145, (1898). Europacentr. et mer.

specialis R.-D. = **carnaria** L.

sponsa R.-D. **carnaria** L.

specta R.-D. = **melanura** MEIG.

squalens R.-D. (*Picr.*) **carnaria** L.

squalens R.-D. (*Sar.*) **carnaria** L.

squalida R.-D. (*Myl.*) **haemorrhoidalis** FALL.

squalida R.-D. (*Phor.*) = **carnaria** L.

squamigera R.-D. **carnaria** L.

squamosa R.-D. **carnaria** L.

strenua R.-D. (*Ber.*) = **erythrura** MEIG.

strenua R.-D. (*Hart.*) **dissimilis** MEIG.

striata FABR.*, Entom. syst., IV, 315, 13, [*Musca*] (1794) et Syst., Antl., 288, 20, (1805); MEIG., S. B., V, 21, 7, (1826); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1286, 3, (1845) et XII, 4709, 3, (1855); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 828, (1849) et Ins. Brit., II, 102, 2, (1853); BOSSD., Finnl. Insekt., II, 136, 3, (1866). Europa.

nova SIEBKE, Enum. ins. norv., 91, 3, (1877).

pernix HABL., Expos. engl. ins., 81, t. XXV, f. 13, [*Musca*] (1776).

privigna PASD. (*ovc* RONDI.), Rev. entom., XV, 197, 13, (1896); DE ROS., Mém. Soc. lim. N. France, XI, t. I, f. 14, t. II, f. 26, 38, (1903).

*) *Oryctes nasicornis* L.

- subulens* R.-D. = **carnaria** L.
- subulata** PAND., Rev. entom., XV, 194, 36. (1896). Europacentr.
laciniata PAND., Rev. entom., XV, 195, 39. (1896); De Ros., et mer.
 Mém. Soc. lim. N. France, XI, t. I, f. 13., t. II, f. 25, 37.
 (1903).
- subcata* R.-D. = **haematodes** MEIG.
- temeraria* R.-D. = **carnaria** L.
- tenebricosa* R.-D. (Muls.) = **melanura** MEIG.
- tenebricosa* R.-D. (Sar.) = **carnaria** L.
- tenella* R.-D. **dissimilis** MEIG.
- teretirostris** PAND., Rev. entom., XV, 190, 28. (1896); De Ros., Gallia.
 Mém. Soc. lim. N. France, XI, t. I, f. 5, 17., t. II, f. 29. (1903).
- tessellata* R.-D. = **carnaria** L.
- tetrella* R.-D. **carnaria** L.
- tristis* R.-D. (Hart.) = **dissimilis** MEIG.
- tristis* R.-D. (Muls.) = **melanura** MEIG.
- tristis* R.-D. (Sar.) **carnaria** L.
- tuberosa** PAND., Rev. entom., XV, 192, 32. (1896). Europacentr.
ambigua KRAM., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., V, 331, 3, f.
 III. (1905).
- tuberans* PAND., Rev. entom., XV, 186, 22. (1896).
- harpar* PAND., Rev. entom., XV, 189, 27. (1896).
- ambripennis* R.-D. = **haemorrhoea** MEIG.
- uncicurva** PAND., Rev. entom., XV, 183, 16. (1896). Gallia.
penicillata VILLEN. in lit.
- ungulata** PAND., Rev. entom., XV, 204, 59. (1896). Gallia mer.
 ?*cochlearis* PAND., Rev. entom., XV, 205, 61. (1896).
- unicolor** MACQ., Dipt. exot., III, 255. (98), t. t. XI, f. 5. (1843). Algeria.
- vaga* R.-D. (Muls.) **melanura** MEIG.
- vaga* R.-D. (Mgi.) **carnaria** L.
- vagans** MEIG., S. B., V, 26, 18. (1826); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1291, Europa.
 10. (1845); ROND., Dipt. ital. Prodr., V, 101. (1862); SEMS., F.
 A., I, 569. (1862); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 58.
 (1894); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 364, 15. (1900).
- vagens* R.-D. (Mgi.) **carnaria** L.
- vagens* R.-D. (Sar.) = **carnaria** L.
- valida* R.-D. = **haemorrhoea** MEIG.
- variiegata* Scop. = **carnaria** L.
- varinervis* R.-D. = **haemorrhoea** MEIG.
- velox* R.-D. **carnaria** L.
- vernalis* R.-D. (Pierr.) **carnaria** L.
- vernalis* R.-D. (Sar.) **carnaria** L.
- viatrix* R.-D. **dissimilis** MEIG.
- vicina** MACQ., Suit. à Buff., II, 225, 9. (1835); MEIG., S. B., VII, 279, Europacentr.
 38. (1838); ROND., Dipt. ital. Prodr., V, 123, *nola*. (1862).
- vicina** VILLEN. (*nec* Macq.), Bull. Soc. entom. France, 1899, 27, f. 2, Gallia.
 (1899).

- villana* R.-D. (*Hart.*) - **dissimilis** MEIG.
villana R.-D. (*Stor.*) - **carnaria** L.
villica R.-D. = **haemorrhoidalis** FALL.
virgo R.-D. - **carnaria** L.
vittata BRAUER - **affinis** FALL.
vivida R.-D. = **nigriventris** MEIG.
vivipara DEG. - **carnaria** L.
vulnerata SCHN., F. A., I. 570. (1862); STROBL, Wien. entom. Zeitg., Europa mer.
 XII. 102. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 63. (1894).
Zetterstedti R.-D. - **haemorrhoidalis** FALL.)*

Blaesoxypha

Loew, Wien. entom. Monatschr., V. 384. (1861),

- gladiator* PAND. = **grylloctona** Lw.
grylloctona Lw.**, Wien. entom. Monatschr., V. 386. (1861); B. Europa centr.
 B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 185. (1893). et mer.
gladiator PAND., Rev. entom., XV. 205. 60. (1896).

Wohlfahrtia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 123. (1889) et LX. 165. (1893).

- Balassogloi** PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 142. [*Sarcophila*] Russia or. et
 (1882). mer.
intermedia PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XXI. 16. [*Sarcophila*] Russia.
 (1887).
magnifica SCHN.***), F. A., I. 567. [*Sarcophila*] (1862); WOLLE., N. Europacentr.
 Acta Acad. Leop. Car., IV. 277. t. IX. f. 4. [-] (1770); F. Löw., et mer.
 Wien. med. Wochenschr., XXXI. 972. [*Sarcophila*] (1883);
 LABOULE., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 28. t. I. f. 7. [*Sarco-*
phila] (1884); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 75. [*Sarco-*
phila] (1883); MÜK, Wien. entom. Zeitg., VI. 33. [*Sarcophila*]
 (1887); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 123. (1889); BLANCH.,
 Zool. med., II. 510. (1890) et Bull. Soc. Zool. France, 1891. 25.
 (1891); PAND., Rev. entom., XIV. 103. f. 1. [*Mctopia*] (1895); GALLI
 VAL., Bull. Soc. Vaud., (4). XXXVII. 354. [*Sarcophila*] (1901);
 BISENOR, Mittheil. Tour. Club Wien, XV. 2. 15. [*Sarcophila*]
 (1903).
Wohlfahrti PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XI. 123. t. III. V.

*) *acnea* AM STEIN et *cinerea* BREM ap. AM STEIN, Jahresber. naturf. Ges. Graub., II. 105. (1857) et *haemorrhagica* MEIG. ap. B. B. Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 411. (1891) *sunt nomina nuda*.

**) *Pezotettix alpina* KOLL.

***) *Homo sapiens* L. et alia mammalia.

[*Sarcophila*] (1875), Nat. Dipt. menschl. Körp., Petersburg 3 tab. [*Sarcophila*] (1878) et *Sarcoph.* Wohlf. Monogr., Petropoli, fig. [*Sarcophila*] (1884); GERST., Sitz. Ges. naturf. Fr. Berlin, 1875, 53 et 108. [*Sarcophila*] (1875); MEGNIN, Les. Paras., 27 et 44, f. 12. [*Sarcophila*] (1880); JOSEPH, D. Medic. Zeitschr., 1885 et 1887, 5. [*Sarcophila*] (1887); HUBER, Bibliogr. Jena, 6. [*Sarcophila*] (1899); PEPPER, Fliegenlarv., 24, f. 7-15. [*Sarcophila*] (1900).

Meigenii SCHN., F. A., I. 567. [*Sarcophila*] (1862); PORTSCH., Hor. Europacentr. Soc. entom. Ross., XVIII, t. II. [*Sarcophila*] (1884); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 123. (1889). et mer.

ruralis MEIG. (nec FALL.), ♀ S. B., V. 17. 2. t. XLIII, f. 9. [*Sarcophaga*] (1826); MEGNIN, Hor. Soc. entom. Ross., XV, V. [*Sarcophila*] (1881); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 363, 2. (1900).

ruralis MEIG. = **Meigenii** SCHN.

Wohlfahrti PORTSCH. = **magnifica** SCHN.

Disjunctio

PAND., Rev. entom., XIII, 56. XIII. (1894) et XV, 169. (1896).

Agria MACQ. (nec R.-D.), p. p., Suit. à Buff., II, 229, 3. (1835); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 123. (1889) et LX, 165. (1893).

argentea MACQ., Hist. nat. Can. Webb, Entom., I, 113, 67. [*Agria*] Ins. Canar. (1838) et Dipt. Exot., III, 265. (108), 2. [*Agria*] (1843).

argentifrons SCHN., ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 123. Sicilia. [*Agria*] (1889).

bella MACQ., Hist. nat. Can. Webb, Entom., I, 113, 66, t. IV, f. 9. Ins. Canar., [*Agria*] (1838) et Dipt. exot., III, 264. (107), 1, t. XIII, f. 5. Caucasus. [*Agria*] (1843); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 123. (1889) et LVIII, 368. [*Agria*] (1891).

distincta SCHN. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 123. [*Agria*] Sicilia. (1889).

hungarica B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 123. [*Agria*] (1889). Hungaria.

marima PORTSCH. = **tetripunctata** DUF.

nuba WIED., Ausser. zweiff. Ins., II, 296, 27. [*Tachina*] (1830). Nubia.

persica BIG. = **tetripunctata** DUF.

tetripunctata DUF*, Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 149, 13. Europa mer., t. VI, f. 12. [*Sarcophaga*] (1850); PORTSCH., Hor. Soc. entom. Persia. Ross., XVI, 283. [*Sarcophila*] (1881); LABORIE., Annal. Soc. entom. France, (6), IV, 31. [*Sarcophila*] (1884); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 123. [*Agria*] (1889); PAND., Rev. entom., XV, 170. (1896).

*) Au **bella** MACQ. ?

marima PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XI, t. II, [*Sarcophila*] (1875).

persica BIG., Annal. Soc. entom. France, (5) X, 150, [*Theria*] (1880); PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVII, 40, [*Sarcophila*] (1882).

Sarcophila

ROSD., Dipt. ital. Prodr., I, 86, 12, (1856) et V, 129, 12, (1862).

? *guttata* WÄLK., Entom., V, 343, 73, (1870).

Tajura.

impunctata ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI, 49, (1868).

Italia.

latifrons FALL., Vet. Acad. Handl., 1816, 238, [*Musca*] (1816) et Dipt. suoc. Musc., 40, 7, [*Musca*] (1822); MEIG., S. B., V, 31, 28, (1826) et VI, 374, [*Sarcophaga*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 230, 2, 4, XVI, f. 3, [*Agria*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., IX, 1295, 15, (1845) et XII, 6179, 15, [*Sarcophaga*] (1855); SCHX., F. A., I, 567, (1862); ROSD., Dipt. ital. Prodr., V, 130, 1, (1862); PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVIII, t. I, (1882); PAND., Rev. entom., XV, 172, 3, (1896); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900, 354, 22, (1900).

? *obsoleta* FALL., Vet. Acad. Handl., 1816, 238, [*Musca*] (1816) et Dipt. suoc. Musc., 40, 6, [*Musca*] (1822); MEIG., S. B., V, 31, 29, [*Sarcophaga*] (1826); ZETT., Dipt. Scand., III, 1296, 16, [*Sarcophaga*] (1845); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900, 361, 22, (1900).

? *maculata* MEIG., S. B., VII, 277, 30, [*Sarcophaga*] (1838); SCHX., F. A., I, 567, (1862); PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI, 284, [*Sarcophaga*] (1881); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1904, (1904).

Europacentr.

megacephala PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI, 142, (1881).

Rossia or.

notata MACQ., Suit. à Buff., II, 230, 4, [*Agria*] (1835); MEIG., S. B., VII, 280, 42, [*Sarcophaga*] (1838).

Europacentr.

obsoleta FALL. ? *latifrons* FALL.

pallipalpis MACQ., Suit. à Buff., II, 230, 3, [*Agria*] (1835); MEIG., S. B., VII, 280, 41, [*Sarcophaga*] (1838); ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI, 49, (1868).

Sicilia.

Angiometopa

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 123, (1889) et LX, 166, (1893).

Homococera LIOY, Atti Istit. ven., (3), IX, 887, [*Omocera*] (1864), em. Scand., 1882, nec CHÉVÉ, 1830, Col.

ruralis FALL., Vet. Acad. Handl., 235, [*Musca*] (1816) et Dipt. suoc. Musc., 39, 3, [*Musca*] (1822); MEIG., S. B., V, 17, 2, 4, XLIII, f. 9, nec [*Sarcophaga*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 223, 1, [*Sarcophaga*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1301, 22, (1845)

Europa.

et XIII. 6180, 22. [*Sarcophaga*] (1859); BOSSD., Finkl. Insekt., II. 141. 17. [*Sarcophaga*] (1866); PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 141. (1880), XVII. 3. (1881) et XVIII. fig. [*Sarcophila*] (1882); PAND., Rev. entom., XV. 172. 2. [*Sarcophila*] (1896); PEIFER, Fliegenlarv., 29. f. 17—19. [*Sarcophila*] (1900); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900. 363. 2. (1900).

Helicobosca

Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 49. 7. (1906).

Eurychaeta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 367. (1891)
et LX. 230. (1893) *nomen nudum*.

? *Microchaetina* WOLF, Biol. centr. amer., II. 240. (1886).

Theria R.-D., Myod., 337. II. (1830), *nov* Hüb. 1816. Lep.

alni Scop. = ? **muscaria** MEIG.

? **birufa** BIG., Annal. Soc. entom. France, (5). X. 152. [*Theria*] (1880). Persia.

? **flavidula** BIG., Annal. Soc. entom. France, (3). X. 151. [*Theria*] (1880). Persia.

intricaria MEIG. = **muscaria** MEIG.

muscaria MEIG.*), S. B., V. 17. 3. [*Sarcophaga*] (1826); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 178. 1. [*Sarcophaga*] (1834) et Suit. à Buff., II. 224. 2. [*Sarcophaga*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1302. 23. [*Sarcophaga*] (1845); PERRIS, Soc. Sci. Lille, 1850. 119. f. 1—5. [*Sarcophaga*] (1851); ROXB., Dipt. ital. Prodr., V. 90. 1. [*Theria*] (1860); SCHIX., F. A., I. 566. [*Theria*] (1862); R.-D., Posth., II. 509. 1. [*Theria*] (1863); BRACER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 76. [*Theria*] (1883); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). XXV. 27. [*Theria*] (1888); PAND., Rev. entom., XV. 207. 63. [*Sarcophaga*] (1896).

? *alni* Scop., Entom. carn., 332. 889. [*Musca*] (1763); VILL., Entom. linn., III. 514. 260. [*Musca*] (1789).

intricaria MEIG., S. B., V. 18. 4. [*Sarcophaga*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 224. 3. [*Sarcophaga*] (1835); CAMERANO, Rendic. Soc. entom. ital., 1878. 24 *Nov*. [*Sarcophaga*] (1878); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900. 363. 3. (1900).

pulpalis R.-D., Myod., 337. 1. [*Theria*] (1830).

pulpalis R.-D. = **muscaria** MEIG.

Heteronychia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 121. (1889) et LX. 166. (1893).

chaetoneura B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 168. t. VIII. f. Europa centr. 191. (1889) et LX. 220. (1893).

*) *Helix arbustorum* L., *pisana* L., *pomatia* L.

? *claripennis* R.-D., Myod., 263, 3. [*Nyctia*] (1830) et Posth., I, 797, 2. [*Nyctia*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 228, (92), 2. [*Melanophora*] (1834); MEG., S. B., VII, 273, 2. [*Nyctia*] (1838); BRÄUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 514, 157, (1898).

dissimilis SEMX. (nec MEG.), F. A., I, 572. [*Sarcophaga*] (1862).
trifaria R.-D., Myod., 263, 4. [*Nyctia*] (1830).

trifasciata Macq., Suit. à Buff., II, 174, 2. [*Melanophora*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), III, 181, 1, t. III, f. 5. [*Anthraxia*] (1855).

claripennis R.-D. = ? **chaetoneura** B. B.

dissimilis SEMX. = **chaetoneura** B. B.

juvenilis BRÄUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 513, 144. (1898). Italia.

trifaria R.-D. = **chaetoneura** B. B.

trifasciata Macq. = **chaetoneura** B. B.

Nyctia

R.-D., Myod., 262, I, (1830).

Cyboria R.-D., Posth., I, 800, VI, (1863).

Macrosoma LIOY, Atti Istit. ven., (3), X, 69, (1865) nec LEACH.

Stygina R.-D., Posth., I, 798, V, (1863).

albopunctata v. FOS. = **halterata** PANZ.

Carceli R.-D. = **halterata** PANZ.

halterata PANZ., Fauna germ., LIV, 13. [*Musca*] (1798); SEMX., p. Europa.

p., F. A., I, 554, (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. VI, f. 118, (1889); STROBL, p. p., Wien, entom. Zeitg., XII, 102, (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 64, (1894); PANZ., p. p., Rev. entom., XV, 141, 2. [*Melanophora*] (1896).

albopunctata v. ROS., Württemb. Corrbll., I, 58. [*Deria*] (1840).

Carceli R.-D., Myod., 263, 1, (1830) et Posth., I, 799, 1. [*Stygina*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 229, (93), 2. [*Melanophora*] (1834), Suit. à Buff., II, 174, 1. [*Melanophora*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), III, 32, 1, t. I, f. 15, (1855); MEG., S. B., VII, 274, 4, (1838); BLANCH., Hist. nat. ins., III, 611. [*Melanophora*] (1840); STREX, Entom. Nachricht., XXVI, 133, (1900).

mutua FABR., Syst. Anth., 302, 91. [*Musca*] (1805); MEG., S. B., V, 39, 9, t. XLIII, f. 20. [*Deria*] (1826) et VII, 273, 1, t. LXXIII, f. 18-22, (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 228, 1, t. III, f. [*Melanophora*] (1834), Suit. à Buff., II, 177, 14. [*Melanophora*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), III, 32, 2, t. I, f. 16, (1855); ROSN., Dipt. ital. Prodr., V, 132, 1, (1862); R.-D., Posth., I, 798, 4, (1863); LIOY, Atti Istit. ven.,

(3), X, 69. [*Maccosoma*] (1865); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 143. (1900).

monticola R.-D., Posth., I, 801, 2. [*Cyrtoria*] (1863).

nigrans MEIG., S. B., V, 40, 11. [*Dezia*] (1826) et VII, 210, 5. [*Rhinophora*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 189, 10, t. III, f. 17. [*Rhinophora*] (1855); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 410. [*Phorichaeta*] et 415. [*Megerlea*] (1891); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 144. (1900).

? *nigrita* Scop., Entom. carn., 328, 878. [*Musca*] (1763); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI, 410. (1856).

nitida R.-D., Myod., 264, 5. (1830) et Posth., I, 797, 3. (1863).

obscurata R.-D., Posth., I, 799, 2. [*Stygina*] (1863).

pusilla R.-D., Myod., 264, 7. (1830).

rubescens R.-D., Myod., 264, 6. (1830).

Servillei R.-D., Myod., 263, 2. (1830) et Posth., I, 801, 1. [*Cyrtoria*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 228. (92), 3. [*Melanophora*] (1834); MEIG., S. B., VII, 273, 3. (1838).

usta R.-D., Posth., I, 800, 3. [*Stygina*] (1863).

vivida R.-D., Posth., I, 796, 1. (1863).

maura F. = **halterata** PANZ.

monticola R.-D. = **halterata** PANZ.

nigrans MEIG. = **halterata** PANZ.

nigrita Scop. = ?**halterata** PANZ.

nitida R.-D. = **halterata** PANZ.

pusilla R.-D. = **halterata** PANZ.

obscurata R.-D. = **halterata** PANZ.

rubescens R.-D. = **halterata** PANZ.

Servillei R.-D. = **halterata** PANZ.

usta R.-D. = **halterata** PANZ.

vivida R.-D. = **halterata** PANZ.

Megerlea

R.-D., Myod., 266, IV. (1830).

Anthracia MEIG., S. B., VII, 268, 2. (1838) *nee* Hüb., 1816, Lep.

Atrania R.-D., Posth., I, 814, XIV. (1863).

caminiaria MEIG., S. B., V, 39, 10, t. XLIII, f. 21. [*Dezia*] (1826) Europa centr. et VII, 268, 1, t. LXXIII, f. 7—12. [*Anthracia*] (1838); MACQ., et mer., Soc. Sci. Lille, 1833, 235, 8. [*Philocera*] (1854) et Annal. Soc. Asia min. entom. France, (3), III, 182, 2, t. III, f. 6. [*Anthracia*] (1855); ROUD., Dipt. ital. Prodr., V, 133, 1. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. VI, f. 119. (1889); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII, 102. [*Nyctia*] (1893); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 133. (1900).

claripennis R.-D., Myod., 267, 3. (1830) et Posth., I, 814, 3. (1863).

fuliginaria ROSS., Dipt. ital. Prodr., V. 134. (1862).

fulvaria ROSS., Dipt. ital. Prodr., V. 134. (1862).

halterata p. p., SCHN., STROBL, PAND.

hyalinata R.-D., Posth., I. 815. 1. [*Atrania*] (1863).

hyalipennis MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 230. 8. [*Melanophora*] (1834).

nitida R.-D., Myod., 267. 1. (1830) et Posth., I. 813. 1. (1863);

MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 230. 7. t. III. f. 7. [*Melanophora*] (1834) et Suit. à Buff., II. 175. 6. [*Melanophora*] (1835).

picca R.-D., Myod., 267. 2. (1830) et Posth., I. 813. 2. (1863);

MACQ., Suit. à Buff., II. 175. 7. [*Melanophora*] (1835).

claripennis R.-D. = **caminaria** MEIG.

fuliginaria ROSS. = **caminaria** MEIG.

fulvaria ROSS. = **caminaria** MEIG.

hyalinata R.-D. = **caminaria** MEIG.

hyalipennis MACQ. = **caminaria** MEIG.

lugubris MACQ., Dipt. exot., III. 225. (68). 1. [*Anthraxia*] (1843). Algeria.

nitida R.-D. = **caminaria** MEIG.

picca R.-D. **caminaria** MEIG.

Gastrolepta

ROSS., Dipt. ital. Prodr., V. 153. 20. (1862).

gentilis ROSS., Dipt. ital. Prodr., V. 154. 1. (1862); JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XX. 28. 32. (1886). Europa mer.

Morinia

R.-D., Myod., 264. II. (1830).

A. *Morinia* s. str.

Melanomyia ROSS., Dipt. ital. Prodr., I. 88. 19. [*Melanomyia*] (1856) et V. 149. 19. (1862).

agilis R.-D., Myod., 266. 1. [*Medoria*] (1830) et Posth., I. 1131. 1. Gallia.

[*Medoria*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 229. (93). 6. t. III. f. 6. [*Melanophora*] (1834) et Suit. à Buff., II. 175. 5. [*Melanophora*] (1835); MEIG., S. B., VII. 276. 7. (1838); STEIN., Entom. Nachricht., XXVI. 130. (1900).

claripennis R.-D. **nana** MEIG.

collaris MEIG., S. B., VII. 204. 3. [*Medoria*] (1838). Germania.

fimbriata MEIG., S. B., V. 37. 6. [*Deria*] (1826); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 35. 2. t. II. f. 3. (1855); ROSS., Dipt. ital. Prodr., V. 152. 1. [*Melanomyia*] (1862); ROSS., Fönnl. Insekt., II. 130. II. [*Deria*] (1866); B. B., Denkschr. Akad. Europacentr. et mer.

- Wien, LX, 221. [*Melanomyia*] (1893); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 136. (1900).
- funesta** MEIG., S. B., IV, 346, 185. [*Tachina*] (1824) et VII, 203, 1. Europa centr.
t. LXIX, f. 13. [*Medoria*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III, 1175.
178. (1844) et XIII, 6136, 178. [*Tachina*] (1859); MACQ., Annal.
Soc. entom. France, (3), III, 31, 7, t. I, f. 14. [*Medoria*] (1855);
STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 32 et 125. [*Medoria*]
(1894); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 138. (1900).
- glabra* MEIG., S. B., VII, 203, 2. [*Medoria*] (1838).
- glabra* MEIG. = **funesta** MEIG.
- minima* ZETT. = **nana** MEIG.
- nana** MEIG., S. B., V, 37, 5. [*Deria*] (1826) et VII, t. LXXIII, f. Europa.
29—34. (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 229, 5. [*Melanophora*]
(1834), Suit. à Buff., II, 175, 4. [*Melanophora*] (1835) et
Annal. Soc. entom. France, (3), III, 36, 4, t. II, f. 5. (1855);
ROSD., Dipt. ital. Prodr., V, 151, 2. [*Melanomyia*] (1862); SCHEX.,
F. A., I, 551. (1862); R.-D., Posth., I, 1130, 2. (1863); B. B.,
Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 381. (1891) et LX, 183. [*Melanomyia*]
(1893); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 34. (1894);
PAND., Rev. entom., XV, 143, 4. [*Melanophora*] (1896); STEIN,
Entom. Nachricht., XXVI, 144. (1900).
- claripennis* R.-D., Myod., 266, 5. (1830).
- minima* ZETT., Ins. Lapp., 654, 8. [*Musca*] (1838) et Dipt.
Scand., III, 1273, 10. [*Deria*] (1845); BOSSO., Finnl. Insekt.,
II, 130, 11. [*Deria*] (1866).
- parva* R.-D., Myod., 265, 3. (1830).
- rubescens* R.-D., Myod., 265, 4. (1830) et Posth., I, 1130, 3.
(1863).
- parva* R.-D. = **nana** MEIG.
- pygmaea** ZETT., Dipt. Scand., III, 1274, 11. [*Deria*] (1844). Scandinavia.
- rubescens* R.-D. = **nana** MEIG.
- tricingulata** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hereceg., XIV, 490. Europacentr.
(1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hereceg., IV, 550. (1904). et mer.
- trifasciata* STROBL (*nov* MACQ.), Tief's Nachl., 53. (1900); HEED.,
Wien. entom. Zeitg., XX, 119. *nota*, (1901).
- trifasciata* STROBL = **tricingulata** STROBL.

B. *Medoria*

R.-D., Myod., 266, III. (1830); MEIG., S. B., VII, 203, 8. (1838).

anthracina MEIG. = ? **digramma** MEIG.

corvina v. RÖD. = **nitida** v. RÖD.

digramma MEIG., S. B., IV, 346, 184. [*Tachina*] (1824) et VII, 203. Europacentr.
4. (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 29, 3, 4. et sept.
1, f. 10. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6136, 178—179. [*Ta-*
china] (1859); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 135. (1900).

? *anthracina* MEIG., S. B., V, 36, 3. [*Deria*] (1826); ? WALK.,

- Ins. Brit., II, 37, 40. [*Tachina*] (1853); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 35, 2, t. II, f. 3, (1855); SCHIX., F. A., I, 551, (1862); PAND., Rev. entom., XV, 144, 6. [*Melanophora*] (1896); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 131, (1900).
- flavicalyptrata** Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 30, 6, t. I, f. 13, (1855). Europacentr.
- incisurata** ZETT., Dipt. Scand., VIII, 6157, 1—3. [*Phania*] (1859). Scandinavia.
- luteisquamata* PAND., **nitidâ** v. Röd.
- melania** MEIG., S. B., IV, 318, 189. [*Tachina*] (1824) et VII, 203, 6, (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 29, 4, t. I, f. 11, (1855); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 143, (1900). Germania.
- nitida** v. Röd., Entom. Nachricht., XVIII, 374, (1892); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 381, (1891) et LX, 205, 106. [*Anthracomyia*] (1893). Europacentr.
- corrina* v. Röd. (v. MEIG.), Entom. Nachricht., XVIII, 374, (1892).
- luteisquamata* PAND., Rev. entom., XV, 145, 7. [*Melanophora*] (1896).
- phasiaeformis** MEIG., S. B., VII, 204, 8, (1838); SCHIX., F. A., I, 550. [*Xysta*] (1862). Germania.
- pullula** ZETT.)*, Dipt. Scand., III, 1174, 176. [*Tachina*] (1845); WULP, Tijdschr. entom., VI, 41, (1869). Europacentr. et sept.

C. *Angioneura*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 161 et 187, (1893).

- acerba** MEIG., S. B., VII, 203, 7. [*Medoria*] (1838); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 30, 5, t. I, f. 12. [*Medoria*] (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6156, 1—2. [*Phania*] (1859); SCHIX., F. A., I, 550, (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 33 et 125. [*Medoria*] (1894); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 620. [*Calobataemyia*] (1894); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 129, (1900). Europa.
- pygmaea* PAND. (v. ZETT.), Rev. entom., XV, 168, 2, (1896).
- retusta* B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 369 [*Calobataemyia*] (1891).
- pygmaea* PAND. — **acerba** MEIG.
- retusta* B. B. — **acerba** MEIG.

D. *Calobataemyia*

- Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 736—737, (1854) et (3), III, 33, (1855).
- nigra** Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 31, t. II, f. 1, (1855); SCHIX., F. A., I, 552, (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 369, (1891). Europacentr.

*) Plagiödera armoraciae F.

Engyzops

ROND., Dipt. ital. Prodr., V. 177. 25. [*Eggisops*] (1862), *cm.* SCDD. 1882.

Eggypops B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 124. (1889).

alpicola STROBL = **Pecchiolii** ROND.

macronyx B. B. = **Pecchiolii** ROND.

Pecchiolii ROND., Dipt. ital. Prodr., V. 178. 1. (1862).

Europa-centr.

alpicola STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 33. [*Morinia*] (1894). et mer.

macronyx B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 168. t. VIII. f. 192. (1889) et LVIII. 433. [*Engyzops*] (1891).

Hoplisa

ROND., Dipt. ital. Prodr., V. 155. 20. *b.* [*Oplisa*] (1862), *cm.* SCDD.

mendica ROND. = **tergestina** SCHN.

pygmaea STROBL = **tergestina** SCHN.

tergestina SCHN., F. A., I. 552. [*Morinia*] (1862); STROBL, Glasnik Europa-centr.

Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 490. [*Morinia*] (1902) et Wiss. et mer.

Mittheil. Bosn. Herceg., IX. 550. [*Morinia*] (1904).

mendica ROND., Dipt. ital. Prodr., V. 155. 1. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VIII. f. 193. (1889).

pygmaea STROBL (*nee* ZETT.), Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 51. [*Phyto*] (1894).*)

Semitachina

PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVIII. 133. (1883).

hylemyiaeformis PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVIII. 133. Transcaucas. (1883).

Brachycoma

ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 69. 34. (1856) et III. 203. 34. (1859).

Oppia R.-D., Posth., II. 404. XXIV. (*nee* I. 309.) (1863) *nee* KOCH. Arach.

adolescens ROND. = ? **devia** FALL.

bombivora WULP. = **devia** FALL.

ciliger R.-D. = **devia** FALL.

devia FALL.**), Dipt. succ. Musc., 6. 8. [*Tachina*] (1820); MEG., 8. Europa.

*) *minuta* B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 415. (1891) *est nomen nudum.*

**) *Bombus agrorum* F., *silvarum* L., *terrestris* L., *Vespa silvestris* F.

B., IV, 391, 408. [*Tachina*] (1824); MACQ., Suit. à Buff., II, 141, 22. [*Tachina*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, 63, II, 393, 39, t. XIII, f. 2. [*Tachina*] (1854); ZETT., Ins. Lapp., 634, 4. [*Tachina*] (1834) et Dipt. Scand., III, 1203, 12, (1844), XII, 4688, 12, (1855) et XIII, 6976, 12. [*Tachina*] (1859); ROSS., Dipt. ital. Prodr., III, 204, 1, (1859); SCHIN., F. A., I, 477, (1862); BOXSID., Fünd. Insekt., II, 49, 9. [*Tachina*] (1866); MÜK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXV, 330, (1885) et Wien. entom. Zeitg., XV, 110, 51, (1896); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, t. VII, f. 173, (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 75, (1892).

adolescens ROSS., Dipt. ital. Prodr., III, 204, (1859); MÜK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXV, 330, 4, (1885).

bombivora WULF., Entom. Tijdschr., (2), IV, 142 et 187, t. IV, f. 3—5. [*Meigenia*] (1869); WEYENB., Entom. Tijdschr., (2), V, 201, t. VIII, f. 1—11. [*Meigenia*] (1870); PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVII, 10, (1882); BRÄUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII, 78, (1883); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 424, (1891) et LXI, 546, (1894).

ciliigera R.-D., Posth., II, 406, 1. [*Oppia*] (1863); PASD., Rev. entom., XIV, 303, 2. [*Metopia*] (1895); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900, 402, (1900).

- metopiella** ROSS., Dipt. ital. Prodr., III, 255, 2, (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 216, (1865); JAROSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XX, 25, 30, (1886). Europa mer.
- ? **smerinthi** MEADE*, Entom. Monthly Mag., (2), III, 75, (1892). Anglia.

Deuterammobia

Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI, 49, 4, (1906).

Annobia WULF., Entom. Tijdschr., (2), IV, 147, (1869) *nee* BULLG., 1820, Hymen.

? *Lalage* R.-D., Posth., I, 559, IV, (1863), *nee* BOE 1830, Aves.

Bigolina R.-D. ? **glabriventris** WULF.

Blondeli R.-D. ? **glabriventris** WULF.

cirrata R.-D. ? **glabriventris** WULF.

erythroccera R.-D. ? **glabriventris** WULF.

glabriventris WULF.**†, Entom. Tijdschr., (2), IV, 148, t. IV, f. 10—14. [*Annobia*] (1869); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, t. IV, f. 69, (1889) et LXI, 542. [*Annobia*] (1894).

? *Bigolina* R.-D., Posth., I, 560, 2. [*Lalage*] (1863).

? *Blondeli* R.-D., Myod., 110, 7. [*Salia*] (1830) et Posth., I, 562.

*) *Smerinthus populi* L.

**) *Parnassius apollo* L.

5. [*Lalage*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 270. 3. [*Lydella*] (1834).
- ? *cirrata* R.-D., Myod., 109. 4. [*Salia*] (1830) et Posth., I. 554. 2. [*Salia*] (1863).
- ? *erythrocerca* R.-D., Myod., 109. 5. [*Salia*] (1830) et Posth., I. 559. 1. [*Lalage*] (1863).
- ? *metallica* R.-D., Myod., 110. 8. [*Salia*] (1830) et Posth., I. 561. 4. [*Lalage*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 270. 4. [*Lydella*] (1834) et Suit. à Buff., II. 134. 4. [*Lydella*] (1835).
- ? *nigricornis* R.-D., Myod., 110. 6. [*Salia*] (1830) et Posth., I. 562. 6. [*Salia*] (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 134. 3. [*Lydella*] (1835).
- ? *parisiaca* R.-D., Posth., I. 561. 3. [*Lalage*] (1863).
- rubricera* BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 351. 82. [*Salia*] (1897).
- metallica* R.-D. = ? **glabriventris** WULF.
- nigricornis* R.-D. = ? **glabriventris** WULF.
- parisiaca* R.-D. = ? **glabriventris** WULF.
- rubricera* BRAUER = **glabriventris** WULF.

Miltogramma

MEIG., Illig. Magaz., II. 280. 109. (1803).

Hamulia R.-D., Posth., II. 110. I. (1863).

Pterella R.-D., Posth., II. 121. III. (1863).

Stenotaenia MACQ., Dipt. exot. Suppl., I. 167. [*Senotainia*] (1846) *em.* SCUDD. 1882.

A. *Craticulina*

BEZZI, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 49. 2. (1906).

Craticula PAND., Rev. entom., XIV. 290. (1895), *new* LOWE 1854. Moll.

barbiferum PAND., Rev. entom., XIV. 291. 4. (1895).

Gallia mer.

brevipenne BIG. = **tabaniforme** FABR.

frontale PAND. = **tabaniforme** FABR.

fulvum B. B. = **tabaniforme** FABR.

tabaniforme FABR., Syst. Antl., 302. 92. [*Musca*] (1805); MEIG., S. B., IV. 227. (1824) et VII. 242. 20. [*Musicera*] (1838); WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 278. 1. (1830). Europa mer., Africa sept.

brevipenne BIG., Annal. Soc. entom. France, (4). I. 228. 3. (1863);

ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 41. (1868); BRAUER,

Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 497. 3. (1899).

canescens PERR. in coll. ap. PAND.

frontale PAND., Rev. entom., XIV. 291. 5. (1895).

fulvum B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 350. [*Araba*] (1891).

B. *Miltogramma* s. str.

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 113. (1889) et LX, 167. (1893).

- algirum** Macq., Dipt. exot., III, 222. (65), 1, 1, VII, f. 2. (1843). Algeria.
- arcuatum** ZETT., Dipt. Scand., III, 1205, 4. (1844). Scandinavia.
- aurifrons** DUF., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 149, 12, t. VI, f. 11. (1850); Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 422, 8, t. XIV, f. 19. (1854); PAND., Rev. entom., XIV, 293, 8. (1895). Hispania, Gallia mer.
- aurulentum** R.-D. = **murinum** MEIG.
- bacillans** PAND. **oestraceum** FALL.
- Contarinii** ROXB., Dipt. ital. Prodr., III, 219, 7. (1859); SCHN., F. A., I, 507. (1862). Europa mer.
- laterale* R.-D., Posth., II, 114, 3. [*Hamulia*] (1863).
- cursorium** R.-D. = **murinum** MEIG.
- deprimatum** ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6150, 7-8. (1859). Scandinavia.
- fasciatum** R.-D. = **Germari** MEIG.
- florcum** R.-D. = **murinum** MEIG.
- Germari** MEIG., S. B., IV, 229, 5. (1824); Macq., Suit. à Buff., II, 154, 4. (1835); ZETT., Dipt. Scand., III, 1203, 2. (1844) et XIII, 6146, 2. (1859); ROXB., Dipt. ital. Prodr., III, 216, 5. (1859); SCHN., F. A., I, 507. (1862); R.-D., Posth., II, 115, 2. (1863) et 128, 8. [*Scutula*] (1863); BOSSQ., Fiml. Insekt., II, 106, 2. (1866); PAND., Rev. entom., XIV, 292, 7. (1895). Europa.
- fasciatum* R.-D. (*nee* MEIG.), Myod., 93, 1. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 252, 1. (1834) et Suit. à Buff., II, 153, 1. (1835); BLANCH., Hist. nat. ins., III, 611. (1840).
- globulare** MEIG., S. B., IV, 233, 15. (1824). Europacentr.
- griseolum** ZETT. (*nee* FALL.), Dipt. Scand., III, 1211, 12. (1844), XII, 4704, 12. (1855) et XIII, 6152, 12. (1859); BOSSQ., Fiml. Insekt., II, 108, 7. (1866). Scandinavia.
- immaculatum** Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 423, 9, t. XIX, f. 17. (1854). Europacentr.
- laterale* R.-D. = **Contarinii** ROXB.
- Macquarti** R.-D. (*), Posth., II, 112, 1. [*Hamulia*] (1863). Gallia.
- marginellum** R.-D. = **murinum** MEIG.
- Megerlei** MEIG., S. B., IV, 233, 11. (1824); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 700. (1849); SCHN., F. A., I, 507. (1862). Europacentr.
- Meigenii** R.-D. = **murinum** MEIG.
- mellense** Macq. = **murinum** MEIG.
- mellifrons** R.-D. = **murinum** MEIG.
- minusculeum** WALK., Entom., V, 311, 66. (1870). Tajura.

*) *Colletes succineta* LATR.

- murinum** MEG. (*), S. B., IV, 230, 8. (1824); MACQ., Suit. à Buff., Europa.
 II, 154, 6, t. XIV, f. 18. (1835); ROSD., Dipt. ital. Prodr., III, 217, 2. (1859); SCHN., F. A., I, 506. (1862); R.-D., Posth., II, 123, 4. [*Pterella*] (1863); VILLES., Bull. Soc. entom. France, 1900, 381, 9. (1900).
aurulentum R.-D., Posth., II, 115, 1. (1863).
cursorium R.-D., Posth., II, 116, 4. (1863).
florcam R.-D., Posth., II, 122, 2. [*Pterella*] (1863).
margineellum R.-D., Posth., II, 118, 8. (1863).
Meigenii R.-D., Posth., II, 116, 3. (1863).
melitense MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 419, 3, t. XIV, f. 15. (1854).
mellifrons R.-D., Posth., II, 121, 1. [*Pterella*] (1863).
parasita R.-D., Myod., 94, 3. (1830) et Posth., II, 117, 5. (1863);
 MACQ., Suit. à Buff., II, 155, 10. (1835).
ruficornis GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII, 101 et 132. [*Tachina*] (1834) et XV, 674. (1842); JAROSCH., Trudy naturf. Gos. Karkoff, XII, 120. (1878).
ruficornis MEG., S. B., IV, 231, 9. (1824); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 421, 5, t. XIV, f. 17. (1854); ROSD., Dipt. ital. Prodr., III, 217, 1. (1859); SCHN., F. A., I, 506. (1862); CORTI, Bull. Soc. entom. ital., XXIX, 140, 46. (1897); PAND., Rev. entom., XIV, 295, 13. (1895).
rusticanum R.-D., Posth., II, 118, 6. (1863).
ratilans MEG., S. B., IV, 231, 10. (1824); MACQ., Suit. à Buff., II, 154, 7. (1835); R.-D., Posth., II, 120, 11. (1863); STEIX, Entom. Nachricht., XXVI, 148. (1900); VILLES., Bull. Soc. entom. France, 1900, 381, 17. (1900).
villanum R.-D., Posth., II, 118, 7. (1863).
- nigricorne** MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 424, 11, t. XIV, f. 16. (1854). Europa-centr.
- nitidomaculatum** MACQ., Luc. Explor. Alger. Zool., III, 479, 196. Algeria.
 t. V, f. 11. (1849).
- occipitale** PAND., Rev. entom., XIV, 295, 12. (1895). Pyrenaea.
- oculatum** ZETT., Dipt. Scand., III, 1212, 13. (1844). Scandinavia.
- oestraceum** FALL. (**), Dipt. succ. Musc., 10, 17. [*Tachina*] (1820); Europa.
 MEG., S. B., IV, 229, 4. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 253, 2. (1834), Suit. à Buff., II, 153, 3. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), II, 418, 1, t. XIV, f. 17. (1854); ZETT., Dipt. Scand., III, 1202, 1. (1844), VIII, 3254, 1. (1849) et XIII, 6146, 1. (1859); ROSD., Dipt. ital. Prodr., III, 215, 3. (1859); SCHN., F. A., I, 506. (1862); R.-D., Posth., II, 123, 3. [*Pterella*] (1863); BOSSD., Finnl. Insekt., II, 106, 1. (1866); MÜLL., Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinl., 1884, 16. (1884); PAND., Rev. entom., XIV, 292.

*) ? *Plusia chrysis* L.

**) *Dasygaster hirtipes* FABR., *Podalirius retusus* KL.

6. (1895); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900, 381. II. (1900).
bacillans PAND., Rev. entom., XIV, 293. 9. (1895).
tessellatum MEIG., S. B., IV, 230. 6. (1824); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 418. 2. t. XIV, f. 17. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6147. 2-3. (1859); R.-D., Posth., II, 127. 7. [*Setulia*] (1863); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900, 381. 10. (1900).
- parasita* R.-D. = **murinum** MEIG.
pilimanum ROND. = **taeniatum** MEIG.
pilitarse ROND., Dipt. ital. Prodr., III, 218. 4. (1859); SCHN., F. A., I, 506. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, t. VI, f. 127. (1889); PAND., Rev. entom., XIV, 294. 10. (1895). Europa-centr. et mer.
- punctatum** MEIG.)*, S. B., IV, 223. 3. (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 253. 3. (1834) et Suit. à Buff., II, 153. 2. (1835); CURT., Brit. Entom., 529. (1832); R.-D., Myod., 93. 2. (1830) et Posth., II, 113. 2. [*Hamulia*] (1863); SIEB., Observ., Erlangae, 20. (1841); ZETT., Dipt. Scand., III, 1201. 3. (1844) et XIII, 6147. 3. (1859); WALK., Ins., Brit., II, 52. 76. [*Tachina*] (1853); ROND., Dipt. ital. Prodr., III, 220. 8. (1859); SCHN., F. A., I, 507. (1862); BONSB., Finnl. Insekt., II, 103. 3. (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 76. (1892); PAND., Rev. entom., XIV, 295. 14. (1895). Europa.
- punctatellum** ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI, 40. (1868). Italia.
rotundiventre ZETT., Dipt. Scand., III, 1209. 10. (1844). Scandinavia.
- raficorne* GIMM. = **murinum** MEIG.
raficorne MEIG. = **murinum** MEIG.
rasticanum R.-D. = **murinum** MEIG.
rutilans MEIG. = **murinum** MEIG.
- sexpunctatum** MEIG., S. B., VII, 231. 20. (1838). Europa-centr.
tachinarium ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6152. 12-13. (1859). Scandinavia.
taeniatum MEIG., S. B., IV, 228. 2. (1824); R.-D., Posth., II, 120. 12. (1863); PAND., Rev. entom., XIV, 294. (1896); STEIS, Entom. Nachricht., XXVI, 149. (1900); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900, 381. 8. (1900) et Ann. Univ. Grenoble, XVII, 8. (1905). Europa-centr. et mer.
pilimanum ROND., Dipt. ital. Prodr., III, 218. 6. (1859); SCHN., F. A., I, 507. (1862); PAND., Rev. entom., XIV, 294. 11. (1895).
- tessellatum* MEIG. = **oestraceum** FALL.
villanum R.-D. = **murinum** MEIG.
V-nigrum MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 423. 10. t. XIV, f. 17. (1854).** Europa-centr.

*) *Ammophila hirsuta* SCOP., *Colletes fodiens* LATR.

***) *semifasciatum* ROND. ap. BEAUFER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII, 497. (1899), *est nomen nudum*.

Apodacra

Macq., *Annal. Soc. entom. France*, (3), II, 425. (1854).

- bembicisequax** PAND., *Rev. entom.*, XIV, 288, 1. (1895). Gallia mer.
cyprica ROHD., *Dipt. ital. Prodr.*, III, 221. (1859); PAND., *Rev. Entom.*, XIV, 289, 3. (1895). Cyprus.
pulehra Egg., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XI, 216. (1861); SEMX., *F. A.*, I, 509. (1862); PAND., *Rev. entom.*, XIV, 289. (1895). Gallia mer.
seriemaculata Macq., *Annal. Soc. entom. France*, (3), II, 426, 1. Europa mer.
 XV, f. 1. (1854); SEMX., *F. A.*, I, 509. (1862); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, t. VI, f. 128. (1889); PAND., *Rev. entom.*, XIV, 289, 2. (1895).

Phylloteles

Loew, *Stettin. entom. Zeitg.*, V, 168, 10. (1844).

- pictipennis** Lw., *Stettin. entom. Zeitg.*, V, 168, 1. t. II, f. 26—29. Europacentr.
 (1844); SEMX., *F. A.*, I, 510. (1862); B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVII, t. VI, f. 135. (1889); PAND., *Rev. entom.*, XIV, 311. et mer.,
 (1895). Asia min.

Setulia

R.-D., *Posth.*, II, 124, IV. (1863).

Metopodia B. B., *Denkschr. Akad. Wien*, LVIII, 359. (1889)
 et LX, 168. (1893).

- algira** R.-D., *Posth.*, II, 128, 9. (1863). Algeria.
aurifrons R.-D. = **grisea** MEIG.
cerecidis R.-D. = **grisea** MEIG.
flavescens R.-D. = **grisea** MEIG.
grisea MEIG., S. B., IV, 230, 7. [*Millogramma*] (1824); Macq., *Suit. à Buff.*, II, 154, 5. [*Millogramma*] (1835); ZETT., *Dipt. Scand.*, XIII, 6148, 3—4. [*Millogramma*] (1859); R.-D., *Posth.*, II, 126, 4. (1863); BOXSÖ., *Finnl. Insekt.*, II, 107, 4. [*Millogramma*] (1866); PAND., *Rev. entom.*, XIV, 297, 17. [*Millogramma*] (1895); STEIS, *Entom. Nachricht.*, XXVI, 139. (1900); VILLEX., *Bull. Soc. entom. France*, 1900, 381, 5. (1900); SROBEJ., *Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg.*, XIV, 488. [*Millogramma*] (1902) et *Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg.*, IX, 548. [*Millogramma*] (1904).
aurifrons R.-D., *Posth.*, II, 125, 3. (1863).
cerecidis R.-D., *Posth.*, II, 124, 1. (1863).
flavescens R.-D., *Posth.*, II, 125, 2. (1863).
intricata MEIG., S. B., IV, 232, 12. [*Millogramma*] (1824); Macq., *Suit. à Buff.*, II, 155, 9. [*Millogramma*] (1835) et *Annal. Soc. entom. France*, (3), II, 421, 6, t. XIV, f. 18. [*Millogramma*] (1854); SEMX., *F. A.*, I, 505. [*Millogramma*]

- (1862): R.-D., Posth., II, 126, 5. (1863): VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900, 381, 6. (1900).
- incompta** MEG., S. B., VI, 366, 16. [*Millogramma*] (1830); SCHN., F. A., I, 508. [*Millogramma*] (1862); R.-D., Posth., II, 127, 6. (1863). Europa centr.
- intricata* MEG. - **grisea** MEG.
- melanura** MEG.^{*)}, S. B., IV, 232, 11. [*Millogramma*] (1824); MACQ., Suif. à Buff., II, 154, 8. [*Millogramma*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), II, 422, 7, t. XV, f. 18. [*Millogramma*] (1854); R.-D., Posth., II, 119, 10. [*Millogramma*] (1862); SREIB., Entom. Nachricht., XXVI, 143. (1900); VILLEX., Bull. Soc. entom. France, 1900, 381, 7. [*Metopodia*] (1900). Europa centr. et mer.

Araba

R.-D., Myod., 127, XV. (1830).

Eumetopia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 114. (1889)
nov WESTW., Rhynch.

agilis R.-D. = **fastuosa** MEG.

bifasciata B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 359. (1889); PAND., Rev. entom., XIV, 309. [*Metopia*] (1895). Asia min.

cluta PAND., Rev. entom., XIV, 309, II. [*Metopia*] (1895). Gallia mer.

✕ **fastuosa** MEG., S. B., IV, 370, 228, t. XII, f. 27. [*Tachina*] (1824) et VII, 248, 1. [*Metopia*] (1838); R.-D., Myod., 128, 1. (1830); MACQ., Suif. à Buff., II, 126, 12. [*Metopia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 437, 1, t. XIII, f. 1. [*Metopia*] (1850); ROUD., Dipt. ital. Prodr., III, 208, 2. [*Metopia*] (1859); SCHN., F. A., I, 499. [*Metopia*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, t. VI, f. 136. [*Eumetopia*] (1889) et LVIII, 359. (1891); PAND., Rev. entom., XIV, 308, 9. [*Metopia*] (1895). Europa centr. et mer.

agilis R.-D., Myod., 120, 1. [*Ophelia*] (1830) et Posth., II, 95, 1. [*Ophelia*] (1863); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII, 501, 13. (1899).

festiva R.-D., Myod., 121, 2. [*Ophelia*] (1830).

festiva R.-D. **fastuosa** MEG.

leucocephala JAESS., Abhandl. Senkenb. Ges., VI, 380, (72), 95. [*Baanhaueria*] (1867); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 210, 17. (1893). Aegyptus.

loeuples R.-D., Posth., II, 86, 6. [*Argyria*] (1863). Italia.

Mannii SCHN., ap. B. B. Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 359. (1891); PAND., Rev. entom., XIV, 309. [*Metopia*] (1895). Europa mer., Asia min.

Steinii SCHN., F. A., I, 498. [*Metopia*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 360. (1891); PAND., Rev. entom., XIV, 309, 10. [*Metopia*] (1895). Europa mer.

stelviana B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 360. (1891). Alpes.

^{*)} *Cerceris emarginata* LATR.

Metopia

MEIG., Illig. Magaz., III. 280. 107. (1863).

Anicia R.-D., Posth., II. 99. V. (1863).

Araba (R.-D. p. p.), RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 216. (1865).

Arabella R.-D., Posth., II. 88. III. (1863).

Argyrella R.-D., Posth., II. 87. II. (1863).

Argyria R.-D., Posth., II. 82. I. (1863), *nee* HEBB. 1816. Lep.

Ophelia R.-D., Myod., 120. IX. (1830), *nee* SAV. 1817. Verm.

anabilis MEIG. = *caepestris* FALL.

argentata MACQ.^{*)}, Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 442. 8. t. Europacentr.
XIII. f. 7. (1850); RONDI., Dipt. ital. Prodr., III. 209. 4. (1859); et mer.
SCHN., F. A., I. 500. (1862).

stizivora RONDI. in litt. ap. RONDI.

argyrocephala MEIG. = **leucocephala** ROSSI.

assimilis R.-D. = **leucocephala** ROSSI.

biseriata MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 440. 5. t. XIII. Gallia mer.
f. 4. (1850).

caesia R.-D. = **campestris** FALL.

campestris FALL., Dipt. succ. Muse., 8. 12. [*Tachina*] (1820); MEIG., Europa.
S. B., IV. 373. 231. [*Tachina*] (1824) et VII. 249. 5. (1830);

MACQ., Suit. à Buff., II. 124. 5. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2). VIII. 440. 4. t. XIII. f. 3. (1850); ZETT., Ins. Lapp., 635. 7. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III. 1028. [*Tachina*] (1844); WALK., Ins. Brit., II. 81. 142. [*Tachina*] (1853); SCHN., F. A., I. 499. (1862); R.-D., Posth., II. 96. 3. [*Ophelia*] (1863); BONSD., Fiml. Insekt., II. 52. 15. [*Tachina*] (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). III. 152. (1892); PASZ., Rev. entom., XIV. 306. 7. (1895).

anabilis MEIG., S. B., IV. 374. 232. [*Tachina*] (1824) et VII. 248. 4. [*Metopia*] (1838); ZETT., Ins. Lapp., 636. 10. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III. 1029. 19. [*Tachina*] (1844); WALK., Ins. Brit., II. 81. 141. [*Tachina*] (1853); SCHN., F. A., I. 500. (1862); R.-D., Posth., II. 99. 6. [*Ophelia*] (1863); BONSD., Fiml. Insekt., II. 52. 16. [*Tachina*] (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). III. 152. (1892); STEIX, Entom. Nachricht., XXVI. 131. (1900).

caesia R.-D., Posth., II. 96. 2. [*Ophelia*] (1863).

cincta R.-D., Myod., 121. 5. [*Ophelia*] (1830); BRACER, Sitz-
sgber. Akad. Wien, CVIII. 501. 15. (1899).

crassicornis PERR., Soc. Linn. Lyon, 1852. 63. (1852).

depressa R.-D., Posth., II. 98. 4. [*Ophelia*] (1863).

*) *Stizus repandus* PASZ.

flavescens MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 285, 5. (1834).

gracilis R.-D., Myod., 121, 3. [*Ophelia*] (1830).

lutescens R.-D., Myod., 121, 4. [*Ophelia*] (1830).

Staegeyi ROXB., Dipt. ital. Prodr., III, 210. (1859).

cinerea R.-D. = **campestris** FALL.

cinerella R.-D. = **leucocephala** ROSSI.

convexinervis MACQ., Annal. Soc. entom. France, (2), VIII, 441, 6. Sardinia.
t. XIII, f. 6. [*fourcineris*] (1850); ROXB., Dipt. ital. Prodr., III,
207, 1. (1859).

crassicornis PERR. = **campestris** FALL.

demissa R.-D. (*Lu.*) = **sabulosa** R.-D.

demissa R.-D. (*Oph.*) = **campestris** FALL.

dissimilis R.-D. = **leucocephala** ROSSI.

erratica MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), V, 109. [*Beachyonna*] Anglia.
(1894); AUSTEX, Entom. Monthly Mag., (2), IX, 38. (1898); MÜK.
Wien. entom. Zeitg., XVII, 61. (1898).

festinus R.-D. = **leucocephala** ROSSI.

flavescens MACQ. = **leucocephala** ROSSI.

?forficulae NEWP.?, Proc. Linn. Soc., II, 248. (1853); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 153. (1892).

gracilis R.-D. = **campestris** FALL.

grisea R.-D. = **leucocephala** ROSSI.

hilaris R.-D. = **leucocephala** ROSSI.

humilis R.-D. = **leucocephala** ROSSI.

insidiosa R.-D. = **sabulosa** R.-D.

jucosa R.-D. = **leucocephala** ROSSI.

labiata FABR. = **leucocephala** ROSSI.

lateralis MACQ. = **leucocephala** ROSSI.

leucocephala ROSSI**, Fauna otr., II, 306, 1591. [*Musca*] (1790); Europa.

PANZ., Fauna germ., LIV, 11. [*Musca*] (1798); LILLG., Fauna otr.

Ros.-i, II, 498, 1504. [*Musca*] (1807); FALC., Vet. Acad. Handl.,

XXXI, 270. [*Musca*] (1810) et Dipt. saec. Musc., 8, II. [*Tachina*]

(1820); MEIG., 8, B., IV, 371, 229. [*Tachina*] (1824); R.-D., Myod.,

130, 5. [*Araba*] (1830) et Posth., II, 81, 1. [*Argyria*] (1863);

MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 284, 1. (1834); SMIT. à BUFF., II, 126,

13, t. XIV, f. 13. (1835) et Annal. Soc. entom. France, (2), VIII,

438, 2, t. XIII, f. 2. (1850); ZETT., Ins. Lapp., 635, 5. [*Tachina*]

(1838) et Dipt. Scand., III, 1026, 16. (1844) et VIII, 3228, 16.

[*Tachina*] (1853); ROXB., Dipt. ital. Prodr., III, 208, 3. (1859);

SEHN., F. A., I, 499. (1862); BOSSQ., Fiml. Insekt., II, 51, 13.

[*Tachina*] (1866); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 151.

(1892); B. B., Denkschr. A. ad. Wien, LVI, t. VI, f. 137. (1899);

PANZ., Rev. entom., XIV, 107, 8. (1895); COQUILL., Rev. Tachin.

*?) Forficula sp.: an in gen. *Dipnochaeta* locanda?

**?) *Bombex* rostrata LATR., *Haliectus* sexcinctus F., *Philanthus* triangulum FABR.

N. Amer., 127. (1897); RIEDL, *Allgem. Zeitschr. f. Entom.*, 1901. 152. (1901).

aeqyrocephala MEG., S. B., IV. 372. 230. [*Tachina*] (1824) et VII. 248. 3. t. LXXI. f. 26—30. (1838); R.-D., *Myod.*, 129. 3. [*Araba*] (1830) et *Posth.*, II. 89. 1. [*Arabella*] (1863); Macq., *Soc. Sci. Lille*, 1833. 284. 2. (1834), *Suit. à Buff.*, II. 126. 13. (1835) et *Annal. Soc. entom. France*, (2). VIII. 439. 3. 4. XIII. f. 2. (1850); ZETT., *Ins. Lapp.*, 635. 6. [*Tachina*] (1838) et *Dipt. Scand.*, III. 1028. 17. [*Tachina*] (1844); SEMX., F. A., I. 500. (1862); BOXSÖ., *Finnl. Insekt.*, II. 51. 14. [*Tachina*] (1866); MEADE, *Entom. Monthly Mag.*, (2). III. 151. (1892); STEIN, *Entom. Nachricht.*, XXVI. 132. (1900).

assimilis R.-D., *Myod.*, 130. 7 [*Araba*] (1830) et *Posth.*, II. 91. 3. [*Arabella*] (1863).

cincurella R.-D., *Posth.*, II. 91. 4. [*Arabella*] (1863).

dissimilis R.-D., *Posth.*, II. 87. 1. [*Aegyrella*] (1863).

festinans R.-D., *Posth.*, II. 88. 2. [*Argyrella*] (1863).

grisea R.-D., *Myod.*, 131. 9. [*Araba*] (1830).

hilaris R.-D., *Posth.*, II. 85. 3. [*Argyria*] (1863).

humilis R.-D., *Posth.*, II. 85. 4. [*Argyria*] (1863).

jacosa R.-D., *Posth.*, II. 92. 7. [*Arabella*] (1863).

?*labiata* FABR., *Entom. syst.*, IV. 329. 74. [*Musca*] (1794) et *Syst. Anil.*, 304. 100. [*Musca*] (1805); VILL., *Entom. linn.*, III. 532. 323. [*Musca*] (1789).

lateralis Macq., *Dipt. exot. Suppl.*, III. 208. (48). [*Degeeria*] (1847).

Luggeri TYL.-TOWNS., *Canad. Entom.*, XXIV. 69. (1892).

minuta R.-D., *Myod.*, 130. 4. [*Araba*] (1830) et *Posth.*, II. 86. 5. [*Argyria*] (1863); Macq., *Soc. Sci. Lille*, 1833. 285. 4. (1834).

obscura R.-D., *Myod.*, 130. 6. [*Araba*] (1830) et *Posth.*, II. 90. 2. [*Arabella*] (1863).

Philaethi R.-D., *Myod.*, 129. 2. [*Araba*] (1830) et *Posth.*, II. 85. 2. [*Argyria*] (1863); Macq., *Soc. Sci. Lille*, 1833. 284. 3. (1834); BRAUER, *Denkschr. Akad. Wien*, CVIII. 501. 14. (1899).

Roseri RONDI., *Dipt. ital. Prodr.*, III. 210. (1859).

ruralis R.-D., *Posth.*, II. 93. 8. [*Arabella*] (1863).

squamipallens R.-D., *Myod.*, 130. 8. [*Araba*] (1830) et *Posth.*, II. 91. 5. [*Arabella*] (1863).

vigilans R.-D., *Posth.*, II. 92. 6. [*Arabella*] (1863).

Luggeri TYL.-TOWNS. **leucocephala** ROSSI.

lutescens R.-D. = **campestris** FALL.

minuta R.-D. = **leucocephala** ROSSI.

muricola R.-D. = **sabulosa** R.-D.

obscura R.-D. **leucocephala** ROSSI.

obscurella ZETT., *Dipt. Scand.*, XII. 4689. 19—20. (1855) et XIII. 6078. 19—20. [*Tachina*] (1859); BOXSÖ., *Finnl. Insekt.*, II. 52. 17. [*Tachina*] (1866).

Scandinavia.

- palliceps** Big., *Annal. Soc. entom. France*, (6), I, 367. (1881). Gallia.
perfida Meig., *S. B.*, IV, 387, 256. [*Tachina*] (1824) et VII, 249, 6. (1838). Germania.
philanthi R.-D. = **leucocephala** Rossi.
pilicornis Pand., *Rev. entom.*, XIV, 304, 3. (1895). Gallia mer.
Roseri R.-D. = **leucocephala** Rossi.
rubricornis Macq., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VIII, 442, 9, 4. Gallia mer.
 XIII, I, 8. (1850); Brauer, *Sitzgsber. Akad. Wien*, CVIII, 501, 12. (1899).
ruralis R.-D. = **leucocephala** Rossi.
sabulosa R.-D., *Posth.*, II, 99, 1. [*Anicia*] (1863). Gallia.
demissa R.-D., *Posth.*, II, 100, 3. [*Anicia*] (1863).
insidiosa R.-D., *Posth.*, II, 100, 2. [*Anicia*] (1863).
maricola R.-D., *Posth.*, II, 101, 4. [*Anicia*] (1863).
sinuata Macq., *Annal. Soc. entom. France*, (2), VIII, 441, 7, 1. XIII, Gallia.
 I, 5. (1850).
squamipallens R.-D. = **leucocephala** Rossi.
Staegei Rond. = **campestris** Fall.
vigilans R.-D. = **leucocephala** Rossi.*)

Phrosinella

R.-D., *Posth.*, II, 82. (1863).

Phrosina R.-D., *Posth.*, II, 101, IV, (1863), nec Risso 1830, Crust.

argyrina R.-D. = **nasuta** Meig.

- nasuta** Meig., *S. B.*, IV, 374, 233. [*Tachina*] (1824) et VII, 249, 8. Europacentr.
 [*Metopia*] (1838); Macq., *Suit. à Buff.*, II, 127, 15. [*Metopia*] et mer.
 (1835); R.-D., *Posth.*, II, 90, *nata*. [*Arabella*] (1863); Stein, *Entom.*
Nachricht., XXVI, 144. (1900).
argyrina R.-D., *Posth.*, II, 102, 1. [*Phrosina*] (1863); Pand.,
Rev. entom., XIV, 306, 6. [*Metopia*] (1895).

Hilarella

Rond., *Dipt. ital. Prodr.*, I, 79, 37. (1856) et III, 212, 37. (1859).

Entaeronychia Tyl.-Townsend., *Trans. amer. entom. Soc.*, XIX, 98. (1892).

Gynnaoprosopa Tyl.-Townsend., *Trans. amer. entom. Soc.*, XIX, 108. (1892).

Misellia R.-D., *Posth.*, II, 116, VIII. (1863).

brunnica R.-D. = **dira** R.-D.

- dira** R.-D. 1, *Myod.*, 95, 1. [*Megacra*] (1830) et *Posth.*, II, 117, 1. Europa.

*) *aurifrons* R.-D., *Posth.*, II, 98, 5. [*Ophelia*] (1863), species Americae meridionalis videtur.

*) *Annulophila sabulosa* Scop.

- [Misellia]* (1863): PAND., Rev. entom., XIV. 312. 1. [*Heteropterina*] (1895).
brannicosa R.-D., Posth., II. 148. 2. [*Misellia*] (1863).
siphonina ZETT., Dipt. Scand., III. 1213. 15. (1844), VIII. 3255. 15. (1849), XII. 4704. 15. (1850) et XIII. 6154. 15. [*Milto-*
gramma] (1859); SCHN., F. A., I. 504. (1862): R.-D., Posth.,
 II. 148. 3. [*Misellia*] (1863): B. B., Denkschr. Akad. Wien,
 LXI. 556. (1894): COQUILL., Rev. Tachin. N. Amer., 129.
 (1897).
- hilarella** ZETT., Dipt. Scand., III. 1212. 14. (1844) et XIII. 6154. 14. Europa.
[Milto-
gramma] (1859); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 108. 8. [*Milto-*
gramma] (1866): PAND., Rev. entom., XIV. 312. [*Heteropterina*]
 (1895).
Zetterstedti ROND., Dipt. ital. Prodr., I. 70. (1856) et III. 213.
 (1859); SCHN., F. A., I. 504. (1862): B. B., Denkschr. Akad.
 Wien. LVI. t. VI. f. 133. (1889).
- italica* ROND. = **stictica** MEIG.
- plumicornis** ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6153. 13—14. [*Milto-*
gramma] Scandinavia.
 (1859).
- siphonina* ZETT. = **dira** R.-D.
- stictica** MEIG., S. B., VI. 367. 17. [*Milto-*
gramma] (1824); SCHN., F. Europa centr.
 A., I. 503. [*Heteropterina*] (1862): R.-D., Posth., II. 145. 6. et mer.
[Megaera] (1863): PAND., Rev. entom., XIV. 313. [*Heteropterina*]
 (1895); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900. 381. 4. (1900).
italica ROND., Dipt. ital. Prodr., III. 213. 1. (1859).
Zetterstedti ROND. = **hilarella** ZETT.

Epolia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 113. (1889) et LX. 168. (1893).

velox B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 166. t. VI. f. 131. (1889). Arabia.

Paragusia

SCHN., Wien. entom. Monatschr., V. 143. (1861).

- elegantula** ZETT., Dipt. Scand., III. 1024. 13. [*Tachina*] (1844); SCHN., Europa.
 F. A., I. 509. [*Apodavra*] (1862); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 50.
 10. [*Tachina*] (1866); WCLP, Entom. Tijdschr., (2). IV. 151.
 (1869); SIXTEN., Wien. entom. Zeitg., VI. 259. (1887); B. B.,
 Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 132. (1889); PAND., Rev.
 entom., XIV. 289. [*Milto-*
gramma] (1895).
Fricaldzki SCHN., F. A., I. 500. (1862); PAND., Rev. entom.,
 XIV. 310. (1895).
Fricaldzki SCHN. = **elegantula** ZETT.

Mesomelaena

ROSD., Dipt. ital. Prodr., III, 206, *nota*, (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 216.
[*Mesomelena*] (1865).

Winnertzia SCHN., Wien. entom. Monatschr., V, 142, (1861),
nee ROSD. 1860, Dipt.

Loewii ROSD. = **mesomelaena** Lw.

mesomelaena Lw., Stettin. entom. Zeitg., IX, 377, [*Metopia*] (1848): Europa centr.
SCHN., F. A., I, 501, [*Winnertzia*] (1862): PAND., Rev. entom., et mer.
XIV, 310, [*Winnertzia*] (1895).

Loewii ROSD., Dipt. ital. Prodr., III, 206, *nota*, (1859): B. B.,
Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. VI, f. 134, [*Winnertzia*] (1889).

Sphecapata

ROSD., Dipt. ital. Prodr., III, 221, [*Sphicapata*] (1859), *em.* BEZZI 1906.

Megaera R.-D., Myod., 94, II, (1830), *nee* TEMM. Aves. ¹²

albifrons ROSD. = **conica** FALL.

angustifrons MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 252, (116), 6, [*Megaera*] Gallia.
(1834): MEIG., S. B., VII, 236, 30, [*Millogramma*] (1838): R.-D.,
Posth., II, 143, (1863).

atrox R.-D. = **conica** FALL.

cinerella R.-D. = **conica** FALL.

conica FALL.*), Vet. Akad. Handl., XXXI, 270, [*Tachina*] (1810) et Europa.
Dipt. suec. Muse., 19, 14, [*Tachina*] (1820): MEIG., S. B., IV,
232, 13, [*Millogramma*] (1824): MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 250,
1, [*Megaera*] (1834), Suit. à Buff., II, 155, 12, [*Millogramma*]
(1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), II, 424, 12, [*Milto-*
gramma] (1854): SIEB., Observ. Erlangae, 15, [*Millogramma*]
(1841): ZETT., Dipt. Scand., III, 1206, 7, (1844), VIII, 3254, 7,
(1849) et XI, 4317, 7, [*Millogramma*] (1855): DAHLB., Acta Holm.,
1850, 162, [*Millogramma*] (1850): WALK., Ins. Brit., II, 40, 47,
[*Tachina*] (1853): ROSD., Dipt. ital. Prodr., III, 226, 5, (1859):
SCHN., F. A., I, 505, [*Millogramma*] (1862): R.-D., Posth., II,
143, 1, [*Megaera*] (1863): BOSSD., Fennl. Insekt., II, 107, 6, [*Milto-*
gramma] (1866): BRUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII, 77,
[*Millogramma*] (1883): FABRE, Souv. entom., I, [*Millogramma*]
(1880): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. VII, f. 138, (1889):
MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 77, [*Millogramma*] (1892):
PAND., Rev. entom., XIV, 299, 20, [*Millogramma*] (1895): VULLEN,
Bull. Soc. entom. France, 1900, 381, 15, (1900).

albifrons ROSD., Dipt. ital. Prodr., III, 225, 4, (1859).

atrox R.-D., Myod., 95, 2, [*Megaera*] (1830).

*) *Oxybelus uniglumis* F., *Philanthus apivorus* L.

- cinctella* R.-D., Posth., II, 144, 4. [*Megacera*] (1863).
- crudeleis* R.-D., Myod., 95, 3. [*Megacera*] (1830) et Posth., II, 144, 3. [*Megacera*] (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 250, (114), 2, t. IV, f. 4. [*Megacera*] (1833); MEIG., S. B., VII, 235, 27. [*Millogramma*] (1838).
- fulvipalpis* R.-D., Posth., II, 144, 2. [*Megacera*] (1863).
- imberbis* ZETT., Ins. Lapp., 636, 9. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., III, 1205, 5, (1844), VIII, 3254, 5, (1840) et XIII, 6149, 5. [*Millogramma*] (1859); BOSSQ., Finl. Insekt., II, 107, 5. [*Millogramma*] (1866).
- inimica* R.-D., Myod., 96, 5. [*Megacera*] (1830) et Posth., II, 145, 5. [*Megacera*] (1863); Macq., Suit. à Buff., II, 155, 13. [*Megacera*] (1835); MEIG., S. B., VII, 235, 26. [*Millogramma*] (1838).
- pygmaea* ROND., Dipt. ital. Prodr., III, 227, 6. (1859).
- quadrinotata* Macq. (nec MEIG.), Suit. à Buff., II, 155, 14. [*Millogramma*] (1835).
- convergens** PAND., Rev. entom., XIV, 298, 8. [*Millogramma*] (1895). Gallia mer.
- convexula** ZETT., Ins. Lapp., 638, 21. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scandinavia.
Scand., III, 1208, 9. [*Millogramma*] (1844).
- crudeleis* R.-D. = **conica** FALL.
- erythrochaeta** BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXVII, 59. (1895). Italia mer.
- fasciata** MEIG., S. B., IV, 227, t. t. XI, f. 26. [*Millogramma*] (1824); Gallia mer.
? GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX, (2), 186, 1. [*Millogramma*] (1847); R.-D., Posth., II, 119, 9. [*Millogramma*] (1863); PAND., Rev. entom., XIV, 296, 15. [*Millogramma*] (1895); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 136. (1900).
- fasciolella** ZETT., Dipt. Scand., III, 1206, 6. [*Millogramma*] (1844). Scandinavia.
- fera** R.-D., Myod., 95, 4. [*Megacera*] (1830). Gallia.
- fulvipalpis* R.-D. = **conica** FALL.
- imberbis* ZETT. = **conica** FALL.
- ineurva** Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 250, (114), 3. [*Megacera*] (1834); Gallia.
MEIG., S. B., VII, 235, 28. [*Millogramma*] (1838); R.-D., Posth., II, 143. (1863).
- inimica* R.-D. = **conica** FALL.
- interrupta** Macq., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 420, 4, t. XIV, f. 17. [*Millogramma*] (1854). Europacentr.
- intricata* ROND. = **penicillaris** ROND.
- lineolata* ROND. = **tricuspis** MEIG.
- maculosa** ROND., Dipt. ital. Prodr., III, 227, 7. (1859); BRACER, Italia.
Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII, 502, 20. (1899).
- melanura** ROND. (nec MEIG.), Dipt. ital. Prodr., III, 224, 2. (1859); Europa mer.
B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 222. (1893).
- minuta** FALL., Vet. Acad. Handl., XXXI, 275. [*Tachina*] (1810) et Dipt. suec. Musc., 9, 15. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV, 407, 292. [*Tachina*] (1824); ZETT., Dipt. Scand., III, 1209, 11. (1844) et XIII, 6, 152, 11. [*Millogramma*] (1859).
- nitida** Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 251, (115), 4. [*Megacera*] (1834); Europacentr.

- MEIG., S. B., VII, 235, 29. [*Millogramma*] (1838); R.-D., Posth., II, 143. (1863).
- nitidula** BIGOT, Annal. Soc. entom. France, (6), I, 367. (1881). Gallia.
- pelopei** ROXD.*, Dipt. ital. Prodr., III, 228, 8. (1859). Italia.
- penicillaris** ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 216. (1865). Italia.
intricata ROXD. *ovae* MEIG., Dipt. ital. Prodr., III, 222, 1. (1859).
- puncticornis** ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6149, 6-7. [*Millogramma*] Scandinavia.
(1859).
- pygmaea* ROXD. **conica** FALL.
- quadrinotata* MACQ. - **conica** FALL.
- strenua* PERR. **tricuspis** MEIG.
- tricuspis** MEIG., S. B., VII, 234, 19. [*Millogramma*] (1838); VILLEX., Europacentr.
Bull. Soc. entom. France, 1900, 381, 13. (1900). et mer.
lineolata ROXD., Dipt. ital. Prodr., III, 225, 3. (1859).
strenua PERR., Mém. Soc. Linn. Lyon, 1852, 65. [*Millogramma*]
(1852); PAND., Rev. entom., XIV, 300, 21. [*Millogramma*]
(1895).

Heteropterina

- MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 426. (1854).
- Elpigia* R.-D., Posth., II, 149, IX. (1863).
- Metopilla* ROXD. in litt. ap. ROXD.
- Tarigramma* MACQ., p. p., Annal. Soc. entom. France, (2), VII, 359. (1849).
- heteroneura** MEIG., S. B., VI, 367, 18. [*Millogramma*] (1830); ZETT., Europa.
Dipt. Scand., III, 1214, 16. [*Millogramma*] (1844); MACQ., Annal.
Soc. entom. France, (3), II, 427, 1, 3, XV, f. 2. (1854); SCHN.,
F. A., I, 503. (1862); R.-D., Posth., II, 151, 4. [*Elpigia*] (1863);
BOXS., Finsl. Insekt., II, 108, 9. [*Millogramma*] (1866); PAND.,
Rev. entom., XIV, 313, 5. (1895); VILLEX., Bull. Soc. entom.
France, 1900, 381, 17. (1900).
minuta R.-D., Posth., II, 151, 3. [*Elpigia*] (1863).
pellucida R.-D., Posth., II, 150, 1. [*Elpigia*] (1863).
pipicus PERR., Soc. Linn. Lyon, 1852, 65. [*Tarigramma*] (1852);
PAND., Rev. entom., 313, 4. (1895).
punctata R.-D., Posth., II, 150, 2. [*Elpigia*] (1830).
minuta R.-D. **heteroneura** MEIG.
- multipunctata** ROXD., Dipt. ital. Prodr., III, 211, 1. (1859); SCHN., Europacentr.
F. A., I, 503. (1862); B. B., Denkschg. Akad. Wien, LVI, t. VI. et mer.
f. 130. (1889); PAND., Rev. entom., XIV, 313, 3. (1895).
- pellucida* R.-D. **heteroneura** MEIG.
- pipicus* PERR. **heteroneura** MEIG.
- pluriseta** PAND., Rev. entom., XIV, 313, 2. (1895). Gallia mer.
- punctata* R.-D. **heteroneura** MEIG.
- pusilla** ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6155, 17. [*Millogramma*] (1859). Scandinavia.

*) *Pelopous spirifex* F.

Arrhenopus

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 360. (1891) et LX, 170. [*Arrhenopus*] (1893). *em.*
piligena ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 217. [*Sph'cecapala*] (1865). Europaentr.
 et mer.

Brachymera

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 116. (1889) et LX, 170. (1893).

Letochai MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV, 343. t. VII, f. 25—26. [*Pachystylum*] (1874), Wien. entom. Zeitg., X, 212. 2. Europaentr.
 (1891) et XVIII, 208, 89. (1899); B. B., Denkschr. Akad. Wien,
 LVI, t. VII, f. 140. [*Letochae*] (1889).

Parabrachymera

MIK, Wien. entom. Zeitg., X, 212. *nola*. (1891).

rugosa MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII, 1239. II. [*Pachystylum*] Europaentr.
 (1863), Wien. entom. Zeitg., X, 212. 1. (1891) et XVIII, 208, 89.
 (1899).

Rhaphiochaeta

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 116. (1889) et LX, 170. (1893).

breviseta ZETT., Ins. Lapp., 645. 49. [*Tachina*] (1838) et Dipt. Scand., Europaentr.
 III, 1137. 135. [*Tachina*] (1844); SCHIX., F. A., I, 450. [*Nemoracaj*] et sept.
 (1862).

Pachyophthalmus

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 117. (1889) et LX, 170. (1893).

anomalus ZETT. = **signatus** MEIG.

aurifrons TYL.-TOWNS. = **signatus** MEIG.

✓ 1 **signatus** MEIG. (*), S. B., IV, 303. 111. [*Tachina*] (1824) et VII, 233. Europaentr.
 22. [*Millogramma*] (1838); SCHIX., F. A., I, 502. [*Macronychia*] et mer.
 (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. VII, f. 145. (1889)
 et LXI, 620. (1894); PASD., Rev. entom., XIV, 298. 19. [*Milto-*
gramma] (1895); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 149. (1900);
 VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 381. 3. (1900).

anomalus ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6074. 11—12. [*Tachina*]
 (1859); ? GER., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII, 1251. [*Ta-*
china] (1863).

aurifrons TYL.-TOWNS., Trans. amer. entom. Soc., XVIII, 354.
 (1891).

*) *Cemonus* sp.

Paramacronychia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 116. (1889) et LX, 171. (1893).

flavipalpis GIBSCH., Entom. Nachricht., VII, 279. H. f. H. [*Macronychia*] (1881); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. VII, f. 142. (1889). Europacentr. et mer.

Meyer-Dürrii SCHN. in coll. DUF. [*Macronychia*].

Macronychia

ROND., Dipt. ital. Prodr., III, 229. (1859).

Annobia R.-D., Myod., 96, III. [*Annobia*] (1830), *see* BILLB. 1820. Hym.

Moschusa R.-D., Posth., II, 139, VI. (1863).

Theone R.-D., Posth., II, 401, XXI. (1863).

agrestis FALL., Vet. Acad. Handl., XXXI, 270. [*Tachina*] (1810) et Dipt. suec. Muse., 6, 7. [*Tachina*] (1820); ZETT., Dipt. Scand., III, 1022, 11. (1844), VIII, 3227, 11. (1849) et XI, 4313, 11. [*Tachina*] (1855); BOSSD., Fiml. Insekt., II, 49, 8. [*Tachina*] (1866); PAND., Rev. entom., XIV, 300. (1895). Europa sept.

agrestis MEIG. = **conica** R.-D.

agrestis ROND. = **ungulans** PAND.

alpestris ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 218. (1865). Alpes.

ardeacea R.-D. = **conica** R.-D.

aurifacies R.-D. = **conica** R.-D.

biciliata R.-D. = **conica** R.-D.

cinerca R.-D. = **conica** R.-D.

cincereifrons R.-D. = **conica** R.-D.

conica R.-D.^{*)}, Myod., 96, I. [*Annobia*] (1830) et Posth., II, 131, I. [*Annobia*] (1863). Europacentr. et mer.

agrestis MEIG. (*see* FALL.), S. B., IV, 302, 110. [*Tachina*] (1824) et VII, 233, 21. [*MiltoGRAMMA*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II, 143, 16. [*Tachina*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), II, 492, 6, t. XIV, f. 6. [*Oodigaster*] (1854); SCHN., F. A., I, 502. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, t. VII, f. 146. (1889); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 93. (1892); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 380, 3. (1900).

ardeacea R.-D., Posth., II, 132, 3. [*Annobia*] (1863).

aurifacies R.-D., Posth., II, 138, 16. [*Annobia*] (1863).

biciliata R.-D., Posth., II, 137, 15. [*Annobia*] (1863).

cinerca R.-D., Posth., II, 132, 2. [*Annobia*] (1863).

cincereifrons R.-D., Posth., II, 133, 7. [*Annobia*] (1863).

^{*)} *Odynerus parietum* L., *Polistes gallicus* F.

- despecta* R.-D., Posth., II, 135, 9. [*Ammobia*] (1863).
dumosa PAND., Rev. entom., XIV, 301, 24. [*Millogramma*] (1895).
flavicans R.-D., Posth., II, 136, 11. [*Ammobia*] (1863).
fugitiva R.-D., Posth., II, 133, 5. [*Ammobia*] (1863).
hortulana R.-D., Posth., II, 136, 12. [*Ammobia*] (1863).
incana R.-D., Posth., II, 135, 10. [*Ammobia*] (1863).
lacta R.-D., Posth., II, 133, 6. [*Ammobia*] (1863).
nigra Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 251, (115), 5. [*Megacra*]
 (1834); MEIG., S. B., VII, 234, 25. [*Millogramma*] (1838).
obliquata R.-D., Posth., II, 132, 4. [*Ammobia*] (1863).
Odyneri R.-D., Bull. Soc. Yonne, VII, 535. [*Ammobia*] (1853)
 et Posth., II, 134, 8. [*Ammobia*] (1863).
perris R.-D., Posth., II, 137, 14. [*Ammobia*] (1863).
praecox R.-D., Posth., II, 138, 17. [*Ammobia*] (1863).
virida R.-D., Posth., II, 136, 13. [*Ammobia*] (1863).

despecta R.-D. = **conica** R.-D.

dumosa PAND. = **conica** R.-D.

flavicans R.-D. = **conica** R.-D.

fugitiva R.-D. = **conica** R.-D.

griseola FALL., Dipt. succ. Muse., 10, 16. [*Tachina*] (1820); MEIG., S. B., IV, 347, 188. (1824) et VII, 191, 58. [*Tachina*] (1838); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 222. (1893); STEIN, Entom. Nachricht., XIV, 216, 77. (1888).

Europacentr.
et sept.

viatica MEIG., S. B., IV, 321, 141. (1824) et VII, 191, 51. [*Tachina*] (1838).

hortulana R.-D. = **conica** R.-D.

incana R.-D. = **conica** R.-D.

lacta R.-D. = **conica** R.-D.

nigra Macq. = **conica** R.-D.

obliquata R.-D. = **conica** R.-D.

Odyneri R.-D. = **conica** R.-D.

perris R.-D. = **conica** R.-D.

polyodon MEIG.)*, S. B., IV, 302, 109. [*Tachina*] (1824) et VII, 233, 23. [*Millogramma*] (1838); Macq., Smit. à Buff., II, 143, 15. [*Tachina*] (1835); SCHN., F. A., I, 502. (1862); R.-D., Posth., II, 140, 1. [*Moschusa*] (1863); RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 218. (1865); SICKM., Jahresb. Nat. Ver. Osnabrück, 1885, 185. (1885); PAND., Rev. entom., XIV, 300, 22. [*Millogramma*] (1895); BEAUCER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII, 502, 22. (1899); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 146. (1900); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 380, 1. (1900).

Europacentr.
et mer.

silvestris RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 218. (1865);

STEIN, Entom. Nachricht., XIV, 216, 76. (1888); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 443. (1891) et LX, 219. (1893).

trifaria R.-D., Posth., II, 402, 1. [*Theone*] (1863); B. B., Denk-

*) *Bombus terrestris* L.

schw. Akad. Wien, LVIII, 441, (1891); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII, 502, 23, (1899).

villana R.-D., Posth., II, 402, 2, [*Theone*] (1863).

praecox R.-D. — **conica** R.-D.

silvestris Rond. — **polyodon** Meig.

vifaria R.-D. — **polyodon** Meig.

ungulus PASD., Rev. entom., XIV, 301, 23, [*Millogramma*] (1895). Europa mer.

agrestis Rond. (*nee* FALL., *nee* MEIG.), Dipt. ital. Prodr., III, 230, 1, (1859) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 217, (1865).

ciatica Meig. — **griseola** Fall.

villana R.-D. — **polyodon** Meig.

civida R.-D. — **conica** R.-D.

Calliphorinae.

Rhynchomyia

R.-D., Myod., 424, XXVI, (1830).

audax Rond., Dipt. ital. Prodr., IV, 71, 2, (1861).

Italia.

callopis Lw., N. Beitr., IV, 49, 44, [*Idia*] (1856).

Europa mer.

colombina Meig. — **impavida** Rossi.

concinna Germ. — **impavida** Rossi.

cuprea Bic., Annal. Soc. entom. France, (5), IV, 241, 1, (1874); Hispania.

BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII, 514, 80, (1899).

cyanescens Lw., Stettin. entom. Zeitg., V, 24, 4, [*Idia*] (1844) et Europa mer.,

Wien. entom. Monatschr., VI, 172, 54, [*Idia*] (1862); Schm., F. Asia min.

A., I, 580, (1862).

fulviceps Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V, 8, [*Oncsia*] (1855).

felina R.-D. — **ruficeps** Fabr.

fulviceps Egg. — **cyanescens** Lw.

impavida Rossi, Fauna etc., II, 304, 1501, [*Musca*] (1790); Italia, Europa mer.,

Fauna etc. Rossi, II, 466, 1501, [*Musca*] (1807); Rond., Dipt. Asia min.

ital., Prodr., IV, 70, 1, (1861); PASD., Rev. entom., XV, 96, 2,

(1896).

colombina Meig., S. B., IV, 319, 138, (1824) et VII, 191, 66.

[*Tachina*] (1838); Macq., Suit. à Buff., II, 248, 2, (1835);

Duf., Annal. Soc. entom. France, (2), IV, 327, 1, IX, (2), f.

1-6, (1846); Schm., F. A., I, 380, (1861); Perr., Annal.

Soc. entom. France, (4), X, 340, (1870).

concinna Germ., Fauna ins. europ., X, 21, [*Musca*] (1821); Lw.,

Stettin. entom. Zeitg., V, 20, 2, [*Idia*] (1844).

punctata G. Costa ap. O. G. Costa, Atti Accad. Sci. Napoli,

V, (2), 106, 1, H. f. 6, [*Idia*] (1841) (1835).

punctata G. Costa — **impavida** Rossi.

ruficeps Fabr., Syst. Anth., 299, 77, [*Musca*] (1805); Meig., S. B., Europa mer.

IV, 319, 137, (1814) et VII, 191, 65, [*Tachina*] (1838); Macq.,

Suit. à Buff., II, 247, t. t. XVI, l. 10, (1835); Rond., Dipt. ital. Prodr., IV, 78, 3, (1861); Scun., F. A., I, 581, (1862); PAND., Rev. entom., XV, 96, I, (1896).

felina R.-D., Myod., 224, I, (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 809, [*Idia*] (1849).

speciosa Lw., Steffin. entom. Zeitg., V, 23, 3, [*Idia*] (1844); Scun., F. A., I, 581, (1862). Europa mer., Asia min.

viridescens GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX, (3), 186, I, [*Gonia*] (1847); PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI, 145, (1882); Kow., Wien. entom. Zeitg., VII, 17, *nota*, (1888).

viridescens GIMM. = **speciosa** Lw.

Metallea

WILF., Entom. Tijdschr., XXIII, 174, (1880).

dispar B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 418, [*Rhyrchomyia*] (1891) et LX, 221, (1893); BRACER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 509, (1898). Aegyptus.

Strongyloneura

BIG., Bull. Soc. entom. France, 1886, ~~XI~~^{XIV}, (1886).

prasina BIG., Bull. Soc. entom. France, 1886, ~~XI~~^{XIV}, (1886). Japonia.

Gymnostylina

MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 736—37, (1854) et (3), III, 25, (1855).

?*Stomina* R.-D., Myod., 411, XIX, (1830).

nitida MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 25, t. f. f. 6, (1855); Scun., F. A., I, 581, (1862). Gallia.

rubicornis R.-D., Myod., 411, I, [*Stomina*] (1830) et Posth., II, 655, I, [*Stomina*] (1863). Gallia.

Idiopsis

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 153, (1889) et LX, 177, (1893).

prasina B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 171, (1889). Sicilia, Aegyptus.

Arrhinidia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 390, (1891) et LX, 177, (1893).

aberrans Scun., Novara Dipt., 316, 72, [*Rhyrchomyia*] (1868). China sept.

Stomatorrhina

RODÉ, Dipt. ital. Prodr., IV, 9, (1861) et V, 226. [*Stomatorrhina*] (1862) *em.*

Idia MEIG., S. B., V, 9, 102, (1826), *nov.* LAM., 1816, Pol.

cinerea R.-D. — **lunata** FABR.

fasciata MEIG. — **lunata** FABR.

lunata FABR.*, Syst. Antl., 292, 44. [*Musca*] (1805); WIED., Nov. Europa, Dipt. genera, 23. [*Idia*] (1820) et Ausser, zweifl. Ins., II, 351, Asia min., 6. [*Idia*] (1830); LW., Stettin. entom. Zeitg., V, 19, 1. [*Idia*] Madeira, (1844); SCHM., F. A., I, 579. [*Idia*] (1862) et Novara Dipt., 309, 52. [*Idia*] (1868); PORTSCH., Paras. criquets nuis. [*Idia*] (1894); PAND., Rev. entom., XV, 149. [*Idia*] (1896).

cinerea R.-D., Myod., 422, 7. [*Idia*] (1830).

fasciata MEIG., S. B., V, 9, 1, 1, XLII, f. 14 — 17. [*Idia*] (1826);

R.-D., Myod., 422, 6. [*Idia*] (1830) et Posth., II, 685, 1. [*Idia*]

(1863); MAQU., Soc. Sci. Lille, 1833, 169, 1, t. I, f. 9. [*Idia*]

(1834) et Suit. à Buff., II, 246, 1, t. XVI, f. 9. [*Idia*] (1835);

O. G. COSTA, Atti Accad. Sci. Napoli, V, (2), 106, 10. [*Idia*]

(1835, 1844); BLANCH., Hist. nat. Ins., III, 615. [*Idia*] (1840);

NYL., Notiser, 296. [*Idia*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., XII,

4713, 1. [*Idia*] (1855); RODÉ, Dipt. ital. Prodr., V, 226, 1,

(1862) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 228, (1865); BOSSD.,

Finnl. Insekt., II, 152, 1. [*Idia*] (1866).

maculata RODÉ, Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 228, (1865).

maculata RODÉ. — **lunata** FABR.

obsoleta WIED., Ausser, zweifl. Ins., II, 355. [*Idia*] (1830); COQUILL., Japonia, Proc. Unit. Stat. Museum, XXI, 333, (1898). China.

Idiella

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 154, (1889) et LX, 177, (1893).

mandarina WIED., Ausser, zweifl. Ins., II, 350, 4. [*Idia*] (1830); China,

WIELE, Tijdschr. entom., XXIII, 171, 28. [*Idia*] (1886) et Dipt.

Sum. Exped., II, 1. [*Idia*] (1881).

xanthogastra WIED., N. Dipt. Gen., 22. [*Idia*] (1820) et Ausser, Arabia,

zweifl. Ins., II, 349, 2. [*Idia*] (1830); R.-D., Myod., 420, 1. [*Idia*]

(1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 807. [*Idia*] (1849) et

Entom., V, 341, 79. [*Idia*] (1870); OST-SACK., Ann. Mus. civ.

Genova, XVI, 118. [*Idia*] (1881); B. B., Denkschr. Akad. Wien,

LXIII, 443, (1891).

*) *Schistocerca peregrina* OL. (= *Sphex* et *Tachytes* praed.)

Rhinia

R.-D., Myod., 422. XXIV. (1830).

- apicalis** WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 354. 10. [*Idia*] (1870); MACQ., Ins. Canar. Hist. Can. Webb, Ent., I. 114. 72. [*Idia*] (1833) et Dipt. exot., III. 280. (123). 1. [*Idia*] (1843); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 218. [*Idia*] (1891) et LX. 219. (1893).
- testacea** R.-D., Myod., 423. I. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 246. China. 3. (1835); SCHN., Novara Dipt., 310. 56. (1868). = *luteola* FABR.

Auchmeromyia

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 391. (1891) et LX. 178. (1893); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CIV. 598. (1895).

latevincta BIG. = **luteola** FABR.

- luteola** FABR., Syst. Antl., 286. 11. [*Musca*] (1805); WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 420. 63. [*Musca*] (1830); LW., Peters Reise Moss., 21. [*Ochromyia*] (1862); GERST., v. d. Deckens Reisen, 392. 10. [*Ochromyia*] (1873); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 391. (1891).

latevincta BIG., Annal. Soc. entom. France, (4). IV. 240. [*Cosmiana*] (1874); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 515. 87. (1899).

senegalensis MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 244. 8. [*Ochromyia*] (1851); ? BIG., Thoms. Archiv., II. 368. 672. [*Ochromyia*] (1858); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 517. 129. (1899).

senegalensis MACQ. = **luteola** FABR.

Pollenia

R.-D., Myod., 412. XX. (1830).

Cephyssa R.-D., Posth., II. 677. XXII. (1863).

Nitellia R.-D., Myod., 417. XXI. (1830).

Orizia R.-D., Posth., II. 678. XXIII. (1863).

agilis R.-D. = **rudis** FABR.

- algira** MACQ., Dipt. exot., III. 312. (155). 1. t. XXI. f. 4. (1843). Algeria.

amentaria Scop. = ? **vespillo** FABR.

arrorum R.-D. = **rudis** FABR.

atramentaria MEG. = **vespillo** FABR.

atrata R.-D. = ? **laevis** ROSE.

autumnalis R.-D. = **rudis** FABR.

- bicolor** R.-D., Myod., 415. 10. (1830) et Posth., II. 661. 6. (1863); Gallia.

MACQ., Suit. à Buff., II. 269. 4. (1835); MEG., S. B., VII. 308.

47. [*Musca*] (1838); PASD., Rev. entom., XV. 151. 1. (1896).

- bisulca* PAND. = **rudis** FABR.
buccalis R.-D. = **rudis** FABR.
caryalescens MACQ. = **rudis** FABR.
cassia R.-D. (Or.) = **rudis** FABR.
cassia R.-D. (Poll.) = **rudis** FABR.
ceccina SCHRANK = **vespillo** FABR.
cinebra R.-D. = **rudis** FABR.
cinebra v. Ros. = **rudis** FABR.
coffeaui R.-D. = **vespillo** FABR.
conjuncta R.-D. = **rudis** FABR.
condempta R.-D. = **rudis** FABR.
cyaneescens R.-D. = **rudis** FABR.
dasyпода PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI, 143. (1884): Caucasus.
 HOUGH, Term. Füzet., XXIII, 248. (1900).
degener HAL., Entom. Mag., I, 165. (1833). Anglia.
depressa MEG. = **rudis** FABR.
familiaris W. HARR. = **rudis** FABR.
floricarpis ROND. = **rudis** FABR.
floralis R.-D. = **rudis** FABR.
fontinalis R.-D. = **vespillo** FABR.
frontalis R.-D. = **rudis** FABR.
fulvicornis R.-D. = **rudis** FABR.
fulvicornis ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6186, 9-10. [*Musca*] (1853). Scandinavia.
fulvipalpis MACQ. = **rudis** FABR.
funebris R.-D. = **rudis** FABR.
gagatea R.-D. = **vespillo** FABR.
griseella R.-D. = **rudis** FABR.
hartensis R.-D. = **rudis** FABR.
intermedia MACQ., Suit. à Buff., II, 272, 16. (1835); MEG., S. B., Europacentr.
 VII, 306, 36. [*Musca*] (1838); EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V, 12. (1855).
labialis R.-D. = **rudis** FABR.
laevis ROND., Dipt. ital. Prodr., V, 200, 7. [*lævis*] (1862). Europacentr.
zabrata R.-D., Myod., 417, 15. (1830) et Posth., II, 662, 8. (1863). et mer.
zucians R.-D., Myod., 416, 13. (1830) et Posth., II, 669, 21. (1863).
pilosula R.-D., Posth., II, 674, 30. (1863).
lanio FABR. = **vespillo** FABR.
leucoptera v. Ros. = **rudis** FABR.
macellaria HAL., Entom. Mag., I, 165. (1833). Anglia.
marginella R.-D. = **rudis** FABR.
metallica R.-D., Myod., 117, 16. (1830). Hispania.
micans R.-D. = ?**laevis** ROND.
muscula R.-D. = **rudis** FABR.
nana R.-D. = **rudis** FABR.
nigrina MEG., S. B., VII, 305, 32. [*Musca*] (1838); SCHN., F. A., I, Europacentr.
 587. (1863).

- nitens* R.-D. = **rudis** FABR.
nitens ZETT. = **vespillo** FABR.
nitidicentris BIG. = **vespillo** FABR.
obscura FABR. = **rudis** FABR.
occlusa Egg. = **rudis** FABR.
olivacea Macq. = **rudis** FABR.
oralis R.-D. = **rudis** FABR.
paupera Rond. = **vespillo** FABR.
pollicellata Macq. = **rudis** FABR.
pilosula R.-D. = **laevis** Rond.
pratensis R.-D. = **rudis** FABR.
pruinosa Macq. = **rudis** FABR.
pubescens R.-D. = **vespillo** FABR.
pulvillata Rond., Dipt. ital. Prodr., V, 198, 4. (1862). Italia.
pumila R.-D. = **rudis** FABR.
recta Macq. = **rudis** FABR.
recurra HARR. = **vespillo** FABR.
rubricornis R.-D. = **rudis** FABR.
rudis FABR., Entom. syst., IV, 314, 9. [*Musca*] (1786) et Syst. Antl., 287, 16. [*Musca*] (1805); FALL., Vet. Acad. Handl., 240. [*Musca*] (1816) et Dipt. succ. Musc., 48, 24. [*Musca*] (1822); MEIG., S. B., V, 66, 28. [*Musca*] (1826); R.-D., Myod., 414, 4. (1830) et Posth., II, 659, 4. (1863); ZETT., Ins. Lapp., 659, 22. [*Musca*] (1838) et Dipt. succ., IV, 1339, 11. [*Musca*] (1845); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 152, 1, t. I, f. 4. (1834) et Suit. à Buff., II, 269, 1, t. XVI, f. 18. (1835); WALK., Ins. Brit., II, 110, 10. [*Musca*] (1853); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V, 11. (1855); Rond., Dipt. ital. Prodr., V, 201, 9. (1862); SCHIN., F. A., I, 586. (1862); BOISD., Fiml. Insekt., II, 151, 10. [*Musca*] (1866); Mox, Psyche, III, 378. (1882); RILEY, Amer. Natur. Philad., XVII, 82. (1883); STROM., Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 71. (1894); PAND., Rev. entom., XV, 151, 3. (1896); Hogen, Zool. Bull., II, 283, f. 1. (1899); How., Insect Book, t. XXII, f. 28. (1902).
agilis R.-D., Myod., 415, 8. (1830) et Posth., II, 667, 18. (1863).
arcorum R.-D., Posth., II, 680, 5. [*Orizia*] (1863).
autumnalis R.-D., Myod., 414, 7. (1830).
bisulca PAND., Rev. entom., XV, 152, 4. (1896).
buccalis R.-D., Posth., II, 672, 26. (1863).
caerulescens Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 153, (17), 2. (1834); MEIG., S. B., VII, 307, 42. [*Musca*] (1838); STROM., Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 72. (1894).
caesia R.-D., Posth., II, 678, 2. [*Orizia*] (1863).
caesia R.-D., Posth., II, 670, 23. (1863).
cinerea R.-D., Posth., II, 669, 22. (1863).
cinerea v. Ros., Württemb. Corrb., I, 58. [*Musca*] (1840).
conjuncta R.-D., Posth., II, 678, 1. [*Orizia*] (1863).
contempta R.-D., Posth., II, 676, 33. (1863).

Europa.

- cyathescens* R.-D., Myod., 414, 5, (1830) et Posth., II, 665, 14, (1863).
- depressa* MEIG., S. B., V, 67, 30, [*Musca*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 273, 19, (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1338, 10, [*Musca*] (1845); SCHN., F. A., I, 587, (1862); BONSD., Finl. Insekt., II, 151, 9, [*Musca*] (1866); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 71, (1894).
- familiaris* W. HARR., Entom. Correspond., 336, [*Musca*] (1869); OST.-SACK., Cat. N. A. Dipt., 2 ed., XXXII et 160, (1878).
- flavipalpis* ROND., Dipt. ital. Prodr., V, 202, 10, (1862).
- florealis* R.-D., Myod., 415, 9, (1830) et Posth., II, 668, 20, (1863); MACQ., Suit. à Buff., II, 262, 3, (1835); MEIG., S. B., VII, 307, 46, [*Musca*] (1838).
- frontalis* R.-D., Posth., II, 671, 25, (1863).
- fulvicornis* R.-D., Myod., 413, 1, (1830) et Posth., II, 658, 2, (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 153, (17), 3, (1834); MEIG., S. B., VII, 307, 43, [*Musca*] (1838).
- fulvipalpis* MACQ., Suit. à Buff., II, 270, 5, (1835); MEIG., S. B., VII, 308, 48, [*Musca*] (1838).
- faucibris* R.-D., Posth., II, 664, 13, (1863).
- grisella* R.-D., Posth., II, 661, 5, (1863).
- hortensis* R.-D., Posth., II, 665, 15, (1863).
- labialis* R.-D., Posth., II, 671, 24, (1863).
- leucoptera* v. ROS., Württemb. CorrbL, I, 58, [*Musca*] (1840).
- marginella* R.-D., Posth., II, 666, 16, (1863).
- muscidea* R.-D., Posth., II, 677, 1, [*Cephalysa*] (1863).
- nana* R.-D., Myod., 418, 2, [*Xitellia*] (1830) et Posth., II, 682, 3, [*Xitellia*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 155, (29), 9, (1834) et Suit. à Buff., II, 272, 15, (1835); MEIG., S. B., VII, 306, 35, [*Musca*] (1838).
- nileus* R.-D., Posth., II, 664, 12, (1863).
- obscura* FABR., Entom. syst., IV, 315, 10, [*Musca*] (1794) et Syst. AntL, 287, 17, [*Musca*] (1805); MEIG., S. B., VI, 374, 50, [*Musca*] (1830); SCHN., F. A., I, 587, (1862); HOUGH, Zool. Bull., II, 213, (1899).
- occlusa* EGK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V, 12, (1855).
- oliracca* MACQ., Suit. à Buff., II, 270, 7, (1835); MEIG., S. B., VII, 308, 49, [*Musca*] (1838).
- oralis* R.-D., Posth., II, 671, 29, (1863).
- pedicellata* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 155, 10, [*pedicellata*] (1834).
- pratensis* R.-D., Posth., II, 668, 19, (1863).
- pratensis* MACQ., Suit. à Buff., II, 272, 17, (1835); MEIG., S. B., VII, 306, 37, [*Musca*] (1838).
- panila* R.-D., Myod., 414, 6, (1830) et Posth., II, 667, 17, (1863); MACQ., Suit. à Buff., II, 469, 2, (1835); MEIG., S. B., VII, 307, 45, [*Musca*] (1838).

recta Macq., Suit. à Buff., II. 270. 8. (1835); MEIG., S. B., VII. 308. 50. [*Musca*] (1838).

rubricornis R.-D., Posth., II. 679. 3. [*Orezia*] (1863).

rafella R.-D., Posth., II. 679. 4. [*Orezia*] (1863).

raficava Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 202. II. (1862).

rafipalpis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 153. (17). 5. (1834); MEIG., S. B., VII. 307. 44. [*Musca*] (1838).

rustica R.-D., Posth., II. 663. 9. (1863).

semiapertura Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 12. (1855).

sibiratica R.-D., Posth., II. 664. 11. (1863).

strenua R.-D., Posth., II. 657. 1. (1863).

submetallica R.-D., Posth., II. 676. 34. (1863).

tessellata R.-D., Posth., II. 683. 4. [*Nitellia*] (1863).

tomentosa R.-D., Myod., 416. 12. (1830) et Posth., II. 673. 28. (1863).

varensis R.-D., Posth., II. 663. 10. (1863).

varia MEIG., S. B., V. 66. 29. [*Musca*] (1826); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 154. 8. (1834) et Suit. à Buff., II. 272. 18. (1835); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 12. (1855); SEMX., F. A., I. 587. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 71. (1894).

vernalis R.-D., Myod., 415. 11. (1830) et Posth., II. 662. 7. (1863).

viatica R.-D., Myod., 413. 2. (1830) et Posth., II. 659. 3. (1863).

violacina R.-D., Posth., II. 675. 32. (1863).

vivida R.-D., Myod., 413. 3. (1830).

rafella R.-D. = **rudis** FABR.

raficeps MEIG. = **vespillo** FABR.

raficornis MACQ. = **vespillo** FABR.

raficava ROND. = **rudis** FABR.

rafipalpis MACQ. = **rudis** FABR.

rustica R.-D. = **rudis** FABR.

semiapertura EGG. = **rudis** FABR.

sibiratica R.-D. = **rudis** FABR.

strenua R.-D. = **rudis** FABR.

submetallica R.-D. = **rudis** FABR.

tessellata R.-D. = **rudis** FABR.

tomentosa R.-D. = **rudis** FABR.

vagabunda MEIG., S. B., V. 72. 36. [*Musca*] (1826).

Germania.

varensis R.-D. = **rudis** FABR.

varia MEIG. = **rudis** FABR.

vernalis R.-D. = **rudis** FABR.

vespillo FABR., Entom. syst., IV. 318. 26. [*Musca*] (1786) et Syst. Europa.

Antl., 292. 39. [*Musca*] (1805); MEIG., S. B., V. 65. 27. [*Musca*]

(1826); R.-D., Myod., 417. 1. [*Nitellia*] (1830) et Posth., II. 672.

27. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 153. 4. (1834) et Suit. à

Buff., II. 270. 6. (1835); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 907.

[*Musca*] (1849); Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 199. 6. (1862); SEMX.,

F. A., I. 586. (1862); PAND., Rev. entom., XV. 151. 2. (1896);
HOUGH, Zool. Bull., II. 283. f. 1. (1899).

zamentaria Scop., Entom. carn., 335. 898. [*Musca*] (1763);
VILL., Entom. lin., III. 477. 168. [*Musca*] (1789); Rossi,
Mant. ins., II. 66. 539. [*Musca*] (1794); SCHN., Verh. zool-
bot. Ges. Wien, VI. 413. (1856).

atramentaria MEIG., S. B., V. 65. 20. [*Musca*] (1826); Macq.,
Soc. Sci. Lille, 1833. 154. 6. t. I. f. 5. (1834) et Suit. à Buff.,
II. 272. 13. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 658. 21. [*Musca*] (1838)
et Dipt. Scand., IV. 1337. 9. [*Musca*] (1845); GIMM., Bull.
Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 679. [*Musca*] (1842); SCHN.,
F. A., I. 587. (1862); BOSSD., Finl. Insekt., II. 151. 8.
[*Musca*] (1866); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 71.
(1894); HOUGH, Term. Füzet., XXIII. 249. (1899).

cevrina SCHRANK, Fauna boi., III. 136. 2496. [*Volucella*] (1803).

caffearia R.-D., Posth., II. 675. 31. (1863).

fontinalis R.-D., Posth., II. 683. 5. [*Nitellia*] (1863).

gugateca R.-D., Posth., II. 680. 6. [*Orizina*] (1863).

lanio FABR., Syst. Antl., 287. 15. [*Musca*] (1805); PANZ., Fauna
germ., LIV. II. [*Musca*] (1798); MEIG., S. B., V. 64. 25.
[*Musca*] (1826) et VII. t. LXXIV. f. 25. [*Musca*] (1838);
Macq., Suit. à Buff., II. 271. 11. (1835); SCHN., F. A., I.
587. (1862).

nilens ZETT., Dipt. Scand., IV. 1340. 12. [*Musca*] (1845); WALK.,
Ins. Brit., II. 110. 9. [*Musca*] (1853); BOSSD., Finl. Insekt.,
II. 152. 11. [*Musca*] (1866).

nilidiventris BIG., Bull. Soc. Zool. France, 596. (1887); BRAUER,
Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 517. 125. (1899).

paupera ROSS., Dipt. ital. Prodr., V. 200. 8. (1862).

pubescens R.-D., Myod., 416. 14. (1830).

recurra HARR., Expos. engl. ins., 85. t. XXV. f. 17. [*Musca*]
(1776).

ruficeps MEIG., S. B., VII. 306. 41. [*Musca*] (1838).

ruficornis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 154. (18). 7. (1834) et
Suit. à Buff., II. 272. 14. (1835); MEIG., S. B., VII. 306. 34.
[*Musca*] (1838); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV.
679. [*Musca*] (1842); R.-D., Posth., II. 681. 1. [*Nitellia*] (1863).

violacea Macq., Suit. à Buff., II. 250. 9. (1835); ROSS., Dipt.
ital. Prodr., V. 199. 5. (1862).

virescens Macq., Suit. à Buff., II. 271. 12. (1835); MEIG., S. B.,
VII. 305. 33. [*Musca*] (1838); R.-D., Posth., II. 682. 2. [*Ni-
tella*] (1863).

viatica R.-D. **rudis** FABR.

violacea Macq. **vespillo** FABR.

violacina R.-D. **rudis** FABR.

virescens Macq. **vespillo** FABR.

virida R.-D. **rudis** FABR.

Phormia

R.-D., Myod., 465. XXXIX. (1830).

- Boganidae** ERICHS., Middelend. Reise Sibir., Zool., 67. 151. [*Musca*] Sibiria.
(1851).
- caerulea** R.-D., Myod., 466. 1. (1830) et Posth., II. 846. 1. (1863); Europa.
MACQ., Suit. à Buff., II. 256. 25. [*Lucilia*] (1835); MEIG., S. B.,
VII. 295. 29. [*Lucilia*] (1838); SCHN., F. A., I. 591. [*Lucilia*]
(1862).
caesar O. FABR. (nec L.), Fauna groenl., 207. 168. [*Volucella*]
(1780).
corusca R.-D., Posth., II. 849. 8. (1863).
groenlandica ZETT., Ins. Lapp., 657. 16. [*Musca*] (1838) et Dipt.
Scand., IV. 1330. 3. [*Musca*] (1845); RONB., Dipt. ital. Prodr.,
V. 196. 1. [*Pollenia*] (1862); BONSD., Finnl. Insekt., II. 149.
3. [*Musca*] (1866); VERR., Entom. Monthly Mag., XVIII. 152.
[*Calliphora*] (1881); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXX.
70. [*Calliphora*] (1894); PAND., Rev. entom., XV. 215. 12.
[*Calliphora*] (1896); LUNDE., Vid. Medd., 1898. 308. 104.
[*Calliphora*] (1898); HEND., Wien. entom. Zeitg., XX. 30.
[*Avihospita*] (1901).
nigripalpis R.-D., Posth., II. 846. 2. (1863).
terrae-novae R.-D., Myod., 467. 6. (1830); HOGG, Zool. Bull.,
II. 289. f. 10. (1899); HOW., Proc. Wash. Acad., II. 568. f.
22. (1902).
- caesar* O. FABR. = **caerulea** R.-D.
corusca R.-D. = **caerulea** R.-D.
cuprea R.-D. = **regina** MEIG.
fulvifacies R.-D. = **regina** MEIG.
groenlandica ZETT. = **caerulea** R.-D.
lucens RONB. = **regina** MEIG.
mollis WALK. = **regina** MEIG.
nigripalpis R.-D. = **caerulea** R.-D.
philadelphica R.-D. = **regina** MEIG.
rectinervis BIG. = **regina** MEIG.
- regina** MEIG., S. B., V. 58. 16. [*Musca*] (1826) et VII. 292. 25. [*Lu-* Europa.
cia] (1838); R.-D., Myod., 466. 2. (1830), Annal. Soc. entom.
France, (2). VII. Bull. 4. (1849) et Posth., II. 847. 3. (1863);
MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 166. 12. [*Lucilia*] (1834) et Suit. à
Buff., II. 256. 24. [*Lucilia*] (1835); SCHN., F. A., I. 589. [*Lucilia*]
(1862); STROBL., Wien. entom. Zeitg., XII. 104. [*Lucilia*] (1893)
et Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 72. [*Lucilia*] (1894); PAND.,
Rev. entom., XV. 215. 1. [*Calliphora*] (1896); HOGG, Zool. Bull.,
II. 288. f. 9. (1899).
cuprea R.-D., Myod., 467. 5. (1830) et Posth., II. 848. 5. (1863).
fulvifacies R.-D., Myod., 467. 4. (1830) et Posth., II. 848. 4.
(1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 166. (30). 13. [*Lucilia*]

(1834) et Suit. à Buff., II. 257. 26. [*Lucilia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 295. 30. [*Lucilia*] (1838).

lucens Rond., Dipt. ital. Prodr., V. 189. 3. [*Somomyia*] (1862); Bezzi, Bull. Soc. entom. ital., XXIII. 62. 178. [*Somomyia*] (1891).

mollis WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 892. [*Lucilia*] (1849).

philadelphica R.-D., Myod., 466. 3. (1830).

rectinervis BIG., Bull. Soc. zool. France, 1887. 600. [*Somomyia*] (1887).

rufigena BIG., Bull. Soc. zool. France, 1887. 598. [*Somomyia*] (1887).

rufipalpis JAENS., Abhandl. Senckenb. Ges., VI. 376. (67). 84. [*Lucilia*] (1867).

rapicola BIG., Bull. Soc. zool. France, 1887. 603. [*Somomyia*] (1887).

squatens R.-D., Myod., 468. 8. (1830) et Posth., II. 849. 7. (1863).

stigmatalis THOMS., Dipt. Eugen., 544. [*Lucilia*] (1858).

terrae-novae MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 224. (25). 57. t. XXXIII. f. 1. [*Lucilia*] (1851).

vittata R.-D., Myod., 467. 7. (1830) et Posth., II. 849. 6. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 257. 27. [*Lucilia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 295. 31. [*Lucilia*] (1838).

rufigena BIG. = **regina** MEIG.

rufipalpis JAENS. = **regina** MEIG.

rapicola BIG. = **regina** MEIG.

squatens R.-D. = **regina** MEIG.

stigmatalis THOMS. = **regina** MEIG.

terrae-novae MACQ. = **regina** MEIG.

terrae-novae R.-D. = **caerulea** R.-D.

vittata R.-D. = **regina** MEIG.

Lucilia

R.-D., Myod., 452. XXXVII. (1830).

Phaenicia R.-D., Posth., II. 750. XXX. (1863).

accincta WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 407. 39. [*Musca*] (1830); Aegyptus. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 420. (1891).

aestivans R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.

aestivans R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** MEIG.

affinis R.-D. = **caesar** L.

agilis R.-D. = **caesar** L.

albiceps MEIG. = **caesar** L.

albipennis MEIG. = **caesar** L.

amoenae R.-D. = **sericata** MEIG.

ardens R.-D. = **sericata** MEIG.

arrogans R.-D. = **caesar** L.

arcensis R.-D. = **caesar** L.
aurata R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.
aurata R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** MEIG.
azurca R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.
azurca R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** MEIG.
benigna R.-D. = **sericata** MEIG.
bicolor R.-D. = **sericata** MEIG.
blanda R.-D. = **sericata** MEIG.
brunnicosa R.-D. = **silvarum** MEIG.
bufonivora Mox. = **silvarum** MEIG.
caerulea BRULLÉ = **caesar** L.
caerulea R.-D. = **caesar** L.
caeruleovicinis Macq. = **sericata** MEIG.
caeruleuscens MEIG. = **sericata** MEIG.

caesar L., Syst. Nat., X, 1, 595, 50. [*Musca*] (1758), XII, II, 989. Europa.
 64. [*Musca*] (1767) et Faun. suec., 1828. [*Musca*] (1761): RÉAUM., Japocia,
 Mém. Ins., IV, t. VIII, f. 1. | — (1734); MERIAS, Hist. Ins. europ., Africa sept.
 I, t. XLIX. | — (1730); GEOFFR., Ins., II, 522, 53. | — (1762);
 MÛLL., Fauna Friedrichsd., 82, 727. [*Musca*] (1764); FABR., Syst.
 entom., 775, 8. [*Musca*] (1775), Spec. ins., II, 437, 10. [*Musca*]
 (1788), Entom. syst., IV, 316, 17. [*Musca*] (1794) et Syst. Anth.,
 289, 26. [*Musca*] (1805); Scop., Entom. carn., 326, 871. [*Musca*]
 (1763); DEG., Mém. Ins., VI, 61, 6. [*Musca*] (1776) et Götze, VI,
 30, 6. [*Musca*] (1782); SCHRANK, Enum. insect., 454, 923. [*Musca*]
 (1783) et Fauna boi., III, 132, 2484. [*Volucella*] (1803); GMEL.,
 Syst. Nat., V, 2838, 64. [*Musca*] (1788); HARR., Expos. engl.
 Ins., 87, t. XXV, f. 23. [*Musca*] (1776); PODA, Ins. Mus. graec.,
 117. [*Musca*] (1761); VILL., Entom. lib., III, 467, 147. [*Musca*]
 (1789); ROSSI, Fauna etc., II, 301, 1491. [*Musca*] (1790); CEDERH.,
 Faunae ingr. Prodr., 309, 971. [*Musca*] (1798); DWIG., Primitiae
 faunae Mosqu., 175, 635. [*Musca*] (1802); LATR., Hist. nat. crust.
 ins., XIV, 380, 2. [*Musca*] (1804) et Gen. crust. ins., IV, 345.
 [*Musca*] (1809); ILLIG., Fauna etc. Rossi, 462, 1491. [*Musca*]
 (1807); FALL., Vet. Acad. Handl., 266. [*Musca*] (1816) et Dipt.
 suec. Musc., 46, 20. [*Musca*] (1821); MEIG., S. B., V, 51, 1.
 [*Musca*] (1826) et VII, t. LXXIII, f. 45 -49. (1838); R.-D., Myod.,
 452, 1. (1830) et Posth., II, 721, 31. (1863); MACQ., Soc. Sci.
 Lille, 1833, 163, 1, t. I, f. 8. (1834) et Suit. à Bull., II, 252, 3.
 (1835); ?, Dict. pict. Hist. nat., V, 458, t. 391, f. 3. [*Musca*]
 (1832); ZETT., Ins. Lapp., 655, 9. [*Musca*] (1838) et Dipt. Scand.,
 IV, 1312, 1. (1845); BLANCH., Hist. nat. Ins., III, 615, t. IV, f.
 11. (1840); WESTW., Introd., II, 569, (1840); WALK., List Dipt.
 Brit. Mus., IV, 879. [*Musca*] (1849) et Ins. Brit., II, 108, 3.
 [*Musca*] (1853); SCHIX., F. A., I, 590. (1862); ROND., Dipt. ital.
 Prodr., V, 190, 5. [*Somomyia*] (1862); BONSD., Fiml. Insekt., II,
 144, 1. (1866); DISCOZZI, Entom. vicent., 227, 12, f. 262. (1865);
 WELP., Biol. centr. amer., II, 297, 1. (1896); MÉGIXIS, Faune

cadaver., 33, fig. (1888); Tyl.-Towss., Psyche, 1893, 468, (1893);
 STROM, Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 72, (1894); GUSCH, Berl.
 entom. Zeitschr., XXXVIII, 305, f. II, (1893); PAND., Rev. entom.,
 XV, 218, 14, [*Calliphora*] (1896); HETT., Trans. N. Zeal. Institut.,
 1900, 63, (1900); GIULIO TOS, Mem. Accad. Sci. Torino, (2), XLV,
 2, 132, (1895); HOGG, Zool. Bull., II, 287, f. 7, (1899); How.,
 Proc. Wash. Acad., II, 563, f. 18, (1900) et Insect Book, 163, f.
 90, (1902); VANEY, Ann. Univ. Lyon, I, (1902).

aestuans R.-D., Posth., II, 740, 61, (1863).

affinis R.-D., Posth., II, 735, 53, (1863).

agilis R.-D., Posth., II, 723, 33, (1863).

albiceps MEIG., S. B., VII, 292, 7, (1838); SCHN., F. A., I, 591,
 (1862).

albipennis MEIG., S. B., V, 58, 17, [*Musca*] (1826).

arrogans R.-D., Posth., II, 723, 34, (1863).

arvensis R.-D., Posth., II, 714, 20, (1863).

aurata R.-D., Posth., II, 713, 18, (1863).

azurca R.-D., Myod., 455, 10, (1830) et Posth., II, 731, 47, (1863);
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 880, [*Musca*] (1849).

cadaverina L., p. p., in coll., teste HAL., Steffin. entom. Zeitg.,
 XII, 143, [*Musca*] (1851).

caerulea BRULLE, Exped. Morée, III, 315, 688, (1832).

caerulea R.-D. (*var.* BRULLE), Posth., II, 731, 46, (1863).

carinatus R.-D., Posth., II, 712, 16, (1863).

chrysellæ R.-D., Posth., II, 746, 73, (1863).

chrysigastris R.-D., Posth., II, 736, 54, (1863).

chrysis R.-D., Posth., II, 711, 15, (1863).

coelestis R.-D., Posth., II, 710, 14, (1863).

compar R.-D., Posth., II, 718, 26, (1863).

consobrina MACQ., Dipt. exot. Suppl., III, 57, (1847); HOGG,
 Zool. Bull., II, 288, (1899).

caprea R.-D., Myod., 459, 27, (1863).

cyanea R.-D., Posth., II, 733, 49, (1863).

cylindrica R.-D., Posth., II, 730, 45, (1863).

delicatula R.-D., Myod., 461, 34, (1863).

diffusa R.-D., Posth., II, 743, 67, (1863).

discolor R.-D., Posth., II, 733, 50, (1863).

diversa R.-D., Posth., II, 701, 3, (1863).

dices R.-D., Posth., II, 715, 21, (1863).

equestris MEIG., S. B., V, 57, 13, (1826) et VI, 374, [*Musca*]
 (1830); MACQ., Suit. à BUFF., II, 253, 10 (1835); WALK., Ins.
 Brit., II, 108, 6, [*Musca*] (1853).

facialis R.-D., Posth., II, 726, 38, (1863).

fastuosa R.-D., Posth., II, 712, 17, (1863).

fausta R.-D., Posth., II, 712, 65, (1863).

fervida R.-D., Myod., 459, 25, (1830); MACQ., Suit. à BUFF., II,
 255, 21, (1835); MEIG., S. B., VII, 295, 27, (1838).

- flamma* R.-D., Posth., II. 706. 8. (1863).
floralis R.-D., Posth., II. 744. 68. (1863).
fraterna MACQ., Dipt. exot. Suppl., III. 57. (1847); HOGGH, Zool. Bull., II. 288. (1899).
fulgēs HARR., Expos. engl. Ins., 87. t. XXV. f. 21. [*Musca*] (1776).
fulvicornis R.-D., Posth., II. 745. 70. (1863).
fulvifrons ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 228. (1865).
fuscipalpis MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 164. (28). 4. (1834) et Suit. à Buff., II. 253. 11. (1835); MEIG., S. B., VII. 294. 12. (1838).
gemma R.-D., Posth., II. 738. 57. (1863).
gemma R.-D., Posth., II. 705. 6. (1863).
inclita R.-D., Posth., II. 703. 2. [*inclita*] (1863).
ingenua R.-D., Posth., II. 714. 19. (1863).
ingredior HARR., Expos. engl. Ins., 140. t. XLI. f. 33. [*Musca*] (1776).
insipis R.-D., Posth., II. 716. 24. (1863).
japonica BIG., Annal. Soc. entom. France, (5). VII. 254. 37. [*Somomyia*] (1877); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 334. (1898); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 522. 164. (1899).
laelatoria R.-D., Posth., II. 718. 27. (1863).
laevis R.-D., Posth., II. 743. 66. (1863).
lepida R.-D., Myod., 453. 2. (1830) et Posth., II. 734. 52. (1863); HOGGH, Zool. Bull., II. 288. (1899).
libera R.-D., Posth., II. 741. 62. (1863).
limbata R.-D., Posth., II. 746. 72. (1863).
limpidipennis R.-D., Myod., 454. 8. (1830) et Posth., II. 737. 56. (1863).
magnifica R.-D., Posth., II. 710. 13. (1863).
maialis R.-D., Posth., II. 715. 22. (1863).
mirifica R.-D., Posth., II. 706. 7. (1863).
modesta R.-D., Myod., 454. 7. (1830).
modica R.-D., Posth., II. 705. 5. (1863).
nigrifrons R.-D., Posth., II. 719. 29. (1863).
nitidula R.-D., Posth., II. 747. 74. (1863).
obscurella R.-D., Posth., II. 744. 69. (1863).
ovatrix R.-D., Posth., II. 709. 12. (1863).
pallipes R.-D., Myod., 461. 32. (1830) et Posth., II. 728. 42. (1863); MACQ., Suit. à Buff., II. 253. 8. (1835); MEIG., S. B., VII. 293. 11. (1838).
prasina R.-D., Posth., II. 720. 30. (1863).
pratensis R.-D., Posth., II. 717. 25. (1863).
pretiosa R.-D., Posth., II. 708. 11. (1863).
pubescens R.-D., Myod., 454. 6. (1830) et Posth., II. 739. 58. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 163. (27). 2. (1834) et

- Suit. à Buff., II, 252, 4. (1835); MEIG., S. B., VII, 293, 8. (1838).
- purpurca* R.-D., Posth., II, 726, 39. (1863).
- pyrrhopus* R.-D., Posth., II, 702, 1. [*pyropus*] (1863).
- quicha* R.-D., Posth., II, 708, 10. (1863).
- redco* HARR., Expos. engl. Ins., 146, t. XII, f. 31. [*Musca*] (1776).
- rostellum* R.-D., Myod., 460, 31. (1830) et Posth., II, 728, 41. (1863); MACQ., Suit. à Buff., II, 253, 7. (1835); MEIG., S. B., VII, 293, 10. (1838).
- rubicornis* R.-D., Posth., II, 722, 32. (1863).
- ruficeps* MEIG., S. B., V, 55, 8. [*Musca*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 252, 6. (1835); BOCHER, Naturgesch., 65, 49. [*Musca*] (1834); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1314, 2. (1815); SEMM., F. A., I, 590. (1862); BOSSQ., Fiml. Insekt., II, 144, 2. (1866); HOCQU, Term. Füzet., XXIII, 249. (1900).
- sapphirica* R.-D., Myod., 461, 33. (1830) et Posth., II, 729, 43. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 164, (28), 3. (1834); MEIG., S. B., VII, 293, 9. (1838).
- scutellaris* R.-D., Posth., II, 716, 23. (1863).
- socialis* R.-D., Posth., II, 724, 35. (1863).
- solers* R.-D., Posth., II, 734, 51. (1863).
- soror* R.-D., Myod., 455, 9. (1830) et Posth., II, 740, 60. (1863).
- spectabilis* R.-D., Posth., II, 707, 9. (1863).
- sumptaosa* R.-D., Posth., II, 748, 76. (1863).
- tepida* R.-D., Posth., II, 736, 55. (1863).
- tomentosa* R.-D., Posth., II, 719, 28. (1863).
- urens* R.-D., Posth., II, 742, 64. (1863).
- valida* R.-D., Posth., II, 732, 48. (1863).
- venusta* R.-D., Posth., II, 727, 40. (1863).
- vernalis* R.-D., Posth., II, 724, 36. (1863).
- vicina* R.-D., Myod., 456, 14. (1830) et Posth., II, 725, 37. (1863).
- victric* R.-D., Posth., II, 704, 4. (1863).
- violacina* R.-D., Posth., II, 729, 44. (1863).
- virgo* R.-D., Myod., 458, 23. (1830).
- vicidana* R.-D., Posth., II, 742, 63. (1863).
- viridis* R.-D., Posth., II, 748, 77. (1863).
- caesia* R.-D. = *silvarum* MEIG.
- calidula* R.-D. = *sericata* MEIG.
- campestris* R.-D. = *sericata* MEIG.
- caerulatus* R.-D. = *caesar* L.
- chloris** HAL., Entom. Meg., I, 185. (1833). Anglia.
- chrysellæ* R.-D. (*Lucæ*) = *caesar* L.
- chrysellæ* R.-D. (*Phœnæ*) = *sericata* MEIG.
- chrysigasteris* R.-D. = *caesar* L.
- chrysis* R.-D. = *caesar* L.
- cinctella* R.-D. = *sericata* MEIG.

- coccinea* R.-D. = **sericata** MEIG.
coelestis R.-D. = **caesar** L.
coquata R.-D. = **sericata** MEIG.
compur R.-D. = **caesar** L.
concinna R.-D. = **sericata** MEIG.
consobrina MACQ. = **caesar** L.
consobrina R.-D. = **sericata** MEIG.
cornicina MEIG. = **silvarum** MEIG.
corasca R.-D. = **sericata** MEIG.
cuprea R.-D. = **caesar** L.
cyanea R.-D. = **caesar** L.
cyanella R.-D. = **sericata** MEIG.
cylindrica R.-D. = **caesar** L.
decora R.-D. = **sericata** MEIG.
delicatula R.-D. = **caesar** L.
deses R.-D. = **sericata** MEIG.
diffusa R.-D. = **caesar** L.
dimidiata R.-D. = **sericata** MEIG.
discolor R.-D. = **caesar** L.
diversa R.-D. = **caesar** L.
dives R.-D. = **caesar** L.
docilis R.-D. = **sericata** MEIG.
dolosa R.-D. = **sericata** MEIG.
dorsalis R.-D. = **sericata** MEIG.
dulcis R.-D. = **sericata** MEIG.
elegans R.-D. = **sericata** MEIG.
equestris MEIG. = **caesar** L.
erythraea R.-D. = **sericata** MEIG.
exilis R.-D. = **sericata** MEIG.
facialis R.-D. = **caesar** L.
facilis R.-D. = **sericata** MEIG.
fastuosa R.-D. = **caesar** L.
fausta R.-D. = **caesar** L.
farilla R.-D. = **sericata** MEIG.
ferrida R.-D. = **caesar** L.
flagrans R.-D. = **sericata** MEIG.
flamma R.-D. = **caesar** L.
flammea R.-D. = **sericata** MEIG.
flammula R.-D. = **sericata** MEIG.
flaripalpis R.-D. = **sericata** MEIG.
floralis R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.
floralis R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** MEIG.
foetida R.-D. = **sericata** MEIG.
fraterna MACQ. = **caesar** L.
frontalis LW. ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 420. (1891). Aegyptus.
fulgens R.-D. = **sericata** MEIG.
fulges HARR. = **caesar** L.

- fulgida* ZETT. **sericata** MEG.
fabricicornis R.-D. (*Luc.*) **caesar** L.
fabricornis R.-D. (*Phaen.*) **sericata** MEG.
fulvifrons R.-D. **sericata** MEG.
fulvifrons ROND. **caesar** L.
fulvipes Lw., Wien. entom. Monatschr., II, 110, 18, (1858). Japonia.
fuscipalpis MACQ. **caesar** L.
gemma R.-D. **caesar** L.
gemmata R.-D. (*Luc.*) **caesar** L.
gemmata R.-D. (*Phaen.*) **sericata** MEG.
glabrata R.-D. **sericata** MEG.
gratiosa R.-D. **sericata** MEG.
hilaris R.-D. **sericata** MEG.
ipica R.-D. **sericata** MEG.
ipita R.-D. **sericata** MEG.
illustris MEG. **silvarum** MEG.
impatiens R.-D. **sericata** MEG.
inclita R.-D. (*Luc.*) **caesar** L.
inclita R.-D. (*Phaen.*) **sericata** MEG.
ingenua R.-D. **caesar** L.
inpedior HARR. **caesar** L.
insipis R.-D. **caesar** L.
insipita R.-D. **sericata** MEG.
japonica BIG. **caesar** L.
jeddensis BIG., Annal. Soc. entom. France, (6), VII, 255, 38, /*Soma-* Japonia.
nyia] (1877); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII, 524, 200, (1899).
juvenis ROND. **sericata** MEG.
labialis R.-D. **sericata** MEG.
lactatoria R.-D. **caesar** L.
laeris R.-D. **caesar** L.
latifrons SCHN. **sericata** MEG.
levis R.-D. **sericata** MEG.
lepida R.-D. (*Luc.*) **caesar** L.
lepida R.-D. (*Phaen.*) **sericata** MEG.
libera R.-D. **caesar** L.
limbata R.-D. **caesar** L.
limpidipennis R.-D. **caesar** L.
locuples R.-D. **sericata** MEG.
longilobata PAND., Rev. entom., XV, 219, 18, [*Calliphora*] (1896). Germania.
macrifica R.-D. **caesar** L.
maialis R.-D. **caesar** L.
marginalis R.-D. (*Luc.*) **silvarum** MEG.
marginalis R.-D. (*Phaen.*) **sericata** MEG.
Meigenii SCHN. **sericata** MEG.
metallica R.-D. **sericata** MEG.
micans R.-D. **sericata** MEG.

- mirifica* R.-D. = **caesar** L.
modesta R.-D. = **caesar** L.
modica R.-D. = **caesar** L.
nigripennis R.-D. = **caesar** L.
nilida R.-D. = **sericata** MEIG.
nilidula R.-D. = **caesar** L.
nobilis MEIG. = **sericata** MEIG.
notata R.-D. = **sericata** MEIG.
nyplialis R.-D. (*Luc.*) = **silvarum** MEIG.
nyplialis R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** MEIG.
obscurella R.-D. = **caesar** L.
obscuripalpis R.-D. = **sericata** MEIG.
oralis R.-D. = **caesar** L.
pallipes R.-D. = **caesar** L.
patrata MEIG. = **silvarum** MEIG.
pauperata R.-D. = **sericata** MEIG.
pilata R.-D. = **sericata** MEIG.
platanus R.-D. = **sericata** MEIG.
prasiata R.-D. = **caesar** L.
pratensis R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.
pratensis R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** MEIG.
pretiosa R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.
pretiosa R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** MEIG.
prompta R.-D. = **sericata** MEIG.
propinqua R.-D. = **sericata** MEIG.
pruinosa MEIG. = **sericata** MEIG.
pruinosa R.-D. = **sericata** MEIG.
pubescens R.-D. = **caesar** L.
pulchella R.-D. = **sericata** MEIG.
pulchra WIED., AUSSER, zweifl. Ins., II, 406, 38, [*Musca*] (1830); Aegyptus.
 B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 420, (1891).
punicea R.-D. = **sericata** MEIG.
purpurea R.-D. (*Luc.*) = **caesar** L.
purpurea R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** MEIG.
pyrrhocrova R.-D. = **sericata** MEIG.
pyrrhois R.-D. = **sericata** MEIG.
pyrrhopus R.-D. = **caesar** L.
quida R.-D. = **caesar** L.
redeo HARR. = **caesar** L.
regalis MEIG. = **silvarum** MEIG.
rostellum R.-D. = **caesar** L.
rubella R.-D. = **sericata** MEIG.
rubicornis R.-D. = **caesar** L.
ruficeps MEIG. = **caesar** L.
rutula R.-D. = **sericata** MEIG.
sapphira R.-D. = **caesar** L.
Sayi JAENS. = **sericata** MEIG.

scintilla R.-D. (*Luc.*) **silvarum** MEIG.

scintilla R.-D. (*Phaen.*) **sericata** MEIG.

scutellaris R.-D. (*Luc.*) **caesar** L.

scutellaris R.-D. (*Phaen.*) **sericata** MEIG.

sericata MEIG., S. B., V., 53, 3. [*Musca*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., Europe.

H., 252, 5. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 655, 10. [*Musca*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1314, 3. (1845) et VII, 3270. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 880. [*Musca*] (1849); BERTOL., Mem. Acc. Sci. Bologna, XII, 6, 5. [*Somomyia*] (1862); SEMX., F. A., I, 590. (1862); ROXD., Dipt. ital. Prodr., V, 191, 6. [*Somomyia*] (1862); BOXSU., Finl. Insekt., II, 145, 3. (1866); PAND., Rev. entom., XV, 219, 16. [*Calliphora*] (1896); WAND., Zool. Anz., 1898, 292, t. 5. (1898); HOGAN, Zool. Bull., II, 287, t. 8. (1899).

aestivans R.-D., Posth., II, 763, 20. [*Phaenicia*] (1863).

amena R.-D., Posth., II, 762, 18. [*Phaenicia*] (1863).

ardens R.-D., Posth., II, 758, 12. [*Phaenicia*] (1863).

aurata R.-D., Posth., II, 776, 46. [*Phaenicia*] (1863).

azurea R.-D., Posth., II, 788, 70. [*Phaenicia*] (1863).

benigna R.-D., Posth., II, 784, 63. [*Phaenicia*] (1863).

bicolor R.-D., Posth., II, 777, 48. [*Phaenicia*] (1863).

blanda R.-D., Posth., II, 775, 45. [*Phaenicia*] (1863).

caerulearividis MACQ., Dipt. exot. Suppl., V, 133, (115), 62. (1855); HOGAN, Zool. Bull., II, 288. (1899).

caerulescens MEIG., S. B., V., 55, 10. [*Musca*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., H., 253, 9. (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1315. (1845).

calidula R.-D., Posth., II, 756, 10. [*Phaenicia*] (1863).

campestris R.-D., Posth., II, 777, 49. [*Phaenicia*] (1863).

chrysellæ R.-D., Posth., II, 792, 76. [*Phaenicia*] (1863).

cinctella R.-D., Posth., II, 796, 82. [*Phaenicia*] (1863).

coccinea R.-D., Posth., II, 750, 1. [*Phaenicia*] (1863).

cognata R.-D., Posth., II, 793, 78. [*Phaenicia*] (1863).

concinna R.-D., Posth., II, 778, 50. [*Phaenicia*] (1863).

consobriua R.-D., Posth., II, 795, 80. [*Phaenicia*] (1863).

corasca R.-D., Posth., II, 763, 21. [*Phaenicia*] (1863).

cyanella R.-D., Posth., II, 789, 71. [*Phaenicia*] (1863).

decora R.-D., Posth., II, 760, 16. [*Phaenicia*] (1863).

desei R.-D., Posth., II, 778, 51. [*Phaenicia*] (1863).

dimidiata R.-D., Posth., II, 769, 32. [*Phaenicia*] (1863).

docilis R.-D., Posth., II, 779, 52. [*Phaenicia*] (1863).

dolosa R.-D., Posth., II, 781, 56. [*Phaenicia*] (1863).

dorsalis R.-D., Posth., II, 770, 31. [*Phaenicia*] (1863).

dorsis R.-D., Posth., II, 766, 25. [*Phaenicia*] (1863).

elegans R.-D., Posth., II, 791, 74. [*Phaenicia*] (1863).

erythraea R.-D., Posth., II, 758, 13. [*Phaenicia*] (1863).

evilis R.-D., Posth., II, 787, 67. [*Phaenicia*] (1863).

facilis R.-D., Posth., II, 796, 83. [*Phaenicia*] (1863).

- facilla* R.-D., Posth., II, 752, 4. [*Phaenicia*] (1863).
flagrans R.-D., Posth., II, 788, 69. [*Phaenicia*] (1863).
flammea R.-D., Posth., II, 761, 17. [*Phaenicia*] (1863).
flammeola R.-D., Posth., II, 762, 19. [*Phaenicia*] (1863).
flavipalpis R.-D., Posth., II, 753, 5. [*Phaenicia*] (1863).
floralis R.-D., Posth., II, 777, 47. [*Phaenicia*] (1863).
foetida R.-D., Posth., II, 784, 62. [*Phaenicia*] (1863).
fulvipes R.-D., Posth., II, 771, 37. [*Phaenicia*] (1863).
fulgida ZERT., Dipt. Scand., IV, 1315, 4. (1845); BOSSB., Fimul.
 Insekt., II, 145, 4. (1866).
fulvicornis R.-D., Posth., II, 787, 68. [*Phaenicia*] (1863).
fulvifrons R.-D., Posth., II, 799, 87. [*Phaenicia*] (1863).
gemmata R.-D., Posth., II, 779, 53. [*Phaenicia*] (1863).
glabrata R.-D., Posth., II, 797, 85. [*Phaenicia*] (1863).
gratiosa R.-D., Posth., II, 755, 8. [*Phaenicia*] (1863).
hilaris R.-D., Posth., II, 764, 22. [*Phaenicia*] (1863).
igrea R.-D., Posth., II, 755, 9. [*Phaenicia*] (1863).
ignita R.-D., Posth., II, 759, 14. [*Phaenicia*] (1863).
impatiens R.-D., Posth., II, 772, 38. [*Phaenicia*] (1863).
inclita R.-D., Posth., II, 782, 59. [*Phaenicia*] (1863).
insignita R.-D., Posth., II, 771, 36. [*Phaenicia*] (1863).
juvencis ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI, 51. [*Somomyia*]
 (1868).
labialis R.-D., Posth., II, 768, 29. [*Phaenicia*] (1863).
latifrons SCHIX., F. A., I, 590. (1862); STROBL, Wien. entom.
 Zeig., XII, 104. (1893) et Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 73.
 (1894).
lenis R.-D., Posth., II, 797, 81. [*Phaenicia*] (1863).
lepidula R.-D., Posth., II, 773, 41. [*Phaenicia*] (1863).
locuples R.-D., Posth., II, 767, 28. [*Phaenicia*] (1863).
marginalis R.-D., Posth., II, 794, 79. [*Phaenicia*] (1863).
Meigenii SCHIX., F. A., I, 591. (1862).
metallica R.-D., Posth., II, 780, 54. [*Phaenicia*] (1863).
micans R.-D., Posth., II, 783, 61. [*Phaenicia*] (1863).
nitida R.-D., Posth., II, 775, 44. [*Phaenicia*] (1863).
nobilis MEIG., S. B., V, 56, 12. [*Musca*] (1826); SCHIX., F. A.,
 I, 590. (1862); MEIG., Entom. Medd., I, 119. (1888); STROBL,
 Wiss. Mittheil. Bosn. Herzeg., VII, 608. (1900); HORGU,
 Term. Füzet., XXIII, 249. (1900).
nolata R.-D., Posth., II, 786, 65. [*Phaenicia*] (1863).
nyplialis R.-D., Posth., II, 795, 81. [*Phaenicia*] (1863).
obscuripalpis R.-D., Posth., II, 754, 6. [*Phaenicia*] (1863).
patasperata R.-D., Posth., II, 766, 26. [*Phaenicia*] (1863).
polita R.-D., Posth., II, 792, 75. [*Phaenicia*] (1863).
praestans R.-D., Posth., II, 769, 33. [*Phaenicia*] (1863).
pratensis R.-D., Posth., II, 772, 40. [*Phaenicia*] (1863).
pretiosa R.-D., Posth., II, 767, 27. [*Phaenicia*] (1863).

- prompta* R.-D., Posth., II, 774, 43. [*Phaenicia*] (1863).
propinqua R.-D., Posth., II, 765, 24. [*Phaenicia*] (1863).
pruinosa MEG., S. B., VII, 294, 24. (1838).
pruinosa R.-D., Posth., II, 786, 66. [*Phaenicia*] (1863).
pulchella R.-D., Posth., II, 798, 86. [*Phaenicia*] (1863).
punicca R.-D., Posth., II, 765, 23. [*Phaenicia*] (1863).
purpurea R.-D., Posth., II, 751, 2. [*Phaenicia*] (1863).
pyrrhocroa R.-D., Posth., II, 754, 7. [*Phaenicia*] (1863).
pyrrhois R.-D., Posth., II, 757, 11. [*Phaenicia*] (1863).
rabella R.-D., Posth., II, 768, 30. [*Phaenicia*] (1863).
ratilla R.-D., Posth., II, 782, 60. [*Phaenicia*] (1863).
Sagii JAVEN., Abhandl. Senckenb. Ges., VI, 375, (67), 85. (1867):
 Hogen, Zool. Bull., II, 288. (1899).
scintilla R.-D., Posth., II, 752, 3. [*Phaenicia*] (1863).
scutellaris R.-D., Posth., II, 772, 39. [*Phaenicia*] (1863).
sabtilis R.-D., Posth., II, 780, 55. [*Phaenicia*] (1863).
sumptuosa R.-D., Posth., II, 789, 72. [*Phaenicia*] (1863).
teucri R.-D., Posth., II, 781, 57. [*Phaenicia*] (1863).
terres R.-D., Posth., II, 785, 64. [*Phaenicia*] (1863).
thoracica R.-D., Posth., II, 781, 58. [*Phaenicia*] (1863).
tubrosa R.-D., Posth., II, 790, 73. [*Phaenicia*] (1863).
vaga R.-D., Posth., II, 768, 31. [*Phaenicia*] (1863).
venusta R.-D., Posth., II, 774, 42. [*Phaenicia*] (1863).
vivida R.-D., Posth., II, 793, 77. [*Phaenicia*] (1863).
vividula R.-D., Posth., II, 770, 35. [*Phaenicia*] (1863).
vira R.-D., Posth., II, 759, 15. [*Phaenicia*] (1863).

silvarum MEG., S. B., V, 53, 4. [*Musca*] (1826); ZETT., Dipt. Europa. Scand., IV, 1318, 7. (1845); SCHN., F. A., I, 391. (1862); ROSS., Dipt. ital. Prodr., V, 191, 8. [*Somomyia*] (1862); BOSSQ., Fiml. Insekt., II, 146, 7. (1866); NOW., Verh. nat. Ver. Brünn, VI, 45, nota. (1868); MORTENS., Zool. Anz., 193. (1892); PAND., Rev. entom., XV, 219, 17. [*Calliphora*] (1896); Hogen, Zool. Bull., II, 287. (1899).

- brannicosa* R.-D., Myod., 459, 26. (1830); Hogen, Zool. Bull., II, 288. (1899).
bufonivora Moxuz., Bull. Dep. Nord Lille, VIII, 25. (1876) et IX. (1878); LAYONN., Annal. Soc. entom. France, (4), III, 14. [—] (1862); BON., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV, 241. [—] (1865); M. GUARD., Bull. Soc. entom. France, 1876, CIII. (1876) et 1877, XXVII. (1877); DE BOER., Soc. entom. Belg., Compt. rend., 1876, 6. (1876); TAYLOR., Bull. Soc. entom. France, 1877, CXIX. (1877); COLLIN DE PLANCY., Bull. Soc. zool. France, 1877. (1877); PONSIGN., Hor. Soc. entom. Ross., XV, IV. (1880) et 1898. (1898); BRACH., Denkschr. Akad. Wien, XLVII, 73. (1883); MEINERT., Entom. Modd.,

*) *Bufo vulgaris* LACR., *Pelobates cultripes* LACR.

- (1890); DUCKER, Zool. Anz., (1891); KLUNZING, Jahresb. Ver. Naturk. Stuttg., 1903, 371. (1903).
- caesia* R.-D., Posth., II. 747, 75. (1863).
- carinicina* MEIG. (*nov* FABR.), S. B., V. 52, 2. [*Musca*] (1826); R.-D., Myod., 456, 16. (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 164, 5. (1834) et Suit. à Buff., II. 254, 13. (1835).
- illustris* MEIG., S. B., V. 54, 7. [*Musca*] (1826); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 165, 7. (1834) et Suit. à Buff., II. 255, 16. (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1317, 6. (1845); WALK., Ins. Brit., II. 108, 5. [*Musca*] (1853); SCHN., F. A., I. 591. (1862); ROND., Dipt. ital. Prodr., V. 192, 9. [*Somomyia*] (1862); BONSD., Fiml. Insekt., II. 146, 6. (1866); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 104. (1893) et Wiss. Mittheil. Steierm., XXX. 73. (1894); HOGG, Term. Füzet., XXIII. 249. (1900).
- marginalis* R.-D., Posth., II. 745, 71. (1863).
- nuptialis* R.-D., Posth., II. 749, 78. (1863).
- parvula* MEIG., S. B., V. 55, 9. [*Musca*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 255, 17. (1835).
- regalis* MEIG., S. B., V. 54, 6. [*Musca*] (1826); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 164, 6. (1834) et Suit. à Buff., II. 254, 15. (1835).
- scintilla* R.-D., Posth., II. 749, 79. (1863).
- splendida* MEIG., S. B., V. 56, 11. [*Musca*] (1826) et VII. 292, 20. t. LXXIII. f. 50. (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 165, 8. (1834) et Suit. à Buff., II. 255, 18. (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1319, 8. (1845); SCHN., F. A., I. 591. (1862); BONSD., Fiml. Insekt., II. 146, 8. (1866).
- thalassina* MEIG., S. B., V. 54, 5. [*Musca*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 254, 14. (1835).

simulatrix PAND., Rev. entom., XV. 218, 15. [*Calliphora*] (1896).

Germania.

socialis R.-D. = **caesar** L.

solvys R.-D. = **caesar** L.

soror R.-D. = **caesar** L.

spectabilis R.-D. = **caesar** L.

splendida MEIG. = **silvarum** MEIG.

subtilis R.-D. = **sericata** MEIG.

sumptuosa R.-D. (*Lac.*) = **caesar** L.

sumptuosa R.-D. (*Phaen.*) = **sericata** MEIG.

tegularia WIED., Ausser. zwcifl. Ins., II. 655, 14. [*Musca*] (1830).

Aegyptus.

tenera R.-D. = **sericata** MEIG.

lepida R.-D. = **caesar** L.

teres R.-D. = **sericata** MEIG.

thalassina MEIG. = **silvarum** MEIG.

thoracica R.-D. = **sericata** MEIG.

tomentosa R.-D. = **caesar** L.

umbrosa R.-D. = **sericata** MEIG.

arens R.-D. = **caesar** L.

vaga R.-D. = **sericata** MEIG.

valida R.-D. = **caesar** L.

- varians** WIED., Auser, zweifl. Ins., II, 655, 13. [*Musca*] (1830): Aegyptus.
LAW., Peters Reise nach Moss. Zool., V, 22. (1862).
- venusta* R.-D. (*Luc.*) **caesar** L.
- venusta* R.-D. (*Phaen.*) **sericata** MEIG.
- vernalis* R.-D. **caesar** L.
- vicina* R.-D. = **caesar** L.
- victrix* R.-D. **caesar** L.
- violacea** GEMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV, 677. (1842). Russia.
- violacea* R.-D. = **caesar** L.
- virgo* R.-D. = **caesar** L.
- viridana* R.-D. = **caesar** L.
- viridis* R.-D. **caesar** L.
- viridula* R.-D. = **sericata** MEIG.
- viridulans* R.-D. **sericata** MEIG.
- vira* R.-D. **sericata** MEIG. *)

Chrysomyia

R.-D., Myod., 444, XXXVI. (1830); Rond., ap. BERTOL., Mem. Accad. Sci. Bologna, XII, 6. *nota*, (1862) et Archiv. Zool. Modena, III, 27. (1863).

Paracompsomyia HOGAN, Proc. Acad. N. Sci. Philad., 1898, 184. (1898).

Pygnosoma B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 623. (1894); BRÄUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII, 497. (1899).

albiceps WIED., Zool. Mag., III, 38, 57. [*Musca*] (1819) et Auser, Aegyptus, zweifl. Ins., II, 404, 34. [*Musca*] (1830); ? Rond., Ann. Mus. civ. Genova, IV, 286, 8. [*Somomyia*] (1873).

annulata SCHIX, in litt. ap. B. B.

bibula WIED., Auser, zweifl. Ins., II, 672. [*Musca, nomen nudum*] (1830); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 620. [*Pygnosoma*] (1893).

Euoda WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 872. [*Musca*] (1819).
nubiana BIG., Annal. Soc. entom. France, (5), VII, 38, 5. [*Somomyia*] (1877); BRÄUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII, 523, 188. [*Pygnosoma*] (1899).

albofasciata MACQ., Hist. Can. Webb Entom., I, 114, 76. [*Lucilia*] Ins. Canar (1838) et Dipt. exot., III, 306. (119), I. [*Pyrellia*] (1843)

felic WALK., Ins. Saunders., IV, 338. [*Musca*] (1853).

bibula WIED. **albiceps** WIED.

Elara WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 870. [*Musca*] (1819) et Aegyptus, Entom., V, 343, 74. (1871); AUST., Ann. Mag. N. Hist., (7), XVII, 303. [*Pygnosoma*] (1906).

*) *calvus* R.-D., MACQ. et MEIG., *paella* MEIG. et *scutellata* MACQ. et MEIG., in anthomyiinis locandae sunt.

Emoda WALK. — **albiceps** WIED.

felix WALK. — **albofasciata** MACQ.

flaviceps MACQ., Suit. à Buff., II, 254, 12. [*Lucilia*] (1835); MEIG., S. B., VII, 294, 13. [*Lucilia*] (1838); ROSD., Dipt. ital. Prodr., V, 189, 1. [*Somomyia*] (1862) et Ann. Mus. civ. Genova, VII, 425. [*Compsomyia*] (1875); ?PAND., Rev. entom., XV, 216, 13. [*Calliphora*] (1896). Europa, mer.

?**hauriens** WIED., AUsSER, zweifl. Ins., II, 398, 24. [*Musca*] (1830). Aegyptus.

marginalis WIED., AUsSER, zweifl. Ins., II, 395, 18. [*Musca*] (1830); Aegyptus.

MACQ., Dipt. exot., III, 300, (143), 18. [*Lucilia*] (1843); BERTOL., Mem. Accad. Sci. Bologna, XII, 6, 4. [*Somomyia*] (1862); BIG., Annal. Soc. entom. France, (5), VII, 255. [*Somomyia*] (1877); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXXIII, 23, 27. [*Pycnosoma*] (1901); RIC., Ann. Mag. N. Hist., (7), VII, 109. [*Calliphora*] (1901); AUST., Ann. Mag. N. Hist., (7), XVII, 307. [*Pycnosoma*] (1906).

nigripennis HOUGH, Proc. Acad. Philad., 1898, 184, f. III. [*Paracompsomyia*] (1898).

regalis R.-D., Myod., 449, 14. (1830).

tessellata BIG., Annal. Soc. entom. France, (5), VIII, 31, 1. [*Phamosia*] (1878); BRÄUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII, 520, 143. (1899).

nigripennis HOUGH — **marginalis** WIED.

nubiana BIG. — **albiceps** WIED.

regalis R.-D. — **marginalis** WIED.

tessellata BIG. — **marginalis** WIED.

Protocalliphora

HOUGH, Entom. News (1899) et Zool. Bull., II, 289. (1900).

Arihospita HEND., Wien. entom. Zeitzg., XX, 29, et 68. (ALBRICH) (1901) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LI, 210, 13. (1901).

Philornis MEISERT, Vid. Medd. N. F., 304. (1889), *larva!*

azurea FALL.*), Vet. Acad. Handl., 1816, 245, 19. [*Musca*] (1816) et Dipt. suec. Muse., 46, 19. [*Musca*] (1821); MEIG., S. B., V, 63, 24. [*Musca*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 657, *observ.* [*Musca*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1331, 6. [*Musca*] (1845); ROSSI, Syst. Verzeichn., 59. [*Musca*] (1818); SCHIN., F. A., 1, 585. [*Calliphora*] (1862); ROSD., Dipt. ital. Prodr., V, 197, 2. [*Pollenia*] (1862); KÜRSCH, Berl. Entom. Zeitschr., XI, 245, t. III. [*sine nomine*] (1867); BOESD., Fimf. Insekt., II, 150, 5. [*Musca*] (1866); NOW., Verh. naturf. Ver. Brünn, VI, 44. *nota.* [*Calliphora*] (1861);

*) *Anthus pratensis* L., *Cofyle riparia* L., *Emberiza miliaria* L., *Hirundinotica* L., *Passer domesticus* L.

BRÄUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 74. [*Calliphora*] (1883);
 PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XXI. 17. t. I. f. 9—10. [*Pol-
 lenia*] (1887); VERR., Entom. Monthly Mag., XXII. 231. 69. [*Cal-
 liphora*] (1886); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 104. [*Calli-
 phora*] (1893); PANZ., Rev. entom., XV. 214. 10. [*Calliphora*]
 (1896); HOGGH, Zool. Bull., II. 289. f. 11. (1900); HEND., Wien.
 entom. Zeitg., XX. 29. 1. [*Arihospita*] (1901).

chrysorrhoea ?MEIG., S. B., V. 60. 20. [*Musca*] (1826); MACQ.,
 Suit. à Buff., II. 263. 4. [*Calliphora*] (1835); SCHN., F. A.,
 I. 585. [*Calliphora*] (1862); BRÄUER, Denkschr. Akad. Wien,
 XLIII. 74. [*Calliphora*] (1883); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm.,
 XXX. 70. [*Calliphora*] (1894); HOGGH, Zool. Bull., II. 290.
 (1900); HEND., Wien. entom. Zeitg., XX. 29. 2. [*Arihospita*]
 (1901).

dispar DUF., Annal. Soc. entom. France, (2). III. 205. t. II.
 [*Laëlia*] (1845); R.-D., Annal. Soc. entom. France, (2). VII.
 IV. [*Phormia*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3269. *obs.*
 [*Laëlia*] (1849).

molesta MEIX., Vid. Medd., 304. [*Philornis*] (1889); B. B., Denk-
 schr. Akad. Wien, LXI. 568. (1894).

nidicola HEYD. ap. Now., Verh. Naturf. Ver. Brünn, VI. 44.
nola. [*Calliphora*] (1861).

sordida ZETT., Ins. Lapp., 657. 17. [*Musca*] (1838) et Dipt.
 Scand., IV. 1332. 4. (1845) et XIII. 6185. 4. [*Musca*] (1859);
 ROSD., Dipt. ital. Prodr., V. 198. 3. [*Pollenia*] (1862); BOSSD.,
 Finkl. Insekt., II. 150. 4. [*Musca*] (1866); CORTI, Bull. Soc.
 entom. ital., XXIX. 140. 58. [*Pollenia*] (1897); HEND., Wien.
 entom. Zeitg., XX. 29. 3. [*Arihospita*] (1901).

Braueri HEND., Wien. entom. Zeitg., XX. 29. 4 et 30. [*Arihospita*] Austria.
 (1901).

chrysorrhoea MEIG. = **azurea** FALL.

dispar DUF. = **azurea** FALL.

molesta MEIX. = **azurea** FALL.

nidicola HEYD. = **azurea** FALL.

sordida ZETT. = **azurea** FALL.

Calliphora

R.-D., Myod., 433. XXXIII. (1830).

? *Mafelia* R.-D., Myod., 431. XXXI. (1830).

Mija ROSD., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (3). II. 175. [*Mya*]
 (1860) et Dipt. ital. Prodr., I. 90. 3. (1856).

Somomyia ROSD., Atti Accad. Sci. Bologna, 1861. 4. [*Somo-
 mya*] (1861) et Dipt. ital. Prodr., IV. 9. (1861).

affinis Macq. = **vomitorea** L.

algira Macq., Dipt. exot., III. 284. (127). I. t. XVI. f. 7. (1843). Algeria.

antarctica SCHIN. = **vomitorea** L.

anthracina MEIG., S. B., VII. 301. 6. [*Musca*] (1838); SCHIN., F. A., Europa centr. I. 585. (1862); HOGGH, Term. Füzet., XXIII. 249. (1901).

attissiodorensis R.-D., Myod., 431. 1. [*Mafetia*] (1830) et Posth., Gallia. II. 689. 1. [*Mafetia*] (1863); MACQ., Suit. à Buff., II. 262. 1. (1835).

flavipalpis MEIG., S. B., VII. 305. 27. [*Musca*] (1838).

brunnibarbis R.-D. = **vomitorea** L.

capensis B. B. = **vomitorea** L.

carriaria SCOP. = **vomitorea** L.

carriara FABR. = **vomitorea** L.

croceipalpis JAENS. = **vomitorea** L.

erythrocephala MACQ. = **vomitorea** L.

erythrocephala MEIG., S. B., V. 62. 22. [*Musca*] (1826); BOUCHÉ, Europa, Naturgesch., 65. 48. [*Musca*] (1834); WIED., Ausser. zciwll. Ins., Japonia. 395. 17. [*Musca*] (1830); ZETT., Ins. Lapp., 656. 15. [*Musca*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1329. 2. [*Musca*] (1845); ZELL., Stett. entom. Zeitg., IV. 314. [*Musca*] (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 895. [*Musca*] (1849) et Ins. Brit., II. 107. 1. [*Musca*] (1853); SCHIN., F. A., I. 584. (1862); ROSD., Dipt. ital. Prodr., V. 188. 2. [*Somomyia*] (1862); BONSD., Finnl. Insekt., II. 149. 2. [*Musca*] (1866); BECHER, Denkschr. Akad. Wien, XLV. t. IV. f. 21. (1882); PORTSCH., Musc. cadav. (1885); WULP, Biol. centr. amer., II. 294. 1. (1886); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLIII. 74. (1883); WEINL., Zeitschr. wiss. Zool., LI. t. VIII. f. 19—22 et 26—27., t. XI. f. 65—71. (1890); BRÜEL, Zool. Jahrbüch., X. 511. t. XLII—XLIV. (1897); LOWNE, Anat. Blow Fly, sec. edit. London, (1892); DAHL, Sitzgsber. Akad. Berlin, 1896. II. 28. (1899); PAXD., Rev. entom., XV. 213. 9. (1896); BERLESE, Riv. pat. veg., VI. 1. (1898) et VIII. 1. t. I—IV. (1899) et Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 253. (1900); SUPISO, Rendic. Accad. Lincei, IX. (1900) et Bull. Soc. entom. ital., XXXII. 192, 216 et 375. (1900); NOČEK, Zeitschr. wiss. Zool., LXX. 1. t. I—V. (1900); MEL., Tijdschr. Entom., XXXVIII. 8. f. 7. (1900) et Zool. Jahrbüch., XV. 682. f. 52—53. (1901); LUNDR., Vid. Medd., 1898. 307. 103. (1898); HUTT., Trans. N. Zeal. Instit., 1900. 64. (1900);

How., Proc. Wash. Acad., II. 564. f. 19. (1900) et Insect Book, 164. f. 91. (1902); VANEY, Ann. Univ. Lyon (1902); HOGGH, Zool. Bull., II. 285. (1900); GRÜNBERG., Sitzgsber. Ges. Nat. Treunes Berlin, 1903. t. I. f. 6. (1901); ENDERL., D. Tiefs. Exped., III. 254. (1903); GRIMSH., Entom. Monthly Mag., (2). XVI. 175. (1905).

insidiosa R.-D., Posth., II. 695. 6. (1863).

lilaca WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 894. [*Musca*] (1849);

HOGGH, Zool. Bull., II. 287. (1900).

littoralis R.-D., Myod., 435. 4. (1830) et Posth., II. 694. 4. (1863).

mousseliaca R.-D., Myod., 436. 9. (1830) et Posth., II. 694.

5. (1863).

musca R.-D., Myod., 436. 7. (1830).

- nana* R.-D., Myod., 436. 10. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 161. 3. (1834).
- scutellata* Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 161. (25). 4. (1834) et Suit. à Buff., II. 263. 5. (1835); MEIG., S. B., VII. 304. 21. [*Musca*] (1838).
- spitzbergensis* R.-D., Myod., 435. 6. (1830).
- vicina* R.-D., Myod., 435. 5. (1830); Hough, Zool. Bull., II. 287. (1900).
- vomitória* HARR. (nec L.), Expos. engl. Ins., 87. t. XXV. f. 22. 10. [*Musca com. minimus*] (1776); O. FABR., Fauna groenl., 207. 167. [*Volucella*] (1780); R.-D., Myod., 435. 3. (1830) et Posth., II. 692. 3. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 160. 1. t. I. f. (1834) et Suit. à Buff., II. 262. 2. t. XVI. f. 16. (1835); ?, Diet. piet. Hist. nat., V. 458. t. 391. f. 2. [*Musca*] (1832); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 615. [*Musca*] (1840); SCHRANK, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau, VI. 31. [*Musca*] (1850); LOWNE, Anat. blow. Fly. London (1870); MAYER, Mem. Acad. Lincei, (3). III. (276). t. I. f. 7-11. [*Musca*] (1879); HUDS., Trans. N. Zool. Institut., XXII. 187. (1899).
- flacipalpis* MEIG. = **autissiodorensis** R.-D.
- fulvibarbis* Macq. = **vomitória** L.
- insidiosus* R.-D. = **erythrocephala** MEIG.
- lata** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Museum, XXI. 334. (1898). Japonia.
- lilaca* WALK. = **erythrocephala** MEIG.
- littoralis* R.-D. = **erythrocephala** MEIG.
- Loewi* ENDERL. = **vomitória** L.
- monspeliaca* R.-D. = **erythrocephala** MEIG.
- musca* R.-D. = **erythrocephala** MEIG.
- nana* R.-D. = **erythrocephala** MEIG.
- nigribarbis** VOLLENI., Medl. Akad. Vet., XV. 10. 11. (1862). Japonia.
- obscoena* ESCHH. = **vomitória** L.
- scutellata* Macq. = **erythrocephala** MEIG.
- spitzbergensis* R.-D. = **erythrocephala** MEIG.
- splendens** Macq., Hist. Can. Webb Ent., 115. 79. t. IV. f. 10. (1838) Ins. Canar.
et Dipt. exot., III. 285. (128). 2. t. XVI. f. 8. (1843).
- terrae-novae* Macq. = **viridescens** R.-D.
- vicina* R.-D. = **erythrocephala** MEIG.
- violacea* MEIG. = **viridescens** R.-D.
- viridescens** R.-D., Myod., 437. 12. (1830); Hough, Zool. Bull., II. 286. f. 5. (1900). Europe-centr.
terrae-novae Macq., Dipt. exot. Suppl., IV. 217. (244). 29. [*Calliphora*] (1851).
- violacea* MEIG., S. B., VII. 301. 5. [*Musca*] (1838); SCHN., F. A., I. 585. (1862); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 70. (1894).
- vomitória** HARR. = **erythrocephala** MEIG.

- vomitorea** L*), Syst. nat., X, 1. 595, 52. [*Musca*] (1758), XII, II. Europa, 989, 67. [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1831. [*Musca*] (1761); RÉAUM., Mém. Ins., IV, t. XII, f. 1—9. [—] (1738); RÖSEL, Ins., II, t. IX, f. 10. [—] (1746); GEOFFR., Ins., II, 724, 59. [—] (1763); MCLL., Fauna Friedrichsd., 83, 730. [*Musca*] (1764); DEG., Ins., VI, 57, 4. [*Musca*] (1776) et Gütze, VI, 29, 4. [*Musca*] (1752); SCHRANK, Enum. ins., 455, 926. [*Musca*] (1783); HARR., Expos. angl. ins., 86, t. XXV, f. 18. [*Musca*] (1776); VILL., Entom. linn., III, 469, 150. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etr., II, 302, 1494. [*Musca*] (1790); PANZ., Fauna germ., X, 19. [*Musca*] (1793); CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 310, 974. [*Musca*] (1798); ILLIG., Fauna etr. Rossi, II, 463, 1494. [*Musca*] (1807); DWIG., Primitiae faunae Mosqui., 175, 638. [*Musca*] (1802); CUV., Règne anim. ill., t. 178, f. 1. [*Musca*] (1815); FALL., Vet. Akad. Handl., 246. [*Musca*] (1816) et Dipt. succ. Musc., 47, 22. [*Musca*] (1821); MEIG., S. B., V, 60, 21. [*Musca*] (1826); SHAW, Gen. Zool., VI, 383, t. 107, f. inf. [*Musca*] (1806); BOUCHÉ, Naturgesch., 63, 47. [*Musca*] (1834); ZETT., Ins. Lapp., 656, 14. [*Musca*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1328, 1. (1845), VIII, 3271, 1. (1849) et XII, 4711, 1. [*Musca*] (1855); DAHLB., Ins. Skand. skäda, 318, 217, t. II, f. 23. [*Musca*] (1837); WESTW., Introd., II, 570, f. 132, 1—2. [*Musca*] (1840); SUNDEV., Ins. extrem., t. III, f. 27—30. [*Musca*] (1844); GOTTSCH., Müll. Arch., 488, (1852); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 892. [*Musca*] (1849) et Ins. Brit., II, 107, 1, t. XII, f. 6. [*Musca*] (1853); LOEW, Wien. entom. Monatschr., II, 110, 17. (1858); SCHIX., F. A., I, 584. (1862); ROND., Dipt. ital. Prodr., V, 188, I. [*Somomyia*] (1862) et Ann. Mus. civ. Genova, VII, 426. [*Compso-myia*] (1875); BOSSD., Finnl. Insekt., II, 149, I. [*Musca*] (1866); LEUCK., Archiv. Naturg., 60. (1861); WEISSM., Embriol., I et II. et Zeitschr. wiss. zool., XIII et XIV. (1864); SUFFOLK, Monthl. micr. Journ., I. (1869); FRACENF., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII, 450. (1867); KNOX, Lancet., II, 514. (1877); PACK., Proc. Boston Soc. N. H., XVI, t. III, f. 6. (1872); KRACCH., Inaug. Diss. Leipzig, 531, t. XIII—XVI. (1881); LUCK, Jen. Zeitschr. f. Naturwiss., XVI, 539, t. XXIII, f. 17—19. [*Musca*] (1883); MEIN., Tropih Dipt., 65, t. VI, f. 1—8. [*Musca*] (1881); DIMM., On the anat. of the mouths., Boston, t. IV, f. 1—5. [*Musca*] (1881); VIALLAN., Ann. Sci. nat. zool., (6), XIV. (1882); VAN REES, Mandbl. v. Naturw., XI. (1884) et XII, 67. [*Musca*] (1885) et Zool. Jahrbüch., III, 1—134, t. I—II. [*Musca*] (1888); KOWAL., Zool. Anz., VIII, 98, 123, 153. (1885) et Zeitschr. wiss. Zool., XLV. (1885); BOLLER LEE, Rec. zool. suisse, II, 363, t. XII, f. 1—21. (1885); TROCESS., Paras. hab. human., 75, fig. (1890); J. B. SMITH, Trans. amer. entom. Soc., XVII, 337, f. 21. (1894); BLANCH., Zool. méd., II, 501. (1885); HUBER, Bibliogr. Jena, 8. (1899);

*) *Lacerta viridis* L., *Platydaetylus muralis* L.

PEPPER, Fliegenlarv., 47, f. 25-28. (1900); HOUGH, Zool. Bull., II. 285. (1900); PAND., Rev. entom., XV. 213, 8. (1896); LEON., Insetti noc., III. 316, f. 165, 166. (1900); ENDERL., D. Tiefsee Exped., III. 254. (1903).

affinis MACQ., Suit. à Buff., II. 263, 6. (1835); MEIG., S. B., VII. 304, 22. [*Musca*] (1838).

antartica SCHN., Novara Reise, 308, 45. (1868); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 219. (1893); ENDERL., D. Tiefsee Exped., III. 253. (1903).

brunniharbis R.-D., Myod., 434, 2. (1830) et Posth., II. 692, 2. (1863).

capensis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 442. (1891); ENDERL., D. Tiefsee Exped., III. 254. (1903).

carnaria Scop., Entom. carn., 325, 868. [*Musca*] (1763); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 409. (1856).

carnaria (coerulea) DEG., Ins., VI. 29, 4. [*Musca*] (1776) et Gütze, VI. 61, 4. [*Musca*] (1782); HERBST, Gem. Naturg., VIII. 107, 10. [*Musca*] (1799).

carnivora FABR., Entom. syst., IV. 313, 4. [*Musca*] (1784) et Syst. Antl., 285, 5. [*Musca*] (1805).

croceipalpis JAENX., Abhandl. Senckenb. Ges., VI. 376. (68). 87. (1867); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 210, 10. (1893).

erythrocephala MACQ. (nec MEIG.), Soc. Sci. Lille, 1833, 160, 2. (1834).

fulvibarbis R.-D., Myod., 434, 1. (1830) et Posth., II. 691, 1. (1863); MACQ., Suit. à Buff., II. 262, 3. (1835); LCC., Bull. Soc. entom. France, (2). IX. LXII. (1851).

Loewi ENDERL., D. Tiefsee Exped., III. 254. (1903).

obscoena ESCM., Entomograph., 113, 84. [*Musca*] (1822); HOUGH, Zool. Bull., II. 287. (1900).

vicarians SCHN. in litt. ap. BRAUER.*)

Onesia

R.-D., Myod., 365, VI. (1830).

Bellardia R.-D., Posth., II. 548, XII. (1863).

Mararigua LOY., Atti Istit. ven., (3). IX. 891. (1864) nec ARAD. Moll.

Melinda R.-D., Myod., 439, XXXIV. (1830).

Thelesina et *Marsilia* R.-D., in litt. ap. R.-D. 1863.

aculeata PAND., Rev. entom., XV. 210, 4. [*Calliphora*] (1896); VIL- GALLIA mer. LEX., Wien. entom. Zeitg., XXI. 26. (1902).

† *myioidea* R.-D. 1830 et *pubeiceps* ZETT. 1845, excludendae sunt. — Auctores plurimi antiquiores speciem hanc cum *erythrocephala* commutarunt.

- agilis** MEIG., S. B., V. 70. 33. [*Musca*] (1826); HEND., Wien. entom. Zeitg., XX. 33. (1901) et XXI. 85. fig. (1902). Europa-centr.
- albiceps* R.-D. = **cognata** MEIG.
- amplectens** PAND., Rev. entom., XV. 210. 3. [*Calliphora*] (1896); Gallia. VILLEN., Wien. entom. Zeitg., XXI. 26. (1902).
? *caprea* R.-D., Myod., 368. 6. (1830) et Posth., II. 538. 6. (1863).
- arcuata* R.-D. = **sepulchralis** MEIG.
- atriceps** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1311. 31. [*Sarcophaga*] (1843); Scandinavia. BOXSÖ., Finnl. Insekt., II. 143. 23. [*Sarcophaga*] (1866); HEND., Wien. entom. Zeitg., XX. 33. [*Melinda*] (1901).
- azurea* MEIG. = **sepulchralis** MEIG.
- azurea* R.-D. = **cognata** MEIG.
- caelestis* R.-D. = **cognata** MEIG.
- caerulea* MEIG. = **cognata** MEIG.
- caerulea* R.-D. = **sepulchralis** MEIG.
- campestris* R.-D. = **sepulchralis** MEIG.
- claripennis* R.-D. = **sepulchralis** MEIG.
- clausa* MACQ. = **obsoleta** MEIG.
- cognata** MEIG., S. B., VI. 374. [*Musca*] (1830); SCHN., F. A., I. 577. Europa. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 54. (1894); HUGH, Term. Füzet., XXIII. 248. (1901).
? *albiceps* R.-D., Myod., 440. 2. [*Melinda*] (1830) et Posth., II. 696. 2. [*Melinda*] (1863).
? *azurea* R.-D., Myod., 440. 4. [*Melinda*] (1830) et Posth., II. 697. 3. [*Melinda*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 161. 6. [*Calliphora*] (1834) et Suit. à Buff., II. 264. 9. [*Calliphora*] (1835).
? *caelestis* R.-D., Myod., 440. 5. [*Melinda*] (1830) et Posth., II. 697. 4. [*Melinda*] (1863).
caerulea MEIG. (nec WIED.). S. B., V. 63. 23. [*Musca*] (1826); WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 654. 12. [*Musca*] (1830); R.-D., Myod., 439. 1. [*Melinda*] (1830) et Posth., II. 696. 1. [*Melinda*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 161. 5. [*Calliphora*] (1834) et Suit. à Buff., II. 264. 8. [*Calliphora*] (1835); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 895. [*Musca*] (1849) et Ins. Brit., II. 109. 8. [*Musca*] (1853); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1310. 30. (1845), VIII. 3269. 30. (1849) et XII. 6181. 30. [*Sarcophaga*] (1859); RONDI., Dipt. ital. Prodr., V. 192. 10. [*Somomyia*] (1862); BOXSÖ., Finnl. Insekt., II. 143. 22. [*Sarcophaga*] (1866); PAND., Rev. entom., XV. 208. 1. [*Calliphora*] (1894); HEND., Wien. entom. Zeitg., XX. 33. [*Melinda*] (1901).
cyanea ZETT., Dipt. Scand., IV. 1358. 12. (1845) et VIII. 3269 et 3276. 12. [*Cyrtoneura*] (1849).
? *gentilis* R.-D., Myod., 441. 7. [*Melinda*] (1830) et Posth., II. 698. 6. [*Melinda*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 161. 7. [*Calliphora*] (1834); MEIG., S. B., VII. 302. 9. [*Musca*] (1838); SCHN., F. A., I. 577. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 54. (1894); HEND., Wien. entom. Zeitg., XX. 33. [*Melinda*] (1901).

Pandia WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 898. [*Musca*] (1849).

pavida R.-D., Posth., II, 698, 7. [*Melinda*] (1863).

?*psoror* R.-D., Myod., 441, 6. [*Melinda*] (1830) et Posth., II, 698, 5. [*Melinda*] (1863).

caprea R.-D. = ?*amplectens* PAND.

cyanea R.-D. = *sepulchralis* MEIG.

cyanea ZETT. = *cognata* MEIG.

festiva R.-D. = *sepulchralis* MEIG.

flavida R.-D. = *sepulchralis* MEIG.

flavipalpis R.-D. = *sepulchralis* MEIG.

floralis R.-D. = *sepulchralis* MEIG.

florida R.-D. = *sepulchralis* MEIG.

fulvipennis MACQ. = *sepulchralis* MEIG.

genarum ZETT., Dipt. Scand., IV, 1309, 29. [*Sarcophaga*] (1845); Europa sept.

BOSSD., Finl. Insekt., II, 143, 21. [*Sarcophaga*] (1866); HEND., Wien. entom. Zeitg., XX, 33. [*Melinda*] (1901).

laticornis ZETT., Ins. Lapp., 658, 19. [*Musca*] (1838).

magnicornis SIEBKE, Nyt. Mag. f. Naturv., 160. [*Sarcophaga*] (1864) et Enum. ins. norveg., 96, 17. [*Sarcophaga*] (1877).

gentilis R.-D. (*Mel.*) = *cognata* MEIG.

gentilis R.-D. (*On.*) = *sepulchralis* MEIG.

germana R.-D. = *sepulchralis* MEIG.

?**glacialis** BON., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XXII, 570. [*Tachina*] Europa arct.

(1865); HOLMGR., Vet. Akad. Handl., VIII, 27. [*Tachina*] (1869).

hilaris R.-D. = *sepulchralis* MEIG.

laticornis ZETT. = **genarum** ZETT.

lepida R.-D. = *sepulchralis* MEIG.

magnicornis SIEBKE = **genarum** ZETT.

melanocera R.-D. = *sepulchralis* MEIG.

micans MEIG. = *sepulchralis* MEIG.

misera R.-D. = *sepulchralis* MEIG.

nicarana R.-D. = *sepulchralis* MEIG.

nigripalpis MACQ. = *sepulchralis* MEIG.

obsoleta MEIG., S. B., IV, 282, 76. [*Tachina*] (1824) et VII, 207, 4. Europa centr.

[*Cystogaster*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 42, 6. t. II, f. 12. [*Clista*] (1855); R.-D., Posth., II, 287, 10.

[*Clytia*] (1863); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 145. (1900); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1900, 382, 2. (1900).

clausa MACQ., Suit. à Buff., II, 231, 4. (1835); MEIG., S. B., VII, 297, 38. [*Lucilia*] (1838); ROSSD., Dipt. ital. Prodr., V, 180, 1. (1862); LLOY, Atti Ist. Ven., (3), IX, 891. [*Maracigna*] (1864); HOGG, Term. Füzet., XXIII, 218. (1901).

vernalis R.-D., Posth., II, 548, 1. [*Bellardia*] (1863); MÜK. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII, 256. (1883).

Pandia WALK. = *cognata* MEIG.

pavida R.-D. = *cognata* MEIG.

polita MÜK. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII, 355, 3. (1883); Europa centr.

- B. B., Denkschr. Akad. Wien. LVIII. 367. (1891); HEND., Wien. entom. Zeitg., XX. 32. (1901).
- prompta* R.-D. = **sepulchralis** MEIG.
- pusilla** MEIG., S. B., V. 71. 35. [*Musca*] (1826); STROBL, Mittheil. Europacentr. Ver. Steierm., XXX. 55. (1894); HEND., Wien. entom. Zeitg., XX. 33. (1901).
- retrocurva* PAND. = **subapennina** ROHD.
- riparia* R.-D. = **sepulchralis** MEIG.
- rubrifacies* R.-D. = **sepulchralis** MEIG.
- rufipalpis* MACQ. = **sepulchralis** MEIG.
- sepulchralis** MEIG., S. B., V. 71. 34. (1826) et VI. 374. [*Musca*] Europa. (1830); SCHN., F. A., I. 376. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 54. (1894); HOUGH, Term. Füzet., XXIII. 248. (1901); PAND., Rev. entom., XV. 209. 2. [*Calliphora*] (1896); HEND., Wien. entom. Zeitg., XX. 32. (1901) et XXI. 85. fig. et 218. (1902); VILLEN., Wien. entom. Zeitg., XXI. 26. fig. et 153. (1902).
- arcuata* R.-D., Posth., II. 545. 23. (1863).
- azarea* MEIG., S. B., VII. 296. 35. [*Lucilia*] (1838).
- caerulea* R.-D., Myod., 369. 12. (1830) et Posth., II. 540. 12. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 175. 4. (1834) et Suit. à Buff., II. 234. 5. (1835).
- campestris* R.-D., Posth., II. 547. 28. (1863).
- claripennis* R.-D., Myod., 367. 3. (1830) et Posth., II. 536. 3. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 175. (39). 2. (1834) et Suit. à Buff., II. 234. 2. (1835); MEIG., S. B., VII. 296. 33. [*Lucilia*] (1838).
- cyanea* R.-D., Myod., 370. 15. (1830) et Posth., II. 541. 15. (1863).
- festiva* R.-D., Posth., II. 543. 19. (1863).
- flavida* R.-D., Posth., II. 543. 18. (1863).
- flavipalpis* R.-D., Posth., II. 545. 24. (1863).
- floralis* R.-D., Myod., 366. 1. (1830) et Posth., II. 535. 1. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 174. (38). I. t. I. f. 9. (1834) et Suit. à Buff., II. 234. 1. t. XVI. f. 5. (1835); MEIG., S. B., VII. 296. 32. [*Lucilia*] (1838); SCHN., F. A., I. 576. (1862); HEND., Wien. entom. Zeitg., XX. 32. (1901).
- florida* R.-D., Posth., II. 548. 29. (1863).
- fulvipennis* MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 175. (39). 5. (1834) et Suit. à Buff., II. 235. 6. (1835); MEIG., S. B., VII. 297. 36. [*Lucilia*] (1838).
- gentilis* R.-D., Myod., 370. 16. (1830) et Posth., II. 542. 16. (1863).
- germana* R.-D., Posth., II. 545. 22. (1863).
- hilaris* R.-D., Posth., II. 544. 20. (1863).
- lepida* R.-D., Myod., 368. 7. (1830) et Posth., II. 538. 7. (1863).
- melanocera* R.-D., Posth., II. 546. 25. (1863).
- micans* MEIG., S. B., VII. 303. 20. [*Musca*] (1838).

- miseria* R.-D., Posth., II, 547, 27. (1863).
nicacana R.-D., Posth., II, 546, 26. (1863).
nigripalpis Macq., Suit. à Buff., II, 235, 7. (1835); Meig., S. B., VII, 297, 37. [*Lucilia*] (1838).
prompta R.-D., Myod., 370, 13. (1830) et Posth., II, 541, 13. (1863).
riparia R.-D., Myod., 366, 2. (1830) et Posth., II, 536, 2. (1863).
rubrifacies R.-D., Posth., II, 544, 21. (1863).
rufipalpis Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 162, 8. [*Calliphora*] (1834) et Suit. à Buff., II, 264, 10. [*Calliphora*] (1835).
teres R.-D., Posth., II, 542, 17. (1863).
tessellata R.-D., Myod., 369, 10. (1830) et Posth., II, 539, 10. (1863).
uvia WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 899. [*Musca*] (1849).
velar R.-D., Myod., 370, 14. (1830) et Posth., II, 541, 14. (1863).
respillo FALL. (nec FABR.), Vet. Acad. Handl., 1816, 247, 23. [*Musca*] (1816) et Dipt. succ. Musc., 45, 25. [*Musca*] (1822); CEDERL., Faunae ingr. Prodr., 310, 975. [*Musca*] (1798); ZETT., Ins. Lapp., 658, 20. [*Musca*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1307, 28. (1843) et XIII, 6481, 28. [*Sarcophaga*] (1859); WALK., Ins. Brit., II, 109, 7. [*Musca*] (1853); ROSS., Dipt. ital. Prodr., V, 181, 2. (1862); BOYSS., Finnl. Insekt., II, 142, 20. [*Sarcophaga*] (1866); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXIII, 65, 192. (1891); WAND., Zool. Anz., 290, f. 3. (1898); HOFER, Term.-Füzet., XXIII, 248. (1901).
viarum R.-D., Myod., 367, 4. (1830) et Posth., II, 537, 4. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 175, (39), 3. (1831) et Suit. à Buff., II, 234, 3. (1835); Meig., S. B., VII, 296, 34. [*Lucilia*] (1838); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscon., XV, 677. (1842).
viridiganea R.-D., Myod., 368, 8. (1830) et Posth., II, 539, 8. (1863).
viridula R.-D., Myod., 369, 9. (1830) et Posth., II, 539, 9. (1863).
viridularis R.-D., Myod., 369, 11. (1830) et Posth., II, 540, 11. (1863).
vulgaris R.-D., Myod., 367, 5. (1830) et Posth., II, 537, 5. (1863).
soror R.-D., **cognata** Meig.
subapennina ROSS., Dipt. ital. Prodr., V, 182, 3. (1862). Europa-centr.
retrocera PASD., Rev. entom., XV, 211, 5. [*Calliphora*] (1896); et mer.
VILLEN., Wien. entom. Zeitg., XXI, 26, fig. (1902).
teres R.-D., **sepulchralis** Meig.
tessellata R.-D., **sepulchralis** Meig.
toxoneura Macq., Hist. Can. Webb Entom., II, 3, 69. (1838) et Dipt. Canariae, exot., II, 268. (III, 1. (1843).
uvia WALK., **sepulchralis** Meig.
velar R.-D., **sepulchralis** Meig.
vernalis R.-D., **obsoleta** Meig.
respillo FALL., **sepulchralis** Meig.
viarum R.-D., **sepulchralis** Meig.

viridiganea R.-D. = **sepulchralis** MEIG.

viridula R.-D. = **sepulchralis** MEIG.

viridulans R.-D. = **sepulchralis** MEIG.

vulgaris R.-D. = **sepulchralis** MEIG.

Cynomyia

R.-D., Myod., 363. 5. [*Cynomyia*] (1830).

Cynophaga LAOV, Atti Istit. ven., (3), IX, 890. (1864).

chrysocephala DEG. = **mortuorum** L.

mortuorum L., Syst. Nat., X, I, 594. [*Musca*] (1758) et XII, II, 989. Europa.
66. [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1830. [*Musca*] (1761); SCHAEFF.,
Icon. ins., t. LIV, f. 9. [—] (1769); MÜLL., Fauna Friedrichsd., 82.
729. [*Musca*] (1763); FABR., Syst. entom., 775. II. [*Musca*] (1775),
Spec. ins., II, 439. 15. [*Musca*] (1781), Entom. syst., IV, 318.
23. [*Musca*] (1894) et Syst. Antl., 290. 32. [*Musca*] (1805); GMEL.,
Syst. Nat., V, 2839. 67. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III,
468. 149. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etr., II, 301. 1493. [*Musca*]
(1790); CEBERL., Faunae ingr. Prodr., 309. 973. [*Musca*] (1798);
DWIG., Prim. faunae Mosqu., 175. 635. [*Musca*] (1802); DON.,
Brit. ins., XV, 5, t. 507. [*Musca*] (1811); LATR., Gen. crust. ins.,
IV, 345. [*Musca*] (1809) et Cons. gén., 444. [*Musca*] (1810);
ILLIG., Fauna etr. Rossi, II, 463. 1493. [*Musca*] (1807); FALL.,
Vet. Acad. Handl., 247. [*Musca*] (1816) et Dipt. suec. Musc., 45.
18. [*Musca*] (1821); MEIG., S. B., V, 16. 1. [*Sarcophaga*] (1826);
R.-D., Myod., 364. 1. (1830) et Postl., II, 578. 1. (1863); ZETT.,
Ins. Lapp., 650. 6. [*Musca*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1303. 25.
[*Sarcophaga*] (1845); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 176. 1. t. II. f.
1. (1834) et Suit. à Buff., II, 233. 1. t. XVI. f. 4. (1835); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., IV, 834. [*Sarcophaga*] (1849) et Ins. Brit.,
II, 105. 9. [*Sarcophaga*] (1853); BLANCH., Hist. nat. Ins., III, 614.
(1840); GÜMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV, 676. [*Sarco-*
phaga] (1842); SCHIN., F. A., I, 575. (1862); RONB., Dipt. ital.
Prodr., V, 183. 1. (1862); BOSSQ., Finl. Insekt., II, 141. 18.
[*Sarcophaga*] (1866); PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., VIII,
bull. XXII, (1872), XI, 2. *sep.* (1875) et XVII, 4. *sep.* (1881);
PAXD., Rev. entom., XV, 212. 7. [*Calliphora*] (1896); LUNDB., Vid.
Medd., 306. 101. (1898).

chrysocephala DEG., Ins., VI, 60. 5. t. LX, f. 5. [*Musca*] (1776)
et Götze, VII, 30. 5. [*Musca*] (1782); R.-D., Myod., 364. 2.
(1830) et Postl., II, 579. 2. (1863).

vomitaria FABR. (*nov* L.), Spec. ins., II, 439. 17. [*Musca*] (1781).
Entom. syst., IV, 318. 25. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 290.
14. [*Musca*] (1805); SCHRANK, Enum. insect., 435. 926. [*Musca*]
(1781) et Fauna boi., III, 133. 2488. [*Volucella*] (1803).

vomitaria FABR. = **mortuorum** L.

Steringomyia

POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX, 568. (1889).

stylifera POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX, 569. (1889); Alpes.
B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 367. (1891).

Acrophaga

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 367. (1891) et LX, 163. (1893).

alpina ZETT., Ins. Lapp., 65I, 7. [*Sarcophaga*] (1838) et Dipt. Scand., Europa.
IV, 1304, 26. [*Sarcophaga*] (1845); WALK., Ins. Brit., II, 105, 10.
[*Sarcophaga*] (1853); ROSS., Dipt. ital. Prodr., V, 182, 4. [*Onesia*]
(1862); BOSSD., Finnl. Ins-kt., II, 142, 19. [*Sarcophaga*] (1866);
PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XI, 1, sep. [*Cynomyia*] (1875);
JAROSCH, Trudy naturf. Ges. Karkoff, XX, 31, 37. [*Cynomyia*]
(1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 367. (1891); STROBL,
Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 53. [*Onesia*] (1894); GEIBSH., Ann.
Scott. N. H., 1897, 23. [*Cynomyia*] (1897); PAND., Rev. entom.,
XV, 211, 6. [*Calliphora*] (1896).

romitorina WAHLB. in litt. ap. ZETT.

fuscipalpis ZETT., Dipt. Scand., IV, 1306, 27. [*Sarcophaga*] (1845); Europa sept.
PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XI, 2, sep. [*Cynomyia*] (1895).

Mohileviana PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XI, 1, sep. [*Cyno-*
myia] (1875). Russia.

stelviana B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 367. (1891). Alpes.

Pharyngomyia

SCHN., Wien. entom. Monatschr., V, 144. (1861).

cervi CLARK — **picta** MEIG.

picta MEIG.†), S. B., IV, 172, 8. [*Oestrus*] (1821); CURT., III. Brit. Europa centr.
Entom., III, 106, 1. [*Oestrus*] (1828); JOLY, Ann. Soc. agric. Lyon,
IX, 286. [*Oestrus*] (1846); KELLS., Stettin. entom. Zeiŕg., VIII,
366. (1847) et XIV, 89. [*Oestrus*] (1853); WALK., Ins. Brit., II,
272, 2. [*Cephalomyia*] (1853); ROSS., Dipt. ital. Prodr., II, 23, 1.
[*Cephenomyia*] (1857); BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII,
395, 401, 1. XI, f. 4. [*Cephenomyia*] (1858) et Mon., 178. (1863);
SCHN., F. A., I, 394. (1862); ACSTES, Entom. Monthly Mag., (2),
IX, 10. (1898).

cervi CLARK, Newb. Zool., 1. [*Oestrus*] (1847); RED HILL, Isis,
1855. [*Cephalomyia*] (1857).

†) *Cervus elaphus* L.

Cephenomyia

LATR., Faun. nat. règne anim., V. 200. [*Cephenomyia*] (1825) em. BRAUER.

Endocephala LLOY, Atti Istit. ven. (3). X. 81. (1865).

- auribarbis** MEIG.*), S. B., IV. 171. 6. t. XXXVIII. f. 17. [*Oestrus*] Europa centr. (1824); ? REBI, Opera, t. 165. [—] (1636); ? REAUM., Ins., V. 85. t. IX. f. 2, 6. [—] (1734); MACQ., Suit. à Buff., II. 50. 2. (1835); JOLY, Ann. Soc. agric. Lyon, IX. 283. (1846); RONDI, Dipt. ital. Prodr., II. 23. 3. (1857); AUSTEN, Entom. Monthly Mag., (2). IX. 9. (1898); GRIMSH., Ann. Scott. N. H., 23. 75. (1900).
- cerri* SCHRANK, Fauna boi., 61. 2290. [*Oestrus*] (1803) *tantum larva*; CLARK, Essay, 69. [*Oestrus*] (1815); JOLY, Ann. Soc. agric. Lyon, IX. 291. (1846).
- claphi* SCHRANK, Enum. insect., 418. 844. [*Oestrus*] (1781) *nomen nudum* et Fauna boi., III. 61. 2291. [*Oestrus*] (1803); VILL., Entom. linn., III. 349. 6. [*Oestrus*] (1789).
- rufibarbis* MEIG., S. B., IV. 172. 7. [*Oestrus*] (1824); BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 394, 401. 410. t. X. f. 1., t. XI. f. 3. (1878), Mon., 193. 1. t. III. f. (1863) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 79. (1892); SCHIX., F. A., I. 395. (1862); GRIMSH., Ann. Scott. N. H., 155. (1895).
- trompe* RATZEB. (*nee* L.), Forstins., III. 10. f. 13. [*Oestrus*] (1844); KELLX., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 366. [*Oestrus*] (1847) et XIV. [*Oestrus*] (1853).
- biangulata* COOKE = **stimulator** CLARK.
- capreoli* HEN. = **stimulator** CLARK.
- cerri* SCHRANK = **auribarbis** MEIG.
- claphi* SCHRANK = **auribarbis** MEIG.
- microcephala* CLARK = **stimulator** CLARK.
- rufibarbis* MEIG. = **auribarbis** MEIG.
- stimulator** CLARK**), Essay, 69. t. V. f. 28, 29. [*Oestrus*] (1815) et Zoolog., 5542 et 5630. [*Oestrus*] (1857); MEIG., S. B., IV. 170. 4. [*Oestrus*] (1824); MACQ., Suit. à Buff., II. 51. 3. (1835); ZELL., Stettin. entom. Zeitg., II. 181. *nola*. (1841) et Isis, 839. 19. t. VII. f. 72. (1842); JOLY, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX. 292. (1846); BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 393. t. X. f. 2. (1858). X. 647. (1860), XXV. 77. (1875), Mon., 206. 4. (1863) et Wien. entom. Zeitg., VI. 76. (1887); SCHIX., F. A., I. 395. (1862); COOKE, Zoolog., 8023. [*Oestrus*] (1862); PORTSCH., Trudy, X. 195. (1874); TROSCHEL, Ver. prouss. Rheinl. u. Westphal., XXXVIII. 119. (1882); BECH., Denkschr. Akad. Wien, XLV. t. IV. f. 27. (1882);

*) *Cervus elaphus* L.: speciem ignotam in *Cervo dama* L. a Bechstein observatum, BRAUER in Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 82. (1883) reordat.

**) *Cervus capreolus* L., *pygargus* PALL.

WACHTL, Wien. entom. Zeitg., V. 305. (1886); SIEBECK, Jagd-
freund Wien, II. 428. (1902).

biangulata COOKE, Zoolog., 5438. [*Oestrus*] (1857).

capreoli HENN., Isis, I. 305. (1855) *larva tantum*.

microcephala CLARK, Essay, 37. [*Oestrus*] (1815).

stimulatrix ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 28. 2. (1857).

trompe CLARK (nec L.), Trans. linn. Soc., XIX. 125. (1843);

SAXES., Stettin. entom. Zeitg., XI. (1850).

stimulatrix ROND. = **stimulator** CLARK.

tarandii CLARK = **trompe** L.

trompe CLARK = **stimulator** CLARK.

trompe L.*), Syst. Nat., X. I. 590. [*Oestrus*] (1758), XII. II. 969. Europa sept.

[*Oestrus*] (1767) et Fauna suec., 1722. [*Oestrus*] (1761); MODEER,

Vet. Acad. Handl., VII. 125. [*Oestrus*] (1786); FIRCHL, Diss. cont.,

II. 78. 3. [—] (1787); FABR., Entom. syst., IV. 231. 6. [*Oestrus*]

(1794) et Syst. Antl., 229. 6. [*Oestrus*] (1805); COGGER, Illustr.

icon., 100. t. XXIII. f. 1. [*Oestrus*] (1803); PANZ., Fauna germ.,

CVII. 20. [*Oestrus*] (1809); LATR., Gen. crust. ins., IV. 342.

[*Oestrus*] (1809), N. Dict. Hist. nat., XXIII. 271. [*Oestrus*] (1816)

et Règne anim., V. 200. (1825); FALL., Dipt. succ. Haemat., 10. 2.

[*Oestrus*] (1818); MEIG., S. B., IV. 170. 5. [*Oestrus*] (1824); ZETT., Iter

Lapp., II. 39. [*Oestrus*] (1824), Ins. Lapp., 622. 1. [*Oestrus*] (1838)

et Dipt. Scand., III. 972. 2. [*Oestrus*] (1844); LAESTAD, Jourh.,

447. [*Oestrus*] (1831); ? Dict. pict. Hist. nat., VI. 227. [*Oestrus*]

(1832); MACQ., Suit. à Buff., II. 50. 1. t. XIII. f. 20. (1835);

BLANCH., Hist. nat. ins., III. 608. (1840); WESTW., Proc. Linn.

Soc., I. 179. (1843); JOLY, Ann. Soc. agric. Lyon, IX. 292. (1846);

SCHOLTZ, Zeitschr. entom. Breslau, IV. 3. (1848); WALK., List

Dipt. Brit. Mus., III. 684. [*Oestrus*] (1848); BRAUER, Verh. zool-
bot. Ges. Wien, VIII. 392. t. X. f. 3. (1858), X. 650. (1860), XXV.

77. (1875), Mon., 203. 3. (1863) et Wien. entom. Zeitg., VI. 76.

(1887); ROND., Dipt. ital. Prodr., II. 23. 4. (1857); SCHN., F. A.,

I. 395. (1862); BONSD., Fiml. Insekt., II. 30. 1. [*Oestrus*] (1866);

POERTSCH., Trudy, X. 194. (1874).

tarandii CLARK, Trans. linn. Soc., XIX. 125. [*Oestrus*] (1843).

trompe RATZER. **auribarbis** MEIG.

Ulrichii BRAUER**), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 5. (1862), X. 653. Europeacentr.

(1860) et Mon., 199. 1. (1863); WANGEN., Schr. Ges. Berl. nat.

Fr., I. 56. (1795) *larva*: POERTSCH., Trudy, X. 195. (1874).

*) Rangifer tarandus L.

**) Cervus alces L.

Phasiinae.

Gymnosoma

MEIG., Hlig. Magaz., II. 278. (1803).

A. *Gymnosoma* s. str.

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 142. (1889) et LX. 153. (1893).

ovale G. COSTA = **rotundatum** L.*atrum* R.-D. = **rotundatum** L.*cerinum* HARR. = **rotundatum** L.*costatum* PANZ. = **rotundatum** L.*hemisphaericum* GEOFFR. = **rotundatum** L.*intermedium* LW. = **rotundatum** L.*Latreillei* R.-D. = **rotundatum** L.*obliquum* R.-D. = **rotundatum** L.

rotundatum L.*), Syst. Nat., X. l. 595. [*Musca*] (1758) et XII. II. 991. 76. [*Musca*] (1767) et Fauna suec., 1838. [*Musca*] (1761); SCHAEFFER, Icon. ins., t. 54. f. 8 et t. 143. f. 3. [—] (1769); GEOFFR., Hist. ins., II. 509. 32. [—] (1763); Scop., Entom. carn., 329. 883. [*Musca*] (1763); MÜLL., Fauna Friedrichsd., 83. 735. [*Musca*] (1764); DEG., Ins., VI. 29. s. t. l. f. l. 11. [*Musca*] (1776) et Götze, VI. 15. 8. [*Musca*] (1782); FABR., Syst. entom., 778. 22. [*Musca*] (1775), Spec. ins., II. 442. 33. [*Musca*] (1781), Entom. syst., IV. 325. 57. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 311. 12. [*Tachina*] (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2846. 76. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 386. 194. [*Musca*] (1789); ROSSI, Fauna etc., II. 305. 1502. [*Musca*] (1790); PANZ., Fauna germ., XX. 19. [*Musca*] (1794); DWIG., Primitiae faun. Mosqu., 176. 644. [*Musca*] (1802); DOX., Brit. ins., XII. 83. t. 424. f. 1. [*Musca*] (1807); CEDERH., Faunae ingr. Prodr., 311. 978. [*Musca*] (1798); SCHRANK, Fauna boi., III. 118. 2441. [*Musca*] (1803); LATR., Hist. nat. Crust. Ins., XIV. 379. 3. [*Ocyptera*] (1804), Gen. crust. ins., IV. 344. [*Ocyptera*] (1809) et Cons. gén., 441. [*Ocyptera*] (1810); LLEG., Fauna etc. Rossi, II. 466. 1502. [*Musca*] (1807); FALL., Dipt. succ. Rhizon., 9. 1. (1820); MEIG., S. B., IV. 204. l. t. XXXIX. f. 21. (1824); LAM., Anim. s. vert., III. 362. 7. [*Musca*] (1816); R.-D., Myod., 236. 1. (1830) et Posth., II. 189. 1. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 209. l. t. II. f. 9. (1834) et Suit. à Buff., II. 189. l. t. XV. f. 5. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 628. 1. (1838) et Dipt. Scand., III. 1226. 1. (1844), XIII. 6161. 1. (1859); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 612. t. IV. f. 9. (1840); O. G. COSTA, Atti Accad. Napoli, V. (2). 99. 5. [(1835) 1844]; BREMI, Isis, 173. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 691. (1849) et Ins.

Europa,

Turcomania.

*) *Pentatoma dissimilis* F., *Rhaphigaster grisea* F.

Brit., II, 11, t. 1, XI, f. 6, (1853); SEMX., F. A., I, 410, (1862);
 BOSSD., Finnl. Insekt., II, 114, f. 1, (1866); DISCONZI, Entom. vicent.,
 226, 7, f. 261, (1865); SEMENK, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau, VI,
 32, (1850); KÜCKEK d'HEREG., Annal. Soc. entom. France, (5), IX,
 349, t. X, f. 1-6, (1879); E. BLANCH., Metamorph. Ins. Paris,
 653, (1886); PAXD., Rev. entom., XIII, 81, f. 1, (1894); BRACHER,
 Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 506, 94, (1898).

anale O. G. COSTA, Atti Accad. Sci. Napoli, V, (2), 100, (1835,
 1844).

atrum R.-D., Myod., 238, 5, (1830); MACQ., Suit. à Buff., II,
 189, 2, (1835).

cerinum HARR., Expos. engl. ins., 36, t. IX, f. 9, [*Musca*] (1776).
costatum PAXZ., Fauna germ., LXXIII, 23, [*Musca*] (1803);
 MEG., S. B., IV, 205, 2, (1824); SEMX., F. A., I, 411, (1862);
 ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 223, (1865); STROBL,
 Glasnik Zem. Mus. Bosn. Hereceg., XIV, 485, (1902) et Wiss.
 Mittheil. Bosn. Hereceg., IX, 545, (1904).

hemisphaericum GEOFFR. ap. FOURCR., Entom. paris., II, 480,
 33, [*Musca*] (1785).

intermedium LW., 20 Ber. Ver. Augsburg, 49 et 57, 5, (1869).

Latreillei R.-D., Myod., 237, 3, (1830).

obliquum R.-D., Myod., 237, 2, (1830).

B. *Stylogymnomyia*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI, 387, (1889) et LX, 153, (1893).

lulifrons ROXD. = **nitens** MEG.

microcerum R.-D. = **nitens** MEG.

minutum R.-D. = **nitens** MEG.

nitens MEG., S. B., IV, 207, 4, (1824); R.-D., Myod., 238, 7, (1830); Europaeentr.
 MACQ., Suit. à Buff., II, 189, 3, (1835); SEMX., F. A., I, 410, et mer.
 (1862); ROXD., Dipt. ital. Prodr., V, 29, 2, (1862) et Atti Soc. ital.
 Sci. Nat., VIII, 224, (1865); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXIII,
 387, (1894); PAXD., Rev. entom., XIII, 82, 2, (1894).

lulifrons ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 224, (1865).

microcerum R.-D., Myod., 238, 8, (1830).

minutum R.-D., Myod., 238, 6, (1830).

Freraea

R.-D., Myod., 285, II, (1830).

A. *Freraea* s. str.

gagatheae R.-D., Myod., 286, I, (1830) et Posth., II, 20, I, (1863); Europaeentr.
 MACQ., Suit. à Buff., II, 195, I, [*Xysta*] (1835); MEG., S. B., VII, et mer.
 288, 4, [*Xysta*] (1838); ROXD., Dipt. ital. Prodr., V, 31, I, (1862).

B. *Gymnapeza*

ZETT., Ins. Lapp., 629. *obs.* (1838) et Dipt. Scand., III. 1257. 123. (1844).

albipennis ZETT. = ? **denudata** ZETT.

denudata ZETT.)*, Dipt. Scand., III. 1258. 2. (1844); SCHN., F. A., Europa sept. 1. 422. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. XI. f. 284. (1889); PAND., Rev. entom., XIII. 74. (1894).

? *albipennis* ZETT., Ins. Lapp., 629. *obserr.* (1838) et Dipt. Scand., III. 1258. 1. (1844).

C. *Gymnophania*

B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 143. (1889) et LX. 154. (1893); COQUILL., Pomona College, I. 35. 1805. (1904).

nigripennis B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 170. t. XI. f. 285. Austria. (1889).

Catharosia

ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 46. (1868).

Braueri STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., XXXI. 126. [*Stecenia*] (1895). Styria.
maculata STROBL (*acc. FALL.*), Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 52. [*Stecenia*] (1894).

fascipennis WIED., AUSSER. zweifl. Ins., II. 342. 113. [*Tachina*] Nubia. (1830); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 358. (1891).

flavicornis ZETT. = **pygmaea** FALL.

limbata MEIG. --- **pygmaea** FALL.

maculata STROBL = **Braueri** STROBL.

nana FALL., Dipt. succ. Rhizom., 4. 4. [*Thereva*] (1820); MEIG., S. B., IV. 199. 26. [*Phasia*] (1824); ZETT., Dipt. Scand., III. 1252. 9. [*Phasia*] (1844); WALLGR., Entom. Tidskr., 1. 20. 11. [*Allophora*] (1880); PAND., Rev. entom., XIII. 83. [*Litophasia*] (1894). Europacentr. et sept.

nigrisquama ZETT. = **pygmaea** FALL.

pygmaea FALL., Dipt. succ. Rhizom., 4. 5. [*Thereva*] (1820); MEIG., S. B., IV. 200. 27. [*Phasia*] (1824); ZETT., Dipt. Scand., III. 1253. 10. [*Phasia*] (1844); ROXD., Dipt. ital. Prodr., IV. 147. 5. [*Stecenia*] (1860) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 47. (1868); WALLGR., Entom. Tidskr., 1. 20. 12. [*Allophora*] (1880); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 358. (1891) et LX. 193. 80. (1893); PAND., Rev. entom., XIII. 83. 1. [*Litophasia*] (1894). Europa.

flavicornis ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6166. 7. [*Leucostoma*] (1859).

limbata MEIG., S. B., IV. 288. 87. [*Tachina*] (1824) et VII. 212. 6. [*Leucostoma*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). III. 193. 7. t. IV. f. 7. [*Leucostoma*] (1855); R.-D., Posth.,

*) Carabus Scheidleri FABR.

- I. 1136. 6. [*Melanophora*] (1863); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI. 621. (1894); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 142. (1900).
nigrisquama ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6165. 6. [*Leucostoma*] (1859); SCHN., F. A., I. 544. [*Plesina*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2). V. 159. [*Plesina*] (1894).

Syntomogaster

SCHN., Wien. entom. Monatschr., V. 140. (1861).

- Ahrensia* R.-D., Posth., II. 14. III. (1863).
Andrina Loew, Atti Istit. ven., (3). X. 72. (1865) *nee* R.-D. 1863. Dipt.
Campogaster Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 80. (1856) *nee* Macq. 1855. Dipt.
Campylura Rond., Archiv. zool. Modena, III. 22. (1863).
Stephensia R.-D., Posth., II. 17. IV. (1863) *nee* STAMT. 1858. Lep.
Strongylogaster Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 211. [*Strongylogaster*] (1834), *em.* BLANCH. III. 612. 1840., *nee* DALLÉ. 1835. Hym.

A. *Syntomogaster* s. str.

- celer** MEIG., S. B., VII. 207. 6. [*Cystogaster*] (1838); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 133. (1900). Europa-centr. et sept.
conceva ZETT., Dipt. Scand., III. 1256. 15. [*Phasia*] (1844); SCHN., F. A., I. 409. (1862); WALLGR., Entom. Tidskr., I. 21. 16. [*Allophora*] (1880); B. B., Denkschr. Akad. Wien. LX. 220. [*Androphana*] (1893); STROB., Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 47. [*Xysta*] (1894).
notata SCHN. in litt. ap. B. B.
ciligera R.-D. = **exigua** MEIG.
conceva ZETT. = **celer** MEIG.
debilis Rond. = **exigua** MEIG.
delicata MEIG. = **exigua** MEIG.
exigua MEIG., S. B., IV. 367. 222. [*Tachina*] (1821); Macq., Suit. à Buff., II. 191. 2. [*Strongylogaster*] (1835); SCHN., F. A., I. 409. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. XI. f. 286. (1889); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 136. (1900). Europa.
ciligera R.-D., Posth., II. 19. 1. [*Stephensia*] (1863).
debilis Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 150. 2. [*Campogaster*] (1860).
delicata MEIG., S. B., IV. 368. 223. [*Tachina*] (1824) et VII. 264. 1. t. LXXII. f. 40—44. [*Tryphera*] (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 191. 3. [*Strongylogaster*] (1835) et Annal. Soc.

entom. France, (3), III. 179. 3. t. III. f. 3. [*Trypthera*] (1855);
 Rond., Dipt. ital. Prodr., IV. 149. 1. [*Campogaster*] (1860);
 SCHN., F. A., I. 409. *nota*. (1862); JAROSCH., Trudy naturf.
 Ges. Karkoff, XIX. 46. 26. [*Campogaster*] (1885); STROBL,
 Mittheil. Ver. Steierm., XXX. 46. [*Strongylogaster*] (1894);
 PAND., Rev. entom., XIII. 72. 1. [*Strongylogaster*] (1894);
 MIK, Wien. entom. Zeitg., XIX. 187. (1900); STEIN, Wien.
 entom. Zeitg., XIX. 247. 1. [*Strongylogaster*] (1900) et Entom.
 Nachricht., XXVI. 134. (1900).

femoralis R.-D., Posth., II. 16. 2. [*Ahrensia*] (1863).

flavipalpis Macq., Suit. à Buff., II. 184. 6. [*Phania*] (1835);
 MEIG., S. B., VII. 202. 3. [*Ucomyia*] (1838); ZETT., Dipt.
 Scand., XII. 4705. *obs.* [*Phania*] (1855); R.-D., Posth., II.
 15. 1. [*Ahrensia*] (1863); LUOY, Atti Istit. ven., (3). X. 72.
 [*Andrina*] (1865).

nitida R.-D., Posth., II. 17. 3. [*Ahrensia*] (1863).

parvula Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 80. (1856) et IV. 150. 3.
 [*Campogaster*] (1860); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosn.
 Herceg., XIV. 484. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg.,
 VII. 544. (1900).

singularis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 797. (1860);
 SCHN., F. A., I. 409. (1862).

vidua Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 797. (1860); SCHN.,
 F. A., I. 409. (1862).

fasciata Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 207. (71). 9. [*Hyalomyia*] (1834); Europa centr.
 MEIG., S. B., VII. 290. 26. [*Allophora*] (1838); GIBSCH., Zeitschr. et sept.
 Naturwiss., LX. 6. (1888); PAND., Rev. entom., XIII. 83. 2.
 [*Litophasia*] (1894).

fasciola ZETT., Ins. Lapp., 626. 3. [*Phasia*] (1838) et Dipt.
 Scand., III. 1254. 11. [*Phasia*] (1844); WALLGR., Entom.
 Tidskr., I. 20. 13. [*Allophora*] (1880).

zonella ZETT., Ins. Lapp., 627. 4. [*Phasia*] (1838) et Dipt. Scand.,
 III. 1254. 12. [*Phasia*] (1844); WALLGR., Entom. Tidskr., I.
 20. 14. [*Allophora*] (1880).

fasciola ZETT. = **fasciata** Macq.

femoralis R.-D. = **exigua** MEIG.

flavipalpis Macq. = **exigua** MEIG.

insularis Big., Bull. Soc. zool. France, 1891. 278. [*Phasia*] (1891). Ins. Canar.

nitida R.-D. = **exigua** MEIG.

opaca ZETT., Ins. Lapp., 626. 2. [*Phasia*] (1838) et Dipt. Scand., III. Europa sept.
 1255. 13. [*Phasia*] (1844); SCHN., F. A., I. 409. (1862); WALLGR.,
 Entom. Tidskr., I. 20. 15. [*Allophora*] (1880).

pannonia Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 45. 45. [*Strongylo- Pannonia.*
gaster] (1873).

parvula Rond. = **exigua** MEIG.

ruficeps ZETT., Ins. Lapp., 627. 5. [*Phasia*] (1838) et Dipt. Scand., Scandinavia.
 III. 1255. 14. [*Phasia*] (1844); SCHN., F. A., I. 409. (1862).

- sexpunctata** PAND., Rev. entom., XV, 117, 3. [*Etheria*] (1896). Gallia mer.
singularis EGG. — **exigua** MEIG.
ridua EGG. — **exigua** MEIG.
zonella ZETT. — **fasciata** MACQ.

B. *Microsoma*

- MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II, 736, 737. (1854) et (3), III, 38. (1855).
nigra MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), III, 38, t. II, f. 6. (1855); Europacentr.
 SCHN., F. A., I, 539. (1862); BRÄUER, Sitzgsber. Akad. Wien,
 CVII, 505, 91. [*Labidigaster*] (1898).

Cinochira

ZETT., Dipt. Scand., IV, 1358. (1845).

- atra** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1359, 1. (1845), V, 1792. *obscura*, (1846), Europa sept.
 VIII, 3276, 1. (1849) et XIII, 6190, 1. (1859); BOHEM., Öfv. vet.
 Acad. Handl., 203. (1851); SCHN., F. A., I, 672. (1862); SINFEN.,
 Wien. entom. Zeitg., X, 143. (1891); B. B., Denkschr. Akad.
 Wien, LX, 189, 47. (1893).
pinguicula ZETT., Dipt. Scand., V, 1759, 112. (1846) et VIII,
 3327, 142. [*Anthomyza*] (1849).
pinguicula ZETT. = **atra** ZETT.

Micra

ZETT., Ins. Lapp., 631, 76. (1838).

- trixina** ZETT., Ins. Lapp., 631, 1. (1838) et Dipt. Scand., III, 1218. Europa sept.
 I, (1844); SCHN., F. A., I, 423. (1862); WAL. sc., Entom. Tidskr.,
 I, 21, 1. (1880); PAND., Rev. entom., XIII, 73. (1894).

Weberia

R.-D., Myod., 233, X. (1830).

- Bohemia* R.-D., Posth., II, 10, 1. (1863) *nov* STÅL 1855, Heml.
Ceromyia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 143. (1889)
 et LX, 154. (1893).
Neoceromyia TAL. TOWNS., Trans. amer. entom. Soc., XIX, (1892).
Uromyia MEIG., S. B., VII, 202, 7. (1838) *nov* R.-D. 1830, Dipt.

appendiculata R.-D. **curvicauda** FALL.

- **curvicauda** FALL.*), Dipt. succ. Muse., 17, 33. [*Tachina*] (1820); Europa.
 MEIG., S. B., IV, 221, 5, t. XI, f. 10. [*Phania*] (1824) et VII.

*) *Amara aulica* Pz., *Ophonus ruficornis* F.

202. 2. t. LXIX. f. 1—6. [*Uromygia*] (1838); BOHEM., Vet. Acad. Handl., 164. [*Tachina*] (1828); R.-D., Myod., 234. 1. [*Phania*] (1830) et Posth., II. 11. 1. [*Bohemia*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 518. 1. t. III. f. 4. [*Phania*] (1834), Suit. à Buff., II. 184. 5. t. XV. f. 3. [*Phania*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3). III. 27. t. 1. f. 7. [*Uromygia*] (1855); ZETT., Dipt. Scand., III. 1217. 2. (1844) et XIII. 6157. 2. [*Phania*] (1859); WALK., Ins. Brit., II. 10. 2. [*Phania*] (1853); ROND., Dipt. ital. Prodr., IV. 80. 1. [*Uromygia*] (1860); SCHN., F. A., I. 422. [*Uromygia*] (1862); BONSD., Finnl. Insekt., II. 110. 2. [*Phania*] (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 143. t. XI. f. 287. [*Ceromyia*] (1889); PAND., Rev. entom., XIII. 71. 8. [*Phania*] (1894).

appendiculata R.-D., Myod., 233. 1. (1830) et Posth., II. 13. 1. (1863); MACQ., Suit. à Buff., II. 184. 7. [*Phania*] (1835).

incrassata PAND. = **thoracica** MEIG.

thoracica MEIG., S. B., IV. 220. 4. (1824) et VII. 202. 1. [*Uromygia*] Europa. (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 184. 4. (1835); ZETT., Dipt. Scand., III. 1217. 1. [*Phania*] (1844); WALK., Ins. Brit., II. 10. 1. t. XI. f. 5. [*Phania*] (1853); ROND., Dipt. ital. Prodr., IV. 77. 2. [*Phania*] (1860) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 222. [*Phania*] (1865); SCHN., F. A., I. 422. [*Uromygia*] (1862); BONSD., Finnl. Insekt., II. 110. 1. [*Phania*] (1866); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 387. [*Ceromyia*] (1891).

incrassata PAND., Rev. entom., XIII. 70. 7. [*Phania*] (1894).

Besseria

R.-D., Myod., 232. IX. (1830).

Apostrophus LW., Schrift. Ges. Fr. nat. Moscou, 1870. 58. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 311. nota. (1871).

Celatoria COQUILL., Ins. Life, II. 233. (1891) et Psyche, VII. 251. (1895); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CIV. 603. (1895).

Wahlbergia ZETT., Dipt. Scand., I. 51. 115. (1842) et III. 1223. 115. (1844).

anthophila LW. = **melanura** MEIG.

appendiculata PERR. = **melanura** MEIG.

bicolor PERR., Soc. Inib. Lyon, 1852. 65. [*Phania*] (1852); PAND., Gallia mer. Rev. entom., XIII. 69. 5. [*Phania*] (1894).

dimidiata ZETT. = **melanura** MEIG.

forcipata BIG. = **melanura** MEIG.

lateralis FALL. = **melanura** MEIG.

melanura MEIG., S. B., IV. 286. 81. [*Tachina*] (1824) et VII. 206. 3. Europa, [*Gymnosoma*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III. 1224. 1. (1844) et Transcaspia. XIII. 6159. 1. [*Wahlbergia*] (1859); SCHN., F. A., I. 420. (1862);

R.-D., Posth., II. 23. 1. [*Wahlbergia*] (1863); BOSSD., Finnl. Insekt., II. 113. I. [*Wahlbergia*] (1866); EXG., Entom. Nachricht., XII. 47. 10. (1886); Mik. Entom. Nachricht., XII. 204. 2. (1886), Wien. entom. Zeitg., VII. 302. 67. (1888) et X. 5. 88. (1891); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. XI. f. 288. (1889).

anthophila Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 310. 169. [*Apostrophus*] (1871); v. RÖD., Entom. Nachricht., X. 255. [*Apostrophus*] (1884); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX. 219. (1893). *appendiculata* PERR., Soc. linn. Lyon, 1852. 66. [*Phania*] (1852); PAND., Rev. entom., XIII. 68. 4. [*Phania*] (1894).

dimidiata ZETT., Dipt. Scand., III. 1225. *observ.* (1844) et XIII. 6159. 2. [*Wahlbergia*] (1859); SEMX., F. A., I. 420. (1862); R.-D., Posth., II. 23. 2. [*Wahlbergia*] (1863).

forcipata BIG., Annal. Soc. entom. France, (6). I. 368. [*Melia*] (1881) et Wien. entom. Zeitg., IX. 317. [*Melia*] (1890); BRUCKER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. 502. 21. (1899).

incompleta B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 411. (1894), *nomen nudum*.

lateralis FALL. (*nec* FABR.), Dipt. succ. Rhizom., 6. 3. [*Ocyptera*] (1820); PAND., Rev. entom., XIII. 69. 6. [*Phania*] (1894).

reflexa R.-D., Myod., 233. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 187. 7. [*Ocyptera*] (1835); MEG., S. B., VII. 216. 11. [*Ocyptera*] (1838).

suspecta Lw., Schrift. Ges. Fr. Nat. Moscou, 1870. 58. 79. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 312. 170. [*Apostrophus*] (1871).

reflexa R.-D. = **melanura** MEG.

suspecta Lw. = **melanura** MEG.

Phaniosoma

ROSD., Dipt. ital. Prodr., I. 74. 50. (1856) et IV. 72. 50. (1860).

apenninum ROSD. — **lateritium** MEG.

lateritium MEG., S. B., IV. 220. 3. (1844) et VII. 189. 3. [*Phania*] Europa mer. (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 183. 3. [*Phania*] (1835); ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 42. [*Phania*] (1868); v. RÖD., Entom. Nachricht., XVII. 83. [*Phania*] (1891); PAND., Rev. entom., XIII. 67. [*Phania*] (1894); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 141. (1900).

apenninum ROSD., Dipt. ital. Prodr., I. 74. (1856) et IV. 73. 1. (1860); JAKOSCH., Trudy naturf. Ges. Karkoff, XX. 18. 24. (1886); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. XI. f. 219. (1889); Mik. Wien. entom. Zeitg., XVII. 198. II. t. II. f. 3. (1898).

phaniaeforme EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 215. [*Redtenbacheria*] (1861); SEMX., F. A., I. 512. [*Redtenbacheria*] (1862).

phaniaeforme EGG. = **lateritium** MEG.

Phania

MEIG., S. B., IV. 218. CXLVI. (1824).

- vittata** MEIG., S. B., IV. 219. 2. (1824) et VII. 189. 2. (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 183. 2. (1835); RONDI., Dipt. ital. Prodr., IV. 76. 1. (1860); SCHN., F. A., I. 421. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 291. (1889); v. RÖD., Entom. Nachricht., XVII. 83. (1891); PAND., Rev. entom., XIII. 66. 2. (1894). Europa centr. et mer.

Evihrissa

RONDI., Dipt. ital. Prodr., IV. 74. (1860) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 224. (1865).

- obscuripennis** MEIG., S. B., IV. 219. 1. t. XI. f. 8. (1824) et VII. 189. 1. [*Phania*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 183. 1. [*Phania*] (1835); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 612. [*Phania*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3256. 2—3. [*Phania*] (1849); RONDI., Dipt. ital. Prodr., IV. 75. 1. (1860); SCHN., F. A., I. 42. [*Phania*] (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. XI. f. 290. (1889); v. RÖD., Entom. Nachricht., XVII. 83. [*Phania*] (1891); PAND., Rev. entom., XIII. 65. 1. [*Phania*] (1894). Europa centr. et mer.

Euthera

Law., Berlin. entom. Zeitschr., X. 47. *nota*. (1866).

- Mannii** MÜK., Wien. entom. Zeitg., VIII. 132. fig. (1889); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. X. f. 278. (1889). Europa mer., Asia min.

Schineria

RONDI., Dipt. ital. Prodr., II. 12. (1857) et III. 45. 10. (1859).

- tergestina** RONDI., Dipt. ital. Prodr., II. 12. (1857) et III. 46. 1. (1859); SCHN., F. A., I. 430. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. V. f. 282. (1889). Europa mer.

Hermyia

R.-D., Myod., 226. IV. [*Hermyia*] (1830).

Paraphania B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. 141. (1889)

et LX. 153. (1893). *jt narobus S. de J. End/Hpe.*

- Beelzebul** WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 301. 37. [*Tachina*] (1830); WELF., Cat. Dipt. South. Asia, 135. [*Orectocera*] (1896); COQUILL., Proc. Unit. Stat. Museum, XXI. 331. [*Paraphania*] (1897). Japonia, China.

Imbrasus WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 788. [*Tachina*]

jt afa B. from Brazil!

(1849) et Proc. linn. Soc. London, I. 126, 113. [*Tachina*]
(1856): WULF, Cat. Dipt. South. Asia, 135. [*Megistogaster*]
(1896).

Imbricatus WALK. — **Beelzebul** WIED.

Cystogaster

LATR., Règne anim., V. 500. [*Cystogaster*] (1829) *em.* SCUDD. 1882.

Pallasia R.-D., Myod., 239. II. (1830).

dispar FALL. = **globosa** FABR.

fulvicollis v. ROS. = **globosa** FABR.

globosa FABR., Syst. entom., 770. 40. [*Musca*] (1775), Spec. ins., II. Europa.
432. 56. [*Syrphus*] (1781), Entom. syst., IV. 304. 39. [*Syrphus*]
(1794) et Syst. Anth., 311. 13. [*Tachina*] (1805); GMEL., Syst. Nat.,
V. 2875. 360. [*Musca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 458. 123.
[*Musca*] (1789); MEIG., S. B., IV. 206. 3. t. XXXIX. f. 22.
[*Gymnosoma*] (1824) et VII. t. LXIX. f. 25-29. (1838); R.-D.,
Myod., 239. 1. [*Pallasia*] (1830) et Posth., II. 192. 1. (1863);
MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 210. 1. t. II. f. 10. (1834) et Suit.
à Buff., II. 190. 1. t. XV. f. 6. (1835); BLANCH., Hist. nat. ins.,
III. 612. (1840); ZETT., Dipt. Scand., III. 1228. 1. (1844); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., IV. 693. [*Gymnosoma*] (1849); SCHN., F.
A., I. 411. (1862); BOSSD., Fönnl. Insekt., II. 115. 1. (1866);
PAND., Rev. entom., XIII. 82. 3. [*Gymnosoma*] (1894).

dispar FALL., Dipt. succ. Rhizom., 9. 2. [*Gymnosoma*] (1820);

ROSD., Dipt. ital. Prodr., V. 30. 1. (1862).

fulvicollis v. ROS., Württemb. Corrbll., I. 57. [*Gymnosoma*] (1840).

ovata R.-D., Myod., 239. 2. [*Pallasia*] (1830); MACQ., Soc. Sci.

Lille, 1833. 211. 3. (1834) et Suit. à Buff., II. 190. 2. (1835).

punctata R.-D., Posth., II. 193. 1. (1863).

ovata R.-D. = **globosa** FABR.

punctata R.-D. = **globosa** FABR.

Tamiclea

MACQ., Mém. Soc. Sci. Lille, 1835. 188. (1836).

Androphana B. B., Denkschr. Akad. Wien, LV1. 149. (1889)
et LX. 156. (1893).

Christophoria ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 48. [*Cristo-*
foria] (1868).

Etheria R.-D., Posth., II. 273. II. (1863) *acc.* LAM. 1863. Moll.

Maculia R.-D., Posth., II. 279. IV. (1863).

Mikiella MEUS., Bull. Soc. entom. France, 1893. CCLXXV.
(1893); MÜK., Wien. entom. Zeitg., XIII. 50. (1894).

- Opesia* R.-D., Posth., II. 276. III. (1863).
- Philopsis* R.-D., Posth., II. 272. I. (1863) *nee* KAUPE, 1851. Aves.
- adpersa* R.-D. = **gagatea** R.-D.
- anicula** MEIG., S. B., IV. 409. 295. [*Tachina*] (1824) et VII. 207. 2. Germania.
[*Cystogaster*] (1838).
- austriaca** MEUN., Bull. Soc. entom. France, 1893. CCLXXV. [*Miki-* Austria.
ella] (1893).
- cana* STROBL = **globulus** MEIG.
- cinerea* MACQ. = **globulus** MEIG.
- dispar** DUF.)*, Annal. Soc. entom. France, (2). IX. 66. [*Hyalomysia*] Gallia.
(1851); PAND., Rev. entom., XV., 115. 1. [*Etheria*] (1896).
? *occlusa* R.-D., Posth., II. 278. 5. [*Opesia*] (1863).
- florilega* R.-D. = **gagatea** R.-D.
- gagatea** R.-D., Posth., II. 276. 1. [*Opesia*] (1863). Gallia.
adpersa R.-D., Posth., II. 277. 2. [*Opesia*] (1863); BRACER,
Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 510. 116. (1898).
florilega R.-D., Posth., II. 277. 3. [*Opesia*] (1863).
- globulus** MEIG., S. B., IV. 367. 221. [*Tachina globulata*] (1824) et VII. Europacentr.
207. 7. [*Cystogaster*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 212. 1. et mer.
[*Strongylogaster*] (1834) et Suit. à Buff., II. 191. 1. t. XV. f. 7.
[*Strongylogaster*] (1835); SCHIX., F. A., I. 499. [*Syptomogaster*]
(1862); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 49. [*Christophoria*]
(1868); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI. 138. (1900).
cana STROBL (*nee* MEIG.), Wiss. Mittheil. Steierm., XXX. 46.
[*Xysta*] (1894).
cinerea MACQ., Soc. Sci. Lille, 1835. 188. t. I. (1836); VILLEN.,
Bull. Soc. entom. France, 1899. 160. (1899) et Wien. entom.
Zeitg., XXV. 43. (1906).
grandis SCHIX. (*nee* Egg.), F. A., I. 408. [*Xysta*] (1862); B. B.,
Denkschr. Akad. Wien, LVI. 171. [*Androphana*] (1889).
grisea PAND. (*nee* R.-D.), Rev. entom., XV. 116. 2. [*Etheria*]
(1896); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1899. 402. 15.
(1899).
pedicellata R.-D., Posth., II. 275. 1. [*Etheria*] (1863); BRACER,
Sitzgsber. Akad. Wien, CVII. 510. 117. (1898).
- grandis* SCHIX. = **globulus** MEIG.
- grisea** R.-D., Posth., II. 278. 4. [*Opesia*] (1863). Gallia.
- lesinensis** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 96. [*Xysta*] (1893). Dalmatia.
- occlusa* R.-D. = ? **dispar** DUF.
- pedicellata** PAND. (*nee* R.-D.), Rev. entom., XV. 117. 4. [*Etheria*] Gallia mer.
(1896).
- pedicellata* R.-D. = **globulus** MEIG.
- petiolata** STROBL., XIV. Progr. Seitenst., 60. [*Xysta*] (1880), Wien. Austria.
entom. Zeitg., XII. 97. [*Xysta*] (1893) et Mittheil. Ver. Steierm.,
XXX. 47. [*Xysta*] (1894).

*) *Brachyderes lusitanicus* FABR.

- punctata** R.-D., Posth., II, 273, 1. [*Macalia*] (1863). Gallia.
punctiventris ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6093, 83-84. [*Tachina*] Scandinavia.
 (1859).
rufitibia STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., XXX, 47. [*Xysta*] (1894). Austria.
sexmaculata R.-D., Posth., II, 273, 1. [*Ptilopsis*] (1863). Gallia.
vernalis R. D., Posth., II, 275, 2. [*Etheria*] (1863). Gallia mer.

Xysta

MEIG., S. B., IV, 181, CXLII (1824).

- cana** MEIG., S. B., IV, 201, 30. [*Phasia*] (1824) et VII, 282, 3. (1838): Europa.
 MACQ., Suit. à Buff., II, 200, 4. [*Helomyia*] (1835); SCHN., F. A., I, 407. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 388. (1891);
 STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 133. (1900); STROBL., Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV, 508. (1902) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., IX, 570. (1904).
Rolli ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6170, 16. [*Phasia*] (1859);
 BOSSD., Föuml. Insekt., II, 123, 5. [*Phasia*] (1866); WALLGR., Entom. Tidskr., I, 17, 1. [*Phasia*] (1880); GUSCEN., Entom. Nachricht., XIII, 7, 5. (1887); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), IX, 39. [*Phasia*] (1898); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LX, 224. (1893); ♀ PAND., Rev. entom., XIII, 91, 4. [*Phasia*] (1894).
cana PAND. = **sola** ROSE.
cilipes MEIG. = **holosericea** FABR. ♀
grandis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X, 796. (1860); B. B., Austria.
 Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 388. (1891).
holosericea FABR., Syst. Antl., 218, 5. [*Thoreca*] (1805); MEIG., S. B., IV, 182, 2. (1824); MACQ., Suit. à Buff., II, 195, 2, t. XV, f. 9. (1835); SCHN., F. A., I, 407. (1862); PAND., Rev. entom., XIII, 93, 3. [*Phasia*] (1894). Europa-centr.
 et mer.
cilipes MEIG., S. B., IV, 182, 1, t. XXXIX, f. 5. (1824); MACQ., Suit. à Buff., II, 195, 1. (1835); BRANON., Hist. nat. ins., III, 613. (1840); ROSE., Dipt. ital. Prodr., V, 32, 1. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 125. (1891).
Latreillei R.-D., Myod., 286, 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 193, 3. (1835).
Latreillei R.-D. = **holosericea** FABR.
Rolli PAND. = **cana** MEIG. ♀, et **semicana** Egg. ♂
Rolli ZETT. = **cana** MEIG.
semicana Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X, 797. (1860); SCHN., F. A., I, 407. (1862); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII, 388. (1891). Europa-centr.
 et mer.
Rolli ♂ PAND., Rev. entom., XIII, 91, 1. [*Phasia*] (1891).
villana R.-D., Posth., II, 286, 7. [*Clytia*] (1863); BRACER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 510, 115. (1898).

- sola** ROSS., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 220, 6, [*Phasia*] (1861) et Dipt. ital. Prodr., V, 40, 6, [*Phasia*] (1862); BEZZI, Bull. Soc. entom. ital., XXVII, 56, [*Phasia*] (1895); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 510, (1898). Europa mer.
- vana* PANZ. (nec MEG.), Rev. entom., XIII, 92, 2, [*Phasia*] (1894).
- testaceicornis** v. ROSS., Württemb. Corbl., I, 57, (1840). Germania.
- villana* R.-D. = **semicana** EGG.

Clytiomyia

ROSS., Dipt. ital. Prodr., IV, 9, [*Clytiomyia*] (1860) et V, 41, 8, (1862).

Arisbava R.-D., Posth., II, 290, VII, (1863).

Clytia R.-D., Myod., 287, 4, (1830) nec LAM. 1812, Moll.

Chryseria R.-D., Posth., II, 288, VI, (1863).

Phanigaster LUOY, Atti Istit. ven., (3), X, 61, (1865).

A. *Clytiomyia* s. str.

- aurantiaca** MEG., S. B., IV, 207, 5, [*Gymnosoma*] (1824) et VII, 207, 5, [*Cystogaster*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 211, 2, [*Cystogaster*] (1834) et Suit. à Buff., II, 190, 3, [*Cystogaster*] (1835); R.-D., Posth., II, 194, 3, [*Cystogaster*] (1863); STEIN, Entom. Nachricht., XXVI, 132, (1900). Germania.
- aurea** R.-D., Posth., II, 281, 1, [*Clytia*] (1863). Gallia.
- continua** PANZ., Fauna germ., LX, 19, [*Musca*] (1798); MEG., S. B., IV, 276, 65, [*Tachina*] (1824) et VII, 205, 2, 1, LXIX, f. 20-21, [*Clytia*] (1838); R.-D., Myod., 288, 5, [*Clytia*] (1830) et Posth., II, 282, 2, [*Clytia*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 254, 2, [*Clytia*] (1834), Suit. à Buff., II, 151, 2, [*Clytia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), II, 413, 3, t. XIV, f. 14, [*Clytia*] (1854); ZETT., Dipt. Scand., III, 1085, 82, [*Tachina*] (1844); WALK., Ins. Brit., II, 33, 32, [*Tachina*] (1853); ROSS., Dipt. ital. Prodr., V, 42, 1, (1862); SCHN., F. A., I, 524, [*Clytia*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., (2), III, 78, [*Clytia*] (1892); PANZ., Rev. entom., XIII, 95, 5, [*Phasia*] (1894). Europacentr. et mer., Africa sept.
- pratensis* R.-D., Myod., 289, 6, [*Clytia*] (1830) et Posth., II, 284, 3, [*Clytia*] (1863).
- vaga* R.-D., Myod., 289, 7, [*Clytia*] (1830) et Posth., II, 284, 4, [*Clytia*] (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 255, (119), 4, [*Clytia*] (1834) et Suit. à Buff., II, 151, 4, [*Clytia*] (1835); MEG., S. B., VII, 206, 7, [*Clytia*] (1838).
- cylindrica** R.-D., Myod., 288, 3, [*Clytia*] (1830) et Posth., II, 288, 1, [*Chryseria*] (1863); MACQ., Suit. à Buff., II, 151, 3, [*Clytia*] (1835); MEG., S. B., VII, 206, 6, [*Clytia*] (1838). Gallia.
- dalmatica** R.-D., Myod., 287, 1, [*Clytia*] (1830); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVII, 509, 114, [*Clytia*] (1898). Dalmatia.

latifrons STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII, 98, [*Clytia*] (1893).

gentilis R.-D. = **helluo** FABR.

✓ **helluo** FABR., Syst. Anth., 295, 58, [*Musca*] (1805).

Europa.

gentilis R.-D., Myod., 288, 4, [*Clytia*] (1830) et Postl., II, 289.

2, [*Chryseria*] (1863).

helvola R.-D., Postl., II, 286, 8, [*Clytia*] (1863).

helvola MEG., S. B., IV, 277, 66, [*Tachina*] (1824) et VII, 205.

3, [*Clytia*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 254, 3, [*Clytia*]

(1834), Suit. à Buff., II, 152, 6, [*Clytia*] (1835) et Annal.

Soc. entom. France, (3), II, 412, 1, t. XIV, f. 13, [*Clytia*]

(1854); SCHIX., F. A., I, 524, [*Clytia*] (1862); ROSD., Dipt.

ital. Prodr., V, 43, 2, (1862); LAOY, Atti Istit. ven., (3), X,

61, [*Phanigaster*] (1865); PANZ., Rev. entom., XIII, 95, 6,

[*Phasia*] (1894).

pellucens MACQ. (nec FALL.), Soc. Sci. Lille, 1833, 254, 1, t. IV,

f. 5, [*Clytia*] (1831), Suit. à Buff., II, 151, 1, t. XIV, f. 17,

[*Clytia*] (1835) et Annal. Soc. entom. France, (3), II, 413, 2,

t. XIV, f. 14, [*Clytia*] (1854).

helvola R.-D. = **helluo** FABR.

helvola MEG. = **helluo** FABR.

lateralis R.-D., Postl., II, 291, 1, [*Arisbaca*] (1863).

Corsica.

latifrons STROBL = **dalmatica** R.-D.

pellucens MACQ. = **helluo** FABR.

pratensis R.-D. = **continua** PANZ.

ruralis R.-D., Postl., II, 285, 6, [*Clytia*] (1863).

Gallia.

sejuncta ROSD., Dipt. ital. Prodr., V, 44, 3, (1862).

Italia.

testaceifrons v. ROS., Württemb. Corubl., I, 58, [*Tachina*] (1840).

Germania.

vaga R.-D. = **continua** PANZ.

vernalis R.-D., Postl., II, 285, 5, [*Clytia*] (1863,^{*)})

Gallia.

B. *Subclytia*

PANZ., Rev. entom., XIII, 36, 1, et 96, 1, (1891).

rotundicollis R.-D. = **rotundiventris** FALL.

rotundiventris FALL., Dipt. succ. Musc., 23, 46, [*Tachina*] (1820); Europa.

MEG., S. B., IV, 356, 204, [*Tachina*] (1824) et VII, 205, 1, t.

LXIX, f. 22-24, [*Clytia*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III, 1086,

83, [*Tachina*] (1844); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3), II,

415, 6, t. XIV, f. 13, [*Clytia*] (1854); SCHIX., F. A., I, 524, [*Cly-*

tia] (1862); MEYER, Entom. Monthly Mag., (2), III, 79, [*Clytia*]

(1892); PANZ., Rev. entom., XIII, 96, 1, (1891).

rotundicollis R.-D., Postl., II, 287, 9, [*Clytia*] (1863).

*) *auricola* MEG., ap. B. B., Denkschr. Akad. Wien., LVIII, 412, [*Clytia*] (1891) est nomen nudum.

C. Heliozeta

ROSD., Dipt. ital. Prodr., I. 82. 9. (1856) et V. 45. 9. [*Heliozeta*] (1862) *em.* SCDD. 1882.

auriceps MACQ. = **pellucens** FALL.

deceptoria PODA — ? **pellucens** FALL.

fumipennis ZETT. = **pellucens** FALL.

macrocera MACQ. = **pellucens** FALL.

pellucens FALL., Dipt. succ. Musc., 22. 45. [*Tachina*] (1820); MEIG., Europa.

S. B., IV. 275. 64. [*Tachina*] (1824) et VII. 205. 1. t. LXIX. f.

14—19. [*Clytia*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., III. 1084. 81. (1844)

et XIII. 6092. 81. [*Tachina*] (1859); ROSD., Dipt. ital. Prodr., V.

45. 1. (1662); SCHX., F. A., I. 524. [*Clytia*] (1862); BONSD.,

Finnl. Insekt., II. 70. 54. [*Tachina*] (1866); PAND., Rev. entom.,

XIII. 95. 7. [*Phasia*] (1894).

auriceps MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 414. 4. t.

XIV. f. 13. [*Clytia*] (1854).

? *deceptoria* PODA, Ins. Mus. graec., 116. 15. [*Musca*] (1761):

SCOP., Entom. carn., 330. 884. [*Musca*] (1763); VILL., Entom.

lim., III. 512. 256. [*Musca*] (1789); SCHX., Verh. zool.-bot.

Ges. Wien, VI. 403. 15. (1856).

fumipennis ZETT., Dipt. Scand., XIII. 6093. 81—82. [*Tachina*]

(1859).

macrocera MACQ., Suit. à Buff., II. 151. 5. [*Clytia*] (1835);

MEIG., S. B., VII. 206. 8. [*Clytia*] (1838).

tephra MEIG., S. B., IV. 364. 216. [*Tachina*] (1824) et VII. 205. 5. Europa-centr.

[*Clytia*] (1838); MACQ., Annal. Soc. entom. France, (3). II. 414. et mer.

5. t. XIV. f. 14. [*Clytia*] (1854); SCHX., F. A., I. 524. [*Clytia*]

(1862).

Phasia

LATR., Hist. nat. Crust. Ins., IV. (1802) et XIV. 379. (1804).

Eratia R.-D., Posth., II. 237. IV. (1863).

Therera FABR., Entom. syst. Suppl., 560. (1798) et Syst. Antl.,

257. 51. (1805) *nee* LATR. 1796. Dipt.

alatterina ROSD. = **crassipennis** FABR. *var. nigra* G.

agrestis R.-D. = **crassipennis** FABR. *var. nigra* G.

agricola R.-D. = **crassipennis** FABR. *var. micans* G.

albifacies R.-D. = **crassipennis** FABR. ♀

albifrons R.-D. = **crassipennis** FABR. ♀

analís FABR. = **crassipennis** FABR. ♀

ancora MEIG. = **crassipennis** FABR. *var. micans* G.

appendiculata JACOBS., Ann. Mus. Zool. St. Peterb., 1899. 297. f. Asia centr.

1—2. (1899).

arcensis R.-D. = **crassipennis** FABR. *var. rubra* G.

atratella R.-D. = **crassipennis** FABR. ♀

- aurifrons* VILL. = ? **crassipennis** FABR. ♀
axillaris MEIG. = **crassipennis** FABR. ♀
basalis MEIG. = **crassipennis** FABR. ♀
brachyptera PANZ. **crassipennis** FABR. var. **micans** G.
campestris R.-D. = **crassipennis** FABR. var. **nigra** G.
cinerella R.-D. = **crassipennis** FABR. ♀
crassipennis FABR.*). Entom. syst., IV, 284, 23. [*Syrphus*] (1794). Europa.
 Suppl., 560, 3. [*Thereva*] (1798) et Syst. Anth., 248, 3. [*Thereva*]
 (1805); COQUEL., Illustr. icon., 102, t. XXIII, f. 10. [*Thereva*]
 (1804); PANZ., Fauna germ., LXXIV, 15. [*Thereva*] (1801); LATR.,
 Gen. crust. insect., IV, 344. (1809); MEIG., S. B., IV, 186, 1.
 (1824) et VII, t. LXXIII, f. 41. (1838); R.-D., Myod., 290, 1.
 (1830), Annal. Soc. entom. France, (1), X, 274. (1841) et Posth.,
 II, 262, 1. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 199, 1, t. II, f.
 5. (1834) et Suit. à Buff., II, 198, 1, t. XV, f. 10. (1835); DUF.,
 Annal. Soc. entom. France, (2), VI, 443, t. VIII, n. 11. (1848);
 WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 689. (1849); SCHN., F. A., I,
 400. (1862); GIBSCH., Entom. Nachricht., XIV, 230. (1888) et
 Illustr. Wochenschr. Entom., II, 34. (1896); PANZ., Rev. entom.,
 XIII, 91, 1. (1894).
albifacies R.-D., Myod., 293, 8. (1830).
albifrons R.-D., Posth., II, 225, 20. (1863).
analis FABR., Entom. syst. Suppl., 561, 5. [*Thereva*] (1798) et
 Syst. Anth., 219, 7. [*Thereva*] (1805); PANZ., Fauna germ.,
 LXXIV, 17. [*Thereva*] (1801); COQUEL., Illustr. icon., 102, t.
 XXIII, [*Thereva*] (1804); MEIG., S. B., IV, 187, 2. (1824);
 SCHN., F. A., I, 393. (1862).
atratella R.-D., Posth., II, 224, 19. (1863).
 ?*aurifrons* VILL., Entom. linn., III, 549, 393, t. X, f. 10. [*Musca*]
 (1789).
axillaris MEIG., S. B., VII, 285, 6. (1838).
basalis MEIG., S. B., VII, 285, 7. (1838).
cinerella R.-D., Posth., II, 223, 17. (1863).
dimidiata PANZ., Fauna germ., LX, 17. [*Musca*] (1798).
fasciana R.-D., Posth., II, 213, 9. (1863).
fasciornis R.-D., Posth., II, 223, 18. (1863).
fascipes R.-D., Posth., II, 219, 14. (1863).
holosericea R.-D., Posth., II, 211, 7. (1863).
occlusa R.-D., Posth., II, 238, 1. [*Eratia*] (1863).
palvirentata BIG., Annal. Soc. entom. France, (3), VIII, 778.
 (1860); GIBSCH., Illustr. Wochenschr. Entom., III, 181. (1897).
 var. **micans** GIBSCH., Entom. Nachricht., XIV, 231. (1888).
agricola R.-D., Posth., II, 221, 16. (1863).
ancora MEIG., S. B., IV, 189, 5. (1826).
brachyptera PANZ., Fauna germ., LX, 16. [*Musca*] (1798); MEIG.,

*) Rhabdigeraster grisea F.

- S. B., IV. 188. 3. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 199. 5. (1835).
- diluta* MEIG., S. B., IV. 189. 6. (1826).
- flavicinctris* MEIG., S. B., IV. 366. 33. (1830).
- obscuripennis* R.-D., Myod., 293. 10. (1830) et Posth., II. 220. 15. (1863).
- placida* R.-D., Posth., II. 218. 13. (1863).
- taeniata* PANZ., Fauna germ., LX. 18. [*Musca*] (1798); MEIG., S. B., IV. 188. 4. (1824); R.-D., Myod., 293. 9. (1830) et Posth., II. 216. 12. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 199. 4. (1835); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 613. (1840); RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 215. 5. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 39. 5. (1862).
- var. nigra* GURSCH., Entom. Nachricht., XIV. 231. (1888).
- adalterina* RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 220. 4. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 39. 4. (1862).
- agrestis* R.-D., Myod., 292. 6. (1830).
- campestris* R.-D., Myod., 292. 5. (1830).
- dorsalis* R.-D., Posth., II. 212. 8. (1863).
- lineata* R.-D., Posth., II. 214. 11. (1863).
- nigra* R.-D., Myod., 291. 2. (1830) et Posth., II. 208. 5. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 200. (64). 3. (1834) et Suit. à Buff., II. 199. 2. (1835); MEIG., S. B., VII. 286. 15. (1838); RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 215. 3. (1861), VIII. 225. (1865) et Dipt. ital. Prodr., V. 38. 3. (1862).
- tessellata* R.-D., Posth., II. 214. 10. (1863).
- var. rubra* GURSCH., Entom. Nachricht., XIV. 231. (1888).
- arvensis* R.-D., Myod., 292. 7. (1830) et Posth., II. 204. 2. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 200. (64). 2. (1834); MEIG., S. B., VII. 287. 16. (1838).
- discoidealis* Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 200. (64). 4. (1834); MEIG., S. B., VII. 286. 13. (1838); R.-D., Posth., II. 207. 4. (1863).
- discoidea* MEIG., S. B., VII. 285. 2. (1838).
- dispar* RONDI., N. Ann. Sci. Nat. Bologna, VIII. 456. (1842), Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 219. 2. (1861), VIII. 225. (1865) et Dipt. ital. Prodr., V. 37. 2. (1862).
- dissimilis* RONDI., N. Ann. Sci. Nat. Bologna, VIII. 456. (1842), Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 219. 1. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 36. 1. (1862).
- hemiptera* PANZ., Fauna germ., LIX. 15. [*Syrphus*] (1798).
- nuculosa* R.-D., Posth., II. 206. 3. (1863).
- oblonga* R.-D., Myod., 291. 4. (1830) et Posth., II. 209. 6. (1863); Macq., Suit. à Buff., II. 199. 3. (1835); MEIG., S. B., VII. 286. 14. (1838); GURSCH., Illustr. Wochenschr. Entom., II. 36. f. VII. (1896).
- varia* MEIG., S. B., VII. 285. 3. (1838).

- var. strigata* GÜRSCHN., Entom. Nachricht., XIV, 231, f. 1. (1888) et Illustr. Wochenschr. Entom., II, 36, f. 6. (1896).
- crassipennis* AUCTORUM.
- rostrata* Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X, 795. (1860); SCHN., F. A., I, 400. (1862).
- vagans* MEIG., S. B., VI, 366, 32. (1830).
- dilatata* MEIG. = *crassipennis* FABR. *var. micans* G.
- dimidiata* PANZ. = *crassipennis* FABR. ♀
- discoidalis* MACQ. = *crassipennis* FABR. *var. rubra* G.
- discoidea* MEIG. = *crassipennis* FABR. *var. rubra* G.
- dispar* ROND. = *crassipennis* FABR. *var. rubra* G. et *strigata* G.
- dissimilis* ROND. = *crassipennis* FABR. *var. micans* G. et *rubra* G.
- dorsalis* R.-D. = *crassipennis* FABR. *var. nigra* G.
- flaviventris* MEIG. = *crassipennis* FABR. *var. micans* G.
- fuscana* R.-D. = *crassipennis* FABR. ♀
- fuscicornis* R.-D. = *crassipennis* FABR. ♀
- fuscipes* R.-D. = *crassipennis* FABR. +
- hemiptera* PANZ. = *crassipennis* FABR. *var. rubra* G.
- holosericea* R.-D. = *crassipennis* FABR.
- leucoptera** ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII, 224. (1865); B. B., Europa mer., Denkschr. Akad. Wien, LX, 222. (1893); MINA PAL., Nat. Sicil., Asia min., XIV, 19, II, (1896); BEZZI et DESTEE, Nat. Sicil., (2), II, 59. (1897).
- magnifica* GÜRSCHN., Illustr. Wochenschr. Entom., II, 33, f. 1—V. (1896) et III, 184. (1897).
- lineata* R.-D. = *crassipennis* FABR. *var. nigra* G.
- maculosa* R.-D. = *crassipennis* FABR. *var. rubra* G.
- magnifica* GÜRSCHN. = *leucoptera* ROND.
- micans* GÜRSCHN. = *crassipennis* FABR. *var.*
- nigra* GÜRSCHN. = *crassipennis* FABR. *var.*
- nigra* R.-D. = *crassipennis* FABR. *var. nigra* G.
- oblonga* R.-D. = *crassipennis* FABR. *var. rubra* G.
- obscuripennis* R.-D. = *crassipennis* FABR. *var. micans* G.
- occlusa* R.-D. = *crassipennis* FABR. ♀
- placida* R.-D. = *crassipennis* FABR. *var. micans* G.
- pulverulenta* BIG. = *crassipennis* FABR. ♀
- rostrata* Egg. = *crassipennis* FABR. *var. strigata* G.
- rotundiventris** LAW., Woch. entom. Monatschr., II, 109, 15. (1858). Japonia
- rubra* GÜRSCHN. = *crassipennis* FABR. *var.*
- strigata* GÜRSCHN. = *crassipennis* FABR. *var.*
- taeniata* PANZ. = *crassipennis* FABR. *var. micans* G.
- tessellata* R.-D. = *crassipennis* FABR. *var. nigra* G.
- vagans* MEIG. = *crassipennis* FABR. *var. strigata* G.
- varia* MEIG. = *crassipennis* FABR. *var. rubra* G.

Helomyia

R.-D., Myod., 296. VII. [*Elomyia*] (1830) *em.* SCIDD. 1882.

Ananta MEIG., S. B., VII. 283. 2. (1838).

abdominalis R.-D. = **lateralis** MEIG.

albisetula MACQ. = **lateralis** MEIG.

albicilliosa MACQ. = **lateralis** MEIG.

aurulans R.-D. = **lateralis** MEIG.

claripennis R.-D. = **lateralis** MEIG.

collinaris R.-D. = **lateralis** MEIG.

flaviventris MACQ. = **lateralis** MEIG.

lateralis MEIG., S. B., IV. 201. 29. [*Phasia*] (1824) et VII. 284. 2. Europa centr. et mer.

[*Ananta*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. 200. 3. (1835); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 213. 1. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 24. 1. (1862); SCHIX., F. A., I. 401. [*Ananta*] (1862); R.-D., Posth., II. 233. 5. (1863); PAND., Rev. entom., XIII. 89. 1. (1894); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1903. 194. (1903).

abdominalis R.-D., Myod., 297. 5. (1830) et Posth., II. 236. 11. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 4. II. f. 7. (1834) et Suit. à Buff., II. 200. 5. (1835); MEIG., S. B., VII. 287. 4. [*Ananta*] (1838); VILLEN., Bull. Soc. entom. France, 1903. 194. 4. (1903).

albisetula MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 204. (68). 4. (1834); R.-D., Posth., II. 237. 12. (1863).

albicilliosa MACQ., Suit. à Buff., II. 201. 7. (1835); MEIG., S. B., VII. 287. 5. [*Ananta*] (1838); SCHIX., F. A., I. 401. [*Ananta*] (1862).

aurulans R.-D., Myod., 297. 3. (1830) et Posth., II. 235. 8. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 203. (67). 2. (1834); MEIG., S. B., VII. 288. 7. [*Ananta*] (1838).

claripennis R.-D., Myod., 297. 2. (1830) et Posth., II. 234. 7. (1863).

collinaris R.-D., Posth., II. 236. 10. (1863).

flaviventris MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 204. (68). 8. (1834); MEIG., S. B., VII. 288. 9. [*Ananta*] (1838); SCHIX., F. A., I. 401. [*Ananta*] (1862); R.-D., Posth., II. 232. 3. (1863).

lugubris ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 218. 2. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 24. 2. (1862).

nebulosa R.-D. (*nec* PANZ.), Myod., 296. 1. (1830) et Posth., II. 234. 6. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 203. (67). 1. (1834) et Suit. à Buff., II. 200. 1. t. XV. f. 11. (1835); MEIG., S. B., VII. 287. 6. [*Ananta*] (1838); SCHIX., F. A., I. 401. [*Ananta*] (1862); GURSCH., Wien. entom. Zeitg., V. 67. (1886).

nigra R.-D., Myod., 297. 4. (1830) et Posth., II. 235. 9. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 203. (67). 3. (1834) et Suit. à Buff., II. 200. 2. (1835); MEIG., S. B., VII. 288. 8. [*Ananta*] (1838).

ornata MEIG., S. B., IV, 202, 31. [*Phasia*] (1824) et VII, 283, 3, t. LXXIII, f. 42. [*Avanta*] (1838); ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 214, 4, (1861) et Dipt. ital. Prodr., V, 26, 4, (1862); R.-D., Posth., II, 231, 2, (1863).

parva ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI, 48, (1868).

?*punctata* MEIG., S. B., IV, 260, 28. [*Phasia*] (1824) et VII, 284, 1. [*Avanta*] (1838); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 204, 5, (1834) et Suit. à Buff., II, 201, 6, (1835); R.-D., Posth., II, 232, 4, (1863).

rubida R.-D., Posth., II, 230, 1, (1863).

umbripennis ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 218, 3, (1861) et Dipt. ital. Prodr., V, 25, 3, (1862).

lugubris ROXD. **lateralis** MEIG.

acbulosa R.-D. **lateralis** MEIG.

nigra R.-D. **lateralis** MEIG.

ornata MEIG. **lateralis** MEIG.

parva ROXD. **lateralis** MEIG.

punctata MEIG. ?**lateralis** MEIG.

rubida R.-D. **lateralis** MEIG.

umbripennis ROXD. **lateralis** MEIG.

Allophora

R.-D., Myod., 293, VI. [*Allophora*] (1830). *em.* Mik, Wien. entom. Zeitg., XIII, 49, 22, (1894); GIESCH., Zeitschr. Naturwiss., LX, 9, (1888).

Halophora PAND., Rev. entom., XIII, 31, III, (1894).

A. *Allophora* s. str.

GIESCH., Zeitschr. Naturwiss., LX, 9, (1888)

affinis FABR. **hemiptera** FABR.

coleoprata LATR. **hemiptera** FABR.

crassipennis DUM. **hemiptera** FABR.

crinita GIESCH. **hemiptera** FABR. *var.*

ferruginea R.-D. **hemiptera** FABR. *var. eximia* G.

hemiptera FABR. (*sensu* GIESCH.), Entom. syst., IV, 281, 22. [*Symphysus*] (1791), Suppl., 569, 2. [*Therera*] (1798) et Syst. Antl., 218, 2. [*Therera*] (1805); SCHAEFF., Icon. insect., 1, 71, f. 6, [] (1769); SCHELL., Gen. Monch. Dipt., 48, 1, II, f. 2. [*Therera*] *in tab. subcol.* (1803); MEIG., S. B., IV, 191, 8. [*Phasia*] (1824) et VII, 289, 1, et LXXIII, f. 13, (1838); R.-D., Myod., 295, 2, (1830) et Posth., II, 228, 2, (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 202, 2, t. II, f. 6, (1834) et Suit. à Buff., II, 202, 2, (1835); ZETT., Dipt. Scand., III, 1216, 2. [*Phasia*] (1814); GAMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV, 676, (1812); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 699. [*Phasia*] (1819); ROSSI, Verzeichn., 58, 1, (1818); ROXD., Atti Soc.

ital. Sci. Nat., III. 213. 4. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 19. 3. (1862); SCHIX., F. A., I. 403. (1862); PORJAD., Bull. Soc. entom. France, (6). II. XC. (1882); PAND., Rev. entom., XIII. 88. 5. (1894); GIRSCHN., Zeitschr. Naturwiss., LX. 10. t. II. f. 1—5. (1888).

affinis FABR., Entom. syst., 284. 24. [*Syrphus*] (1794), Suppl., 561. 4. [*Thereca*] (1798) et Syst. Antl., 218. 4. [*Thereca*] (1805); PANZ., Fauna germ., LXXIV. 16. [*Thereca*] (1801); COQUEB., Illustr. icon., 103. t. XXIII. f. 12. [*Thereca*] (1804); LATR., Gen. crust. insect., IV. 345. [*Phasia*] (1809); v. Ros., Württemb. Corubl., I. 57. [*Phasia*] (1840).

calceoprata LATR., Hist. nat. Crust. ins., XIV. 379. [*Phasia*] (1804).

crassipennis DUM. (nec FABR.), Consid. gén., t. XLIX. f. 6. [*Thereca*] (1823).

obscuripennis MEIG., S. B., VII. 289. 3. (1838); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 212. 2. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 19. 2. (1862); SCHIX., F. A., I. 403. (1862).

pilosa R.-D., Myod., 295. 3. (1830).

subcalceoprata FABR. (nec L.), Syst. entom., 764. 9. [*Syrphus*] (1775), Spec. insect., II. 423. 11. [*Syrphus*] (1781); GMEL., Syst. nat., V. 2869. 335. [*Musca*] (1788); VILV., Entom. linn., III. 581. 13. [*Conops*] (1789); PANZ., Fauna germ., LXXIV. 13. [*Thereca*] (1801); LATR., Gen. crust. insect., IV. 345. [*Phasia*] (1809); LAM., Anim. s. vert., III. 363. 10. [*Musca*] (1815); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 202. 1. (1834) et Suit. à Buff., II. 201. 1. t. XV. f. 12. (1835); R.-D., Myod., 294. (1830) et Posth., II. 226. 1. (1863); WALK., Ins. Brit., II. 7. 1. t. XI. f. 3. [*Phasia*] (1853), ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 212. 1. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 19. 1. (1862).
?*tristis* HERBST, Gem. Naturg., VIII. 110. t. LXIV. f. 5. [*Musca*] (1787).

var. **eximia** GIRSCHN., Zeitschr. Naturwiss., LX. 11. (1888).

ferruginea R.-D., Myod., 295. 4. (1830).

orthoptera ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 217. 4. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 20. 4. (1862).

var. **obscura** GIRSCHN., Zeitschr. Naturwiss., LX. 10. (1888).

var. **vittata** GIRSCHN., Zeitschr. Naturwiss., LX. 10. (1888).

obscura G. = **hemiptera** FABR. var.

obscuripennis MEIG. = **hemiptera** FABR.

orthoptera ROND. = **hemiptera** FABR. var. **eximia** G.

pilosa R.-D. = **hemiptera** FABR.

subcalceoprata FABR. = **hemiptera** FABR.

tristis HERBST = **hemiptera** FABR.

vittata G. = **hemiptera** FABR. var.

B. *Hyalomyia*

R.-D., Myod., 298. 8. VIII. [*Hyalomyia*] (1830); GÜRSCHN., Zeitschr. Naturwiss., LX. 18. (1888).

aenea R.-D. = *obesa* FABR. var. *umbripennis* G.
aenea v. Ros. = *obesa* FABR. var. *umbripennis* G.
albipennis MEIG. = *obesa* FABR. var. *latipennis* G.
apicalis R.-D. = *obesa* FABR. var. *umbripennis* G.
areolaris ROND. = *obesa* FABR. var. *umbripennis* G.
atra R.-D. = *obesa* FABR. ♀
atrata R.-D. = *obesa* FABR. var. *latipennis* G.
atropurpurea MEIG. = *obesa* FABR. var. *umbripennis* G., *nebulosa* G. et *fascipennis* G.

× *aurigera* Egg. = *Bonapartea* ROND. var.

aurulans MEIG., S. B., IV. 197. 20. [*Phasia*] (1824) et VII. 284. 13. Europacentr.
 (1838); GÜRSCHN., Zeitschr. Naturwiss., LX. 48. 2. (1888). et mer.

caucalans SCHN. = *obesa* FABR. var. *minus*.

barbifrons GÜRSCHN., Zeitschr. Naturwiss., LX. 36. 5. t. II. f. 15. Europacentr.
 (1888). et mer.

? *semicinerea* ROND. (nec MEIG.), Dipt. ital. Prodr., V. 7. 2. (1862).

basalis R.-D. = *obesa* FABR. var. *umbripennis* G.

Bonapartea ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 212. 12. (1861) et Europacentr.
 Dipt. ital. Prodr., V. 16. 12. (1862); v. Röb., Berlin. entom. et mer.
 Zeitschr., XXVI. 386. (1882); GÜRSCHN., Wien. entom. Zeitg., II. 144 et 175. (1883) et Zeitschr. Naturwiss., LX. 23. 3. t. II. f. 10—12. (1888).

Helleri PALM., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 420. (1875).

scrolina PERR. ap. PAND.

suboleoptata PAND. (nec L.), Rev. entom., XIII. 88. 4. (1894).

? *urnifera* v. Ros., Württemb. Corbl., I. 57. [*Phasia*] (1840).

var. **aurigera** Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 796. (1860); SCHN., F. A., I. 401. (1862); GÜRSCHN., Stuttg. entom. Zeitg., XXXIX. 195. (1878) et Zeitschr. Naturwiss., LX. 22. 4. II. f. 6—9. (1888); LABOULE, Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 17. t. I. f. 5—6. (1884).

var. **Kriechbaumeri** SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 841. (1869); GÜRSCHN., Zeitschr. Naturwiss., LX. 23. (1888).

lucubata MEIG. = *obesa* FABR.

maculiceps R.-D. = *obesa* FABR. var. *nebulosa* G.

cinerea FABR. = *obesa* FABR. var. *fascipennis* G. et *latipennis* G.

clavipennis R.-D. = *obesa* FABR. var. *latipennis* G.

dimidiata R.-D. = *obesa* FABR. var. *fascipennis* G.

fascipennis GÜRSCHN. = *obesa* FABR. var.

femoralis R.-D. = *obesa* FABR.

flavipennis ZETT. = *obesa* FABR. var. *latipennis* G.

fuliginipennis GÜRSCHN. = *obesa* FABR. var. *umbripennis* G.

fulipennis ROND. = *obesa* FABR. var. *umbripennis* G.

- fasciana* R.-D. = **obesa** FABR. *var.* **umbripennis** G.
fascipennis MACQ. = **obesa** FABR. *var.* **umbripennis** G.
glabrata R.-D. = **obesa** FABR. *var.* **latipennis** G.
gratella R.-D. = **obesa** FABR. *var.* **fascipennis** G.
grisea ZETT. = **obesa** FABR. ♀
hamata MEIG. = **obesa** FABR. *var.* **fascipennis** G.
Helleri PALM = **Bonapartea** ROND.
integra R.-D. = **obesa** FABR.
intersecta R.-D. = **obesa** FABR. *var.* **fascipennis** G.
Kriechbaumeri SCHN. = **Bonapartea** ROND. *var.*
latipennis GIESCHN. = **obesa** FABR. *var.*
limpidipennis R.-D. = **obesa** FABR. ♀
minuta R.-D. = **obesa** FABR. *var.* **umbripennis** G.
marina ROND. = **obesa** FABR. *var.* **fascipennis** G.
muscaria FALL. = **obesa** FABR. *var.* **umbripennis** G.
nebulosa GIESCHN. = **obesa** FABR. *var.*
nebulosa PANZ. = **obesa** FABR. *var.* **umbripennis** G., **nebulosa** G.
 et **fascipennis** G.
nerrosa MEIG. = **obesa** FABR. *var.* **umbripennis** G. et **nebulosa** G.
nitida R.-D. = **obesa** FABR. *var.* **nebulosa** G.
nubeculosa MEIG. = **obesa** FABR. *var.* **umbripennis** G.
nubilipennis MEIG. = **obesa** FABR. *var.* **umbripennis** G.
obesa FABR., Entom. syst. Suppl., 561. 6. [*Thereva*] (1798) et Syst. Europa.
 Antl., 219. 6. [*Thereva*] (1805); MEIG., S. B., IV. 194. 13. [*Phasia*]
 (1824) et VII. 284. 7. (1838); R.-D., Myod., 299. 3. (1830) et
 Posth., II. 254. 18. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 206. 3.
 (1834) et Suit. à Buff., II. 203. 4. (1835); WALK., Ins. Brit., II.
 8. 2. [*Phasia*] (1853); ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 210.
 4. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 11. 4. (1862), SCHN., F. A., I.
 405 (1862); WALLEGR., Entom. Tidskr., I. 18. 3. (1880); GIESCHN.,
 Wien. entom. Zeitg., V. 103. 4. I. f. 1—12. (1886), Entom. Nach-
 richt., XIII. 74. VIII. et 129. (1887) et Zeitschr. Naturwiss., LX.
 28. 4. t. II. f. 13—14. (1888); PANZ., Rev. entom., XIII. 86. 3
 (1894).
atra R.-D., Posth., II. 261. 28. (1863).
bucephala MEIG., S. B., IV. 197. 21. [*Phasia*] (1824) et VII.
femorialis R.-D., Posth., II. 259. 25. (1863).
grisea ZETT., Dipt. Scand., III. 1250. 5. [*Phasia*] (1844).
integra R.-D., Posth., II. 257. 20. (1863).
limpidipennis R.-D., Posth., II. 259. 24. (1863).
tomentosa ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 603. 2. (1868);
 MISÀ PAL., Nat. Sicil., XIV. 19. 9. (1896).
unicolor ROND., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 47. (1868).
var. **fascipennis** GIESCHN., Wien. entom. Zeitg., V. 66. III.
 (1886) et Zeitschr. Naturwiss., LX. 28. (1888).
cinebra FABR., Syst. Antl., 221. 13. [*Thereva*] (1805); MEIG., S.
 B., IV. 198. 22. [*Phasia*] (1824) et VII. t. LXXIII. f. 41.

- (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 204. 8. t. XV. f. 13. (1835);
 SEMX., F. A., I. 405. (1862); GÜRSCH., Entom. Nachricht.,
 XIII. 130. 5. (1887).
- dimidiata* R.-D., Posth., II. 241. 2. (1863).
- gratella* R.-D., Posth., II. 244. 6. (1863).
- hamata* MEIG., S. B., IV. 193. 11. [*Phasia*] (1824) et VII. 284.
 6. (1838); R.-D., Myod., 298. 2. (1830) et Posth., II. 247. 9.
 (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 206. 2. (1834) et Suit.
 à Buff., II. 203. 3. (1835); GÜRSCH., Entom. Nachricht., XIII.
 129. 1. (1887).
- intersecta* R.-D., Posth., II. 248. 10. (1863).
- marina* ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 216. 7. (1861) et
 Dipt. ital. Prodr., VI. 13. 7. (1862).
- nebulosa* PANZ., Fauna germ., LIX. 15. [*Musca*] (1798); MEIG.,
 S. B., IV. 195. 14. [*Phasia*] (1824) et VII. 284. 8. (1838);
 LATR., Gen. crust. insect., IV. 345. [*Phasia*] (1809); R.-D.,
 Myod., 300. 6. (1830) et Posth., II. 253. 16. (1863); ROXD.,
 Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 212. 10. (1861) et Dipt. ital.
 Prodr., V. 15. 10. (1862).
- var. latipennis* GÜRSCH., Wien. entom. Zeitg., V. 68. IV.
 (1886) et Zeitschr. Naturwiss., LX. 28. (1888).
- albipennis* MEIG., S. B., IV. 194. 12. [*Phasia*] (1824) et VII.
 284. 16. (1838); R.-D., Myod., 300. 5. (1830); Macq., Soc.
 Sci. Lille, 1833. 206. 5. (1834) et Suit. à Buff., II. 203. 5.
 (1835); GÜRSCH., Entom. Nachricht., XIII. 130. 6. (1887).
- atrata* R.-D., Posth., II. 261. 27. (1863).
- claripennis* R.-D., Posth., II. 260. 26. (1863).
- flavipennis* ZETT., Dipt. Scand., III. 1250. 6. [*Phasia*] (1844);
 BOSSD., Fennl. Insekt., II. 122. 3. [*Phasia*] (1866); WALLEGR.,
 Entom. Tidskr., I. 18. 4. (1880); GÜRSCH., Entom. Nachricht.,
 XIII. 74. (1887).
- glabrata* R.-D., Posth., II. 258. 22. (1863).
- speciosa* CURT., Brit. Entom., 697. [*Phasia*] (1864).
- violacea* MEIG., S. B., IV. 193. 10. [*Phasia*] (1824) et VII. 284.
 5. (1838); Macq., Suit. à Buff., II. 203. 2. (1835); ROXD.,
 Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 212. 11. (1861) et Dipt. ital.
 Prodr., V. 15. 11. (1862); R.-D., Posth., II. 241. 1. (1863).
- var. nebulosa* GÜRSCH., Wien. entom. Zeitg., V. 65. II. (1886)
 et Zeitschr. Naturwiss., LX. 28. (1888).
- cavrescens* R.-D., Posth., II. 245. 7. (1863).
- nevrosa* MEIG., S. B., IV. 196. 17. [*Phasia*] (1824) et VII. 284.
 11. (1838); WALLEGR., Entom. Tidskr., I. 19. 6. (1880);
 GÜRSCH., Entom. Nachricht., XIII. 75. (1887).
- nilida* R.-D., Posth., II. 250. 12. (1863).
- purpurca* R.-D., Posth., II. 244. 5. (1863).
- rashica* R.-D., Posth., II. 252. 11. (1863).
- umbrata* ZETT., Dipt. Scand., III. 1249. 1. [*Phasia*] (1844);

- ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 211. 6. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 12. 6. (1862); GIBSCH., Entom. Nachricht., XIII. 74. (1887).
- vestita* R.-D., Posth., II. 249. 11. (1863).
- var. umbripennis* GIBSCH., Wien. entom. Zeitg., V. 5. 1. (1886) et Zeitschr. Naturwiss., LX. 28. (1888).
- avoca* R.-D., Posth., II. 257. 21. (1863).
- avoca* v. Ros., Württemb. Corrbll., I. 57. [*Phasia*] (1840).
- apicalis* R.-D., Posth., II. 246. 8. (1863).
- areolaris* ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 216. 9. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 14. 9. (1862).
- atroparpurea* MEG., S. B., IV. 193. 9. [*Phasia*] (1824) et VII. 284. 4. (1838); R.-D., Myod., 298. 1. (1830) et Posth., II. 242. 4. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 205. 1. (1834) et Suit. à Buff., II. 202. 1. (1835); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 613. [*Phasia*] (1840); ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 211. 8. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 14. 8. (1862); SCHIX., F. A., I. 406. (1862); WALLENGR., Entom. Tidskr., I. 19. 7. (1880); GIBSCH., Entom. Nachricht., XIII. 75 et 129. 2. (1887).
- auralans* SCHIX. (nec MEG.), F. A., I. 404. (1862).
- basalis* R.-D., Myod., 299. 4. (1830) et Posth., II. 252. 15. (1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833. 206. (70). 4. (1834); MEG., S. B., VII. 289. 14. (1838).
- fuliginipennis* GIBSCH., Wien. entom. Zeitg., V. 5. (1886).
- fuliginipennis* ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 215. 5. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 12. 5. (1862).
- fusca* R.-D., Posth., II. 254. 17. (1863).
- fuscipennis* MACQ., Suit. à Buff., II. 203. 6. (1835); MEG., S. B., VII. 289. 15. (1838).
- minuta* R.-D., Posth., II. 258. 23. (1863).
- muscaria* FALL., Dipt. succ. Rhizom., 3. 2. [*Therera*] (1820); MEG., S. B., IV. 196. 18. [*Phasia*] (1824) et VII. 284. 17. (1838); ZETT., Ins. Lapp., 626. 1. [*Phasia*] (1838) et Dipt. Scand., III. 1248. 3. [*Phasia*] (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 690. [*Phasia*] (1849); ROSD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III. 210. 3. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V. 11. 3. (1862); SCHIX., F. A., I. 105. (1862); BOSSD., Fennl. Insekt., II. 122. 2. [*Phasia*] (1866); WALLENGR., Entom. Tidskr., I. 18. 2. (1880); GIBSCH., Entom. Nachricht., XIII. 130. 4. (1887).
- nubeculosa* MEG., S. B., IV. 195. 15. [*Phasia*] (1824) et VII. 284. 9. (1838).
- nubilipennis* MEG., S. B., IV. 197. 19. [*Phasia*] (1824) et VII. 284. 12. (1838).
- opacina* R.-D., Posth., II. 251. 13. (1863).
- pratensis* R.-D., Posth., II. 256. 19. (1863).
- umbripennis* MEG., S. B., IV. 195. 16. [*Phasia*] (1824) et VII.

284, 10. (1838); WALLENGR., Entom. Tidske., I, 19, 5. (1880);
GIRSCHN., Entom. Nachricht., XIII, 130, 3. (1887).

- opacina* R.-D. = **obesa** FABR. *var.* **umbripennis** G.
pratensis R.-D. = **obesa** FABR. *var.* **umbripennis** G.
purpurea R.-D. = **obesa** FABR. *var.* **nebulosa** G.
rustica R.-D. = **obesa** FABR. *var.* **nebulosa** G.
semicinerea RONÉ. = ?**barbifrons** G.
speciosa CURT. = **obesa** FABR. *var.* **latipennis** G.
subcoleoptera PAND. = **Bonapartea** ROND.
tomentosa ROND. = **obesa** FABR.
umbata ZETT. = **obesa** FABR. *var.* **nebulosa** G.
umbripennis GIRSCHN. = **obesa** FABR. *var.*
umbripennis MEIG. = **obesa** FABR. *var.* **umbripennis** G. et **nebulosa** G.
unicolor ROND. = **obesa** FABR.
unifera v. ROS. = ?**Bonapartea** ROND.
vestita R.-D. = **obesa** FABR. *var.* **nebulosa** G.
violacea MEIG. = **obesa** FABR. *var.* **latipennis** G. et **umbripennis** G.

C. *Paralophora*

GIRSCHN., Zeitschr. Naturwiss., LX, 38, III. (1888).

- carbonaria* R.-D. = **pusilla** MEIG.
chorca R.-D. = **pusilla** MEIG.
corinna R.-D. = **pusilla** MEIG.
hyalipennis R.-D. = **pusilla** MEIG.
pallipes R.-D. = **pusilla** MEIG.
pusilla MEIG., S. B., IV, 198, 23. [*Phasia*] (1824) et VII, 284, 20. Europa.
(1838); R.-D., Myod., II, 300, 8. (1830) et Posth., II, 266, 35.
(1863); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 207, 6. (1834) et Suit. à
Buff., II, 204, 9. (1835); ZETT., Dipt. Scand., III, 1251, 7. [*Phasia*]
(1844); WALK., Ins. Brit., II, 8, 3. [*Phasia*] (1835); ROND., Atti
Soc. ital. Sci. Nat., III, 210, 1. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V,
9, 1. (1862); BOSSQ., Finnl. Insekt., II, 123, 4. [*Phasia*] (1866);
WALLENGR., Entom. Tidske., I, 19, 9. (1880); GIRSCHN., Zeitschr.
Naturwiss., LX, 38, 6. t. II, f. 22–24. (1888); PAND., Rev. entom.,
XIII, 86, 2. (1894).
carbonaria R.-D., Myod., 300, 7. (1830) et Posth., II, 262, 29.
(1863); MACQ., Suit. à Buff., II, 204, 7. (1835); MEIG., S. B.,
VII, 290, 27. (1838); ? PAND., Rev. entom., XIII, 85, 1. (1894).
chorca R.-D., Posth., II, 266, 34. (1863).
corinna R.-D., Myod., 301, 9. (1830) et Posth., II, 265, 33 (1863);
MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 207, (71), 7. (1834); MEIG., S. B.,
VII, 290, 16. (1838).
hyalipennis R.-D. (*var.* FALLÉ), Myod., 301, 10. (1830) et Posth.,
II, 263, 50. (1863); MACQ., Suit. à Buff., II, 204, 10. (1835).
pallipes R.-D., Posth., II, 261, 31. (1863).
scuticæ R.-D., Posth., II, 261, 32. (1863).

semicinerea MEIG., S. B., IV, 199, 24. [*Phasia*] (1824) et VII, 284, 21. (1838); R.-D., Myod., II, 301, 11. (1830) et Posth., II, 267, 36. (1863); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 207, 8, t. II, f. 8. (1834) et Suit. à Buff., II, 204, 11. (1835); ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 210, 2. (1861).

viripennis ZETT., Dipt. Scand., XIII, 6169, 6-7. [*Phasia*] (1859); WALLENGR., Entom. Tidskr., I, 19, 8. (1880).

secularis R.-D. = **pusilla** MEIG.

semicinerea MEIG. = **pusilla** MEIG.

viripennis ZETT. = **pusilla** MEIG.

D. *Phorantho*

ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 213. (1861); GURSCH., Zeitschr. Naturwiss., LX, 40. (1888).

abdominalis GURSCH. = **subcoleoptrata** L. var.

muscaeformis ROXD. = **subcoleoptrata** L. var.

ornata GURSCH. = **subcoleoptrata** L. var.

subcoleoptrata L., Syst. Nat., XII, II, 1006, 13. [*Conops*] (1767): Europa centr. et sept.

FABR., Entom. syst., IV, 283, 21. [*Syrphus*] (1794), Suppl., 560.

1. [*Thereva*] (1798) et Syst. Auth., 217, 1. [*Thereva*] (1805); FALL.,

Dipt. succ. Rhizom., 2, 1. [*Thereva*] (1820); MEIG., S. B., IV,

190, 7. [*Phasia*] (1824) et VII, 284, 2. (1838); ZETT., Dipt. Scand.,

III, 1245, 1. [*Phasia*] (1844); SCHK., F. A., I, 403. (1862); BOSSD.,

Finnl. Insektl., II, 121, 1. [*Phasia*] (1866); WALLENGR., Entom.

Tidskr., I, 18, 1. (1880); GURSCH., Zeitschr. Naturwiss., LX, 40,

7, t. II, f. 16-21. (1888).

var. **abdominalis** GURSCH., Zeitschr. Naturwiss., LX, 41, II. (1888).

var. **muscaeformis** ROXD., Atti Soc. ital. Sci. Nat., III, 217, 1. (1861) et Dipt. ital. Prodr., V, 22, 1. [*musciformis*] (1862); GURSCH., Zeitschr. Naturwiss., LX, 40, I. (1888).

var. **ornata** GURSCH., Zeitschr. Naturwiss., LX, 41, III. (1888).

Eginiinae.

Eginia

R.-D., Myod., 502, X. (1830).

Syllegoptera ROXD., Dipt. ital. Prodr., I, 96, 14. (1856) et VI, 245. (1867).

carriverris BIG. = **ocyptrata** MEIG.

cylindrica R.-D. = **ocyptrata** MEIG.

ocyptrata MEIG., S. B., V, 131, 86. [*Anthomyia*] (1826) et VII, 334. Europa.

[*Coccosia*] (1838); MACQ., Suit. à Buff., II, 318, 9. [*Hylenomyia*]

(1835): SCHN., F. A., I. 669. (1862): RONDI, Dipt. ital. Prodr., VI. 245. 1. (1867) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., IX. 423. (1866): B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVI. t. VI. f. 117. (1889) et LXI. 619. (1894); MK, Wien. entom. Zeitg., VII. 29. 47. (1888); v. ROU., Wien. entom. Zeitg., XI. 181. 1. (1893).

curvirostris BRG., Annal. Soc. entom. France, (6). IV. 270. (1884).
cylindrica R.-D., Myod., 503. 1. (1830).

Syngamoptera

SCHNABL, Rev. russe entom., II. 79. (1902).

amurensis SCHNABL, Rev. russe entom., II. 82. (1902).

Siberia.

Hypoderminae.

Oedemagena

LATR., N. Diet. Hist. nat., XXIII. 272. (1816) et Règne anim., V. 503. (1825).

tarandi L.²), Syst. nat., X. 1. 590. (1758). XII. II. 969. 2. [*Oestrus*] Europa sept. (1767) et Fauna suec., 1731. [*Oestrus*] (1761): FABR., Syst. entom., 746. 2. [*Oestrus*] (1775), Spec. insect., II. 398. 3. [*Oestrus*] (1782), Entom. syst., IV. 231. 5. [*Oestrus*] (1794) et Syst. Antl., 227. 5. [*Oestrus*] (1805): HERBST, Gem. Naturg., VIII. 112. t. LXXVII. [*Oestrus*] (1796): MODEER, Vet. Acad. Handl., 136. [*Oestrus*] (1786): GMEL., Syst. Nat., V. 2810. 2. [*Oestrus*] (1788): VILL., Entom. linn., III. 346. 2. [*Oestrus*] (1789): OL., Encycl. méthod., VIII. 434. [*Oestrus*] (1811): CLARR, Essay, 53. t. II. f. 13-14. [*Oestrus*] (1815): LATR., N. Diet. Hist. nat., XXIII. 272. (1816) et Faun. nat. règne anim., V. 503. (1825); FALL., Dipt. succ. Haemat., 10. 3. [*Oestrus*] (1818); MEIG., S. B., IV. 169. 3. t. XXXVIII. f. 15. (1824); LAESTAD, Journ., 447. [*Oestrus*] (1831): MACQ., Suit. à Buff., II. 49. 1. t. XIII. f. 19. (1835); GUÉR., Icon. règne anim., t. CI. f. 3. (1837); KEFERST., Die d. Mensch. Thier. Ins., 319. [*Oestrus*] (1837); DAMBL., Skand. Ins. skå la, 311. 211. [*Oestrus*] (1837); ZETT., Iter Lapp., II. 39. [*Oestrus*] (1821), Ins. Lapp., 622. 2. [*Oestrus*] (1838) et Dipt. Scand., III. 973. 3. [*Oestrus*] (1844); ? Diet. pict. Hist. nat., VI. 227. (1833); JOLY, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX. 281. 1. (1816); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 681. [*Oestrus*] (1849); WILSTW., Proc. Linn. Soc. London, I. 179. (1843); SCHOLTZ, Entom. Breslau, IV. 1. (1818); BEAULI, Verh. zool. bot. Ges. Wien, VIII. 392. 106 et 155. [*Hypoderma*] (1858) et Mon., 131. [*Hypoderma*] (1863); BOSSQ., Fund. Insekt., II. 30. 2. [*Oestrus*] (1866); PARSON., Trudy. X. 191. [*Hypoderma*] (1874); WILL., Trans. amer. entom. Soc., XIII. 307. (1886); LIOG., Insetti nocivi, III. 351. f. 181. (1900).

¹) Rangifer tarandus L.

Hypoderma

Latre., Fam. nat. règne anim., V. 503. (1825).

- Actaeon** BRACER¹⁾, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 396. 407. 409. Europa centr.
t. X. f. 4. t. XI. f. 1 et 6. (1858), Mon., 117. 3. (1863), Wien.
entom. Zeitzg., VI. 75. (1887) et Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. t.
I. f. 4. (1897); REAUM., Ins., IV. 527. [—] (1738); SCHN., F. A.,
I. 397. (1862).
elaphi SCHRANK, vide Cophenomyia.
lineatum KELLER. (nec VILL.), Stettin. entom. Zeitzg., VIII. 366.
[*Oestrus*] (1847) et XIV. 89. (1853).
- albicoma** BRACER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 334 et 379. t. I. f. 2. Europa mer.
2. (1879).
- albofasciatum** PORTSCH, Hor. Soc. entom. Ross., XVIII. 128. (1884). Sibiria.
Bellieri BU. = **bovis** L.
- bonassi* BRACER = ?*lineatum* VILL.
- borinum* SCHWARZ = **bovis** L.
- bovis** L.²⁾, Fauna suec., II. 1739. *larva* [*Oestrus*] (1761); VALLISNIER.,
Opera. I. t. XXVIII. f. 10. [—] (1710); REAUM., Mém. ins., IV. Europa,
t. 36. [—] (1738); FRISCH, Ins., 5. 25. t. VII. [—] (1720—38); Africa sept.
GEOTR., Hist. ins., II. 456. f. [—] (1763); SCHAEFF., Elem. entom.,
t. 91. [—] (1766); O. F. MÜLL., Fauna Friedrichsd., 76. 660. [*Oestrus*]
(1764); FABR., Syst. entom., 746. f. [*Oestrus*] (1775), Spec. insect.,
II. 398. 2. [*Oestrus*] (1781), Entom. syst., IV. 231. 3. [*Oestrus*]
(1794) et Syst. Anl., 228. 3. [*Oestrus*] (1805); SULZ., Ins., t. XX.
f. 127. [—] (1776); DEC., Ins., VI. 297. 2. t. XV. f. 22. [*Oestrus*]
(1776) et GÉZE, VI. 119. 2. [*Oestrus*] (1782); MÖBER, Vid. Acad.
Handl., 148. [*Oestrus*] (1786); SCHRANK, Enum. insect., 417. 842.
[*Oestrus*] (1781) et Fauna boi., III. 59. 2288. [*Oestrus*] (1803);
HERBST., Gem. Naturg., VIII. t. LXXVII. f. 2. [*Oestrus*] (1787);
FISCH., Dissert. Cont., t. III. f. 5. [*Oestrus*] (1787); VILL., Entom.
linn., III. 345. f. [*Oestrus*] (1789); ROSSI, Fauna etr., II. 269.
1114. [*Oestrus*] (1790) et Mant., II. 143. [*Oestrus*] (1794); CLARK,
Trans. linn. Soc., VIII. 289. [*Oestrus*] (1797) et Essay, 44. t. II.
f. 1—II. [*Oestrus*] (1815); LATR., Dict. hist. nat. Détéry., XXIV.
197. [*Oestrus*] (1801), Gen. crust. insect., IV. 342. [*Oestrus*] (1809),
N. Diet. hist. nat. art. Oestre, [*Oestrus*] (1816) et Fam. nat. règne
anim., V. 503. (1825); ILIC., Fauna etr. Rossi., II. 418. 1414.
[*Oestrus*] (1807); CEDERN., Faunae ingr. Prodr., 287. 901. [*Oestrus*]
(1798); DWIG., Primit. Faunae Mosqu., 173. 608. [*Oestrus*] (1802);
SHAW, Gen. zool., VI. 358. t. 102. fig. sup. [*Oestrus*] (1806); OLL.,
Encycl. méthod., VIII. 462. 3. [*Oestrus*] (1811); LEACH, Eprob.
ins., t. 2. [*Oestrus*] (1817) et Mem. Werner. Soc., II. 567. 2.
[*Oestrus*] (1818); FALL., Dipt. suec. Haemat., II. 4. [*Oestrus*]

¹⁾ *Cervus elaphus* L.

²⁾ *Bos taurus* L.

(1818); MÉRIG., S. B., IV, 167, 2, [*Oestrus*] (1824); BAYL. BAR., Saggio, 89, 75, [*Aestrus*] (1819); GENÉ, Ins., no lvi, 177, 123, [*Oestrus*] (1835); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 333, 1, 4, VI, f. 3, (1834) et Suit. à Buff., II, 48, 1, 4, XIII, f. 18, (1835); 2, Diét. pict. hist. nat., VI, 227, 1, 418, f. 3, (1833); GUER., Leon règne anim. Ins., t. XI, f. 2, (1837); DABLE, Skand. Ins. skäda, 312, 212, [*Oestrus*] (1837); ZETT., Ins. Lapp., 623, 3, [*Oestrus*] (1838) et Dipt. Scand., III, 974, 4, [*Oestrus*] (1844); WESTW., Introd., II, [*Oestrus*] (1840); BLANCH., Hist. nat. ins., III, 607, (1840); SELLS, Trans. entom. Soc., III, 72, [*Oestrus*] (1842); JOLY, Ann. Soc. Agric. Lille, IX, 225, (1866); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III, 684, [*Oestrus*] (1849) et Ins. Brit., II, 270, 1, 4, XIX, f. 1, [*Oestrus*] (1853); SAXES., Steffin. entom. Zeitg., XI, —, [*Oestrus*] (1850); RONDI., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (3), IX, 67, (1854) et Dipt. ital. Prodr., II, 21, 1, (1857); BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII, 398, 454, 1, X, f. 6 et 1, XI, f. 6, (1858), Mon., 124, 5, (1863) et Wien. entom. Zeitg., VI, 75, (1887); SPRING, Bull. Acad. r. méd. Belg., (2), IV, fig. (1861); SCHN., F. A., 1, 396, (1862); R.-D., Posth., 1, 59, 1, (1863); BOSSQ., Finl. Insekt., II, 30, 3, [*Oestrus*] (1866); FEDTSCH., Materiali, 155, (1868); BERRETTA, Atti Accad. Gioenia, (3), XIV, (1879); PORTSCH., Tentyr., X, 193, (1874); GÜLLER., Mittheil. naturf. Ges. Bern, 1881, 7, (1882); BLANCH., Zool. méd., II, 514, (1888); JOSEPH, D. med. Zeitg., (1885); CALANDE, Atti Accad. Gioenia S. N., XVI, [*Oestrus*] (1885); B. FEDTSCH., Entom. Nachricht., XVII, 202, 376, (1891); AUSTEN, Entom. Monthly Mag., (2), XI, 94, (1901) et Ann. Mag. N. Hist., (7), IV, 69, (1899); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LXI, 557, (1894); HERB., Bibliogr. Jena, 19—21, (1899); KOOBA., Tijdschr. Ned. Dierk. Ver., (2), V, 29, (1899); MEAL, Ann. Soc. Belg., XLIV, 42, (1900) et Tijdskr. entom., XXXVIII, 13—16, f. 14—16, (1902); v. ROU., Ins. Börse, 1901, 107, (1901); PEPPER, Fliegenlarv., 18, f. 4—5, (1909); LEON., Ins. norvici, III, 318, f. 180—183, (1900).

Bellievi BOU., Annal. Soc. entom. France, (4), II, 113, 5, (1862);

BRAUER, Mon., 130, 8, (1863) et Sitzgsber. Akad. Wien, CVI, 332, 2 et 3, (1897); RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI, 21, (1865).

barinnum SCHWARZ, Die Oestrac., 13, [*Oestrus*] (1810).

sabulatacum GRAY., Erfahr. üb. Krank. Hausthier., II, [*Oestrus*] (1818).

var. heteropterum MACQ., Dipt. exot., III, 181, (21), 1, (1813); JOLY, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX, 281, 2, (1846); BRAUER, Mon., 129, 6, (1863).

desertorum BRÄUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI, 377, 1, 1, f. 1, (1897); **Diana** BRÄUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII, 397, 2, 107—155,

Musc. 211

Aegyptus,
Europäer
et mer.

*) *Cervus capreolus* L., *claphus* L.

t. X. f. 5. t. XI. f. 5. (1858), X. 651. (1860), XII. (1864). Mon., 113. 2. (1863), Wien. entom. Zeitg., VI. 75. (1887) et Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 359. t. I. f. 3. (1897); KELLN., Stuttg. entom. Zeitg., XIV. 90. [*Oestrus*] (1853); SCHN., F. A., I. 397. (1862); Coq. et SALLÉ, Annal. Soc. entom. France. (4). II. 794. t. XIX. f. 6. (1862); VÖLK., Berl. Klin. Wochenschr., XIV. 209. (1883); JOSEPH, D. Med. Zeitschr., (1885) et Entom. Nachricht., XI. 19. (1885); AUSTEN, Entom. Monthly Mag., (2). IX. 12. (1898); PEIFER, Fliegenlarv., 19. f. 6. (1900).

claphi SCHRANK = ?**Actaeon** BRAUER.

equi LOIS. = ?**Silenus** BRAUER.

crictorum LEACH = **lineatum** VILL.

haemorrhoidale CLARK = **lineatum** VILL.

heteroptera MACQ. — **bovis** L. var.

lineatum KELLN. = **Actaeon** BRAUER.

lineatum VILL.*), Entom. linn., III. 349. 7. t. IX. f. 1. [*Oestrus*] Europa mer.

(1789); OL., Encycl. méthod., VIII. 467. 13. [*Oestrus*] (1811); MEIG., S. B., IV. 173. 9. [*Oestrus*] (1824); BRAUER, Verh. zool-bot. Ges. Wien, VIII. 459. (1858), Mon., 122. 4. (1863), Wien. entom. Zeitg., VI. 75. (1887) et Verh. zool-bot. Ges. Wien, LX. 509. (1890); SCHN., F. A., I. 397. (1862); LÖW., Wien. entom. Monatschr., VII. 35. 15. (1863); PORTSCH., Trudy, X. 193. (1874); RULEY, Ins. Life, IV. 302. fig. (1892); AUSTEN, Entom. Monthly Mag., (2). XII. 92. (1901); How., Insect Book, 156. f. 86. (1902). *bonassi* BRAUER, Verh. zool-bot. Ges. Wien, XXV. 75. t. IV. f. 2. (1875), *larva tantum*, et Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 81. (1883).

crictorum LEACH, Eprob. Ins., 2. 3. [*Oestrus*] (1817) et Mem. Werner. Soc., II. 568. 3. [*Oestrus*] (1818); MACQ., Suit. à Buff., II. 49. (1835); SELLS, Trans. entom. Soc., III. 8. 72. (1842); CLARK, Trans. linn. Soc., XIX. 2. 86. (1843).

haemorrhoidale var. *b.* CLARK, Trans. linn. Soc., III. 328. [*Oestrus*] (1797).

supplens WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 685. [*Oestrus*] (1849); B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 440. (1891).

cernale CLARK, Essay, 37. 67. 72. t. I. f. 30—32. [*Oestrus*] (1815).

Loiseli JOLY — ?**Silenus** BRAUER.

Silenus BRAUER**) Verh. zool-bot. Ges. Wien, VIII. 460. t. X. f. 7. Europa mer.

a. (1858), Mon., 111. 1. (1863) et Wien. entom. Zeitg., VI. 76. Asia min. (1887); RONDI., Atti Soc. ital. Sci. Nat., XI. 21. (1868).

?*equi* LOIS., Soc. vet. Manch., 197. [*Oedemagena*] (1844); JOLY, Compt. rend. Acad. Paris, 86. (1849); BRAUER, Mon., 137. (1863); ORMER., Flies injur. to stock, 36. (1900).

?*Loiseli* JOLY, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX. 241. (1846).

*) ?*Bos taurus* L., ?*Ovis aries* L.

**) ?*Equus asinus* L.

subcutaneum GREVE — **bovis** L.
supplens WALK. — **lineatum** VILL.
vernale CLARK — **lineatum** VILL.

Larvae

aegagri BRAUER¹⁾, Mon., 134. (1863). Ural.
alcis HILDE²⁾, Grun. forstl. Blätt., XIV. 155. (?); PALL., Zoogeogr. Rossia.
 fosso-asiat., 206. [—] (1776); BRAUER, Mon., 137. (1863).
corinnae BALS. CRIV.³⁾, Mem. Ist. lomb., IX. (1862); BRAUER, Mon., Asia min.
 136. (1863).
damae B. B.⁴⁾, Denkschr. Akad. Wien, LXI. 558. (1894). Europa centr.
moschiferi PALL.⁵⁾, Spicil. zool., XIII. 19. t. VI. f. 5. (1779); BRAUER, Asia centr.
 Mon., 137. (1863).
saigae PALL.⁶⁾, Spicil. zool., XII. 29. t. III. f. 2—3. (1777); BRAUER, Rossia.
 Mon., 135. (1863); GLITSCH, Bull. Soc. Imp. Moscou, 229. (1865);
 PORTSCH., Ann. Mus. Petersb., VII. 213. t. VI. f. 3. (1902).

Oestrinae.

Tachinoestrus

PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XXI. 194. (1887).

Semenovi PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XXI. 195. t. VI. f. 7. Mongolia,
 XXVI. 209. (1862); MÜK, Wien. entom. Zeitg., VI. 241. 36. (1887). China.

Portschinskia

SEMENOW, Rev. russe d'entom., I. 52 et 6. 353. (1902).

Microcephalus SCHNABEL, D. entom. Zeitschr., XXI. 49. (1877)
nee LATR., WULF 1873. Dipt.

Schnablia BEZZA, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., VI. 50. 9.
 (1906).

bombiformis PORTSCH., Ann. Mus. Petersb., VI. 420. t. 2. [*Micro-* Rossia asiat.
cephalus] (1901).

gigas PORTSCH., Ann. Mus. Petersb., VI. 411. t. 1. [*Microcephalus*] Rossia asiat
 (1901).

Loewii SCHNABEL, D. Entom. Zeitschr., XXI. 52. t. 1. f. 1—7. [*Micro-* Sibiria.

1) *Capra aegagrus* GM.

2) *Cervus alces* L.

3) *Antelope dorcas* L.

4) *Cervus dama* L.

5) *Moschus moschiferus* L.

6) *Saiga tatarica*, PALL.

cephalus] (1877) et XXVI. 13. [*Microcephalus*] (1882); BRAUER, Wien. entom. Zeitg., V. 345. [*Microcephalus*] (1886) et Sitzgsber. Akad. Wien, CIV. 587. [*Microcephalus*] (1895).

- Neugebaueri** PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 137. (1882). Europaeentr.
XVIII. 128. (1884). XXI. 13. t. I. f. 8. [*Microcephalus*] (1887) et et mer.
Ann. Mus. Petersb., VI. 424. f. 4. [*Microcephalus*] (1902); SCHNAB, D. entom. Zeitschr., XXVI. 14. [*Microcephalus*] (1882).
- Przewalskii** PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XXI. 9. t. I. f. 7. Asia media.
[*Microcephalus*] (1887) et Ann. Mus. Petersb., VI. 423. f. 3.
[*Microcephalus*] (1902).

Oestromyia

BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 647. (1860).

- Kosłowi** PORTSCH., Ann. Mus. Petersb., VII. 211. t. VI. f. 2. (1902). Russia asiat.
leporina PALL. ?**Pallasii** PORTSCH.
- Pallasii** PORTSCH.^{*)}, Ann. Mus. Petersb., VII. 209. t. VI. f. 1. (1902). Sibiria.
? *leporina* PALL., Nov. spec. Quadr., Erlangae, 50. t. II. f. 1.
B. [*Oestras*] (1778); CLARK, Trans. linn. Soc., XIX. 87.
[*Caterbra*] (1843); JOLY, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX. 179.
t. VI. f. 15. [*Caterbra*] (1846); BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, XI. 313. (1861), Mon., 145. 2. (1863) et Verh. zool.-bot.
Ges. Wien, XVI. 647. t. XIX. f. 2. (1866); SCHREB., Säugethiere, IV. t. 231. [*Oestras*] (1876); B. B., Denkschr. Akad.
Wien, LXI. 565. (1894).
- Satyryus** BRAUER^{**)}, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 462. t. X. f. 8. Europaeentr.
[*Hypoderma*] (1858), X. 647. (1860), XI. 311. (1861), XIV. 891.
(1864) et Mon., 143. 1 et 270. (1863); COQUEB, et SALLÉ, Annal.
Soc. entom. France, (4). II. 792. II. (1862); SCHN., F. A., I. 398.
(1862); v. RÖD., Berlin. entom. Zeitschr., XXVI. 386. (1882);
PORTSCH., Ann. Mus. Petersb., VII. 207. (1902).

Oestroderma

PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XXI. 190. (1887).

- Potanini** PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XXI. 191. t. VI. f. 6. Mongolia.
(1887).

Cephalomyia

LATR., Fam. nat. règne anim., V. 502. [*Cephalomyia*] (1825) em. BRAUER.

libyca CLARK **maculata** WIED.

- maculata** WIED.^{***)}, Ansser. zweifl. Ins., II. 256. 2. [*Oestras*] (1830): Africa sept.
Macq., Dipt. exot., III. 182. (25). t. II. f. 7. (1843); JOLY, Ann.

*) *Lagomys alpinus* PALL., Curzoniae Hod.

***) *Hypudaenus arvalis* L.

***) *Bos bubalus* L., *Camelus bactrianus* L. et *dromedarius* L.

Soc. Agric. Lyon, IX, 291, (1846); BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII, 650, 657, (1857) et Mon., 163, (1863); SCHN., F. A., I, 393, [*Oestrus*] (1862); POERSCHE, Hor. Soc. entom. Ross., XVIII, 129, (1884).

libyca CLARK, Trans. linn. Soc., XIX, 2, 92, [*Oestrus*] (1843); JOLY, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX, 287, [*Oestrus*] (1846).

?*tilillator* CLARK, Essay, Suppl., II, 4, II, f. 22, [*Oestrus*] (1846); JOLY, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX, 289, [*Oestrus*] (1846).

tilillator CLARK — ?*maculata* WIED.

Oestrus

L., Syst. Nat., X, 584, (1758) et XII, 969, (1767); BRAUER, Mon., 150, (1863).

ovinus FISCH. : - *ovis* L.

ovis L., Fauna suec., 1734, (1761) et Syst. nat., XII, II, 970, 5, (1767); Europa.

REDI, Op., I, 455, [—] (1686); VALLIS., Op., I, 217, [—] (1733);

REAU M., Mém. Ins., IV, t. XXXV, f. 10—25, [—] (1734); SCHREB., N. Spec. ins., 15, 12, [—] (1759); GEOFFR., Ins., II, 456, 2, t. XVII, f. 1, [—] (1763);

FABR., Syst. entom., 747, 5, (1775), Spec. insect., II, 399, 6, (1781), Entom. syst., IV, 232, 8, (1794) et Syst. Anth., 230, 10, (1805);

SCHENK, Enum. ins., 417, 843, (1781) et Fauna boi., III, 60, 2289, (1803); MODER, Vet. Akad. Handl., 125, (1787);

HERBST, Gem. Naturg., VIII, 97, t. LXIV, f. 3, (1787); GMEL., Syst. nat., V, 2811, 5, (1788);

VILL., Entom. linn., III, 348, 5, (1789); CLARK, Trans. linn. Soc., III, 289, t. XXII, f. 14—17, (1797) et Essay, 59, t. II, f. 16—21, (1815);

DOX., Brit. Ins., XVI, 19, 550, (1813); SHAW, Gen. Zool., VI, 364, t. 102, f. *inf.* (1806);

DWIG., Primitiæ faunæ Mæsq., 173, 609, (1802); LATR., Gen. crust. ins., IV, 341, (1809), N. Diet. Hist. nat., Oestre (1816) et Fam. nat. règne anim., V, 502, [*Cephalomyia*] (1825);

GERM., Faunae ingr. Prodr., 288, 902, (1798); OLL., Encycl. méthod., VIII, 462, (1811);

LEYEN, Eprob. ins., I, 1, (1817) et Mem. Wern. Soc., II, 537, 1, (1818);

FALL., Dipt. suec. Haemat., 9, 1, (1818); MEIG., S. B., IV, 165, 1, t. XXXVIII, f. 16, (1821);

2, Diet. pict. Hist. nat., VI, 227, t. 418, f. 4, (1833); DALL., Ins. Skand. skäda, 310, 210, (1837);

GREG., Icon. règne anim. Ins., t. Cl, f. 9, [*Cephalomyia*] (1837); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 331, 1, t. VI, f. 2, [*Cephalomyia*] (1834) et Suit. à Buff., II, 51, 1, t. XIII, f. 24, [*Cephalomyia*] (1835);

BRANCH., Hist. nat. ins., III, 608, [*Cephalomyia*] (1840); WESTW., Introd., II, —, (1840);

BAVLE BAR., Saggio, 96, 78, (1819); GENÉ, Insetti nocivi, 180, 127, t. III, f. 19, (1835); ZETT., Dipt. Scand., III, 970, 1, [*Cephalomyia*] (1841);

JOLY, Ann. Acc. Agric. Lyon, IX, 21, 1, [*Cephalomyia*] (1846); WALK., List. Dipt. Brit. Mus., III, 683, —, (1852).

(*) *Capra hircus* L., *Ovis aries* L.

(1849) et Ins. Brit., II. 272. f. 1. XIX. f. 4. [*Cephalomyia*] (1853); SAXES, Stettin. ent. Zeitg., XI. 31. (1850); NUM. Tijdschr. Vetensk., IV. 133. (1850); LÖWE, Die falsche Drehk., (1854); RONDI, N. Ann. Sci. nat. Bologna, (3). IX. 67. [*Cephalomyia*] (1854), Dipt. ital. Prodr., II. 23. f. [*Cephalomyia*] (1857) et Atti Soc. ital. Sci. Nat., VIII. 127. [*Cephalomyia*] (1865); LÖW, Zeitschr. ges. Naturwiss., VIII. 103. 125. [*Cephalomyia*] (1857); BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 391. 401. 411. 452. [*Cephalomyia*] (1858), Mon., 151. f. (1863) et Wien. entom. Zeitg., VI. 76. (1887); SEMX., F. A., I. 393. (1862); R.-D., Posth., II. 57. f. [*Cephalomyia*] (1863); FRETSCH., Materiali, 155. (1868); LEE., Bull. Soc. entom. France, (5). VI. XCX. (1876); PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVIII. 131. (1884); HETT., Trans. N. Zeal. Instit., 1900. 44. (1900); LEON., Insetti nocivi, III. 345. f. 178—179. [*Cephalomyia*] (1900); HOW., Insekt. Book, 155. f. 85. (1902); JOHNS, ap. SMITH, Ins. N. Jers., 667. f. 313. (1903).

ovinus FISCH., Dissert. Cont., III. t. II. f. 1—5. (1787).

perplevus HUDS., Man. N. Zeal. Entom., 63. t. VII. f. 12. (1892).

perplevus HUDS. = *ovis* L.

Larvae

antilopis PALL.^{*)}, Spicil. zool., XII. 50. (1777); BRAUER, Mon., 161. (1863); PORTSCH., Ann. Mus. Petersb., VII. 216. t. VI. f. 4. (1902).
argalis BRAUER^{**)}, PALL., Spicil. zool., XI. 29. (1776); BRAUER, Mon., 160. (1863) et Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 82. (1883).
 Russia asiat.

Rhinoestrus

BRAUER, Wien. entom. Zeitg., V. 300. (1886).

purpureus BRAUER^{***)}, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 457. [*Cephalomyia*] (1858), X. 650. [*Cephalomyia*] (1860), Mon., 158. 3. [*Oestrus*] (1863), Wien. entom. Zeitg., V. 275. [*Oestrus*] et 289. t. IV. (1886), VI. 15 et 76. (1887); SEMX., F. A., I. 393. [*Oestrus*] (1862); LEE., Wien. entom. Monatschr., VII. 38. [*Cephalomyia*] (1863); PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVIII. 129. [*Oestrus*] (1884); GREYR., Ges. Nat. Fr. Berlin, 1904. 36. (1904).
 Europacentr. et mer., Africa sept.

*) *Antilope gutturosa* PALL.

**) *Ovis argali* BOUD.

***) *Equus caballus* L. et *zebra* L.

Gastrophilinae.*)

Gastrophilus

LEACH, Mem. Wern. Soc. Edinburgh, II. 568. II. [*Gasterophilus*] (1817).

Enteromyza Rond., Dipt. ital. Prodr., II. 20. nota. (1857).

Gastrus Meig., S. B., IV. 174. CXL. (1824).

antilopes PALL. = **equi** FABR.

asininus Brauer = **equi** FABR. var.

bengalensis Macq. = **equi** FABR.

bovis Gmel. = **haemorrhoidalis** L.

bovis L. = **equi** FABR. et **pecorum** FABR.

Clarkii Leach = **nasalis** L.

laudensis Schwarz = **nasalis** L.

equi (Clark**), p. p., Trans. Linn. Soc., III. 226. t. XXIII. f. 7—9. Europa,
 [*Oestrus*] (1797) et Essay, 17. t. I. f. 1—16. [*Oestrus*] (1815); Africa sept.
 GEOPR., Hist. ins., II. 456. 3. [—] (1766); Rossi, Fauna etc., II.
 268. 1413. [*Oestrus*] (1790); FABR., Syst. Antl., 228. 4. [*Oestrus*]
 (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 341. [*Oestrus*] (1806), Cons.
 gén., 441. [*Oestrus*] (1810), Dict. Hist. nat., Oestre [*Oestrus*]
 (1816) et Fam. nat. règne anim., V. 504. [*Oestrus*] (1825); HALLG.,
 Fauna etc. Rossi, II. 416. 1413. [*Oestrus*] (1807); SAM., Entom.
 Compend., 70. t. IX. f. 1. [*Oestrus*] (1819); SHAW, Gen. zool.,
 VI. 359. t. 102. f. med. [*Oestrus*] (1806); WOOD, Linn. gen. ins.,
 II. 81. 63. [*Oestrus*] (1821); OL., Encycl. méthod., VIII. 462.
 [*Oestrus*] (1811); HARR., Ins. of N. Engl., 3 ed., 623. t. VIII. f.
 2. [*Oestrus*] (1842); LEACH, Eprob. Ins., 2. I. (1817) et Mem.
 Wern. Soc., II. 568. I. (1818); FALL., Dipt. succ. Haemat., 13. 8.
 [*Oestrus*] (1818); MEIG., S. B., IV. 175. 1. t. XXXVIII. f. 21—22.
 [*Gastrus*] (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 229. 1. t. VI. f.
 1. (1834), Suit. à Buff., II. 52. 1. t. XIII. f. 23. [*Oestrus*] (1835)
 et Luc. Explor. Algérie Zool., III. 475. 187. [*Oestrus*] (1849);
 GUER., Icon. règne anim. Ins., t. 101. f. 6. [*Oestrus*] (1837); NEM.,
 Ueb. Brems. Larven, 16. (1837); ZETT., Ins. Lapp., 623. 1. [*Ga-*
strus] (1838) et Dipt. Scand., III. 976. 1. (1844), XII. 4684. 1.
 [*Gastrus*] (1853); DAHLB., Skand., Ins. skåda, 313. 213. f. 22.
 [*Oestrus*] (1837); 2, Dict. pict. Hist. nat., VI. 226. t. 458. f. 2.
 [*Oestrus*] (1835); BAYLE BAR., Saggio, 91. 76. t. I. f. 10. [*Aestrus*]
 (1819); GENE, Insetti nocivi, 178. 124. [*Oestrus*] (1835); WESTW.,
 Introd., II. —. (1840); BLANCH., Hist. nat. ins., III. 608. t. IV.
 f. 6—7. [*Oestrus*] (1840); JOLY, Mem. Soc. Agric. Lyon, IX. 182.
 [*Oestrus*] (1846); ROND., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (3). IX. 67.

*) Haec tribus in methodo Girschneriana ad familiam Anthomyidarum recte adscribenda est.

**) Equus caballus L. (et asinus L.), Hyæna striata L.

[*Gastrus*] (1854) et Dipt. ital. Prodr., II. 19. 2. [*Oestrus*] (1857); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 685. [*Gastrus*] (1849) et Ins. Brit., II. 274. 1. t. XIX. f. 5. (1853); HENNIG, Isis Dresden, I. 297. [*Gastrus*] (1855); BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 414 et 456. (1858) et Mon., 68. 1. (1863); SCHIX., F. A., I. 391. (1862); R.-D., Posth., I. 61. 1. [*Oestrus*] (1863); BOSSD., Fiml. Insekt., II. 31. 1. [*Gastrus*] (1866); DISCONZI, Entom. vicent., 224. 2. f. 259—260. [*Oestrus*] (1865); FEDTSCH., Materiali, 155. (1868); MEIN., Trophi Dipter., t. VI. f. 17—18. [*Gastrus*] (1881); ERCOLANI, Rendic. Accad. Bologna, 20. [*Gastrus*] (1864); GÜLLER., Mittheil. naturf. Ges. Bern, 1881. 7. (1882); PERRONC., Ann. Accad. Agric. Torino, XXXIX. fig. (1896); ENDERL., Sitzgsber. Akad. Wien, CVIII. t. I—II. f. 1, 3, 9, 12, 13, 16, 21—23, 26, 31—34, 41. [*Gastrus*] (1899); B. FEDTSCH., Entom. Nachricht., XVII. 202. 375. (1891); HUTT., Trans. N. Zeal. Inst., 1900. 44. (1900); FROGG., Agric. Gazzette N. S. W., 1900. t. I. f. 9. (1900); MELL., Zool. Jahrbüch., XV. 679. (1900) et Tijdskr. Entom., XXXVIII. 12. f. 12—13. (1901); VANEX, Ann. Univ. Lyon, (1902); LEON., Insetti nocivi, III. 337. f. 174—176. (1900); WESCHÉ, Journ. micr. Soc., 1904. t. III. f. 4. (1904).*)

? *antilopes* PALL., Itin., I. app. 475. 78. [*Oestrus*] (1779).

bovis L., Fauna suec., II. 1730. [*Oestrus*] (1761) et Syst. nat., XII. 969. 1. [*Oestrus*] (1767); FABR., Syst. entom., 743. 1. [*Oestrus*] (1775) et Spec. ins., II. 398. 2. [*Oestrus*] (1781); HERBST, Gem. Naturg., VIII. 94. t. LXIV. f. 1. [*Oestrus*] (1787); FISCH., Diss. cont., II. t. II—IV. [*Oestrus*] (1787); SCHIRANK, Enum. insect., 417. 842. [*Oestrus*] (1781).

gastricus SCHWAB, Die Oestrac., 31. [*Oestrus*] (1840) et Verg. anat. path. Praep. München, ed. II. 88. [*Oestrus*] (1841).

haemorrhoidalis GÆL. (nec L.), Syst. nat., V. 2810. 4. [*Oestrus*] (1788); DWIG., Primitiae faun. Mosqu., 173. 610. [*Oestrus*] (1802); SCHIRANK, Fauna boi., III. 58. 2286. [*Oestrus*] (1803).

intestinalis DEG., Ins., VI. 291. 1. t. XV. f. 13—19. [*Oestrus*] (1776) et Götze, VI. 117. 1. [*Oestrus*] (1782).

var. *asinimus* BRAUER, Mon., 71. (1863).

var. *bengalensis* MACQ., Dipt. exot., III. 25. [*Oestrus*] (1843).

equi CLARK = *equi* FABR. et *pecorum* FABR.

ferruginatus BRAUER = *inermis* BRAUER.

ferruginatus ZETT. = *pecorum* FABR.

flavipes OL.**), Encycl. méthod., VIII. 467. 12. [*Oestrus*] (1811); Europa mer.
MALPIGHI, Opera, 8. *larva*. [—] (1686); MACQ., Suit. à Buff., II. Africa sept.
54. 6. [*Oestrus*] (1835); MEIG., S. B., VII. 171. 9. [*Oestrus*] (1838); Asia min.

*) *uterinus* GROGNIER, Préc. cours zool. vét., [*Oestrus*] (?).
teste JOLY, Ann. Accad. Agric. Lyon, IX. 293. (1846) est species excludenda.

**) *Equus asinus* L.

JOLY, Ann. Accad. Agric. Lyon, IX. 286. [*Oestrus*] (1846);
BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 450. 456. [*Gastrus*]
(1868) et Mon., 80. 4. (1863).

pallens BIG., Bull. Soc. entom. France, (5). IV. LXXX. (1884);

BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wien, CVI. 332. 1. (1887).

gastricus SCHWAB = **equi** FABR. et **pecorum** FABR.

haemorrhoidalis GMEL. = **equi** FABR.

haemorrhoidalis L.*, Syst. nat., X. 590. [*Oestrus*] (1758), XII. II. Europa.

970. 4. [*Oestrus*] (1767) et Fauna suec., II. 1733. [*Oestrus*] (1761);

RÉAUM., Mem. ins., IV. t. XXXV. f. 1—5. [—] (1734); GEOFFR.,

Hist. ins., II. 455. [—] (1764); FABR., Syst. entom., 746. [*Oestrus*]

(1775). Spec. insect., II. 399. 5. [*Oestrus*] (1781), Entom. syst.,

IV. 232. 7. [*Oestrus*] (1794) et Syst. Antl., 229. 7. [*Oestrus*]

(1805); DEG., Ins., VI. 291. t. XV. f. 13. [*Oestrus*] (1776) et

Götze, VI. 117. (1782); VILL., Entom. linn., III. 347. 4. [*Oestrus*]

(1789); CLARK, Trans. linn. Soc., III. 289. t. XXIII. f. 10—13.

[*Oestrus*] (1797) et Essay, 29. [*Oestrus*] (1815); OL., Encycl.

méthod., VIII. 462. 7. [*Oestrus*] (1811); LEACH, Eprob. ins., 2. 2.

(1817) et Mem. Wern. Soc., II. 568. 2. (1818); FALL., Dipt. suec.

Haemat., 13. 7. [*Oestrus*] (1818); MEIG., S. B., IV. 177. 4. [*Gastrus*]

(1824); LATR., Fam. nat. règne anim., V. 504. [*Oestrus*] (1825);

MACQ., Soc. Sci. Lille, 1833, 330. 3. [*Oestrus*] (1834) et Suit. à

Buff., II. 53. 4. [*Oestrus*] (1835); NUM., Ueb. Bremsenlarv., 24.

21. [*Gastrus*] (1837); BAYLE BAR., Saggio, 93. 77. [*Oestrus*] (1819);

GENE, Insetti nocivi, 179. 125. [*Oestrus*] (1835); ?, Dict. pict.

hist. nat., VI. 226. [*Oestrus*] (1833); SCHWAB, Die Oestrac., 37.

[*Oestrus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., III. 981. 7. [*Gastrus*] (1844);

JOLY, Ann. Acc. Agric. Lyon, IX. 200. [*Oestrus*] (1846); WALK.,

List Dipt. Brit. Mus., III. 687. [*Gastrus*] (1849) et Ins. Brit., II.

274. 2. (1853); ROND., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (3). IX. 67.

[*Oestrus*] (1854) et Dipt. ital. Prodr., II. 19. 3. [*Oestrus*] (1857);

BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 414. [*Gastrus*] (1858)

et Mon., 83. 6. (1863); SCHN., F. A., I. 392. (1862); BOSSD.,

Finnl. Insekt., II. 31. 2. [*Gastrus*] (1866); PORTSCH., Trudy, X.

191. (1874); BECH., Denkschr. Akad. Wien, XLV. t. IV. f. 29.

(1882); HÜBER, Bibliogr. Jena, 21. (1899); ENDERL., Sitzgsber.

Akad. Wien, CVIII. t. I—II. f. 6, 7, 28. [*Gastrus*] (1899); HERTT.,

Trans. N. Zeal. Instit., 1900. 44. (1900); LEON., Insetti nocivi,

III. 342. f. 177. (1900).

boris GMEL. (*nee* L.), Syst. nat., V. 2809. 1. [*Oestrus*] (1788).

inermis BRAUER**, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 461. [*Gastrus*] Europa-centr.
(1858) et Mon., 73. 2. (1863); SCHN., F. A., I. 391. (1862). et mer.

feruginatus BRAUER (*nee* ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
VIII. 414. [*Gastrus*] (1858).

*) *Equus caballus* L.

***) *Equus caballus* L.

intestinalis DEG. = **equi** FABR.

jubarum MEIG. = **pecorum** FABR.

jumentarum MEIG. = **nasalis** L.

lativentris BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII, 465. [*Gastrus*] Europa sept. (1858), Mon., 81, 5. (1863) et Sitzgsber. Akad. Wien, CVI, 332. (1897).

nasalis L.*), Syst. Nat., X, 590. [*Oestrus*] (1758) et XII, II, 969, 3. [*Oestrus*] (1767) et Fauna suec., II, 1722. [*Oestrus*] (1761); FABR., Syst. entom., 746, 3. [*Oestrus*] (1775), Spec. ins., II, 399, 4. [*Oestrus*] (1781), Entom. syst., IV, 232, 7. [*Oestrus*] (1894); RÉAUM., Mem. ins., IV, 550, t. XXXV, f. 1—2. [—] (1734); DEG., Ins., IV, t. XV, f. 20—21. [*Oestrus*] (1776) et Götze, VI, t. XV. [*Oestrus*] (1782); GMELL., Syst. Nat., V, 2810, 3. [*Oestrus*] (1788); VILL., Entom. linl., III, 347, 3. [*Oestrus*] (1790); SCHRANK, Fauna boi., III, 59, 2287. [*Oestrus*] (1803); MEIG., S. B., IV, 178, 5. [*Gastrus*] (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833, 330, 4. [*Oestrus*] (1834) et Suit. à Buff., II, 54, 5. [*Oestrus*] (1835); NUM., Ueb. Bremsenlarv., 27. [*Gastrus*] (1837); ZETT., Ins. Lapp., 624, 3. [*Gastrus*] (1838) et Dipt. Scand., III, 979, 4. [*Gastrus*] (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III, 686. [*Gastrus*] (1849) et Ins. Brit., II, 275, 4. (1853); ROND., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (3), IX, 67. [*Gastrus*] (1854); BRAUER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII, 414, 457. [*Gastrus*] (1858) et Mon., 86, 7. (1863); SCHN., F. A., I, 392. (1862); PORTSCH., Trudy, X, 192. (1874).

Clarkii LEACH, Eprob. ins., 2, 3. (1817) et Mem. Werner. Soc.,

II, 568, 3. (1818); MEIG., S. B., IV, 180, 8. [*Gastrus*] (1824).

duodenalis SCHWAB, Die Oestrac., 35, 37. [*Oestrus*] (1840).

jumentarum MEIG., S. B., IV, 179, 6. [*Gastrus*] (1824).

nigritus ZETT., Dipt. Scand., III, 981, 6. [*Gastrus*] (1844).

salutaris MEIG., S. B., IV, 176, 3. [*Gastrus*] (1844); DUMER.,

Cons. gén., t. LI, f. A. [*Oestrus*] (1823); Macq., Soc. Sci.

Lille, 1833, 329, 2. [*Oestrus*] (1834) et Suit. à Buff., II, 53,

3. [*Oestrus*] (1835); ?, Dict. piet. hist. nat., VI, 226. [*Oestrus*]

(1833); CURT., Brit. entom., VIII, 145. [*Gastrus*] (1837);

GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX, (3), 184, 3. [*Ga-*

strus salutaris] (1847); ZETT., Dipt. Scand., III, 980, 5. [*Ga-*

strus] (1853); WALK., Ins. Brit., II, 275, 3. (1853); ROND.,

Dipt. ital. Prodr., II, 18, nota. [*Oestrus*] (1887); FROGG.,

Agric. Gazzette N. S. W., 1900, 5, t. I, f. 1—8. (1900).

salutiferus CLARK, Essay, 33, t. I, f. 26, 27, 33—36. [*Oestrus*]

(1815); JOLY, Ann. Soc. Agric. Lyon, IX, 285. [*Oestrus*]

(1846).

subjacens WALK., List Dipt. Brit. Mus., III, 687. [*Gastrus*]

(1849); BRAUER, Mon., 90, 8. (1863); OST-SACK., Cat. N. A.

Dipt., 2, ed., 143. (1878).

*) *Equus caballus* L.

reterinus CLARK, Trans. linn. Soc., III, 328. 4. [*Oestrus*] (1797);
 FABR., Syst. Anth., 230. 8. [*Oestrus*] (1805); OL., Encycl.
 méthod., VIII, 462. [*Oestrus*] (1811); FALL., Dipt. suec.
 Haemat., 12. 6. [*Oestrus*] (1818); BAYLE BAR., Saggio, 96. 79.
 [*Aestrus*] (1819); GEXE, Insetti nocivi, 180. 126. [*Oestrus*]
 (1835); JOLY, Ann. Acc. Agric. Lyon, IX, 284. [*Oestrus*]
 (1846).

nigricornis Lw., Wien. entom. Monatschr., VII, 38. [*Gastrus*] (1863); Rossia mer.
 BRAUER, Mon., 90. 9. (1863).

nigritus ZETT. = **nasalis** L.

pallens BIG. = **flavipes** OL.

pecorum FABR.*), Entom. syst., IV, 230. 2. [*Oestrus*] (1794) et Syst. Europa.
 Anth., 228. 2. [*Oestrus*] (1805); FALL., Dipt. suec. Haemat., 12. 5.

[*Oestrus*] (1818); MEIG., S. B., IV, 176. 2. [*Gastrus*] (1824);

MACQ., Suit. à Buff., II, 53. 2. [*Oestrus*] (1835); ZETT., Ins. Lapp.,

623. 2. [*Gastrus*] (1838) et Dipt. Scand., III, 977. 2. [*Gastrus*]
 (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III, 686. [*Gastrus*] (1849);

ROUD., Dipt. ital. Prodr., II, 18. *nota*, [*Oestrus*] (1857) et Atti Soc.
 ital. Sci. Nat., XI, 21. [*Oestrus*] (1868); BRAUER, Verh. zool.-bot.

Ges. Wien, VIII, 456. [*Gastrus*] (1858) et Mon., 75. 3. (1863);

SCHN., F. A., I, 391. (1862); LEON., Ins. nocivi, III, 343. (1900).
bovis var. *b.* L., Fauna suec., II, 1730. [*Oestrus*] (1761).

equi var. *b.* CLARK, Essay, 66. [*Oestrus*] (1815).

ferruginatus ZETT., Dipt. Scand., III, 978. 3. [*Gastrus*] (1844);
 ROND., N. Ann. Sci. nat. Bologna, (3), IX, 67. [*Oestrus*]
 (1854) et Dipt. ital. Prodr., II, 18. 1. [*Oestrus*] (1857).

gastricus SCHWAB p. p.

jaborum MEIG., S. B., IV, 179. 7. [*Gastrus*] (1824).

Selysi CARL., Rev. Mag. Zool., [*Gastrus*] (1842); WALK., List
 Dipt. Brit. Mus., III, 687. [*Gastrus*] (1849).

reterinus var. JOLY, Ann. Acc. Agric. Lyon, IX, 293. [*Oestrus*]
 (1846).

ritali FABR., Entom. syst., IV, 231. 4. [*Oestrus*] (1794); SCHELL.,
 Genr. Mouch. Dipt., 14. t. XXI. [*Oestrus*] (1803).

salutaris MEIG. = **nasalis** L.

salutiferus CLARK = **nasalis** L.

Selysi CARL. = **pecorum** FABR.

subjuvens WALK. = **nasalis** L.

reterinus CLARK = **nasalis** L.

reterinus JOLY = **pecorum** FALL. p. p.

ritali FABR. = **pecorum** FABR.

*) *Equus caballus* L.

CYCLORRHAPHA.

CYCLORRAPHA SCHIZOPHORA.

SCHIZOMETOPA.

ANTHOMYIDAE.

I. Muscinae.

a. *M. muscaeformes*.

Graphomyia

R.-D., Essai sur les Myod., 403. XV. (1830).

Cartoneura MACQ., Recueil Soc. Sci. Agric. Lille, 146. p. p. (1833).

Cyrtoneura (nom. emend.) MEIG., S. B., VII. 309. 4. p. p. (1838).

?bimaculata MACQ., Recueil Soc. Sci. Agric. Lille, 149. 11. ♂ [*Cartoneura*] (1833). Gallia.

caerulescens WAHLBG., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., IX. 185. Europa sept. [*Cyrtoneura*] (1852).

picta ZETT., Dipt. Scand., XII. 4715. 10—11. ♂ [*Cyrtoneura*] (1855).

maculata Scop., Entom. carn., 326. 870. [*Musca*] (1763); L., Syst. Nat., Ed. XII. 990. 70. [*Musca*] (1767); DEG., Ins., VI. 84. 13. [*Musca*] (1776); FABR., Mantissa Ins., II. 342. 8. [*Musca*] (1787); Rossi, Faun. etr., II. 300. 1490. [*Musca*] (1790); FABR., Entom. syst., IV. 314. 8. ♀ [*Musca*] (1794); PASZ., Fauna germ., 44. 22. [*Musca*] (1797); FABR., Syst. Antl., 287. 14. [*Musca*] (1805); FALL., Musc., 49. 27. [*Musca*] (1823); MEIG., S. B., V. 78. 48. [*Musca*] (1826); R.-D., Myod., 403. I. (1830); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 149. 9. [*Cartoneura*] (1833) et Suit. à Buff., II. 275. 1. [*Cartoneura*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 659. 25. [*Musca*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1355. 10. [*Cyrtoneura*] (1845); WALK., Ins. Brit., II. 114. 19. [*Musca*] (1853); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4715. Europa, Africa sept. Syria.

10. [*Cyrtoneura*] (1855); SCHN., F. A., I. 582. (1862); ROXD., Prodr., V. 218. 1. (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 633. 1. (1863); PAND., Revue Entom. France, XVII. 47. (1898).
minor R.-D., Myod., 404. 3. (1830).
vulpina FABR., Spec. Ins., II. 439. 20. ♂ [*Musca*] (1781), Entom. syst., IV. 319. 29. ♂ [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 292. 43. ♂ [*Musca*] (1805); R.-D., Myod., 404. 2. (1830).
media R.-D., Myod., 405. 5. (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 634. 2. Gallia. (1863).
minor R.-D. = **maculata** SCOP.
picta ZETT. = **caerulescens** WAHLBG.
vulpina FABR. = **maculata** SCOP.

Morellia

R.-D., Essai sur les Myod., 405. XVI. (1830).

- Alina* R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 639. XV. (1863).
Camilla R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 641. XVI. (1863).
Cartoneura MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 146. p. p. (1833).
Cyrtoneura (nom. emend.) MEIG., S. B., VII. 309. 4. p. p. (1838).
aculeata EGG. = **aenescens** R.-D.
aenescens R.-D., Myod., 406. 4. (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 641. Europa.
 1. [*Camilla*] (1863); PAND., Revue Entom. France, XVII. 34. 1. [*Pyrellia*] (1898).
aculeata EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 291. ♂ [*Cyrtoneura*] (1865).
curripes MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 148. 8. [*Cartoneura*] (1833) et Suit. à Buff., II. 276. 7. ♂ [*Cartoneura*] (1835); MEIG., S. B., VII. 310. 11. [*Cyrtoneura*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1347. 2. [*Cyrtoneura*] (1845); ROXD., Prodr., V. 215. 3. [*Cyrtoneura*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVI. 27. 4. ♂ (1880); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1893. 75. [*Cyrtoneura*] (1894).
valga ZETT., Dipt. Scand., IV. 1348. 3. ♂ [*Cyrtoneura*] (1845).
agilis R.-D. = **hortorum** FALL.
palbolineata GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 682. [*Hylemyia*] (1842). Russia.
caerulescens MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 148. 7. [*Cartoneura*] (1833). Gallia.
concolor R.-D., Myod., 406. 3. (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 640. Gallia.
 3. ♂ [*Alina*] (1863).
curripes MACQ. = **aenescens** R.-D.
fuliginosa R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 638. 3. ♂ (1863). Gallia.
fuscana R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 642. 2. ♂ [*Camilla*] (1863). Gallia.

- gagatea** R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II, 638, 4, ♂ (1863). Gallia.
- horticola** R.-D. = **hortorum** FALL.
- hortorum** FALL., Acta Holm., 252, 33. [*Musca*] (1816); WIED., Zool. Mag., I, 1, 83, 35. [*Anthomyia*] (1817); FALL., Musc., 52, 33. [*Musca*] (1823); MEIG., S. B., V, 73, 39. [*Musca*] (1826); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 148, 6. [*Curtoncra*] (1833) et Suit. à Buff., II, 276, 5. [*Curtoncra*] (1835); HALID., Ann. nat. Hist., II, 185. (1838); ZETT., Ins. Lapp., 660, 30. [*Musca*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1346, 1. [*Cyrtoneura*] (1845); WALK., Ins. Brit., II, 113, 17. [*Musca*] (1853); LW., Wien. entom. Monatschr., I, 46. [*Cyrtoneura*] (1857); SCHN., F. A., I, 597. [*Cyrtoneura*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVI, 25, 2. (1880).
- agilis** R.-D., Myod., 405, 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 276, 6. [*Curtoncra*] (1835); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II, 639, 1. [*Mina*] (1863); PAND., Revue Entom. France, XVII, 34, 2. [*Pyrellia*] (1898).
- horticola** R.-D., Myod., 405, 2. (1830).
- importana** HALID., Entom. Mag., IV, 149, 2, p. p. (1837).
- pilipes** ROXD., Prodr., V, 215, 2. ♂ [*Cyrtoneura*] (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II, 640, 4. ♂ [*Mina*] (1863); BEZZI, Bull. Soc. entom. Ital., XXIII, 60. [*Cyrtoneura*] (1891).
- hortorum** HAL. (nec FALL.) = **simplex** LW.
- hortulana** WIED., AUSSER. zweifl. Ins., II, 417, 57. ♀ [*Musca*] (1830). China.
- importana** HAL. p. p. = **hortorum** FALL.
- importana** HAL. p. p. = **simplex** LW.
- lusoria** R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II, 637, 2, ♂ (1863). Gallia.
- nilotica** LW., N. Beitr., IV, 48, 43. ♂ [*Cyrtoneura*] (1856); STEIN, Mitt. Zool. Mus. Berlin, II, 101, 142. (1903). Aegyptus.
- pilipes** ROXD. = **hortorum** FALL.
- podagrica** LW., Wien. entom. Monatschr., I, 45. [*Cyrtoneura*] (1852); SCHN., F. A., I, 596. [*Cyrtoneura*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVI, 26, 3. ♂ (1880); STROBL, Mitth. Ver. Steierm., 1893, 75. [*Cyrtoneura*] (1894); PAND., Revue Entom. France, XVII, 35, 3. [*Pyrellia*] (1898). Europacentr. et sept.
- pratensis** R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II, 640, 2, ♂ [*Mina*] (1863). Gallia.
- simplex** LW., Wien. entom. Monatschr., I, 45. [*Cyrtoneura*] (1857); SCHN., F. A., I, 596. [*Cyrtoneura*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVI, 24, 1. (1880). Europa.
- hortorum** HAL. (nec FALL.), Entom. Mag., IV, 149. (1837); ROXD., Prodr., V, 214, 1. [*Cyrtoneura*] (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II, 636, 1. (1863); PAND., Revue Entom. France, XVII, 35, 4. [*Pyrellia*] (1898).
- importana** HAL., Ann. nat. Hist., II, 185. (1838).
- radya** ZETT. = **aenescens** R.-D.
- vidua** R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II, 642, 3. ♂ [*Camilla*] (1863). Gallia.

Musca

L., Fauna Suec., Ed. II. 439. (1761).

Byomya R.-D., Myod., 392. X. (1830).

Placemya R.-D., Myod., 392. IX. (1830).

angustifrons THOMS., Eugenicus Resa, Dipt., 546. 174. (1868).

bivittata THOMS., Eugenicus Resa, Dipt., 547. 177. (1868).

aurifacies R.-D., Myod., 396. 2. ♂ (1830); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 158. 4. ♂ (1833) et Suit. à Buff., II. 266. 5. ♂ (1835); MEIG., S. B., VII. 302. 14. ♂ (1838); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 619. 2. ♂ (1863).

campestris R.-D., Myod., 395. 1. ♀ (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 266. 6. ♀ (1835); MEIG., S. B., VII. 305. 26. ♀ (1838); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 619. 1. ♀ (1863).

campicola R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 627. 12. (1863).

frontalis RONDI., Atti Soc. Milano, XI. 51. (1868).

riparia R.-D., Myod., 398. 8. ♀ (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 266. 3. ♀ (1835); MEIG., S. B., VII. 304. 25. ♀ (1838).

reticularis R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 627. 13. ♀ (1863).

autumnalis DEG. = **corvina** FABR.

bivittata THOMS. = **angustifrons** THOMS.

bovina R.-D. = **domestica** L.

campestris R.-D. = **aurifacies** R.-D.

campicola R.-D. = **aurifacies** R.-D.

carifex R.-D. = **tempestita** FALL.

continua R.-D. = **corvina** FABR.

convexifrons THOMS., Eugenicus Resa, Dipt., 547. 176. ♂ (1868).

corvina FABR., Spec. Ins., II. 440. 21. ♂ (1781), Mantissa Ins., II. 344. 23. (1787); ROSSI, Fauna etr., 302. 1495. (1790); FABR., Entom. syst., IV. 320. 31. ♂ (1794) et Syst. Antl., 294. 49. ♂ (1805); FALL., Muse., 48. 25. (1821); MEIG., S. B., V. 69. 32. (1826); R.-D., Myod., 396. 4. (1830); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 157. 3. (1833) et Suit. à Buff., II. 266. 4. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 659. 23. (1838) et Dipt. Scand., IV. 1336. 8. (1845); WALK., Ins. Brit., II. 111. 12. (1853); SCHN., F. A., I. 594. (1862); ROND., Prodr., V. 221. 1. (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 620. 3. (1863); PAND., Revue Entom. France, XVII. 42. 3. (1898).

autumnalis DEG., Ins., VI. 83. 12. (1776).

continua R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 628. 15. (1863).

floralis R.-D., Myod., 397. 7. ♀ (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 622. 6. ♀ (1863).

grisella R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 622. 5. (1863).

ludifacies R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 621. 4. (1863).

ludifica FABR., Entom. syst., IV. 323. 46. ♂ (1794) et Syst. Antl., 298. 73. (1805); PANZ., Fauna germ., 105. 13. ♀ (1809).

Aegyptus,
Ins. Canar.
Europacentr.
et mer.

China.
Europa,
Afr. sept.,
Caucasus.

- nigripes* PANZ. (*nec* FABR.), Fauna germ., 60. 13. ♂ (1798).
rustica R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 622. 7. (1863).
Tau SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 458. 931. ♂ (1781).
ambaculata FABR., Syst. Antl., 294. 50. (1805).
- crassirostris** STEIN, Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 99. 137. (1903). Aegyptus.
- cuprea* MACQ. = **tempestiva** FALL.
- domestica** L., Fauna Suec., Ed. II. 453. 1833. (1761); Scop., Entom. capul., 327. 872. (1763); L., Syst. Nat., Ed. XII. II. 990. 69. (1767); FABR., Syst. Entom., 774. 5. (1775); DEG., Ins., VI. 72. 10. (1776); SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 456. 928. (1781); FABR., Spec. Ins., II. 436. 7. (1781) et Mantissa Ins., II. 343. 9. (1787); ROSSI, Faun. Etr., II. 300. 1489. (1790); FABR., Entom. syst., IV. 315. 11. (1794) et Syst. Antl., 287. 18. (1805); FALL., Musc., 49. 26. (1823); MEIG., S. B., V. 67. 31. (1826); R.-D., Myod., 398. 10. (1830); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille. 157. 1. (1833) et Suit. à Buff., II. 265. 1. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 659. 24. (1838) et Dipt. Scand., IV. 1335. 7. (1845); WALK., Ins. Brit., II. 111. 11. (1853); SEMN., F. A., I. 594. (1862); ROND., Prodr., V. 221. 2. (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 624. 9. (1863); PANZ., Revue Entom. France, XVII. 42. 4. (1898).
- bovina* R.-D., Myod., 398. 9. (1830); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 157. 2. ♂ (1833) et Suit. à Buff., II. 266. 2. ♂ (1835); MEIG., S. B., VII. 302. 13. (1838); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 623. 8. (1863).
- lateralis* MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 158. 5. ♀ (1833) et Suit. à Buff., II. 266. 7. ♀ (1835); MEIG., S. B., VII. 303. 15. ♀ (1838).
- vaccina* R.-D., Hist. nat. d. Dipt. II. 625. 10. (1863).
- vagatoria* R.-D., Myod., 399. 12. ♀ (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 626. 11. (1863).
- floralis* R.-D. = **corvina** FABR.
- frontalis** MACQ., Dipt. exot., II. 3. 151. 1. ♂ (1843); Algeria.
- frontalis* ROND. = **aurifacies** R.-D.
- grisella* R.-D. = **corvina** FABR.
- gymnosomea** ROND., Prodr., V. 222. 4. (1862). Ins. Mehta.
- lasiophthalma* THOMS. = **vitripennis** MEIG.
- lateralis* MACQ. = **domestica** L.
- lucidula** Lw., Beitr., IV. 48. 42. ♀ [*Cyrtoneura*] (1856). Aegyptus.
- ludifacies* R.-D. = **corvina** FABR.
- ludifica* FABR. = **corvina** FABR.
- minima* ROND. = **tempestiva** FALL.
- nana* MEIG. = **tempestiva** FALL.
- nigripes* PANZ. (*nec* FABR.) = **corvina** FABR.
- niveisquama** THOMS., Eugenios Resa, Dipt., 547. 175. (1868). China.
- Osiris* WIED. = ? **vitripennis** MEIG. Aegyptus.
- ? **pellucens** MEIG., S. B., VII. 303. 19. ♀ (1838). Bavaria.
- phasiaciformis* MEIG. = **tempestiva** FALL.

- phasiiformis* MACQ. (*nee* MEIG.) — **vitripennis** MEIG.
riparia R.-D. — **aurifacies** R.-D.
reticularis R.-D. — **aurifacies** R.-D.
rustica R.-D. — **corvina** FABR.
senegalensis MACQ., Dipt. exot., II. 3. 151. 2. ♂ (1853). Senegambia.
stimulans R.-D. — **tempestiva** FALL.
sugillatrix R.-D. — **vitripennis** MEIG.
Tau SCHRANK — **corvina** FABR.
tempestiva FALL., Musc., 53. 56. (1823); MEIG., S. B., V. 76. 44. ♂ (1826); ZETT., Ins. Lapp., 661. 31. (1838) et Dipt. Scand., IV. 1349. 4. [*Cyrtoneura*] (1845) et XII. 6189. 4. [*Cyrtoneura*] (1859); SCHIX., F. A., I. 595. (1862); ROND., Prodr., V. 222. 3. (1862); PAND., Revue Entom. France, XVII. 41. 2. (1898). Europa.
caruifer R.-D., Myod., 393. 1. [*Byomyia*] (1830); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 158. 7. (1833) et Suit. à Buff., II. 267. 10. (1835); MEIG., S. B., VII. 303. 16. (1838); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 616. 1. [*Byomyia*] (1863). Asia sept., Afr. sept.
cuprea MACQ., Suit. à Buff., II. 268. 12. ♀ (1835); MEIG., S. B., VII. 304. 24. ♀ (1838).
minima ROND., Atti Soc. Milano, XI. 52. ♀ (1868).
nana MEIG., S. B., VI. 375. 51. ♀ (1830).
phasiiformis MEIG., S. B., V. 72. 37. (1826) et VII. 303. 18. (1838).
stimulans R.-D., Myod., 393. 3. [*Byomyia*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 268. 11. (1835); MEIG., S. B., VII. 304. 23. (1838); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 617. 3. [*Byomyia*] (1863).
umbraculata FABR. = **corvina** FABR.
vaccina R.-D. = **domestica** L.
vagatoria R.-D. = **domestica** L.
? **varensis** R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 627. 14. ♀ (1863). Gallia.
violacea R.-D., Myod., 393. 2. ♀ [*Byomyia*] (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 616. 2. ♀ [*Byomyia*] (1863). Gallia.
vitripennis MEIG., S. B., V. 73. 38. ♂ (1826); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 158. 6. ♂ (1833) et Suit. à Buff., II. 267. 8. ♂ (1835); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3271. 8. 9. ♂ (1849); DUF., Annal. Soc. entom. France, sér. 2. IX. 67. ♀ (1851); WALK., Ins. Brit., II. 111. 13. (1853); SCHIX., F. A., I. 594. (1862); ROND., Prodr., V. 224. 1. [*Placemyia*] (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 615. 1. ♂ [*Placemyia*] (1863); PAND., Revue entom. France, XVII. 41. 1. (1898). Europa.
lasiophthalma THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 548. 179. (1868).
? *Osiris* WIED., Ausser. zweifl. Ins., II. 420. 62. ♂ (1830). Afr. sept., Ins. Canar.
phasiiformis MACQ. (*nee* MEIG.), Suit. à Buff., II. 267. 9. (1835); ROND., Prodr., V. 225. 2. [*Placemyia*] (1862).
sugillatrix R.-D., Myod., 392. 1. [*Placemyia*] (1830).

Dasyphora

R.-D., Essai sur les Myod., 409. XVIII. (1830).

Carloneura Macq., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 146. p. p. (1833).

Cyrtoneura (nom. emend.) MEG., S. B., VII. 309. 4. p. p. (1838).

aeuconicicus PORTSCH. = ? **saltuum** ROND.

agilis R.-D. = **pratorum** MEG.

calidula R.-D. = **pratorum** MEG.

ferrens R.-D. = **pratorum** MEG.

fuliginosa R.-D. = **pratorum** MEG.

fulvicornis R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 653. 7. (1863).

Gallia.

guara R.-D. = **pratorum** MEG.

nicacensis R.-D. = ? **pratorum** MEG.

penicillata Egg. = **versicolor** MEG.

pratorum MEG., S. B., V. 78. 47. [*Musca*] (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 275. 3. [*Carloneura*] (1835); SCHN., F. A., I. 588. (1862); ROND., Prodr., V. 207. 1. (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 652. 4. (1863); PAND., Revue Entom. France, XVII. 39. II. [*Pyrellia*] (1898); HOGU, Termész. Füzet., XXIII. 249. (1900).

Europacentr. et mer.

agilis R.-D., Myod., 409. 1. (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 651. 3. (1863).

calidula R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 651. 2. (1863).

ferrens R.-D., Myod., 410. 2. ♀ (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 652. 5. ♀ (1863).

fuliginosa R.-D., Myod., 410. 4. (1830).

guara R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 650. 1. (1863).

? *nicacensis* R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 653. 6. (1863).

viridescens PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVII. 4. (1882).

viridula R.-D., Myod., 410. 3. (1830).

saltuum ROND., Prodr., V. 207. 2. (1862); PAND., Revue Entom. France, XVII. 40. 12. [*Pyrellia*] (1898); HOGU, Termész. Füzet., XXIII. 249. (1900).

Europacentr. et mer., Transcauc., Ins. Canar.

? *aeuconicicus* PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI. 143. ♀ (1881) et XVII. 4. (1882).

versicolor MEG., S. B., V. 77. 46. [*Musca*] (1826); SCHN., F. A., I. 588. (1862); ROND., Prodr., V. 208. 3. (1862); PAND., Revue entom. France, XVII. 39. 10. [*Pyrellia*] (1898).

Europacentr. et mer.

penicillata Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 292. [*Cyrtoneura*] (1865).

viridescens PORTSCH. = **pratorum** MEG.

viridula R.-D. = **pratorum** MEG.

Pyrellia

R.-D., Essai sur les Myod., 462. XXXVIII. (1830).

aenea ZETT., Dipt. Scand., IV. 1324. 5. (1845); SCHIX., F. A., I. 592, Europa. (1862).

bicolor R.-D., Myod., 465. 8. (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 844. 9. (1863).

calida R.-D., Myod., 464. 6. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 258. 30. [*Lucilia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 299. 6. (1838).

fasciata GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 678. (1842).

fervida R.-D., Myod., 465. 9. (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 845. 10. (1863).

fascipennis v. Ros., Württemb. Corrbll., I. 58. [*Musca*] (1840).

ignita R.-D., Myod., 464. 5. (1835); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 167. 15. [*Lucilia*] (1833) et Suit. à Buff., II. 257. 29. [*Lucilia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 298. 3. (1838); SCHIX., F. A., I. 592. (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 841. 3. (1863); PASD., Revue Entom. France, XVII. 37. 6. (1898).

littoralis R.-D., Myod., 464. 7. (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 844. 8. (1863).

saphyrea R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 843. 6. (1863).

scintilla R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 842. 5. (1863).

suda ROSB., Prodr., V. 205. 3. (1862); BEZZI, Bull. Soc. entom. Ital., XXIII. 61. 173. (1891).

albofasciata MACQ., Dipt. exot., II. 3. 149. 1. ♀ (1843).

Ins. Canar.

amoena R.-D. = **cadaverina** L.

bicolor R.-D. = **aenea** ZETT.

cadaverina L., Fauna Suec., Ed. II. 451. 1829. [*Musca*] (1761) et Europa.

Syst. Nat., Ed. XII. II. 989. 65. [*Musca*] (1767); FABR., Syst. Entom., 775. 9. [*Musca*] (1775); DEG., Ins., VI. 62. 7. [*Musca*] (1776); FABR., Spec. ins., II. 438. 12. [*Musca*] (1781); SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 455. 925. [*Musca*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 343. 14. [*Musca*] (1787); ROSSI, Fauna etr., 301. 1492. [*Musca*] (1790); FABR., Entom. syst., IV. 317. 21. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 289. 30. [*Musca*] (1805); FALL., Musc., 53. 35. [*Musca*] (1823); MEIG., S. B., V. 59. 19. [*Musca*] (1826); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 167. 14. [*Lucilia*] (1833) et Suit. à Buff., II. 257. 28. [*Lucilia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 298. 1. (1838); ZETT., Ins. Lapp., 656. 12. [*Musca*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1320. 1. (1845); WALK., Ins. Brit., II. 112. 15. [*Musca*] (1853); SCHIX., F. A., I. 592. (1862); ROSB., Prodr., V. 201. 2. (1862); PASD., Revue entom. France, XVII. 37. 7. (1898).

amoena R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 841. 2. (1863).

cuprea R.-D., Myod., 464. 4. ♂ (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 258. 31. ♂ [*Lucilia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 299. 7. ♂ (1838); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 842. 4. ♂ (1863).

- nitida* MEIG., S. B., VII. 298. 4. (1838); SCHN., F. A., I. 592. (1862).
- polita* MEIG., S. B., VII. 298. 5. ♂ (1838); SCHN., F. A., I. 592. (1862).
- suavipalata* R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 843. 7. (1863).
- usta* R.-D., Myod., 463. 3. ♂ (1830).
- vivida* R.-D., Myod., 463. 2. (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 840. 1. (1863).
- calida* R.-D. = **aenea** ZETT.
- caprea* R.-D. = **cadaverina** L.
- cyarella** MEIG., S. B., V. 77. 45. [*Musca*] (1826); MACQ., Suit. à Europaentr. Buff., II. 276. 4. [*Cartoncura*] (1835); SCHN., F. A., I. 588. [*Dasyphora*] (1862).
- cyarella* PAND. (nec MEIG.) = **eriphthalma** MACQ.
- cyanicolor* ZETT. = **serena** MEIG.
- eriphthalma** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 168. 18. ♀ [*Lucilia*] (1833) et Suit. à Buff., II. 258. 35. ♂ [*Lucilia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 299. 10. ♂ (1838); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1326. 7. (1845).
- cyarella* PAND. (nec MEIG.), Revue Entom. France, XVII. 39. 9. (1898).
- lasiophthalma* MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 168. 19. ♂ (1833) et Suit. à Buff., II. 258. 34. ♂ [*Lucilia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 299. 9. ♂ (1838); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1325. 6. (1845); WALK., Ins. Brit., II. 112. 14. [*Musca*] (1853).
- fasciata* GÜMM. = **aenea** ZETT.
- fervida* R.-D. = **aenea** ZETT.
- fuscipennis* v. Ros. = **aenea** ZETT.
- ignita* R.-D. = **aenea** ZETT.
- lasiophthalma* MACQ. = **eriphthalma** MACQ.
- littoralis* R.-D. = **aenea** ZETT.
- nitida* MEIG. = **cadaverina** L.
- polita* MEIG. = **cadaverina** L.
- purpureofasciata** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1321. 2. ♂ (1845). Suécia.
- saphyrea* R.-D. = **aenea** ZETT.
- scintilla* R.-D. = **aenea** ZETT.
- serena** MEIG., S. B., V. 59. 18. ♀ [*Musca*] (1826); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 167. 16. [*Lucilia*] (1833) et Suit. à Buff., II. 258. 32. [*Lucilia*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 656. 13. [*Musca*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1322. 3. (1845); WALK., Ins. Brit., II. 113. 16. [*Musca*] (1853); SCHN., F. A., I. 592. (1862); RONN., Prodr., V. 204. 4. (1862); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., 1893. 74. (1894); PAND., Revue Entom. France, XVII. 36. 5. (1898).
- cyanicolor* ZETT., Dipt. Scand., IV. 1323. 4. (1845); STROBL., Mittheil. Ver. Steierm., 1893. 73. (1894).
- violacea* MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 167. 17. [*Lucilia*]

(1833) et Suit. à Buff., II. 258. 33. ♀ [*Lucilia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 299. 8. ♀ (1838).

maragplala R.-D. = **cadaverina** L.

suda ROND. = **aenea** ZETT.

usta R.-D. = **cadaverina** L.

violacea MACQ. = **serena** MEIG.

vivida R.-D. = **cadaverina** L.

Pseudopyrellia

GIRSCHN., Berl. entom. Zeitschr., XXXVIII. 306. 9. (1893).

Euphoria R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 799. XXXI. (1863).

Lucilia R.-D., Myod., 452. XXXVII. p. p. (1830).

Orthellia R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 837. XXXII. p. p. (1863).

aurulans R.-D. = **cornicina** FABR.

caesarion MEIG. = **cornicina** FABR.

calens R.-D. = **cornicina** FABR.

cornicina FABR., Spec. Ins., II. 438. 11. [*Musca*] (1781), Mantissa Europa.

Ins., II. 343. 13. [*Musca*] (1787), Entom. syst., IV. 317. 20. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 289. 29. [*Musca*] (1805); FALL., Musc., 47. 21. [*Musca*] (1821); MEIG., S. B., V. 52. 2. [*Musca*] (1826); R.-D., Myod., 456. 16. [*Lucilia*] (1830); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 164. 5. [*Lucilia*] (1833) et Suit. à Buff., II. 254. 13. [*Lucilia*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 655. 11. [*Musca*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1316. 5. [*Lucilia*] (1845); WALK., Ins. Brit., II. 108. 4. [*Musca*] (1853); SCHN., F. A., I. 590. [*Lucilia*] (1862); ROND., Prodr., V. 191. 7. [*Somomya*] (1862); PAND., Revue Entom. France, XVII. 38. 8. [*Pyrellia*] (1898).

aurulans R.-D., Myod., 458. 21. [*Lucilia*] (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 827. 43. [*Euphoria*] (1863).

caesarion MEIG., S. B., V. 97. 14. ♀ [*Musca*] (1838); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 165. 9. [*Lucilia*] (1833) et Suit. à Buff., II. 255. 19. [*Lucilia*] (1835); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 813. 20. [*Euphoria*] (1863).

calens R.-D., Myod., 459. 24. [*Lucilia*] (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II. 805. 9. [*Euphoria*] (1863); MACQ., Suit. à Buff., II. 255. 20. [*Lucilia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 294. 26. [*Lucilia*] (1838).

frontalis THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 545. 173. [*Pyrellia*] (1868).

mollis R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 838. 2. ♀ [*Orthellia*] (1863).

rectinervis R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 837. 1. ♀ [*Orthellia*] (1863).

? *regalis* MEIG., S. B., V. 54. 6. ♂ (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 254. 15. [*Lucilia*] (1835).

- scutellata* Macq., Suit. à Buff., H. 256, 22. ♀ [*Lucilia*] (1835);
 Meig., S. B., VII. 295, 28. ♀ [*Lucilia*] (1838).
splendida R.-D. (nec Meig.), Myod., 457, 17. [*Lucilia*] (1830) et
 Hist. nat. d. Dipt., H. 830, 48. [*Euphoria*] (1863).
thalassina Meig., S. B., V. 54, 5. ♂ [*Musca*] (1826); Macq.,
 Suit. à Buff., H. 254, 14. ♀ [*Lucilia*] (1835).
viridescens R.-D., Myod., 458, 20. [*Lucilia*] (1830) et Hist. nat.
 d. Dipt., H. 811, 17. [*Euphoria*] (1863).

Ausserdem sind wahrscheinlich synonym mit *cornicina* sämtliche von R.-D. unter seiner Gattung *Euphoria* [Hist. nat. d. Dipt., H. 800—836.] aufgeführten Arten. Es sind folgende:

adamantina 836, 57.	decora 812, 19.	praecox 809, 14.
aenea 803, 6.	festiva 818, 29.	prompta 807, 12.
agilis 809, 5.	flamma 836, 58.	puella 817, 27.
analis 816, 26.	floralis 814, 22.	purpurea 835, 56.
aurata 820, 31.	frontalis 815, 23.	ruralis 823, 35.
autumnalis 822, 34.	fulgida 821, 32.	scintilla 525, 39.
bella 828, 44.	gentilis 821, 37.	scutellaris 814, 21.
bicolor 832, 50.	gloriosa 833, 52.	semiaurata 810, 16.
blanda 828, 45.	grata 806, 10.	smaragda 802, 5.
callicthroa 835, 55.	gratiosa 833, 51.	sopor 815, 24.
caeruleifrons 822, 33.	juvunda 829, 46.	triumphalis 834, 53.
chalybea 811, 18.	lauta 802, 4.	venusta 804, 7.
chrysothoa 824, 38.	metallica 808, 13.	viridicyanea 816, 25.
chrysura 825, 40.	mollis 826, 42.	viridis 801, 2.
corusca 823, 36.	nitida 826, 41.	viridula 805, 8.
eumetaus 830, 47.	nitidula 800, 1.	vivida 807, 11.
cyaneifrons 831, 49.	pacida 834, 54.	volucris 818, 28.
cyaneoviridis 19, 30.	polita 801, 3.	

frontalis THOMS. = *cornicina* FABR.

mollis R.-D. = *cornicina* FABR.

rectinervis R.-D. = *cornicina* FABR.

regalis MEIG. = ? *cornicina* FABR.

scutellata Macq. = *cornicina* FABR.

splendida R.-D. (nec MEIG.) = *cornicina* FABR.

thalassina MEIG. = *cornicina* FABR.

viridescens R.-D. = *cornicina* FABR.

Mesembrina

MEIG., S. B., V. 10, CLIII. (1826).

apiaria FABR. = *mystacea* L.

apiformis PANZ. = *mystacea* L.

bombylius DEG. = *mystacea* L.

decipiens Lw., Besch., eur. Dipt., III. 239, 153. ♂ (1873).

Asia sept.

Peziloi POIRSON, Trudy Soc. entom. Ross., VII. 57. (1875) et

Hor. Soc. entom. Ross., XI. 29. (1875).

- ingrica** PORTSCH., Trudy Soc. entom. Ross., VII. 59. (1875) et Hor. Asia sept.
Soc. entom. Ross., XI. 29. (1875).
- intermedia** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3274. 2—3. (1849); ROND., Suecia.
Prodr., V. 212. (1862); PANZ., Revue Entom. France, XVII. 32.
2. (1898).
- matutina** ROND., Prodr., V. 210. 2. ♀ (1862). Gallia.
- meridiana** L., Fauna Suec., Ed. II. 451. 1827. [*Musca*] (1761); SCOR., Europa.
Entom. carn., 325. 867. [*Musca*] (1763); L., Syst. Nat., Ed. XII.
II. 989. 63. [*Musca*] (1767); FABR., Syst. Entom., 773. 3. [*Musca*]
(1775); DEG., Ins., VI. 55. 2. [*Musca*] (1776); SCHRANK, Enum.
Ins. Austr., 454. 922. [*Musca*] (1781); FABR., Spec. Ins., II. 435.
3. [*Musca*] (1781) et Mantissa Ins., II. 342. 4. [*Musca*] (1787);
PANZ., Fauna germ., 10. 17. [*Musca*] (1793); FABR., Entom. syst.,
IV. 312. 2. [*Musca*] (1794); ROSSI, Mant. Ins., II. 64. 534. [*Musca*]
(1794); FABR., Syst. Anth., 284. 3. [*Musca*] (1805); FALL., Musc.,
51. 30. [*Musca*] (1823); MEIG., S. B., V. II. 1. (1826); R.-D.,
Myod., 401. 1. (1830); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 151.
1. (1833) et Suit. à Buff., II. 274. 2. (1835); ZETT., Ins. Lapp.,
652. 2. (1838) et Dipt. Scand., IV. 1343. 2. (1845) et VIII. 3273.
2. (1849); WALK., Ins. Brit., II. 115. 21. [*Musca*] (1853); SCHIX.,
F. A., I. 583. (1862); ROND., Prodr., V. 211. 4. (1862); R.-D.,
Hist. nat. d. Dipt., II. 631. 1. (1863); PANZ., Revue Entom.
France, XVII. 32. 2. (1898).
- mystacea** L., Fauna Suec., Ed. II. 442. 1793. [*Musca*] (1761); DEG., Europa.
Ins., VI. 133. 1. [*Musca*] (1776); SCHRANK, Enum. Ins. Austr.,
443. 900. [*Musca*] (1781); FALL., Musc., 50. 29. [*Musca*] (1823);
MEIG., S. B., V. 12. 2. (1826); R.-D., Myod., 401. 3. (1830);
MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 151. 2. (1833) et Suit. à
Buff., II. 273. 1. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 651. 1. (1838) et Dipt.
Scand., IV. 1341. 1. (1845); SCHIX., F. A., I. 583. (1862); ROND.,
Prodr., V. 210. 1. (1862); PANZ., Revue Entom. France, XVII.
31. 1. (1898).
- apiaria* FABR., Spec. Ins., II. 422. 5. [*Syrphus*] (1781) et Entom.
syst., IV. 280. 9. [*Syrphus*] (1794); PANZ., Fauna germ., 91.
20. [*Syrphus*] (1804) (*descriptio*).
- apiiformis* PANZ., Fauna germ., 91. 20. [*Syrphus*] (1804) (*figura*).
- bombylius* DEG., Ins., VI. 58. 1. [*Musca*] (1776).
- Paciloi* PORTSCH. - **decipiens** Lw.
- resplendens** WAHLB., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., I. 66. (1844); Lapponia.
ZETT., Dipt. Scand., IV. 1344. 3. (1845); Lw., Wien. entom.
Monatschr., II. III. 23. ♀ (1858); ROND., Prodr., V. 212. (1862);
PANZ., Revue Entom. France, XVII. 32. 2. (1898).
- vespertina** ROND., Prodr., V. 211. 3. ♀ (1862). Italia.

b. *M. ariciaeformes*.**Stomoxys**

GEOFFROY, Hist. d. Ins., II, 538. (1764).

aculeata R.-D. = **calcitrans** L.*aurifacies* R.-D. = **calcitrans** L.

calcitrans L., Fauna Suec., Ed. II, 467. 1900. [*Conops*] (1761): Europa, Scor., Entom. carn., 368. 1001. [*Empis*] (1763): L., Syst. Nat., Ed. XII, II, 1004, 2. [*Conops*] (1767); FABR., Syst. Entom., 798, 3. (1775) et Spec. Ins., II, 467, 4. (1781); SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 484, 990. [*Conops*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II, 362, 4. (1787); ROSSI, Fauna etc., II, 330, 1573. (1790); FABR., Entom. syst., IV, 394, 5. (1794); SCHRANK, Fauna boica, III, 2563. [*Conops*] (1803); FABR., Syst. Antl., 280, 5. (1805); FALL., Haematomyz., 6, 3. (1818); MEIG., S. B., IV, 160, 3. (1824); R.-D., Myod., 386, 1. (1830); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 170, 1. (1833) et Suît, à Buff., II, 242, 1. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 621, 1. (1838) et Dipt. Scand., III, 985, 1. (1844); WALK., Ins. Brit., II, 116, 1. (1853); SCHN., F. A., 1, 578. (1862); ROXD., Prodr., V, 228, 1. (1862); R.-D., Hist. nat. d. Ins., II, 602, 1. (1863); TASCHENBERG, Pract. Insectenkde, 110, 45. (1880); PAND., Revue Entom. France, XVII, 45, 3. (1898).

aculeata R.-D., Myod., 386, 3. (1830); MACQ., Suît, à Buff., II, 242, 2. (1835).

aurifacies R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II, 607, 9. (1863).*chrysocephala* R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II, 604, 3. (1863).*clavipennis* R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II, 604, 2. (1863).*conclans* R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II, 607, 8. (1863).*flavescens* R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II, 605, 5. (1863).*infesta* R.-D., Myod., 387, 5. (1830).*minuta* R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II, 606, 6. (1863).*praeceor* R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II, 608, 10. (1863).

putogens DEG., Ins., VI, 78, 11. [*Musca*] (1776); R.-D., Myod., 386, 4. (1830); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 171, 2. (1833) et Suît, à Buff., II, 242, 3. (1835); MEIG., S. B., IV, 170, 2. (1838).

rubrifrons R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II, 606, 7. (1863).

tessellata FABR., Entom. syst., IV, 395, 6. (1794) et Syst. Antl., 281, 7. (1805).

vulvarans R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II, 605, 4. (1863).*chrysocephala* R.-D. = **calcitrans** L.*clavipennis* R.-D. = **calcitrans** L.*conclans* R.-D. = **calcitrans** L.*flavescens* R.-D. = **calcitrans** L.*infesta* R.-D. = **calcitrans** L.*minuta* R.-D. = **calcitrans** L.

- pratensis* R.-D. = **calcitrans** L.
pungens DEG. = **calcitrans** L.
rufifrons R.-D. = **calcitrans** L.
tessellata FABR. = **calcitrans** L.
vulnerans R.-D. = **calcitrans** L.

Haematobia

R.-D., Essai sur les Myod., 388. VII. (1830).

- atripalsis** BEZZI, Bull. Soc. entom. Ital., XXVII. 60. (1895). Italia.
ferox R.-D. = **stimulans** MEIG.
geniculata R.-D. = **stimulans** MEIG.
irritans FABR. (*nee* L.) = **stimulans** MEIG.
melanogaster MEIG. = **stimulans** MEIG.
pungens R.-D. (*nee* FABR.) = **stimulans** MEIG.
stimulans MEIG., S. B., IV. 161. 4. [*Stomoxys*] (1824); MACQ., Recueil Soc. Se. Agric. Lille, 171. 1. (1833) et Suit. à Buff., II. 243. 1. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 621. 2. [*Stomoxys*] (1838) et Dipt. Scand., III. 986. 2. [*Stomoxys*] (1844); SCHN., F. A., I. 578. [*Stomoxys*] (1862); ROXB., Prodr., V. 229. 1. (1862); PAND., Revue Entom. France, XVII. 44. 2. [*Stomoxys*] (1898). Europa.
ferox R.-D., Myod., 388. 1. (1830); MACQ., Recueil Soc. Se. Agric. Lille, 172. 2. (1833) et Suit. à Buff., II. 243. 2. (1835); MEIG., S. B., VII. 171. 6. [*Stomoxys*] (1838); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 608. 1. (1863).
geniculata R.-D., Myod., 388. 2. (1830).
irritans FABR. (*nee* L.), Syst. Entom., 798. 4. [*Stomoxys*] (1775), Spec. Ins., II. 468. 5. [*Stomoxys*] (1781), Mantissa Ins., II. 362. 5. [*Stomoxys*] (1787) Entom. syst., IV. 395. 7. [*Stomoxys*] (1794) et Syst. Antl., 281. 10. [*Stomoxys*] (1805); FALL., Haematomyz., 7. 4. [*Stomoxys*] (1818); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 610. 3. (1863).
melanogaster MEIG., S. B., IV. 163. 6. ♀ [*Stomoxys*] (1824); SCHN., F. A., I. 578. [*Stomoxys*] (1862).
pungens R.-D. (*nee* FABR.), Hist. nat. d. Dipt., II. 609. 2. (1863).
vernalis R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 610. 4. (1863).
tibialis R.-D., Myod., 389. 4. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 244. 4. (1835); MEIG., S. B., VII. 171. 7. [*Stomoxys*] (1838). Gallia, Italia.
vernalis R.-D. = **stimulans** MEIG.

Lyperosia

ROXB., Prodr., V. 230. 4. (1862).

Priophora R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 611. VII. (1863).

- irritans** L., Fauna Suec., Ed. II. 467. 1901. [*Conops*] (1761) et Syst. Nat., Ed. XII. II. 1004. 3. [*Conops*] (1767); MEIG., S. B., IV. 162. Europa.

5. [*Stomorxys*] (1824); MACQ., Suit. à Buff., II. 243. 3. [*Haematobia*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 621. 3. [*Stomorxys*] (1838) et Dipt. Scand., III. 987. 3. [*Stomorxys*] (1844); ROSD., Prodr., V. 231. 1. (1862); PAND., Revue Entom. France, XVII. 43. 1. [*Stomorxys*] (1898).

pungens FABR. (nec DEG.), Mantissa Ins., II. 362. 6. [*Stomorxys*] (1787), Entom. syst., IV. 395. 9. [*Stomorxys*] (1794) et Syst. Antl., 282. 12. [*Stomorxys*] (1805); FALL., Haematomyz., 7. 5. [*Stomorxys*] (1818).

serrata R.-D., Myod., 389. 3. [*Haematobia*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., 244. 5. [*Haematobia*] (1835); MEG., S. B., VII. 171. 8. [*Stomorxys*] (1838); ROSD., Prodr., V. 231. 2. (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 611. 1. [*Priophora*] (1863).

pungens FABR. (nec DEG.) = **irritans** L.

serrata R.-D. — **irritans** L.

Muscina

R.-D., Essai sur les Myod., 406. XVII. (1830).

Blissonia R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 648. XVIII. (1863).

Cartoneura MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 146. p. p. (1833).

Cyrtoneura (nom. emend.) MEG., S. B., VII. 309. 4. p. p. (1838).

Pararicia B. B., Denkschr. Akad. Wien, LVIII. 391. (1891).

aperta MACQ. = **assimilis** FALL.

assimilis FALL., Musc., 56. 41. + (1823); MEG., S. B., V. 105. 39. Europa, Syria, Ins. Canar

[*Anthomyia*] (1826); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1351. 6. [*Cyrtoneura*] (1845); SCHN., F. A., I. 598. [*Cyrtoneura*] (1862); ROSD., Prodr., V. 216. 6. [*Cyrtoneura*] (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1893. 76. [*Cyrtoneura*] (1894).

aperta MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 147. 4. [*Cartoneura*] (1833) et Suit. à Buff., II. 278. 15. [*Cartoneura*] (1835); MEG., S. B., VII. 311. 14. [*Cyrtoneura*] (1838).

borealis ZETT., Ins. Lapp., 660. 28. [*Musca*] (1838).

carsia MEG., S. B., V. 76. 43. ♀ [*Musca*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 278. 13. + [*Cartoneura*] (1835); MEG., S. B., VII. 309. 5. [*Cyrtoneura*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1350. 5. [*Cyrtoneura*] (1845); SCHN., F. A., I. 598. [*Cyrtoneura*] (1862); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 648. 1. [*Blissonia*] (1863); PAND., Revue Entom. France, XVII. 48. 3. (1898).

fangivora R.-D., Myod., 408. 6. (1830); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 147. 3. [*Cartoneura*] (1833) et Suit. à Buff., II. 278. 12. [*Cartoneura*] (1835); MEG., S. B., VII. 309. 7. [*Cyrtoneura*] (1838); DEB., Annal. Sci. nat., sér. 2. XIII. 154. 5. [*Cartoneura*] (1810); R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II. 649. 2. [*Blissonia*] (1863).

- rustica* R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II, 649, 3. ♀ [*Blissonia*] (1863).
- borealis* ZETT. = **assimilis** FALL.
- cuesia* MEIG. = **assimilis** FALL.
- caesia** R.-D. (*unc* MEIG.), Hist. nat. d. Dipt., II, 647, 6. ♂ (1863). Gallia.
- cinerascens* WIED. = **stabulans** FALL.
- concolor** R.-D., Myod., 408, 5. ♀ (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 277, 11. Gallia.
[*Cartoneura*] (1835); MEIG., S. B., VII, 311, 13. [*Cyrtoneura*] (1838).
- fungivora* R.-D. = **assimilis** FALL.
- grisea* R.-D. = **stabulans** FALL.
- minor* POETSCH. = **stabulans** FALL.
- nigripalpis** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 148, 5. [*Cartoneura*] Gallia.
(1833) et Suit. à Buff., II, 278, 14. [*Cartoneura*] (1835); MEIG.,
S. B., VII, 310, 9. [*Cyrtoneura*] (1838).
- pabulorum** FALL., Muse., 51, 31. [*Musca*] (1823); MEIG., S. B., V, Europa centr.
75, 41. [*Musca*] (1826); R.-D., Myod., 407, 1. (1830); MACQ., et sept.
Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 146, 1. [*Cartoneura*] (1833) et Suit. Africa sept.
à Buff., II, 277, 8. [*Cartoneura*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 660,
27. [*Musca*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1352, 7. [*Cyrtoneura*]
(1845); SCHIX., F. A., I, 597. [*Cyrtoneura*] (1862); R.-D., Hist.
nat. d. Dipt., II, 644, 1. (1863); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm.,
1893, 75. [*Cyrtoneura*] (1894); PAND., Revue Entom. France,
XVII, 48, 2. (1898).
- paseuorum** MEIG., S. B., V, 74, 40. [*Musca*] (1826); MACQ., Suit. à Europa,
Buff., II, 277, 9. [*Cartoneura*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV, Ins. Canar.
1353, 8. [*Cyrtoneura*] (1845); SCHIX., F. A., I, 597. [*Cyrtoneura*]
(1862); ROND., Prodr., V, 216, 4. [*Cyrtoneura*] (1862); R.-D., Hist.
nat. d. Dipt., II, 644, 2. (1863).
- picatena* R.-D. = **stabulans** FALL.
- rustica* R.-D. = **assimilis** FALL.
- stabulans** FALL., Muse., 52, 32. [*Musca*] (1823); MEIG., S. B., V, 75, Europa,
42. [*Musca*] (1826); R.-D., Myod., 407, 2. (1830); MACQ., Recueil Africa sept.,
Soc. Sc. Agric. Lille, 147, 2. [*Cartoneura*] (1833) et Suit. à Buff., Ins. Canar.
II, 277, 10. [*Cartoneura*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 660, 29.
[*Musca*] (1838); DCF., Annal. Sci. nat., sér. 2, XIII, 157, 4.
[*Cartoneura*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1354, 9. [*Cyrtoneura*]
(1845); WALK., Ins. Brit., II, 113, 18. [*Musca*] (1853); CURT.,
Farm. Ins., 462, 34. [*Musca*] (1860); SCHIX., F. A., I, 597. [*Cyrtoneura*]
(1862); ROND., Prodr., V, 216, 5. [*Cyrtoneura*] (1862);
R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II, 645, 3. (1863); TASCHENBERG, Pract.
Insectenkde., 108, 44. [*Musca*] (1880); PAND., Revue Entom.
France, XVII, 48, 1. (1898).
- cinerascens* WIED., Zool. Mag., I, 1, 79, 28. [*Musca*] (1817).
- grisea* R.-D., Myod., 408, 3. (1830) et Hist. nat. d. Dipt., II,
646, 4. (1863).
- minor* POETSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVI, 143. ♀ [*Cyrtoneura*]
(1881).
- picatena* R.-D., Myod., 408, 4. ♀ (1830) et Hist. nat. d. Dipt.,
II, 647, 5. ♀ (1863).

Polietes

ROSD., Bull. Soc. Milano, IX, 91, VI, (1866).

Macrosoma R.-D., Essai sur les Myod., 402, XIV, (1830).

albolineata FALL., Musc., 54, 38, [*Musca*] (1823); MEG., S. B., V, 83, 2, [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 286, 2, [*Aricia*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 662, 2, [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1388, 2, [*Aricia*] (1845); WALK., Ins. Brit., II, 119, 2, [*Anthomyia*] (1853); SCHN., F. A., I, 601, [*Aricia*] (1862); ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 97, 2, [*Yctodesia*] (1866) et Prodr., VI, 141, 32, [*Yctodesia*] (1877); MEAD., Deser. List Brit. Anth., I, 4, 2, (1897); PAND., Revue Entom. France, XVII, 71, 9, [*Aricia*] (1898).

floralis R.-D., Myod., 403, 2, [*Macrosoma*] (1830).

floralis R.-D. = **albolineata** FALL.

hirtierura MEAD., Entom. Monthly Mag., XXIII, n. XXIV, 179, -7 Britannia, (1887) et Deser. List Brit. Anth., I, 4, 3, -7 (1897).

lardaria FABR., Spéc. Ins., II, 436, 5, [*Musca*] (1781), Mantissa Ins., II, 342, 6, [*Musca*] (1787), Entom. syst., IV, 313, 5, [*Musca*] (1794) et Syst. Anth., 285, 6, [*Musca*] (1805); FALL., Musc., 54, 37, [*Musca*] (1823); MEG., S. B., V, 83, 1, [*Anthomyia*] (1826); R.-D., Myod., 402, 1, [*Macrosoma*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 286, 1, [*Aricia*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 661, 1, [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1387, 1, [*Aricia*] (1845); WALK., Ins. Brit., II, 119, 1, [*Anthomyia*] (1853); SCHN., F. A., I, 601, [*Aricia*] (1862); ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 91, 1, (1866) et Prodr., VI, 109, 1, (1877); MEAD., Deser. List Brit. Anth., I, 3, 1, (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 163, [*Macrosoma*] (1899).

nigrolimbata BOSSD., Finnl. Dipt., II, 172, 3, [*Aricia*] (1866). Europa centr. et sept.

Phaonia

R.-D., Essai sur les Myod., 482, III, (1830).

Aricia R.-D., Myod., 486, VI, p. p. (1830).

Ephemera R.-D., Myod., 185, V, (1830).

Fellaca R.-D., Myod., 476, I, p. p. (1830).

Hyctodesia (nom. emend.) MEAD., Entom. Monthly Mag., XVIII, 2, 2, (1881).

Myliaca R.-D., Myod., 179, II, p. p. (1830).

Polamia R.-D., Myod., 507, XII, (1830).

Rohrella R.-D., Myod., 489, VII, p. p. (1830).

Stagnia R.-D., Myod., 508, XIII, (1830).

Tremia R.-D., Myod., 481, IV, (1830).

Yctodesia ROSD., Prodr., IV, 9, (1861).

- acripipes* POK. **fulvisquama** ZETT.
aeuicentris ZETT. **nitida** MACQ.
agilis R.-D. = ?**incana** WIED.
- alpicola** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1401, 15. [*Aricia*] (1845); PAND., Europa.
 Revue Entom. France, XVII, 78, 21. ? [*Aricia*] (1898).
- alpina** ROXD., Bull. Soc. entom. Ital., II, 320, 31. ? [*Yctodesia*] (1870) Italia.
 et Prodr., VI, 135, 25. ? [*Yctodesia*] (1877).
- ancilla* v. RÖD. (*aeu* MEIG.) = **querceti** BOUCHÉ.
- angelicae** ROXD. (*aeu* SCOP.), Atti Soc. Milano, IX, 120, 18. ♂ ? [*Spilogaster*] Europa centr.
 (1866) et Prodr., VI, 85, 13. [*Spilogaster*] (1877); MEADE, et mer.
 Entom. Monthly Mag., XXIII, 28. [*Mydaca*] (1881); ? v. d. WULF,
 Tijdschr. v. Entom., XXVI, 116. [*Spilogaster*] (1883); STEIN,
 Entom. Nachr., XVIII, 330. ? [*Spilogaster*] (1892).
erronca SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XX, 343, 9. [*Aricia*]
 (1886) et XXII, 458, 8. [*Aricia*] (1888).
- angelicae* SCOP. = ?**basalis** ZETT.
- annosa** ZETT., Ins. Lapp., 663, 7. ♀ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Europa sept.
 Scand., IV, 1393, 6. ♀ [*Aricia*] (1845); PAND., Revue Entom. et mer.
 France, XVII, 51, 1. ? [*Quadrala*] (1898).
- anthomyzoides** STORM, Norske Selks. Skr., 239. ? [*Aricia*] (1895). Norvegia.
- anthracina** ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6227, 107—108. ? [*Aricia*] Lapponia.
 (1860); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 30. [*Aricia*] (1902).
- aricioïdea* R.-D. = ?**signata** MEIG.
- austriaca** CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XIX, 272, 2. [*Aricia*] (1900). Lapp., Austr.
- basalis** ZETT., Ins. Lapp., 691, 134. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Europa.
 Scand., IV, 1695, 67. [*Anthomyza*] (1845); SCHN., F. A., I, 605.
 [*Aricia*] (1862); ROXD., Atti Soc. Milano, IX, 103, 16. [*Yctodesia*]
 (1866) et Prodr., VI, 130, 18. [*Yctodesia*] (1877); SCHNABL, Hor.
 Soc. entom. Ross., XXI, 458. [*Aricia*] (1887) et XXII, 462, 21.
 [*Aricia*] (1888); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXIII, n. XXIV,
 180. [*Hyetodesia*] (1887) et Descr. List Brit. Anth., I, 12, 27.
 [*Hyetodesia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 86, 35.
 [*Aricia*] (1899).
 ? *angelicae* SCOP., Entom. carn., 329, 880. [*Musca*] (1763); FALL.,
 Musc., 78, 94, p. p. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V, 117,
 59. [*Anthomyza*] (1826).
 ? *deceptoraria* SCHRANK (*aeu* SCOP.), Enum. Ins. Austr., 458, 932.
 [*Musca*] (1781).
 ? *fera* R.-D., Myod., 477, J. ? [*Felluca*] (1830).
vagus STROBL (*aeu* FALL.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII,
 219. [*Aricia*] (1893).
var. alpina STROBL (*aeu* ROXD.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
 XLIII, 219, 3. [*Aricia*] (1893).
- basalis* ZETT. *var.* = **veterana** ZETT.
- betuleti* BOUCHÉ = **laeta** FALL.
- bicolor** POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX, 549. [*Aricia*] (1889). Austria.
- bitincta** ROXD., Atti Soc. Milano, IX, 106, 23. [*Yctodesia*] (1866) et Europa centr.
 Prodr., VI, 122, 7. [*Yctodesia*] (1877); SCHNABL, Hor. Soc. entom. et mer.

- Ross., XXII, 440, 50. [*Aricia*] (1888); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 90, 43. + [*Aricia*] (1899).
- Blondeli* R.-D. = ?**variegata** MEIG.
- boleticola** RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 103, 17. [*Yctodesia*] (1866) Europe centr. et Prodr., VI, 129, 17. [*Yctodesia*] (1877); MEADE, Descr. List et mer. Brit. Anth., I, 12, 29. [*Hyctodesia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 81, 26. [*Aricia*] (1899).
- rossica* SCHNAB., Hor. Soc. entom. Ross., XXII, 418, 43. [*Aricia*] (1888).
- ?*vittata* R.-D., Myod., 489, 9. [*Aricia*] (1830).
- brevicilliosa* MACQ. = ?**laeta** FALL.
- candicans** PAND., Revue Entom. France, XVII, 75, 17. + [*Aricia*] (1898) Europe centr. et mer.
- chalinata** PAND., Revue Entom. France, XVIII, 110, 26. + [*Spilogaster*] (1899) Europe centr.
- ?*glauialis* STROBL. (nec ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 232. + [*Lasiops*] (1893).
- cincta** ZETT., Dipt. Scand., V, 1745, 127. + [*Anthomyza*] (1846); Europe. SCHNAB., Hor. Soc. entom. Ross., XXII, 429, 47. + [*Aricia*] (1888) et XXII, 482, 47. [*Aricia*] (1888); PAND., Revue Entom. France, XVII, 74, 15. [*Aricia*] (1898).
- semidiaphana* RONDI., Bull. Soc. entom. ital., II, 318, 28. + [*Yctodesia*] (1870) et Prodr., VI, 137, 27. + [*Yctodesia*] (1877).
- alpicola* LABOULE., Ann. Soc. entom. France, sér. 5, III, 310. [*Spilogaster*] (1873).
- ?**cinctinervis** ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6228, 108-109. + [*Aricia*] (1860); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 109, 25. [*Spilogaster*] (1899) Europe centr. et sept.
- squalens* ZETT., Ins. Lapp., 669, 36. + [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1445, 56. + [*Aricia*] (1845).
- claripennis* R.-D. = ?**Gobertii** MEIG.
- comta** MEIG., S. B., V, 125, 76. + [*Anthomyza*] (1826) Europe centr.
- ?*erythrostoma* ZETT., Dipt. Scand., VIII, 3314, 65-66. + [*Anthomyza*] (1849) et sept.
- consobrina** ZETT., Ins. Lapp., 665, 46. + [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1401, 11. [*Aricia*] (1845); SCHNAB., Hor. Soc. entom. Ross., XXII, 434, 49. [*Aricia*] (1888); STROBL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 216. [*Aricia*] (1893).
- deceptorata* SCHENK (nec SCOP.) = ?**basalis** ZETT.
- defecta** WALK., Ins. Brit., II, 129, 31. [*Anthomyza*] (1853) Britannia
- denominata* ZETT. = **variegata** MEIG.
- diluta** RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 101, 12. [*Yctodesia*] (1866) et Prodr., VI, 130, 19. [*Yctodesia*] (1877) Italia.
- discordea* MACQ. = ?**variegata** MEIG.
- dorsalis** R.-D., Myod., 491, 6. [*Robrella*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., Gallia, II, 290, 29. [*Aricia*] (1835).
- dubia* MEADE = **Gobertii** MEIG.

- errans** MEIG., S. B., V, 112, 50. ♀ [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 287, 8. [*Aricia*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 688, 119. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1636, 1. [*Anthomyza*] (1845); WALK., Ins. Brit., II, 126, 23. [*Anthomyia*] (1853); ZETT., Dipt. Scand., XII, 4737, 1. [*Anthomyza*] (1855); SCHIX., F. A., I, 604. [*Aricia*] (1862); RONDI., Bull. Soc. entom. Ital., II, 321, 33. [*Yctodesia*] (1870) et Prodr., VI, 119, 2. [*Yctodesia*] (1877); SCHNABL., Hor. Soc. entom. Ross., XX, 395, 27. [*Aricia*] (1886) et XXII, 474, 27. [*Aricia*] (1888); STROBL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 218. [*Aricia*] (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I, 11, 26. [*Hypodesia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 84, 31. [*Aricia*] (1899).
erratica FALL., var. ♂, Musc., 77, 92. [*Musca*] (1825).
nigricornis R.-D., Myod., 484, 1. ♂ [*Tremia*] (1830).
Zetterstedti BOSSD., Finl. Dipt., II, 273, 44. ♀ [*Anthomyza*] (1866).
- erratica** FALL., Musc., 77, 92. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V, 111, 49. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 287, 7. [*Aricia*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1633, 65. [*Anthomyza*] (1845); WALK., Ins. Brit., II, 127, 27. [*Anthomyia*] (1853); SCHIX., F. A., I, 604. [*Aricia*] (1862); RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 104, 19. [*Yctodesia*] (1866) et Prodr., VI, 118, 1. [*Yctodesia*] (1877); SCHNABL., Hor. Soc. entom. Ross., XX, 394, 26. [*Aricia*] (1886) et XXII, 474, 26. [*Aricia*] (1888); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I, 11, 24. [*Hypodesia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 83, 30. [*Aricia*] (1899).
riarum R.-D., Myod., 482, 1. (1830).
- erratica* FALL., var. ♂ = **errans** MEIG.
- erratica* R.-D. = ?**lugubris** MEIG.
- erronea* SCHNABL. = **angelicae** ROND. (nec SCOP.)
- erythrostoma* ZETT. = **comta** MEIG.
- exoleta** MEIG., S. B., V, 86, 7. ♂ [*Anthomyia*] (1826). Patria ?
- fera* R.-D. = ?**basalis** ZETT.
- flavisquama* ZETT. p. p. = **pallidisquama** ZETT.
- foveolata** STROBL. (nec ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 229. [*Limnophora*] (1893). Europa centr.
- fragilis* R.-D. = **pallida** FABR.
- fulvisquama** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1491, 99. [*Aricia*] (1845); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 106, 21. ♀ [*Spilogaster*] (1899); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 31. [*Aricia*] (1902). Europa centr. et sept.
acripes POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX, 550. [*Aricia*] (1889).
- fuscata** FALL., Musc., 85, 109. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V, 126, 78. [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1665, 30. [*Anthomyza*] (1845); SCHIX., F. A., I, 609. [*Spilogaster*] (1862); RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 100, 10. [*Yctodesia*] (1866) et Prodr., VI, 132, 21. [*Yctodesia*] (1877); SCHNABL., Hor. Soc. entom. Ross.,

- XX. 339, 8. [*Aricia*] (1886) et XXII. 456, 8. [*Aricia*] (1888);
 MEADE, Descr. List Brit. Anth., I. 10, 21. [*Hyetodesia*] (1897);
 PAND., Revue Entom. France, XVII. 80, 25. [*Aricia*] (1898).
plumata R.-D., Myod., 486, 4. ♂ [*Euphemia*] (1830).
?sericata MEIG., S. B., V. 124, 74. ♀ [*Anthomyia*] (1826).
vittifera SCHN. (nec ZETT.), F. A., I. 610. [*Spilogaster*] (1862).
Girschneri SCHNABL. ?*tinctipennis* ROND.
glucialis STROBL. (nec ZETT.) = *chalinata* PAND.
Gobertii MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 599. [*Aricia*] (1881): Europaeentr.
 SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 427, 46. [*Aricia*] (1888): et sept.
 MEADE, Descr. List Brit. Anth., I. 7, 7. [*Hyetodesia*] (1897).
?claripennis R.-D., Myod., 486, 2. [*Euphemia*] (1830).
dubia MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII. 4. [*Hyetodesia*]
 (1881) et XXV. 424. [*Hyetodesia*] (1889).
grandaeva ZETT., Dipt. Scand., IV. 1681, 49. + [*Anthomyza*] (1845): Suecia.
 STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI. 47. [*Aricia*] (1902).
halterata STEIN, Entom. Nachr., XIX. 217, 9. [*Spilogaster*] (1893). Germania.
humeralis R.-D. = *scutellaris* FALL.
humarella STEIN, Entom. Nachr., XXVI. 307, 3. ♀ [*Aricia*] (1900). Transsylvan.
hybrida SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 396, 38. [*Aricia*] Europaeentr.
 (1888).
incana WIED., Zool. Mag., I. 81, 32. [*Anthomyia*] (1817); MEIG., S. Europa.
 B., V. 84, 3. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suif. à Buff., II. 286,
 4. [*Aricia*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 662, 3. [*Anthomyza*] (1838)
 et Dipt. Scand., IV. 1389, 3. [*Aricia*] (1845); WALK., Ins. Brit.,
 II. 121, 7. [*Anthomyia*] (1853); SCHN., F. A., I. 601. [*Aricia*]
 (1862); ROND., Atti Soc. Milano, IX. 98, 3. [*Yctodesia*] (1866) et
 Prodr., VI. 140, 31. [*Yctodesia*] (1877); SCHNABL, Hor. Soc. entom.
 Ross., XX. 382, 22. [*Aricia*] (1886) et XXII. 464, 22. [*Aricia*]
 (1888); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I. 6, 1. [*Hyetodesia*]
 (1897); PAND., Revue Entom. France, XVII. 77, 19. [*Aricia*]
 (1898).
?agilis R.-D., Myod., 478, 5. ♂ [*Felluca*] (1830).
?indevisa WALK., Ins. Brit., II. 120, 6. [*Anthomyia*] (1853).
memorum FALL., Musc., 55, 39. [*Musca*] (1823).
?nigripes R.-D., Myod., 477, 3. ♂ [*Felluca*] (1830).
inconspicua ZETT. = *turpis* ZETT.
indevisa WALK. = ?*incana* WIED.
insularis ROND., Bull. Soc. entom. Ital., II. 321, 32. ♂ [*Yctodesia*] Sardinia.
 (1870) et Prodr., VI. 126, 12. ♂ [*Yctodesia*] (1877).
interlatensis WALK., Ins. Brit., II. 120, 1. [*Anthomyia*] (1853). Britannia.
Jaroschewskii SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 408, 10. ♂ Russia mer.
 [*Aricia*] (1888).
Kowarzii SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 196, 31. ♂ [*Aricia*] Russia.
 (1886) et XXII. 181, 31. ♂ [*Aricia*] (1888).
laeta FALL., Musc., 56, 12. [*Musca*] (1823); MEIG., S. B., V. 106, 10. Europa.
 [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suif. à Buff., II. 292, 30. [*Aricia*]

- (1835): ZETT., Ins. Lapp., 664. 14. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1642. 7. [*Anthomyza*] (1845); SCHN., F. A., I. 603. [*Aricia*] (1862); ROND., Atti Soc. Milano, IX. 100. 9. [*Yctodesia*] (1866) et Prodr., VI. 134. 23. [*Yctodesia*] (1877); SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 333. 6. [*Aricia*] (1886) et XXII. 452. 6. [*Aricia*] (1888); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I. 10. 19. [*Hytodesia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVII. 73. 12. [*Aricia*] (1898).
- betuleti* BOUCHÉ, Naturgesch. d. Ins., I. 78. 67. ♀ [*Anthomyia*] (1834).
- breviciliosa* MACQ., Suit. à Buff., II. 292. 26. [*Aricia*] (1835).
- maculipennis* STORM, Norske Selks. Skr., 238. ♂ [*Aricia*] (1895).
- virgripes* R.-D., Myod., 481. 9. ♂ [*Mydaca*] (1830).
- pratensis* R.-D., Myod., 485. 1. [*Euphemina*] (1830).
- ruralis* MACQ., Suit. à Buff., II. 291. 25. [*Aricia*] (1835).
- ?lasiophthalma** ZETT. (nec MACQ.), Dipt. Scand., XII. 4737. 3—4. Suecica.
[*Anthomyza*] (1855).
- littoralis* R.-D. = **?querceti** BOUCHÉ.
- littorata* R.-D. = **?signata** MEIG.
- lugubris** MEIG., S. B., V. 87. 8. ♂ [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 664. 15. ♂ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1400. 13. ♂ [*Aricia*] (1845); SCHN., F. A., I. 601. [*Aricia*] (1862); SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 384. 23. [*Aricia*] (1886) et XXII. 466. 23. [*Aricia*] (1888); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXV. 395. [*Hytodesia*] (1889) et Descr. List Brit. Anth., I. 8. 8. [*Hytodesia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVII. 78. 22. [*Aricia*] (1898).
- erratica* R.-D., Myod., 478. 4. ♀ [*Felluca*] (1830).
- luteisquama** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1492. 100. ♂ [*Aricia*] (1845); STEIN, Entom. Nachr., XVIII. 325. [*Aricia*] (1892) et Wien. entom. Zeitg., XXI. 35. [*Aricia*] (1902). Lapponia.
- maculipennis* STORM **?laeta** FALL.
- ?maculiventris** ZETT., Dipt. Scand., V. 1748. 131. [*Anthomyza*] (1816). Suecica.
- magnicornis** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1666. 31. ♂ [*Anthomyza*] (1845). Europae.ets.
- manicata** ROND., Bull. Soc. entom. Ital., II. 322. 34. [*Yctodesia*] (1870) et Prodr., VI. 133. 12. [*Yctodesia*] (1877). Italia.
- marmorata* SCHN. (nec ZETT.) = **morio** ZETT.
- Meadei* MEIX. = **?querceti** BOUCHÉ.
- medisecta** PAND., Revue Entom. France, XVIII. 102. 14. ♀ [*Spilogaster*] (1899). Europacentr.
- megalops** PAND., Revue Entom. France, XVIII. 103. 16. ♀ [*Spilogaster*] (1899). Germania.
- meridionalis* ROND. = **trimaculata** BOUCHE.
- morio** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1399. 12. [*Aricia*] (1845); SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 374. 20. [*Aricia*] (1886); PAND., Revue Entom. France, XVII. 77. 20. [*Aricia*] (1898). Europa.

- narmorata* SCHIX. (nec ZETT.), F. A., 1. 601. [*Arícia*] (1862);
STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 216. [*Arícia*]
(1893).
- plumbea* ZETT., Ins. Lapp., 662. 5. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt.
Scand., IV, 1392. 5. [*Arícia*] (1845).
- mystica** MEIG., S. B., V, 126. 77. ? [*Anthomyia*] (1826). Europa-centr.
- nemorum* FALL. = **incana** WIED.
- nigricornis* R.-D. = **errans** MEIG.
- nigripalpis** ROXD., Bull. Soc. entom. Ital., II, 320. 30. ♀ [*Yctodesia*]
(1870) et Prodr., VI, 128. 16. ♀ [*Yctodesia*] (1877). Italia.
- nigripes* R.-D. [*Fellaca*] = ?**incana** WIED.
- nigripes* R.-D. [*Mydaca*] = ?**laeta** FALL.
- nitida** MACQ., Suit. à Buff., II, 304. 16. ♂ [*Hydrophoria*] (1835). Europa-centr.
aeuicentris ZETT., Dipt. Scand., IV, 1441. 51. ♀ [*Arícia*] (1845). et sept.
VIII, 3281. 51. ♀ [*Arícia*] (1849) et XIV, 6240. 51. ♀ [*Arícia*]
(1860).
- ?*nympharum* R.-D., Myod., 508. 1. [*Stagmia*] (1830); Macq.,
Suit. à Buff., II, 302. 49. [*Hydrophoria*] (1835).
- ?*potamogeti* R.-D., Myod., 509. 2. [*Stagmia*] (1830).
- Steinii* SCHNABL., Hor. Soc. entom. Ross., XXII, 423. 45. [*Arícia*]
(1888); STEIN, Entom. Nachr., XIX, 218. 13. [*Spilogaster*]
(1893); PASD., Revue Entom. France, XVIII, 112. 29. [*Spilo-*
gaster] (1899).
- nympharum* R.-D. = ?**nitida** Macq.
- pallida** FABR., Mant. Ins., II, 344. 25. [*Musca*] (1787), Entom. syst.,
IV, 320. 33. [*Musca*] (1794) et Syst. Anth., 295. 53. [*Musca*]
(1805); FALL., Musc., 89. 122. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V,
115. 56. [*Anthomyia*] (1826); Macq., Suit. à Buff., II, 289. 16.
[*Arícia*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., V, 1741. 123. [*Anthomyza*]
(1846); WALK., Ins. Brit., II, 123. 17. [*Anthomyia*] (1853); SCHIX.,
F. A., 1. 605. [*Arícia*] (1862); ROXD., Atti Soc. Milano, IX, 107.
26. [*Yctodesia*] (1866) et Prodr., VI, 124. 10. [*Yctodesia*] (1877);
SCHNABL., Hor. Soc. entom. Ross., XX, 412. 33. [*Arícia*] (1886) et
XXII, 481. 33. [*Arícia*] (1888); MEAD., Deser. List Brit. Anth.,
I, 13. 34. [*Yctodesia*] (1897); PASD., Revue Entom. France,
XVIII, 90. 14. [*Arícia*] (1899).
- fragilis* R.-D., Myod., 492. 7. [*Robrella*] (1830).
- populi* ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., V, 1742. 124. [*Antho-*
myza] (1846) et XIV, 6294. 124. [*Anthomyza*] (1860).
- ?*testacea* DEAC., Ins., VI, 87. 16. [*Musca*] (1776).
- pallidisquama** ZETT., Dipt. Scand., VIII, 3288. 100—101b. [*Arícia*]
(1849) et XIV, 6225. 100—101b. [*Arícia*] (1860); STEIN, Wien.
entom. Zeitg., XXI, 40. [*Arícia*] (1902). Lapponia.
- flavisquama* ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6225. 100—101a p. p.
[*Arícia*] (1860).
- ?**pallipes** R.-D., Myod., 507. 2. [*Potamia*] (1830). Gallia.
- palpata** STEIN, Entom. Nachr., XXIII, 322. 5. [*Arícia*] (1897). Europa-centr.

- trigonalis* MEADE (*nee* MEIG.), Entom. Monthly Mag., XXIII. n. XXIV. 180. [*Hyetodesia*] (1887); SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 432. 48. [*Aricia*] (1888); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I. 10. 20. [*Hyetodesia*] (1897).
- trigonostigma* CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XX. 40. 24. ♂ [*Spilogaster*] (1901).
- perdita** MEIG., S. B., VI. 376. 216. ♂ [*Anthomyia*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1639. 4. [*Anthomyza*] (1845), XII. 4738. 4. [*Anthomyza*] (1855) et XIV. 6265. 4. [*Anthomyza*] (1860); SCHN., F. A., I. 604. [*Aricia*] (1862); SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 398. 28. [*Aricia*] (1886) et XXII. 477. 28. [*Aricia*] (1888); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I. 11. 22. [*Hyetodesia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVII. 75. 16. [*Aricia*] (1898). Europa centr. et sept.
- platyptera* ZETT. = **querceti** BOUCHÉ.
- plumata* R.-D. = **fusca** FALL.
- plumbea** MEIG., S. B., V. 85. 5. [*Anthomyia*] (1826); SCHN., F. A., I. 602. [*Aricia*] (1862); PAND., Revue Entom. France, XVII. 72. 11. [*Aricia*] (1898). Europa centr.
- plumbea* ZETT. (*nee* MEIG.) = **morio** ZETT.
- populi* MEIG. = **scutellaris** FALL.
- populi* ZETT. (*nee* MEIG.) = **pallida** FABR.
- populi* WALK. (*nee* MEIG.) = **variegata** MEIG.
- Portschinskyi** SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 414. 42. ♂ [*Aricia*] (1888). Russia.
- potamogeti* R.-D. = ?**nitida** MACQ.
- praeterita** WALK., Ins. Brit., II. 120. 3. [*Anthomyia*] (1853). Britannia.
- pratensis* R.-D. = **laeta** FALL.
- profugax** PAND., Revue Entom. France, XVIII. 99. 8. ♂ [*Spilogaster*] (1899). Gallia.
- pullata** CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XIX. 271. 1. ♂ [*Aricia*] (1900). Austria.
- punctata** MACQ., Suit. à Buff., II. 288. 11. [*Aricia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 315. 26. [*Aricia*] (1838). Gallia.
- pura** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 48. 53. [*Aricia*] (1873). Europa centr.
- querceti** BOUCHÉ, Naturgesch. d. Ins., I. 82. 70. [*Anthomyia*] (1834). Europa centr.
- ancilla* v. RÖD. (*nee* MEIG.), Mitt. Schweiz ent. Ges., VI. 687. [*Mydaca*] (1880). et sept.
- ?*littoralis* R.-D., Myod., 507. 1. [*Potamia*] (1830).
- ?*Meadei* MENN., Bull. Soc. entom. France. 62. CLVIII. 1. ♂ [*Spilogaster*] (1893) et 63. CCH. ♀ [*Spilogaster*] (1894).
- platyptera* ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3281. 53-54. [*Aricia*] (1849); SEIN, Entom. Nachr., XIX. 216. 8. [*Spilogaster*] (1893); VILL., Bull. Soc. entom. France, 19. 350. [*Mydaca*] (1898); PAND., Revue Entom. France, XVII. 71. 10. [*Aricia*] (1898).
- ?*riparia* MACQ., Suit. à Buff., II. 299. 8. [*Spilogaster*] (1835).
- reispellis* PAND., Revue Entom. France, XVIII. 108. 24. [*Spilogaster*] (1899).

- regalis** STEIN, Entom. Nachr., XXVI, 306, 2. [*Aricia*] (1900). Caucasus.
- riparia** MACQ. ? **querceti** BOUCHE.
- rossica** SCHNABL. - **boleticola** ROND.
- ruficrura** ROND., Atti Soc. Milano, IX, 101, 11. [*Yctodesia*] (1866) et Prodr., VI, 131, 20. [*Yctodesia*] (1877); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 218. [*Aricia*] (1893). Europacentr. et mer.
- rufipalpis** MACQ., Suit. à Buff., II, 287, 6. ? [*Aricia*] (1835); MEIG., S. B., VII, 311, 25. ? [*Aricia*] (1838); ROND., Atti Soc. Milano, IX, 102, 15. [*Yctodesia*] (1866) et Prodr., VI, 128, 15. [*Yctodesia*] (1877); SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XXII, 444, 51. [*Aricia*] (1888); MEADE, Deser. List Brit. Anth., I, 12, 30. [*Hypodesia*] (1897); PASD., Revue entom. France, XVIII, 85, 33. [*Aricia*] (1899). Europacentr. et mer., Creta.
- rufiseta** ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6264, 2-3. ? [*Anthomyza*] (1860); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 52. [*Aricia*] (1902). Europacentr. et sept.
- rufisetiformis* STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 223. ± [*Spilogaster*] (1893).
- rufisetiformis* STROBL. - **rufiseta** ZETT.
- ruralis** MACQ. ? **laeta** FALL.
- scutellaris** FALL., Musc., 90, 123. [*Musca*] (1825); ZETT., Dipt. Scand., V, 1743, 125. [*Anthomyza*] (1846) et VIII, 3323, 125. [*Anthomyza*] (1849); SCHUS., F. A., I, 605. [*Aricia*] (1862); ROND., Atti Soc. Milano, IX, 105, 22. [*Yctodesia*] (1866) et Prodr., VI, 121, 6. [*Yctodesia*] (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 3. [*Hypodesia*] (1881); SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XX, 401, 29. [*Aricia*] (1886) et XXII, 478, 29. [*Aricia*] (1888); MEADE, Deser. List Brit. Anth., I, 13, 32. [*Hypodesia*] (1897); PASD., Revue Entom. France, XVIII, 89, 42. [*Aricia*] (1899).
- hannaealis* R.-D., Myod., 491, 4. [*Robrella*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 290, 19. [*Aricia*] (1835).
- populi* MEIG., S. B., V, 115, 55. [*Anthomyza*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 289, 15. [*Aricia*] (1835); SCHUS., F. A., I, 605. [*Aricia*] (1862).
- stolala* ROND., Atti Soc. Milano, IX, 106, 24. [*Yctodesia*] (1866) et Prodr., VI, 123, 8. [*Yctodesia*] (1877).
- testacea* WALK. (nec FABR.), Ins. Brit., II, 124, 19. [*Anthomyza*] (1853).
- scutellata** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1640, 5. ? [*Anthomyza*] (1815). Suecia.
- semidiaphana** ROND. - **cincta** ZETT.
- sericata** MEIG. ? **fuscata** FALL.
- serva** MEIG., S. B., V, 86, 6. ? [*Anthomyza*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 287, 5. [*Aricia*] (1835); ZETT., Ins. Lappl., 663, 10. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1397, 10. [*Aricia*] (1845); WALK., Ins. Brit., II, 120, 5. [*Anthomyza*] (1853); SCHUS., F. A., I, 601. [*Aricia*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 3. [*Hypodesia*] (1881); SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XX, 387, 24. [*Aricia*] (1886) et XXII, 467, 21. [*Aricia*] (1888); STROBL,

- Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 215. [*Aricia*] (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I, 7, 4. [*Hyclodesia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVII, 79, 23. [*Aricia*] (1898).
- setigera** STEIN, Entom. Nachr., XXVI, 305, 1. [*Aricia*] (1900). Succia.
- signata** MEIG., S. B., V, 113, 52. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Europa.
Buff., II, 288, 10. [*Aricia*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1638.
2. [*Anthomyza*] (1845); WALK., Ins. Brit., II, 126, 24. [*Anthomyia*]
(1853); SCHN., F. A., I, 603. [*Aricia*] (1862); RONDI., Atti Soc.
Milano, IX, 105, 20. [*Yctodesia*] (1866) et Prodr., VI, 119, 3.
[*Yctodesia*] (1877); SCHNABL., Hor. Soc. entom. Ross., XX, 331.
5. [*Aricia*] (1886) et XXII, 452, 5. [*Aricia*] (1888); MEADE, Descr.
List Brit. Anth., I, 11, 25. [*Hyclodesia*] (1897); PAND., Revue
Entom. France, XVIII, 84-32. [*Aricia*] (1899).
? *ariciaïdea* R.-D., Myod., 483, 3. (1830).
? *tilarata* R.-D., Myod., 481, 8. ♀ [*Myiaca*] (1830).
cagatoria R.-D., Myod., 483, 2. (1830).
- soror* R.-D. = **variegata** MEIG.
- squalens* ZETT. = **cinctinervis** ZETT.
- Steinii** CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XIX, 273, 3. ♂ [*Aricia*] (1900). Austria.
- Steinii* SCHNABL. = **nitida** MACQ.
- stolata* ROND. = **scutellaris** FALL.
- subfuscinervis** ZETT., Ins. Lapp., 673, 50. ♂ [*Anthomyza*] (1838) et Scandinavia.
Dipt. Scand., IV, 1489, 17. [*Aricia*] (1845).
vicina ZETT., Ins. Lapp., 673, 51. ♀ [*Anthomyza*] (1838).
- tenuiseta** POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 8. [*Aricia*] (1893). JugumStelvi-
tessellata MACQ. = ? **trimaculata** BOUCHÉ. anum.
- testacea* DEG. = **pallida** FABR.
- testacea* FABR. = ? **variegata** MEIG.
- testacea* WALK. (nec FABR.) = **scutellaris** FALL.
- tibialis** R.-D., Myod., 486, 3. ♀ [*Euphemia*] (1830). Gallia.
- Tiefii** SCHNABL., Hor. Soc. entom. Ross., XXII, 420, 44. ♂ [*Aricia*] (1888). Europa centr.
trigonogramma CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XX, 41, 25. [*Spilo-*
gaster] (1901).
- tinctipennis** ROND., Atti Soc. Milano, IX, 104, 18. ♂ [*Yctodesia*] Europacentr.
(1866) et Prodr., VI, 120, 4. ♂ [*Yctodesia*] (1877). et mer.
? *Girschneri* SCHNABL., Hor. Soc. entom. Ross., XXII, 401, 39.
[*Aricia*] (1888).
- trigonalis** MEIG., S. B., V, 127, 79. ♂ [*Anthomyia*] (1826); SCHN., Europa centr.
F. A., I, 612. [*Aricia*] (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XLIII, 218. [*Aricia*] (1893).
- trigonalis* MEADE = **palpata** STEIN.
- trigonogramma* CZERNY = **Tiefii** SCHNABL.
- trigonospila** CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XX, 39, 23. [*Spilogaster*] Europa centr.
(1901).
- trigonostigma* CZERNY = **palpata** STEIN.
- trimaculata** BOUCHÉ, Naturgesch. d. Ins., I, 80, 68. [*Anthomyia*] Europa,
(1834); CURT., Fam. Ins., 142, 11. [*Anthomyia*] (1860). Creta,
Tunisia.

- meridionalis* ROXB., Atti Soc. Milano, IX, 97, 1. [*Yctodesia*] (1866) et Prodr., VI, 142, 33. [*Yctodesia*] (1877); SCHNABL., Hor. Soc. entom. Ross., XX, 337, 7. [*Arctia*] (1886) et XXII, 454, 7. [*Arctia*] (1888); PAND., Revue Entom. France, XVII, 74, 14. [*Arctia*] (1898).
- zesselata* MACQ., Suitt. à Buff., II, 304, 15. [*Hydrophoria*] (1835); MEG., S. B., VII, 317, 29. [*Hylemyia*] (1838).
- turpis** ZETT., Ins. Lapp., 673, 52. [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1490, 98. [*Arctia*] (1845). Scandinavia.
- inconspicua* ZETT., Ins. Lapp., 673, 53. [*Anthomyia*] (1838).
- ulmicola* LABOULE. **cincta** ZETT. Norvegia.
- umbrata** STORM, Norske Selsk. Sker., 238. [*Arctia*] (1895). Europa-centre.
- vagens** FALL., Musc., 78, 93. [*Musca*] (1825); MEG., S. B., V, 112, 51. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suitt. à Buff., II, 288, 9. [*Arctia*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 688, 118. [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1638, 3. [*Anthomyia*] (1845); WALK., Ins. Brit., II, 126, 22. [*Anthomyia*] (1853); SCHN., F. A., I, 604. [*Arctia*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 3. [*Hyctodesia*] (1884); SCHNABL., Hor. Soc. entom. Ross., XX, 378, 21, p. p. [*Arctia*] (1886), XXI, 458. [*Arctia*] (1887) et XXII, 163, 21. [*Arctia*] (1888); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXV, 394. [*Hyctodesia*] (1889) et Deser. List Brit. Anth., I, 12, 28. [*Hyctodesia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVII, 85, 34. [*Arctia*] (1898).
- vagens* STROBL (nec FALL.) **basalis** ZETT.
- vagatoria* R.-D. **signata** MEG.
- variegata** MEG., S. B., V, 114, 54. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suitt. à Buff., II, 289, 14. [*Arctia*] (1835); SCHN., F. A., I, 605. [*Arctia*] (1862); ROXB., Atti Soc. Milano, IX, 105, 21. [*Yctodesia*] (1866) et Prodr., VI, 120, 5. [*Yctodesia*] (1877); SCHNABL., Hor. Soc. entom. Ross., XX, 104, 30. [*Arctia*] (1886) et XXII, 179, 30. [*Arctia*] (1888); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXV, 394. [*Hyctodesia*] (1889) et Deser. List Brit. Anth., I, 13, 33. [*Hyctodesia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 96, 5. [*Spilogaster*] (1899).
- Blondeli* R.-D., Myod., 491, 3. [*Robrella*] (1830); MACQ., Suitt. à Buff., II, 290, 18. [*Arctia*] (1835).
- denominata* ZETT., Dipt. Scand., XII, 4747, 125-126. [*Anthomyia*] (1855) et XIV, 6291, 125-126. [*Anthomyia*] (1860).
- discoidea* MACQ., Suitt. à Buff., II, 292, 29. [*Arctia*] (1835); MEG., S. B., VII, 323, 87. [*Hylemyia*] (1838).
- populi* WALK. (nec MEG.), Ins. Brit., II, 123, 18. [*Anthomyia*] (1853).
- sonor* R.-D., Myod., 491, 2. [*Robrella*] (1830).
- Asiatica* FABR., Spec. Ins., II, 140, 22. [*Musca*] (1751), Mant. Ins., II, 311, 24. [*Musca*] (1787) et Entom. syst., IV, 320, 32. [*Musca*] (1791); ROSS., Mant. Ins., II, 65, 536. [*Musca*] (1791); PANZ., Fauna germ., 60, 11. [*Musca*] (1798). FABR.,

- Syst. Antl., 294, 51. [*Musca*] (1805); MEG., S. B., V, 116-57. [*Anthomyia*] (1826); R.-D., Myod., 190, 1. [*Robocella*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 290, 17. [*Aricia*] (1835); DEP., Ann. Sci. nat., sér. 2, XII, 31, 9. [*Anthomyia*] (1839).
- cersipellis* PAND. = *querceti* BOUCH.
- veterana** ZETT., Ins. Lapp., 662, 6. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 139, 11. [*Aricia*] (1845).
basalis ZETT., var., Ins. Lapp., 663, 11. ? [*Anthomyza*] (1838).
- viaram* R.-D. = *erratica* FALL.
- vicina* ZETT. = *subfuscinerervis* ZETT.
- villana** R. D., Myod., 484, 4. + (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 288, 12. + [*Aricia*] (1835); MEG., S. B., VII, 315, 27. + [*Aricia*] (1838).
- vittata* R.-D. = ?*boleticola* ROND.
- villifera* SCHN. (nec ZETT.) = *fusca* FALL.
- vivida** ROND., Bull. Soc. entom. Ital., II, 319, 29. ? [*Yctodesia*] (1870) Europa mer.
 et Prodr., VI, 135, 24. ? [*Yctodesia*] (1877); PAND., Revue Entom. France, XVII, 79, 21. [*Aricia*] (1898).
- Zellerstedtii* BOSSD. = *errans* MEG.
- Zugmayeriae** SCHNABL., Hor. Soc. entom. Ross., XXII, 411, 41. ? Austria.
 [*Aricia*] (1888); STROBL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 219. [*Aricia*] (1893).

Alloeostylus

SCHNABL., Entom. Nachr., XIV, 49. (1888) et 82. (1888).

Phyllis R.-D., Myod., 603, V, p. p. (1830).

Brachylabis SCHNABL., Hor. Soc. entom. Ross., XXIV, 497, 2. (1890).

aculeatus LW. = *diaphanus* WIED.

varulans PAND. = *sudeticus* SCHNABL.

binotatus STROBL. (nec ZETT.) = *sudeticus* SCHNABL.

diaphanus WIED., Zool. Mag., 1, 1, 81, 31. [*Anthomyia*] (1817); Europa centr. et sept.
 SCHN., F. A., 1, 623. [*Limnophora*] (1862).

aculeatus LW., Berl. entom. Zeitschr., XVII, 18, 54. ? [*Aricia*] (1873); SCHNABL., Hor. Soc. entom. Ross., XX, 410, 32. [*Aricia*] (1886).

flavescens MEG. (nec FALL.), S. B., V, 202, 211. [*Anthomyia*] (1826); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXIII, u. XXIV, 56. [*Pegomyia*] (1887) et Descr. List Brit. Anth., 1, 14, 38. [*Hyalodesia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 96, 3. [*Spilogaster*] (1899).

flavus R.-D., Myod., 604, 1. [*Phyllis*] (1830).

fulvipes WALK., Ins. Brit., II, 157, 59. [*Anthomyia*] (1853).

varians ZETT., Ins. Lapp., 698, 168. ? [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., V, 1784, 168. [*Anthomyza*] (1846).

- flavcolus* MEIG. (*var.* FALL.) **diaphanus** WIED.
flavus R.-D. ? **diaphanus** WIED.
futilis WALK. ? **diaphanus** WIED.
nigricans R.-D. ? **simplex** WIED.
posticus ZETT. - **simplex** WIED.
posticatus ZETT. - **simplex** WIED.
scutellaris FALL. *var.* β **simplex** WIED.
simplex WIED., Zool. Mag., I, I, 84, 38, [*Anthomyia*] (1817); MEIG., S. B., V, 122, 69, , [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Dipt. Scand., VIII, 3324, 130, [*Anthomyia*] (1849); MEALE, Entom. Monthly Mag., XXIII, II, XXIV, 1-1, [*Hyetodesia*] (1887) et Descr. List Brit. Anth., I, 14, 36, [*Hyetodesia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 98, 6, [*Spilogaster*] (1899).
? *nigricans* R.-D., Myol., 488, 6, , [*Uicia*] (1830).
posticus ZETT., Dipt. Scand., V, 174, 130, , [*Anthomyia*] (1846).
posticatus MEIG., S. B., V, 190, 187, , [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Dipt. Scand., VIII, 3324, 130, [*Anthomyia*] (1849).
scutellaris FALL. *var.* β , Musc., 99, 125, , [*Anthomyia*] (1825).
sudeticus SCHUM., Entom. Nachr., XIV, 49, (1888); MEALE, Entom. Monthly Mag., XXV, 396, , [*Hyetodesia*] (1889) et Descr. List Brit. Anth., I, 14, 37, [*Hyetodesia*] (1897).
arabans PAND., Revue Entom. France, XVIII, 98, 7, [*Spilogaster*] (1899) et XVIII, 123, 10, [*Limnophora*] (1899).
bimaculatus STROM. (*var.* ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 226, , [*Spilogaster*] (1893).
Sundewalli ZETT., Dipt. Scand., IV, 1680, 47, [*Anthomyia*] (1845); ROSS., Atti Soc. Milano, IX, 99, 5, , [*Aspilid*] (1866) et Prodr., VI, 88, 17, , [*Spilogaster*] (1877); STROM, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 222, [*Spilogaster*] (1893); STEIN, Entom. Nachr., XIX, 229, 17, [*Spilogaster*] (1893); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 103, 15, [*Spilogaster*] (1899).
var. **argyratus** STROM. (*var.* ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 229, , [*Limnophora*] (1893).
rufus ZETT. **diaphanus** WIED.

Trichopticus

- ROSS., Bull. Soc. entom. Ital., II, 335, XXXII, (1870) (Trichopticus).
Hera SCHUM., Entom. Nachr., XIV, 113, p. p. (1888).
Lusitans MEIG., S. B., VII, 123, 3, p. p. (1838).
Rhynchodrichops SCHUM., Ber. Soc. entom. Ross., XXIV, 198, 2, p. p. (1890).
Tricops ROSS., Prodr., I, 96, 11, (1856).
aeuleipes ZETT., Ins. Lapp., 671, 58, [*Anthomyia*] (1858) et Dipt. Scand., IV, 1187, 96, [*Uicia*] (1845) et XIV, 6224, 96, [*Uicia*]

- (1860); SCHIN., F. A., I. 618. [*Lasiops*] (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 233. (1893).
armipes ROND., Bull. Soc. entom. Ital., II, 336, 2. ♀ (1870) et Prodr., VI, 146, 1. ♂ (1877).
apicalis MEIG. = *semicinereus* WIED.
aprinus PAND. = *rostratus* MEADE.
armipes ROND. = *aculeipes* ZETT.
ater FALL. = *longipes* ZETT.
baicalensis SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XX, 362, 16. ♀ [*Aricia*] Sibiria. (1886).
cinereiventris ZETT., Dipt. Scand., IV, 1500, 110. ♀ [*Aricia*] (1845). Suecia.
cristatus ZETT., Dipt. Scand., IV, 1579, 193. [*Aricia*] (1845). Europacentr.
culminum POK. = *subrostratus* ZETT. et sept.
enclaus SCHIN. (nec MEIG.) = *decolor* FALL.
decolor FALL., Musc., 68, 70. ♀ [*Musca*] (1824); MEIG., S. B., V, 198, 201. ♀ [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 679, 81. ♀ [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1525, 136. ♀ [*Aricia*] (1845); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 124, 12. [*Limnophora*] (1899). Europa.
enclaus SCHIN. (nec ZETT.), F. A., I, 618. [*Lasiops*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 174. (1882); MEIG., Bull. Soc. entom. France, 62, LXV, 3. ♀ [*Lasiops*] (1893). MEADE, Descr. List Brit. Anth., I, 8, 12. [*Hyctodesia*] (1897).
innocens ZETT., Dipt. Scand., IV, 1522, 132. ♀ [*Aricia*] (1845).
melcorica MEIG. (nec L.), S. B., V, 137. + [*Anthomyia*] (1826).
?obscurus MACQ., Suit. à Buff., II, 302, 20. [*Hydrophoria*] (1835).
depressiventris ZETT. = *mutatus* FALL.
flaviscapula ZETT. p. p. = *longipes* ZETT.
?foveolatus ZETT., Dipt. Scand., IV, 1587, 201. ♀ [*Aricia*] (1845). Suecia.
perpendicularis ZETT., Dipt. Scand., IV, 1588, 202. [*Aricia*] (1845).
frenatus HOLMGR., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX, 103. [*Aricia*] Europa sept. (1872); LUNDG., Vid. Medd., 109. [*Lasiops*] (1898); STEIN, Wien. entom. Zeitzg., XXI, 58. [*Lasiops*] (1902).
hians ZETT., Ins. Lapp., 698, 167. ♀ [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Europa. Scand., V, 1762, 146. [*Anthomyia*] (1846).
impar ZETT., Dipt. Scand., V, 1762, 145. [*Anthomyia*] (1846); STEIN, Entom. Nachr., XVIII, 332. (1892).
hirsutulus ZETT., Ins. Lapp., 673, 55. [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Europa. Scand., IV, 1494, 103. [*Aricia*] (1845); SCHIN., F. A., I, 619. Caucasus. [*Lasiops*] (1862); SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XX, 367, 17. ♀ [*Aricia*] (1886); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXV, 448. (1889); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 231. (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I, 9, 13. [*Hyctodesia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 108, 23. ♀ [*Spilogaster*] (1899).
hirtulus ZETT., Ins. Lapp., 673, 54. ♀ [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Europa. Scand., IV, 1492, 101. ♀ [*Aricia*] (1845); ROND., Prodr., VI, 147, 2. ♀ (1877).

- hyalinatus* FALL. *semicinereus* WIRD.
impar ZETT. *hians* ZETT.
innocens ZETT. = *decolor* FALL.
innocuus ZETT., Ins. Lapp., 674, 56. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 149, 102. [*Aricia*] (1845); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXV, 449. (1889); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 231. (1893); MEADE, Deser. List Brit. Anth., I, 9, 14. [*Hyetodesia*] (1897).
pabipes ZETT., Dipt. Scand., IV, 1499, 109. ? [*Aricia*] (1845).
lividiventris ZETT., Dipt. Scand., IV, 1444, 55. ? [*Aricia*] (1845); STREX, Wien. entom. Zeitg., XXI, 34. [*Spilogaster*] (1902).
longipes ZETT., Dipt. Scand., IV, 1403, 17. [*Aricia*] (1845); SCHN., F. A., I, 602. [*Aricia*] (1862); SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XX, 357, 14. [*Aricia*] (1886); MEADE, Deser. List Brit. Anth., I, 8, 10. [*Hyetodesia*] (1897).
ater FALL., Musc., 59, 50. ? [*Musca*] (1823); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1404, 18. [*Aricia*] (1845).
flavispinosa ZETT., Dipt. Scand., VIII, 3287, 100-101. ? p. p. [*Aricia*] (1849).
?nigripennis R.-D., Myod., 479, 7. ? [*Fellaca*] (1830).
?rufripennis R.-D., Myod., 478, 6. ? [*Fellaca*] (1830).
metoptica MEIG. (nec FALL.) p. p. = *decolor* FALL.
Miki SCHNABL. = *nigritellus* ZETT.
mutatus FALL., Musc., 92, 133. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V, 203, 213. [*Anthomyza*] (1826); ZETT., Dipt. Scand., V, 1763, 117. [*Anthomyza*] (1846); RONDI, Prodr., VI, 159, 8. ? [*Anthomyza*] (1877).
depressiventris ZETT., Dipt. Scand., IV, 1524, 134. ? [*Aricia*] (1845); ? STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 231, 2 (1893).
scnipellucidas ZETT., Dipt. Scand., IV, 1523, 133. ? [*Aricia*] (1845); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXVIII, 175. (1882); MEIX., Bull. Soc. entom. France, 62, CXCIV, 2. [*Lasiops*] (1893); MEADE, Deser. List Brit. Anth., I, 10, 18. [*Hyetodesia*] (1897).
nigripennis R.-D. ? **longipes** ZETT.
nigritellus ZETT., Ins. Lapp., 666, 21. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1509, 22. [*Aricia*] (1845) et XIV, 6202, 22. [*Aricia*] (1860); SCHN., F. A., I, 608. [*Spilogaster*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXVIII, 27. [*Mutaba*] (1881); STREX, Entom. Nachr., XIX, 215, 1. [*Spilogaster*] (1893); MEADE, Deser. List Brit. Anth., I, 15, 3. [*Mydops*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 113, 30. [*Spilogaster*] (1899).
Miki SCHNABL, Entom. Nachr., XIV, 111. ? [*Heck*] (1888).
obscurus MACQ. ? *decolor* FALL.
perpendicularis ZETT. *foveolatus* ZETT.
pabipes ZETT. *innocuus* ZETT.

- pulcher** MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 175. (1882) et Descr. Britannia.
List Brit. Anth., I, 9, 15. [*Hyctodesia*] (1897).
- rostratus** MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 176. (1882); POK., Europa.
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX, 558. (1889); STROBL, Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 232. (1893); MEADE, Descr. List
Brit. Anth., I, 9, 16. ? [*Hyctodesia*] (1897).
aprinus PASD., Revue Entom. France, XVIII, 123, 11. [*Limno-*
phora] (1899).
- rubrifrons* R.-D. = ? **longipes** ZETT.
- semicinereus** WIED., Zool. Mag., I, 1, 84, 37. [*Anthomyia*] (1817); Europa.
MEIG., S. B., V, 108, 43. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., Asia min.,
II, 301, 14. [*Hydrophoria*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 670, 40. Caucasus.
[*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1500, III. [*Aricia*] (1845);
SCHN., F. A., I, 606. [*Spilogaster*] (1862); RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 100, 8. [*Yctodesia*] (1866) et Prodr., VI, 136, 26. [*Yctodesia*]
(1877); SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XX, 369, 18. [*Aricia*]
(1886); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 217. [*Aricia*]
(1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I, 9, 17. [*Hyctodesia*]
(1897); PASD., Revue Entom. France, XVIII, 104, 18. [*Spilo-*
gaster] (1899).
apicalis MEIG., S. B., VI, 375, 214. ? [*Anthomyia*] (1830); SCHN.,
F. A., I, 619. [*Lasiops*] (1862).
hyalinatus FALL., Musc., 64, 62. [*Musca*] (1823).
- semipellucidus* ZETT. = **mutatus** FALL.
- separ** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1495, 104. [*Aricia*] (1845) et XIV, 6226. Europacentr.
104. [*Aricia*] (1860); STEIN, Entom. Nachricht., XVIII, 325. (1892). et sept.
spinipes POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX, 552. [*Aricia*]
(1889).
variabilis ZETT. (nec FALL.). Ins. Lapp., 663, 9, p. p. [*Antho-*
myza] (1838).
- spinipes* POK. = **separ** ZETT.
- subrostratus** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1496, 105. [*Aricia*] (1845) et Europa.
XIV, 6227, 105. [*Aricia*] (1860); RONDI., Bull. Soc. entom. Ital., II, 355, 1. (1870) et Prodr., VI, 147, 3. (1877); STROBL, Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 232. (1893).
calvinium POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX, 557. (1889).
- ? **tyrolensis** MEIG., Bull. Soc. entom. France, 62, CLIX, 2. (1893). Europacentr.
- variabilis** FALL., Musc., 58, 47. [*Musca*] (1823); MEIG., S. B., V, 87. Europa.
9. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 300, 12. [*Hydro-*
phoria] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 663, 9. [*Anthomyza*] (1838) et
Dipt. Scand., IV, 1402, 16. [*Aricia*] (1845); SCHN., F. A., I, 602.
[*Aricia*] (1862); RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 99, 7. [*Yctodesia*]
(1866) et Prodr., VI, 139, 30. [*Yctodesia*] (1877); SCHNABL, Hor.
Soc. entom. Ross., XX, 360, 15. [*Aricia*] (1886); MEADE, Descr.
List Brit. Anth., I, 8, 11. [*Hyctodesia*] (1897); PASD., Revue
Entom. France, XVIII, 76, 18. [*Aricia*] (1899).
- variabilis* ZETT. (nec FALL.) p. p. = **separ** ZETT.

Rhynchopsilops

HENDER, Wien. entom. Zeitzg., XXII, 129, (1903).

villosus HENDER, Wien. entom. Zeitzg., XXII, 131, (1903).

Europa merid.

Drymeia

Musc., S. B., V, 204, CLVIII, (1826).

hamata FALL., Musc., 61, 57, [*Musca*] (1823); Zett., Dipt., Scand., IV, 1368, 1, (1845); WALK., Ins. Brit., II, 146, 1, (1853); SMITH, F. A., I, 621, (1862); ROSA, Atti Soc. Milano, IX, 86, 1, (1866) et Prodr., VI, 18, 1, (1877); MAYER, Entom. Monthly Mag., XVIII, 172, (1882) et Doser, List Brit. Anth., I, 28, 1, (1897); PASD., Revue Entom. France, XVIII, 111, 27, [*Spilogaster*] (1899).

obscura MUG., S. B., V, 204, 1, [*Anthomyia*] (1826); R.-D., Myod., 561, 1, (1870); MACQ., Suit. à Buff., II, 322, 1, (1835).

piligera ZETT., Dipt., Scand., IV, 1438, 47, [*Arctia*] (1845) et VIII, 2281, 37, [*Arctia*] (1849).

obscura MUG. = hamata FALL.

piligera ZETT. = hamata FALL.

Eriphia

Musc., S. B., V, 206, CLIX, (1826).

cinerea MUG., S. B., V, 206, 1, (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 331, 1, (1835); ROSA, Atti Soc. Milano, IX, 174, 1, (1866), Bull. Soc. entom. Ital., II, 339, 1, (1870) et Prodr., VI, 31, 1, (1877); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 231, (1893).

hirticeps STROBL, (nec FALL.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 231, (1893) [*Trichopterus*] (1893).

Rondanii PASD., Revue Entom. France, XVIII, 117, 26, [*Limnophora*] (1899).

hirticeps STROBL, (nec FALL.) = cinerea MUG.

Rondanii PASD. = cinerea MUG.

Pogonomyia

Rosa, Bull. Soc. entom. Ital., II, 336, XXIII, (1870).

alpicola ROSA, Bull. Soc. entom. Ital., II, 337, 1, (1870) et Prodr., VI, 33, 1, (1877); POG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 231, (1893); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 231, (1893).

concolor PASD., (nec STROBL), Revue Entom. France, XVIII, 117, 2, [*Limnophora*] (1899).

zyglacoides ROSA, Atti Soc. Milano, IX, 77, 1, [*Ephyra*] (1866) et Prodr., VI, 94, II, [*Spilogaster*] (1877).

alpicola MEADE (*nee* ROND.) = **Meadei** POK.

atramentaria STROBL (*nee* MEIG.) = **Meadei** POK.

brunalis ROND. = **Meadei** POK.

cinerea PAND. (*nee* MEIG.) = **alpicola** ROND.

glacialis ROND. = ?**alpicola** ROND.

Meadei POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 8. (1893); MEADE, Europa,

Descr. List Brit. Anth., I, 29, 1. (1897).

alpicola MEADE (*nee* ROND.), Entom. Monthly Mag., XVIII, 172. (1882).

atramentaria STROBL (*nee* MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII, 230. [*Limnophora*] (1863); SCHN., F. A., I, 623. [*Limnophora*] (1862).

brunalis ROND., Atti Soc. Milano, IX, 88, 2. ? [*Aspilid*] (1866) et Prodr., VI, 92, 23. ? [*Spilogaster*] (1877).

tetra PAND. (*nee* MEIG.), Revue Entom. France, XVIII, 118, 3. [*Limnophora*] (1899).

segnis HOLMGR., Entom. Tid-kr., IV, 169, 22. [*Uvicia*] (1883); STEIN, Europa sept.,

Wien. entom. Zeitzg., XXI, 62. (1902).

tetra PAND. (*nee* MEIG.) = **Meadei** POK.

Syllegopterula

POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 18. (1893).

Beckeri POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 19. (1893). Europa centr.

monticola CZERNY, Wien. entom. Zeitzg., XX, 34, 1. ? [*Spilogaster*] (1901). et mer.

tuberculiventris STROBL (*nee* ZETT.), Wien. entom. Zeitzg., XIII, 68. [*Coenosia*] (1894).

monticola CZERNY — **Beckeri** POK.

tuberculiventris STROBL (*nee* ZETT.) = **Beckeri** POK.

Acanthiptera

ROND., Prodr., VI, 64, XI. (1877).

Acanthiptera ROND., Atti Soc. Milano, IX, 154, XVII. (1866).

Phyllis R.-D., Myod., 603, V, 1, p. p. (1830).

Sphacolyma PERR., Annal. Soc. entom. France, sér. V, T. VII, 379. (1877).

flava PERR. = **inanis** FALL.

inanis FALL., Musc., 91, 127. [*Masca*] (1825); MEIG., S. B., V, 189. Europa,

186. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Bull., II, 353, 16. [*Pegomyia*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., V, 1782, 167. [*Anthomyia*] (1846); SCHN., F. A., I, 634. [*Anthomyia*] (1862); ROND., Atti Soc.

Milano, IX, 154, I. (1866) et Prodr., VI, 64, I. (1877); MEADE,

Entom. Monthly Mag., XX, 9 (1883) et Deser. List Brit. Anth., II, 29, 1 (1897); PASD., Revue Entom. France, XVIII, 93, 1, [*Spilogaster*] (1899).

flava PERL., Annal. Soc. entom. France, sér. 5, VII, 379, [*Sphodryna*] (1877).

robustiformis R.-D., Myod., 604, 3, [*Phyllis*] (1830).

robustiformis R.-D. = *inanis* FALL.

Hebecnema

SCHNABL., Hor. Soc. entom. Ross., XXIII, 331, 3, (1889).

Spilogaster Myc., Suitt. à Buff., II, 293, 2, p. p. (1835).

carbo SCHN., = *fumosa* MEG.

debilis WALK., ? *umbratica* MEG.

fumosa MEG., S. B., V, 109, 45, ? [*Anthomyia*] (1826); Myc., Suitt., Europa, à Buff., II, 300, II, ? [*Hydrophora*] (1835); His. Cauc.,

carbo SCHN., F. A., I, 602, [*Arctia*] (1862); Syria,

fascipes ZELL., Dipt. Scand., IV, 1617, 12, ? [*Anthomyia*] (1815); Algeria,

PASD., Revue Entom. France, XVII, 67, 2, [*Arctia*] (1898).

manra R.-D., Myod., 501, 19, [*Mydia*] (1830).

salifuga ROUD., Prodr., VI, 138, 28, ? [*Ychabesia*] (1877);

Buzzi, Bull. Soc. entom. Ital., XXIII, 59, 169, [*Arctia*] (1891).

? *tristis* BOU., Annal. Soc. entom. France, sér. 6, V, 282, 1, [*Trichophleus*] (1885).

fumosa WALK., *carbo* MEG. = *vespertina* FALL.

fascipes ZELL. = *fumosa* MEG.

lilloyalis R.-D. = *vespertina* FALL.

manra R.-D. = *fumosa* MEG.

nigra R.-D. = *vespertina* FALL.

nigricolor FALL., Musc., 81, 101, ? [*Musca*] (1825); MEG., S. B., Europa, V, 195, 195, ? [*Anthomyia*] (1826); ZELL., Dipt. Scand., IV, 1616,

II, ? [*Anthomyia*] (1845); SCHN., F. A., I, 610, [*Spilogaster*] (1862); ROUD., Atti Soc. Milano, IX, 119, 16, [*Spilogaster*] (1866)

et Prodr., VI, 86, II, [*Spilogaster*] (1877); MEG., Entom. Monthly Mag., XXV, 424, [*Myiaca*] (1889); SERON., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 222, [*Spilogaster*] (1893); MEG., Deser. List Brit. Anth., I, 16, 3, [*Myiaca*] (1897); PASD., Revue Entom. France, XVIII, 88, 39, [*Arctia*] (1899).

? *salicorum* R.-D., Myod., 480, 3, [*Myiaca*] (1830); Myc., Suitt., à Buff., II, 291, 21, ? [*Arctia*] (1835); MEG., S. B., VII, 323, 86, ? [*Halimacra*] (1874).

? *tristis* BOU., WALK., His. Brit., II, 130, 35, [*Anthomyia*] (1815).

rugata FALL. = *vespertina* FALL.

palustris R.-D. = ? *umbratica* MEG.

salifuga ROUD. = *fumosa* MEG.

salicorum R.-D. = ? *nigricolor* FALL.

transiens WALK., ?*nigricolor* FALL.

tristis BIG., *fumosa* MEG.

umbatica MEG., S. B., V. 88, 10, ? [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Europa,
D., Lapp., 665, 18, [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, Syria,
1107, 19, [*Aricia*] (1845); SCHN., F. A., I, 605, [*Aricia*] (1862);
ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 99, 6, [*Yctodesia*] (1866) et Prodr.,
VI, 139, 29, [*Yctodesia*] (1877); SCHNAB., Hor. Soc. entom. Ross.,
XX, 372, 19, [*Aricia*] (1886) et XXII, 261, 19, [*Aricia*] (1888);
MEG., Descr. List Brit. Anth., I, 8, 9, [*Hydrodesia*] (1897);
PAND., Revue Entom. France, XVII, 68, 3, [*Aricia*] (1898).

?*debilis* WALK., Ins. Brit., II, 122, 12, [*Anthomyia*] (1853).

?*palustris* R.-D., Myol., 502, 21, [*Mydina*] (1830).

vespertina FALL., Muse., 58, 49, [*Musca*] (1823); MEG., S. B., V. Europa,
107, 11, [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1406, 20, Ins. Canar.,
[*Aricia*] (1845); WALK., Ins. Brit., II, 123, 11, ? [*Anthomyia*] Syria,
(1853); SCHN., F. A., I, 608, [*Spilogaster*] (1862); ROSD., Atti Soc. Algeria,
Milano, IX, 118, 15, [*Spilogaster*] (1866) et Prodr., VI, 133, 24, [*Spilo-*
gaster] (1877); STEIN, Entom. Nachr., XIX, 215, 2, [*Spilo-*
gaster] (1893); MEG., Descr. List Brit. Anth., I, 15, 2, [*Mydina*] (1897); PAND., Revue entom. France, XVII, 68, 4, [*Aricia*] (1898).

?*rossa* WALK. *unc* MEG., Ins. Brit., II, 123, 13, ? [*Anthomyia*] (1853).

libialis R.-D., Myol., 506, 9, [*Hydrophoria*] (1830).

nigra R.-D., Myol., 501, 20, ? [*Mydina*] (1830).

nigrita FALL., Muse., 60, 55, ? [*Musca*] (1823); MEG., S. B., V. 110, 48, [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. 5 Bull., II, 301, 13, [*Hydrophoria*] (1835); SCHN., F. A., I, 609, [*Spilogaster*] (1862).

Mydaea

R.-D., Essai sur les Myol., 479, II, (1830).

Aricia R.-D., Myol., 486, VI, (1830).

Aspilota ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 86, V, p. p. (1866) *colima*.

Caricea SCHNAB. *unc* R.-D., Hor. Soc. entom. Ross., XXIV, 195, 4, p. p. (1899).

Helina R.-D., Myol., 493, VIII, p. p. (1830).

Mydina R.-D., Myol., 495, IX, p. p. (1830).

Myospila ROSD., Prodr., I, 91, 9, (1856).

Quadrula PAND., Revue entom. France, XVII, 51, p. p. (1898).

Spilogaster MACQ., Suit. 5 Bull., II, 263, 2, (1835).

abdominalis ZETT., Dipt. Scand., V, 1741, 126, ? [*Anthomyia*] Europa,
(1846) et XI, 4724, 126, ? [*Anthomyia*] (1852); WALK., Ins. Brit., Syria,
II, 125, 20, [*Anthomyia*] (1853); ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 108, 27, [*Yctodesia*] (1866) et Prodr., VI, 125, 11, [*Yctodesia*] (1877); SCHNAB., Hor. Soc. entom. Ross., XX, 328, 4, ? [*Aricia*]

- (1886) et XXII, 451, 4. [*Trichia*] (1888); MEADE, De ce. List Brit. Anth., I, 13, 35, [*Hypobasia*] (1897); PASD., Revue Entom. France, XVIII, 96, 4, [*Spilogaster*] (1899).
- abdominalis* BOUCH. ? *ancilla* MUG.
- aqualis* MUG. ? *quadrum* FABR.
- affinis* MEADE, Entom. Monthly Mag., XXVII, 42, ? (1894) et Döser, Britanica, List Brit. Anth., I, 17, 9, (1897).
- albicornis* ROSD., Bull. Soc. entom. Ital., II, 323, 26, ? [*Spilogaster*] Italia, (1870) et Prodr., VI, 74, 2, ? [*Spilogaster*] (1877).
- albifrons* ROSD., Bull. Soc. entom. Ital., II, 325, 3, ? [*Limnophora*] Europa, (1870) et Prodr., VI, 107, 5, ? [*Limnophora*] (1877); MEADE, et m. g., Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV, 259, ? [*Limnophora*] (1887).
- albifrons* STROBL. (nec ROSD.) ? *protuberans* ZETT.
- allotalla* MUG., S. B., VI, 376, 215, ? [*Anthomyia*] (1830); ROSD., Eur. (1870) et Prodr., VI, 85, 18, ? [*Spilogaster*] (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 28, (1884) et XXV, 424, (1889); STRUX., Entom. Nachr., XIX, 218, 14, [*Spilogaster*] (1893); MEADE, Döser, List Brit. Anth., I, 15, 1, (1897); PASD., Revue Entom. France, XVII, 70, 8, [*Trichia*] (1898); *bisignata* ZETT., Dipt. Scand., XII, 4718, 24, 25, ? [*Azocera*] (1855); STRUX., Entom. Nachr., XV, 121, 5, [*Spilogaster*] (1889); *zordilicetratis* ZETT., Dipt. Scand., IV, 1116, 28, [*Trichia*] (1845); PASD., Revue Entom. France, XVIII, 107, 22, [*Spilogaster*] (1899).
- alpestris* ROSD., Bull. Soc. entom. Ital., II, 318, 8, ? [*Aspilota*] (1870) Italia, et Prodr., VI, 87, 16, ? [*Spilogaster*] (1877).
- altercata* PASD., Revue Entom. France, XVIII, 103, 17, ? [*Spilogaster*] Gallia, (1899).
- amabilis* MUG., S. B., V, 125, 75, ? [*Anthomyia*] (1826). Germania,
- analis* R-D., Mycol., 196, 2, [*Myiopa*] (1830). Gallia,
- anceps* ZETT., Fas. Lapp., 689, 123, [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Europa, Scand., IV, 1063, 28, [*Anthomyia*] (1845); WARK., Fas. Brit., II, Asia, (1832, 42, [*Anthomyia*] (1853); SCHN., F. A., I, 612, [*Spilogaster*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXV, 426, (1894); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 221, [*Spilogaster*] (1893); *caesia* MUG., Sult. à Bull., II, 296, 11, [*Spilogaster*] (1850); ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 110, 7, [*Spilogaster*] (1866) et Prodr., VI, 97, 28, [*Spilogaster*] (1877); STRUX., Entom. Nachr., XV, 120, 4, [*Spilogaster*] (1889); PASD., Revue Entom. France, XVII, 51, 5, [*Quadrula*] (1894); *depuncta* ZETT. (nec FABR.), Fas. Lapp., 689, 122, ? [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1066, 29, ? [*Anthomyia*] (1845); *modesta* MUG., S. B., V, 119, 63, ? [*Anthomyia*] (1826); *subpuncta* FABR., var. *f.* Musc., 89, 97, [*Musca*] (1825).
- ancilla* MUG., S. B., V, 100, 35, ? [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Dipt. Europa, Scand., VIII, 3278, 28, 29, ? [*Azocera*] (1849); PASD., Revue Entom. France, XVIII, 103, 17, ? [*Spilogaster*] (1899).

- Soc. entom. Ross., XXI, 29. [*Spilogaster*] (1887); STEIN, Entom. Nachr., XIX, 219, 16. [*Spilogaster*] (1893); PAND., Revue Entom. France, XVII, 68, 5. [*Aricia*] (1898).
- ?*abdominalis* BORCHÉ, Naturgesch. d. Ins., I, 83, 71. [*Anthomyia*] (1831).
- bicincta* VILL., Bull. Soc. entom. France, No. 7, 133. ? [*Spilogaster*] (1899).
- angelicæ* FALL. (nec SCOP.) p. p. = **urbana** MEG.
- angelicæ** PAND. (nec SCOP.), Revue Entom. France, XVII, 65, 27. Gallia.
[*Quadrula*] (1898).
- angulicornis** POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX, 555. [*Spilogaster*] (1889). Jugum Stel-
vianum.
- anicula** ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6213, 65-66. ? [*Aricia*] (1860); Lapponia.
STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 29. [*Spilogaster*] (1902).
- ariciōidea** R.-D., Myod., 493, 2. [*Helina*] (1830). Gallia.
binotata MACQ., Suit. à Buff., II, 295, 4. [*Spilogaster*] (1835).
bipunctata R.-D., Myod., 493, 3. [*Helina*] (1830).
- africanus** PAND., Revue Entom. France, XVIII, 105, 19. [*Spilogaster*] Gallia.
(1899).
- atrior** PAND., Revue Entom. France, XVIII, 106, 20. [*Spilogaster*] Gallia.
(1899).
- atripes** MEADE, Entom. Monthly Mag., XXV, 425. ? [*Spilogaster*] Europacentr.
(1889) et Descr. List Brit. Anth., I, 19, 3. [*Spilogaster*] (1897). et sept.
duplicis STEIN (nec ZETT.), Entom. Nachr., XV, 122, 6. [*Spilogaster*] (1889); PAND., Revue Entom. France, XVII, 60, 17.
[*Quadrula*] (1898).
- bibax** WUOL., Ausser, zweifl. Ins., II, 431, 20. ? [*Anthomyia*] (1830). China.
bicincta VILL. = **ancilla** MEG.
- biguttata* R.-D. = **impuncta** FALL.
- binotata* MACQ. = **ariciōidea** R.-D.
- binotata** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1672, 38. [*Anthomyia*] (1845) et Europa sept.,
XIV, 6279, 38. [*Anthomyia*] (1860); STEIN, Entom. Nachr., XVIII, Asia min.,
331. (1892) et XIX, 221, 24. [*Spilogaster*] (1893).
impuncta ZETT. (nec FALL.) var. h., Ins. Lapp., 691, 133. [*Anthomyia*] (1838).
- bipunctata* R.-D. = **ariciōidea** R.-D.
- bisbinotata* R.-D. = **impuncta** FALL.
- bipectata* ZETT. = **aliofalla** MEG.
- borealis** ZETT., Ins. Lapp., 679, 80. ? [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Lapponia.
Scand., IV, 1478, 88. ? [*Aricia*] (1845); STEIN, Entom. Nachr.,
XVIII, 325. (1892).
- caesia* MACQ. = **anceps** ZETT.
- caesia* BLZZI (nec MACQ.) = **quadrum** FABR.
- calceata** RONDI, Atti Soc. Milano, IX, 115, 6. [*Spilogaster*] (1866) et Europacentr.,
Prod., VI, 96, 27. [*Spilogaster*] (1877); STEIN, Entom. Nachr., et mer.,
XV, 147, 1. [*Spilogaster*] (1889); PAND., Revue Entom. France,
XVII, 55, 7. [*Quadrula*] (1898).

- ?claripennis* R.-D., Myod., 197, 7. [*Mydina*] (1830).
?communis R.-D., Myod., 197, 6. [*Mydina*] (1830).
?limpōlipennis R.-D., Myod., 198, 8. [*Mydina*] (1830).
?campestris R.-D., Myod., 499, 14. [*Mydina*] (1830). Gallia.
?capucina ZETT., Dipt. Scand., VIII, 3283, 62—63. [*Aricia*] (1849). Suecia.
charcoarvensis SCHNABL. — **obscurata** MEIG.
ciiliatocosta ZETT., Dipt. Scand., IV, 1713, 19. [*Anthomyia*] (1845). Europa.
 MEADE, Entom. Monthly Mag., XX, 60. [*Caricea*] (1885) et Deser.
 List Brit. Anth., I, 21, 13. [*Spilogaster*] (1897); PASD., Revue
 Entom. France, XVII, 60, 18. [*Quadrala*] (1898).
paraholina ROSS, Bull. Soc. entom. Ital., II, 334, 5. [*Caricea*]
 (1870) et Prodr., VI, 276, 6. [*Caricea*] (1877).
tigrina MEIG. (nec FABR.), S. B., V, 242, 2. [*Coccosia*] (1826).
cineraria ZETT., Dipt. Scand., IV, 1677, 14. [*Anthomyia*] (1845). Norvegia.
cinerascens R.-D., Myod., 499, 12. [*Mydina*] (1830). Gallia.
clara MEIG., S. B., V, 121, 68. [*Anthomyia*] (1826); SCHN., F. A.,
 I, 610. [*Spilogaster*] (1862); ROSS, Atti Soc. Milano, IX, 113, 2.
 [*Spilogaster*] (1866) et Prodr., VI, 76, 4. [*Spilogaster*] (1877);
 PASD., Revue entom. France, XVII, 62, 21. [*Quadrala*] (1898).
germanica R.-D., Myod., 192, 8. [*Roberla*] (1830).
quinqueoculata MEIG., Suit. à Buis., II, 291, 2. [*Spilogaster*]
 (1835).
claripennis R.-D. [*Aricia*] — **impuncta** FALL.
claripennis R.-D. [*Helina*] — **?pubescens** STEIN.
claripennis R.-D. [*Mydina*] — **?calceata** ROSS.
collina WALK., Ins. Brit., II, 132, 44. [*Anthomyia*] (1833). Britannia.
communis MEADE (nec R.-D.) — **duplicata** MEIG.
communis R.-D. — **?calceata** ROSS.
concolor CZERNY, Wien. entom. Zeitzg., XIX, 180, 1. [*Spilogaster*]
 (1900) et XX, 14, 37. [*Spilogaster*] (1901). Europa centr.
confinis MEIG., S. B., V, 123, 70. [*Anthomyia*] (1826). Patris?
congestata ZETT. — **spinicoستا** ZETT.
coniformis STEIN, Mitt. Zool. Mus. Berlin, II, 101, 113. [*Spilogaster*]
 (1903). Africa sept.
consimilis FALL., M. sc., 8, 110. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B.,
 V, 201, 209. [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 690, 129.
 [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1639, 35. [*Anthomyia*]
 (1845); SCHN., F. A., I, 623. [*Limnophora*] (1862); MEADE, Entom.
 Monthly Mag., XVIII, 65. [*Spilogaster*] (1874); STEIN, Entom.
 Nachr., XVIII, 331. (1892); MEADE, Deser. List Brit. Anth., I,
 22, 14. [*Spilogaster*] (1897); PASD., Revue Entom. France, XVIII,
 99, 9. [*Spilogaster*] (1899).
consimilis ZETT. (nec FALL.) p. p. — **protuberans** ZETT.
consors ZETT., Dipt. Scand., IV, 1671, 10. [*Anthomyia*] (1845) et
 VIII, 3300, 40. [*Anthomyia*] (1849).
corollata FABR. — **?quadrimaculata** FALL.
corollata PASD., Revue Entom. France, XVII, 61, 20. [*Quadrala*] (1898). Germania

- calharnata* ROND. **obscuripes** ZETT.
- divites* WALK. **separata** MEIG.
- decedens** WALK., Ins. Brit., II, 121, 9. [*Anthomyia*] (1853). Britannia.
- demigrans* ZETT. **depuncta** FALL.
- denudata** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1683, 51. ? [*Anthomyia*] (1845). Suecia.
- depulsa** WALK., Ins. Brit., II, 131, 39. [*Anthomyia*] (1853). Britannia.
- depuncta** FALL., Musc., 80, 98. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V, 194, 194. [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 689, 122. ? [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1661, 29. ? [*Anthomyia*] (1845); WALK., Ins. Brit., II, 127, 26. [*Anthomyia*] (1853); SCHIX., F. A., I, 612. [*Spilogaster*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 65. [*Spilogaster*] (1881) et Descr. List Brit. Anth., I, 21, 10. [*Spilogaster*] (1897).
- demigrans* ZETT., Dipt. Scand., IV, 1699, 70. ? [*Anthomyia*] (1845); SCHIX., F. A., I, 610. [*Spilogaster*] (1862); STREX, Entom. Nachr., XIX, 222, 30. [*Spilogaster*] (1893); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 82, 27. [*Aricia*] (1899).
- farillacea* MEIG., S. B., V, 123, 72. ? [*Anthomyia*] (1826).
- injasta* ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6272, 1; 44. ? [*Anthomyia*] (1860).
- modesta* MEIG., S. B., V, 119, 63. ? [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suët. à Buff., II, 293, 32. [*Aricia*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1699, 71. [*Anthomyia*] (1845).
- tetrastigma* MEIG., S. B., V, 120, 66. ? [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suët. à Buff., II, 296, 8. ? [*Spilogaster*] (1835); WALK., Ins. Brit., II, 130, 34. [*Anthomyia*] (1853); SCHIX., F. A., I, 610. [*Spilogaster*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV, 181. [*Spilogaster*] (1887) et Descr. List Brit. Anth., I, 21, 11. [*Spilogaster*] (1897).
- depuncta* FALL. var. ♂ **punctiventris** ZETT.
- depuncta** ROND. (nec FALL.), Atti Soc. Milano, IX, 114, 5. [*Spilogaster*] (1866) et Prodr., VI, 80, 8. [*Spilogaster*] (1877); PAND., Revue Entom. France, XVII, 61, 24. [*Quadrala*] (1899).
- ? *fulvicornis* R.-D., Myod., 496, 1. ? [*Mydina*] (1830); MACQ., Suët. à Buff., II, 295, 6. + [*Spilogaster*] (1835).
- depuncta* ZETT. (nec FALL.) p. p. = **anceps** ZETT.
- deserta** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1682, 50. ? [*Anthomyia*] (1845). Suecia.
- detracta** WALK., Ins. Brit., II, 122, 10. [*Anthomyia*] (1853). Britannia.
- detrita** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1700, 73. ? [*Anthomyia*] (1845). Suecia.
- deciarformis* MEIG. **montana** ROND.
- didyma** MEIG., S. B., VII, 315, 27. ? [*Hylemyia*] (1838); STREX, Entom. Nachr., XXVI, 152. (1900). Germania.
- dispar* R.-D. **quadrum** FABE.
- dispar* SCHIX. (nec FALL.) **nivalis** ROND.
- dispar* WALK. (nec FALL.) **duplicata** MEIG.
- doubleti** PAND., Revue Entom. France, XVII, 69, 7. ? [*Aricia*] (1898). Gallia.

- duplicaris* STEIN (nec Zett.) = *atripes* MIDD.
- duplaris** Zett., Dipt. Scand., IV, 1411, 24, [*Tricomy*] (1859) et XIV, 6203, 24, [*Arctia*] (1869); MIDD., Entom. Monthly Mag., XVIII, 63, [*Spilogaster*] (1881), H. sör. IV, 249, = [*Spilogaster*] (1893) et Deser. List Brit. Anih., I, 20, 5, [*Spilogaster*] (1897).
- duplicata** MIDD., S. B., V, 32, 17, [*Anthomyia*] (1826); MIDD., Suit. à Buff., II, 296, 9, [*Spilogaster*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 667, 26, [*Anthomyia*] (1858) et Dipt. Scand., IV, 1410, 23, [*Arctia*] (1859) et XIV, 6202, 23, [*Arctia*] (1869); SEMM., F. A., I, 607, [*Spilogaster*] (1862); RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 117, 13, [*Spilogaster*] (1866) et Prodr., VI, 191, 34, [*Spilogaster*] (1877); MIDD., Entom. Monthly Mag., XVIII, 63, [*Spilogaster*] (1881); SERRIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 221, [*Spilogaster*] (1893); STILIX., Entom. Nachr., XV, 149, 3, [*Spilogaster*] (1889); MIDD., Deser. List Brit. Anih., I, 19, 4, [*Spilogaster*] (1897); PASD., Revue Entom. France, XVII, 55, 8, [*quadralis*] (1898).
- emmanis* MIDD. (nec R.-D.), Entom. Monthly Mag., XVIII, 64, [*Spilogaster*] (1881) et Deser. List Brit. Anih., I, 20, 6, [*Spilogaster*] (1897).
- dispar* WALK., G. F. ALL., Ins. Brit., II, 123, 16, [*Anthomyia*] (1853).
- diligiosa* R.-D., Myol., 498, 11, = [*Mydax*] (1804).
- limpida* WALK., Ins. Brit., II, 1, 2, 43, = [*Anthomyia*] (1853).
- nigripes* R.-D., Myol., 488, 9, [*Mydax*] (1800).
- opulenta* R.-D., Myol., 500, 15, [*Mydax*] (1800).
- quadralis* F. ALL. (nec F. ALL.), Muse., 80, 99, [*Musca*] (1825).
- serialis* R.-D., Myol., 498, 10, = [*Mydax*] (1800).
- effecta** WALK., Ins. Brit., II, 127, 25, [*Anthomyia*] (1853). Britannia.
- elata* ZETT. = *urbana* MIDD.
- euphonioides* R.-D. = *pertusa* MIDD.
- exal* ZETT. = *protuberans* ZETT.
- extrema** WALK., Ins. Brit., II, 129, 33, [*Anthomyia*] (1853). Britannia.
- farillata* ZETT. = *depuicta* F. ALL.
- fixa** WALK., Ins. Brit., II, 121, 8, [*Anthomyia*] (1853). Britannia.
- flagripes** RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 111, 1, [*Spilogaster*] (1866) et Prodr., VI, 79, 7, [*Spilogaster*] (1876); MIDD., Entom. Monthly Mag., XVIII, 65, = [*Spilogaster*] (1881) et Deser. List Brit. Anih., I, 21, 12, [*Spilogaster*] (1897); PASD., Revue Entom. France, XVII, 61, 25, [*quadralis*] (1898). Europa.
- flavescens** GRAY., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV, 681, [*Hyalomyia*] (1812). Livonia.
- flavogrisea** ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6275, 24, 24, = [*Anthomyia*] (1860); SEMM., Wiss. entom. Z. (Zett.), XXI, 49, 18, = [*Arctia*] (1902) = *spontanea* STEIN (nec ZETT.), Entom. Nachr., XI, 371, 6, [*Spilogaster*] (1874).
- flava* R.-D. = *urbana* MIDD.

- ?*floricola* R.-D., Myod., 479, 1. (1870); Macq., Suit. à Buff., II, 291, 22. [*Arctia*] (1835).
pellucida R.-D., Myod., 479, 2. (1870).
- fratercula* ZETT., Dipt., Scand., IV, 1672, 37. [*Anthomyza*] (1845); SCHOEN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 225. [*Linnophora*] (1893); STEIN., Entom. Nachr., XVIII, 331. (1892) et XIX, 220, 19. [*Spilogaster*] (1893).
sarotala SCHOEN. (nec ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 226. . [*Linnophora*] (1893).
spanijimorata MEADE, Entom. Monthly Mag., XXV, 426. . [*Spilogaster*] (1889) et Deser. List Brit. Anth., I, 22, 17. [*Spilogaster*] (1897).
var. ciliaris SCHOEN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 225. [*Linnophora*] (1893).
- fratercula* MEADE (nec ZETT.), Entom. Monthly Mag., XXV, 425. . Britannia. [*Spilogaster*] (1879).
- fuliginosa* R.-D. *duplicata* MEAD.
- fabriciana* R.-D. ?*depuncta* ROSE (nec FALL.)
- germana* R.-D. *clara* MEAD.
- hilarata* ROSE. *pertusa* MEAD.
- honesta* MEAD., S. B., V, 123, 71. . [*Anthomyza*] (1826). Patria?
- humeralis* ZETT., Dipt., Scand., XIV, 6284, 68—69. . [*Anthomyza*] (1860). Europa sept.
- humeralis* R.-D. ?*tineta* ZETT.
- ignobilis* ZETT., Dipt., Scand., IV, 1647, 43. . [*Anthomyza*] (1845); STEIN., Wien. entom. Zeitg., XXI, 48. [*Spilogaster*] (1902). Suecia.
- impulsa* WALK. ?*quadrum* FARR.
- impuncta* FALL., Musc., 79, 26. [*Musca*] (1825); MEAD., S. B., V, 118, 61. [*Anthomyza*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 691, 133. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt., Scand., IV, 1698, 69. [*Anthomyza*] (1845); WALK., Ins. Brit., II, 129, 52. [*Anthomyza*] (1853); ZETT., Dipt., Scand., XIV, 6285, 69. [*Anthomyza*] (1860); SCHN., F. A., I, 611. [*Spilogaster*] (1892); STEIN., Entom. Nachr., XIX, 223, 75. [*Spilogaster*] (1893); MEADE, Deser. List Brit. Anth., I, 17, 10. (1897).
- hyphala* R.-D., Myod., 488, 5. . [*Arctia*] (1830).
- ?*hishianata* R.-D., Myod., 489, 7. [*Arctia*] (1830).
- claytonensis* R.-D., Myod., 488, 3. [*Arctia*] (1830).
- impunctata* R.-D., Myod., 487, 1. . [*Arctia*] (1830); Macq., Suit. à Buff., II, 293, 31. [*Arctia*] (1835); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 83, 29. [*Arctia*] (1899).
- injusta* ZETT., var. b. Dipt., Scand., XIV, 6272, 13—14. . [*Anthomyza*] (1860).
- laticipes* R.-D., Myod., 488, 4. [*Arctia*] (1830).
- ?*quarta-impunctata* R.-D., Myod., 489, 8. [*Arctia*] (1830).
- castica* R.-D., Myod., 487, 2. [*Arctia*] (1830).
- impuncta* ZETT., var. b. *binotata* FALL.
- impunctata* ZETT. [*Arctia*] --- *impuncta* FALL.

- impunctata** R.-D., *Myod.*, 496. 3. [*Mydina*] (1830). Gallia.
- ?**inconfessa** WALK., *Ins. Brit.*, II. 134. 48. [*Anthomyia*] (1853). Britannia.
- inconspicua** MEIG., *S. B.*, VII. 322. 71. ♀ [*Hylenyia*] (1838). Bavaria.
- incurrata** BOUCHÉ = ?**meditabunda** FABR.
- indistincta** RONDI., *Atti Soc. Milano*, IX. 119. 17. [*Spilogaster*] (1860) Italia.
et *Prodr.*, VI. 83. 12. [*Spilogaster*] (1877).
- infiwa** WALK. = ?**duplicata** MEIG.
- injusta** ZETT. = **depuncta** FALL.
- injusta** ZETT. *var. b.* = **impuncta** FALL.
- ?**innoxia** MEIG., *S. B.*, VII. 322. 58. ♂ [*Hylenyia*] (1838). Germania.
- interfusa** PAND., *Revue Entom. France*, XVIII. 100. 11. [*Spilogaster*] (1899). Gallia.
- intermedia** VILL., *Bull. Soc. entom. France*, No. 7. 134. [*Spilogaster*] (1899). Gallia.
- ?**inuncta** ZETT., *Ins. Lapp.*, 672. 48. ♀ [*Anthomyza*] (1838) et *Dipt. Scand.*, IV. 1440. 50. ♀ [*Aricia*] (1845). Scandinavia.
- ?**lacteipalpis** ZETT., *Dipt. Scand.*, VIII. 3304. 16—17. ♀ [*Anthomyza*] (1849). Scandinavia.
- lactifica** R.-D. = **lucorum** FALL.
- lasiophthalma** MACQ., *Suit. à Buff.*, II. 297. 13. ♂ [*Spilogaster*] (1835); MEIG., *S. B.*, VII. 314. 13. ♂ [*Aricia*] (1838); RONDI., *Atti Soc. Milano*, IX. 101. 13. [*Yctodesia*] (1866) et *Prodr.*, V. 126. 13. ♂ [*Yctodesia*] (1877); SCHNABL, *Hof. Soc. entom. Ross.*, XX. 325. 3. ♂ [*Aricia*] (1886) et XXII. 450. 3. [*Aricia*] (1888); STROBL, *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XLIII. 217. [*Aricia*] (1893); MEADE, *Descr. List Brit. Anth.*, I. 13. 31. [*Hyctodesia*] (1897); PAND., *Revue Entom. France*, XVIII. 101. 12. [*Spilogaster*] (1899).
- lateritia** RONDI., *Atti Soc. Milano*, IX. 107. 25. [*Yctodesia*] (1866) et *Prodr.*, VI. 124. 9. [*Yctodesia*] (1877). Italia.
- laxifrons** ZETT., *Dipt. Scand.*, XIV. 6200. 16—17. ♀ [*Aricia*] (1860); STEIN, *Wien. entom. Zeitg.*, XXI. 33. [*Spilogaster*] (1902). Lapponia.
- lenticeps** THOMS., *Eugenies Resa*, *Dipt.*, 553. 190. ♀ [*Anthomyia*] (1868). China.
- ?**limbinervis** MACQ. in Lucas, *Hist. nat. des anim. art. de l'Algérie*, III. 490. 233. [*Hydrophoria*] (1849). Algeria.
- limpidipennis** R.-D. = ?**calceata** RONDI.
- Linnigii** GIMM., *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, VII. 114. [*Anthomyia*] (1834). Livonia.
- litorea** MEIG. (*nec* FALL.) = **protuberans** ZETT.
- ?**longicornis** ZETT., *Ins. Lapp.*, 678. 74. [*Anthomyza*] (1838) et *Dipt. Scand.*, IV. 1572. 187. [*Aricia*] (1845). Scandinavia.
- longitarsis** MEADE, *Descr. List Brit. Anth.*, I. 17. 8. ♂ (1897). Britannia.
- lucana** RONDI. **pagana** FABR.
- lucorum** FALL., *Musc.*, 55. 40. [*Musca*] (1823); MEIG., *S. B.*, V. 85. 4. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., *Suit. à Buff.*, II. 286. 3. [*Aricia*] (1835); ZETT., *Ins. Lapp.*, 662. 1. [*Anthomyza*] (1838) et *Dipt. Scand.*, IV. 1391. 1. [*Aricia*] (1845); WALK., *Ins. Brit.*, II. 122

- II. [*Anthomyia*] (1853); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6196. 4. [*Arícia*] (1860); SCHIX., F. A., I. 600. [*Arícia*] (1862); RONDI., Atti Soc. Milano, IX. 98. 4. [*Yctodesia*] (1866) et Prodr., VI. 143. 34. [*Yctodesia*] (1877); SCHNABL., Hor. Soc. entom. Ross., XX. 313. I. [*Arícia*] (1886) et XXII. 447. I. [*Arícia*] (1888); MEADE, Deser. List Brit. Anth., I. 6. 2. [*Hgetodesia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVII. 52. 2. [*Quadrela*] (1898); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXII. 273. 1. [*Spilogaster*] (1903).
lactifica R.-D., Myod., 500. 16. [*Mydina*] (1830).
obscurataeformis SCHNABL., Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 383. 35. c) [*Arícia*] (1888).
pylone WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 928. ♀ [*Anthomyia*] (1849).
solita WALK., Ins. Saund., 354. ♂ [*Anthomyia*] (1856).
var. soror R.-D., Myod., 501. 18. [*Mydina*] (1830).
- ludibunda* R.-D. = ?*meditabunda* FABR.
luteipes R.-D. **impuncta** FALL.
- maculipennis** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1475. 85. [*Arícia*] (1845); Europa-centr.
 STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI. 37. [*Spilogaster*] (1902); CZERNY, et sept.
 Wien. entom. Zeitg., XX. 37. 12. [*Spilogaster*] (1901).
ruslica R.-D., Myod., 495. 7. ♀ [*Helina*] (1830).
- marmorata** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6197. 4—5. [*Arícia*] (1860); Europa-centr.
 STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXII. 277. 9. [*Spilogaster*] (1903). et sept.
- marmorata* SCHNABL. (nec ZETT.) = **multisetosa** STROBL.
- meditabunda** FABR., Spec. Ins., II. 444. 46. [*Musca*] (1781) et Mant. Europa,
 Ins., II. 347. 54. [*Musca*] (1787); ROSSI, Fauna Etr., II. 308. 1511. Africa sept.,
 [*Musca*] (1790); FABR., Entom. syst., IV. 322. 43. [*Musca*] (1794); Ins. Canar.,
 PANZ., Fauna germ., 44. 23. [*Musca*] (1797); FABR., Syst. Anth., Algeria,
 297. 68. [*Musca*] (1805); FALL., Musc., 50. 28. [*Musca*] (1823); Syria.
 MEIG., S. B., V. 79. 49. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 149. 10. [*Cartouneura*] (1833) et Suit. à Buff., II. 275. 2. [*Cartouneura*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 660. 26. [*Musca*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1357. II. [*Cyrtouneura*] (1845); WALK., Ins. Brit., II. 114. 20. [*Musca*] (1853); RONDI., Prodr., V. 219. I. [*Myospila*] (1862); SCHIX., F. A., I. 598. [*Myospila*] (1862).
 ?*incurrata* BOUCHÉ, Naturgesch. d. Ins., I. 168. 54. [*Musca*] (1834).
 ?*ludibunda* R.-D., Myod., 499. 13. [*Mydina*] (1830).
quadrisetosa THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 549. 181. [*Cyrtouneura*] (1868).
- memnonipes** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6280. 45—46. [*Anthomyia*] Succia.
 (1860); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI. 50. [*Spilogaster*] (1902).
- menechma** PAND., Revue Entom. France, XVII. 56. 9. [*Quadrela*] Europa-centr.
 (1898).
- meracula** PAND., Revue Entom. France, XVIII. 114. 33. ♀ [*Spilogaster*] Germania.
 (1899).
- modesta* MEIG. p. p. = **depuncta** ZETT.

- modesta* MEG. p. p. **anceps** ZETT.
- ? *mollis* R.-D., Myod., 502, 22. ♀ [*Mydina*] (1830). Gallia.
- montana* ROSS., Atti Soc. Milano, IX, 124, 21. ♀ [*Spilogaster*] (1866) et Prodr., VI, 75, 3. ♀ [*Spilogaster*] (1877); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 89, 41. ♀ [*Aricia*] (1899).
deviæformis MIK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII, 418. [*Spilogaster*] (1867). Europa centr.
- multisetosa** STROBL., Mith. Ver. Steierm., 238. ♀ [*Aricia*] (1897); STREX, Wien. entom. Zeitg., XXII, 276, 8. [*Spilogaster*] (1903). Europa centr.
- intrinocata* SCHNABL. (nec ZETT.), Hor. Soc. entom. Ross., XX, 390, 25. [*Aricia*] (1886) et XXII, 496, 25. [*Aricia*] (1888); MEADE, Deser. List Brit. Anth., I, 7, 5. [*Hyetodesia*] (1897). Europa centr.
- musca* R.-D. = ? *urbana* MEG.
- nebulosa** STREX, Entom. Nachr., XIX, 219, 15. [*Spilogaster*] (1893); PAND., Revue Entom. France, XVII, 69, 6. [*Aricia*] (1898). Europa centr.
- nenorana* ROSS. = **fineta** ZETT.
- nigricans** R.-D., Myod., 497, 5. ♀ [*Mydina*] (1830). Gallia.
- nigripennis** SCHNABL., Hor. Soc. entom. Ross., XXII, 378, 4. ♀ [*Aricia*] (1888); STREX, Wien. entom. Zeitg., XXII, 273. [*Spilogaster*] (1903). Europa centr. et sept.
- ? *Sahlbergi* ZETT., Ins. Lapp., 661, 13. ♀ [*Anthomyia*] (1838).
Zobsearata ZETT., var. h., Dipt. Scand., 1394, 8. [*Aricia*] (1815). Europa centr.
- nigrripes* R.-D. [*Helina*] **obscuripes** ZETT.
- nigrripes* R.-D. [*Mydina*] = **duplicata** MEG.
- ? **nitens** R.-D., Myod., 500, 17. [*Mydina*] (1830). Gallia.
- nivalis** ROSS., Atti Soc. Milano, IX, 98, 5. ♀ [*Yctodesia*] (1866) et Prodr., VI, 143, 35. ♀ [*Yctodesia*] (1877); PAND., Revue Entom. France, XVII, 59, 15. [*quadrala*] (1899); STREX, Wien. entom. Zeitg., XXII, 274, 1. [*Spilogaster*] (1903). Europa centr.
- dispar* SCHN. (nec FALL.) F. A., I, 600. [*Aricia*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 3. ♀ [*Hyetodesia*] (1884); SCHNABL., Hor. Soc. entom. Ross., XX, 354, 13. ♀ [*Aricia*] (1886); MEADE, Deser. List Brit. Anth., I, 7, 6. [*Hyetodesia*] (1897). Europa centr.
- uralis* ZETT., Ins. Lapp., 663, 8. [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1393, 7. [*Aricia*] (1815). Europa centr.
- uralis* ZETT. = ? **nivalis** ROSS.
- nubianus** BIG., Ann. Soc. entom. France, sér. 6, V, 288, 6. ♀ [*Spilogaster*] (1885). Nubia.
- obscura** MACQ., Suit. 5 Buff., II, 302, 20. [*Hydrophoria*] (1835). Gallia.
- obscura** STREX, Berlin. entom. Zeitschr., XLII, 197, 1. ♀ [*Spilogaster*] (1897); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XX, 13, 29. [*Spilogaster*] (1901). Europa centr.
- obscurata** MEG., S. B., V, 89, 12. ♀ [*Anthomyia*] (1825); ZETT., Ins. Lapp., 661, 12. ♀ [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1394, 8. [*Aricia*] (1815); WALK., Ins. Brit., II, 123, 15. [*Anthomyia*] (1833); ZETT., Dipt. Scand., XIV, 619, 3. [*Esocid*] (1860). Europa centr. et sept.

SCHIX., F. A., I. 600. [*Aricia*] (1862); SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 345. 10. [*Aricia*] (1886) et XXII. 458. 10. [*Aricia*] (1888); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 215. [*Aricia*] (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I. 6. 3. [*Hyctodesia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVII. 53. 3. [*Quadrala*] (1898); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXII. 273. 2. [*Spilogaster*] (1903).

charcoriensis SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XXII. 391. 37.
? [*Aricia*] (1888).

obscurata ZETT. var. b. = ?**nigripennis** SCHNABL.

obscurataeformis SCHNABL. = **lucorum** FALL.

obscuratidea PAND. = **obscuratoides** SCHNABL.

obscuratoides SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XX. 347. 11. ? Europa-centr.
[*Aricia*] (1886) et XXII. 459. 11. ? [*Aricia*] (1888); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXII. 274. 3. [*Spilogaster*] (1903).

obscuratidea PAND., Revue Entom. France, XVII. 59. 16. [*Quadrala*] (1898).

obscuripes PAND. (nec ZETT.), Revue Entom. France, XVIII. 122. 9. Gallia.
[*Limnophora*] (1899).

obscuripes ZETT., Dipt. Scand., IV. 1678. 45. ♀ [*Anthomyza*] (1845). Europa.
colturnata RONDI, Atti Soc. Milano, IX. 116. 8. ? [*Spilogaster*] (1866) et Prodr., VI. 95. 26. [*Spilogaster*] (1877); STEIN, Entom. Nachr., XIX. 220. 18. [*Spilogaster*] (1893); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 102. 13. ♀ [*Spilogaster*] (1899).
nigripes R.-D., Myod., 494. 5. ♀ [*Helina*] (1830).

obtusipennis FALL., Musc., 57. 46. [*Musca*] (1823); MEIG., S. B., V. Europa.
193. 192. [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 666. 20. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1425. 35. [*Aricia*] (1845); PAND., Revue Entom. France, XVII. 61. 19. [*Quadrala*] (1898); HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XXI. 144. 19. [*Enoplopteric*] (1902).

olivacea ZETT., Dipt. Scand., IV. 1701. 74. ♀ [*Anthomyza*] (1845). Suecia.

orichalcea ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3285. 97-98. [*Aricia*] (1849); Scandinavia
STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI. 39. [*Spilogaster*] (1902).

subfusciverris ZETT. var. b., Dipt. Scand., IV. 1189. 97. ? [*Aricia*] (1845).

orthoneura MACQ. = ?**urbana** MEIG.

pagana FABL., Entom. syst., IV. 326. 61. [*Musca*] (1794) et Syst. Europa.
Anth., 288. 23. [*Musca*] (1805); FALL., Musc., 79. 95. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V. 116. 58. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 290. 21. [*Aricia*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 691. 132. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1696. 68. [*Anthomyza*] (1845); WALK., Ins. Brit., II. 128. 28. [*Anthomyia*] (1853); SCHIX., F. A., I. 611. [*Spilogaster*] (1862); RONDI, Atti Soc. Milano, IX. 120. 19. [*Spilogaster*] (1866) et Prodr., VI. 82. 11. [*Spilogaster*] (1877); STEIN, Entom. Nachr., XIX. 223. 32. [*Spilogaster*] (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I. 16. 5. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 86. 36. [*Aricia*] (1899).

- lucana* Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II, 323, 21. ♀ [*Spilogaster*] (1870).
- scutellaris* R.-D., Myod., 480, 5. ♀ (1830).
- palposa** CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XX, 43, 33. ♀ [*Spilogaster*] Austria. (1901).
- paradoxalis** STEIN, Mittl. Zool. Mus. Berlin, II, 102, 141. [*Spilogaster*] Aegyptus. (1903).
- parulina* Rond., **ciliatocosta** ZETT.
- pellucida* R.-D., **floricola** R.-D.
- pellucida* R.-D. [*Mydina*] ? **duplicata** MEIG.
- pendula** PAND., Revue Entom. France, XVII, 57, 42. ♀ [*Quadrata*] Gallia. (1898).
- ?**perexigua** PAND., Revue Entom. France, XVIII, 88, 40. ♀ [*Aricia*] Gallia. (1899).
- pertusa** MEIG., S. B., V, 149, 64. ♀ [*Anthomyia*] (1826); Macq., Europa. Suit. à Buff., II, 291, 3. ♀ [*Spilogaster*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1671, 36. [*Anthomyia*] (1845); SCHN., F. A., I, 623. [*Limnophora*] (1862); STEIN, Entom. Nachr., XVIII, 331. (1892); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I, 22, 15. [*Spilogaster*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVII, 62, 23. [*Quadrata*] (1898). *caphenoides* R.-D., Myod., 493, 1. ♀ [*Helina*] (1830). *hithera* Rond., Atti Soc. Milano, IX, 113, 3. ♀ [*Spilogaster*] (1866) et Prodr., VI, 78, 6. [*Spilogaster*] (1877). *trigonotaculata* A. Ros., Württemb. Corbl., I, 59. ♀ [*Anthomyia*] (1810).
- pollinosa** SELIS, Entom. Nachr., XXVI, 308, 1. [*Spilogaster*] (1900). Croatia.
- propinqua* STORM **van der Wulpji** SCHNBL.
- prospinoso** PAND., Revue Entom. France, XVII, 56, 10. [*Quadrata*] Gallia. (1898).
- protuberans** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1675, 41. [*Anthomyia*] (1815); Europa centr. et sept. SCHN., F. A., I, 621. [*Limnophora*] (1862); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I, 22, 16. [*Spilogaster*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVII, 57, 1. [*Quadrata*] (1898). *albifrons* STROBL (nec Rond.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 226. [*Limnophora*] (1893). *consimilis* ZETT (nec FALL.), Ins. Lapp., 690, 129. ♀ [*Anthomyia*] (1838). *cesal* ZETT., Dipt. Scand., IV, 1716, 93. ♀ [*Anthomyia*] (1815); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV, 73. [*Caricca*] (1887); SELIS, Entom. Nachr., XIX, 221, 20. ♀ [*Spilogaster*] (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 71, 2. [*Caricca*] (1897). *blanca* MEIG. (nec FALL.), S. B., V, 90, 13. [*Anthomyia*] (1826). *equalis* (nec Schall.) AM SELIS, Jahresber. Ver. Graubünden, V, 98. ♀ [*Anthomyia*] (1860).
- pubescens** SELIS, Entom. Nachr., XIX, 222, 29. [*Spilogaster*] (1893). Europa centr. *zebrapennis* R.-D., Myod., 491, 1. ♀ [*Helina*] (1830).

- pubicheta** Rond., Bull. Soc. entom. Ital., II, 317, 7. [*Aspilidæ*] (1870) Italia.
et Prodr., VI, 91, 21. [*Spilogaster*] (1877).
- pubiseta** ZETT. — ? **separata** Meig.
- punctata** R.-D. = **uliginosa** Fall.
- punctiventris** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1710, 87. [*Anthomyia*] Europæentr.
(1845); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 82, 28. [*Aricia*] (1899). et sept.
depuncta Fall., var. ♂, Musc., 89, 98, p. p. [*Musca*] (1825).
- pylone** Walk. — **lucorum** Fall.
- quadrimaculata** Fall., Musc., 63, 61. [*Musca*] (1823); Meig., S. Europa.
B., V, 92, 16. [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 670, 39.
[*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1477, 87. [*Aricia*] (1845);
SCHIX., F. A., I, 622. [*Limnophora*] (1862); Rond., Atti Soc.
Milano, IX, 118, 14. [*Spilogaster*] (1866) et Prodr., VI, 97, 29.
[*Spilogaster*] (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 63.
[*Spilogaster*] (1881); STEIN, Entom. Nachr., XIX, 217, 10. [*Spilo-*
gaster] (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I, 19, 2. [*Spilo-*
gaster] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVII, 58, 13. [*Qua-*
drata] (1898).
? *cornuta* Fabr., Syst. Antl., 298, 71. [*Musca*] (1805).
- quadrinotata** Meig., S. B., V, 113, 53. [*Anthomyia*] (1826); Meig., Europa.
Suit. à Buff., II, 289, 13. [*Aricia*] (1835); ZETT., Dipt. Scand.,
IV, 1694, 66. [*Anthomyia*] (1845); SCHIX., F. A., I, 603. [*Aricia*]
(1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX, 102, 11. [*Yctodesia*] (1866).
SCHNABEL, Hor. Soc. entom. Ross., XX, 322, 2. [*Aricia*] (1886) et
XXII, 449, 2. [*Aricia*] (1888); MEADE, Descr. List Brit. Anth.,
I, 11, 23. [*Yctodesia*] (1897); PAND., Revue Entom. France,
XVII, 64, 28. [*Quadrata*] (1898); STEIN, Wien. entom. Zeitg.,
XXII, 275, 7. [*Spilogaster*] (1903).
quatuornotata Rond., Prodr., VI, 127, 14. [*Yctodesia*] (1877).
- quadrinotata** Brullé, Expéd. scient. d. Morée, III, 315, 691. Græcia.
[*Anthomyia*] (1832).
- quadriseclata** Thoms. — **meditabunda** Fabr.
- quadrum** Fabr., Syst. Antl., 297, 67. [*Musca*] (1805); Meig., S. B., Europa.
V, 93, 18. [*Anthomyia*] (1826); Macq., Suit. à Buff., II, 295, 7. Asia sept.,
[*Spilogaster*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 689, 121. [*Anthomyia*] Africa sept.
(1838) et Dipt. Scand., IV, 1661, 27. [*Anthomyia*] (1845); Walk.,
Ins. Brit., II, 130, 36. [*Anthomyia*] (1853); ZETT., Dipt. Scand.,
XIV, 6277, 27. [*Anthomyia*] (1860); SCHIX., F. A., I, 607. [*Spilo-*
gaster] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 64. [*Spilo-*
gaster] (1881); STEIN, Entom. Nachr., XV, 118, 2. [*Spilogaster*]
(1889); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 221. [*Spilo-*
gaster] (1893); MEADE, Desc. List Brit. Anth., I, 21, 9. [*Spilo-*
gaster] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVII, 54, 6. [*Qua-*
drata] (1898).
acqualis Meig., S. B., V, 99, 28. [*Anthomyia*] (1826).
cuesia Bezzi (nec Macq.), Bull. Soc. entom. Ital., XXIII, 58.
153. [*Spilogaster*] (1891).

- dispar* R.-D., Myod., 197, 4. [*Mydina*] (1830).
impulsa WALK., Ins. Brit., II. 130, 37. [*Anthomyia*] (1853).
separata SCHN. (nec MEIG.), F. A., I. 611. [*Spilogaster*] (1862).
subpuncta FALL., Muse., 80, 97. [*Musca*] (1825).
quadrum FALL. (nec FABR.) — **duplicata** MEIG.
quatuorrotata ROND. — **quadrinotata** MEIG.
quatuor punctata AM STEIN — ? **protuberans** ZETT.
quatuor punctata R.-D. — ? **impuncta** FALL.
quinquemaculata MACQ. = **clara** MEIG.
rapida R.-D. — ? **tincta** ZETT.
 repulsa WALK., Ins. Brit., II. 131, 38. [*Anthomyia*] (1853). Britannia.
 ? rufifrons BIG., Ann. Soc. entom. France, sér. 6, V. 270, 1. ? [*Limnophora*] (1885). Gallia.
 rufinervis POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX, 554, 17. [*Spilogaster*] (1889). JugumStelvi-
 anum.
 rupestris ROND., Atti Soc. Milano, IX, 89, 4, 2 p. p. [*Isptia*] (1866) Italia.
 et Prodr., VI, 89, 19, 2. [*Spilogaster*] (1877).
rupestris ROND., p. p. — **tirolensis** ROND.
rustica R.-D. [*Arctia*] — **impuncta** FALL.
rustica R.-D. [*Helina*] = **maculipennis** ZETT.
Sahlbergi ZETT. — ? **nigripennis** SCHNABL.
scutellaris R.-D. — **pagana** FABR.
 separata MEIG., S. B., V. 119, 62, 17. [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Europa centr.
 Dipt. Scand., VIII, 3318, 88-89. [*Anthomyia*] (1849) et XIV, et sept.
 6287, 88-89. [*Anthomyia*] (1860); MEADE, Entom. Monthly Mag.,
 XVIII, 28, (1881) et XXV, 424, (1889); STEIN, Entom. Nachr.,
 XIX, 221, 36. [*Spilogaster*] (1893); MEADE, Deser. List Brit.
 Auth., I, 17, 11, (1897); PASD., Revue Entom. France, XVIII,
 100, 10. [*Spilogaster*] (1899).
daicles WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 959. [*Anthomyia*]
 (1849).
? pubiscla ZETT., Dipt. Scand., IV, 1711, 88, 17. [*Anthomyia*]
 (1845).
separata SCHN. (nec MEIG.) = **quadrum** FABR.
 setigera POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII, 407, 17. [*Caricca*] Teriolis.
 (1887).
solita WALK. = **lucorum** FALL.
sordidiventris ZETT. — ? **allotalla** MEIG.
sororia STROBL (nec ZETT.) — **fratercula** ZETT.
 sororia ZETT., Dipt. Scand., IV, 1673, 39, 17. [*Anthomyia*] (1845); Europa centr.
 STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 55. [*Spilogaster*] (1902). et sept.
spinivosta STEIN (nec ZETT.) — **flavogrisea** ZETT.
 spinivosta ZETT., Dipt. Scand., IV, 1611, 6, 17. [*Anthomyia*] (1845). Lapponia.
 STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 53. [*Spilogaster*] (1902).
congeulata ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6266, 8-9. [*Anthomyia*]
 (1860).
spinifemorata MEADE — **fratercula** ZETT.

- ?**strenua** MEIG., S. B., V. 120. 65. ♀ [*Anthomyia*] (1826). Germania.
subfuscivirens ZETT. var. *b.* — **orichalcea** ZETT.
subpuncta FALL. — **quadrum** FABR.
subpuncta FALL. var. *β* — **anceps** ZETT.
- ?**subsecuta** WALK., Ins. Brit., II. 133. 46. [*Anthomyia*] (1853). Britannia.
 ?**subtesselata** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1648. 14. ♀ [*Anthomyza*] (1845). Suecia.
supera WALK., Ins. Brit., II. 131. 40. [*Anthomyia*] (1853). Britannia.
sylvana ROND., Bull. Soc. entom. ital., II. 322. 23. ♂ [*Aspilid*] (1870). Italia.
tetrastigma MEIG. = **depuncta** FALL.
tigrina MEIG. (nec FABR.) — **ciliatocosta** ZETT.
- tincta** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1644. 9. ♂ [*Anthomyza*] (1845); Europa.
 SCHN., F. A., I. 611. [*Spilogaster*] (1862); ROND., Prodr., VI. 81.
 9. ♂ [*Spilogaster*] (1877); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
 XI, III. 223. [*Spilogaster*] (1893); STEIS, Entom. Nachr., XIX.
 223. 31. [*Spilogaster*] (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I.
 16. 6. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 87. 37.
 [*Aricia*] (1899).
 ?*hameralis* R.-D., Myod., 481. 6. (1830).
nemorana ROND., Bull. Soc. entom. Ital., 323. 25. ♀ [*Spilo-*
gaster] (1870) et Prodr., VI. 82. 10. ♀ [*Spilogaster*] (1877).
 ?*rapida* R.-D., Myod., 480. 4. ♀ (1830); MACQ., Suit. à Buff.,
 II. 291. 23. ♀ [*Aricia*] (1835).
- tirolensis** ROND., Prodr., VI. 90. 20. ♀ [*Spilogaster*] (1877). Europa mer.
rapestris ROND., Atti Soc. Milano, IX. 89. 4. ♀ p. p. [*Aspilid*]
 (1866).
- trigononaculata* v. Ros. — **pertusa** MEIG.
- uliginosa** FALL., Musc., 81. 100. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V. Europa.
 121. 67. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 294. 1. Africa sept.
 [*Spilogaster*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1745. 128. [*Antho-*
myza] (1845); WALK., Ins. Brit., II. 125. 21. [*Anthomyia*] (1853);
 ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6295. 128. [*Anthomyza*] (1860); SCHN.,
 F. A., I. 609. [*Spilogaster*] (1862); ROND., Atti Soc. Milano, IX.
 112. 1. [*Spilogaster*] (1866) et Prodr., VI. 77. 5. [*Spilogaster*]
 (1877); STEIS, Entom. Nachr., XIX. 223. 33. [*Spilogaster*] (1893);
 MEADE, Descr. List Brit. Anth., I. 20. 8a [*Spilogaster*] (1897);
 PAND., Revue Entom. France, XVII. 62. 22. [*Quadrala*] (1898).
punctata R.-D., Myod., 492. 9. [*Rohrella*] (1830).
 var. **almeriensis** STROBL, Mem. R. Soc. Esp., III. 347. 770. Hispania.
 [*Spilogaster*] (1905).
 var. **flavicoxa** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6277. 28—29. ♀ [*An-*
thomyza] (1860); STEIS, Wien. entom. Zeitg., XXI. 46. (1902). Gottlandia.
- urbana** MEIG., S. B., V. 118. 60. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Europa.
 Buff., II. 292. 27. [*Aricia*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1651.
 17. [*Anthomyza*] (1845); WALK., Ins. Brit., II. 128. 29. [*Antho-*
myia] (1853); SCHN., F. A., I. 612. [*Spilogaster*] (1862); ROND.,
 Atti Soc. Milano, IX. 120. 90. [*Spilogaster*] (1866) et Prodr., VI.
 86. 15. [*Spilogaster*] (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII.

28. (1881); V. D. WULF, Tijdschr. v. Entom., XXVI, 116. [*Spilogaster*] (1883); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I, 16, 7. (1897).
 PAND., Revue Entom. France, XVIII, 87, 38. [*Aricia*] (1899).
angelicæ FALL. (nec SCOP.), Muse., 78, 91, p. p. [*Musca*] (1825) +
 ZETT., Ins. Lapp., 688, 120. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt.
 Scand., IV, 1643, 8. [*Anthomyza*] (1845); WALK., Ins. Brit.,
 II, 128, 30. [*Anthomyia*] (1853); SCHUS., F. A., I, 612. [*Spilo-*
gaster] (1862).
electa ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6274, 12-13. ♀ [*Anthomyza*]
 (1860); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 222.
 [*Spilogaster*] (1893).
eflorea R.-D., Myod., 477, 2. ♀ [*Fellaca*] (1830).
musca R.-D., Myod., 481, 7. (1830).
orthoneura MACQ., Suit. à Buff., II, 292, 28. [*Aricia*] (1835).
ustipennis RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 121, 22. ♀ [*Spilogaster*] Italia.
 (1866) et Prodr., VI, 74, 1. ♀ [*Spilogaster*] (1877).
van der Wulp SCHNABL, Hor. Soc. entom. Ross., XX, 387, 36. ♂ Eurocentr.
 [*Aricia*] (1886) et XXII, 482, 36. [*Aricia*] (1888); STROBL, Verh. et sept.
 zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 215. [*Aricia*] (1893); PAND., Revue
 Entom. France, XVII, 53, 4. [*Quadrala*] (1898); STEIN, Wien.
 entom. Zeitg., XXII, 275, 6. [*Spilogaster*] (1903).
propinqua STORM, Norske Selsk. Sk., 239. ♂ [*Aricia*] (1895).
venosa RONDI., Prodr., VI, 98, 30. ♂ [*Spilogaster*] (1877). Italia.
vernalis R.-D. = **duplicata** MEIG.
vicina CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XIX, 181, 2. ♂ [*Spilogaster*] (1900). Austria.
vilis ZETT., Dipt. Scand., IV, 1669, 34. ♀ [*Anthomyza*] (1815). Suecia.
villositarsis PAND., Revue Entom. France, XVII, 58, 14. ♂ [*Quadrala* Gallia.
 (1898).
vittifera ZETT., Dipt. Scand., IV, 1700, 72. ♂ [*Anthomyza*] (1815). Suecia.
vomiturationis R.-D., Bull. Ann. Soc. entom. France, II, 7, XVIII. Gallia.
 (1849).
Wilhelmi SCHNABL (nom. mut. pro Zetterstedti), Hor. Soc. entom. Suecia.
 Ross., XX, 350, 12. [*Aricia*] (1886).
Zetterstedti BIDENK., Entom. Tidskr., XIII, 245, 5. ♂ [*Limnophora*] Scandinavia.
 (1892).

Hydrotaea

R.-D., Essai sur les Myod., 509, XIV. (1830).

Ovodontha R.-D., Prodr., I, 91, 2, p. p. (1856).

- albipuncta** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1581, 195. [*Aricia*] (1815). Eurocentr.
 STEIN, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII, 315, 11. (1903); GRIMSHAW, et sept.
 Entom. Monthly Mag., ser. 2, XVII, 9, 9. (1906).
fusciculata MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 125. ♂ (1884)
 et Descr. List Brit. Anth., I, 27, 43. ♂ (1897).
amocia Lw. = **tuberculata** RONDI.
angulata STEIN = **pellucens** PORTSCH.

- arnipes** FALL., *Musc.*, 75. 86. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V. 138. 98. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., *Suit. à Buff.*, II. 305. 8. (1835); ZETT., *Dipt. Scand.*, IV. 1434. 44. [*Aricia*] (1845); SCHIX., F. A., I. 616. (1862); ROND., *Atti Soc. Milano*, IX. 80. 5. (1866) et *Prodr.*, VI. 23. 5. (1877); MEADE, *Entom. Monthly Mag.*, XVIII. 124. (1882); STEIN, *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XLIII. 236. ♂ (1893); MEADE, *Descr. List Brit. Anth.*, I. 27. 12. (1897); PAND., *Revue entom. France*, XVIII. 170. 8. (1899); STEIN, *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, LIII. 311. 10. (1903); GRIMSHAW, *Entom. Monthly Mag.*, ser. 2. XVII. 8. 8. (1906).
flavosa MACQ., *Suit. à Buff.*, II. 307. 17. ♂ (1835); MEIG., S. B., VII. 325. 19. ♂ (1838).
- atrata* R.-D. **velutina** R.-D.
- Bezzii** STEIN, *Entom. Nachr.*, XXV. 24. 6. (1899); PAND., *Revue Entom. France*, XVIII. 164. 1. (1899); STEIN, *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, LIII. 304. 4. (1903).
 ?*hirticeps* FALL., *Musc.*, 67. 69. ♀ [*Musca*] (1824); MEIG., S. B., V. 197. 209. ♀ [*Anthomyia*] (1826); ZETT., *Ins. Lapp.*, 679. 77. ♀ [*Anthomyza*] (1838) et *Dipt. Scand.*, IV. 1524. 135. ♀ [*Aricia*] (1845).
- bilens* MEIG. **irritans** FALL.
- bimaculata* MEIG. **ciliata** FABR.
- bispinosa* PAND. (*nee* ZETT.) **tuberculata** ROND.
- bispinosa** ZETT., *Dipt. Scand.*, IV. 1428. 38. ♂ [*Aricia*] (1845); SCHIX., F. A., I. 615. ♂ (1862); LUNDE, *Vid. Medd.*, 309. 108. (1898); STEIN, *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, LIII. 311. 8. (1903).
- blanda* MEIG. **palaestrica** MEIG.
- borussica** STEIN, *Entom. Nachr.*, XXV. 23. 5. ♂ (1899); PAND., *Revue Entom. France*, XVIII. 174. 16. ♂ (1899); STEIN, *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, LIII. 334. 23. ♂ (1893).
carripes PORTSCH. (*nee* FALL.), *Hor. Soc. entom. Ross.*, XV. 158. 4. ♂ (1880).
- brevipennis* Lw. **velutina** R.-D.
- brunipennis* MACQ. **dentipes** FABR.
- ciliata** FABR., *Entom. syst.*, IV. 333. 87. [*Musca*] (1794) et *Syst. Antl.*, 305. 109. [*Musca*] (1805); MEIG., S. B., V. 159. 131. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., *Suit. à Buff.*, II. 306. 15. (1835); WALK., *Ins. Brit.*, II. 140. 66. [*Anthomyia*] (1853); SCHIX., F. A., I. 614. (1862); CRER., *Brit. Entom.*, Ed. II. 768. (1862); ROND., *Prodr.*, VI. 29. 2. [*Onodontha*] (1877); MEADE, *Descr. List Brit. Anth.*, I. 24. 1. (1897); PAND., *Revue Entom. France*, XVIII. 175. 18. (1899); STEIN, *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, LIII. 299. 1. (1903); GRIMSHAW, *Entom. Monthly Mag.*, ser. 2. XVI. 243. 1. (1905).
bimaculata MEIG., S. B., V. 160. 135. ♀ [*Anthomyia*] (1826); MACQ., *Suit. à Buff.*, II. 307. 16. ♀ (1835).
spinipes FALL., *Musc.*, 61. 55. [*Musca*] (1823); ZETT., *Ins. Lapp.*, 672. 49. [*Anthomyza*] (1838) et *Dipt. Scand.*, IV. 1484. 93. [*Aricia*] (1845).

Europa,
 Syria.

Europacentr.
 et mer.

Europacentr.
 et sept.

Europacentr

Europa.

- cinerea** R.-D., Myod., 511, 7. ♀ (1830); STEIN, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII, 323, 16. ♀ (1903); GRIMSHAW, Entom. Monthly Mag., ser. 2, XVII, 73, 11. (1906). Europe-centre, et mer.
- trimaenonata* PAND., Revue Entom. France, XVIII, 171. (1899).
- etaripennis** R.-D., Myod., 510, 1. ♀ (1830). Galia.
- caucibus* WALK. (nec MEIG.) - **occulta** MEIG.
- curvipes** FALL., Musc., 90, 124. ♀ [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V, 136, 95. ♀ [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 305, 7. (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1433, 12. ♀ [*Aricia*] (1845); SCHN., F. A., I, 616. ♀ (1862); ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 81, 7. (1866) et Prodr., VI, 25, 7. (1877); STEIN, Entom. Nachr., XXV, 23, 3. ♀ (1899); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 173, 11. ♀ (1899); STEIN, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII, 331, 21. (1903); GRIMSHAW, Entom. Monthly Mag., ser. 2, XVII, 75, 16. (1906); *meridionalis* PORTSCH., Hor. Soc. entom. Ross., XVII, 3. ♀ (1882). Europa.
- curvipes* PORTSCH. (nec FALL.) - **borussica** STEIN.
- cyrtoneurina** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1486, 91. ♀ [*Aricia*] (1845). Europe
- ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 83, 3. ♀ [*Onodontha*] (1866) et Prodr., VI, 29, 3. [*Onodontha*] (1877); MEAD., Entom. Monthly Mag., XVIII, 123. (1881); CORRI. Bull. Soc. entom. Ital., XXV, 37, 27. [*Onodontha*] (1893); MEAD., Deser. List Brit. Anth., I, 25, 3. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 166, 2. (1899); STEIN, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII, 302, 3. (1903); GRIMSHAW, Entom. Monthly Mag., ser. 2, XVI, 214, 3. (1906).
- sibiricola* Lw., Zeitschr. Naturw., VIII, 106. (1857); SCHN., F. A., I, 615. ♀ (1862); Lw., Europ. Dipt., III, 211, 155. ♀ (1873).
- dentimana* MEIG. - **irritans** FALL.
- dentipes** FABR., Syst. Anth., 393, 95. [*Musca*] (1805); FALL., Musc., 60, 54. [*Musca*] (1823); MEIG., S. B., V, 141, 105. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 303, 1. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 667, 27. [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1126, 36. [*Aricia*] (1845); SCHN., F. A., I, 615. (1862); ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 78, 1. (1866) et Prodr., VI, 21, 1. (1877); MEAD., Entom. Monthly Mag., XVIII, 124. (1881) et Deser. List Brit. Anth., I, 25, 1. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 167, 4. (1899); STEIN, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII, 306, 5. (1903); GRIMSHAW, Entom. Monthly Mag., ser. 2, XVI, 211, 1. (1905).
- beauvoisii* MACQ., Suit. à Buff., II, 301, 6. ♀ (1835); MEIG., S. B., VII, 325, 17. ♀ (1838).
- flavifacies* R.-D., Myod., 511, 6. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 301, 4. (1835).
- montecultha* R.-D., Myod., 509, 1. (1830).
- obscuripennis* MACQ., Suit. à Buff., II, 301, 5. ♀ (1835); MEIG., S. B., VII, 325, 16. ♀ (1838).
- var. anxia** ZETT., Ins. Lapp., 668, 29. ♀ [*Anthomyia*] (1838)

- crinita* STEIN — **similis** MEADE.
fasciculata MEADE — **albipuncta** ZETT.
flavifacies R.-D. — ?**dentipes** FABR.
floccosa MACQ. = **armipes** FALL.
 ?**floralis** R.-D., Myod., 514, 17. (1830). Gallia.
gagalea R.-D. — **velutina** R.-D.
glabricula FALL., Musc., 75, 87. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V, 155, 126. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 305, 11. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 687, 117. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1135, 45. [*Aricia*] (1845) et XIV, 6209, 45. [*Aricia*] (1860); STEIN, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII, 335, 24. (1903); GRIMSHAW, Entom. Monthly Mag., ser. 2, XVII, 75, 17. (1906).
glabricula MEADE (nec FALL.) — **parva** MEADE.
glabricula ZETT. (nec FALL.) var. c. — **occulta** MEIG.
gracilis R.-D. — **palpalis** R.-D.
hirticeps FALL. — ?**Bezzii** STEIN.
impera LW. — **militaris** MEIG.
incompta MEIG., S. B., V, 138, 97. ? [*Anthomyia*] (1826). Patria ?
 ?**inermis** R.-D., Myod., 510, 3. (1830). Gallia.
irritans FALL., Musc., 62, 58. [*Musca*] (1823); ZETT., Ins. Lapp., 668, 30. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1431, 40. [*Aricia*] (1845); SCHN., F. A., I, 617. (1862); ROXD., Atti Soc. Milano, IX, 80, 6. (1866) et Prodr., VI, 24, 6. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 124. (1881); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 236. (1893); MEADE, Deser. List Brit. Anth., I, 26, 7. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 172, 12. (1899); STEIN, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII, 327, 19. (1903); GRIMSHAW, Entom. Monthly Mag., ser. 2, XVII, 74, 15. (1906).
biceps MEIG., S. B., V, 135, 92. ? [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 306, 14. (1835).
dentimana MEIG., S. B., V, 149, 44. ? [*Anthomyia*] (1826); SCHN., F. A., I, 617. (1862).
irritans MEIG. (nec FALL.) — **Pandelléi** STEIN.
meridionalis PORTSCH. — **curvipes** FALL.
meteorica L., Fauna Succ., Ed. II, 455, 1849. [*Musca*] (1764) et Syst. Nat., Ed. XII, II, 993, 88. [*Musca*] (1767); FABR., Syst. Entom., 780, 36. [*Musca*] (1775) et Spec. Ins., II, 115, 49. [*Musca*] (1781); SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 464, 913. [*Musca*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II, 347, 58. [*Musca*] (1787). Entom. syst., IV, 333, 88. [*Musca*] (1791) et Syst. Anth., 306, 110. [*Musca*] (1805); FALL., Musc., 61, 63. [*Musca*] (1823); MEIG., S. B., V, 137, 96. ? [*Anthomyia*] (1826); R.-D., Myod., 513, 11. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 306, 12. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 668, 32. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1429, 39. [*Aricia*] (1845); SCHN., F. A., I, 616. (1862); ROXD., Atti Soc. Milano, IX, 79, 3. (1866) et Prodr., VI, 22, 3. (1877); TYSCHENBERG, Pract. Insectenkte, 118, 47. [*Anthomyia*] (1880); MEADE, Entom. Monthly

Europa,
Asia sept.

- Mag., XVIII, 121. (1884); STRIX, Wien. entom. Zeitg., IX, 129.
 ' (1890); MEYER, Deser. List Brit. Anth., I, 27, 10. (1897);
 PAYD., Revue Entom. France, XVIII, 171, 11. (1899); STRIX,
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII, 321, 15. (1903); GRAYSON,
 Entom. Monthly Mag., ser. 2, XVII, 72, 13. (1906).
vaccarum DEG., Ins., VI, 85, 11. [*Musca*] (1776).
- militaris** MEG., S. B., V, 136, 94. ' [*Anthomyia*] (1826); MYQ., Europ.
 Suit. à Buff., II, 304, 2. ' (1835); PAYD., Revue Entom. France,
 XVIII, 168, 6. (1899); STRIX, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII,
 316, 12. (1903); GRAYSON, Entom. Monthly Mag., ser. 2, XVII,
 10, 10. (1906).
impera Lw., Europ. Dipt., III, 243, 156. (1873); MEYER, Entom.
 Monthly Mag., XXIII n. XXIV, 251. (1887) et Deser. List
 Brit. Anth., I, 26, 9. (1897).
velutina STROB. (nec R.-D.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII,
 236. (1843).
- montecapita* R.-D. **dentipes** FABR.
- nebulosa** R.-D., Myod., 510, 2. ' (1830); MYQ., Suit. à Buff., II, Gallia
 304, 3. ' (1835); MEG., S. B., VII, 324, 14. ' (1838).
- nitida* R.-D. **velutina** R.-D.
- nymphatae* R.-D. ? **Pandelléi** STRIX.
- obscuripennis* MEG. **dentipes** FABR.
- occulta** MEG., S. B., V, 133, 90. ' [*Anthomyia*] (1826); MYQ., Europ.
 Suit. à Buff., II, 305, 9. ' (1835); ZERR., Dipt. Scand., IV, 1186, Ins. Canar.
 95. [*Aricia*] (1845) et XIV, 6224, 95. [*Aricia*] (1860); SOMM., F.
 A., I, 614. (1862); STROB., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII,
 235. (1843); MEYER, Deser. List Brit. Anth., I, 25, 2. (1897);
 PAYD., Revue Entom. France, XVIII, 170, 9. (1899); STRIX, Verh.
 zool.-bot. Ges. Wien, LIII, 309, 2. (1903); GRAYSON, Entom.
 Monthly Mag., ser. 2, XVI, 243, 2. (1905).
enclaus WALK. (nec MEG.), Ins. Brit., II, 133, 15. [*Anthomyia*]
 (1853).
glabricola ZERR. (nec FALL.) var. c., Ins. Lapp., 687, 117.
 [*Anthomyia*] (1838).
- palaestrica** MEG., S. B., V, 135, 93. ' [*Anthomyia*] (1826); ZERR., Europaeentr.
 Dipt. Scand., IV, 1428, 37. ' [*Aricia*] (1845) et VIII, 3279, 37. et sept.
 ' [*Aricia*] (1849); MEYER, Entom. Monthly Mag., XVIII, 121.
 ' (1884); STRIX, Wien. entom. Zeitg., VII, 292, 3. ' (1888).
 Mik. Wien. entom. Zeitg., VIII, 233, 72. (1889); MEIS., Bull.
 Soc. entom. France, 62, XXXIII. ' (1893); MEYER, Deser. List
 Brit. Anth., I, 25, 6. ' (1897); PAYD., Revue Entom. France,
 XVIII, 167, 3. (1899); STRIX, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII,
 309, 7. (1903); GRAYSON, Entom. Monthly Mag., ser. 2, XVI,
 245, 6. (1905).
blanda MEG., S. B., V, 119, 103. ' [*Anthomyia*] (1826)
Rondani MEYER, Entom. Monthly Mag., XVIII, 125. ' (1887)
 et Deser. List Brit. Anth., I, 26, 8. ' (1897).

- ?palpalis** R.-D., Myod., 512, 10. ♀ (1830). Gallia.
gracilis R.-D., Myod., 513, 12. ♀ (1830).
- Pandelléi** STEIN, Entom. Nachr., XXV, 23, 2. ♂ (1899) et Verh. Europa-centr. et sept. zool.-bot. Ges. Wien, LIII, 325, 18. (1903). Creta.
irritans MEIG. (nec FALL.) S. B., V, 131, 91. [*Anthomyia*] (1826); Macq., Suit. à Buff., II, 396, 13. ♂ (1835).
cygniphacae R.-D., Myod., 511, 5. ♂ (1830).
scambus PAND. (nec ZETT.), Revue Entom. France, XVIII, 174, 17. (1899).
- parva** MEADE, Entom. Monthly Mag., XXV, 448. ♂ (1889); STROBL, Tief's dipt. Nachl., 49. (1899); STEIN, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII, 336, 25. (1903); GRIMSHAW, Entom. Monthly Mag., ser. 2, XVII, 76, 18. (1906). Europa-centr. et sept.
glabricula MEADE (nec FALL.), Descr. List Brit. Anth., I, 27, 14. ♂ (1897).
- pellucens** PORRESCHE, Hor. Soc. entom. Ross., XV, 158, 5. ♂ (1880); STEIN, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII, 332, 12. ♂ (1903). Europa-centr. et mer.
angulata STEIN, Entom. Nachr., XXV, 23, 4. ♂ (1899), PAND., Revue Entom. France, XVIII, 174, 15. (1899).
- penicillata** ROXD., Atti Soc. Milano, IX, 82, 1. [*Onodonta*] (1866) Europa-centr. et mer. et Prodr., VI, 28, 1. [*Onodonta*] (1877); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 173, 13. (1899); STEIN, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII, 329, 20. (1903).
- pilipes** STEIN, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII, 312, 9. ♂ (1903); BRITANNIA, Lapponia. Germania
 GRIMSHAW, Ann. Scott. Nat. Hist., 158. (1901) et Entom. Monthly Mag., ser. 2, XVI, 246, 7. (1905). Gallia.
- ?riparia** R.-D., Myod., 512, 8. ♀ (1830).
Rondanii MEADE = **palaestrica** MEIG.
scambus PAND. (nec ZETT.) **Pandelléi** STEIN.
- scambus** ZETT., Ins. Lapp., 668, 31. ♂ [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scandin., IV, 1433, 43. ♂ [*Arctia*] (1845); STEIN, Entom. Nachr., XXV, 22, 1. ♂ (1899) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII, 324, 17. (1903). Scandinavia
- silvicola* Lw. = **cyrtoneurina** ZETT.
- similis** MEADE, Entom. Monthly Mag., XXIII n. XXIV, 250. ♂ (1887) et Descr. List Brit. Anth., I, 25, 5. ♂ (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 167, 5. (1899); STEIN, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII, 308, 6. (1903); GRIMSHAW, Entom. Monthly Mag., ser. 2, XVI, 245, 5. (1905). Europa-centr. et sept.
eximia STEIN, Wien. entom. Zeitg., VII, 289, 1. ♂ (1888).
- spinipes* FALL. = **ciliata** FABR.
- trimacronata* PAND. **cinerea** R.-D.
- tuberculata** ROXD., Atti Soc. Milano, IX, 79, 4. ♂ (1866) et Prodr., VI, 23, 4. ♂ (1877); STEIN, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII, 318, 13. (1903); GRIMSHAW, Entom. Monthly Mag., ser. 2, XVII, 11, 11. (1906). Europa-centr. et mer.
amoena Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII, 48, 55. (1873).

- hispinosa* PAND. (nec ZETT.), Revue Entom. France, XVIII, 169, 7. ♀ (1899).
- vacarum* DEG. = **meteorica** L.
- velutina** R.-D., Myod., 513, 13. (1830); Macq., Suit. à Buff., II, 365. Europa.
10. (1835); MEG., S. B., VII, 325, 18. ♀ (1838); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1432, 41. ♀ [*Aricia*] (1815) et XIV, 6209, 11. ♀ [*Aricia*] (1860); SCHN., F. A., I, 617. ♀ (1862); ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 79, 2. (1866) et Prodr., VI, 22, 2. ♀ (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., ser. 2, IV, 221. (1893) et Deser. List Brit. Anth., I, 27, 11. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 170, 10. (1899); STEIN, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII, 320, 14. (1903); GRIMSHAW, Entom. Monthly Mag., ser. 2, XVII, 72, 12. (1906).
- atrata* R.-D., Myod., 514, 16. ♀ (1830).
- brevipennis* Lw., Zeitschr. Naturw., VIII, 107. (1857) et Europ. Dipt., III, 240, 154. (1873); SCHN., F. A., I, 616. (1862).
- gagatea* R.-D., Myod., 514, 14. ♀ (1830).
- nitida* R.-D., Myod., 514, 15. ♀ (1830).
- relutina* STROB. (nec R.-D.) = **militaris** MEG.

Ophyra

R.-D., Essai sur les Myod., 516, XVI. (1830).

- aenescens** WIED., Ausser zweifl. Ins., II, 435, 29. [*Anthomyia*] (1830). Europa-centr.
? viridescens R.-D., Myod., 517, 4. (1830).
- anthrax** MEG., S. B., V, 161, 137. [*Anthomyia*] (1826); Macq., Suit. Europa-centr.
à Buff., II, 308, 2. (1835); SCHN., F. A., I, 620. (1862); ROSD., et mer.
Atti Soc. Milano, IX, 85, 2. [*Ophira*] (1866) et Prodr., VI, 36, 2. Africa sept.
[*Ophira*] (1877); MEADE, Deser. List Brit. Anth., I, 28, 2. (1897); Ins. Canar.
PAND., Revue Entom. France, XVIII, 177, 21. [*Hydrotaea*] (1899).
- rutihans* R.-D., Myod., 516, 3. ♀ (1830).
- gracilis* WIED. = **nigra** WIED.
- grönlandica** LUNDR., Vid. Medd., 281, 116. (1900). Grönlandia
- leucostoma** WIED., Zool. Mag., I, I, 82, 34. [*Anthomyia*] (1817); Europa,
FALL., Musc., 61, 56. [*Musca*] (1823); MEG., S. B., V, 160, 136. Caucasus.
[*Anthomyia*] (1826); Macq., Suit. à Buff., II, 308, 1. (1835); Ins. Canar.,
ZETT., Ins. Lapp., 667, 28. [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., Syria,
IV, 1436, 46. [*Aricia*] (1815); SCHN., F. A., I, 620. (1862); ROSD., Tunisia
Atti Soc. Milano, IX, 84, 1. [*Ophira*] (1866) et Prodr., VI, 35, 1. [*Ophira*] (1877); MEADE, Deser. List Brit. Anth., I, 28, 1. (1897).
PAND., Revue Entom. France, XVIII, 176, 19. [*Hydrotaea*] (1899)
- nitida* R.-D., Myod., 516, 1. (1830).
- opalia* WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 556. [*Anthomyia*] (1819).
- pubescens* R.-D., Myod., 516, 2. (1830).
- minima** ROSD., Bull. Soc. entom. Ital., II, 317, 3. [*Ophira*] (1870) Europa-centr.
et Prodr., VI, 36, 3. [*Ophira*] (1877); PAND., Revue Entom. et mer.
France, XVIII, 176, 20. [*Hydrotaea*] (1899)

- nigra** WIED., Aussererhop. zweifl. Ins., II. 432. 22. [*Anthomyia*] China. (1830).
gracilis WIED., Aussererhop. zweifl. Ins., II. 432. 23. [*Anthomyia*] (1830).
nilola R.-D. = **leucostoma** WIED.
opalia WALK. = **leucostoma** WIED.
pubescens R.-D. = **leucostoma** WIED.
rutilans R.-D. = **anthrax** MEIG.
spoliata ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3280. 46-47. ? [*Aricia*] (1849). Suecia.
viridescens R.-D. = ?**aenescens** WIED.

Fannia

R.-D., Essai sur les Myod., 567. IX. (1830).

Amita R.-D., Myod., 569. XI. p. p. (1830).

Homalomyia BOUCHÉ, Naturgesch. d. Ins., 89. (1834).

Philinta R.-D., Myod., 568. X. p. p. (1830).

acra WALK. = **manicata** MEIG.

aerea MEIG., S. B., V. 157. 131. [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1605. 220. p. p. [*Aricia*] (1845); STEIN, Berl. entom. Zeitschr., XI. 70. 20. [*Homalomyia*] (1895); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 195. 29. [*Homalomyia*] (1899). Europa.

aërea ZETT., Ins. Lapp., 686. 109. ? p. p. [*Anthomyia*] (1838).

aeria MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 63. 40. ? [*Homalomyia*] (1897).

carbonaria ROXB., Bull. Soc. entom. Ital., II. 324. 14. ? [*Homalomyia*] (1870) et Prodr., VI. 53. 8. ? [*Homalomyia*] (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII. 205. [*Homalomyia*] (1882).

Rondanii STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 241. ? [*Homalomyia*] (1893).

acra ZETT. p. p. = **parva** STEIN.

aërea ZETT. p. p. = **aerea** MEIG.

aeria MEADE = **aerea** MEIG.

albiverris ZETT. = **lugubrina** ZETT.

aprica HAL. = **hamata** MACQ.

aricina SCHN. = ?**hamata** MACQ.

armata MEIG., S. B., V. 139. 99. ? [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Bull., II. 334. 3. ? [*Anthomyia*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1563. 177. ? [*Aricia*] (1845); SCHN., F. A., I. 655. [*Homalomyia*] (1862); ROXB., Atti Soc. Milano, IX. 129. 6. ? [*Homalomyia*] (1866) et Prodr., VI. 56. 24. [*Homalomyia*] (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII. 203. [*Homalomyia*] (1882); STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XI. 66. 19. [*Homalomyia*] (1895); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 63. 9. [*Homalomyia*] (1897); Europa.

- PAND., Revue Entom. France, XVIII, 188, 14. [*Homalomyia*] (1899).
marginata Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX, 565. [*Homalomyia*] (1889).
pseudoornata STROBL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 239. [*Homalomyia*] (1893).
ornata STROBL. (nec MEIG.) **coracina** Lw.
armillata ZETT. **manicata** MEIG.
atra STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XI, 125, 40. [*Homalomyia*] (1895). Europacentr.
alvina v. Ros. **hamata** Macq.
barbata STEIN, Wien, entom. Zeitzg., XI, 73, 2. [*Homalomyia*] (1892) Europacentr.
 et Berlin, entom. Zeitschr., XI, 59, 17. [*Homalomyia*] (1895);
 PAND., Revue Entom. France, XVIII, 180, 4. [*Homalomyia*] (1899).
pseudoornata STROBL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 239. [*Homalomyia*] (1893).
boletina v. Ros. **monilis** Hal.
bosniaca STROBL. **incisurata** ZETT. **scalaris** FAER.
Brateri Pok. p. p. **leucostieta** MEIG.
brevis Rond. **leucostieta** MEIG.
brunipennis R.-D. **?mutica** ZETT.
canicularis L., Fauna Suec., Ed. II, 64, 1841. [*Musca*] (1761) et Syst. Nat., Ed. XII, II, 992, 80. [*Musca*] (1767); FAER., Syst. Entom., 779, 27. [*Musca*] (1775) et Spec. Ins., II, 143, 36. [*Musca*] (1781); SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 162, 938. [*Musca*] (1781); FAER., Mantissa Ins., II, 346, 16. [*Musca*] (1787). Entom. syst., IV, 329, 70. [*Musca*] (1794) et Syst. Anfl., 393, 97. [*Musca*] (1805); FALL., Muse., 69, 72. [*Musca*] (1824); MEIG., S. B., V, 143, 101. [*Anthomyia*] (1826); R.-D., Mxod., 568, 1. [*Philanta*] (1830); Macq., Sait. à B. ff., II, 334, 5. [*Anthomyia*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 681, 86. [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1573, 188. [*Avicia*] (1845); WALK., Ins. Brit., II, 136, 53. [*Anthomyia*] (1853); SCHIN., F. A., I, 654. [*Homalomyia*] (1862); Rond., Atti Soc. Milano, IX, 132, 12. [*Homalomyia*] (1866) et Prosp., VI, 48, 2. [*Homalomyia*] (1877); TACHENBERG, Pract. Insectenkde., 133, 57. [*Anthomyia*] (1880); MEYER, Entom. Monthly Mag., XVIII, 209. [*Homalomyia*] (1882); STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XI, 53, 15. [*Homalomyia*] (1895). Mead., Deser. List Brit. Anth., II, 63, 8. [*Homalomyia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 189, 17. [*Homalomyia*] (1899).
constantina Macq., Dipt. exot., II, 3, 170, 1. [*Anthomyia*] (1833).
cf. varicata KULL., Annal. Soc. entom. France, 67, 109. [*Homalomyia*] (1898).
fulvicaudata v. Ros., Württemb. Gesell., I, 59. [*Anthomyia*] (1810).
introdacta WALK., Ins. Scand., 369. [*Anthomyia*] (1856).

- isara* WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 952. ♀ [*Anthomyia*] (1849).
mexicana BIG., Annal. Soc. entom. France, sér. 6, V, 284, 3. ♂ [*Homalomyia*] (1885).
minor domestica DEG., Ins., VI, 26, 5. [*Musca*] (1776).
muscaïdes WALK., Entom., V, 344, 80. ♂ [*Anthomyia*] (1871).
pallipes R.-D., Myod., 569, 2. [*Philita*] (1830).
?tuberosa CURT., Farm. Ins., 463, 26. [*Anthomyia*] (1860).
- carbonaria** MEIG., S. B., V, 154, 124. ♀ [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 308, 3. [*Ophyra*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6249, 175—177. ♀ [*Aricia*] (1860); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 179, 1. [*Homalomyia*] (1899). Europacentr. et sept.
- corrina* VERR., Entom. Monthly Mag., XXVIII, 149. [*Homalomyia*] (1892); STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XI, 102, 32. [*Homalomyia*] (1895); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 65, 19. [*Homalomyia*] (1897).
- nigella* MEIG., S. B., V, 156, 129. ♀ [*Anthomyia*] (1826).
stygia MEIG., S. B., V, 155, 127. ♀ [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 309, 5. ♀ [*Ophyra*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1560, 175. ♀ [*Aricia*] (1845).
- carbonaria* ROND. = **aerea** MEIG.
- carbonaria* STROBL. (nec MEIG.) = **Stroblii** STEIN.
- carbonella** STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XI, 96, 29. ♂ [*Homalomyia*] (1895). Europacentr.
- ciliata** STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XI, 44, 10. ♂ [*Homalomyia*] (1895). Europacentr. et mer.
- ?melania* DUF., Annal. Sci. nat., sér. 2, XII, 35, 10. [*Anthomyia*] (1839).
- cilicrura* ROND. = **fuscula** FALL.
- constantina* MACQ. = **canicularis** L.
- coracina** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII, 47, 50. ♀ [*Homalomyia*] (1873); STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XI, 80, 24. [*Homalomyia*] (1895); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 64, 12. [*Homalomyia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 187, 13. [*Homalomyia*] (1899).
- armata* STROBL. (nec MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 238. [*Homalomyia*] (1893).
spissata MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 203. ♂ [*Homalomyia*] (1882).
- corrina* VERR. = **carbonaria** MEIG.
- cothurnata** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII, 47, 49. ♂ [*Homalomyia*] (1873); STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XI, 73, 21. ♂ [*Homalomyia*] (1895). Europacentr.
- lugubrina* STROBL. (nec ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 240. [*Homalomyia*] (1893).
- difficilis** STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XI, 58, 16. [*Homalomyia*] (1895); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 190, 18. [*Homalomyia*] (1899). Europacentr.

clapsa WALK. ?*scalaris* FABR.

fasciculata LAW., Berlin, entom. Zeitschr., XVII, 47, 51. ? [*Homalomyia*] (1873); STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XL, 54, 14. ? [*Homalomyia*] (1895). Hungaria.

floralis R.-D. **serena** FALL.

floricola MEIG. **fuscula** FALL.

fulvicarar KIEFF. ?**canicularis** L.

fulromaculata v. ROS. **canicularis** L.

fuscimana v. ROS. **hamata** MACQ.

fuscula FALL., Musc., 86, 113. ? [*Musca*] (1825); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1686, 56. ? [*Anthomyia*] (1845) et VIII, 3310, 56. [*Anthomyia*] (1849); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 202. ? [*Homalomyia*] (1882) et XXIII n. XXIV, 252. [*Homalomyia*] (1887); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 238. [*Homalomyia*] (1893); STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XL, 25, 3. [*Homalomyia*] (1895); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 61, 2. [*Homalomyia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 185, 10. [*Homalomyia*] (1899). Europa.

ciliocara RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 128, 5. [*Homalomyia*] (1866) et Prodr., VI, 56, 12. [*Homalomyia*] (1877).

floricola MEIG., S. R., V, 145, 106. ? [*Anthomyia*] (1826); SCHIN., F. A., I, 656. [*Homalomyia*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 205. ? [*Homalomyia*] (1882).

obsa LAW., Berlin, entom. Zeitschr., XVII, 47, 52. [*Homalomyia*] (1873).

genualis STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XL, 126, 11. [*Homalomyia*] (1895); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 67, 24. ? [*Homalomyia*] (1897); PAND., Revue entom. France, XVIII, 192, 22. [*Homalomyia*] (1899). Europacentr.
et sept.

?*macrophthalma* BOUCHÉ, Naturgesch. d. Ins., I, 90, 79. [*Anthomyia*] (1834).

germana MEIG. **ornata** MEIG.

glaucescens ZETT., Dipt. Scand., IV, 1586, 199. [*Arctia*] (1845) et XIV, 6253, 199. [*Arctia*] (1860); STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XL, 112, 35. [*Homalomyia*] (1895); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 66, 21. [*Homalomyia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 191, 21. [*Homalomyia*] (1899). Europa.

hermosa RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 130, 8. [*Homalomyia*] (1866) et Prodr., VI, 51, 9. [*Homalomyia*] (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 201. [*Homalomyia*] (1882).

lividula ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6248, 175-176. ? [*Arctia*] (1860).

?**grisea** R.-D., Myod., 570, 2. ? [*Aminta*] (1830). Gallia.

grisea STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XL, 38, 7. [*Homalomyia*] (1895); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 181, 9. [*Homalomyia*] (1899). Europacentr.

hamata MYQ., Sait. à Buff., II, 312, 10. [*Limnophora*] (1835); ZETT., Europa.

Dipt. Scand., V. 1760. 144. ♀ [*Anthomyza*] (1846) et VIII. 3327. 144. ♂ [*Anthomyza*] (1849); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XLIII. 237. [*Homalomyia*] (1893); MEUN., Bull. Soc. entom. France, 62. XXVIII. + [*Homalomyia*] (1893); STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XI. 18. 1. [*Homalomyia*] (1895); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 61. 1. [*Homalomyia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 181. 5. [*Homalomyia*] (1899).

aprica HAL., Entom. Mag., IV. 159. (1837); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII. 202. [*Homalomyia*] (1882).

zaricina SCHN., F. A., I. 624. [*Limnophora*] (1862).

atrimana v. Ros., Württemb. Corbl., I. 59. ♂ [*Anthomyia*] (1840).
fuscimana v. Ros., Württemb. Corbl., I. 59. ♀ [*Anthomyia*] (1840).

Passerini ROHD., Atti Soc. Milano, IX. 126. 1. [*Homalomyia*] (1866) et Prodr., VI. 57. 13. [*Homalomyia*] (1877).

rafipes FALL., Musc., 85. 111. ♀ [*Musca*] (1825).

triplesia MEGG., S. B., VII. 331. 65. ♂ [*Anthomyia*] (1838).

ridula ZETT., Dipt. Scand., IV. 1710. 86. ♀ [*Anthomyza*] (1815); BOHEM., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., 203. ♂ [*Anthomyza*] (1851); WAMBERG., Öf. K. Vet. Akad. Förhandl., IX. 187. [*Anthomyza*] (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4743. 81. ♂ [*Anthomyza*] (1855).

herniosa ROHD. **glaucescens** ZETT.

hirticeps STEIN, Wien. entom. Zeitg., XI. 70. 1. ♂ [*Homalomyia*] (1892) et Berlin. entom. Zeitschr., XI. 64. 18. [*Homalomyia*] (1895); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 180. 3. [*Homalomyia*] (1899). Europaeentr.
et sept.

hispanica BIG. = **incisurata** ZETT.

impura ZETT. = **incisurata** ZETT.

incisurata ZETT., Ins. Lapp., 679. 79. ♂ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1577. 191. [*Aricia*] (1845); WALK., Ins. Brit., II. 142. 72. [*Anthomyia*] (1853); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6251. 191. [*Aricia*] (1860); SCHN., F. A., I. 656. [*Homalomyia*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII. 202. [*Homalomyia*] (1882); STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XI. 115. 36. [*Homalomyia*] (1895); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 66. 22. [*Homalomyia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 188. 16. [*Homalomyia*] (1899). Europa,
Ins. Canar.

bosnica STROBL, Wiss. Mitth. Bosn., VII. 613. [*Gymnochoeristomania*] (1900) (**incisurata** ZETT. < **scalaris** FABR.)

hispanica BIG., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 283. 1. ♂ [*Homalomyia*] (1885).

impura ZETT., Ins. Lapp., 683. 95. ♂ [*Anthomyza*] (1838).

lulibanda R. D., Myod., 570. 1. [*Aviata*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 335. 7. [*Anthomyia*] (1835); MEGG., S. B., VII. 330. 58. [*Anthomyia*] (1838).

? *prostrata* ROSSI, Fauna Eur., II. 108. 1510. [*Musca*] (1790):

- ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 131, 11. [*Homalomyia*] (1866)
et Prodr., VI, 50, 4. [*Homalomyia*] (1877).
- insignis** STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XI, 23, 2. ♀ [*Homalomyia*] (1895). Europacentr.
et mer.
- introducta* WALK. = **canicularis** L.
- isara* WALK. = **canicularis** L.
- Kowarzii** VERR., Entom. Monthly Mag., XXVIII, 149. ♀ [*Homalomyia*] (1892); STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XI, 83, 25. [*Homalomyia*] (1895); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 64, 43. ♀ [*Homalomyia*] (1897). Britannia,
Germania.
- latipalpis** STEIN, Wien, entom. Zeitg., XI, 75, 3. ♀ [*Homalomyia*] (1892) et Berlin, entom. Zeitschr., XI, 148, 37. ♀ [*Homalomyia*] (1895); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 190, 19. ♀ [*Homalomyia*] (1899). Europacentr.
- lepida* MEIG. (nec WILD.) = **mutica** ZETT.
- lepida* WIED. = ?**polychaeta** STEIN.
- leucosticta** MEIG., S. B., VII, 328, 31. ♀ [*Anthomyia*] (1826). Europacentr.
et mer.
- Braueri* POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 542, 4. [*Strobilia*] (1893). Aegyptus,
Asia min.,
Algeria.
- brevis* ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 132, 13. [*Homalomyia*] (1866) et Prodr., VI, 47, 1. [*Homalomyia*] (1877); SULLS, Berlin, entom. Zeitschr., XI, 51, 13. [*Homalomyia*] (1895); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 199, 30. [*Homalomyia*] (1899).
- lineata** STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XI, 120, 38. ♀ [*Homalomyia*] (1895). Europacentr.
- lucidata* ZETT. = **glaucescens** ZETT.
- luctuosa* MEIG. = **serena** FALL.
- ludibunda* R.-D. = **incisurata** ZETT.
- lugens* ZETT. p. p. = **mutica** ZETT.
- lugens* ZETT. p. p. = **polychaeta** STEIN.
- lugubrina** ZETT., Ins. Lapp., 687, 115. ♀ [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1595, 210. [*Aricia*] (1845); STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XI, 105. Ann. 2. [*Homalomyia*] (1895). Suecia.
- albiverris* ZETT., Dipt. Scand., IV, 1557, 172. ♀ [*Aricia*] (1845).
- lugubrina* STROB. (nec ZETT.) = **cothurnata** Lw.
- macrophthalmia* BOUCHE = ?**genualis** STEIN.
- manicata** MEIG., S. B., V, 110, 100. [*Anthomyia*] (1826); Macq., Suit. à Buff., II, 333, 1. [*Anthomyia*] (1835); DUF., Annal. Sci. nat., sér. 2, XIII, 152, 2. [*Anthomyia*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1576, 190. [*Aricia*] (1845); SCHN., F. A., 1, 655. [*Homalomyia*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 203. [*Homalomyia*] (1882); STROB., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 237. [*Homalomyia*] (1893); STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XI, 39, 8. [*Homalomyia*] (1895); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 62, 5. [*Homalomyia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 185, 11. [*Homalomyia*] (1899). Europa,
Aegyptus.
- aura* WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 951, 1. [*Anthomyia*] (1849).

- armillata* ZETT., Ins. Lapp., 679. 76. ♀ [*Anthomyza*] (1838).
- scalaris* FALL. (nec FABR.) var., Musc., 69. 73. ♀ [*Musca*] (1824).
- marginata* POK. -- **armata** MEIG.
- melania* DUF. = ?**ciliata** STEIN.
- mericana* BIG. -- **canicularis** L.
- minor domestica* DEG. **canicularis** L.
- minutipalpis** STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XI. 106. 33. [*Homalomyia*] (1895); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 193. 25. [*Homalomyia*] (1899). Europa-centr.
- monilis** HAL., Ann. nat. Hist., ser. 1. T. 2. 185. [*Anthomyia*] (1838); STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XI. 43. 9. [*Homalomyia*] (1895); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 63. 6. [*Homalomyia*] (1897). Europa, Creta, Ins. Canar., Syria, Algeria.
- boletina* v. ROS., Württemb. Corbl., 1. 59. [*Anthomyia*] (1840).
- ?*paradoxalis* DUF., Annal. Sci. nat., sér. 2. XIII. 155. 3. [*Anthomyia*] (1840).
- peniculata* ROND., Prodr., VI. 52. 6. ♂ [*Homalomyia*] (1877); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 238. [*Homalomyia*] (1893).
- muscoides* WALK. — **canicularis** L.
- mutica** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1580. 194. [*Aricia*] (1845); SCHIX., F. A., 1. 656. (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII. 204. [*Homalomyia*] (1882); STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XI. 122. 39. ♂ [*Homalomyia*] (1895); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 66. 23. [*Homalomyia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 188. 15. [*Homalomyia*] (1899). Europa, Algeria.
- ?*brunnicornis* R.-D., Myod., 570. 3. [*Amida*] (1830).
- ?*lepada* MEIG. (nec WIED.), S. B., V. 110. 101. ♂ [*Anthomyia*] (1826); SCHIX., F. A., 1. 655. [*Homalomyia*] (1862).
- lugens* ZETT., Dipt. Scand., IV. 1578. 192. ♂ p. p. [*Aricia*] (1845).
- nigrisquama* MEADE, Entom. Monthly Mag., XXIII n. XXIV. 253. ♂ [*Homalomyia*] (1887).
- triangulifera* ROND., Atti Soc. Milano, IX. 130. 9. [*Homalomyia*] (1866) et Prodr., VI. 51. 5. [*Homalomyia*] (1877).
- nigella* MEIG. -- **carbonaria** MEIG.
- nigrisquama* MEADE -- **mutica** ZETT.
- nitida** STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XI. 130. 42. ♀ [*Homalomyia*] (1895); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 192. 24. ♀ [*Homalomyia*] (1899); STROBL, Mem. R. Soc. Esp., III. 348. 776. [*Homalomyia*] (1905). Europa sept. et mer.
- obsca* LW. -- **fuscula** FALL.
- observanda** ROND., Prodr., VI. 61. 16. ♀ [*Homalomyia*] (1877). Italia.
- ornata** MEIG., S. B., V. 191. 188. ♂ [*Anthomyia*] (1826); Macq., Suit. à Bull., II. 334. 4. ♂ [*Anthomyia*] (1835); WALK., Ins. Brit., II. 144. 80. [*Anthomyia*] (1853); STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XI. 28. 4. [*Homalomyia*] (1895). Europa.
- germana* MEIG., S. B., V. 185. 176. ♀ [*Anthomyia*] (1826).

pallipes R.-D. **canicularis** L.

pallitibia ROND., Atti Soc. Milano, IX, 127, 4. [*Homalomyia*] (1866) Europa.
 et Prodr., VI, 49, 3. [*Homalomyia*] (1877); STROBL, Verh. zool-
 bot. Ges. Wien, XLIII, 240, 4. [*Homalomyia*] (1893); STEIN,
 Berlin, entom. Zeitschr., XL, 35, 6. [*Homalomyia*] (1895); MEADE,
 Descr. List Brit. Anth., II, 62, 4. [*Homalomyia*] (1897); PAND.,
 Revue Entom. France, XVIII, 184, 8. [*Homalomyia*] (1899).
pallitibiae MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 202. [*Homalo-*
myia] (1882).

? *pruinosa* MEG., S. B., V, 191, 189. ♀ [*Anthomyia*] (1826);
 MACQ., Suit. à Buff., II, 339, 26. ♀ [*Anthomyia*] (1835).

pallitibiae MEADE **pallitibia** ROND.

paradoxalis DUF. ? **monilis** HAL.

parva STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XL, 98, 30. [*Homalomyia*] Europa-centr.
 (1895); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 65, 17. ♂ [*Homalo-*
myia] (1897). et sept.

aerea ZETT., Dipt. Scand., IV, 1605, 220. ♂ p. p. [*Aricia*] (1845).

Passerinii ROND. = **hamata** MACQ.

peniculata ROND. = **monilis** HAL.

pini HART. **scalaris** FABR.

polychaeta STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XL, 108, 31. [*Homalo-* Europa.
myia] (1895); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 66, 20. [*Homalo-*
myia] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 192, 23.
 [*Homalomyia*] (1899).

? *lepida* WIED., Zool. Mag., I, I, 82, 33. [*Anthomyia*] (1817);
 STROBL, Verh. zool-bot. Ges. Wien, XLIII, 239. [*Homalo-*
myia] (1893).

lugens ZETT., Dipt. Scand., IV, 1578, 192. ♂ p. p. [*Aricia*] (1845).

sociella SCHN. (nec ZETT.), F. A., I, 655. ♂ [*Homalomyia*] (1862).

postica STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XL, 89, Ann. [*Homalomyia*] Europa-centr.
 (1895); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 179, 2. ♂ [*Homalo-*
myia] (1899). et sept.

pretiosa SCHN., F. A., I, 654. [*Homalomyia*] (1862); STEIN, Berlin, Europa.
 entom. Zeitschr., XL, 32, 5. [*Homalomyia*] (1895); MEADE, Descr.
 List Brit. Anth., II, 62, 3. [*Homalomyia*] (1897); PAND., Revue
 Entom. France, XVIII, 183, 7. [*Homalomyia*] (1899).

Rosei ROND., Atti Soc. Milano, IX, 126, 2. ♂ [*Homalomyia*]
 (1866) et Prodr., VI, 59, II. ♂ [*Homalomyia*] (1877); MEADE,
 Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV, 252. [*Homalomyia*]
 (1887); STROBL, Verh. zool-bot. Ges. Wien, XLIII, 237.
 [*Homalomyia*] (1893).

? *Ashteca* R.-D., Myod., 569, 3. ♂ [*Philiola*] (1830).

prostrata ROSS ? **incisurata** ZETT.

pruinosa MEG. ? **pallitibia** ROND.

pseudoarmata STROBL p. p. **armata** MEG.

pseudoarmata STROBL p. p. **barbata** STEIN.

? **rivutaris** R.-D., Myod., 571, I. ♂ [*Armita*] (1830).

Gallia.

Rondanii STROBL. **aerea** MEIG.

Roseii RONDI. **pretiosa** SCHN.

rafipes FALL. ♀, ♀. **hamata** MACQ.

sallatrix R.-D. — **scalaris** FABR.

scalaris FABR., Entom. Syst., IV, 332, 83. [*Musca*] (1791) et Syst. Antl., 305, 106. [*Musca*] (1805); FALL., Musc., 69, 73. [*Musca*] (1824); MEIG., S. B., V, 141, 102. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suitt. à Buff., II, 333, 2. [*Anthomyia*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 681, 87. [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1575, 189. [*Aricia*] (1845); SCHN., F. A., I, 651. [*Homalomyia*] (1862); RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 131, 10. [*Homalomyia*] (1866) et Prodr., VI, 55, 10. [*Homalomyia*] (1877); TASCHENBERG, Pract. Insectenkde., 134, 58. [*Anthomyia*] (1880); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 202. [*Homalomyia*] (1882); STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XI, 46, 11. [*Homalomyia*] (1895); MEADE, Deser. List Brit. Anth., II, 63, 7. [*Homalomyia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 186, 12. [*Homalomyia*] (1899).

Europa,
Ins. Canar.,
Palaestina.

elapsa WALK., Ins. Brit., II, 136, 54. ♀ [*Anthomyia*] (1853).
pini HART., Jahresber. Fortschr. Forstwiss., 302, 33. [*Anthomyia*] (1837); RATZBERG, Forstins., III, 170, 2. [*Anthomyia*] (1844).

sallatrix R.-D., Myod., 567, 1. (1830).

subnitida MACQ., Dipt. exot. Suppl., 4, 265, ♀ [*Anthomyia*] (1851).

scalaris FALL. (nec FABR.) var. = **manicata** MEIG.

serena FALL., Musc., 76, 88. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V, 200, 206. [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 685, 108. [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1594, 208. [*Aricia*] (1845) et VIII, 3299, 208. [*Aricia*] (1849); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 204. [*Homalomyia*] (1882); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 240. [*Homalomyia*] (1893); STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XI, 100, 31. [*Homalomyia*] (1895); MEADE, Deser. List Brit. Anth., II, 65, 18. [*Homalomyia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 193, 26. [*Homalomyia*] (1899).

Europa,
Asia sept.

floralis R.-D., Myod., 571, 5. ♂ [*Aminta*] (1830).

luctuosa MEIG., S. B., V, 156, 128. ♀ [*Anthomyia*] (1826).

similis STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XI, 93, 28. [*Homalomyia*] (1895); MEADE, Deser. List Brit. Anth., II, 65, 16. ♂ [*Homalomyia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 191, 27. ♂ [*Homalomyia*] (1899).

Europacentr.
et sept.

sociella MEADE (nec ZETT.), Entom. Monthly Mag., XVIII, 204. ♂ [*Homalomyia*] (1882).

? **sociella** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1564, 178. [*Aricia*] (1845); SCHN., F. A., I, 655. [*Homalomyia*] (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 240. [*Homalomyia*] (1893); STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XI, 89, 27. [*Homalomyia*] (1895); MEADE, Deser. List Brit. Anth., II, 64, 15. [*Homalomyia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 194, 28. [*Homalomyia*] (1899).

Europa.

- triangulifera* MEADE (nec RONDI, Entom. Monthly Mag., XXIII n. XXIV, 252. [*Homalomyia*] (1887).
- sociella* MEADE (nec ZETT.) — **similis** STEIN.
- sociella* SCHN. (nec ZETT.) — **polychaeta** STEIN.
- speciosa** VILL., Bull. Soc. entom. France, 19, 319. — [*Homalomyia*] Europacentr. (1898).
- spissata* MEADE — **coracina** LW.
- Stroblii** STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XL, 49, 12. — [*Homalomyia*] Styria. (1895).
- carbonaria* STROBL (nec MEG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 241. — [*Homalomyia*] (1893).
- stygia* MEG. — **carbonaria** MEG.
- subnitida* MACQ. — **sealaris** FABR.
- testacea* R.-D. — ? **pretiosa** SCHN.
- triangulifera* MEADE (nec RONDI.) — **sociella** ZETT.
- triangulifera* ROND. — **mutica** ZETT.
- triplesia* MEG. — **hamata** MACQ.
- tuberculata** ZETT., Dipl. Scand., VIII, 3296, 177—178. — [*Aricia*] Europacentr. (1849); STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XL, 77, 23. [*Homalomyia*] et sept. (1895); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 191, 20. [*Homalomyia*] (1899).
- tuberosa* CURT. — ? **canicularis** L.
- umbrosa** STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XL, 75, 22. — [*Homalomyia*] Europacentr. (1895); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 61, 11. — et sept. [*Homalomyia*] (1897).
- Verrallii** STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XL, 86, 26. — [*Homalomyia*] Britannia. (1895); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 61, 11. — [*Homalomyia*] (1897).
- vesparia** MEADE, Entom. Monthly Mag., ser. 2, II, 42. — [*Homalomyia*] Britannia. (1891).
- viduata* ZETT. — **hamata** MACQ.

Coelomyia

HAL., WESTW., Introd. to the mod. classific. of Ins., II, 143. (1840).

- canicularis* ZETT. (nec L.) var. *b.* — **subpellucens** ZETT.
- mollissima* HAL. — **spathulata** ZETT.
- spathulata** ZETT., Dipl. Scand., IV, 154, 156. [*Aricia*] (1845); STEIN, Berlin. entom. Zeitschr., XL, 131, 1. (1895); MÜK, Wien. entom. Zeitg., XVII, 172, 86. (1898).
- mollissima* HAL. in WESTW., Introd. to the mod. classific. of Ins., II, 143. (sine descriptione) (1840); ROND., Ann. Soc. Milano, IX, 129, 7. — [*Homalomyia*] (1866) et Prodr., VI, 52, 7. — [*Homalomyia*] (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 224. (1882); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 238. — [*Homalomyia*] (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 67, 1. (1897).

- subpellucens** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1561, 176. [*Tricia*] (1845); Succia,
 STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XI, 134, 2. (1895); MEIG., Bull.
 Soc. entom. France, 62, LXXV, 2. [*Homalomyia*] (1893).
canicularis ZETT. (nec L.) var. b., Ins. Lapp., 681, 86. ♀ [*An-*
thomyia] (1838).

Piezura

ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 122, IX. (1866).

graminicola ZETT. **pardalina** ROSD.

- pardalina** ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 122, I. (1866) et Prodr., VI, Europa.
 62, I. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 221, . . .
 (1882); STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XI, 136, 1. (1895);
 MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 59, 1. (1897); PAND., Revue
 Entom. France, XVIII, 182, 6. [*Homalomyia*] (1899).
graminicola ZETT., Dipt. Scand., V, 1777, 129. ♀ [*Anthomyia*] (
 1846).

Platycoenosia

STROBL, Wien, entom. Zeitg., XIII, 72. (1894).

Choristamma STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XI, 138. (1895).

externa PAND. = **Mikii** STROBL.

graminicola STROBL (nec ZETT.) = **Mikii** STROBL.

Mikii STROBL, Wien, entom. Zeitg., XIII, 72. . . (1894). Europa centr.

externa PAND., Revue Entom. France, XVIII, 152, 18. [*Coccosia*] (
 1899).

graminicola STROBL (nec ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
 XLIII, 221. ♀ [*Spilogaster*] (1893).

Pokoranyi STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XI, 138, 1. [*Chori-*
stamma] (1895).

Pokoranyi STEIN **Mikii** STROBL.

Euryomma

STEIN, Entom. Nachr., XXV, 49. (1899).

brevipalpis THOMS. **peregrinum** MEIG.

commune WALK. = **peregrinum** MEIG.

hispanicense STEIN **peregrinum** MEIG.

peregrinum MEIG., S. B., V, 187, 181. ♀ [*Anthomyia*] (1826). Europa mer.,

brevipalpis THOMS., Eugénie Resa, Dipt., 557, 200. ♀ [*Antho-*
myia] (1868). Ins. Canar.

commune WALK., Ins. Scand., 366. ♀ [*Anthomyia*] (1856). ¹¹/₈ - 2

hispanicense STEIN, Entom. Nachr., XXV, 20. (1899). ¹¹/₈ - 2

Schembrii ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 127, 3. ♀ [*Homalomyia*] (
 1866) et Prodr., VI, 60, 15. ♀ [*Homalomyia*] (1877). ¹¹/₈ - 2

Schembrii ROSD. = **peregrinum** MEIG.

Azelia

R.-D., Essai sur les Myod., 592, XV, (1830)

Atomogaster M'ycq., Suit. à Buff., II, 329, II, (1835).

agilis R.-D., Myod., 594, 7, (1830).

Gallia.

ambulans M'ull., ?*triquetra* W'ied.

aterrima M'ull., S. B., V, 157, 130. [*Anthomyia*] (1826). M'ycq., Suit. à Buff., II, 327, 13. [*Chotophila*] (1835); Zett., Dipt. Scand., IV, 1606, 221. [*Arctia*] (1850); Scms., F. A., I, 639. [*Anthomyia*] (1862); Lw., Entom. Misc., 35, 8, (1871); M'ead., Entom. Monthly Mag., XVIII, 223, (1882); Ström., Verh. zool. bot. Ges. Wien, XLIII, 212, (1893); M'ead., Deser. List Brit. Anth., II, 69, 6, (1897); Pass., Revue Entom. France, XVIII, 201, 36. [*Homalomyia*] (1899).

Europe centr. et sept.

cilipes H'yll., Ann. nat. Hist., ser. 1, II, 185, (1838). Lw., Entom. Misc., 25, 3, (1871). Ross., Prodr., VI, II, 4, (1877); M'ead., Entom. Monthly Mag., XVIII, 222, 3, (1882); Ström., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 241, (1893); M'ead., Deser. List Brit. Anth., II, 68, 3, (1897); Pass., Revue Entom. France, XVIII, 200, 31. [*Homalomyia*] (1899).

Europe.

Stegesi Zett., Dipt. Scand., IV, 1592, 207, [*Arctia*] (1840). Scms., F. A., I, 610. [*Anthomyia*] (1862); Ross., Atti Soc. Milano, IX, 135, 1, (1866).

tibialis Ström., Kjöfers Naturh. Tidsskr., IV, 320, 2. [*Atomogaster*] (1843).

tibialis R.-D., Myod., 591, 9, (1830); M'ycq., Suit. à Buff., II, 330, 1, [*Atomogaster*] (1835).

triquetra M'ycq. (nec W'ied.), Suit. à Buff., II, 329, 1, p. p. [*Atomogaster*] (1835).

duodecimspuntata R.-D., ?*triquetra* W'ied.

florica R.-D., ?*triquetra* W'ied.

gentilis R.-D., Myod., 592, 2, (1830)

Gallia.

gibbera M'ull., S. B., V, 152, 120. [*Anthomyia*] (1826). Lw., Entom. Misc., 35, 7, (1871); M'ead., Entom. Monthly Mag., XVIII, 223, (1882); Ström., Verh. zool. bot. Ges. Wien, XLIII, 212, (1893); M'ead., Deser. List Brit. Anth., II, 69, 5, (1897).

Europe centr. et sept.

lepida Fall. (nec W'ied.) var. β Zeiterstedtii Ross.

Macquarti Ström., Kjöfers Naturh. Tidsskr., IV, 319, 1. [*Atomogaster*] (1843); Zett., Dipt. Scand., IV, 1592, 206. [*Arctia*] (1850). Scms., F. A., I, 610. [*Anthomyia*] (1862). Ross., Atti Soc. Milano, IX, 135, 3, (1866); Lw., Entom. Misc., 29, 1, (1871). Ross., Prodr., VI, 10, 3, (1877); M'ead., Entom. Monthly Mag., XVIII, 222, 1, (1882); Ström., Verh. zool. bot. Ges. Wien, XLIII, 210, (1893); M'ead., Deser. List Brit. Anth., II, 68, 1, (1897); Pass., Revue Entom. France, XVIII, 200, 32, (1899).

Europe.

متر

umbulosa R.-D., Myod., 592. 3. ♂ (1830).

triquetra Macq. (nec WIED.), Suit. à Buff., II. 329. 1. p. p. [*Atomogaster*] (1835).

monodaetyla Lw., Entom. Misc., 31. 6. (1874).

Europacentr.

umbulosa R.-D. ? **Macquarti** STAG.

novempunctata ZSCHACH, Mus. Lesk., 133. 161. [*Musca*] (1788).

Europacentr.

undipes ZETT. = **triquetra** WIED.

obscura R.-D., Myod., 593. 5. ♀ (1830).

Gallia.

parva RONDI., Atti Soc. Milano, IX. 131. 1. (1866); Lw., Entom. Misc., 32. 5. ♂ (1874); RONDI., Prodr., VI. 39. 1. (1877).

Europacentr.
et n. r.

? **picipes** MEGG., S. B., V. 178. 161. ♂ [*Anthomyia*] (1826).

Germania.

Staguri ZETT. = **cilipes** HAL.

tibialis R.-D. = ? **cilipes** HAL.

tibialis STAG. = **cilipes** HAL.

triquetra WIED., Zool. Mag., I. 1. 80. 39. ♂ [*Anthomyia*] (1817);

Europa.

MEGG., S. B., V. 162. 139. [*Anthomyia*] (1826); RONDI., Atti Soc.

✓ v. J. Milano, IX. 135. 5. ♂ (1866); Lw., Entom. Misc., 19. 1. (1874);

RONDI., Prodr., VI. 41. 5. ♂ (1877); MEADE, Entom. Monthly

Mag., XVIII. 222. 4. ♂ (1882) et Deser. List Brit. Anth., II. 69. 4. (1897).

? *umbulans* MÜLL., Zool. Dan. Prodr., 2079. [*Musca*] (1776);

SCHRANK, Fauna boica, III. 126. 2169. [*Musca*] (1803).

? *duodecimpunctata* R.-D., Myod., 593. 4. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 330. 3. [*Atomogaster*] (1835).

? *florva* R.-D., Myod., 592. 1. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 330. 2. [*Atomogaster*] (1835).

undipes ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3299. 207—208. ♂ [*Aricia*] (1849); PANB., Revue Entom. France, XVIII. 201. 35. [*Homalomyia*] (1899).

triquetra FALL. (nec WIED.) = **Zetterstedtii** RONDI.

triquetra Macq. (nec WIED.) p. p. = **cilipes** HAL.

triquetra Macq. (nec WIED.) p. p. = **Macquarti** STAG.

Villeneuvei PANB., Revue Entom. France, XVIII. 201. 31. ♂ [*Homalomyia*] (1899).

Gallia.

Zetterstedtii RONDI., Atti Soc. Milano, IX. 135. 2. (1866); Lw., Entom. Misc., 22. 2. (1874); RONDI., Prodr., VI. 40. 2. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII. 222. 2. ♂ (1882) et Deser. List Brit. Anth., II. 68. 2. (1897).

Europa.

lepida FALL. (nec WIED.) var. ♂, Musc., 77. ♀ [*Musca*] (1825).

triquetra FALL. (nec WIED.), Musc., 73. 80. [*Musca*] (1825);

ZETT., Ins. Lapp., 685. 105. [*Anthomyia*] (1838); STAGG., Kröjers Naturh. Tidsskr., IV. 320. 3. [*Atomogaster*] (1843);

ZETT., Dipt. Scand., IV. 1590. 205. [*Aricia*] (1845); SCHEX., F. A., I. 640. [*Anthomyia*] (1862); PANB., Revue Entom. France, XVIII. 201. 33. [*Homalomyia*] (1899).

Limnophora

R.-D., Essai sur les Myod., 517, XVIII. (1830).

Brontaea Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII, 461. (*nom. sol.*) (1873).

Cuculla R.-D., Myod., 523, XIX. (1830).

Gymnodia R.-D., Hist. nat. d. Dipt., II, 635, XIII. (1863).

Neolimnophora SCHUBAL., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II, 94. (1902).

Pseudolimnophora STROBL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 272. (1893).

Strobilia Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 541. (1893).

- abbreviata** ZETT., Ins. Lapp., 671, 43. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scandinavia, Scand., IV, 1481, 91. [*Aricia*] (1845); ?PAND., Revue Entom. France, XVIII, 125, 14. ? (1899).
- aërea** FALL., Musc., 76, 89. [*Musca*] (1825); ZETT., Ins. Lapp., 686, 109. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1602, 217. [*Aricia*] (1845); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 127, 17. ? (1899). ?*rotundicentris* ZETT., Dipt. Scand., IV, 1557, 171. ? [*Aricia*] (1845). Europacentr. et s. pt.
- aestuum** VILL., Wien. entom. Zeitg., XXI, 197. (1902). Europaeoccid.
- albivincta* BIG. — **Osten-Sackenii** JAENS.
- albifrons* PAND. (*non* ZETT.) — **pacifica** SCHUB. (*non* MEIG.)
- aliena* WALK. — **tonitruui** WIED.
- Almquistii** HOLMGR., Nov. Spec. Ins., 17. [*Aricia*] (1881) et Entom. Now.-Sondja, Tidskr., IV, 167, 19. [*Aricia*] (1883); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 56. (1902).
- analisis** R.-D., Myod., 519, 3. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 319, ? (1835). Gallia.
- ?aquatica** R.-D., Myod., 521, 15. (1830). Gallia.
- arctica* ZETT., *var.* — **contractifrons** ZETT.
- Braueri* Pok., p. p. — **rufimana** STROBL.
- brunneisquama** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1162, 73. [*Aricia*] (1815); STROBL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 225. (1893). Europacentr. et sept.
- brunniceosa** R.-D., Myod., 522, 19. (1830). Gallia.
- ?calcarata** PORTSCH., Hor. Soc. entom. Russ., XVI, 111. ? (1881). Caucasus.
- candicans** VILL., Wien. entom. Zeitg., XXV, 28. (1906). Europa.
- carbonella** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1114, 26. ? [*Aricia*] (1815). Europa.
ROND., Atti Soc. Milano, IX, 117, 12. ? [*Spilogaster*] (1866) et Prodr., VI, 102, 35. [*Spilogaster*] (1877); STURM, Entom. Nachr., XIX, 216, 5. [*Spilogaster*] (1893); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 111, 32. [*Spilogaster*] (1899).
- nitidiverris* STROBL. (*non* ZETT.) *var.* **minor**, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 220. [*Spilogaster*] (1893).
- carbonella* SCHUB. (*non* ZETT.) — **dispar** FALL.
- ?cinerea** R.-D., Myod., 523, 1. [*Cuculla*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., Gallia, II, 312, 9. (1835).

- ?*coenosa* R.-D., Myod., 522. 16. (1830). Gallia.
- compuncta** WIED., Zool. Mag., I. 1. 80. 30. [*Anthomyia*] (1817);
MEIG., S. B., V. 117. 111. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à
Buff., II. 311. 5. (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1457. 68. [*Arctia*]
(1845) et VIII. 3281. 68. [*Arctia*] (1849); SCHN., F. A., I. 622.
(1862); RONDI., Atti Soc. Milano, IX. 138. 1. (1866) et Prodr.,
VI. 106. 4. (1877); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII.
225. (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I. 23. 18. [*Spiloga-*
staster] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 125. 13.
(1899).
- conspicua* HOLMGR. ?**megastoma** BOHEM.
- contractifrons** ZETT., Ins. Lapp., 683. 97. ♀ [*Anthomyia*] (1838) et Europa centr.
Dipt. Scand., IV. 1463. 74. [*Arctia*] (1845) et XIV. 6218. 74.
[*Arctia*] (1860); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I. 23. 24. [*Spiloga-*
staster] (1897); LUNDB., Vid. Medd., 311. 111. (1898).
arctica ZETT. var., Ins. Lapp., 669. 34. [*Anthomyia*] (1838);
STROBL, Krøyers Naturh. Tidsskr., ser. 2. I. 364. 39. [*Antho-*
myia] (1845).
- deflorata** HOLMGR., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXI. 102. [*Arctia*] Grönlandia.
(1872). Now.-Semb.
- denigrata** MEIG., S. B., V. 110. 46. ♀ [*Anthomyia*] (1826). Europa centr.
virginensis ZETT., Dipt. Scand., IV. 1407. 21. [*Arctia*] (1845) et et sept.
XIV. 6202. 21. [*Arctia*] (1860); SCHN., F. A., I. 608. [*Spiloga-*
staster] (1862); STEIN, Entom. Nachricht., XIX. 215. 4. [*Spilo-*
staster] (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I. 19. 1.
[*Spilogaster*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII.
113. 31. [*Spilogaster*] (1899).
- denudata** HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5. 30. Spitzbergia.
[*Arctia*] (1869); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI. 57. (1902).
ranunculi HOLMGR., K. Svensk. Akad. Handl., VIII. No. 5. 34.
♀ [*Arctia*] (1869); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI. 62.
(1902).
- depressiuscula** ZETT., Ins. Lapp., 674. 59. [*Anthomyia*] (1838) et Norvegia.
Dipt. Scand., IV. 1498. 107. [*Arctia*] (1845).
- depressula** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1460. 71. [*Arctia*] (1845). Suecia, Liv.
- didyma** ZETT., Ins. Lapp., 683. 100. [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Europa centr.
Scand., IV. 1461. 72. [*Arctia*] (1845) et XIV. 6218. 72. [*Arctia*] et sept.
(1860); ?SCHN., F. A., I. 622. (1862); ?STROBL, Verh. zool.-bot.
Ges. Wien, XLIII. 228. ♀ (1893).
- didyma* ZETT. var. b. **septemnotata** ZETT.
- dispar** FALL., Musc., 58. 18. [*Musca*] (1823); MEIG., S. B., V. 88. 11. Europa.
[*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 296. 12. [*Spilogaster*]
(1835); ZETT., Ins. Lapp., 665. 17. [*Anthomyia*] (1838) et Dipt.
Scand., IV. 1396. 9. [*Arctia*] (1845) et XIV. 6190. 9. [*Arctia*]
(1860); STEIN, Entom. Nachr., XIX. 215. 3. [*Spilogaster*] (1893).
carbonella SCHN. (nec ZETT.), F. A., I. 608. [*Spilogaster*] (1862);
STROBL, Verh. zool. bot. Ges. Wien, XLIII. 220. [*Spilogaster*]
(1893).

- funeralis* RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 88, 3. ♀ [*Aspilid*] (1866)
 et Prodr., VI, 94, 25. [*Spilogaster*] (1877); PAND., Revue
 Entom. France, XVIII, 111, 28. [*Spilogaster*] (1899).
- dorsata** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1472, 82. ♀ [*Aricia*] (1815); HOLMGR., Laponia,
 K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII, No. 5, 29. [*Aricia*] (1869). Spetsbergia
hyperborea BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXII, 571,
 10. [*Aricia*] (1865).
labiosa BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXII, 571, 9
 ♀ [*Aricia*] (1865).
megastoma BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXII, 572,
 11, p. p. [*Aricia*] (1865).
- dubitanda** PAND., Revue Entom. France, XVIII, 153, 20. ♀ [*Cornosia*] Germania
 (1899).
- ? **exigua** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II, 658, 20. ♀ [*Anthomyia*] China.
myia] (1830).
- exsurda** PAND., Revue Entom. France, XVIII, 126, 16. (1899). Europacentr
sarda RONDI. (nec ZETT.). Atti Soc. Milano, IX, 136, 1. [*Mela- et mer.,*
nuchelia] (1866) et Prodr., VI, 105, 2. (1877). Caucasus.
flavescens STEIN, Mit. Zool. Mus. Berlin, II, 106, 150. (1903). Aegyptus.
fluviatilis R.-D., Myod., 520, 7. (1830); MYCO., Suit. à Buff., II, 310, Gallia
 4. (1835).
- frontalis** R.-D., Myod., 521, 13. (1830). Gallia.
- fuliginosa** HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII, No. 5, Spetsbergia
 30. ♀ [*Aricia*] (1869); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 59. (1902).
- fumipennis** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1465, 75. ♀ [*Aricia*] (1815). Suecia
funeralis RONDI. **dispar** FALL.
- ? **genurufa** PAND., Revue Entom. France, XVIII, 130, 22. ♀ (1899). Gallia
 ? **grisea** R.-D., Myod., 523, 2. ♀ [*Cuculla*] (1830). Gallia
humilis ZETT. **septemnotata** ZETT.
hyperborea BOHEM. **dorsata** ZETT.
- illota** HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII, No. 5, 32. ♀ Spetsbergia
 [*Aricia*] (1869); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 59. (1902)
- interrupta** MYCO., Suit. à Buff., II, 311, 6. (1835). Gallia
labiosa BOHEM. **dorsata** ZETT.
- leucogaster** ZETT., Ins. Lapp., 671, 57. ♀ [*Anthomyia*] (1838) et Europacentr
 Dipt. Scand., IV, 1497, 106. ♀ [*Aricia*] (1815). et sept
- lingualis** PAND., Revue Entom. France, XVIII, 130, 23. ♀ (1899). Gallia
- litorea** FALL., Musc., 63-60. [*Musca*] (1823); ZETT., Ins. Lapp., 670 Europacentr
 38. ♀ [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1473, 83. [*Vicia*] et sept
 (1815) et XII, 1728, 83. [*Vicia*] (1855); ?Scars., F. A., I, 622. (1862). ?RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 138, 2. (1866) et Prodr.,
 VI, 106, 3. (1877); ?MÉANE, Entom. Monthly Mag., XXIII, 13. (1891); ?STIGMER, Verh. zool. bot. Ges. Wien, XLIII, 226. (1893); ?MÉANE, Descr. List Brit. Anth., I, 25, 20. [*Spilogaster*]
 (1897); ?PAND., Revue Entom. France, XVIII, 127, 18. (1899).
litorea ZETT. (nec FALL.) var. *b.* **quinquelineata** ZETT.

- littoralis** R.-D., Myod., 520, 9. (1830). Gallia.
- ?**liturata** MACQ., Suit. à Buff., II. 312, 11. ♀ (1835). Gallia.
- lobalis** THOMS. = **tonitru** WIED.
- ladibanda** HOLMGR. = **megastoma** BOHEM.
- macrops** PAND., Revue Entom. France, XVIII. 131, 24. ♀ (1899). Gallia.
- maculigera** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1480-90. ♀ [*Aricia*] (1845). Scandinavia
- maculosa** MEIG., S. B., V. 91, 15. [*Anthomyia*] (1826); SCHIS., F. A., Europa,
I. 608. [*Spilogaster*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII. Caucasus,
62. [*Spilogaster*] (1882) et Deser. List Brit. Anth., I. 20, 7. [*Spilo-*
gaster] (1897).
- sigillata** ROSD., Atti Soc. Milano, IX. 116, 9. ♂ [*Spilogaster*]
(1866) et Prodr., VI. 99, 31. [*Spilogaster*] (1877); PAND.,
Revue Entom. France, XVIII. 114, 34. [*Spilogaster*] (1899).
- sarda** STROBL. (nec ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII.
228, (1893).
- marginalis** FALL., Musc., 66, 67. [*Musca*] (1824); MEIG., S. B., V. Scandinavia
196, 198. [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 676, 68. [*Antho-*
myia] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1515, 126. [*Aricia*] (1845) et
XIV. 6235, 136. [*Aricia*] (1860).
- maritima** v. RÖD., Wien. entom. Zeitg., VI. 115. ♂ [*Melanochelia*] Europacentr.
(1887); SCHNAB., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 94. [*Neolim-* et sept.,
nophora] (1902). Algeria.
- ? **celerissima** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1588, 203. ♀ [*Aricia*] (1845).
- megastoma** BOHEM., Öf. K. Vet. Akad. Förhandl., XXII, 572, 11. Spetsbergia.
[*Aricia*] (1865); HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII.
No. 5, 29. [*Aricia*] (1869); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI. 64.
(1902).
- ? **consparsata** HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII.
No. 5, 31. [*Aricia*] (1869); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI.
57, (1902).
- ladibanda** HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5.
32. ♂ [*Aricia*] (1869).
- triangulifera** BOHEM. (nec ZETT.), Öf. K. Vet. Akad. Förhandl.,
XXII, 572, 12. [*Aricia*] (1865).
- megastoma** BOHEM. p. p. = **dorsata** ZETT.
- ?**meridionalis** R.-D., Myod., 523, 20. (1830). Gallia.
- multipectata** STEIN, Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 107, 151. (1903). Aegyptus.
- nigrinervis** ZETT. = **denigrata** MEIG.
- nigrinervis** STROBL. (nec ZETT.) var. **minor** = **carbonella** ZETT.
- nigripes** R.-D. = **triangula** FALL.
- nigriventris** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1442, 52. ♀ [*Aricia*] (1845); Scandinavia.
STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI. 37. ♂ (1902).
- ?**nitida** R.-D., Myod., 521, 14. (1830). Gallia.
- notabilis** STEIN, Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 105, 149. (1903). Aegyptus, Ins.
Cuar., Syria.
- notata** FALL., Musc., 62, 59. [*Musca*] (1823); MEIG., S. B., V. 90, 14. Europa,
[*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 296, 10. [*Spilogaster*]
(1835); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1412, 25. [*Aricia*] (1845); SCHIS.,
Caucasus.

- F. A., I. 608. [*Spilogaster*] (1862); *Rend.*, Att. Soc. Milano, IX, 116, 10. [*Spilogaster*] (1866) et *Prodr.*, VI, 100, 32. [*Spilogaster*] (1877); *Mémoires*, Entom. Monthly Mag., XVIII, 62. [*Spilogaster*] (1881) et *Descr. List Brit. Anth.*, I, 20, 8. [*Spilogaster*] (1897).
PAND., *Revue Entom. France*, XVII, 67, 1. [*Tricia*] (1898).
Vigirina *AN STRIX.*, *Jahresber. Ver. Graubünden*, V, 96.
 [*Anthomyia*] (1860).
- novemmaculata** ZERR., *Dipt. Scand.*, XIV, 6219, 79—80. [*Tricia*] Lappont (1860); *STRIX.*, *Wien. entom. Zeitg.*, XXI, 38. (1902).
- nupta** ZERR., *Dipt. Scand.*, XIV, 6217, 71—72. [*Tricia*] (1860) Scandinavia
- obscura** R. D., *Mycol.*, 519, 4. (1839). Gallia.
- obsignata** ROXB., **Osten-Sackenii** JAENS.
- omissa** MEIG., *S. B.*, V, 119, 114. [*Anthomyia*] (1826). Patria?
- opacula** STROB. (*var* ZERR.), *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XLIII, 228. (1893). Styria
- Osten-Sackenii** JAENS., *Abh. Senckenb. Ges.*, VI, 371, 77. [*Spilogaster*] (1866). Europa mer., Ins. Canar., Syria.
- albicipita* BEC., *Annal. Soc. entom. France*, sér. 6, V, 286, 2. [*Spilogaster*] (1885). *STRIX.*, *Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt.*, VII, 209, 3. (1907).
- obsignata* ROXB., *Att. Soc. Milano*, IX, 117, 11. [*Spilogaster*] (1866) et *Prodr.*, VI, 100, 33. [*Spilogaster*] (1877). *STRIX.*, *Berlin. entom. Zeitschr.*, LI, 65, 5. (1906)
- pacifica** MEIG., *S. B.*, V, 119, 113. [*Anthomyia*] (1826) Germania
- pacifica** STROB. (*var* MEIG.), F. A., I, 661. [*Cacosia*] (1862). *STROB.*, *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XLIII, 272. [*Pseudolinnaphora*] (1893). Europa-centr. et mer.
- Pok.*, *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XLIII, 541. [*Strablia*] (1893)
- albifrons* *PAND.*, (*var* ZERR.), *Revue Entom. France*, XVIII, 132, 26. (1899).
- triampla* ROXB. (*var* FALL.), *Att. Soc. Milano*, IX, 201, 16. [*Cacosia*] (1866) et *Prodr.*, VI, 268, 16. [*Cacosia*] (1877)
- pallitarsis** STRIX., *Mit. Zool. Mus. Berlin*, II, 108, 152. (1903) Africa sept.
- palustris** R. D., *Mycol.*, 518, 2. (1839); *Mycol.*, *Suit. 5 Bull.*, II, 310, 1. (1835) Gallia
- ?**palustris** R. D., *Mycol.*, 523, 3. [*Cicadella*] (1839) Gallia
- pauvilla** HORNER, K., *Svensk. Vet. Akad. Handl.*, VIII, No. 5, 32. [*Tricia*] (1869). *STRIX.*, *Wien. entom. Zeitg.*, XXI, 61. (1902) Europe sept.
- plumiseta** STRIX., *Mit. Zool. Mus. Berlin*, II, 109, 153. (1903) Aegyptus
- polystigma** MEIG., *S. B.*, V, 119, 115. [*Anthomyia*] (1826). *Mycol.*, *Suit. 5 Bull.*, II, 311, 7. (1834). *Kow.*, *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XXIII, 161. *Camp. de Egypt.* [*Braconia*] (1873). *PAND.*, *Revue Entom. France*, XVIII, 129, 30. (1899) Europa-centr. et mer., Canisus
- palustris* R. D., *H. Entom. d. Dipt.*, II, 673, 1. [*Grimmia*] (1863). *VIEI.*, *Wien. entom. Zeitg.*, XXX, 281, IV. [*Grimmia*] (1908)
- capla* NOW., *Verh. Ver. Braunn.*, VI, 91. (1681)
- suaphorus* *Mycol.*, *Suit. 5 Bull.*, II, 311, 33. [*Anthomyia*] (1834)
- palustris* R. D. — **polystigma** MEIG.

- ?punctatella** R.-D., Myod., 524, 42. ♀ (1830). Gallia.
- quinquelineata** ZETT., Ins. Lapp., 671, 42. ♀ [*Anthomyia*] (1838) Lapponia.
 et Dipt. Scand., IV, 1475, 81. ♀ [*Arctia*] (1845) et XIV, 6222,
 81. ♀ [*Arctia*] (1860).
liborea ZETT. (nec FALL.) var. h., Ins. Lapp., 670, 38. ♀ [*Anthomyia*] (1838)
- canonali** HOLMGR. — **denudata** HOLMGR.
- rivularis** R.-D., Myod., 519, 6. ♀ (1830). Macq., Suit. à Buff., II, Gallia
 310, 3. ♀ (1835).
- rotundicentris** ZETT. — **?aërea** FALL.
- rufimana** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 272. ♀ [*Pseudolimnophora*] (1893). Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, Europa-centr.
 542. [*Strobilia*] (1893). et mer.,
Braueri Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 542. ♀ Aegyptus
 [*Strobilia*] (1893).
- scripta** NOW. — **polystigma** MEIG.
- seripulosa** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1483, 92b. ♀ [*Arctia*] (1845); Europa-sept.
 MEADG., Entom. Monthly Mag., XXIII n. XXIV, 71. [*Cucosia*] et mer.,
 et Deser. List Brit. Anth., II, 74, 2. [*Cucosia*] (1897).
- septemnotata** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1476, 86. ♀ [*Arctia*] (1845) Europa-centr.
 et XIV, 6223, 86. ♀ [*Arctia*] (1860); MEADG., Entom. Monthly et sept.
 Mag., XVIII, 102. (1884) et Deser. List Brit. Anth., I, 23, 23. [*Spilogaster*] (1897); PASD., Revue entom. France, XVIII, 130, Europa-centr.
 21. (1899).
dihypa ZETT. var. h., Ins. Lapp., 683, 100. [*Anthomyia*] (1838).
humilis ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6224, 80, 81. ♀ [*Arctia*] (1860).
- seta** PASD. — **solitaria** ZETT.
- sigillata** ROND. — **maculosa** MEIG.
- singularis** MEIG. — **polystigma** MEIG.
- solitaria** ZETT., Ins. Lapp., 677, 72. ♀ [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Europa-centr.
 Scand., IV, 1479, 89. ♀ [*Arctia*] (1845); MEADG., Entom. Monthly et sept.
 Mag., XX, 105. [*Cucosia*] (1883) et XXIII n. XXIV, 250. (1887).
 STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 227. (1893); MEADG.,
 Deser. List Brit. Anth., I, 23, 24. ♀ [*Spilogaster*] (1897).
seta PASD., Revue Entom. France, XVIII, 128, 49. (1899).
- sordidipennis** HOLMGR., Entom. Tidsskr., IV, 169, 20. [*Arctia*] Now.-Scutlja
 (1883); SEFIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 63. (1902).
- sororecula** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1459, 70. [*Arctia*] (1845); MEADG., Europa-centr.
 Deser. List Brit. Anth., I, 23, 19. [*Spilogaster*] (1897). et sept.
triangula MEIG. (nec FALL.), S. B., V, 148, 42. ♀ [*Anthomyia*]
 (1826); Macq., Suit. à Buff., II, 311, 8. (1835).
- surda** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1476, 86. ♀ [*Arctia*] (1845) et XIV, Europa-centr.
 6223, 86. ♀ [*Arctia*] (1860); PASD., Revue Entom. France, et sept.
 XVIII, 120, 6. (1899); SEFIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 42. (1902).
- surda** ROND. (nec ZETT.) — **exsurda** PASD.

- sarda* STROBL (*nov. ZETT.*) **maculosa** MEG.
- tigrina* AM. STEIN **?notata** FALL.
- tonitru** WIED., *Aussereurop.*, zweifl. Ins., II, 129, 16. ¹ [*Anthomyia*] China
myia] (1830); STEIN, *Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt.*, III, 433
 (1902).
albica WALK., *Ins. Saund.*, 363. ¹ (1836).
lobalis THOMS., *Eugenies Resa. Dipt.*, 554, 185. ¹ [*Anthomyia*]
 (1868).
var. variegata STEIN, *Mitt. Zool. Mus. Berlin*, II, 104, 118. Aegyptus
 (1903) et *Berlin. entom. Zeitschr.*, LI, 65, 1. (1906).
- trapae** R.-D., *Myod.*, 520, 11. (1830). Gallia
- triangula** FALL., *Musc.*, 74, 82. [*Musca*] (1825); MEG., *S. B.*, V,
 148, 112. ¹ [*Anthomyia*] (1826); ZETT., *Ins. Lapp.*, 685, 107.
 [*Anthomyia*] (1838) et *Dipt. Scand.*, IV, 1182, 92. [*Tricia*]
 (1845); SCHN., *F. A.*, I, 664. [*Coccosia*] (1862); MEG., *Entom.*
Monthly Mag., XX, 105. [*Coccosia*] (1883); STROBL, *Verh. zool.*
bot. Ges. Wien, XLIII, 272. [*Pseudolimnophora*] (1893); MEG.,
Deser. List Brit. Anth., II, 74, 1. [*Coccosia*] (1897); PAVO,
Revue Entom. France, XVIII, 131, 25. (1899).
nigripes R.-D., *Myod.*, 541, 23. [*Limosina*] (1830); MEG., *Suit*
à Buff., II, 349, 23. [*Coccosia*] (1835); MEG., *S. B.*, VII
 336, 11. [*Coccosia*] (1838); RONDI, *Atti Soc. Milano*, IX, 203
 15. ¹ [*Coccosia*] (1866) et *Prodr.*, VI, 267, 15. [*Coccosia*] (1877)
- triangula* MEG. (*nov. FALL.*) **?sororeula** ZETT.
- triangula* ROND. (*nov. FALL.*) **pacifica** SCHN. (*nov. MEG.*)
- triangulifera** ZETT., *Ins. Lapp.*, 680, 83. [*Anthomyia*] (1838) et *Dipt.* Scandinavia
Scand., IV, 1167, 78. [*Tricia*] (1845); STAVEO, *Kjöpers. Naturh.*
Tidsskr., ser. 2, I, 361, 10. [*Tricia*] (1845); ZETT., *Dipt. Scand.*,
 XIV, 6219, 78. [*Tricia*] (1850); LARSEN, *Vid. Medd.*, 312, 112.
 (1898).
- triangulifera* BOHEM. (*nov. ZETT.*) **megastoma** BOHEM.
- trianguligera** ZETT., *Ins. Lapp.*, 680, 82. [*Anthomyia*] (1838) et *Dipt.* Scandinavia
Scand., IV, 1166, 77. [*Tricia*] (1845). ² STROBL, *Verh. zool. bot.*
Ges. Wien, XLIII, 227. (1893). MEG., *Deser. List Brit. Anth.*,
 I, 23, 22. [*Spilogaster*] (1897).
- trigonifera** ZETT., *Ins. Lapp.*, 669, 33. ¹ [*Anthomyia*] (1838) et Lapponia
Dipt. Scand., IV, 1158, 69. ¹ [*Tricia*] (1845). STAVEO, *Kjöpers.*
Naturh. Tidsskr., ser. 2, I, 361, 38. ¹ [*Tricia*] (1845). LARSEN,
Vid. Medd., 311, 110. (1898).
- trigonota** ZETT., *Ins. Lapp.*, 680, 81. ¹ [*Anthomyia*] (1838) et *Dipt.* Scandinavia
Scand., IV, 1168, 79. ¹ [*Tricia*] (1845). STEIN, *Wien. entom.*
Zeitg., XXI, 13 (1904).
- tristiola** ZETT., *Ins. Lapp.*, 675, 70. ¹ [*Anthomyia*] (1838) et *Dipt.* Lapponia
Scand., IV, 1139, 108. [*Tricia*] (1845).
- umbrisquama** ZETT., *Dipt. Scand.*, XI, 1320, 87, 88. [*Tricia*] (1850)
- vana** ZETT., *Dipt. Scand.*, IV, 1165, 76. ¹ [*Tricia*] (1845). ¹ PAVO,
Revue Entom. France, XVIII, 120, 7. ¹ (1899)

velerrima ZETT. ? *maritima* v. Röd.

virgo VILL., Wien. entom. Zeitg., XXV, 30. (1906).

Europa mer.

? *vitticollis* ZETT., Dipt. Scand., IV, 1471, 81. ♀ [*Aricia*] (1845);
HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII, No. 5, 28. [*Aricia*]
(1869).

Suecia,

Spetsberg.,
Grönlandia.

c. *M. coenosiaeformes*.

Dialyta

MEIG., S. B., V, 208. CLX. (1826).

alpina POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX, 565. ♂ (1889).

Teriolis.

angulicornis ZETT. *erinacea* FALL.

atriceps LAW., Wien. entom. Monatschr., II, 153. ♂ (1858); SCHIX.,
F. A., I, 657. (1862); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 119.
4. [*Limnophora*] (1899).

Europacentr

erinacea FALL., Musc., 65, 64. [*Musca*] (1824); MEIG., S. B., V, 208, 1.
(1826); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1370, 1. (1845); SCHIX., F. A., I,
657. (1862); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 119, 5. [*Limno-*
phora] (1899).

Europacentr
et sept.

angulicornis ZETT., Ins. Lapp., 681, 89. ♂ [*Anthonya*] (1838).

? *ruffrons* MEIG., S. B., VII, 337, 2. ♀ (1838).

Patria ?

Steinii STROBL., Mitt. Ver. Steierm., 1897, 252. (1898).

Europacentr
et sept.

Atherigona

ROXD., Prodr., I, 97, 48. (1856).

falcata THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 560, 209. ♀ [*Coenosia*] (1868).

China.

humeralis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II, 441, 10. ♀ [*Coenosia*]
(1830); STEN., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., III, 130. (1902).

Nubia.

quadripunctata ROSSI ? *varia* MEIG.

scutellaris STEN., Mitt. Zool. Mus. Berlin, II, 110, 155. (1903).

Aegyptus.

simplex THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 560, 210. [*Coenosia*] (1868).

China.

soccata ROXD., Bull. Soc. entom. Ital., II, 332, 2. ♀ (1870) et Prodr.,
VI, 252, 2. ♀ (1877).

Italia.

trilineata STEN., Termész. Füzet., XXIII, 157, 4. ♀ (1900).

Aegypt., I. Canar.

varia MEIG., S. B., V, 187, 182. ♀ [*Anthonya*] (1826); MACQ., Suif.
à Buff., II, 349, 26. [*Coenosia*] (1835); SCHIX., F. A., I, 669.
(1862); MEYER, Entom. Monthly Mag., XX, 107. (1883) et Descrip.
List Brit. Anth., II, 77, 1. (1897).

Europacentr.
et mer.,

Africa sept.,
Ins. Canar.,
Syria.

? *quadripunctata* ROSSI, Mantissa Ins., II, 71, 555. [*Musca*]
(1794); ROXD., Atti Soc. Milano, IX, 192, 1. (1866) et Prodr.,
VI, 251, 1. (1877); STROM., Mem. R. Soc. Esp., III, 351, 789.
(1905).

Myopina

R.-D., Essai sur les Myod., G^o. IX. (1850).

- denticauda* Zett., Ins. Lapp., 675, 61. [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1502, 112. [*Arctia*] (1845) et XIV, 6229, 112. [*Arctia*] (1860). Suecia, Lapponia.
- morieni* Zett., Dipt. Scand., IV, 1505, 115. [*Arctia*] (1845). Scandinavia.
- myopina* FALL. — *reflexa* R.-D.
reflexa R.-D., Myod., 676, 1. (1830); Macq., Suit. à Buff., II, 389, 1. (1835); SCHN., F. A., I, 658. (1862). Ross., Ath. Soc. Milano, X, 93. (1867). Europa.
- myopina* FALL., Musc., G^o. 65. [*Musca*] (1821); Meig., S. B., V, 222, 28. [*Cnecostia*] (1826); Zett., Ins. Lapp., 677, 70. [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1503, 113. [*Arctia*] (1845); PAND., Revue Entom. France, XIX, 271, 49. (1881) 49. (1891). [*Chortophila*] (1901).
- scoparia* Zett., Dipt. Scand., IV, 1501, 111. [*Arctia*] (1845); SELL., Wien. entom. Zeitg., XXI, II. (1902). Lapponia

Calliophrys

Kow., Wien. entom. Zeitg., XII, 19. (1895).

Melanochelia Ross., Ath. Soc. Milano, IX, 136, XII, p. p. (1866).

- absida* HAL. — *riparia* FALL.
exuta Kow., Wien. entom. Zeitg., XII, 52, 3. (1893). Rhodra, Bay.
- pulchriceps* Lw., Wien. entom. Monatsch., IV, 3. (1869); [*Anthomyia*] (1869); Kow., Wien. entom. Zeitg., XII, 51, 4. (1893). Europe centr. et mer.
- riparia* FALL., Musc., 67, 68. [*Musca*] (1821); Meig., S. B., V, 197, 199. [*Anthomyia*] (1826); Zett., Dipt. Scand., IV, 1581, 197. [*Arctia*] (1845); SCHN., F. A., I, 658. [*Myopina*] (1862); Ross., Prodr., VI, 101, 1. [*Limnophora*] (1877); Meig., Entom. Monthly Mag., XX, 101. [*Melanochelia*] (1877); v. Roux, Wien. entom. Zeitg., VI, 115. [*Melanochelia*] (1887); Meig., Descrip. List Brit. Anth., II, 73, 1. [*Melanochelia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 126, 15. [*Limnophora*] (1899).
absida HAL., Entom. Mag., I, 166. [*Lispa*] (1833). Europa, Algeria, Ins. Canar.

Lispa

FAV., Proc. d. Carac. gener. d. Ins., 169. (1896).

- acha* WAER. — *tentaculata* DUG.
apicalis Mik., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX, 33. (1869); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI, 12, 8. (1892); Bock., Zentschr. Entom. Breslau, 33, 15. (1901). Austria

- armipes** Beck., Mitt. Zool. Mus. Berlin, H. 118, 168. (1903) et Zeitschr. Entom. Breslau, 60, 37. (1904). Aegyptus.
- aurulans** R.-D. = **phidromyzina** Fall.
- bohemica** Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 53, 32. (1904). Bohemia.
- brunnica** Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 40, 21. ♀ (1904). Asia centr.
- caesia** Meig., S. B., V, 228, 6. (1826); Stenl., Entom. Nachr., XXVI, 152. (1900); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 51, 30. (1904). Europacentr., Aegyptus, Syria.
- crassiuscula* Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII, 31. (1847); Schms., F. A., I, 659. (1862); Rosb., Prodr., VI, 294, 43. (1877); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI, 50, 16. (1892); Meade, Deser. East Brit. Anth., II, 70, 4. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 134, 2. (1899).
- candicans** Kow., Wien. entom. Zeitg., XI, 36, 2. (1892). Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 44, 25. (1904). Europa mer.
- var. obscurior* Strohm., Wien. entom. Zeitg., XII, 108. ♀ (1893). Hispania.
- calcarsis** Lw. = **nuba** Wied.
- cinifera** Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 41, 22. ♀ (1904). Asia centr.
- schinella* Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 38, 19. ♀ (1901).
- cochlearia** Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 32, 14. ♀ (1901). Aegyptus.
- comitata** Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 34, 16. ♀ (1904). Transcaespia.
- consanguinea** Lw., Wien. entom. Monatschr., II, 8, 2. (1858); Schms., F. A., I, 661. (1862); Rosb., Atti Soc. Milano, IX, 212, 5. (1866) et Prodr., VI, 289, 6. (1877); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI, 40, 6. (1892); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 138, 6. (1899); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 28, 11. (1904). Europa.
- convexiuscula** Kow., Wien. entom. Zeitg., XI, 48, 14. ♀ (1892). Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 60, 36. ♀ (1904). Sicia.
- crassiuscula* Lw. = **caesia** Meig.
- dissimilis** Macq., Dipt. exot. Suppl. 4, 261. ♀ (1851); Beck., Mitt. Zool. Mus. Berlin, H. 119, 171. (1903) et Zeitschr. Entom. Breslau, 45, 2. (1904); Stenl., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., VII, 274, 31. (1907). Aegyptus.
- elephantina** Beck. = **lineata** Macq.
- flavineceta** Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII, 27. (1847); Schms., Wien. entom. Zeitg., XXI, 67. ♀ (1902); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 56, 55. (1904). Europacentr.
- var. Schnablii* Schms., Pam. Fizyogr., (1881) et Wien. entom. Zeitg., XXI, 68. ♀ (1902). Europacentr. et mer.
- flavineceta* Kow. (nec Lw.) Wien. entom. Zeitg., XI, 43, 9. (1892). Caucasus.
- ?torrentialis* Rosb., Prodr., VI, 293, 11. ♀ (1877); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI, 52, 7. (1892).
- flavineceta* Kow. (nec Lw.) = *var. Schnablii* Schms.
- flavinervis** Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 20, 5. ♀ (1904). Asia centr.
- fluvialis** R.-D. = **tentaculata** Meig.
- frigida** Erich. in Müll., Reise in Sibir., II, 1, 67, 153. (1851); Beck., Zeitschr. Entom. Breslau, 55, 34. (1904). Sibiria.

- quinta* V. D. WOOD. — **pilosa** Lw.
- halophora** Beck., *Mit. Zool. Mus. Berlin*, II, 116, 165 (1904) et *Zeitschr. Entom. Breslau*, 19, 29 (1904) — *Aegyptus*.
- hyalinipennis* THOMS. — **pygmaea** FALL.
- hydromyzina** FALL., *Musc.*, 94, 4, (1829) — *Musc.*, S. B., V, 225, 4 (1826); *Myq.*, *Sunt. à Bull.*, II, 315, 7, (1830); *Zool. Dipt. scand.*, I, 179, 6, (1846) — Kow., *Wien. entom. Zeitg.*, XI, 11, 7 (1892); Beck., *Zeitschr. Entom. Breslau*, 35, 17, (1904).
caurabaus R.-D., *Myod.*, 26, 6, (1830); *Myq.*, *Sunt. à Bull.*, II, 311, 5, (1830).
- Kowarzi** Beck., *Mit. Zool. Mus. Berlin*, II, 116, 161 (1904) — *Aegyptus*.
Zeitschr. Entom. Breslau, 18, 28 (1904)
- liberalis* STEIN. — **pectinipes** Beck.
- leucocephala** Lw., *N. Beitr.*, IV, 19, 16, (1836) — Beck., *Zeitschr. Entom. Breslau*, 19, 1 (1904) — *Aegyptus*.
- leucomelana* Kow. — **longicollis** MEIG.
- leucospila* ROXB. — **melaleuca** Lw.
- leucospyla* ROXB. — **melaleuca** Lw.
- lineata** MCG., *BARKER, WILB. et BARTH. Hist. nat. Hes. Canari.*, II, 13, 116, 90, (1838); *Myq.*, *Dipt. exot.*, II, 3, 161, 2, (1843); Beck., *Zeitschr. Entom. Breslau*, 62, 38, (1904) — *Aegyptus*.
elephantina Beck., *Mit. Zool. Mus. Berlin*, II, 116, 161 (1904) — *Ins. Canari.*
- linealis* WALK., *Ausereurop. zweif. Ins.*, II, 659, 23 (1830).
- litorea** FALL., *Musc.*, 94, 3, (1825); *Musc.*, S. B., V, 224, 1, (1826); *Zool. Dipt. scand.*, V, 179, 1, (1846) — Lw., *Stettin. entom. Zeitg.*, VIII, 25, (1841); *Zool. Dipt. scand.*, VIII, 3329, 1, (1849); WALK., *Ins. Brit.*, II, 118, 2, (1843); SCOUR., *F. A.*, I, 669 (1862); ROXB., *Atti Soc. Milano*, IX, 214, 9 (1866) et *Prodr.*, VI, 293, 12, (1877); Kow., *Wien. entom. Zeitg.*, XI, 19, 15 (1892); *Myod.*, *Descr. List. Brit. Anth.*, II, 70, 3 (1897); PASQ., *Revue Entom. France*, XVIII, 135, 3, (1899); Beck., *Zeitschr. Entom. Breslau*, 51, 33, (1901) — *Aegyptus*.
- longicollis** MEIG., S. B., V, 225, 1 (1826); *Myq.*, *Sunt. à Bull.*, II, 313, 1, (1830); ROXB., *Bull. Soc. entom. Ital.*, II, 371, 10 (1840) et *Prodr.*, VI, 290, 8, (1877); Beck., *Zeitschr. Entom. Breslau*, 17, 3 (1901) — *Aegyptus*.
leucomelana Kow., *Wien. entom. Zeitg.*, XI, 36, 1, (1892); Kow., *Wien. entom. Zeitg.*, XIII, 19, (1894) — *China*.
- longicauda* ROXB. — **pygmaea** FALL.
- maculifrons* MCG. — **pygmaea** FALL.
- melaleuca** Lw., *Stettin. entom. Zeitg.*, VIII, 28, (1841); SCOUR., *F. A.*, I, 661, (1862); Kow., *Wien. entom. Zeitg.*, XI, 11, 10, (1892); PASQ., *Revue Entom. France*, XVIII, 136, 1 (1899); Beck., *Zeitschr. Entom. Breslau*, 39, 20, (1904) — *Aegyptus*.
leucospila ROXB., *Prodr.*, VI, 291, 9, (1875)
- leucospyla* ROXB., *Atti Soc. Milano*, IX, 213, 7, (1866) — *China*.
- melitensis* ROXB. — **nana** MCG.

- meridionalis* ROXB. — *nana* MACQ.
metatarsalis THOMS. — *pygmaea* FALL.
monacha SCHN. — *superciliosa* Lw.
- nana** MACQ., Suit. à Buff., II, 311, 6. ♀ (1835); Mém., 8, 3, VII, 337, 9. ♀ (1838); ROXB., Atti Soc. Milano, IX, 211, 2. ♀ (1866) et Prodr., VI, 287, 3. ♀ (1877); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI, 39, 5, (1892); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 138, 7, (1899); BECK., Zeitschr. Entom. Breslau, 20, 6, (1904).
melitensis ROXB., Atti Soc. Milano, IX, 211, 3. ♀ (1866) et Prodr., VI, 287, 4. ♀ (1877).
meridionalis ROXB., Atti Soc. Milano, IX, 211, 4. ♀ (1866) et Prodr., VI, 288, 5. ♀ (1877).
pulchella Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII, 29, (1847); MEXON., Descr. List Brit. Anth., II, 70, 3, (1897).
- nubalis* WIED. — ?*lineata* MACQ.
- nuba** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II, 114, 6, (1830); STERN, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., III, 132, (1902); BECK., Zeitschr. Entom. Breslau, 13, 1, (1901).
cilitoris Lw., N. Beitr., IV, 49, 15. ♂ (1856).
- nubilipennis** Lw., Beschre. europ. Dipt., III, 244, 157. ♀ (1873); BECK., Zeitschr. Entom. Breslau, 21, 7. ♀ (1904). Sarcoph.
- nympheicola* R.-D. — **uliginosa** FALL.
- Odessa** BECK., Zeitschr. Entom. Breslau, 37, 18. ♂ (1901). Odessa.
- palulosa* R.-D. — **uliginosa** FALL.
- parcespinosa** BECK., Acta Soc. Scient. Fenn., XXVI, 47, 79. ♀ (1900) et Zeitschr. Entom. Breslau, 52, 31. ♀ (1901). Sibiria.
- pectinipes** BECK., Mitt. Zool. Mus. Berlin, II, 113, 161, (1903) et Zeitschr. Entom. Breslau, 29, 12, (1901). Aegyptus,
 Ins. Canar.
- lateralis* STERN, Berlin. Entom. Zeitschr., LI, 70, 3. ♀ (1906).
- persica** BECK., Zeitschr. Entom. Breslau, 22, 8, (1904). Persia.
- pilosa** Lw., Wien. entom. Monatschr., VI, 298, 4, (1862); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI, 16, 12, (1892); BECK., Zeitschr. Entom. Breslau, 17, 27, (1901). Europaeentr.
 et occid.
- geminata* v. D. WILLE, Tijdschr. v. Entom., XI, 233, (1868).
- polanogela* R.-D. — **tentaculata** DEG.
- pulchella* Lw. — **nana** MACQ.
- pygmaea** FALL., Muse., 91, 5. ♀ (1829); Zettl. Dipt. Scand., V, 1800, 6, (1816) et VIII, 3330, 6, (1819); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI, 51, 1. ♀ (1892); BECK., Zeitschr. Entom. Breslau, 31, 13, (1901). Europa,
 Aegyptus,
 Ins. Canar.
- hyalinipennis* THOMS., Eugénies Resa, Dipt. 562, 211. ♀ (1868).
longiuscula ROXB., Prodr., VI, 286, 2. ♂ (1877).
maculifrons MACQ., Dipt. exot. Suppl. 4, 265, [Hylemyia] (1864).
metatarsalis THOMS., Eugénies Resa, Dipt., 562, 213. ♀ (1868).
simplississima Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII, 30, (1817).
saburata ROXB., Atti Soc. Milano, IX, 210, 1, (1866) et Prodr., VI, 285, 1, (1877).
tenuipalpis ZETT., Dipt. Scand., V, 1798, 3. ♂ (1816) et XIV, 6307, 3. ♀ (1860); Kow., Wien. entom. Zeitg., XI, 37, 3, (1892)

- ?quadrilineata** Myq., Suit. à Buff., H. 314, S. 1 (1835). *Musc.*, S. B., VII, 337, 10 (1838). Kow., *Wien. entom. Zeitg.*, XI, 52, 1 (1892).
- rigida** Beck., *Mitt. Zool. Mus. Berlin*, II, 116, 163 (1903) et *Zeitschr. Entom. Breslau*, 12, 23, (1904). Egypte
- riparia** R.-D. **tentaculata** Drog.
- secalis** Lw., *Stettin. entom. Zeitg.*, VIII, 28, 1 (177). Kow., *Wien. entom. Zeitg.*, XI, 52, 5 (1892). Beck., *Mitt. Zool. Mus. Berlin*, II, 112, 153, 1 (1903) et *Zeitschr. Entom. Breslau*, 24, 9, (1904). Africa sept.
Asie orient.
- schuichi** Beck., **cinifera** Beck.
- simplicissima** Lw. **pygmaea** Favi.
- sinensis** Schm., *Novara Reise. Dipt.*, 296, 3 (1861). China
- superciliosa** Lw., *Wien. entom. Monatschr.*, V, 34f. (1861). Kow., *Wien. entom. Zeitg.*, XI, 4, 13, (1892). Beck., *Zeitschr. Entom. Breslau*, 5, 26, (1901). Europea cent.
- monaha* Schm., *F.*, V, 1, 660 (1862). *Paris. Revue Entom. France*, XVIII, 133, 35 (1899).
- salvata** Roxb. **pygmaea** Favi.
- larsalis** R.-D. **tentaculata** Drog.
- tentaculata** Drog., *Ins.*, VI, 86, 15, [*Musca*] (1756). *Linn. Gen. Const. et Ins.*, IV, 347, (1809). *Fav.*, *Musc.*, 93, 1, (1826). *Musc.*, S. B., V, 226, 3, (1826). *Myq.*, *Suit. à Buff.*, H. 311, 2, 1 (1835). *Zool.*, *Ins.*, Lappé, 699, 1, (1838) et *Dipt. Scand.*, V, 1796, 1 (1846). *Waldl.*, *Ins. Brit.*, II, 117, 1, (1855). *Schm.*, *F.*, V, 1, 660 (1862); *Roxb.*, *Mé. Soc. Milano*, IX, 213, 6, (1866) et *Prodr.*, VI, 289, 7, (1877). Kow., *Wien. entom. Zeitg.*, XI, 38, 1 (1892). *Madr.*, *Descr. East Brit. Anth.*, II, 69, 1 (1893). *Stettin. Wien. entom. Zeitg.*, XVIII, 229, 201, 1 [*Moschos*] (1899). *Paris. Revue Entom. France*, XVIII, 137, 5 (1899). Beck., *Zeitschr. Entom. Breslau*, 26, 10, (1901). Europe
Asie cent.
Ins. Canar.
- aola* Wied., *List. Dipt. Berl. Mus.*, IV, 362 [*Anthracus*] (1849).
- flaviventris** R.-D., *Myod.*, 525, 2 (1830).
- polanogyla** R.-D., *Myod.*, 525, 1, (1830).
- riparia** R.-D., *Myod.*, 525, 3 (1830).
- larsalis** R.-D., *Myod.*, 526, 3 (1830). *Myq.*, *Suit. à Buff.*, H. 311, 1, (1835).
- libalis** Myq., *Bavker.*, *Wien. et Berlin. Hist. nat. d. Be. Canaries.*, II, 13, 116, 89 (1838). *Myq.*, *Dipt. exot.*, II, 3, 165, 1, 1 (1833). B. Canar.
- var. canariensis* Beck., *Zeitschr. Entom. Breslau*, 24, 10, (1901).
- lempalpis** Zett. **pygmaea** Favi.
- libalis** Myq. **tentaculata** Drog.
- larviculalis** Roxb. *var. Schlablii* Schm.
- uliginosa** Favi., *Musc.*, 93, 2 (1826). *Musc.*, S. B., V, 226, 2 (1826). *Myq.*, *Suit. à Buff.*, H. 311, 3 (1835). *Zool.*, *Dipt. Scand.*, V, 1797, 2 (1846). Lw., *Stettin. entom. Zeitg.*, VIII, 21, (177). Europe
Asie cent.
Ins. Canar.

(1847); SCHN., F. A., I, 661. (1862); RONDI, Atti. Soc. Milano, IX, 213, 8. (1866) et Prodr., VI, 292, 10. (1878); KOW., Wien. entom. Zeitg., XI, 15, 41. (1892); MEADE, Descri. List Brit. Anth., II, 70, 2. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 439, 8. (1899); BECK., Zeitschr. Entom. Breslau, 13, 24. (1904).

nymphaticola R.-D., Myod., 524, 1. (1830).

pallulosa R.-D., Myod., 526, 7. (1830).

uroleuca PAND., Revue Entom. France, XVIII, 434, 1. (1899) Gallia.

vittipennis THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 561, 212. (1868). China

Caricea

R.-D., Essai sur les Myod., 530, 1. (1830).

Lispocephala Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 532. (1893).

alma MEIG., S. B., V, 188, 181. (1838) [*Anthomyia*] (1825); ZETT., Dipt. Scand., V, 1757, 110 [*Anthomyia*] (1846) et XIV, 6298, 110. [*Anthomyia*] (1860); SCHN., F. A., I, 663. [*Cocnosia*] (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 266. [*Cocnosia*] (1893); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XVI, 25. [*Lispocephala*] (1897). Europa.

pallipalpis ZETT., Dipt. Scand., IV, 1678, 46. (1845) et XIV, 6281, 46. (1860) [*Anthomyia*].

sparia ZETT., Ins. Lapp., 693, 112. [*Anthomyia*] (1838).

oculata RONDI, Atti. Soc. Milano, IX, 200, 8. (1866) [*Cocnosia*] (1856) et Bull. Soc. ent. Ital., II, 261, 10. [*Cocnosia*] (1870)

et Prodr., VI, 261, 10. [*Cocnosia*] (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX, 106. [*Cocnosia*] (1883) et Descri. List Brit. Anth., II, 75, 6. [*Cocnosia*] (1897).

boops THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 559, 20a. (1868) [*Cocnosia*] (1868) China

brachialis RONDI, Prodr., VI, 262, 7. (1877) [*Cocnosia*] (1877); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XVI, 24, 2. [*Lispocephala*] (1897). Europa.

Stroblii MIK., Wien. entom. Zeitg., VI, 261. [*Cocnosia*] (1887)

et Wien. entom. Zeitg., XI, 186, 12. [*Cocnosia*] (1892).

erythroceræ R.-D., Myod., 534, 16. (1830); MYQ., Suit. à Buff., II, 315, 1. [*Cocnosia*] (1835); MEIG., S. B., VII, 335, 3. [*Cocnosia*] (1838). Europa, Caucasus.

lactipennis ZETT., Dipt. Scand., IV, 1722, 101. [*Anthomyia*] (1845)

STEIN, Entom. Nachr., XVIII, 331, 101. (1892) et Wien. entom. Zeitg., XVI, 25, 3. Ann. [*Lispocephala*] (1897).

venia PAND. (nec FABR.), Revue Entom. France, XVIII, 430, 23. [*Cocnosia*] (1899).

lactipennis ZETT. = **erythroceræ** R.-D.

Mikii STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII, 107. (1893) [*Cocnosia*] (1893). Europe centr.

pallicornis Pok. (nec ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 532. [*Lispocephala*] (1893). et mer.

- var. hispanica* STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII 224-192 [Ins. Canar., Algeria, Syria].
[Coenosia] (1899).
pallicornis POK. (nec ZETT.) Mikii STROBL.
pallipalpis ZETT. alma MEG.
pantherina ROSD. ? *verna* FABR.
parva ZETT. alma MEG.
Stroblii MIK. brachialis ROSD.
trogodytes ZETT. verna FABR.
ungulata ROSD. alma MEG.
verna FABR., Entom. syst., IV, 339, 70. [*Musca*] (1794) et Syst. Anth., 304, 101. [*Musca*] (1805). FALL., Musc., 87, 116. [*Musca*] (1820) MEG., S. B., V, 214, 6. [*Coenosia*] (1826); MYQ., Suit. a Buff., II 346-9. [*Coenosia*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 693, 143. [*Anthomy. a*] (1838) et Dipl. Scand., IV, 1721, 100. [*Anthomy. a*] (1840) et XIV, 6289, 100. [*Anthomy. a*] (1860); SCHUS., F. A., I, 666. [*Coenosia*] (1862). ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 204, 9. [*Coenosia*] (1866) et Prodr., VI, 265, 11. [*Coenosia*] (1877); STEIN., Entom. Nachr., XVIII, 331, 100. (1892); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 76-11. [*Coenosia*] (1897); STEIN., Wien. entom. Zeitg., XVI 25, 3 Ann. [*Lispacephala*] (1897).
?pantherina ROSD., Bull. Soc. entom. Ital., II, 333, 1. ? (1870) et Prodr., VI, 277, 7. ? (1877).
trogodytes ZETT., Ins. Lapp., 691, 131. ? [*Anthomy. a*] (1838) et Dipl. Scand., IV, 1668, 33. [*Anthomy. a*] (1845) et XII, 1741, 33. [*Anthomy. a*] (1855). PAND., Revue Entom. France, XVIII, 156, 21. [*Coenosia*] (1899).
verna PAND. (nec FABR.) erythrocerus R. D.

II. Coenosiinae.

a. *C. hylemyiaeformis*

Acroptena

POK., Wien. entom. Zeitg., XII, 60, II (1893).

- frontata* ZETT., Ins. Lapp., 669, 35. ? [*Anthomy. a*] (1838) et Dipl. Scand., IV, 1133-61. [*Leica*] (1845). SYDÉN., Kjöpers. Naturh. Tidsskr., n. ser. I, 363, 37. ? [*Anthomy. a*] (1840). ROSD., Atti Soc. Milano, IX 140, 2. ? [*Hydrophoria*] (1866). HEDGEC., Sven. K. Vet. Akad. Handl., VIII, No. 9, 33. [*Leica*] (1869). ROSD., Prodr., VI, 174, 6. ? [*Hydrophoria*] (1877).
obscura BOHEM., Ofv. K. Vet. Akad. Forhandl., XXII 343-11 [*Scatomy. a*] (1865).
Sinuoje POK., Wien. entom. Zeitg., XII, 61. (1893).
spinulosis PAND., Revue Entom. France, XVIII 220-3 [*Hydrophoria*] (1899).

- verlicina* ZETT., Ins. Lapp., 665, 49. ♀ [*Anthomyia*] (1838) et
Dipt. Scand., IV, 1452, 63. ♀ [*Arctia*] (1845).
obscura BOHEM., **frontata** ZETT.
Simoyi POK., **frontata** ZETT.
spinichinis PAND., **frontata** ZETT.
verlicina ZETT., ?**frontata** ZETT.

Hydrophoria

R. D., Essai sur les Myod., 503, XI, (1830)

Zaphne R. D., Myod., 527, XXI, (1830)

- absens* WALK., ?*ruralis* MEG.
albiceps MEG., S. B., V, 95, 21. ♀ [*Anthomyia*] (1826). Europa-centr.
ambigua FALL., Musc., 56, 43. ♀ [*Musca*] (1823); ZETT., Dipt. Scand., Europa.
IV, 1445, 27. ♀ [*Arctia*] (1845) et XII, 1749, 27. ♀ [*Arctia*] (1855).
SCHN., F. A., I, 612. ♀ [*Spilogaster*] (1862); ROXB., Ann Soc. Milano, IX,
140, I, ♀ (1866) et Prodr., VI, 175, 7. ♀ (1877); MEAD., Entom.
Monthly Mag., XVIII, 102, (1881); STROB., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XLIH, 242, (1893); MEAD., Deser. List Brit. Anth., I, 30,
I, (1897); PAND., Revue Entom. France, XIX, 221, 6, (1900).
arisa SCHN. (nec MEG.), F. A., I, 609. ♀ [*Spilogaster*] (1862).
lineatocollis ZETT., Ins. Lapp., 679, 78. ♀ [*Anthomyia*] (1838).
annulata PAND., Revue Entom. France, XVIII, 242, 4. ♀ [*Hylemyia*] Europa-centr.
(1899).
hyalipennis STROB. (nec ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XLIII, 243, (1895).
anthomyia ROXB., **ruralis** MEG.
barbiventris ZETT., Dipt. Scand., IV, 1589, 204. ♀ [*Arctia*] (1845). Lapponia.
STROB., Wien. entom. Zeitzg., XXI, 30, (1902).
luculentis ZETT., Dipt. Scand., IV, 1551, 168. ♀ [*Arctia*]
(1845).
brunneifrons ZETT., Ins. Lapp., 690, 126. ♀ [*Anthomyia*] (1838) et Lapponia.
Dipt. Scand., IV, 1660, 26. ♀ [*Anthomyia*] (1845).
leale WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 931. ♀ [*Anthomyia*]
(1849).
hyannifrons ROXB. (nec ZETT.) **divisa** MEG.
cassia MEG., ?**conica** WIED.
caudata ZETT., Dipt. Scand., XII, 1724, 27, 28. ♀ [*Arctia*] (1855). Europa-centr.
SCHN., F. A., I, 634. ♀ [*Hylemyia*] (1862); MEAD., Entom. Monthly et sept.
Mag., XVIII, 103. ♀ (1881) et Deser. List Brit. Anth., I, 30,
3, (1897); PAND., Revue Entom. France, XIX, 221, 5. ♀ (1900).
conica WIED., Zoolog. Mag., I, I, 49, 29. ♀ [*Anthomyia*] (1847); FALL., Europa.
Musc., 83, 107. ♀ [*Musca*] (1825); MEG., S. B., V, 97, 23. ♀ [*Anthomyia*] Asia sept.
(1826); MEG., Suif. à Buff., II, 298, I, (1835); ZETT.,
Ins. Lapp., 689, 124. ♀ [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV,
1652, 48. ♀ [*Anthomyia*] (1845); WALK., Ins. Brit., II, 134, 49.

[*Anthomyia*] (1853); SCHN., F. A., I, 631. [*Hyleniopsis*] (1862).
 RONDI, Atti Soc. Milano, IX, 141, 3. (1866) et Prodr., VI, 172,
 3. (1877); MEAD., Deser. List Brit. Anth., I, 31, 7. (1897); PASO.,
 Revue Entom. France, XVIII, 216, 12. [*Hyleniopsis*] (1899)

zeacasia MACQ., Suit. à Bull., II, 298, 2. (1835).

distincta MEIG., S. B., V, 101, 31. (1826) [*Anthomyia*] (1826).

zabulata FALL., Musc., 82, 102. (1825) [*Musca*] (1825); MEIG., S. B.,

V, 195, 196. (1826) [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Dipt. Scand., IV,
 1651, 19. [*Anthomyia*] (1845); SCHN., F. A., I, 631. [*Hyleniopsis*]
 (1862); STROB., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 241. (1893).

zinquivenda ZETT., Dipt. Scand., VIII, 3397, 18-19. [*Anthomyia*]
 (1849).

monticola ZETT., Dipt. Scand., VIII, 3306, 18-19. [*Anthomyia*]
 (1849).

zuvipicus MEIG., S. B., VII, 321, 51. (1827) [*Hyleniopsis*] (1838).

operosa MEIG., S. B., V, 102, 33. (1826) [*Anthomyia*] (1826); ZETT.,

Dipt. Scand., IV, 1657, 22. [*Anthomyia*] (1845) et XI, 1740, 22.
 [*Anthomyia*] (1855); STROB., Verh. zool. bot. Ges. Wien,
 XLIII, 244. (1893); MEAD., Entom. Monthly Mag., XVIII,
 269. (1892) [*Hyleniopsis*] (1882) et Deser. List Brit. Anth., I, 37, 18.
 [*Hyleniopsis*] (1897).

zagittariae R. D., Myod., 505, 6. (1830); MACQ., Suit. à Bull.,
 II, 298, 3. (1835); MEIG., S. B., VII, 320, 50. (1827) [*Hyleniopsis*]
 (1838).

zabulata WALK., Ins. Brit., II, 135, 50. [*Anthomyia*] (1853)

tibialis R. D., Myod., 505, 5. (1830).

var. alpicola STROB., Mittl. Ver. Steiermark, 1897, 241. (1898).

var. diabata PASO., Revue Entom. France, XVIII, 216. [*Hyleniopsis*]
 (1899).

coronata ZETT. = *divisa* MEIG.

dignola BUDSK. = ?*divisa* MEIG.

dispar MACQ. = *divisa* MEIG.

distincta MEIG. = *conica* WOOD.

divisa MEIG., S. B., V, 99, 27. (1826) [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Dipt.
 Scand., XI, 1723, 27-28. (1855) [*Arctia*] (1855); MÜLL., Verh. zool.-bot.
 Ges. Wien, XVII, 122. (1867) [*Sphopastis*] (1867); MEAD., Entom.
 Monthly Mag., XVIII, 402. (1891) et Deser. List Brit. Anth., I,
 30, 2. (1897); PASO., Revue Entom. France, XVIII, 215, 8.
 [*Hyleniopsis*] (1899).

brunneifrons RONDI, *Opusc. Zett.*, Atti Soc. Milano, IX, 141, 3.
 (1866) et Prodr., VI, 174, 3. (1877); MEAD., Entom.
 Monthly Mag., XVIII, 403. (1891) et Deser. List Brit.
 Anth., I, 32, 3. (1897).

coronata ZETT., Dipt. Scand., IV, 1658, 23. (1845) [*Anthomyia*]
 (1845) et XIV, 6275, 23. (1899) [*Anthomyia*] (1899); SCHN., F. A.,
 I, 631. [*Hyleniopsis*] (1862); BUDSK., Entom. Tidskr., XIII,
 94, 3. (1894) [*Hyleniopsis*] (1894).

Europa
 Africa (sept.)

- zalignola* BIDENK., Entom. Tidskr., XI, 199. ♀ [*Anthomyza*] (1890).
dispar MACQ., Suït. à Buff., II, 317. 7. ♀ [*Hylemyia*] (1835).
egerioides R.-D., Myod., 527. 2. ♀ [*Zaphne*] (1830).
hylemyoides R.-D., Myod., 527. 1. ♀ [*Zaphne*] (1830).
nymphacae R.-D., Myod., 504. 2. ♂ (1830); MACQ., Suït. à Buff., II, 300. 10. ♂ (1835).
nymphacicola R.-D., Myod., 506. 7. ♀ (1830).
trapeae R.-D., Myod., 505. 3. (1830).
- divisa* SCHN. (nec MEIG.) = **ambigua** FALL.
dubitata FALL. = ?**conica** WIED.
egerioides R.-D. = ?**divisa** MEIG.
flexiloba PAND., Revue Entom. France, XVIII, 215. 9. [*Hylemyia*] Gallia. (1899).
 ?**fuliginosa** R.-D., Myod., 505. 4. ♂ (1830). Gallia.
fusca MEADE, Deser. List Brit. Anth., I, 31. 4. ♂ (1897). Britannia.
gracilis ZETT. = **linogrisea** MEIG.
hyalipennis STROBL (nec ZETT.) = **annulata** PAND.
hyalipennis ZETT. = ?**sociata** MEIG.
hylemyoides R.-D. = ?**divisa** MEIG.
ignobilis ZETT., Dipt. Scand., IV, 1448. 59. ♂ [*Aricia*] (1845); STEIN, Scandinavia. Wien. entom. Zeitg. XXI, 33. (1902).
inquirenda ZETT. = ?**conica** WIED.
interposita RONN. = **linogrisea** MEIG.
lineatocollis ZETT. = **ambigua** FALL.
linogrisea MEIG., S. B., V, 129. 82. [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Dipt. Europa. Scand., IV, 1659. 24. [*Anthomyza*] (1845); SCHN., F. A., I, 631. [*Hylemyia*] (1862); RONN., Prodr., VI, 170. 1. (1877); MEADE, Deser. List Brit. Anth., I, 31. 5. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 217. [*Hylemyia*] (1899).
gracilis ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6274. 22 -23. ♂ [*Anthomyza*] (1860).
interposita RONN., Bull. Soc. entom. Ital., II, 325. 7. ♀ (1870).
repens MEIG., S. B., V, 128. 81. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suït. à Buff., II, 316. 2. [*Hylemyia*] (1835); SCHN., F. A., I, 630. [*Hylemyia*] (1862).
sericata STROBL (nec MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 217. ♀ [*Hylemyia*] (1893).
vanthopus MEIG., S. B., V, 130. 84. ♂ [*Anthomyia*] (1826).
- ?**liturata** MACQ., Suït. à Buff., II, 302. 17. ♀ (1835). Gallia.
laeviventris ZETT. = **barbiventris** ZETT.
mutulata MACQ. = **ruralis** MEIG.
monticola ZETT. = **conica** WIED.
 ?**nana** MACQ., Suït. à Buff., II, 302. 18. ♀ (1835). Gallia.
nigricans MEIG. = ?**conica** WIED.
nymphacae R.-D. = ?**divisa** MEIG.
nymphacicola R.-D. = ?**divisa** MEIG.
operosa MEIG. = **conica** WIED.

- ?*pallipes* R.-D., *Myol.*, 507, 2. [? *Polania*] (1830); *Myog.*, Suit. à Buff., Gallia, Buff., H. 299, 7. (1835); *Meig.*, S. B., VII, 324, 53. [? *Hylomyia*] (1838).
- palposa* STEIN, *Entom. Nachr.*, XXIII, 320, 1. (1897); *Pavd.*, *Revue Entom. France*, XVIII, 219, 1. (1899). Europe-centr.
- ?*pucta* MEIG., S. B., V, 96, 23. [? *Anthomyia*] (1826).
- patellans* PAVD., *Revue Entom. France*, XIX, 222, 8. (1900). Gallia
- plumosior* PAVD., *ruralis* MEIG.
- potamogeti* R.-D., *Myol.*, 501, 1. (1830); *Myog.*, Suit. à Buff., Gallia, H. 300, 9. (1835); *Meig.*, S. B., VII, 317, 28. [? *Hylomyia*] (1838).
- pucta* MEIG. ?*palposa* STEIN.
- repens* MEIG. *linogrisea* MEIG.
- ruralis* MEIG., S. B., V, 101, 32. [? *Anthomyia*] (1826). Europa
- ?*absens* WALK., *Insc. Brit.*, H. 435, 51. [? *Anthomyia*] (1853).
- anthomyia* ROSS, *Atti Soc. Milano*, IX, 111, 5. (1866) et *Prodr.*, VI, 171, 2. (1877); *Meidr.*, *Entom. Monthly Mag.*, XVIII, 103. (1881); *Strobl.*, *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XLIII, 243 (1893); *Meidr.*, *Descr. List Brit. Anth.*, 1, 31, 6. (1897).
- maculata* *Myog.*, Suit. à Buff., H. 299, 5. (1835); *Meig.*, S. B., VII, 320, 51. [? *Hylomyia*] (1838).
- plumosior* PAVD., *Revue Entom. France*, XVIII, 216, 11. [? *Hylomyia*] (1899).
- ?*testacea* R.-D., *Myol.*, 506, 8. (1830); *Myog.*, Suit. à Buff., H. 298, 1. (1835).
- scyllarum* R.-D. ?*conica* WIED.
- septimalis* PAVD., *Revue Entom. France*, XVIII, 220, 1. (1899). Gallia
- sericata* STROBL. (*nov. Meig.*) *linogrisea* MEIG.
- sociata* MEIG., S. B., V, 98, 26. [? *Anthomyia*] (1826). Europe-centr.
- ?*hypoleucis* ZELL., *Dipt. Scand.*, XIV, 1720, 27-28. [? *Tricia*] (1835).
- speculiventris* PAVD., *Revue Entom. France*, XIX, 221, 7. (1900). Austria
- subtracta* WALK. ?*conica* WIED.
- teale* WALK. *brunneifrons* ZELL.
- testacea* R.-D. ?*ruralis* MEIG.
- tibialis* R.-D. ?*conica* WIED.
- trapat* R.-D. ?*divisa* MEIG.
- ?*trivittata* ZELL., *Dipt. Scand.*, XIV, 626, 9-10. [? *Anthomyia*] (1830). Suecia
- ?*vetula* ZELL., *Dipt. Scand.*, IV, 1639, 25. [? *Anthomyia*] (1815). Suecia
- Wierzejskii* MÜK., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XVII, 420. [? *Spilogaster*] (1867); *Pavd.*, *Revue Entom. France*, XVIII, 219, 1. (1899). Europe-centr.
- anthopis* MEIG. *linogrisea* MEIG.

Hylemyia

R.-D., Essai sur les Myod., 570. I. (1830)

? *Chlor* R.-D., Myod., 560. VI. (1830).*Delia* R.-D., Myod., 571. XII. p. p. (1830).? *Egyria* R.-D., Myod., 555. II. (1830)

- acerba* PAND., Revue Entom. France, XIX, 232-22. [*Hydrophoria*] Europe centr. (1900).
- aequalis* ZERT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., V, 1791, 175. ♀ [*Anthomyia*] Dania. (1846).
- agrestis* R.-D., Myod., 555, 16. (1830); Mycq., Suit. à Buff., II, 318. Gallia. II. (1835); MEIG., S. B., VII, 319, 33. (1838).
- agricola* R.-D., Myod., 573, 5. [*Delia*] (1830). Gallia.
- ? *allecta* WALK., Ins. Brit., II, 134, 47. [*Anthomyia*] (1853). Britannia.
- angusta* STEIN, Berlin, entom. Zeitschr., XLII, 218, II of 285. (1897). Germania.
- angustifrons* STROEL. (nec MEIG.) — *antiqua* MEIG.
- antiqua* MEIG., S. B., V, 166, 115. [*Anthomyia*] (1826); ZERT., Dipt. Europa. Scand., IV, 1566, 180. [*Aricia*] (1845); SCHN., F. A., 6E3. [*Anthomyia*] (1862); ROYD., Atti Soc. Milano, IX, 481, 5. (1866); TASCHEBERG, Entom. für Gärtner, 382, 169. [*Anthomyia*] (1871); ROYD., Prodr., VI, 186, 7. (1877); TASCHEBERG, Praef. Insectenke, 126, 59. [*Anthomyia*] (1880); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 269. (1882) et Deser. List Brit. Anth., I, 36, 13. (1897). PAND., Revue Entom. France, XIX, 231, 21. [*Hydrophoria*] (1900).
- angustifrons* STROEL. (nec MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 259. [*Anthomyia*] (1893).
- ? *cecropicola* R.-D., GERM.-MEXX., Rev. et Mag. Zool., II, 3, 231. I. [*Anthomyia*] (1851).
- ceparum* MEIG., S. B., VI, 376, 247. ♀ [*Anthomyia*] (1830). BOUCHÉ, Naturgesch. d. Gartenins., 129, I. [*Anthomyia*] (1833) et Naturgesch. d. Ins., I, 73, 59. [*Anthomyia*] (1831).
- ceptorum* MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX, 248. [*Phorbia*] (1883) et Deser. List Brit. Anth., II, 52, 19. [*Phorbia*] (1897).
- cinerea* MEADE (nec FALL.), Entom. Monthly Mag., XIX, 147. ♀ [*Chorophila*] (1882), XXIII u. XXIV, 51. ♀ [*Chorophila*] (1887) et ser. 2, IV, 220. ♀ [*Chorophila*] (1893).
- libarariae* RATZER, Forstins., III, 170, I. ♀ [*Musca*] (1811)
- arvensis* R.-D., Myod., 554, 15. ♀ (1830); Mycq., Suit. à Buff., II, 320, 20. ♀ (1835). Gallia.
- arvicola* R.-D., Myod., 573, 6. [*Delia*] (1830). Gallia.
- asella* MEIG. — *lasciva* ZERT.
- atrata* R.-D., Myod., 571, 8. ♀ [*Delia*] (1830). Gallia.
- autumnalis* R.-D., Myod., 554, 13. (1830). Gallia.
- ? *betae* HOLMGR., Entom. Tidskr., I, 89. [*Aricia*] (1880). Europa sept.
- bicalearia* PAND., Revue Entom. France, XIX, 233, 25. [*Hydrophoria*] Germania. (1900).

- biciliaris** PAND., Revue Entom. France, XIX, 232, 24. ♀ [*Hydrophoria*] (1900). Germania.
- bracata** ROND., Atti Soc. Milano, IX, 183, 12. (1866) et Prodr., VI, 190, 12. (1877). Italia.
- brunneilinea** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1148, 58. ♂ [*Aricia*] (1845); WALK., Ins. Brit., II, 111, 70. ♀ [*Anthomyia*] (1853); ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6212, 58. ♂ [*Aricia*] (1860).
frontata STROBL (nec ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 244. [*Hydrophoria*] (1893).
laticentris ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6269, 10-12. ♂ [*Aricia*] (1860).
schisticolor ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6215, 66-67. ♂ [*Aricia*] (1860).
seticrura ROND., Atti Soc. Milano, IX, 179, 2. ♂ (1866) et Prodr., VI, 183, 4. ♂ (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 267. (1882); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 247. (1893); MEADE, Deser. List Brit. Anth., I, 34, 5. (1897); PAND., Revue Entom. France, XIX, 225, 12. [*Hydrophoria*] (1900).
- brunnescens** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1455, 66. ♂ [*Aricia*] (1845) et XIV, 6214, 66. [*Aricia*] (1860); STEIN, Entom. Nachr., XVI, 302, 4. (1890); PAND., Revue Entom. France, XIX, 237, 33. [*Hydrophoria*] (1900). Europa.
cardui SCHN. (nec MEIG.), F. A., I, 645. [*Anthomyia*] (1862).
floralis FALL. var. ♂, Musc., 71, 76. ♂ [*Musca*] (1821).
fuligo R.-D., Myod., 574, 9. ♂ [*Delia*] (1830).
mutata R.-D., Myod., 574, 10. ♂ [*Delia*] (1830).
nigrescens MEADE (nec ROND.), Entom. Monthly Mag., XVIII, 268. ♂ (1882) et Deser. List Brit. Anth., I, 34, 7. ♂ (1897).
- brunnescens* ROND. (nec ZETT.) = **nigrescens** ROND.
- catylica* R.-D. = ?**antiqua** MEIG.
- caesia** MACQ., Suit. à Buff., H, 318, 12. ♂ (1835); MEIG., S. B., VII, 318, 31. ♂ (1838); PERRIS, Annal. Soc. entom. France, 336, 21. (1870). Gallia.
- candens* STROBL (nec ZETT.) = **cinerea** FALL.
- cardui** MEIG., S. B., V, 104, 37. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., H, 321, 22. (1835). Europa, Caucasus.
cinerella SCHN. (nec MEIG.), F. A., I, 628. (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 268. ♂ (1882); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 248. (1893).
ciniventris ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6211, 160-161. ♂ [*Aricia*] (1860); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 248. (1893); PAND., Revue Entom. France, XIX, 226, 13. [*Hydrophoria*] (1900).
floricola R.-D., Myod., 572, 1. [*Delia*] (1830).
impressitarsis MACQ., Suit. à Buff., II, 335, 8. [*Anthomyia*] (1835).

- lychnidis* KALTESB., Pflanzenfeinde, 55, 27. [*Anthomyia*] (1874):
 MIK, Wien. entom. Zeitg., XIX, 148-8. (1900).
- oralis* MACQ. (nec R.-D.), Suit. à Buff., II, 323, 4. ? [*Chortophila*] (1835).
- parallelicentris* SCHN. (nec ZETT.), F. A., I, 629. ? (1862).
- penicillaris* ROND., Atti Soc. Milano, IX, 180, 4. (1866) et Prodr.,
 VI, 184, 6. (1877); STEIN, Entom. Nachr., XVI, 300, 2. (1890):
 MEADE, Descr. List Brit. Anth., I, 36, 12. (1897).
- var. nuda* STROBL, Tief's dipt. Nachl., 48. (1899).
- cardui** MEADE (nec MEIG.), Entom. Monthly Mag., XVIII, 267. ? Europacentr.
 (1882); STEIN, Entom. Nachr., XVI, 301, 3. (1890); MEADE, Descr.
 List Brit. Anth., I, 34, 6. ? (1897); PAND., Revue Entom. France,
 XIX, 238, 34. [*Hydrophoria*] (1900).
- cardui* SCHN. (nec MEIG.) = **brunnescens** ZETT.
- ceparum* MEIG. = **antiqua** MEIG.
- ceptorum* MEADE = **antiqua** MEIG.
- ciliatocosta* ZETT. = **lineariventris** ZETT.
- cinerascens** MEIG., S. B., V, 150, 116. ♀ [*Anthomyia*] (1826). Europacentr.
- cinerascens* R.-D. = **pullula** ZETT.
- cinerea** FALL., Musc., 70, 75. ? [*Musca*] (1824); MEIG., S. B., V, Europa.
 199, 203. [*Anthomyia*] (1826).
- candens* STROBL (nec ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII,
 261. [*Anthomyia*] (1893).
- ? *spinosa* ROND., Atti Soc. Milano, IX, 181, 7. ? (1866) et
 Prodr., VI, 187, 9. ? (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag.,
 2, ser. IV, 222. ? (1893) et Descr. List Brit. Anth., I, 35,
 9. ? (1897); PAND., Revue Entom. France, XIX, 230, 19.
 [*Hydrophoria*] (1900).
- cinerea* MEADE (nec FALL.) = **antiqua** MEIG.
- cinrella* MEADE (nec MEIG.) = ? **tristriata** STEIN.
- cinrella** MEIG. (nec FALL.), S. B., V, 100, 30. [*Anthomyia*] (1826). Germania.
- cinrella* SCHN. (nec MEIG.) = **cardui** MEIG.
- cinerosa* PAND. (nec ZETT.) = **lamelliseta** STEIN.
- cinerosa** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1450, 61. [*Aricia*] (1845); MEADE, Europa.
 Entom. Monthly Mag., XVIII, 268. ? (1882) et Descr. List Brit.
 Anth., I, 35, 10. (1897).
- canthoptera* BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 83, 27.
 [*Aricia*] (1863).
- coarctata** FALL., Musc., 84, 108. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V, Europa.
 130, 85. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 322, 26. Asia sept.
 (1835); ZETT., Ins. Lapp., 690, 127. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt.
 Scand., IV, 1644, 10. [*Anthomyza*] (1845) et VIII, 3304, 10. [*Anthomyza*]
 (1849); WALK., Ins. Brit., II, 138, 62. [*Anthomyia*]
 (1853); SCHN., F. A., I, 629. (1862); TASCHENBERG, Naturg. wirbell.
 Tiere, 245. [*Anthomyia*] (1865) et Pract. Insectenkde, 119, 48.
 [*Anthomyia*] (1880); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 269.
 (1882) et XXIII u. XXIV, 54. (1887) et Descr. List Brit. Anth.,

- l. 37, 19. (1897); PAND., Revue Entom. France, XIX, 224, 10. [*Hydrophoria*] (1900).
leptogaster ZETT., Ins. Lapp., 666, 23. ♂ [*Anthomyia*] (1838).
conica FALL., var. ♂ u. ♀ = **strigosa** FABR.
 ?**conjuncta** MEIG., S. B., V, 129, 83. ♂ [*Anthomyia*] (1826); Macq., Suit. à Buff., II, 317, 4. (1835). Germania.
crassirostris MEIG. = **flavipennis** FALL.
eriniventris ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6268, 10—11. ♂ [*Anthomyia*] (1860); STEIN, Entom. Nachr., XVI, 298, 1. (1890); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I, 37, 20. (1897). Europa.
libiaria ROXD., Atti Soc. Milano, IX, 183, 11. ♂ (1866) et Prodr., VI, 189, 11. ♂ (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 270. ♂ (1882).
eriniventris ZETT. [*Aricia*] = **cardui** MEIG.
deceptor R.-D. = **riparia** R.-D.
 ?**facilis** MEIG., S. B., VII, 319, 34. ♀ (1838). Patria ?
ferrugineocollata ZETT. = **strigosa** FABR.
flabellifera PAND., Revue Entom. France, XIX, 234, 27. ♂ [*Hydrophoria*] (1900). Germania.
flavipennis FALL., Muse., 59, 52. [*Musca*] (1823); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1420, 31. [*Aricia*] (1845); WALK., Ins. Brit., II, 138, 61. [*Anthomyia*] (1853); SCHN., F. A., I, 628. (1862); ROXD., Atti Soc. Milano, IX, 180, 3. (1866) et Prodr., VI, 182, 2. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 266. (1882); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 246. (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I, 33, 2. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 213, 7. (1899). Europa.
crassirostris MEIG., S. B., V, 107, 42. [*Anthomyia*] (1826); Macq., Suit. à Buff., II, 319, 16. (1835).
flavipennis R.-D., Myod., 553, 11. (1830); Macq., Suit. à Buff., II, 320, 18. (1835); MEIG., S. B., VII, 322, 57. (1838). Gallia.
flavoptera R.-D., Myod., 554, 14. (1830); Macq., Suit. à Buff., II, 320, 19. (1835). Gallia.
floralis FALL., var. ♂ = **brunnescens** ZETT.
florica R.-D. = **variata** FALL.
floricola R.-D. = **cardui** MEIG.
fontana STROBL. (nec ZETT.) = **brunneilinea** ZETT.
fuligo R.-D. = **brunnescens** ZETT.
fuscinervis ZETT. = **tetra** MEIG.
Garbiglietti ROXD., Atti Soc. Milano, IX, 184, 16. ♂ (1866) et Prodr., VI, 193, 16. ♂ (1877). Italia.
grisea FALL., Muse., 57, 45. [*Musca*] (1823); Macq., Suit. à Buff., II, 319, 14. (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1421, 32. [*Aricia*] (1845); ROXD., Atti Soc. Milano, IX, 182, 9. ♂ (1866) et Prodr., VI, 181, 2. ♂ (1877); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 212, 3. (1899). Europa.
hortensis R.-D., Myod., 556, 2 [*Aricia*] (1830); Macq., Suit. à Buff., II, 321, 21. (1835). Gallia.

- hymnalis* R.-D. = **nigrimana** MEIG.
immatura ZETT., Dipt. Scand., IV, 1649, 15. ♀ [*Anthomyza*] (1845). Scandinavia.
impressitarsis MACQ. = **cardui** MEIG.
insularis KUNTZE = **lavata** BOHEM.
intermedia MEIG. = ?**puella** SCHIX.
lamelliseta STEIN, Entom. Nachr., XXVI, 312, 7. (1900). Europacentr.
cinerosa PAND. (nec ZETT.), Revue Entom. France, XIX, 234. et occ.
 28. ♂ [*Hydrophoria*] (1900).
lanceolata ZETT. var. = **tetra** MEIG.
lasciva ZETT., Ins. Lapp., 666, 22. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., Europacentr.
 IV, 1419, 30. [*Aricia*] (1845); SCHIX., F. A., I, 631. (1862); MEADE, et sept.
 Entom. Monthly Mag., XVIII, 266. (1882); STROBL, Verh. zool.-
 bot. Ges. Wien, XLIII, 245. (1893); MEADE, Descr. List Brit.
 Anth., I, 34, 4. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII,
 212, 5. (1899).
asella MEIG., S. B., V, 110, 47. ♀ [*Anthomyia*] (1826).
partita MEIG., S. B., V, 100, 29. ♂ [*Anthomyia*] (1826).
laticentris ZETT. = **brunneilinea** ZETT.
lavata BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XX, 83, 28. [*Antho-* Europa sept.
myza] (1863).
insularis KUNTZE, Deutsche entom. Zeitschr., 335. ♀ [*Chorto-*
phila] (1894) et 54. ♂ [*Chortophila*] (1896).
leptogaster ZETT. = **coarctata** FALL.
lineariventris ZETT., Dipt. Scand., IV, 1541, 152. [*Aricia*] (1845). Europacentr.
ciliatocosta ZETT., Dipt. Scand., IV, 1543, 155. ♀ [*Aricia*] (1845). et sept.
littorata R.-D. = **variata** FALL.
littorata R.-D. [*Delia*] = **pullula** ZETT.
littorariae RATZEL. = **antiqua** MEIG.
 ?**longicornis** BOCHÉ, Naturgesch. d. Ins., I, 85, 73. [*Anthomyia*] Germania.
 (1834).
longula MEIG. (nec FALL.) = **pullula** ZETT.
lophota PAND., Revue Entom. France, XIX, 236, 32. ♂ [*Hydro-* Germania.
phoria] (1900).
lucipes R.-D. = **nigrimana** MEIG.
lychnidis KALTENB. = **cardui** MEIG.
maculipes ZETT. p. p. = **pseudomaculipes** STROBL.
majuscula POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX, 561. ♂ [*Chorto-* Europacentr.
phila] (1889). et sept.
maura R.-D. = **brunnescens** ZETT.
megatricha KERT., III, asiatische Forschungsreise des Grafen Zichy, Asia sept.
 II, 199, 153. (1901).
munda MEIG., S. B., V, 124, 23. ♂ [*Anthomyia*] (1826); SCHIX., F. Europacentr.
 A., I, 632. (1862).
nigrescens RONDI., Prodr., VI, 186, 8. ♂ (1877); STROBL, Verh. Europacentr.
 zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 249. ♂ (1893). et mer.
brunnescens RONDI. (nec ZETT.), Atti Soc. Milano, IX, 181, 6. ♂ (1866).

nigrescens MEADE (nec ROND.) **brunnescens** ZETT.

nigrimana MEIG., S. B., V, 132, 88. ♀ [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Europa.

Dipt. Scand., IV, 1656, 21. ♀ [*Anthomyia*] (1845); SCHN., F. A.,

1. 630, (1862); ROND., Atti Soc. Milano, IX, 184, 14, (1866) et Prodr., VI, 192, 14. ♀ (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 269, (1882) et Deser. List Brit. Anth., I, 36, 16, (1897).

lyemalis R.-D., Myod., 552, 5. ♀ (1830).

luteipes R.-D., Myod., 551, 4. ♀ (1830).

silvicola R.-D., Myod., 551, 3, (1830); MACQ., Suit. à Buff., II,

317, 5, (1835); MEIG., S. B., VII, 319, 49, (1835).

nitida MACQ., Suit. à Buff., II, 321, 24. ♀ (1835).

Gallia.

obscuripennis ZETT. **tetra** MEIG.

operosa PAND. (nec MEIG.) **puella** SCHN.

oralis MACQ. (nec R.-D.) = ?**cardui** MEIG.

paralleliventris SCHN. (nec ZETT.) = **cardui** MEIG.

paralleliventris ZETT., Dipt. Scand., XII, 4725, 31-32. ♀ [*Arctia*] Scandinavia.
(1855).

partita MEIG. = **lasciva** ZETT.

penicillaris ROND. = **cardui** MEIG.

piliventris POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX, 558, (1889).

Jugum Ste-
vianum.

plebeja R.-D. (nec FABR.) = **strigosa** FABR.

plumosula R.-D., Myod., 575, 11. ♀ [*Delia*] (1830).

Gallia.

?**plumosula** R.-D., Myod., 604, 2. ♀ [*Phyllis*] (1830).

Gallia.

praepotens WIED., Zool. Mag., I, 1, 83, 36, [*Anthomyia*] (1817);

Europa.

FALL., Musc., 83, 106, [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V, 127, 80,

[*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 316, 1, (1835);

ZETT., Dipt. Scand., IV, 1701, 75, [*Anthomyia*] (1845); WALK.,

Ins. Brit., II, 139, 63, [*Anthomyia*] (1853); SCHN., F. A., I, 630,

(1862); ROND., Atti Soc. Milano, IX, 184, 15, (1866) et Prodr.,

VI, 192, 15, (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 269,

(1882) et Deser. List Brit. Anth., I, 36, 17, (1897); PAND., Revue

Entom. France, XVIII, 210, 1, (1899).

pseudomaculipes STROBL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 249,

Europacentr.
et sept.

(1896).

maculipes ZETT., Dipt. Scand., IV, 1708, 83. ♀, p. p. [*Anthomyia*]

(1845) et VIII, 3316, 83. ♀, p. p. [*Anthomyia*] (1849).

puella SCHN. (nec MEIG.), F. A., I, 629, (1862); MEADE, Entom.

Europacentr.

Monthly Mag., XVIII, 269, (1882) et Deser. List Brit. Anth., I,

36, 14, (1897).

?*intermedia* MEIG., S. B., V, 102, 34, [*Anthomyia*] (1826).

operosa PAND. (nec MEIG.), Revue Entom. France, XIX, 224

11, [*Hydrophoria*] (1900).

?*virida* R.-D., Myod., 552, 7. ♀ (1830); MACQ., Suit. à Buff.,

II, 318, 8. ♀ (1835).

pullula ZETT., Dipt. Scand., IV, 1119, 60, [*Arctia*] (1845); WALK.,

Europa.

Ins. Brit., II, 138, 60, [*Anthomyia*] (1853); SCHN., F. A., I, 650,

[*Anthomyia*] (1862); ROND., Atti Soc. Milano, IX, 179, 1, (1866)

Algeria,
Syria.

- et Prodr., VI. 184. 5. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII. 268. (1882) et Deser. List Brit. Anth., I. 35. 11. (1897); PAND., Revue Entom. France, XIX. 227. 14. [*Hydrophoria*] (1900).
cineascens R.-D., Myod., 575. 13. [*Delia*] (1830).
liturata R.-D., Myod., 575. 12. [*Delia*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 335. 9. [*Anthomyia*] (1835).
longula MEIG. (nec FALL.), S. B., V. 103. 36. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 321. 23. (1835).
vernalis R.-D., Myod., 576. 14. [*Delia*] (1830).
- quaerenda** PAND., Revue Entom. France, XIX. 229. 18. ♂ [*Hydrophoria*] (1900). Germania.
- riparia** R.-D., Myod., 572. 2. [*Delia*] (1830). Gallia.
deceptoria R.-D., Myod., 573. 4. [*Delia*] (1830).
vicina R.-D., Myod., 572. 3. [*Delia*] (1830).
- ?**rufa** MEIG., S. B., VII. 322. 66. ♀ (1838). Germania?
- rastica* R.-D. = **variata** FALL.
schisticolor ZETT. = **brunneilinea** ZETT.
selicrara ROND. = **brunneilinea** ZETT.
- silvatica** R.-D., Myod., 555. 1. ♀ [*Egeria*] (1830). Gallia.
- ?**silvicola** R.-D., Myod., 561. 1. [*Chloë*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 328. 17. [*Chorthophila*] (1835). Gallia.
- silvicola* R.-D. = **nigrimana** MEIG.
- ?**socculata** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1683. 52. ♂ [*Anthomyza*] (1845). Scandinavia.
- spinosa* ROND. = ?**cinerea** FALL.
- stimulea** PAND., Revue Entom. France, XIX. 232. 23. ♀ [*Hydrophoria*] (1900). Gallia.
- strenua* R.-D. = **strigosa** FABR.
- strigosa** FABR., Entom. syst., IV. 322. 39. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 296. 61. [*Musca*] (1805); MEIG., S. B., V. 131. 87. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 317. 3. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 689. 125. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1654. 20. [*Anthomyza*] (1845); SCHM., F. A., I. 630. (1862); ROND., Atti Soc. Milano, IX. 184. 13. (1866) et Prodr., VI. 191. 13. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII. 269. (1882); STROM. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 246. (1893); MEADE, Deser. List Brit. Anth., I. 36. 15. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 211. 2. (1899).
conica FALL. var. ♂ et ♀; MUSE., 83. 107. [*Musca*] (1825).
ferrugineocirrata ZETT., Dipt. Scand., IV. 1703. 76. ♀ [*Anthomyza*] (1845); WALK., Ins. Brit., II. 139. 64. [*Anthomyia*] (1853).
plebeja R.-D. (nec FABR.), Myod., 551. 2. (1830).
strenua R.-D., Myod., 550. 1. ♂ (1830).
- subcalva** PAND., Revue Entom. France, XIX. 230. 20. ♀ [*Hydrophoria*] (1900). Gallia.
- ?**tempta** WALK., Ins. Brit., II. 139. 65. [*Anthomyia*] (1853). Britannia.
- tenuiventris** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6205. 31—33. [*Aricia*] (1860). Scandinavia.

- testacea** R.-D., Myod., 556, 3. [*Egeria*] (1830); Macq., Suit. à Buff., II, 321, 25. (1835). Gallia.
- tetra** MEG., S. B., V, 158, 131. ♂ [*Anthomyia*] (1826); SCHIX., F. A., I, 639. [*Anthomyia*] (1862). Europacentr.
fusciverris ZETT., Ins. Lapp., 671, 44. ♀ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1438, 48. ♂ [*Aricia*] (1845). et sept.,
lanceolata ZETT. var., Ins. Lapp., 672, 45. ♀ [*Anthomyza*] (1838). Asia sept.
obscuripennis ZETT., Ins. Lapp., 672, 47. ♂ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1439, 49. ♂ [*Aricia*] (1845); WAMBERG., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., IX, 185. [*Aricia*] (1852).
- tibialis** R.-D., Myod., 552, 6. ♂ (1830); Macq., Suit. à Buff., II, 317, 6. (1835). Gallia.
- tibiaria* ROND. = **criniventris** ZETT.
- tristriata** STEIN, Entom. Nachr., XXVI, 310, 6. (1900). Europacentr.
zincarella MEADE (nec MEG.), Descr. List Brit. Anth., I, 35, 8. ♂ (1897).
- unicillata** PAND., Revue Entom. France, XIX, 235, 29. ♂ [*Hypophoria*] (1900). Europacentr.
- vacans** PAND., Revue Entom. France, XIX, 235, 30. [*Hypophoria*] (1900). Germania.
- variata** FALL., Musc., 59, 51. [*Musca*] (1823); MEG., S. B., V, 97, 24 [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 667, 25. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1418, 29. [*Aricia*] (1845); SCHIX., F. A., I, 628. (1862); ROND., Atti Soc. Milano, IX, 182, 8. (1866) et Prodr., VI, 188, 10. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 266. (1882); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 245. (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I, 34, 3. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 213, 6. (1899). Europa,
florica R.-D., Myod., 554, 12. ♀ (1830). Asia sept.
liturata R.-D., Myod., 553, 10. (1830).
rustica R.-D., Myod., 553, 9. (1830); Macq., Suit. à Buff., II, 318, 10. (1835); MEG., S. B., VII, 318, 32. (1838).
- venalis** R.-D. = **pullula** ZETT.
- viatica** R.-D., Myod., 574, 7. [*Delia*] (1830). Gallia.
- vicina** R.-D. = **riparia** R.-D.
- virginea** MEG., S. B., V, 96, 22. ♂ [*Anthomyia*] (1826); SCHIX., F. A., I, 628. ♂ (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII, 266. (1882); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 245. (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I, 33, 1. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 215, 10. (1899). Europa.
- vivida** R.-D. = **puella** SCHIX. (nec MEG.)
- zanthoptera** BOHEM. = **cinerosa** ZETT.

Acyglossa

ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 175, XX, (1866).

- atramentaria** MEIG., S. B., V, 153, 23, ♀ [*Anthomyia*] (1826); PAND., Revue Entom. France, XIX, 247, 2, [*Chortophila*] (1900).
corvina Lw., Berlin, entom. Zeitschr., XVII, 46, 48, ♀ [*Anthomyia*] (1873).
diversa ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 175, 1, (1866) et Prodr., VI, 232, 1, (1877).
corvina Lw. p. p. = **atramentaria** MEIG.
diversa ROSD. = **atramentaria** MEIG.

Europacentr.
et mer.

Eustalomyia

Kow., Wien, entom. Zeitg., X, 101, (1891).

Hylemyia R.-D., Essai sur les Myod., 550, 1, p. p. (1830).

- arrogans** ROSD. = **vittipes** ZETT.
brivia WALK. = **histrío** ZETT.
decorata ZETT. = **vittipes** ZETT.
festiva ZETT., Dipt. Scand., IV, 1424, 34, ♀ [*Aricia*] (1845); SCHX., F. A., I, 627, [*Hylemyia*] (1862); Kow., Wien, entom. Zeitg., X, 104, 2, (1891); MEADE, Entom. Monthly Mag., 2, ser. IV, 222, ♀ [*Hylemyia*] (1893) et Deser. List Brit. Anth., I, 38, 2, (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 209, 1, (1899).
hilaris FALL., Musc., 57, 44, [*Masca*] (1823); MEIG., S. B., V, 94, 49, [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 319, 13, [*Hylemyia*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 666, 21, [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1423, 33, [*Aricia*] (1845) et XIV, 6206, 33, [*Aricia*] (1860); SCHX., F. A., I, 627, [*Hylemyia*] (1862); ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 182, 10, [*Hylemyia*] (1866) et Prodr., VI, 181, 1, [*Hylemyia*] (1877); Kow., Wien, entom. Zeitg., X, 104, 3, (1891); MEADE, Deser. List Brit. Anth., I, 38, 1, (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 207, 4, [*Anthomyia*] (1899).
hilaris MEIG. (nec FALL.), S. B., V, 319, 13, ♀ [*Anthomyia*] (1826).
histrío ZETT., Ins. Lapp., 676, 64, [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1517, 127, [*Aricia*] (1845) et XIV, 6235, 127, [*Aricia*] (1860); ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 167, 17, [*Chortophila*] (1866) et Prodr., VI, 215, 17, [*Chortophila*] (1877); Kow., Wien, entom. Zeitg., X, 103, 1, (1891); MEIG., Bull. Soc. entom. France, CCVII, [*Chortophila*] (1892); MEADE, Deser. List Brit. Anth., I, 38, 3, (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 209, 2, (1899).
brivia WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 916, ♀ [*Anthomyia*] (1849).
vittipes ZETT., Dipt. Scand., IV, 1649, 16, ♀ [*Anthomyia*] (1845); Kow., Wien, entom. Zeitg., X, 106, 4, ♀ (1891); STEIX, Berlin, entom. Zeitschr., XLII, 222, 1, ♀ (1897).

Europacentr.
et sept.

Europa.

Europacentr.
Europa.

Europa.

- arrogans* ROSEN., Atti Soc. Milano, IX, 185, 17. [*Anthomyia*] (1866) et Prodr., VI, 191, 17. [*Hylemyia*] (1877).
decorata ZETT., Dipt. Scand., XI, 4323, 21—22. [*Anthomyia*] (1852).

Hyporites

Pok., Wien. entom. Zeitg., XII, 54, (1893).

- montanus** SCHN., F. A., I, 626. [*Eriphia*] (1862); PAND., Revue Entom. France, XX, 303, 8. [*Hammomyia*] (1901). Europa-centr. et mer.

Prosalpia

Pok., Wien. entom. Zeitg., XII, 55, (1893).

Eriphia SCHN. (see MEG.), F. A., I, 625, (1862).

athlops ZETT. = **Billbergi** ZETT.

alpina WALK. = **silvestris** FALL.

argyrata ZETT. = **silvestris** FALL.

argyrocephala ZETT. = **silvestris** FALL.

atricauda ZETT. = ?**Billbergi** ZETT.

- Billbergi** ZETT., Ins. Lapp., 678, 75. [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1528, 138. [*Uicia*] (1815); MICH., Entom. Monthly Mag., XIX, 148. [*Chortophila*] (1882) et Deser. List Brit. Anth., II, 16, 11. [*Chortophila*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XX, 303, 7. [*Hammomyia*] (1901). Europa, Asia min.

athlops ZETT., Ins. Lapp., 683, 98. [*Anthomyia*] (1838).

atricauda ZETT., Dipt. Scand., IV, 1529, 139. [*Uicia*] (1815).

carina L.V., Berlin. entom. Zeitschr., XVII, 46, 48. [*Dr. thomyia*] (1873).

leptaroides ZETT., Dipt. Scand., IV, 1515, 125. [*Uicia*] (1815); SCHN., F. A., I, 650. [*Anthomyia*] (1862).

zuoereus ZETT., Ins. Lapp., 681, 88. [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1531, 112. [*Uicia*] (1815).

silvestris SCHN. (see FALL.), F. A., I, 626. [*Eriphia*] (1862); SIEGB., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 261. [*Hylephila*] (1893).

stipitata Pok., Wien. entom. Zeitg., XII, 56, 1, (1893).

Billbergi SCHN. (see ZETT.) = **silvestris** FALL.

carina L.V. p. p. = **Billbergi** ZETT.

deceps ZETT. = **silvestris** FALL.

donata WALK. = **silvestris** FALL.

grisea WALK. = **silvestris** FALL.

hylephorina Pok. = **silvestris** FALL.

- incisivalva** SIEGB., Math. Ver. Stiefeln., 1896, 247. [*Anthomyia*] (1898). Europa-centr. et sept.

leptaroides ZETT. = **Billbergi** ZETT.

- leptaroides* ZETT. *var. b.* — **silvestris** FALL.
moerens ZETT. = ?**Billbergi** ZETT.
marina ZETT. = **silvestris** FALL.
silvestris FALL., Musc., 70, 74. [*Musca*] (1824); MEIG., S. B., V, 198. Europa centr. et sept., Asia sept., Asia min.
 202. [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 678, 73. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1527, 137. [*Aricia*] (1845) et XIV, 6238, 137. [*Aricia*] (1860); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV, 54. [*Chortophila*] (1887) et Descr. List Brit. Anth., II, 46, 10. [*Chortophila*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XX, 302, 6. [*Hammomyia*] (1901).
alpina WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 927. ♀ [*Anthomyia*] (1849).
argyrata ZETT., Dipt. Scand., IV, 1443, 53. ♀ [*Aricia*] (1845).
argyrocephala ZETT., Ins. Lapp., 670, 37. ♀ [*Anthomyza*] (1838).
Billbergi SCHN. (*nee* ZETT.), F. A., I, 626. ♀ [*Eriphia*] (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 264. [*Hylephila*] (1893).
decrepita ZETT., Dipt. Scand., IV, 1454, 65. ♀ [*Aricia*] (1845); WALK., Ins. Brit., II, 141, 69. ♀ [*Anthomyia*] (1853).
donnae WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 946. ♀ [*Anthomyia*] (1849).
grisea WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 962. ♂ [*Eriphia*] (1849).
hydrophorina POK., Wien. entom. Zeitg., XII, 59, 3. (1893).
leptaroides ZETT. *var. b.*, Dipt. Scand., XIV, 6235, 125. ♂ [*Aricia*] (1860).
marina ZETT., Ins. Lapp., 682, 91. ♀ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1533, 141. ♀ [*Aricia*] (1845).
silvestris SCHN. (*nee* FALL.) = **Billbergi** ZETT.
styriaca POK. = **Billbergi** ZETT.
teriolensis POK., Wien. entom. Zeitg., XII, 57, 2. ♀ (1893). Europa centr. et sept.

Hammomyia

ROSD., Prodr., VI, 236, XXIV, (1877).

Hylephila ROSD., Prodr., VI, 233, XXIII, (1877).

Leucophora R.-D., Myod., 562, VIII, (1830).

albescens ZETT. = **albiseta** v. Ros.

albiseta v. Ros., Württemb. Corubl., I, 59. [*Anthomyia*] (1840). Europa.

albescens ZETT., Dipt. Scand., IV, 1520, 130. [*Aricia*] (1845) et XIV, 6235, 130. [*Aricia*] (1860); SCHN., F. A., I, 638. [*Anthomyia*] (1862); ROSD., Prodr., VI, 236, 1. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX, 146. [*Chortophila*] (1882) et Descr. List Brit. Anth., II, 44, 3. [*Chortophila*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XX, 300, 2. (1901).

- albula* MEIG. (nec FALL.) S. B., V. 102, 35. [*Anthomyia*] (1826).
 RONDI, Atti Soc. Milano, IX, 166, 15. [*Chortophila*] (1866).
buccata FALL., Musc., 65, 65. ♀ [*Musca*] (1824).
cinerea R.-D., Myod., 563, 3. [*Leucophora*] (1830); MACQ., Suït. à Buff., II, 328, 21. [*Chortophila*] (1835).
grisea MEIG. (nec FALL.) S. B., V. 94, 20. ♀ [*Anthomyia*] (1826).
pallida MACQ., Suït. à Buff., II, 319, 15. ♀ [*Hylemyia*] (1835);
 MEIG., S. B., VII, 318, 39. ♀ [*Hylemyia*] (1838).
albula MEIG. (nec FALL.) — **albisetia** v. Ros.
bifolia PAND., Revue Entom. France, XX, 390, 3. ♀ (1901). Gallia.
buccata FALL., Musc., 65, 65. ♀ [*Musca*] (1824); MEIG., S. B., V. Europa.
 146, 108. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suït. à Buff., II, 312, 12.
 [*Limnophora*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1535, 116. [*Aricia*]
 (1845) et XIV, 6231, 116. [*Aricia*] (1860); SCHN., F. A., I, 637.
 [*Anthomyia*] (1862); RONDI, Atti Soc. Milano, IX, 167, 16. [*Chortophila*]
 (1866) et Prodr., VI, 234, 1. [*Hylephila*] (1877); MEADE,
 Entom. Monthly Mag., XIX, 145. [*Chortophila*] (1882); STROBL,
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 264. [*Hylephila*] (1893);
 MEAD, Descr. List Brit. Anth., II, 44, 1. [*Chortophila*] (1897);
 STEIN, Entom. Nachr., XXVI, 151. (1900).
disquamia PAND., Revue Entom. France, XX, 391, 4. (1901).
 ?*sericea* R.-D., Myod., 563, 4. ♀ [*Leucophora*] (1830); MACQ.,
 Suït. à Buff., II, 328, 20. ♀ [*Chortophila*] (1835).
buccata FALL. p. p. — **albisetia** v. Ros.
buccata PAND. (nec FALL.) — **unilineata** ZETT.
ciliosa PAND., Revue Entom. France, XX, 390, 1. ♀ (1901). Gallia.
cinerea R.-D. — **albisetia** v. Ros.
disquamia PAND. — **buccata** FALL.
floralis R.-D. = ?**unilineata** ZETS.
grisea MEIG. (nec FALL.) — **albisetia** v. Ros.
grisea R.-D., Myod., 562, 1. ♀ [*Leucophora*] (1830); MACQ., Suït. à Gallia.
 Buff., II, 328, 18. ♀ [*Chortophila*] (1835).
inflata RONDI, Prodr., VI, 235, 2. ♀ [*Hylephila*] (1877). Italia.
obtusa ZETT., Ins. Lapp., 682, 95. ♀ [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Lapponia.
 Scand., IV, 1571, 186. ♀ [*Aricia*] (1845).
pallida MACQ. — **albisetia** v. Ros.
sericea R.-D. — ?**buccata** FALL.
sponsa MEIG., S. B., V, 147, 110. ♀ [*Anthomyia*] (1826). Germania?
unilineata ZETT., Ins. Lapp., 675, 63. [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Europa.
 Scand., IV, 1518, 128. [*Aricia*] (1845); SCHN., F. A., I, 638.
 [*Anthomyia*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX, 146.
 [*Chortophila*] (1882); STEIN, Entom. Nachr., XVIII, 325. (1892).
 MEAD, Descr. List Brit. Anth., II, 11, 2. [*Chortophila*] (1897).
buccata PAND. (nec FALL.) Revue Entom. France, XX, 391, 5.
 (1901).
 ?*floralis* R.-D., Myod., 563, 2. ♀ [*Leucophora*] (1830); MACQ.,
 Suït. à Buff., II, 328, 19. ♀ [*Chortophila*] (1835).

unistriata ZETT., Ins. Lapp., 677. 71. ♂ [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1512. 122. ♂ [*Aricia*] (1815); STEIN, Entom. Nachr., XVIII. 325. (1892). Laponnia.

Pegomyia

R.-D., Essai sur les Myod., 598. I. (1830).

Chlorina R.-D., Myod., 602. IV. (1830).

Phoraca R.-D., Myod., 600. III. (1830).

Zabia R.-D., Myod., 600. II. p. p. (1830).

abbreviata POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 560. ♂ [*Anthomyia*] (1889); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 84. 33. (1906). Jugum Stel-vianum.

occlusae R.-D. ?**nigritarsis** ZETT.

?**albibasalis** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3317. 83—84. ♂ [*Anthomyia*] (1849). Norvegia.

albimargo PAND., Revue Entom. France, XX. 296. 8. ♂ (1901); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 86. 35. (1906). Europa.

obscura MEADE (*oc. Macq.*), Entom. Monthly Mag., XIX. 216.

[*Phorbia*] (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 52. 18.

[*Phorbia*] (1897).

atricolor FALL., Musc., 82. 103. ♂ [*Musca*] (1821); MEIG., S. B., V. 201. 207. [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1687. 57. [*Anthomyia*] (1845). Suecia.

atriplivis GOUR. - **hyoseyami** PANZ.

atritarsis ZETT., Dipt. Scand., IV. 1689. 59. ♂ [*Anthomyia*] (1845); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI. 44. (1902) et XXV. 99. 48. (1906). Laponnia.

balteata HOLMGR., Entom. Tidskr., IV. 172. 30. ♀ [*Anthomyia*] (1883). Now-Semlja.

basilaris MACQ., Suit. à Buff., II. 353. 13. (1835); MEIG., S. B., VII. 333. 102. [*Anthomyia*] (1838). Gallia.

bicolor WIED., Zool. Mag., I. 1. 77. 26. [*Anthomyia*] (1817); FALL., Musc., 91. 128. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V. 185. 177. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 351. 4. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 696. 158. [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., V. 1773. 157. [*Anthomyia*] (1846); SCHIX., F. A., I. 635. [*Anthomyia*] (1862); RONDI., Atti Soc. Milano, IX. 161. 1. [*Chortophila*] (1866) et Prodr., VI. 205. 1. [*Chortophila*] (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX. 12. (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 58. 19. (1897); PAND., Revue Entom. France, XX. 298. 12. (1900); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 75. 21. (1906).

longipes R.-D., GUÉR.-MEX., Rev. et Mag. Zool., II. 3. 233. 1.

[*Zabia*] (1851).

milis MEIG., S. B., V. 183. 173. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 351. 2. (1835); WALK., Ins. Brit., II. 144.

78. [*Anthomyia*] (1853); SCHIX., F. A., I. 634. [*Anthomyia*] (1862); GOURBEAU, Annal. Soc. entom. France, II. 9. 166.

(1851) (*milis* sic!).

- ramicis* BOUCHE, Naturgesch. d. Ins., I, 209, 5. [*Anthomyia*] (1834); R.-D., GERM.-MEX., Rev. et Mag. Zool., II, 3, 232, 3, + (1851).
- solenis* MEG., S. B., V, 187, 180, + [*Anthomyia*] (1826); SCHN., F. A., I, 648. [*Anthomyia*] (1862).
- bina* WIED., Aussereurop. zwelf. Ins., II, 126, 9. [*Anthomyia*] (1830). China.
- bivittata* STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 98, 47. (1906). Europacentr.
- blepharipteroides* DUF. **Winthemi** MEG. et sept.
- ?boletina* DUF., Annal. sci. nat., sér. 2, XIII, 163. [*Anthomyia*] (1810). Europacentr.
- brunea* R.-D., Myod., 599, 5. + (1830). Gallia.
- brunnea* MACQ., Suit. à Buff., II, 351, 6. + (1835).
- brunea* R.-D. [*Phyllis*] = **?silacea** MEG.
- brunicornis* R.-D., Myod., 599, 2. (1830). Gallia.
- brunicosa* R.-D., Myod., 599, 4. + (1830). Gallia.
- brunnea* MACQ. = **brunea** R.-D.
- caesia* STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 78, 24. (1906). Germania, Gallia.
- ?calceata* MEG., S. B., V, 192, 190. + [*Anthomyia*] (1826). Austria.
- calceolata* ZETT. = **setaria** MEG.
- calyptrata* ZETT., Dipt. Scand., V, 1775, 159, + [*Anthomyia*] (1816). Europacentr.
- et XII, 4751, 159, + [*Anthomyia*] (1855); PAND., Revue Entom. et sept.
- France, XX, 294, 6. (1901).
- capucina* ZETT. = **transversa** FALL.
- cerasi* R.-D., Myod., 599, 3. (1830). Gallia.
- chenopodii* ROSE. = **hyoseyami** PANZ.
- clunifera* ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6304, 172-173. + [*Anthomyia*] Suecia,
- (1860); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 15. (1902).
- conformis* FALL. = **hyoseyami** PANZ.
- conformis* MEADE (nec FALL.) = **genupuneta** STEIN.
- conformis* PAND. (nec FALL.) = **setaria** MEG.
- consobrina* ZETT. = **transversa** FALL.
- crassicauda* STEIN. = **rufipes** FALL.
- cunicularis* ROSE. = **hyoseyami** PANZ.
- Damianitschi** SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV, 998. [*Anthomyia*] Austria
- (1865).
- depressiventris** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1688, 58. + [*Anthomyia*] Lapponia
- (1815); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 16. (1902) et XXV, 93, 13. (1906).
- depinata* ZETT. = **rufipes** FALL.
- diaphana* FALL. (nec WIED.) = **silacea** MEG.
- digitalis* ROSE. = **Winthemi** MEG.
- dissimilipes* ZETT. = **hyoseyami** PANZ. var. *betae* GILL.
- dubia* BIG. = **socia** FALL.
- effluens* ROSE. = **hyoseyami** PANZ.
- egens* MEG. = **hyoseyami** PANZ.
- eplippium* ZETT. = **geniculata** BOUCH.
- erythostoma* A. ROSE. = **fulgens** MEG.
- esuriens** MEG., S. B., V, 181, 170. + [*Anthomyia*] (1826); STEIN, Europa
- Wien. entom. Zeitg., XXV, 85, 31. (1906).

- maculipes* ZETT., Dipt. Scand., IV, 1708, 83. ♀ p. p. [*Anthomyza*] (1845) et VIII, 3316, 83. p. p. [*Anthomyza*] (1849).
? *Rogenhoferi* STROBL, Progr. Gymn. Seitenstetten, 25. [*Anthomyia*] (1880).
- euphyppium* ROXD. = **geniculata** BOUCHÉ.
- erilis* MEIG. = **hyoseyami** PANZ.
- erilis* SCHN. (nec MEIG.) = **nigritarsis** ZETT.
- femorialis* BRISCHKE = **hyoseyami** PANZ. var. **betæ** C'ERT.
- figulina** ROXD., Bull. Soc. entom. Ital., II, 326, 19. [*Anthomyia*] (1870) Italia.
et Prodr., VI, 166, 16. [*Anthomyia*] (1877).
- flava** R.-D., Myod., 569, 4. [*Philinta*] (1830); Macq., Suit. à Buff., Gallia.
II, 334, 6. [*Anthomyia*] (1835); MEIG., S. B., VII, 332, 99. [*Anthomyia*] (1838).
- flavcola* FALL. (nec FABR.) = **silacea** MEIG.
- flavescens** R.-D., Myod., 601, 1. ♀ [*Phoraea*] (1830); Macq., Suit. Gallia.
à Buff., II, 352, 10. (1835); MEIG., S. B., VII, 333, 104. [*Anthomyia*] (1838).
- flavipalpis** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1707, 81. ♂ [*Anthomyza*] (1845) Europacentr.
et XIV, 6286, 81. [*Anthomyza*] (1860); STEIN, Wien. entom. Zeitg., et sept.
XXV, 72, 17. (1906).
- flavipes** FALL., Musc., 90, 125. ♂ [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V, Europa.
195, 197. [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 692, 137. ♂ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., V, 1764, 148. [*Anthomyza*] (1846); SCHN., F. A., I, 642. [*Anthomyia*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX, 13. (1883); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 252. [*Anthomyia*] (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 58, 20. (1897); PASD., Revue Entom. France, XX, 293, 3. (1901); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 69, 15. (1906).
pulchripes Lw., Zeitschr. Naturw., VIII, 104, 167. [*Anthomyia*] (1857).
var. **diluta** STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 71, Ann. I, Italia.
(1906).
- flavipes** R.-D., Myod., 600, 6. ♂ (1830); Macq., Suit. à Buff., II, 352, Gallia.
7. ♂ (1835); MEIG., S. B., VII, 332, 100. [*Anthomyia*] (1838).
- flavipes* ZETT. (nec FALL.) var. **b** = **rufipes** FALL.
- flavisquama** STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 91, 40. (1906). Austria.
- flavoscutellata** ZETT., Ins. Lapp., 697, 162. [*Anthomyza*] (1838) et Europacentr.
Dipt. Scand., V, 1765, 149. [*Anthomyza*] (1846); SCHN., F. A., I, et sept.
649. [*Anthomyia*] (1862); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 84, 31. (1906).
- flavotibiella* ZETT. = **socia** FALL.
- frigida** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1685, 54. ♂ [*Anthomyza*] (1845). Scandinavia.
- fulgens** MEIG., S. B., V, 183, 172. [*Anthomyia*] (1826); Macq., Suit. Europa.
à Buff., II, 352, 9. (1835); WALK., Ins. Brit., II, 144, 79. [*Anthomyia*] (1853); ROXD., Atti Soc. Milano, IX, 152, 15. [*Anthomyia*] (1866) et Prodr., VI, 161, 14. [*Anthomyia*] (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV, 58. (1887) et Descr. List Brit.

- Anth., II. 56. 10. (1897); STEIN, Entom. Nachr., XXVI. 153. (1900) et Wien. entom. Zeitg., XXV. 79. 25. (1906).
erythrostoma V. ROS., Württemb. Corobl., I. 59. ♀ [*Anthomyia*] (1840).
hyoseyami PANZ. (nec PANZ.), Revue Entom. France, XX. 295. 7. (1904).
- fulviceps** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6296. 135-136. [*Anthomyia*] Europaeentr. (1860); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 59. 1. ♂ (1906). et sept.
- fungorum** WALK. (nec DEC.), Ins. Brit., II. 143. 77. [*Anthomyia*] Britannia. (1853).
- fuscula* MEIG. (nec FALL.) = **socia** FALL.
- geniculata** BOUCHÉ, Naturgesch. d. Ins., I. 81. 69. [*Anthomyia*] (1834): Europa. STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 74. 19. (1906).
- euphippium* ZETT., Dipt. Scand., V. 1790. 174. [*Anthomyia*] (1846); SCHN., F. A., I. 642. [*Anthomyia*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 73. (1887) et Deser. List Brit. Anth., II. 56. 11. (1897).
- euphippium* RONDI., Atti Soc. Milano, IX. 155. 17. [*Anthomyia*] (1866) et Prodr., VI. 166. 17. [*Anthomyia*] (1877).
- genupuneta** STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 90. 39. (1906). Britannia, *conformis* MEADE (nec FALL.), Entom. Monthly Mag., XX. 10. Gallia. (1883) et Deser. List Brit. Anth., II. 54. 2. (1897).
- gilva** PANZ. (nec ZETT.), Revue Entom. France, XVIII. 94. 2. ♂ Europa sept. [*Spilogaster*] (1899).
- gilva** ZETT., Dipt. Scand., V. 1789. 173. [*Anthomyia*] (1846); STEIN, Europa sept. Wien. entom. Zeitg., XXV. 69. 13. (1906).
- villigera* ZETT. var. b., Ins. Lapp., 697. 161. ♀ [*Anthomyia*] (1838).
- Gouraldi* R.-D. = **hyoseyami** PANZ.
- grisea* R.-D. [*Phorbia*] = ?**socia** FALL.
- grossa* BRASCHKE = ?**setaria** MEIG.
- guttifrons** ZETT., Dipt. Scand., V. 1772. 155. ♀ [*Anthomyia*] (1846). Suecia.
- haemorrhoea* PANZ. (nec ZETT.) = **hyoseyami** PANZ.
- haemorrhoea** ZETT., Ins. Lapp., 692. 138. ♂ [*Anthomyia*] (1838) et Europaentr. Dipt. Scand., IV. 1691. 62. ♀ [*Anthomyia*] (1845) et XIV. 6282. et sept. 62. [*Anthomyia*] (1860); SCHN., F. A., I. 636. [*Anthomyia*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX. 11. ♀ (1883) et Deser. List Brit. Anth., II. 55. 3. (1897); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 102. 53. (1906).
- intersceta* MEADE (nec MEIG.), Entom. Monthly Mag., 2. ser. IV. 222. [*Phorbia*] (1893) et Deser. List Brit. Anth., II. 50. 9. [*Phorbia*] (1897).
- Holmgreni** BOUÏSS., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XV. 2. 55. ♀ [*Anthomyia*] (1858). ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6305. 178. ♀ [*Anthomyia*] (1860); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI. 18. (1904) et XXV. 101. 52. (1906). Lapponia, Hungaria.
- humeralis** R.-D., Myod., 602. ♀ [*Phorbia*] (1830). Gallia

haucradis v. Ros. — **rufipes** FALL.

hyoscyami PAND. (nec PANZ.) = **fulgens** MEIG.

hyoscyami PANZ., Fauna germ., CVIII, 43. [*Musca*] (1809); MEIG., S. B., V, 182, 174. [*Anthomyia*] (1826); R.-D., Myod., 598, 4. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 350, 1. (1835); WAHLEB., K. Svensk Vet. Akad. Handl., 9. (1838); ZETT., Dipt. Scand., V, 179f., 176. [*Anthomyza*] (1846); SCHN., F. A., I, 642. [*Anthomyia*] (1862); RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 165, 7. [*Chortophila*] (1866) et Prodr., VI, 209, 7. [*Chortophila*] (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX, 11. (1883) et XXIII u. XXIV, 58. (1887) et Deser. List Brit. Anth., II, 55, 4. (1897); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 94, 44. (1906).

atriplivis GOUR., Annal. Soc. entom. France, II, 9, 163. (1851);

R.-D., GUÉR.-MEX., Rev. et Mag. Zool., II, 3, 230, 1. (1851).

chenopodii RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 162, 4. [*Chortophila*] (1866) et Prodr., VI, 207, 5. [*Chortophila*] (1877).

conformis FALL., Muse., 82, 105. ♀ [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V, 180, 167. ♀ [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1704, 77. ♀ [*Anthomyza*] (1845); NÖEDLINGER, die kl. Feinde der Landwirtschaft, 556. [*Anthomyia*] (1855); TASCHENBERG, Naturg. wirbell. Tiere, 175, 65. [*Anthomyia*] (1865); KALTENE., Insectenfeinde, 504, 25. [*Anthomyia*] (1874); FARSKY, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIX, 107. [*Anthomyia*] (1879); TASCHENBERG, Pract. Insectenkde, 123, 50. [*Anthomyia*] (1880); LINDG., Vid. Medd., 287, 125. (1900).

cunicularis RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 163, 5. ♀ [*Chortophila*] (1866) et Prodr., VI, 208, 6. ♀ [*Chortophila*] (1877).

effodiens RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 163, 8. ♀ [*Chortophila*] (1866) et Prodr., VI, 209, 9. ♀ [*Chortophila*] (1877).

egeus MEIG., S. B., V, 181, 169. ♀ [*Anthomyia*] (1826) et VI, 377. ♀ [*Anthomyia*] (1830).

erilis MEIG., S. B., V, 184, 175. ♀ [*Anthomyia*] (1826).

Gourabli R.-D., GUÉR.-MEX., Rev. et Mag. Zool., II, 3, 231, 2. (1851).

haemorrhoid PAND. (nec ZETT.), Revue Entom. France, XX, 298, 11. (1901).

perforans RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 163, 6. ♂ [*Chortophila*] (1866) et Prodr., VI, 209, 8. ♂ [*Chortophila*] (1877).

var. betae CURT., Journ. Agr. Soc. Engl., VIII, P. II, 412. ♂ [*Anthomyia*] (1847) et Farm. Ins., 397, 6. ♂ [*Anthomyia*] (1860); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX, 10. (1883) et Deser. List Brit. Anth., II, 55, 5. (1897).

dissimilipes ZETT., Dipt. Scand., VIII, 331f., 62–63. ♂ [*Anthomyza*] (1849).

femorialis BRISCHKE, Schrift. Ges. Danzig, V, 275. ♂ [*Anthomyia*] (1880).

spinaciae HOLMGR., Entom. Tidskr., I, 89. [*Anthomyza*] (1880).

- incisiva** STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 73, 18. ♂ (1906). Europa e.ets.
- iniqua** STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 63, 6. (1906). Europa e.ets.
- interruptella** ZETT., Dipt. Scand., XII, 4742, 58—59. ♀ [*Anthomyza*] Europa centr. (1855); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 49. (1902) et XXV, 87. et sept. 36. (1906).
- intersecta* MEADE (nec MEIG.) = **haemorrhoea** ZETT.
- invisa** ZETT., Dipt. Scand., V, 1756, 138. ♀ [*Anthomyza*] (1846); Europa centr. STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 62, 4. ♂ (1906). et sept.
- laticornis** FALL., Musc., 86, 112. ♀ [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V, 202, 210. [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1705, 79. [*Anthomyza*] (1845). Suecia.
- latitarsis* ZETT. = **Winthemi** MEIG.
- limbatella** RONDI., Prodr., VI, 206, 2. ♀ [*Chortophila*] (1877). Italia.
- limbatella** ZETT., Ins. Lapp., 697, 161. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Suecia. Scand., V, 1781, 166. [*Anthomyza*] (1846) et XIV, 6303, 166. [*Anthomyza*] (1860).
- longimana** POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII, 405. [*Chortophila*] (1887); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 96, 45. (1906). Europa centr. ? *Megerlei* MEIG., S. B., V, 179, 166. ♂ [*Anthomyia*] (1826). et sept.
- longipes* R.-D. [*Zabia*] p. p. = **bicolor** WIED.
- lunatifrons** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1708, 84. ♀ [*Anthomyza*] (1846). Suecia.
- larida* ZETT. = ? **rufipes** FALL.
- macra** MEIG., S. B., VII, 332, 76. [*Anthomyia*] (1838). Belgia.
- maculata** STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 88, 37. ♂ (1906). Europa centr.
- maculipes* ZETT. p. p. = **esuriens** MEIG. et sept.
- Megerlei* MEIG. = ? **longimana** POK.
- mimula** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1707, 82. ♂ [*Anthomyza*] (1845). Suecia.
- minima** STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 100, 50. (1906). Germania.
- nilis* MEIG. = **bicolor** WIED.
- myiodea** R.-D., Myod., 601, 3. [*Phoraca*] (1830); Macq., Suit. à Buff., Gallia. II, 353, II. (1835); MEIG., S. B., VII, 334, 106. [*Anthomyia*] (1838).
- nigriceps** ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6300, 153—154. ♂ [*Anthomyza*] Suecia. (1860); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 51. (1902).
- nigrifrons** MACQ., Suit. à Buff., II, 353, 12. (1835); MEIG., S. B., Gallia. VII, 334, 105. [*Anthomyia*] (1838).
- nigrisquama** STEIN, Wien. entom. Zeitg., VII, 290, 2. [*Chortophila*] Germania. (1888) et XXV, 93, 42. (1906). Gallia.
- nigritarsis** ZETT., Ins. Lapp., 696, 159. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Europa. Scand., V, 1778, 162. [*Anthomyza*] (1846). SCHN., F. A., I, 635. [*Anthomyia*] (1862); RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 152, 14. ♂ [*Anthomyia*] (1866) et Prodr., VI, 163, 13. [*Anthomyia*] (1877). MEADE, Entom. Monthly Mag., XX, 13. (1883); STROB., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 251. [*Anthomyia*] (1893); MEADE, Deser. List Brit. Anth., II, 58, 18. (1897); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 77, 23. (1906).
- ? *zactosae* R.-D., GER.-MEX., Rev. et Mag. Zool., II, 3, 232, 4. (1851).

- exilis* SCHN. (*nee* MEIG.), F. A., I. 636. [*Anthomyia*] (1862);
MEADE, Entom. Monthly Mag., XX. 13. (1883) et Descr. List
Brit. Anth., II. 57. 16. (1897).
- rufifrons* v. Ros., Württemb. Corubl., I. 59. ♀ p. p. [*Anthomyia*] (1840).
- ?**niveipennis** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1692. 64. ♀ [*Anthomyia*] Suecia.
(1845).
- notabilis** ZETT., Dipt. Scand., V. 1780. 165. ♀ [*Anthomyia*] (1846). Suecia.
obscura MEADE (*nee* MACQ.) = **albimargo** PANZ.
ovata ZETT. = **rufina** FALL.
- palliceps** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1692. 63. ♀ [*Anthomyia*] (1845). Suecia.
- pallida** STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 63. 14. (1906). Europa e. ets.
- pallidoscutellata** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4324. 148—149. ♂ [*Anthomyia*] Suecia.
(1852).
- pallipes** STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 89. 38. (1906). Germ., Hollandia.
- palpata** STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 101. 51. ♀ (1906). Germania.
- perforans* ROND. = **hyoscyami** PANZ.
- phyllioidea** R.-D., Myod., 603. 2. [*Chlorina*] (1830). Gallia.
- pilosa** STEIN, Entom. Nachr., XXVI. 322. 13. (1900) et Wien. entom. Laponnia.
Zeitg., XXV. 82. 28. (1906).
- polygona** KALTENB., Verh. naturf. Ver. d. Preuss. Rheinl., XXI. 317. Europacentr.
2. [*Anthomyia*] (1864) et Pflanzenfeinde, 512. 27. [*Anthomyia*]
(1874).
- pulchripes* LW. = **flavipes** FALL.
- rimans** ROND., Bull. Soc. entom. Ital., II. 327. 34. ♀ [*Chortophila*] Italia.
(1870) et Prodr., VI. 210. 10. ♀ [*Chortophila*] (1877).
- Rogenhoferi* STROBL = ?**esuriens** MEIG.
- ruficeps** ZETT., Ins. Lapp., 698. 166. ♀ [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Laponnia.
Scand., V. 1770. 153. ♂ [*Anthomyia*] (1846).
- rufifrons* v. Ros. p. p. = **nigritarsis** ZETT.
- rufifrons* v. Ros. p. p. = **squamifera** STEIN.
- rufina** FALL., Musc., 92. 132. ♂ [*Musca*] (1825); ZETT., Dipt. Scand., Europacentr.
V. 1760. 143. [*Anthomyia*] (1846); STEIN, Wien. entom. Zeitg., et sept.
XXV. 64. 8. (1906).
- ovata* ZETT., Ins. Lapp., 697. 160. ♀ [*Anthomyia*] (1838).
- ?**rufina** MEIG. (*nee* FALL.) S. B., V. 213. 4. ♀ [*Coccosia*] (1826). Germania.
- rufipes** FALL., Musc., 85. 111. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V. 186. Europa.
178. ♂ [*Anthomyia*] (1826); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XLIII. 252. [*Anthomyia*] (1893); STEIN, Entom. Nachr., XXIII.
331. (1892) et Wien. entom. Zeitg., XXV. 81. 27. (1906).
- crassicauda* STEIN, Entom. Nachr., XXVI. 320. 12. (1900).
- deprimata* ZETT., Dipt. Scand., IV. 1706. 80. [*Anthomyia*] (1845)
et XIV. 6286. 80. [*Anthomyia*] (1860).
- flavipes* ZETT. var. b, Dipt. Scand., V. 1764. 148. [*Anthomyia*] (1846).
- humeralis* v. Ros., Württemb. Corubl., I. 59. p. p. [*Anthomyia*] (1840).

- ?larida* ZETT., Dipt. Scand., V. 1780. 164. [*Anthomyza*] (1846).
tenera MEADE (*nee* ZETT.), Descr. List Brit. Anth., II. 58. 17. (1897).
- rafipes* ZETT. (*nee* FALL.) = *squamifera* STEIN.
- rugulosa** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1686. 55. ♀ [*Anthomyza*] (1845). Succia.
- rumicis* BOUCHÉ = *bicolor* WIED.
- salicis* ZETT. = *setaria* MEIG.
- scapularis** ZETT., Dipt. Scand., V. 1776. 160. ♀ [*Anthomyza*] (1846). Succia.
- scutellaris** R.-D., Myod., 601. 2. ♀ [*Phoraea*] (1830). Gallia.
- scutellaris* v. Ros. = **Winthemi** MEIG.
- seitenstettensis** STROBL, Progr. Gymn. Seitenstetten, 25. [*Anthomyia*] (1880); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 92. 41. (1906). Europa.
- setaria** MEIG., S. B., V. 178. 165. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 351. 3. (1835); SCHN., F. A., I. 648. [*Anthomyia*] (1862); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 54. 1. (1897); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 99. 49. (1906). Europacentr. et sept.
- calceolata* ZETT., Dipt. Scand., IV. 1704. 78. [*Anthomyza*] (1845).
conformis PAND. (*nee* FALL.), Revue Entom. France, XIX. 239. 1. [*Egle*] (1900).
- ?grossa* BRISCUKE, Schrift. Ges. Danzig., V. 268. ♂ [*Anthomyia*] (1880).
- salicis* ZETT., Ins. Lapp., 692. 135. ♂ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1709. 85. [*Anthomyza*] (1845); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 252. [*Anthomyia*] (1893).
- saxdentata** BIG., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 277. 2. ♂ [*Chortophila*] (1885); STEIN, Zeitschr. f. Hymenopt. Dipt., VII. 293. 3. (1907). Gallia.
- sectana* PAND. = ? **socia** FALL.
- silacea** MEIG., S. B., VI. 377. 218. ♂ [*Anthomyia*] (1830); SCHN., F. A., I. 641. [*Anthomyia*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 57. (1887) et Descr. List Brit. Anth., II. 57. 12. (1897); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 66. 11. (1906). Europa.
- ?branca* R.-D., Myod., 605. 4. [*Phyllis*] (1830).
- diaphana* FALL. (*nee* WIED.), Musc., 92. 130. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V. 189. 185. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 353. 15. (1838); ZETT., Dipt. Scand., V. 1786. 170. [*Anthomyza*] (1846); ROSD., Ati Soc. Milano, IX. 153. 18. [*Anthomyia*] (1866) et Prodr., VI. 167. 18. [*Anthomyia*] (1877); PAND., Revue Entom. France, XIX. 292. 1. (1900).
- flavcola* FALL. (*nee* FABR.), Musc., 91. 129. [*Musca*] (1825).
- socia** FALL., Musc., 82. 101. ♀ [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V. 201. 208. ♀ [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1680. 48. [*Anthomyza*] (1845); ROSD., Ati Soc. Milano, IX. 150. 8. [*Anthomyia*] (1866) et Prodr., VI. 173. 1. [*Hydrophoria*] (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XVIII. 101. [*Hydrophoria*] (1881) et Descr. List Brit. Anth., I. 32. 9. [*Hydrophoria*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XIX. 222. 9. [*Hydrophoria*] (1900); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 65. 9. (1906). Europa.

- dubia* BIG., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 274. 1. ♀
[*Hydrophoria*] (1885).
- flavotibiella* ZETT., Dipt. Scand., IV. 1667. 32. ♀ [*Anthomyza*]
(1845).
- fuscula* MEIG. (nec FALL.), S. B., V. 174. 158. [*Anthomyia*]
(1826); SCHN., F. A., I. 629. [*Hylemyia*] (1862).
- ? *grisea* R.-D., Myod., 560. 5. ♂ [*Phorbia*] (1830).
- ? *serotana* PAND., Revue Entom. France, XIX. 239. 2. [*Egle*]
(1900).
- ? *tibialis* MACQ., Suit. à Buff., II. 326. 10. ♂ [*Chortophila*]
(1835).
- varipes* STROBL, Progr. Gymn. Seitenstetten, 25 u. 62. [*Anthomyia*]
(1880).
- villica* MEIG., S. B., VII. 319. 38. ♀ [*Hylemyia*] (1838).
- sociella** STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 66. 10. (1906). Succia,
Germania.
- solenis* MEIG. = **bicolor** WIED. Germania,
- solitaria** STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 80. 26. (1906). Germania,
Austria.
- spinaciae* HOLMGR. = **hyoscyami** PANZ. var. **betae** CURT. Europacentr.
- squamifera** STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 63. 7. (1906). et sept.
- rufipes* ZETT. (nec FALL.), Ins. Lapp., 692. 136. ♂ [*Anthomyza*]
(1838) et Dipt. Scand., V. 1751. 133. [*Anthomyza*] (1846);
SCHN., F. A., I. 642. [*Anthomyia*] (1862); MEADE, Entom.
Monthly Mag., XX. II. (1883) et Descr. List Brit. Anth.,
II. 55. 6. (1897); STEIN, Entom. Nachr., XVIII. 331. (1892);
PAND., Revue Entom. France, XX. 296. 9. (1901).
- rufifrons* v. ROS., Württemb. CorrbL., I. 59. ♀ p. p. [*Anthomyia*]
(1840).
- strigipes** ZETT., Dipt. Scand., V. 1775. 158. ♀ [*Anthomyza*] (1846). Succia.
- stupida** ZETT., Dipt. Scand., V. 1779. 163. ♀ [*Anthomyza*] (1846). Succia.
- sulcans** ROSD., Atti Soc. Milano, IX. 164. 9. ♀ [*Chortophila*] (1866) Europacentr.
et Prodr., VI. 211. 11. ♀ [*Chortophila*] (1877); PAND., Revue
Entom. France, XIX. 233. 26. ♀ [*Hydrophoria*] (1900). et mer.
- tabida** MEIG., S. B., V. 180. 168. ♂ [*Anthomyia*] (1826). Germania.
- ? **temperata** MEIG., S. B., V. 188. 183. ♀ [*Anthomyia*] (1826). Germania?
- tenera* MEADE (nec ZETT.) = **rufipes** FALL.
- tenera** ZETT., Ins. Lapp., 697. 165. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Europacentr.
Scand., V. 1766. 150. [*Anthomyza*] (1846); STEIN, Wien. entom.
Zeitg., XXV. 82. 30. (1906). et sept.
- terebrans** ROSD., Atti Soc. Milano, IX. 164. 10. ♂ [*Chortophila*] Italia.
(1866) et Prodr., VI. 211. 12. ♂ [*Chortophila*] (1877).
- tergina** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1690. 60. ♀ [*Anthomyza*] (1845). Succia.
- terminalis** ROSD., Atti Soc. Milano, IX. 164. 3. ♂ [*Chortophila*] Europa mer.,
(1866) et Prodr., VI. 207. 4. ♀ [*Chortophila*] (1877); STEIN, Wien.
entom. Zeitg., XXV. 104. 54. ♀ (1906). Algeria.
- thoracica** R.-D., Myod., 603. 1. [*Chlorina*] (1830); MACQ., Suit. à Gallia.
Buff., II. 353. 14. (1835); MEIG., S. B., VII. 333. 103. [*Anthomyia*]
(1838).

libialis MACQ. — ? *socia* FALL.

transgressa ZETT., Dipt. Scand., V, 1770, 154, ♀ [*Anthomyia*] Europa sept.
(1846); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXV, 449, (1889) et Descr. List Brit. Anth., II, 57, 13, (1897); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 82, 29, ♂ (1906).

transversa FALL., Musc., 92, 131, [*Musca*] (1825); MEG., S. B., V, Europa
203, 212, [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Dipt. Scand., V, 1752, 134, [*Anthomyia*] (1846); SCHIN., F. A., I, 641, [*Anthomyia*] (1862); ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 151, 11, ♀ [*Anthomyia*] (1866) et Prodr., VI, 160, 10, [*Anthomyia*] (1877); PASD., Revue Entom. France, XX, 294, 4, (1901); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 60, 2, (1906).

capucina ZETT., Dipt. Scand., V, 1753, 135, ♂ [*Anthomyia*] (1846); ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 150, 9, ♂ [*Anthomyia*] (1866).

consobrina ZETT., Dipt. Scand., V, 1755, 137, ♀ [*Anthomyia*] (1846).

Winthemi SCHIN. (nec MEG.), F. A., I, 641, [*Anthomyia*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX, 42, (1883) et Descr. List Brit. Anth., II, 56, 9, (1897).

transversa MEADE (nec FALL.) = **Winthemi** MEG.

transversa STROBL (nec FALL.) = **ulmaria** ROSD.

? **tridens** BOE., Annal. Soc. entom. France, sér. 6, V, 277, 1, ♂ Galia
[*Chortophila*] (1885).

tunicata ZETT., Dipt. Scand., V, 1787, 171, ♀ [*Anthomyia*] (1846), Lapponia.
STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 55, (1902).

ulmaria ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 150, 10, [*Anthomyia*] (1866) et Europa centr.
Prodr., VI, 160, 9, [*Anthomyia*] (1877); STEIN, Wien. entom. et mer.
Zeitg., XXV, 62, 5, (1906).

transversa STROBL (nec FALL.) Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 251, [*Anthomyia*] (1893).

var. **rufoecornis** POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX, 559, ♂ [*Anthomyia*] (1889).

univittata v. ROS., Württemb. Corrid., I, 59, ♀ [*Anthomyia*] (1840); Europa.
STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 71, 16, (1906).

varipes POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX, 562, [*Chortophila*] Jugum Steb-
[*Chortophila*] (1889); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 81, 33, (1906). vianum.

varipes STROBL = *socia* FALL.

ventralis STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 75, 20, (1906), Austria, Italia.

versicolor MEG., S. B., V, 181, 171, [*Anthomyia*] (1826); Meq., Suit. Europa centr.
à Bull., II, 351, 5, (1835); SCHIN., F. A., I, 636, [*Anthomyia*] (1862); ROSD., Atti Soc. Milano, IX, 161, 2, [*Chortophila*] (1866) et Prodr., VI, 206, 3, [*Chortophila*] (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX, 13, (1883) et Descr. List Brit. Anth., II, 57, 11, (1897); STEIN, Entom. Nachr., XXVI, 157, (1900); PASD., Revue Entom. France, XX, 297, 10, (1901); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV, 76, 22, (1906).

villica MEIG. = *socia* FALL.

vittigera ZETT., Ins. Lapp., 697. 164. ♀ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., V. 1788. 172. [*Anthomyza*] (1846); SCHN., F. A., I. 641. [*Anthomyia*] (1862); ROXB., Atti Soc. Milano, IX. 153. 16. [*Anthomyia*] (1866) et Prodr., VI. 165. 15. [*Anthomyia*] (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX. 13. (1883); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 250. [*Anthomyia*] (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 59. 21. (1897); PAND., Revue Entom. France, XX. 293. 2. ♀ (1901); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 68. 12. (1906). Europa centr. et sept.

vittigera ZETT. var. *b* = *gilva* ZETT.

Winthemi MEIG., S. B., V. 186. 179. ♀ [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Dipt. Scand., V. 1792. 177. ♀ [*Anthomyza*] (1846); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 61. 3. (1906). Europa.

? *blepharipteroides* DUF., Annal. Soc. nat., sér. 2. XII. 42. 12.

[*Sapromyza*] (1839) et XIII. 162. [*Homalomyia*] (1840).

digitaria ROXB., Atti Soc. Milano, IX. 152. 13. ♀ [*Anthomyia*] (1866) et Prodr., VI. 162. 12. [*Anthomyia*] (1877).

lulitarsis ZETT., Dipt. Scand., V. 1754. 136. [*Anthomyza*] (1846); SCHN., F. A., I. 635. [*Anthomyia*] (1862); ROXB., Atti Soc. Milano, IX. 151. 12. [*Anthomyia*] (1866) et Prodr., VI. 161. 11. [*Anthomyia*] (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX. 12. (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 56. 7. (1897); PAND., Revue Entom. France, XX. 294. 5. (1901).

scutellaris v. ROS., Württemb. Corubl., I. 59. ♀ [*Anthomyia*] (1840).

transversa MEADE (nec FALL.), Entom. Monthly Mag., XX. 12. (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 56. 8. (1897).

var. **obscura** STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXV. 62. Ann. (1906).

Winthemi SCHN. (nec MEIG.) = *transversa* FALL.

zonata ZETT., Ins. Lapp., 697. 163. ♀ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., V. 1768. 151. ♀ [*Anthomyza*] (1846) et XIV. 6299. 151. ♂ ? [*Anthomyza*] (1860). Europa sept.

Chortophila

Macq., Suit. à Buff., II. 323. 10. (1835).

Adia R.-D., Myod., 558. IV. (1830).

Delia R.-D., Myod., 571. XII. p. p. (1830).

Egyle R.-D., Myod., 584. XIV. (1830).

Nerina R.-D., Myod., 557. III. (1830).

Phorbia R.-D., Myod., 559. V. (1830).

aestiva MEIG., p. p. = *cilicrura* ROXB.

agilis R.-D., Myod., 585. I. [*Egyle*] (1830). Gallia.

- agrorum** MEIG., S. B., VII, 329, 51. ♂ [*Anthomyia*] (1838); SCHN., Germania, F. A., I, 650. [*Anthomyia*] (1862).
- albidella** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1620, 236. [*Tricia*] (1845) et VIII, 3303, 236. [*Tricia*] (1849).
- albipennis** MEIG., S. B., V, 152, 119. ♀ [*Anthomyia*] (1826); SCHN., Austria? F. A., I, 649. [*Anthomyia*] (1862).
- albipennis* R.-D. [*Nerina*] - ?**cinerella** FALL.
- albipennis** R.-D., Myod., 581, 30. ♀ [*Delia*] (1830). Gallia.
- albula** FALL., Musc., 74, 83. [*Musca*] (1824); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1610, 226. [*Tricia*] (1845); PAND., Revue Entom. France, XIX, 269, 46. ♂ 280, 46. ♀ (1900). Europe-centr. et sept.
- arenosa* ZETT., Dipt. Scand., IV, 1511, 121. [*Tricia*] (1845); SCHN., F. A., I, 637. [*Anthomyia*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX, 146. (1882) et Descr. List Brit. Anth., II, 48, 1. (1897).
- alpigena** POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 14. (1895). Jugum Stey.
- angusta** MACQ., Suit. à Buff., II, 327, 16. ♂ (1835). Gallia.
- angustifrons** MEIG., S. B., V, 116, 109. ♂ [*Anthomyia*] (1826). Europe-centr. et sept.
- scatophaga* ZETT., Ins., 7, p., 677, 69. [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1519, 120. [*Tricia*] (1845); STERN, Krojers Naturl. Tidsskr., n. ser. I, 365, 41. ♂ [*Tricia*] (1845); SCHN., F. A., I, 637. [*Anthomyia*] (1862).
- angustifrons** ROND. (nec MEIG.), Atti Soc. Milano, IX, 165, 13. (1866) et Probr., VI, 216, 18. (1877); STERN, Entom. Nachr., XVIII, 327. (1892); VILL., Bull. Soc. entom. France, 3, 13. (1899); PAND., Revue Entom. France, XIX, 241, 8. [*Egle*] (1900). Europa.
- angustiventris* ZETT. = **trichocetyla** ROND.
- analis* ZETT. = **pietiventris** ZETT.
- anthophila** R.-D., Myod., 580, 26. [*Delia*] (1830). Gallia.
- anthophila** R.-D., Myod., 586, 5. [*Egle*] (1830). Gallia.
- anthracina** CZERNY, Wien. entom. Zeitzg., XXV, 251, 1. ♂ (1906). Austria sup.
- appendiculata* BR. = **brassicae** BOUCH.
- arenosa* ZETT. = **albula** FALL.
- argyrocephala** MEIG., S. B., V, 115, 107. ♂ [*Anthomyia*] (1826); SCHN., F. A., I, 619. [*Anthomyia*] (1862); STERN, Entom. Nachr., XXVI, 151. (1900). Europe-centr.
- arrogans** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1567, 181. ♀ [*Tricia*] (1845). Suecia.
- arvensis** R.-D., Myod., 560, 4. ♂ [*Phorbia*] (1830). Gallia.
- atomaria** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1624, 212. [*Tricia*] (1845). Suecia.
- lipida* ZETT. (nec FALL.) var. *b*, Ins. Lapp., 686, 110. [*Anthomyia*] (1838).
- atronitens** STROBI., Verh. zool. bot. Ges. Wien, XLIII, 261. [*Anthomyia*] (1895). Styria.
- auctinervis** ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6210, 150, 151. ♂ [*Tricia*] (1860). Laponia.
- autumnalis** R.-D., Myod., 587, 9. ♂ [*Egle*] (1830). Gallia.
- biumbrosa** PAND., Revue Entom. France, XIX, 266, 22. ♂ 271, 22. ♀ (1900). Germania.

- brassicæ** BOUCHÉ, Naturg. d. Gartenins., 131. 2. [*Anthomyia*] (1833) Europa.
 et Naturgesch. d. Ins., I. 74. 60. [*Anthomyia*] (1834); R.-D.,
 GUÉR.-MEX., Rev. et Mag. Zool., II. 3. 234. 2. [*Anthomyia*] (1851);
 CRT., Farm. Ins., 141. 9. [*Anthomyia*] (1860); TASCHEBERG,
 Naturg. d. wirbell. Tiere, 172. 64. [*Anthomyia*] (1865), Entom.
 für Gärtner, 385. 170. [*Anthomyia*] (1871) et Pract. Insectenkde.
 128. 53. [*Anthomyia*] (1880).
appendiculata BIG., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 278.
 3. ♂ (1885); STEIN, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., VII.
 293. 1. (1907).
floccosa MACQ., Suit. à Buff., II. 326. 12. (1835); ROND., Atti
 Soc. Milano, IX. 171. 27. (1866) et Prodr., VI. 217. 19. (1877);
 MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX. 214. [*Phorbia*] (1883)
 et Descr. List Brit. Anth., II. 48. 2. [*Phorbia*] (1897); PAND.,
 Revue Entom. France, XIX. 236. 31. [*Hydrophoria*] (1900).
floralis FALL., Musc., 71. 76. p. p. [*Musca*] (1824); MEG., S. B.,
 V. 165. 143. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II.
 337. 15*b* [*Anthomyia*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 684. 102.
 [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1536. 147. [*Aricia*]
 (1845); WALK., Ins. Brit., II. 142. 73. [*Anthomyia*] (1853);
 ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6239. 147. [*Aricia*] (1860); SCHIN.,
 F. A., I. 616. [*Anthomyia*] (1862); TASCHEBERG, Entom. für
 Gärtner, 389. 173. [*Anthomyia*] (1871); WEYENB., Tijdschr.
 v. Entom., XVI. 1. [*Anthomyia*] (1873); TASCHEBERG, Pract.
 Insectenkde., 132. 56. [*Anthomyia*] (1880); STEIN, Entom.
 Nachr., XVIII. 326. (1892); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges.
 Wien, XLIII. 261. [*Anthomyia*] (1893).
villipes ZETT., Dipt. Scand., IV. 1436. 67. ♂ [*Aricia*] (1845).
 XII. 4728. 67. [*Aricia*] (1855) et XIV. 6216. 67. [*Aricia*]
 (1860); SCHIN., F. A., I. 650. [*Anthomyia*] (1862).
- brevicornis** STROBL (*nec* ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. Europa-centr.
 259. [*Anthomyia*] (1893).
- brevicornis* ZETT. = **muscaria** MEG.
- brunnipennis** MACQ., Suit. à Buff., II. 337. 18. ♂ [*Anthomyia*] (1835). Gallia.
- caerulescens** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 258. [*Anthomyia*] (1893). Europa-centr.
 et mer.
- caesia** MACQ., Suit. à Buff., II. 325. 6. ♂ (1835). Gallia.
- calthæ** R.-D., Myod., 577. 19. [*Delia*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., Gallia.
 II. 336. 12. [*Anthomyia*] (1835); MEG., S. B., VII. 330. 60. [*Anthomyia*] (1838).
- campicola** R.-D., Myod., 576. 16. ♀ [*Delia*] (1830). Gallia.
- cana* MACQ. = ?**cilicrura** ROND.
- candens** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1546. 158. [*Aricia*] (1845); PAND., Europa-centr.
 Revue Entom. France, XIX. 254. 17. ♂ 282. 17. ♀ (1900). et sept.
- canescens** ZETT., Ins. Lapp., 676. 67. ♀ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Succia.
 Scand., IV. 1509. 119. ♀ [*Aricia*] (1845).
pallipennis ZETT., Ins. Lapp., 676. 66. ♀ [*Anthomyza*] (1838).

- chorea** R.-D., Myod., 577, 18. [*Delia*] (1830): Macq., Suit. à Buff., Gallia, II, 336, 11. [*Anthomyia*] (1835); Meig., S. B., VII, 330, 59. [*Anthomyia*] (1838).
- ciliata* WALK. = **muscaria** Meig.
- cilicrura** Rond., Atti Soc. Milano, IX, 165, 12. (1866) et Prodr., VI, Europa, 213, 15. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX, 216. [*Phorbia*] Asia sept., (1883); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 260. [*Anthomyia*] Ins. Canar., (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 49, 6. [*Phorbia*] Syria, (1897); PAND., Revue Entom. France, XIX, 250, 6. 278, 6. ♀ et ♀ var. (1900).
- aestiva* Meig., S. B., V, 169, 149. ♀ [*Anthomyia*] (1826).
- caena* Macq., Suit. à Buff., II, 310, 29. ♀ [*Anthomyia*] (1834); Meig., S. B., VII, 330, 57. ♀ [*Anthomyia*] (1838).
- cordia* WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 953. ♂ [*Anthomyia*] (1849).
- cupreifrons* WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 966. ♀ [*Dialyta*] (1849).
- laucrus* THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 556, 197. ♂ [*Anthomyia*] (1868).
- marginala* WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 964. ♀ [*Eriphia*] (1849).
- perana* WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 950. ♂ [*Anthomyia*] (1849).
- plutona* Meig., S. B., V, 171, 152, p. p. [*Anthomyia*] (1826); Macq., Suit. à Buff., II, 343, 11, p. p. [*Anthomyia*] (1834); Zett., Dipt. Scand., IV, 1517, 160, p. p. [*Arctia*] (1845) et XII, 4752, 160, p. p. [*Leucal*] (1855); Sams., F. A., I, 615, p. p. [*Anthomyia*] (1862); Tschenscher, Entom. für Gärtner, 387, 171. [*Anthomyia*] (1874) et Pract. Insectenkde., 130, 54. [*Anthomyia*] (1880).
- platyptera* THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 556, 198. ♀ [*Anthomyia*] (1868).
- rubifrons* Bic., Annal. Soc. entom. France, sér. 6, V, 297, 3. ♂ [*Anthomyia*] (1885).
- rupeola* Bic., Annal. Soc. entom. France, sér. 6, V, 285, 5. ♂ [*Homalomyia*] (1885).
- sergia* WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 947. ♂ [*Anthomyia*] (1849).
- tipia* WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 949. ♀ [*Anthomyia*] (1849).
- tyana* WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 945. ♀ [*Anthomyia*] (1849).
- vana* WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 951. ♀ [*Anthomyia*] (1849).
- cinerea** Zett., *over* FALC., Ins. Lapp., 671, 11. ♀ [*Anthomyia*] (1848) Sweden et Dipt. Scand., IV, 1106, 56. ♀ [*Leucal*] (1849) et XIV, 6211, 57. [*Arctia*] (1869).

- cinerea* MEADE (*duce* FALL.) p. p. = **trapezina** ZETT.
- cinerea** PAND. (*duce* FALL.), Revue Entom. France, XIX, 286, 59. ♀ (1900). Europacentr.
- cinerea** R.-D., Myod., 557, 1. [*Xerina*] (1830). Gallia.
- cuprea* MACQ., Suit. à Buff., II, 324, 3. (1835).
- cinerella** FALL., Musc., 77, 91. [*Musca*] (1825); ZETT., Ins. Lapp., 686, III. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1611, 227. [*Aricia*] (1845) et XIV, 6256, 227. [*Aricia*] (1860); ROSO., Atti Soc. Milano, IX, 166, 14. (1866) et Prodr., VI, 220, 23. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX, 147. (1883) et Deser. List Brit. Anth., II, 45, 7. (1897); PAND., Revue Entom. France, XIX, 258, 26. ♂ (1900). Europa, Asia sept., Africa sept., Ins. Canar., Caucasus, Syria.
- zabipennis* R.-D., Myod., 557, 2. ♀ [*Xerina*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 324, 4. ♀ (1835).
- flavescens* R.-D., Myod., 558, 3. [*Xerina*] (1830).
- interraptilinea* ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6232, 122-123. ♂ [*Aricia*] (1860).
- oralis* R.-D., Myod., 558, 1. ♂ [*Ada*] (1830).
- pusilla* MEAD., E. V., 151, 118. [*Anthomyza*] (1826); SCHUS., F. A., I, 638. [*Anthomyza*] (1862).
- remorata* HOLMGR., Entom. Tidskr., IV, 171, 29. ♀ [*Aricia*] (1883).
- trig. nig. ter* PAND., Revue Entom. France, XIX, 242, 6. [*Egla*] (1900).
- trigononaculata* MACQ., Dipt. exot., Suppl. 1, 239. ♂ [*Anthomyza*] (1851).
- virescens* MACQ., Dipt. exot., Suppl. 4, 239. ♂ [*Anthomyza*] (1851).
- claripennis** R.-D., Myod., 560, 3. [*Phorbia*] (1830). Gallia.
- claripennis** R.-D., Myod., 590, 18. [*Egla*] (1830). Gallia.
- praevar* R.-D., Myod., 590, 15. [*Egla*] (1830).
- communis** R.-D., Myod., 588, 13. [*Egla*] (1830). Gallia.
- concomitans** PAND., Revue Entom. France, XIX, 251, 1. ♂ 287, 7. (1900). Europacentr.
- confidella** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1621, 237. ♀ [*Aricia*] (1845). Suecia.
- congenerata** PAND., Revue entom. France, XIX, 266, 42. ♂ (1900). Gallia.
- conifrons** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1569, 184. [*Aricia*] (1845); PAND., Revue Entom. France, XIX, 260, 30. ♂ 285, 30. ♀ (1900). Europacentr. et sept.
- cordifrons** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1616, 231. ♀ [*Aricia*] (1845). Suecia.
- corelia* WALK. = **cilicrura** ROND.
- coronata** HOLMGR., Entom. Tidskr., IV, 171, 29. ♀ (1883); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 57. (1902). Now.-Semlja.
- erinitarsata** STEIN, Entom. Nachr., XXVI, 316, 10. ♂ (1900). Germania.
- cancicornis* ZETT. **pietiventris** ZETT.
- cuprea* MACQ. **cinerea** R.-D.
- cuprifrons* WALK. **cilicrura** ROND.
- eurtinasuta** PAND., Revue Entom. France, XIX, 254, 15. (1900). Gallia.

- curvicauda** ZETT., Dipt. Scand., VI. 1618. 234. [*Aricia*] (1845). VIII. Europa.
3303. 234. [*Aricia*] (1849) et XIV. 6258. 234. [*Aricia*] (1860);
SCHIN., F. A., I. 639. [*Anthomyia*] (1862); MEADE, Entom. Monthly
Mag., XXV. 449. (1889) et Deser. List Brit. Anth., II. 46. 8.
(1897); STROBL, Tief's dipt. Nachl., 46. (1899); PAND., Revue
Entom. France, XIX. 265. 39. ♂ 276. 39. ♀ (1900).
semitulida ZETT., Dipt. Scand., IV. 1568. 183. ♀ [*Aricia*] (1845).
- dejecta** PAND., Revue entom. France, XIX. 273. 64. ♀ (1900). Gallia.
denigrata BOHEM. = **pratensis** MEIG.
- dentiens** PAND., Revue Entom. France, XIX. 268. 45. ♂ 290. 45. ♀ Gallia.
(1900).
- detergens** PAND., Revue Entom. France, XIX. 229. 16. [*Hydrophoria*] Gallia.
(1900).
- determinata* WALK. = **muscaria** MEIG.
- diadema** MEIG., S. B., V. 151. 117. ♂ [*Anthomyia*] (1826). Germania.
diducta PAND., Revue Entom. France, XIX. 285. 58. ♀ (1900). Gallia.
dilaminata PAND., Revue Entom. France, XIX. 263. 36. ♂ (1900). Gallia.
discreta MEIG., S. B., V. 172. 155. ♂ [*Anthomyia*] (1826); MACQ.,
Suët. à Buff., II. 337. 16. ♂ (1835); SCHIN., F. A., I. 647. [*An-*
thomyia] (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 261.
[*Anthomyia*] (1893); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXIII u.
XXIV. 55. [*Phorbia*] (1887) et Deser. List Brit. Anth., II. 50.
10. [*Phorbia*] (1897).
dissecta MEADE (nec MEIG.), Entom. Monthly Mag., XIX. 215.
♂ [*Phorbia*] (1883) et Deser. List Brit. Anth., II. 51. 15. ♂
[*Phorbia*] (1897).
intersecta PAND. (nec MEIG.), Revue Entom. France, XIX. 255.
20. ♂ 257. 20. var. ♂ (1900).
trapezoides ZETT., Dipt. Scand., IV. 1554. 167. ♂ [*Aricia*] (1845).
STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 256. [*Anthomyia*]
(1893).
- discussa** PAND., Revue Entom. France, XIX. 257. 24. ♂ 277. 24. ♀ Gallia.
282. 21. ♀ (1900).
- dissecta* MEADE (nec MEIG.) = **discreta** MEIG.
- dissecta** MEIG., S. B., V. 176. 160. ♂ [*Anthomyia*] (1826); MACQ.,
Suët. à Buff., II. 324. 2. ♂ (1835); SCHIN., F. A., I. 649. [*An-*
thomyia] (1862). Europa,
humicella STROBL (nec ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII.
256. p. p. [*Anthomyia*] (1893).
ignota ROSA., Atti Soc. Milano, IX. 168. 20. ♂ (1866) et Prodr.,
VI. 231. 36. ♂ (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX.
217. [*Phorbia*] (1883) et Deser. List Brit. Anth., II. 51. 16.
[*Phorbia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XIX. 240.
1. [*Egla*] (1900).
opifirma MEIG., S. B., V. 176. 161. [*Anthomyia*] (1826).
- dissecta** PAND. (nec MEIG.), Revue Entom. France, XIX. 267. 11. ♂ Europa-centr.
273. II. ♂ 288. II. ♀ (1900).

- dissecta** Rond. (*nec* Meig.), Atti Soc. Milano, IX, 172, 29, (1866) et Italia.
Prodr., VI, 225, 28, (1877).
- dissecta** Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., IV, 1547, 159. ♂ [*Aricia*] Dania,
(1845) et XIV, 6243, 159. ♀ [*Aricia*] (1860).
- divergens** Rond., Atti Soc. Milano, IX, 170, 23, (1866) et Prodr., VI, Italia.
212, 13 (1877).
- dorsalis** R.-D., Myod., 593, 6. ♂ [*Azelia*] (1830). Gallia.
- elongata** Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX, 563, (1889). Europae. et m.
- excavans** PAND., Revue Entom. France, XIX, 253, 12. ♂ 277, 12. Germania.
+ (1900).
- excubans** PAND., Revue Entom. France, XIX, 282, 55. ♀ (1900). Gallia.
- exigua** R.-D., Myod., 591, 22. ♀ [*Egle*] (1830). Gallia.
- exigua* Meade = *lepidida* Fall. (*nec* Wied.)
- exigua** PAND. (*nec* Meade), Revue Entom. France, XIX, 256, 21. ♂ Europaentr.
(1900).
- Fabricii** R.-D., Myod., 587, 8. ♂ [*Egle*] (1830). Gallia.
- Fabricii** Holmgr., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX, 101, [*Aricia*] Grönlandia,
(1872); Z. Ges. Vid. Medd., 285, 120, [*Anthomyia*] (1900); Steix, Now.-Seml.
Wien ento. Zeitzg., XXI, 58, (1902).
- festiva** R.-D., Myod., 589, 16. [*Egle*] (1830). Gallia.
- flavescens* R.-D., Myod., 590, 17, [*Egle*] (1830).
- flavescens* R.-D. [*Egle*] = **festiva** R.-D.
- flavescens* R.-D. [*Aricia*] = ?**cinerella** Fall.
- flavibasis** Steix, Mit. Zool. Mus. Berlin, II, 121, 173, (1903). Aegyptus, Ins.
Canar., Syria.
- flaviceps** Zett., Dipt. Scand., IV, 1540, 151. ♂ [*Aricia*] (1845) et Suecia.
XIV, 6241, 151. ♂ [*Aricia*] (1860).
- flavifrons** Zett., Dipt. Scand., XIV, 6242, 157-158. ♂ [*Aricia*] Lapponia.
(1860).
- flavosa* Macq. = **brassicae** Bouche.
- floralis** Fall., Musc., 71, 76. ♂ [*Musca*] (1824). Steix, Entom. Europaentr.
Nachr., XVIII, 326, (1892). et sept.
- floralis* Fall. p. p. = **brassicae** Wied.
- floralis* Fall. var. ♂ et ♂ = **trichodactyla** Rond.
- floricola** R.-D., Myod., 587, 16, [*Egle*] (1830). Gallia.
- florilega** Zett., Dipt. Scand., IV, 1555, 169. ♂ [*Aricia*] (1845), XI, Europa,
1733, 169. ♂ [*Aricia*] (1855) et XIV, 6246, 169. ♀ [*Aricia*] (1860); Ins. Canar.
Schim., F. A., I, 650, [*Anthomyia*] (1862); Meade, Entom. Monthly
Mag., XIX, 217, [*Phorbia*] (1883) et Descr. List Brit. Anth., II,
49, 7, [*Phorbia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XIX, 255,
19. ♂ (1900).
- florilega* Zett. p. p. = **trichodactyla** Rond.
- florum** R.-D., Myod., 589, 15, [*Egle*] (1830). Gallia.
- ? *Friescaua* Bouche = ?**muscaria** Meig.
- frontalis** Macq., Suit. à Buff., II, 325, 8. ♂ (1835). Gallia.
- frontalis* Macq. [*Anthomyia*] = **nitida** Macq.
- frontella** Zett., Ins. Lapp., 687, 116, [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Europaentr.
Scand., IV, 1615, 230, [*Aricia*] (1845), VIII, 330E, 230, [*Aricia*] et sept.

- (1849) et XIV. 6257. 230. [*Arícia*] (1860); SCHN., F. A., I. 651. [*Anthomyia*] (1862); STROBL, Mitth. Ver. Steiermark. 1897. 246. [*Anthomyia*] (1898).
- fugax** MEIG., S. B., V. 174. 157. [*Anthomyia*] (1826); SCHN., F. A., I. 646. [*Anthomyia*] (1862); STEIN, Entom. Nachr., XXVI. 153. (1900); LUNDB., Vid. Medd., 284. 119. [*Anthomyia*] (1900).
pubica ROXB., Atti Soc. Milano, IX. 173. 31. (1866) et Prodr., VI. 227. 31. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX. 215. [*Phorbia*] (1883) et Deser. List Brit. Anth., II. 49. 4. [*Phorbia*] (1897).
striolata ZETT. (nec FALL.), Ins. Lapp., 684. 103. p. p. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1545. 157. p. p. [*Arícia*] (1845), XII. 4731. 157. p. p. [*Arícia*] (1855) et XIV. 6242. 157. p. p. [*Arícia*] (1860); PAND., Revue Entom. France, XIX. 228. 15. [*Hydrophoria*] (1900)
- fugax** STROBL (nec MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 262. [*Anthomyia*] (1893). Styria.
- fulviceps** MACQ., Suit. à Buff., H. 340. 28. [*Anthomyia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 329. 56. [*Anthomyia*] (1838). Gallia.
- ?**fumigata** MEIG., S. B., V. 154. 125. ♀ [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., H. 309. 4. [*Ophyra*] (1835). Germania.
- funesta** KÜHN, Zeitschr. landw. Centralver. Prov. Sachsen, No. 6. I. 8. [*Anthomyia*] (1870); TASCHEMBERG, Pract. Insectenkde, 121. 49. [*Anthomyia*] (1880). Germania.
- ?**furcata** BOUCHE, Naturgesch. d. Ins., I. 71. 58. [*Anthomyia*] (1834). Germania.
- fusciceps** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1552. 165. ♂ [*Arícia*] (1845). Europa sept.
ruficeps STAEG., Kröjers Naturh. Tidskr., n. ser. I. 366. 43. ♂ [*Arícia*] (1845).
- fuscipennis** R.-D., Myod., 580. 27. [*Delia*] (1830). Gallia.
germana R.-D., Myod., 580. 28. [*Delia*] (1830).
- fuscipennis** MACQ., Suit. à Buff., H. 338. 19. ♂ [*Anthomyia*] (1835). Gallia.
- gagatea** R.-D., Myod., 564. 5. ♂ [*Leucophora*] (1830). Gallia.
- gemmata** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6233. 124-125. [*Arícia*] (1860); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI. 32. (1902). Lapponia.
- geniculata** MACQ., Suit. à Buff., H. 326. 11. ♂ (1835); MEIG., S. B., VII. 321. 56. ♂ [*Hylenyia*] (1838). Gallia.
- geniculata** MACQ., Suit. à Buff., H. 339. 24. [*Anthomyia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 331. 73. [*Anthomyia*] (1838). Gallia.
- gentianae** PAND., Revue Entom. France, XIX. 274. 50. (1900). Gallia.
germana R.-D. = **fuscipennis** R.-D.
- gilvocana** PAND., Revue Entom. France, XIX. 289. 61. (1900). Germania.
- glabra** R.-D., Myod., 579. 24. [*Delia*] (1830). Gallia.
- glaucescens* STROBL (nec ZETT.) = **lepida** FALL.
glaucoptana STROBL. = **lepida** FALL.
- gnava** MEIG., S. B., V. 164. 142. [*Anthomyia*] (1826); CURT., Farm. Ins., 142. 10. [*Anthomyia*] (1860) Europa.
incognita ROXB., Atti Soc. Milano, IX. 168. 19. (1866) et

- Prodr., VI. 230. 35. ♂ (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX. 215. [*Phorbia*] (1883).
- lactucae* BOUCHÉ, Naturgesch. d. Ins., I. 77. 64. [*Anthomyia*] (1834); SCHIS., F. A., I. 643. [*Anthomyia*] (1862); TASCHENBERG, Entom. für Gärtner, 381. 168. [*Anthomyia*] (1871) et Pract. Insectenkde, 125. 51. [*Anthomyia*] (1880); MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX. 215. ♂ [*Phorbia*] (1883); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 257. [*Anthomyia*] (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 51. 14. [*Phorbia*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XIX. 229. 17. [*Hypbrophoria*] (1900).
- lactucarum* BOUCHÉ, Naturgesch. d. Gartenins., 132. 3. [*Anthomyia*] (1833).
- obscura* ZETT. (nec Macq.), Dipt. Scand., IV. 1553. 166. ♂ [*Aricia*] (1845).
- grisella** ROND., Bull. Soc. entom. Ital., II. 328. 35. ♂ (1870) et Prodr., VI. 223. 22. ♂ (1877). Italia.
- Huberlandti* SCHIS. = **?sepia** MEIG.
- herbicola** R.-D., Myod., 578. 21. [*Delia*] (1830). Gallia.
- hilarella** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1513. 123. ♀ [*Aricia*] (1845). Suecia.
- hirticrura** ROND., Bull. Soc. entom. Ital., II. 329. 37. ♂ (1870) et Prodr., VI. 214. 16. ♂ (1877). Italia.
- histicrina* ROND. = **pratensis** MEIG.
- humarella** ZETT., Ins. Lapp. 686. 113. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1613. 228. [*Aricia*] (1845) et XIV. 6257. 228. [*Aricia*] (1860); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 256. p. p. [*Anthomyia*] (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 50. 12. [*Phorbia*] (1897). Europaeentr. et sept.
- latifrons* ZETT., Dipt. Scand., IV. 1598. 212. ♀ [*Aricia*] (1845).
- morionella* PAND. (nec ZETT.), Revue Entom. France, XIX. 251. 8. (1900).
- humarella* STROBL. (nec ZETT.) p. p. = **dissecta** MEIG.
- hystrix** BRISCHKE, Entom. Nachr., VI. 56. ♀ [*Anthomyia*] (1880) et Schrift. Ges. Danzig, V. 287. [*Anthomyia*] (1880). Germania.
- icterica** HOLMGR., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX. 102. ♀ [*Aricia*] (1872); LUNDB., Vid. Medd., 286. 122. ♂ [*Anthomyia*] (1900). Grönlandia, Now.-Semb.
- ignola* ROND. = **dissecta** MEIG.
- impubicollis** PAND., Revue Entom. France, XIX. 265. 40. ♂ 276. 40. ♀ (1900). Gallia.
- impudica* ROND. = **trapezina** ZETT.
- inaequa** PAND., Revue Entom. France, XIX. 255. 18. ♂ 272. 18. ♀ (1900). Germania.
- incana** BRISCHKE, Schrift. Ges. Danzig, V. 260. ♀ [*Anthomyia*] (1880). Germania.
- incognita* ROND. = **gnava** MEIG.
- inermella** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1598. 211. ♀ [*Aricia*] (1845). Lapponia.
- infirma* MEIG. = **dissecta** MEIG.

- infirmata** PAND. (*nee* MEIG.), Revue Entom. France, XIX, 252, 11. (1900). Europacentr.
- insperata** PAND., Revue Entom. France, XIX, 260, 29. ♂ (1900). Gallia.
- interflua** PAND., Revue Entom. France, XIX, 262, 33. ♂ (1900). Gallia.
- intercrapillinea* ZETT. = **cinerella** FALL.
- intersecta** MEIG., S. B., V, 175, 159. ♂ [*Anthomyia*] (1826); SCHN., Europa.
F. A., I, 646. [*Anthomyia*] (1862); STEIS, Entom. Nachr., XXVI,
154, (1900).
- neglecta* MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX, 249. ♂ [*Phorbia*]
(1883) et Descr. List Brit. Anth., II, 50, 11. [*Phorbia*] (1897).
- quintilis* PAND., Revue Entom. France, XIX, 253, 13. ♂ 279,
13. ♀ (1900).
- intersecta* PAND. (*nee* MEIG.) = **discreta** MEIG.
- intersecta** RONDI. (*nee* MEIG.), Atti Soc. Milano, IX, 170, 25. (1866) Italia.
et Prodr., VI, 229, 33. (1877).
- intersecta** STROBL (*nee* MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, Styria.
260. [*Anthomyia*] (1893).
- intersecta* ZETT. (*nee* MEIG.) = **vetula** ZETT.
- Jacobaeae** HARDY, Scott. Naturalist, I, 254, III. ♀ [*Anthomyia*] Britannia.
(1871—72).
- Judicariae** POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 11. ♂ [*Hyle-* Teriolis.
myia] (1893).
- labiata* R.-D. (*nee* FABR.) = ? **muscaria** MEIG.
- lactucae* BOUCHÉ = **gnava** MEIG.
- lactuarum* BOUCHÉ = **gnava** MEIG.
- laminata* ZETT. = **trapezina** ZETT.
- laminifera** RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 167, 18. ♂ (1866) et Prodr., Italia.
VI, 229, 34. ♂ (1877).
- lanigerus* THOMS. = **cilicrura** RONDI.
- latifrons* ZETT. = **humerella** ZETT.
- latipennis** ZETT., Ins. Lapp., 676, 75. ♂ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Europacentr.
Scand., IV, 1508, 118. [*Tricia*] (1845); PAND., Revue Entom. et sept.
France, XIX, 259, 28. ♂ (1900).
- lepida** FALL. (*nee* WIED.), Musc., 76, 90. [*Musca*] (1825); ZETT., Ins. Europacentr.
Lapp., 686, 110. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1595, et sept.
209. [*Tricia*] (1845) et XIV, 6254, 209. [*Tricia*] (1869).
- exigua* MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX, 220. ♂ [*Phorbia*]
(1883) et Descr. List Brit. Anth., II, 52, 17. [*Phorbia*] (1897).
- glaurescens* STROBL (*nee* ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XLIII, 257. [*Anthomyia*] (1893).
- glaucophana* STROBL., Mithl. Ver. Steiermark, 1897, 247. (1898).
- lepida* ZETT. (*nee* FALL.) var. *b* p. p. **parva** R.-D.
- lepida* ZETT. (*nee* FALL.) var. *b* p. p. **atomaria** ZETT.
- litigata** PAND., Revue Entom. France, XIX, 274, 51. ♂ (1900). Gallia.
- littoralis** R.-D., Myod., 580, 29. ♂ [*Delia*] (1830). Gallia.
- liturata* MEIG. = **trichodaetyla** RONDI.
- longicauda** STROBL., Mithl. Ver. Steiermark, 1897, 245. ♂ [*Antho-* Europacentr.
myia] (1898). et mer.

- nuda* STEIN, Entom. Nachr., XXVI, 314, 9. (1900).
- longipilis** PAND., Revue Entom. France, XIX, 261, 32. ♂ (1900). Germania.
- longula** FALL., Musc., 72, 79. [*Musca*] (1824); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1565, 179. [*Aricia*] (1845); SCHIX., F. A., I, 636. [*Anthomyia*] (1862); ROND., Atti Soc. Milano, IX, 171, 28. (1866) et Prodr., VI, 226, 30. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV, 55. (1887) et Descr. List Brit. Anth., II, 45, 5. (1897); PAND., Revue Entom. France, XIX, 258, 25. ♂ (1900).
- punctiventris* ZETT., Dipt. Scand., XIV, 6212, 60-61. ♂ [*Aricia*] (1860).
- macula** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1600, 214. ♀ [*Aricia*] (1845) et VIII, 3300, 214. [*Aricia*] (1849). Suecia.
- maculifrons** ZETT., Ins. Lapp., 672, 46. ♀ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1443, 54. ♀ [*Aricia*] (1845); SIEBKE, Nyt Mag. Naturvid., XIV, 407. ♀ [*Aricia*] (1866) et Catal. Dipt. Norw., 106, 42. ♀ [*Aricia*] (1877); STEIN, Wien. entom. Zeitzg., XXI, 36. (1902). Suecia.
- scutis* ZETT., Ins. Lapp., 682, 94. ♂ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1534, 145. ♀ [*Aricia*] (1845); STEIN, Wien. entom. Zeitzg., XXI, 41. (1902).
- margaritans** PAND., Revue Entom. France, XIX, 288, 60. ♀ (1900). Gallia.
- marginata* WALK. = *cilicirura* ROND.
- melanaria** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1607, 222. ♀ [*Aricia*] (1845). Europa sept.
- melanogaster** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1568, 182. ♀ [*Aricia*] (1845). Suecia.
- melanura** MEIG., S. B., V, 172, 153. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 327, 14. (1835); PAND., Revue Entom. France, XIX, 258, 27. ♂ (1900). Europacentr.
- minuta* MEIG. = ?*parva* R.-D.
- morianella** ZETT., Ins. Lapp., 687, 114. ♂ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1615, 229. ♂ [*Aricia*] (1845). Lapponia.
- morianella* PAND. (nec ZETT.) = **humereilla** ZETT.
- musca** R.-D., Myod., 559, 1. [*Phorbia*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 326, 9. ♀ (1835). Gallia.
- muscaria** MEIG. (nec FABR.), S. B., V, 170, 150. ♂ [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 342, 40. [*Anthomyia*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1549, 162. [*Aricia*] (1845); ROND., Atti Soc. Milano, IX, 171, 26. (1866) et Prodr., VI, 219, 21. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX, 246. [*Phorbia*] (1883); SCHROB., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 258. [*Anthomyia*] (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 51, 13. [*Phorbia*] (1897). Europa.
- brevicornis* ZETT., Ins. Lapp., 683, 99. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1534, 146. [*Aricia*] (1845) et XIV, 6239, 146. [*Aricia*] (1860); SCHIX., F. A., I, 646. [*Anthomyia*] (1862); PAND., Revue Entom. France, XIX, 246, 1. ♂ 272, 1. ♀ (1900).
- ciliata* WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 961. ♂ [*Eriphia*] (1849).

- determinata* WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV, 955. ♀ [*Anthomyia*] (1849).
- ? *Friescaua* BOUCHÉ, Naturgesch. d. Ins., I, 87, 76. [*Anthomyia*] (1834).
- ? *labiata* R.-D. (nec FABR.), Myod., 586, 7. [*Egla*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 342, 32. ♂ [*Anthomyia*] (1835).
- palpella* ROND., Bull. Soc. entom. Ital., II, 328, 36. (1870).
- muscaria** SCHN. (nec MEIG.), F. A., I, 644. (1862). Austria.
- naso* ZETT. = **vetula** ZETT.
- nasutula** PAND., Revue Entom. France, XIX, 285, 57. ♀ (1900). Europacentr. et occid.
- neglecta* MEADE = **intersecta** MEIG.
- nigra** R.-D., Myod., 591, 21. ♂ [*Egla*] (1830). Gallia.
- nigronitens** PAND., Revue Entom. France, XIX, 266, 41. ♂ (1900). Gallia.
- nitida** MACQ., Suit. à Buff., II, 338, 21. ♂ [*Anthomyia*] (1835). Gallia.
- frontalis* MACQ., Suit. à Buff., II, 339, 25. ♀ [*Anthomyia*] (1835).
- nitida** R.-D., Myod., 586, 6. ♀ [*Egla*] (1830). Gallia.
- nitidicauda** ZETT., Dipt. Scand., XII, 4730, 148—149. [*Aricia*] (1855). Scandinavia.
- nuceicornis** PAND., Revue Entom. France, XIX, 264, 37. ♂ 288, 37. ♀ (1900). Gallia.
- nuda* STEIN. = **longicauda** STROBL.
- obscura** MACQ., Suit. à Buff., II, 336, 15. ♂ [*Anthomyia*] (1835). Europacentr. et sept.
- obscura* ZETT. (nec MACQ.) = **gnava** MEIG.
- octoguttata** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1570, 185. ♂ [*Aricia*] (1845); MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX, 33. [*Anthomyia*] (1882). Europacentr. et sept.
- var. moesta* HOLMGR., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX, 102. ♂ [*Aricia*] (1872); LUNDB., Vid. Medd., 286, 121. [*Anthomyia*] (1900); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 59. (1902).
- odontogaster* ZETT. = **trapezina** ZETT.
- oralis* R.-D. = ? **cinerella** FALL.
- orbitalis** PAND., Revue Entom. France, XIX, 289, 62. ♀ (1900). Gallia.
- pallipennis* ZETT. = **canescens** ZETT.
- pallipes** R.-D., Myod., 588, 12. [*Egla*] (1830). Gallia.
- palmodes** PAND., Revue Entom. France, XIX, 284, 56. ♀ (1900). Gallia.
- palpella* ROND. = **muscaria** MEIG.
- palustris** R.-D., Myod., 578, 20. [*Delia*] (1830). Gallia.
- parva** R.-D., Myod., 590, 20. [*Egla*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 343, 42. [*Anthomyia*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1617, 233. [*Aricia*] (1845), VIII, 3303, 233. [*Aricia*] (1849) et XII, 4736, 233. [*Aricia*] (1855); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 256. [*Anthomyia*] (1893). Europacentr. et sept.
- lepida* var. *b* ZETT. (nec FALL.), Ins. Lapp., 686, 110. [*Anthomyia*] (1838).
- ? *minuta* MEIG., S. B., V, 17, 163. [*Anthomyia*] (1826).
- parvula** FALL., Musc., 75, 85. [*Musca*] (1824); MEIG., S. B., V, 200, 205. [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1604, 219. [*Aricia*] (1845). Succia.
- perrima* WALK. = **cilicrura** ROND.

- pictiventris** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1539. 150. ♂ [*Aricia*] (1845) et XIV. 6240. 150. ♂ [*Aricia*] (1860). Europacentr. et sept.
anilis ZETT., Ins. Lapp., 682. 92. ♀ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1530. 141. ♀ [*Aricia*] (1845) et XIV. 6238. 141. ♀ [*Aricia*] (1860).
cunicornis ZETT., Ins. Lapp., 682. 90. ♀ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1532. 143. ♀ [*Aricia*] (1845).
pilifera ZETT. = **pratensis** MEIG.
pilitarsis STEIN, Entom. Nachr., XXVI. 313. 8. ♂ [*Prosalpia*] (1900). Europacentr.
pilosella ROND., Prodr., VI. 218. 20. ♂ (1877). Italia.
platura MEIG. p. p. = **cilicrura** ROND.
platura MEIG. p. p. = **trichodactyla** ROND.
platura ROND. (nec MEIG.), Atti Soc. Milano, IX. 170. 24. (1866) et Prodr., VI. 228. 32. (1877); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 261. [*Anthomyia*] (1893). Europacentr. et mer.
platygaster THOMS. = **cilicrura** ROND.
praeox R.-D. = ?**claripennis** R.-D. [*Eglet*].
pratensis MEIG., S. B., V. 158. 132. [*Anthomyia*] (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 339. 27. [*Anthomyia*] (1835); SCHN., F. A., I. 643. [*Anthomyia*] (1862); PAND., Revue Entom. France, XIX. 266. 43. ♂. var. 267. 43. ♂ 279. 43. ♀ (1900). Europa.
denigrata BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XX. 82. 26. [*Aricia*] (1863).
histicina ROND., Atti Soc. Milano, IX. 169. 22. ♂ (1866) et Prodr., VI. 225. 29. (1877).
pilifera ZETT., Dipt. Scand., IV. 1623. 240. ♂ [*Aricia*] (1845) et XIV. 6259. 240. ♀ [*Aricia*] (1860).
sepia ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., IV. 1537. 148. p. p. [*Aricia*] (1845).
pratensis R.-D., Myod., 577. 17. [*Delia*] (1830). Gallia.
pratensis STROBL (nec MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 257. [*Anthomyia*] (1893). Gallia.
promissa MEIG., S. B., V. 166. 144. ♀ [*Anthomyia*] (1826); SCHN., F. A., I. 649. ♀ [*Anthomyia*] (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 258. [*Anthomyia*] (1893). Europacentr.
pseudofugax STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 262. [*Anthomyia*] (1893). Styria.
pulica ROND. = **fugax** MEIG.
pulverulenta R.-D., Myod., 588. 11. ♀ [*Eglet*] (1830). Gallia.
punctiventris ZETT. = **longula** FALL.
pusilla MEIG. = **cinerella** FALL.
pygialis PAND., Revue Entom. France, XIX. 252. 10. (1900). Germania.
quinquevirgata PAND., Revue Entom. France, XIX. 261. 31. ♂ (1900). Germania.
quintilis PAND. = **intersecta** MEIG.
remorata HOLMGR. = **cinerella** FALL.
retrostimulea PAND., Revue Entom. France, XIX. 290. 63. ♀ (1900). Gallia.

- rhinotmeta** PAND, Revue Entom. France, XIX. 253. 14. ♂ 279. 14. Gallia.
♀ (1900).
- rotundiventris** PAND. (*nee* ZETT.), Revue Entom. France, XIX. 252. 9. (1900). Germania.
- rubifrons* BIG. = **cilicirura** ROND.
- ruginans** PAND., Revue Entom. France, XIX. 254. 16. ♂ (1900). Europacentr.
ruficeps STAEG. = **fusciceps** ZETT. et occid.
- rupacula* BIG. = **cilicirura** ROND.
- rupicapra** MIK, Wien. entom. Zeitg., VI. 296. (1887). Austria.
- rustica** R.-D., Myod., 559. 2. ♀ [*Phorbia*] (1830). Gallia.
- Sancti Jacobi* BIG. = **trichodactyla** ROND.
- Sancti Marci** CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXV. 252. 2. (1906). Austria sup.
- scatophagina* ZETT. = **angustifrons** MEIG.
- semiaenea** BRULLE, Expéd. scient. d. Morée, III. 318. 695. ♂ [*Anthomyia*] (1832). Graecia.
- semititida* ZETT. = **curvicauda** ZETT.
- seneciella** MEADE, Bull. Soc. entom. France, 61. CXVI. [*Phorbia*] (1892) et Descr. List Brit. Anth., II. 49. 8. [*Phorbia*] (1897). Gallia.
- senilis* ZETT. = **maculifrons** ZETT.
- sepia** MEIG., S. B., V. 152. 121. [*Anthomyia*] (1826); Macq., Suit. à Europa,
Buff., II. 327. 15. (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1537. 148. Asia sept.
[*Aricia*] (1845); WALK., Ins. Brit., II. 140. 68. [*Anthomyia*] (1853);
SCHIN., F. A., I. 638. [*Anthomyia*] (1862); ROND., Atti Soc. Milano,
IX. 174. 33. (1866) et Prodr., VI. 222. 25. (1877); MEADE, Entom.
Monthly Mag., XIX. 148. (1882); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, XLIII. 255. [*Anthomyia*] (1893); MEADE, Descr. List Brit.
Anth., II. 46. 9. (1897); PAND., Revue Entom. France, XIX. 264.
38. ♂ 283. 38. ♀ (1900).
? *Haberlandti* SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 999.
[*Anthomyia*] (1865); MIK, Wien. entom. Zeitg., XIV. 94. 36.
(1895).
- sepia* ZETT. (*nee* MEIG.) p. p. = **pratensis** MEIG.
- sepiella** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1541. 153. ♂ [*Aricia*] (1845); STEIN, Laponnia.
Wien. entom. Zeitg., XXI. 41. (1902).
- sergia* WALK. = **cilicirura** ROND.
- signata** BRISCHKE, Schrift. Ges. Danzig, VII. 1. 107. ♂ [*Anthomyia*] (1888). Germania.
- sonchi** HARDY, Scott. Naturalist, I. 209. II. [*Anthomyia*] (1871—72). Britannia.
- sordida** BRULLE, Expéd. scient. d. Morée, III. 317. 694. ♀ [*Anthomyia*] (1832). Graecia.
- soror** R.-D., Myod., 578. 22. [*Delia*] (1830). Gallia.
- spatulans** PAND., Revue Entom. France, XIX. 277. 54. ♀ (1900). Germania.
- spretta** STROBL (*nee* MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 259. ♂ [*Anthomyia*] (1893). Styria.
- stigmatella** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1599. 213. ♀ [*Aricia*] (1845). Scandinavia.
- stigmatica** PAND. (*nee* MEIG.), Revue Entom. France, XIX. 262. 35. ♂ (1900). Germania.

- stricta** WALK., Ins. Brit., II. 143. 75. [*Anthomyia*] (1853). Britannia.
- († **strigilata** ZETT., Ins. Lapp., 684. 101. ♀ [*Anthomyza*] (1838) et Laponnia.
Dipt. Scand., IV. 1556. 170. ♀ [*Aricia*] (1845).
- striolata** FALL., Musc., 71. 27. [*Musca*] (1824); MEIG., S. B., V. 173. Europa centr.
156. ♂ [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 684. 113. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1545. 157. [*Aricia*] (1845), XII. et sept.
4731. 157. [*Aricia*] (1855) et XIV. 6242. 157. [*Aricia*] (1860); SCHIN., F. A., I. 647. [*Anthomyia*] (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 262. [*Anthomyia*] (1893); MEADE, Entom. Monthly Mag., ser. 2. IV. 220. (1893) et Descr. List Brit. Anth., II. 45. 6. (1897).
- striolata** ZETT. (nec FALL.) p. p. = **fugax** MEIG.
- ?**stygia** STROBL (nec MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 256. Styria.
♀ [*Anthomyia*] (1893).
- subvittata** BRULLÉ, Expéd. scient. d. Morée, III. 317. 693. [*Anthomyia*] (1832). Græcia.
- superuncta** PAND., Revue Entom. France, XIX. 287. 52. ♀ (1900). Germania.
- tarsifimbria** PAND., Revue Entom. France, XIX. 249. 4. ♂ 279. 4. Germania.
♀ (1900).
- tessellata** R.-D., Myod., 576. 15. [*Delia*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., Gallia.
II. 335. 10. [*Anthomyia*] (1835).
- ?**tibialis** MACQ., Suit. à Buff., II. 338. 22. ♂ [*Anthomyia*] (1835); Gallia.
MEIG., S. B., VII. 332. 74. [*Anthomyia*] (1838).
- transversalis** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1538. 149. ♂ [*Aricia*] (1845); Europa centr.
MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX. 214. [*Phorbia*] (1883); et sept.
STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 255. [*Anthomyia*] (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 48. 3. [*Phorbia*] (1897).
- trapezina** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1513. 124. [*Aricia*] (1845); SCHIN., Europa,
F. A., I. 638. [*Anthomyia*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., Asia min.
XIX. 147. (1882), XXIII u. XXIV. 54. (1887) et ser. 2. IV. 220. (1893) et Descr. List Brit. Anth., II. 45. 4. (1897).
- cinerea* MEADE (nec FALL.), Entom. Monthly Mag., XIX. 147.
♀ (1882).
- impulica* ROND., Atti Soc. Milano, IX. 173. 32. (1866) et Prodr., VI. 223. 26. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX. 146. (1882); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 254. [*Anthomyia*] (1893).
- laminata* ZETT., Ins. Lapp., 675. 62. ♂ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1507. 117. [*Aricia*] (1845).
- olontogaster* ZETT., Dipt. Scand., IV. 1519. 129. [*Aricia*] (1845).
- varicolor* PAND. (nec MEIG.), Revue Entom. France, XIX. 262. 34. ♂ 275. 34. ♀ 287. 34. ♀ (1900).
- trapezoides** MEADE (nec ZETT.), Descr. List Brit. Anth., II. 53. 20. Britannia.
♂ [*Phorbia*] (1897).
- trapezoides** ROND. (nec ZETT.), Atti Soc. Milano, IX. 169. 21. ♂ Italia.
(1866) et Prodr., VI. 221. 24. ♂ (1877).

trapezoides ZETT. = **discreta** MEIG.

trichodactyla RONDI., Atti Soc. Milano, IX. 164. 11. ♂ (1866) et Prodr., VI. 213. 14. ♂ (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX. 217. [*Phorbia*] (1883); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 260. [*Anthomyia*] (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 49. 5. [*Phorbia*] (1897); PASD., Revue Entom. France, XIX. 250. 5. (1900).

angustiventris ZETT., Dipt. Scand., IV. 1542. 154. ♂ [*Aricia*] (1845), XII. 4731. 154. [*Aricia*] (1855) et XIV. 6242. 154. [*Aricia*] (1860).

floralis FALL. var. γ et δ , Musc., 71. 76. [*Musca*] (1824).

florilega ZETT., Dipt. Scand., IV. 1555. 169. ♂ p. p. [*Aricia*] (1845) et XII. 4733. 169. ♂ p. p. [*Aricia*] (1860).

littorata MEIG., S. B., VII. 329. 37. ♂ [*Anthomyia*] (1838); SCHIN., F. A., I. 650. [*Anthomyia*] (1862).

plataria MEIG., S. B., V. 171. 152. p. p. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 343. 41. [*Anthomyia*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1547. 160. p. p. [*Aricia*] (1845) et XII. 4732. 160. p. p. [*Aricia*] (1855); SCHIN., F. A., I. 645. p. p. [*Anthomyia*] (1862).

Sancti-Jacobi BIG., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 296. 2. ♂ [*Anthomyia*] (1885).

trigonigaster PASD. = **cinerella** FALL.

trigonomaculata MACQ. = **cinerella** FALL.

?**triplex** LW., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 46. 47. ♂ [*Anthomyia*] (1873). Dalmatia, Hungaria.

?**tristis** MEIG., S. B., V. 153. 122. ♂ [*Anthomyia*] (1826). Germania.

triticiperda STEIN, Entom. Nachr., XXVI. 317. 11. (1900). Hungaria.

tyana WALK. = **cilicrura** RONDI.

umbellatarum R.-D., Myod., 579. 25. [*Delia*] (1830). Gallia.

?**unicolor** BRULLÉ, Expéd. scient. d. Morée, III. 318. 696. ♀ [*Lispa*] (1832). Graecia.

?**ursula** ERICHSON in MIDDENDORF, Reise nach Sibirien, II. 1 67. 152. [*Anthomyia*] (1851). Sibiria.

varicolor MEIG., S. B., V. 167. 146. [*Anthomyia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 325. 7. (1835); WALK., Ins. Brit., II. 141. 71. [*Anthomyia*] (1853); SCHIN., F. A., I. 637. [*Anthomyia*] (1862); RONDI., Atti Soc. Milano, IX. 172. 30. (1866) et Prodr., VI. 224. 27. (1877); STEIN, Entom. Nachr., XXVI. 156. (1900); MEVS., Bull. Soc. entom. France, 62. LXIV. I. (1893). Europa.

varicolor PASD. (nec MEIG.) = **trapezina** ZETT.

?**vernalis** R.-D., Myod., 594. 8. ♀ [*Azelia*] (1830). Gallia.

vetula ZETT., Ins. Lapp., 682. 93. ♀ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1550. 163. [*Aricia*] (1845) et VIII. 3293. 163. [*Aricia*] (1849). Europacentr. et sept.

intersecta ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., IV. 1548. 161. ♂ [*Aricia*] (1845).

NA

- naso* ZETT., Dipt. Scand., IV. 1551. 164. ♂ [*Aricia*] (1845);
STEIN, Entom. Nachr., XVIII. 327. (1892).
- viana* WALK. = **cilicrura** ROND.
- vicina* MACQ., Suit. à Buff., II. 337. 17. ♂ [*Anthomyia*] (1835). Gallia.
- villipes* ZETT. = **brassicae** BOURCHÉ.
- virescens* MACQ. = **cinerella** FALL.
- viridescens** R.-D., Myod., 589. 14. ♀ [*Egle*] (1830); MACQ., Suit. à Gallia.
Buff., II. 342. 39. [*Anthomyia*] (1835).
- vittata** MACQ., Suit. à Buff., II. 336. 14. ♂ [*Anthomyia*] (1835). Gallia.
- vulgaris** R.-D., Myod., 579. 23. [*Delia*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., Gallia.
II. 336. 13. [*Anthomyia*] (1835).

Lasiops

MEIG., S. B., VII. 323. 3. (1838).

- adelpha** KOW., Mitth. Münch. entom. Ver., IV. 133. 5. ♂ (1880). Austria.
- anthomyina** ROND., Atti Soc. Milano, IX. 143. 1. ♂ (1866) et Prodr., Europa centr.
VI. 149. 1. ♂ (1877); KOW., Mitth. Münch. entom. Ver., IV. 136. et mer.,
7. ♂ (1880). Ins. Canar.
- Rondania* PAND., Revue Entom. France, XIX. 240. 3. [*Egle*]
(1900).
- ctenocnema** KOW., Mitth. Münch. entom. Ver., IV. 130. 2. ♂ (1880); Europa centr.
MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX. 29. (1882) et Descrip. List et sept.
Brit. Anth., II. 41. 1. (1897).
- eriphthalma** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6236. 134—135. ♂ [*Aricia*] Europa centr.
(1860); KOW., Mitth. Münch. entom. Ver., IV. 138. 8. ♂ (1880); et sept.
PAND., Revue Entom. France, XIX. 249. 3. ♂ 273. 3. ♀ [*Chortophila*]
(1900).
- glacialis** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1521. 131. [*Aricia*] (1845); KOW., Europa.
Mitth. Münch. entom. Ver., IV. 135. 6. (1880).
- hirticeps* ZETT. (nec FALL.). Ins. Lapp., 679. 77. ♀ (nec ♂) [*Anthomyia*]
(1838).
- Kowarzi* STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 233. (1893).
- hirticeps* ZETT. (nec FALL.) p. p. = **glacialis** ZETT.
- Kowarzi* STROBL = **glacialis** ZETT.
- Meadei** KOW., Mitth. Münch. entom. Ver., IV. 131. 3. (1880); MEADE, Britannia.
Entom. Monthly Mag., XIX. 30. (1882) et Descrip. List Brit. Anth.,
II. 42. 3. ♂ (1897).
- parviceps** KOW., Mitth. Münch. entom. Ver., IV. 132. 4. ♂ (1880). Europa centr.
- Röderi** KOW., Mitth. Münch. entom. Ver., IV. 128. 1. (1880); MEADE, Europa centr.
Entom. Monthly Mag., XIX. 30. (1882) et Descrip. List Brit. Anth., et sept.
II. 42. 2. (1897).
- Rondania* PAND. = **anthomyina** ROND.
- triseriata** STEIN, Entom. Nachr., XXVI. 309. 5. (1900). Europa mer.

Anthomyia

MEIG., Illiger's Magaz., H. 281. 111. (1803).

- aestiva** MEIG., S. B., V. 169. 149. ♂ (1826); PAND., Revue Entom. France, XIX. 242. 5. [*Egle*] (1900).
aestivalis MACQ., Suit. à Buff., H. 313. 13. [*Limnophora*] (1835).
cinerella FALL. var. β , Muse., 77. 91. [*Musca*] (1825).
hamerella ZETT., Ins. Lapp., 686. 113. p. p. [*Anthomyza*] (1838)
 et Dipt. Scand., IV. 1613. 228. p. p. [*Aricia*] (1845); SCHN.,
 F. A., I. 644. (1862); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
 XLIII. 256. ♀ (1893).
muscaria MEIG., S. B., V. 170. 150. ♀ (1826).
obelisca MEIG., S. B., V. 172. 154. ♂ (1826); MACQ., Suit. à
 Buff., H. 342. 38. ♂ (1835).
 ? *prompta* R.-D., Myod., 558. 5. ♂ [*Xerina*] (1830); MACQ.,
 Suit. à Buff., H. 324. 5. ♂ [*Chortophila*] (1835).
subcella ZETT., Dipt. Scand., XVI. 6259. 243. ♂ [*Aricia*] (1860).
subcinctris ZETT., Dipt. Scand., IV. 1451. 62. ♂ [*Aricia*] (1845);
 ROND., Atti Soc. Milano, IX. 149. 7. (1866) et Prodr., VI.
 158. 7. ♂ (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX. 32.
 (1882); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 253. (1893);
 MEADE, Descr. List Brit. Anth., H. 43. 5. (1897).
 var. **alpina** STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 253.
 (1893).
aestivalis MACQ. = **aestiva** MEIG.
- albicincta** FALL., Muse., 73. 81. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V. 161. 138. (1826); MACQ., Suit. à Buff., H. 338. 20. (1835); ZETT.,
 Ins. Lapp., 685. 106. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV.
 1601. 216. [*Aricia*] (1845); SCHN., F. A., I. 648. (1862); ROND.,
 Atti Soc. Milano, IX. 148. 4. (1866) et Prodr., VI. 156. 4. (1877);
 MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX. 32. (1882) et Descr. List
 Brit. Anth., H. 43. 2. (1897); PAND., Revue Entom. France,
 XVIII. 205. 2. (1899).
micropteryx THOMS., Eugenes Resa, Dipt., 555. 195. (1868).
monticola BIG., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 297. 4.
 (1885).
 ? *nigricans* R.-D., Myod., 584. 8. ♀ (1830).
- ? **alpica** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1624. 241. [*Aricia*] (1845). Scandinavia.
bisulcata THOMS. = **illocata** WALK.
brassicæ WIED. = **radicum** L.
campestris R.-D. = ? **radicum** L.
chorea R.-D. = **pluvialis** L.
cineræ FALL. p. p. = **radicum** L.
cinerella FALL. var. β = **aestiva** MEIG.
- dedecorata** ROND., Atti Soc. Milano, IX. 148. 5. ♂ (1866) et Prodr.,
 VI. 157. 5. ♂ (1877).
defixa WALK., Ins. Brit., H. 137. 57. (1853).
 Italia.
 Britannia.

- diadema* HOLMGR. = *radicum* L.
flavescens R.-D. = *pluvialis* L.
 ?*floralis* R.-D., Myod., 583. 6. ♀ (1830). Gallia.
gagatea R.-D., Myod., 583. 7. ♂ (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Gallia.
 341. 32. ♂ (1835).
humicella ZETT. p. p. = *aestiva* MEIG.
illocata WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 129. 131. ♀ (1856): China.
 STEIN, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., 197. (1901).
bisetosa THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 555. 196. ♀ (1868).
vicarians SCHIN., Novara Reise, Dipt., 298. 11. ♀ (1868); STEIN,
 Termész. Füzt., XXIII. 142. 15. [*Spilogaster*] (1900).
infirmata ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., IV. 1585. 198. [*Aricia*] (1845). Europa.
jugicola POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 13. (1893). Jugum Stel-
 vianum.
lulibanda R.-D. = *radicum* L.
micropteryx THOMS. = *albicincta* FALL.
 ?*mollis* R.-D., Myod., 583. 5. (1830). Gallia.
monticola BIG. = *albicincta* FALL.
muscaria MEIG. p. p. = *aestiva* MEIG.
napobrassicae BJERK. = *radicum* L.
nigricans R.-D. = ? *albicincta* FALL.
obelisca MEIG. = *aestiva* MEIG.
obliqua MACQ. = *radicum* L.
plurinotata BRULLÉ, Expéd. scient. d. Morée, III. 316. 692. ♀ Hungaria,
 (1832). Graecia.
pluvialis L., Fauna Suec., Ed. II. 455. 1844. [*Musca*] (1761); Scop., Europa,
 Entom. Carn., 332. 891. [*Musca*] (1763); L., Syst. Nat., Ed. XII. Creta,
 II. 992. 83. [*Musca*] (1767); FABR., Syst. Entom., 779. 28. [*Musca*] Asia sept.,
 (1775); DEG., Ins., VI. 27. 6. [*Musca*] (1776); FABR., Spec. Ins., Asia min.,
 II. 443. 40. [*Musca*] (1781); SCHIRANK, Enum. Ins. Austr., 463. Africa sept.,
 939. [*Musca*] (1781); ROSSI, Fauna Etr., II. 397. 1509. [*Musca*] Ins. Canar.,
 (1790); FABR., Entom. syst., IV. 329. 71. [*Musca*] (1794) et Syst. Syria.
 Antl., 304. 98. [*Musca*] (1805); FALL., Musc., 68. 71. [*Musca*]
 (1824); MEIG., S. B., V. 163. 141. (1826); R.-D., Myod., 582. 1.
 (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 340. 30. (1835); ZETT., Ins. Lapp.,
 680. 85. [*Anthomyia*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1558. 173. [*Aricia*]
 (1845); WALK., Ins. Brit., II. 135. 52. (1853); SCHIN., F. A., I.
 647. (1862); RONDI, Atti Soc. Milano, IX. 147. 2. (1866) et Prodr.,
 VI. 155. 3. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX. 32.
 (1882) et Descr. List Brit. Anth., II. 42. 1. (1897); PASD., Revue
 Entom. France, XVIII. 206. 3. (1899).
chorca R.-D., Myod., 582. 2. (1830).
flavescens R.-D., Myod., 582. 3. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II.
 341. 31. (1835).
quinquemaculata MACQ., BARKER, WEBB et BERTH., Hist. nat. d.
 Hes. Canaries, II. 13. 116. 92. (1838) et Dipt. exot., II. 3.
 170. 2. ♂ (1843).
soror R.-D., Myod., 583. 4. ♀ (1830).

var. imbrida Rond., Atti Soc. Milano, IX. 148. 3. (1866) et Prodr., VI. 155. 2. (1877).

var. procellaris Rond., Atti Soc. Milano, IX. 147. 1. (1866) et Prodr., VI. 154. 1. (1877).

praticola ZETT. = **pratincola** PANZ.

pratincola PANZ., Fauna Germ., 108. 12. (1809); SCHN., F. A., I. 648. (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX. 32. (1882) et Deser. List Brit. Anth., II. 43. 3. (1897). Europaeentr. et sept., Syria.

praticola ZETT., Dipt. Scand., IV. 1559. 174. [*Aricia*] (1845); PANZ., Revue Entom. France, XVIII. 204. 1. (1899).

pratincola MEIG., S. B., V. 162. 140. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 341. 34. (1835).

pratincola MEIG. = **pratincola** PANZ.

prompta R.-D. = ?**aestiva** MEIG.

pusilla MEIG. p. p. = **radicum** L.

quinquemaculata MACQ. = **pluvialis** L.

radicum L., Fauna Suec., Ed. II. 454. 1840. [*Musca*] (1761) et Syst. Nat., Ed. XII. II. 392. 79. [*Musca*] (1767); FABR., Syst. Entom., 878. 24. [*Musca*] (1775), Spec. Ins., II. 443. 35. [*Musca*] (1781) et Mantissa Ins., II. 345. 42. [*Musca*] (1787); ROSSI, Mantissa Ins., II. 66. 542. [*Musca*] (1794); FALL., Musc., 72. 78. [*Musca*] (1824); MEIG., S. B., V. 168. 148. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 341. 35. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 684. 104. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1582. 196. [*Aricia*] (1845); WALK., Ins. Brit., II. 137. 56. (1853); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4734. 196. [*Aricia*] (1855) et XIV. 6252. 196. [*Aricia*] (1860); CURT., Farm Ins., 143. 12. (1860); SCHN., F. A., I. 645. (1862); ROND., Atti Soc. Milano, IX. 149. 6. (1866); TASCHENBERG, Entom. für Gärtner, 388. 172. (1871); ROND., Prodr., VI. 157. 6. (1877); TASCHENBERG, Pract. Insectenkde. 131. 55. (1880); MEADE, Entom. Monthly Mag., XIX. 32. (1882); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 253. (1893); MEADE, Deser. List Brit. Anth., II. 43. 4. (1897); PANZ., Revue Entom. France, XIX. 243. 7. [*Egla*] (1900). Europa, Africa sept.

brassicæ WIED., Zool. Mag., I. 1. 78. 27. (1817).

?*campestris* R.-D., Myod., 585. 3. [*Egla*] (1830).

cinerca FALL., Musc., 70. 75. ♀ [*Musca*] (1824).

diadema HOLMGR., Entom. Tidskr., IV. 170. 27. ♀ [*Aricia*] (1883).

ludibunda R.-D., Myod., 585. 2. [*Egla*] (1830).

napobrassicæ BIERK., Acta Holm., 196. [*Musca*] (1780).

obliqua MACQ., Suit. à Buff., II. 342. 37. ♂ (1835).

pusilla MEIG., S. B., V. 151. 118. ♀ (1826).

ruficeps MEIG., S. B., V. 177. 162. ♂ (1826); SCHN., F. A., I. 644. (1862); v. RÖD., Zeitschr. Naturw., XXXIII. 92. (1869).

spretæ MEIG., S. B., V. 171. 151. ♂ (1826); SCHN., F. A., I. 644. (1862); GIRAUD, Annal. Soc. entom. France, sér. 5. II. 505. (1872).

stigmatica MEIG., S. B., V. 167. 147. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 330. 6. ♂ [*Atomogaster*] (1835); SCHIN., F. A., I. 649. (1862).

tristicula HOLMGR., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX. 101. [*Aricia*] (1872).

vulgaris R.-D., Myod., 584. 1. [*Egyle*] (1830).

ruficeps MEIG. = **radicum** L.

soror R.-D. = **pluvialis** L.

specta MEIG. = **radicum** L.

stigmatica MEIG. = **radicum** L.

sulcella ZETT. = **aestiva** MEIG.

sulciventris ZETT. = **aestiva** MEIG.

tristicula HOLMGR. = **radicum** L.

vicarius SCHIN. = **illocata** WALK.

vulgaris R.-D. = **radicum** L.

b. *C. coenosiaeformis*

Mycophaga

ROSD., Prodr., I. 102. 17. (1856).

boletorum ROSD., Atti Soc. Milano, IX. 189. 2. ♀ (1866) et Prodr., VI. 244. 2. ♀ (1877); Kow., Wien. entom. Zeitg., XII. 146. 1. (1893). Italia.

fungorum DEG., Ins., VI. 89. 18. [*Musca*] (1776); ROSSI, Mantissa Ins., II. 66. 540. [*Musca*] (1794); FALL., Musc., 89. 121. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V. 211. 1. [*Coenosia*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 696. 156. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., V. 1739. 121. [*Anthomyza*] (1846), XII. 4746. 121. [*Anthomyza*] (1855) et XIV. 6293. 121. [*Anthomyza*] (1860); SCHIN., F. A., I. 663. [*Coenosia*] (1862); ROSD., Atti Soc. Milano, IX. 189. 1. (1866) et Prodr., VI. 243. 1. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX. 107. (1883); Kow., Wien. entom. Zeitg., XII. 142. 1. (1893); v. RÖD., Wien. entom. Zeitg., XII. 181. 3. (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., I. 39. 1. (1897); PAND., Revue Entom. France, XX. 299. 13. [*Pegomyia*] (1901). Europa.

palliditincta BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XX. 84. 29. [*Anthomyza*] (1863).

rufiventris MACQ., Suit. à Buff., II. 320. 17. ♀ [*Hylemyia*] (1835).

testacea GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 113. ♂ [*Coenosia*] (1834).

palliditincta BOHEM. = **fungorum** DEG.

rufiventris MACQ. = **fungorum** DEG.

testacea GIMM. = **fungorum** DEG.

Eutrichota

Kow., Wien. entom. Zeitg., XII. 140. 2. (1893).

- inornata** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 49. 56. [*Coenosia*] Europacentr.
(1873); Kow., Wien. entom. Zeitg., XII. 140. 1. (1893); v. Röd.,
Wien. entom. Zeitg., XII. 181. 2. (1893); STROBL, Wien. entom.
Zeitg., XIII. 75. (1894); PAND., Revue Entom. France, XVIII.
217. 13. [*Hylemyia*] (1899).

Chirosia

ROND., Prodr., I. 102. 14. (1856).

Chiastochaeta Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 568.
(1889).

Rhadina Kow., Wien. entom. Zeitg., XII. 144. 5. (1893).

albimana ZETT. = **albitarsis** ZETT.

- albitarsis** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1610. 225. [*Aricia*] (1845); MEADE, Europa.
Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 74. (1887); MÜK, Wien.
entom. Zeitg., VI. 264. 37. (1887); Kow., Wien. entom. Zeitg.,
XII. 143. 1. (1893); MEADE, Deser. List Brit. Anth., II. 77. 1.
(1897); PAND., Revue Entom. France, XIX. 269. 47. ♂ 279. 47.
♀ [*Chortophila*] (1900).

albimana ZETT., Dipt. Scand., IV. 1726. 106. [*Anthomyza*] (1845);
Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 9. 3. [*Coenosia*] (1858);
ROND., Atti Soc. Milano, IX. 186. 1. (1866) et Prodr., VI.
238. 1. (1877).

- fallax** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 46. 46. (1873); Kow., Hungaria.
Wien. entom. Zeitg., XII. 146. 2. (1893).

fusca STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 274. ♀ (1893)
et Wien. entom. Zeitg., XIII. 75. (1894).

fusca STROBL = **fallax** Lw.

grossicauda STROBL = **parvicornis** ZETT.

- montana** Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 17. ♂ (1893); Austria.
Kow., Wien. entom. Zeitg., XII. 144. 1. [*Rhadina*] (1893).

nigripes BEZZI, Bull. Soc. entom. Ital., XXVII. 63. ♀ (1895). Italia.

- parvicornis** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1600. 215. ♀ [*Aricia*] (1845) et Europa.
XIV. 6254. 215. [*Aricia*] (1860).

grossicauda STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 222. 199 u. 200.
(1899).

- remotella** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1619. 235. [*Musca*] (1845). Succia.

serena FALL. var. ♂ — **Trollii** ZETT.

- Trollii** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1609. 224. [*Aricia*] (1845); Pok., Europacentr.
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 567. [*Chiastochaeta*] (1889);
v. Röd., Entom. Nachr., XVII. 228. [*Chiastochaeta*] (1891); MÜK,
Wien. entom. Zeitg., X. 193. 95. [*Biol.*] (1891); Kow., Wien.
entom. Zeitg., XII. 145. 1. [*Chiastochaeta*] (1893); STROBL, Wien.

entom. Zeitg., XIII. 74. (1894); MIK, Wien. entom. Zeitg., XIV. 296. [*Biol.*] (1895); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 222. 199. (1899); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 116. 1. ♀ [*Limnophora*] (1899).

serena FALL. var. ♂, Musc., 76. 88. [*Musca*] (1825).

Dexiopsis

POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 533. (1893).

lacteipennis ZETT., Dipt. Scand., IV. 1586. 200. [*Aricia*] (1845); Europa centr. et sept.
POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 534. (1893).

litoralis ZETT., Dipt. Scand., V. 1758. 141. ♀ [*Anthomyza*] (1846) Europa centr. et sept.
et XII. 4750. 141. [*Anthomyza*] (1855); POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 532. (1893); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XVI. 22. 1. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 157. 26. [*Coenosia*] (1899).

pallicornis ZETT., Dipt. Scand., V. 1756. 139. ♀ [*Anthomyza*] (1846) et XIV. 6298. 139. [*Anthomyza*] (1860); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX. 106. [*Coenosia*] (1883) et Deser. List Brit. Anth., II. 75. 7. [*Coenosia*] (1897); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XVI. 24. Ann. (1897).

minutalis ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6291. 111—112. ♂ [*Anthomyza*] Europa centr. et sept. (1860).

pallicornis ZETT. = **litoralis** ZETT.

rubricornis ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3326. 140—141. ♂ [*Anthomyza*] Scandinavia. (1849); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI. 52. (1902).

Macrorchis

ROSD., Prodr., VI. 280. XXXV. (1877).

alienans PAND. = **intermedia** FALL.

articulata ZETT. = **means** MEIG.

compuncta WALK. (nec WIED.) = ? **meditata** FALL.

intermedia FALL., Musc., 87. 115. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V. Europa. 214. 7. [*Anthomyza*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 693. 140. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1723. 102. [*Anthomyza*] (1845), XII. 4745. 102. [*Anthomyza*] (1855) et XIV. 6290. 102. [*Anthomyza*] (1860); SCHN., F. A., I. 666. [*Coenosia*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX. 60. (1883); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 274. (1893); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XVI. 101. 12. (1897); MEADE, Deser. List Brit. Anth., II. 72. 1. (1897).
alienans PAND., Revue Entom. France, XVIII. 144. 5. [*Coenosia*] (1899).

means MEIG., S. B., V. 216. 10. [*Coenosia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. Europa, 346. 10. [*Coenosia*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 695. 150. [*Anthomyza*] Caucasus.

(1838) et Dipt. Scand., IV. 1725. 105. [*Aricia*] (1845); SCHIN., F. A., I. 666. [*Coenosia*] (1862); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX. 61. (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 72. 2. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 146. 7. [*Coenosia*] (1899).

articulata ZETT., Dipt. Scand., IV. 1530. 140. ♀ [*Aricia*] (1845) et VIII. 3291. 140. [*Aricia*] (1849); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 271. [*Coenosia*] (1893); POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 540. (1893).

remotella SCHIN. (nec ZETT.), F. A., I. 666. [*Coenosia*] (1862).

meditata FALL., Musc., 87. 114. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V. 219. 19. ♂ [*Coenosia*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 692. 139. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV. 1715. 92. [*Anthomyza*] (1845), XII. 4744. 92. [*Anthomyza*] (1855) et XIV. 6287. 92. [*Anthomyza*] (1860); SCHIN., F. A., I. 666. [*Coenosia*] (1862); ROND., Atti Soc. Milano, IX. 201. 10. [*Coenosia*] (1866) et Prodr., VI. 281. 1. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX. 61. (1883) et XXIII u. XXIV. 74. (1887); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 274. (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 72. 3. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 121. 8. [*Limnophora*] (1899).
? *compuncta* WALK. (nec WIED.), Ins. Brit., II. 142. 74. [*Anthomyia*] (1853).

remotella SCHIN. (nec ZETT.) = **means** MEIG.

Chelisia

ROND., Prodr., I. 101. 12. (1856).

monilis MEIG., S. B., V. 222. 27. [*Coenosia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 346. 11. [*Coenosia*] (1835); SCHIN., F. A., I. 666. [*Coenosia*] (1862); ROND., Atti Soc. Milano, IX. 188. 1. (1866) et Prodr., VI. 241. 1. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX. 108. (1883); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 266. (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 78. 1. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 154. 21. [*Coenosia*] (1899).

nigripennis ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6256. 225–226b [*Aricia*] (1860).

? *trilinea* MEIG., S. B., VII. 328. 27. [*Anthomyia*] (1838).

umbripennis ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3302. 225–226. [*Aricia*] (1849) et XIV. 6256. 225–226. [*Aricia*] (1860).

nigripennis ZETT. = **monilis** MEIG.

trilinea MEIG. = ? **monilis** MEIG.

umbripennis ZETT. = **monilis** MEIG.

Allognota

POK., Wien. entom. Zeitg., XII. 64. (1893).

agromyzella ROND. = **agromyzina** FALL.

agromyzina FALL., Muse., 74. 84. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V. 199. 204. [*Anthomyia*] (1826); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1608. 223. [*Aricia*] (1845); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 157. 25. [*Coenosia*] (1899).

Europa,
Caucasus.

agromyzella ROND., Atti Soc. Milano, IX. 205. 19. [*Coenosia*] (1866) et Prodr., VI. 270. 19. [*Coenosia*] (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX. 105. [*Coenosia*] (1883); POK., Wien. entom. Zeitg., XII. 63. (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 74. 3. [*Coenosia*] (1897).

? *mucronatella* ZETT., Dipt. Scand., IV. 1616. 232. ♀ [*Aricia*] (1845).

nigra MEIG., S. B., V. 216. 12. [*Coenosia*] (1826).

opacula ZETT., Dipt. Scand., XII. 4735. 217—218. ♀ [*Aricia*] (1855).

simplex MEIG., S. B., V. 221. 24. [*Coenosia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 348. 21. [*Coenosia*] (1835).

mucronatella ZETT. = ?**agromyzina** FALL.

nigra MEIG. = **agromyzina** FALL.

opacula ZETT. = **agromyzina** FALL.

simplex MEIG. = **agromyzina** FALL.

Hoplogaster

ROND., Bull. Soc. entom. Ital., II. 331. XXVIII. (1870).

Oplogaster ROND., Prodr., I. 98. 19. (1856).

abdominalis GIMM. = **mollicula** FALL.

alpicola POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 528. (1893).

Jugum Stel-
vianum.

biocellata STROBL (*nee* ZETT.) = **mollicula** FALL.

cineticula ROND. = **mollicula** FALL.

mollicula FALL., Muse., 90. 126. [*Musca*] (1825); ZETT., Ins. Lapp., 696. 157. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., V. 1749. 132. [*Anthomyza*] (1846); WALK., Ins. Brit., II. 143. 76. [*Anthomyia*] (1853); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4749. 132. [*Anthomyza*] (1855) et XIV. 6295. 132. [*Anthomyza*] (1860); SCHIN., F. A., I. 664. [*Coenosia*] (1862); ROND., Atti Soc. Milano, IX. 199. 1. [*Oplogaster*] (1866) et Prodr., VI. 248. 1. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX. 108. (1883); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 265. [*Chelisia*] (1893); POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 528. (1893); MEUN., Bull. Soc. entom. France, 62. LXV. 4. [*Coenosia*] (1893); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XVI. 26. 4. (1897); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 77. 1. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 143. 3. [*Coenosia*] (1899).

Europa,
Asia sept.,
Caucasus.

- abdominalis* GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 683. ♀
 [*Coenosia*] (1842).
- biocellata* STROBL. (nec ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII.
 265. ♀ [*Chelisia*] (1893).
- cincticala* RONDI., Atti Soc. Milano, IX. 191. 2. ♀ [*Oplogaster*]
 (1866) et Prodr., VI. 249. 2. ♀ (1877).
- nemoralis* MEIG., S. B., V. 212. 3. [*Coenosia*] (1826); MACQ.,
 Suit. à Buff., II. 345. 6. [*Coenosia*] (1835).
- ? *pallidicornis* R.-D., Myod., 544. 9. [*Palusia*] (1830).
- nemoralis* MEIG. = **mollicula** FALL.
- obscuricula** RONDI., Bull. Soc. entom. Ital., II. 331. 3. ♂ (1870) et Europa centr.
 Prodr., VI. 249. 3. ♂ (1877); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, et mer.
 XLIII. 529. (1893).
- reducta* PAND., Revue Entom. France, XVIII. 148. 12. [*Coenosia*]
 (1899).
- remotella* STROBL. (nec ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII.
 265. [*Chelisia*] (1893).
- pallidicornis* R.-D. = ? **mollicula** FALL.
- reducta* PAND. = **obscuricula** RONDI.
- remotella* STROBL. (nec ZETT.) = **obscuricula** RONDI.

Orchisia

RONDI., Prodr., VI. 279. XXXIV. (1877).

- costata** MEIG., S. B., V. 266. 19. [*Sapromyza*] (1826); POND., Prodr., Europa centr.
 VI. 279. 1. (1877); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 160. et mer.,
 31. [*Coenosia*] (1899). China.
- marginata* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 440. 6. ♀
 [*Coenosia*] (1830).
- pictipennis* LAW., Wien. entom. Monatschr., II. 10. [*Coenosia*]
 (1858); SCHN., F. A., I. 664. [*Coenosia*] (1862); RONDI., Atti
 Soc. Milano, IX. 207. 1. ♀ [*Caricca*] (1866); MEADE, Entom.
 Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 74. [*Coenosia*] (1887);
 STROBL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 272. [*Coenosia*]
 (1893); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 540. (1893);
 MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 76. 12. [*Coenosia*] (1897).
- marginata* WIED. = **costata** MEIG.
- pictipennis* LAW. = **costata** MEIG.

Coenosia

MEIG., S. B., V. 210. CLXI. (1826).

- Caricca* R.-D., Myod., 530. I. p. p. (1830).
- Centriocera* POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 537. (1893).
- Limnospila* SCHNABL., Wien. entom. Zeitg., XXI. 111. (1902).
- Limosia* R.-D., Myod., 535. II. (1830).
- Palusia* R.-D., Myod., 542. III. (1830).

- acuminata** STROBL, Mitth. Ver. Steiermark, 1897. 250. ♂ (1898). Styria.
- acuta** R.-D., Myod., 543. 3. [*Palusia*] (1830). Gallia.
- agrestis** R.-D., Myod., 537. 7. [*Limosia*] (1830). Gallia.
- albatella** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3312. 64—65. ♀ [*Aricia*] (1849). Europacentr.
- albicornis** MEIG. p. p. = **pumila** FALL. et sept.
- albicornis** MEIG. p. p. = **tricolor** ZETT.
- albicornis** STROBL (nec MEIG.) = **perpusilla** MEIG.
- albida** R.-D. = ?**decipiens** MEIG.
- albidula** R.-D., Myod., 537. 5. [*Limosia*] (1830). Gallia.
- albifrons** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3301. 223—224. ♂ [*Aricia*] (1849); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 543. [*Strobilia*] (1893); SCHNABL, Wien. entom. Zeitg., XXI. 111. [*Limnospila*] (1902). Europa.
- obscuripes* RONDI., Atti Soc. Milano, IX. 203. 14. (1866) et Prodr., VI. 267. 14. (1877); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 273. [*Pseudolimnophora*] (1893); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 154. 22. (1899).
- albipalpis** MEIG., S. B., V. 218. 16. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 347. 13. (1835). Germania.
- alismatis** R.-D. = ?**geniculata** FALL.
- ambulans** MEIG., S. B., V. 217. 13. (1826); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1738. 120. ♀ [*Anthomyza*] (1845); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 538. 4. [*Centriocera*] (1893). Europacentr. et sept.
- nigrifemur* ZETT. var. *b*, Dipt. Scand., XI. 4323. 112. ♀ [*Anthomyza*] (1852).
- nigrimana* MEIG., S. B., V. 215. 9. (1826); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 538. 5. [*Centriocera*] (1893).
- pygmaella* Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 409. ♂ (1887) et XLIII. 538. 8. [*Centriocera*] (1893); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XVI. 55. 3. (1897).
- analis** R.-D. = **tigrina** FABR.
- annulata** MACQ., Suit. à Buff., II. 348. 18. (1835); MEIG., S. B., VII. 336. 7. (1838). Gallia.
- ?**annulipes** MACQ., Suit. à Buff., II. 338. 28. [*Anthomyia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 331. 72. ♀ [*Anthomyia*] (1838). Gallia.
- antennata** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3322. 117—118. ♂ [*Anthomyza*] (1849); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 538. 3. [*Centriocera*] (1893). Europacentr. et sept.
- apicalis** ZETT. = **octopunctata** ZETT.
- atra** MEIG., S. B., VI. 377. 29. (1830); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 160. 32. (1899). Europa, Caucasus, Syria.
- globulicentris* ZETT., Dipt. Scand., IV. 1603. 218. ♀ [*Aricia*] (1845) et XII. 4736. 218. [*Aricia*] (1855); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 273. (1893).
- nigrifacies* R.-D., Myod., 541. 26. [*Limosia*] (1830).
- pallidipes* R.-D., Myod., 542. 27. [*Limosia*] (1830).
- palustris* R.-D., Myod., 541. 25. [*Limosia*] (1830); MACQ., Suit.

- à Buff., II. 349. 24. (1835); MEIG., S. B., VII. 336. 12. (1838);
 Rond., Atti Soc. Milano, IX. 205. 18. (1866) et Prodr., VI.
 270. 18. (1877).
- attenuata** STEIN, Mitt. Zool. Mus. Berlin, II. 121. 176. (1903). Africa sept., Ins.
 Canar., Syria.
- barbipes** ROND., Atti Soc. Milano, IX. 199. 4. ♂ (1866) et Prodr.,
 VI. 261. 5. ♂ (1877). Italia.
- basilaris** MACQ., Suit. à Buff., II. 348. 20. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia.
 336. 9. (1838).
- bilineella** ZETT., Ins. Lapp., 694. 149. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Europacentr.
 Scand., IV. 1719. 97. [*Anthomyza*] (1845); STROBL, Verh. zool- et sept.
 bot. Ges. Wien, XLIII. 269. (1893); STEIN, Wien. entom. Zeitg.,
 XVI. 96. 9. (1897).
pumila POK. (nec FALL.), Verh. zool-bot. Ges. Wien, XLIII.
 536. (1893); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 147. 10.
 (1899).
 ?*sagittariae* R.-D., Myod., 544. 6. [*Palusia*] (1830).
- biocellata** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1724. 103. ♀ [*Anthomyza*] (1845) Scandinavia
 et XII. 4745. 103. ♀ [*Anthomyza*] (1855).
pumila ZETT. var. d., Ins. Lapp., 694. 147. ♀ [*Anthomyza*]
 (1838).
- bruniornis** R.-D., Myod., 543. 3. [*Palusia*] (1830). Gallia.
- brunipes* R.-D. = ?*pumila* FALL.
- campestris** R.-D., Myod., 537. 6. [*Limosia*] (1830). Gallia.
- ?**cineraria** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1677. 44. ♀ [*Anthomyza*] (1845). Norvegia.
- cinerea** R.-D., Myod., 536. 4. [*Limosia*] (1830). Gallia.
- cingulipes** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3320. 97—98. ♀ [*Anthomyza*] Europa.
 (1849); POK., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XLIII. 538. 9. [*Centri-*
cera] (1893); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XVI. 92. 7. (1897).
 ?*genualis* ROND., Atti Soc. Milano, IX. 200. 7. (1866) et Prodr.,
 VI. 263. 9. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX. 107.
 (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 75. 9. (1897).
- communis* R.-D. = **tigrina** FABR.
- compressicauda* STEIN = **torrida** WIED.
- croceimana* PAND. — **decipiens** MEIG.
- cylindrus** PAND., Revue Entom. France, XVIII. 159. 29. (1899). Gallia.
- dealbata** ZETT., Ins. Lapp., 695. 154. ♂ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Suecica.
 Scand., IV. 1736. 118. [*Anthomyza*] (1845) et XII. 4746. 118.
 [*Anthomyza*] (1855).
- decipiens** MEIG., S. B., V. 218. 17. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. Europa.
 347. 11. (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1735. 116. [*Anthomyza*]
 (1845), VIII. 3322. 116. [*Anthomyza*] (1849) et XIV. 6293. 116.
 (1860); SCHUM., F. A., I. 667. (1862); STROBL, Verh. zool-bot.
 Ges. Wien, XLIII. 270. (1893); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XVI.
 51. 1. (1897).
 ?*albida* R.-D., Myod., 538. 13. [*Limosia*] (1830).
croceimana PAND., Revue Entom. France, XVIII. 150. 16. ♂
 (1899).

- incompta* MEIG., S. B., VII, 335. (1838).
- pedella* FALL., Musc., 88, 118. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V, 216, 11. (1826); ZETT., Ins. Lapp., 693, 144. ♀ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1734, 115. ♀ [*Anthomyza*] (1845), XII, 4746, 115. [*Anthomyza*] (1855) et XIV, 6293, 115. [*Anthomyza*] (1860); SCHN., F. A., I, 667. (1862); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 76, 13. (1897).
- pumila* ZETT. (nec FALL.) var. *b.* Ins. Lapp., 694, 147. ♀ [*Anthomyza*] (1838).
- ? *ripicola* R.-D., Myod., 539, 14. [*Limosia*] (1830).
- ? *riveraris* R.-D., Myod., 538, 11. [*Limosia*] (1830).
- ? *scirporum* R.-D., Myod., 536, 1. [*Limosia*] (1830).
- decipiens* PAND. (nec MEIG.) = **pumila** FALL.
- distincta* R.-D. = ? **pumila** FALL.
- dorsalis** v. Ros., Württemb. Corubl., I, 59. ♂ (1840). Europa.
- lateralis* v. Ros., Württemb. Corubl., I, 59. ♀ (1840).
- ? *litoralis* STROBL. (nec ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 267. (1893).
- ? *longipes* R.-D., Myod., 600, 1. [*Zabia*] (1830); Macq., Suit. à Buff., II, 352, 3. [*Pegomyia*] (1835); MEIG., S. B., VII, 333, 101. [*Anthomyia*] (1838).
- longitarsis* STEIN, Entom. Nachr., XXVI, 323, 14. (1900).
- tenuimana* PAND., Revue Entom. France, XVIII, 160, 30. ♀ (1899).
- ? **dubia** Macq., Suit. à Buff., II, 343, 12. (1835); MEIG., S. B., VII, 336, 6. (1838). Gallia.
- elegantula* Rond. = **ruffipalpis** MEIG.
- felina* Rond. = **tigrina** FABR.
- femoralis** R.-D., Myod., 531, 1. [*Caricea*] (1830). Gallia.
- femoralis* R.-D. [*Palusia*] = **geniculata** FALL.
- flavescens** R.-D., Myod., 543, 2. [*Palusia*] (1830). Gallia.
- flavicornis** FALL., Musc., 88, 117. [*Musca*] (1825); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1714, 91. [*Anthomyza*] (1845); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 142, 2. ♂ (1899). Europe-centr. et sept.
- flavicornis** R.-D., Myod., 543, 4. [*Palusia*] (1830). Gallia.
- flavimana** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1729, 109. ♂ [*Anthomyza*] (1845). Suecia.
- fronto* PAND. = **nigrigidigita** Rond.
- fuliginosa* R.-D. = **paludosa** R.-D.
- fulvicornis** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1728, 108. ♀ [*Anthomyza*] (1845) et VIII, 3321, 108. ♂ [*Anthomyza*] (1849); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 47. (1902). Lapponia.
- fusca* R.-D., Myod., 533, 8. [*Caricea*] (1830). Gallia.
- ? **genarum** ZETT., Ins. Lapp., 695, 153. ♀ [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1727, 107. ♀ [*Anthomyza*] (1845). Lapponia.
- geniculata** FALL., Musc., 89, 120. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V, 219, 20. ♂ (1826); Macq., Suit. à Buff., II, 347, 16. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 694, 145. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand.,

- IV. 1720. 98. [*Anthomyza*] (1845) et XII. 4745. 98. [*Anthomyza*] (1855); SCHN., F. A., I. 665. (1862); ROND., Atti Soc. Milano, IX. 200. 6. 7 (1866) et Prodr., VI. 263. 8. 7 (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 74. (1887); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 268. (1893); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XVI. 59. 5. (1897); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 75. 10. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 158. 27. (1899).
- ? *alismatis* R.-D., Myod., 540. 20. [*Limosia*] (1830).
- ? *femorialis* R.-D., Myod., 545. 10. [*Palusia*] (1830).
- ? *hydrocotilidis* R.-D., Myod., 540. 19. [*Limosia*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 349. 25. (1835); MEIG., S. B., VII. 336. 13. (1838).
- ? *juncorum* R.-D., Myod., 540. 21. [*Limosia*] (1830).
- genualis* ROND. = ? **cingulipes** ZETT.
- globuliventris* ZETT. = **atra** MEIG.
- grata** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 438. 3. 7 (1830). China.
- gratiosa* PAND. = ? **tricolor** ZETT.
- humilis** MEIG., S. B., V. 220. 23. (1826); ZETT., Dipt. Scand., IV. 1732. 113. [*Anthomyza*] (1845); WALK., Ins. Brit., II. 140. 67. ♀ [*Anthomyia*] (1853); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4746. 113. [*Anthomyza*] (1855) et XIV. 6292. 113. [*Anthomyza*] (1860); SCHN., F. A., I. 667. (1862); ROND., Atti Soc. Milano, IX. 202. 11. (1866) et Prodr., VI. 274. 1. [*Caricea*] (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXIII u. XXIV. 73. [*Caricea*] (1887); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 270. (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 71. 3. [*Caricea*] (1897).
- ? *limpidipennis* R.-D., Myod., 533. 10. [*Caricea*] (1830).
- ? *littoralis* R.-D., Myod., 533. 9. [*Caricea*] (1830).
- ? *nana* ZETT., Dipt. Scand., IV. 1716. 94. [*Anthomyza*] (1845) et XIV. 6288. 94. [*Anthomyza*] (1860); SCHN., F. A., I. 667. (1862); ROND., Prodr., VI. 274. 2. [*Caricea*] (1877); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 146. 8. (1899).
- ? *seamaculata* ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., IV. 1717. 95. [*Anthomyza*] (1845) et XII. 4744. 95. [*Anthomyza*] (1855).
- hydrocotilidis* R.-D. = ? **geniculata** FALL.
- ? **immaculata** R.-D., Myod., 541. 24. [*Limosia*] (1830). Gallia.
- ? *incompta* MEIG. = **decipiens** MEIG.
- ? *infantula* ROND. = ? **tricolor** ZETT.
- ? *intermedia* PAND. (nec FALL.) = **sexnotata** MEIG.
- ? *juncorum* R.-D. = ? **geniculata** FALL.
- ? **lamellata** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6289. 101-102. 7 [*Anthomyza*] (1860). Lapponia.
- ? **lappae** R.-D., Myod., 534. 15. [*Caricea*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 345. 3. (1835); MEIG., S. B., VII. 335. 2. (1838). Gallia.
- ? *lateralis* v. Ros. = **dorsalis** v. Ros.
- ? *leonina* ROND. = **tigrina** FABE.
- ? *leucophaea* R.-D. = **tarsalis** R.-D.

- limpidipennis* R.-D. [*Caricea*] = **humilis** MEIG.
- limpidipennis* R.-D. [*Limosia*] = **paludosa** R.-D.
- lineatipes** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1676. 42. ♀ [*Anthomyza*] (1845): Europa.
STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 270. (1893); POK.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 539. (1893); STROBL, Mem.
R. Soc. Esp., III. 350. 788. (1905).
- littoralis* STROBL. (nec ZETT.) = **dorsalis** v. Ros.
- littoralis* R.-D. [*Caricea*] = **humilis** MEIG.
- littoralis* R.-D. [*Limosia*] = ?**pumila** FALL.
- longicauda** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6230. 112—113. ♂ [*Aricia*] Europa-centr.
(1860); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI. 55. (1902). et sept.
? *longisquama* ZETT., Dipt. Scand., IV. 1622. 239. ♀ [*Aricia*]
(1845).
- octosignata* STROBL. (nec ROND.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XLIII. 267. ♂ (1893).
- Rondanii* STROBL, Wiss. Mitth. Bosnien, VII. 615. (1900).
- longipes* R.-D. [*Zabia*] p. p. = ?**dorsalis** v. Ros.
- longisquama* ZETT. = ?**longicauda** ZETT.
- longitarsis* STEIN. = **dorsalis** v. Ros.
- macroglossa** HOLMGR., Entom. Tidskr., IV. 167. 16. ♂ [*Aricia*] Now.-Semlja.
(1883); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI. 59. (1902).
- macularis* WIED. = **torrida** WIED.
- menyanthidis** R.-D., Myod., 542. 1. [*Palusia*] (1830); MACQ., Suit. Gallia.
à Buff., II. 345. 7. (1835); MEIG., S. B., VII. 336. 5. (1838).
- metallipennis** ZETT., Ind. Lapp., 695. 155. ♀ [*Anthomyza*] (1838) et Lapponia.
Dipt. Scand., IV. 1737. 119. ♀ [*Anthomyza*] (1845).
- macronatella* PAND. (nec ZETT.) = ?**pulicaria** ZETT.
- marina* MEIG. = **rufipalpis** MEIG.
- nana* ZETT. = **humilis** MEIG.
- nigra** ROND. (nec MEIG.), Atti Soc. Milano, IX. 204. 17. ♀ (1866) et Italia.
Prodr., VI. 271. 17. (1877).
- nigridigita** ROND., Atti Soc. Milano, IX. 198. 3. (1866) et Prodr., VI. Europa-centr.
259. 3. (1877); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XVI. 28. 6. (1897); et mer.
PAND., Revue Entom. France, XVIII. 159. 28. (1899).
- fronto* PAND., Revue Entom. France, XVIII. 150. 17. ♂ (1899).
- nigrimana* SCHIX. (nec MEIG.), F. A., I. 666. ♂ (1862).
- tricolor* POK. (nec ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII.
534. p. p. (1893).
- nigrifacies* R.-D. = **atra** MEIG.
- nigrifemur* ZETT. = ?**tricolor** ZETT.
- nigrifemur* ZETT. var. *b* = **ambulans** MEIG.
- nigrimana* MEIG. = **ambulans** MEIG.
- nigrimana* SCHIX. (nec MEIG.) p. p. = **nigridigita** ROND.
- nigrimana* SCHIX. (nec MEIG.) p. p. = **tricolor** ZETT.
- nigripes** R.-D., Myod., 541. 23. [*Limosia*] (1830). Gallia.
- nilens* R.-D. = ?**tricolor** ZETT.
- nitidula** R.-D., Myod., 542. 28. [*Limosia*] (1830). Gallia.

- Nordenskiöldi** HOLMGR., Entom. Tidskr., IV, 166, 14. ♂ [*Aricia*] Now.-Semlja.
(1883); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XXI, 61. (1902).
proboscidea HOLMGR., Entom. Tidskr., IV, 166, 15. [*Aricia*]
(1883).
- obscura* R.-D. = **paludosa** R.-D.
obscuripes ROXD. = **albifrons** ZETT.
- octopunctata** ZETT., Ins. Lapp., 693, 141. ♂ [*Anthomyza*] (1838) et Scandinavia.
Dipt. Scand., IV, 1729, 110. [*Anthomyza*] (1845) et XIV, 6291,
110. [*Anthomyza*] (1860); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII,
539, 10. [*Centriocera*] (1893).
apicalis ZETT., Dipt. Scand., IV, 1677, 43. ♀ [*Anthomyza*]
(1845) et XIV, 6279, 43. [*Anthomyza*] (1860).
strigella ZETT., Ins. Lapp., 695, 152. ♀ [*Anthomyza*] (1838).
- octosignata** ROXD., Atti Soc. Milano, IX, 202, 12. ♂ (1866) et Prodr., Europacentr.
VI, 265, 12. ♂ (1877); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, et mer.
532, (1893); STROBL, Wiss. Mitth. Bosni u, VII, 615. (1900).
- octosignata* STROBL (*nec* ROXD.) p. p. = **longicauda** ZETT.
- pallidipes* R.-D. = **atra** MEIG.
pallipes R.-D. = ?**pumila** FALL.
paludosa R.-D. [*Caricca*] = **tigrina** FABR.
- paludosa** R.-D., Myod., 539, 15. [*Limosia*] (1830). Gallia.
fuliginosa R.-D., Myod., 540, 18. [*Limosia*] (1830).
limpidipennis R.-D., Myod., 540, 22. [*Limosia*] (1830).
obscura R.-D., Myod., 539, 16. [*Limosia*] (1830).
picca R.-D., Myod., 539, 17. [*Limosia*] (1830).
- palustris* R.-D. = **atra** MEIG.
- patelligera** ROXD., Atti Soc. Milano, IX, 205, 20. ♂ (1866) et Prodr., Italia.
VI, 271, 20. ♂ (1877).
- pedella* FALL. = **decipiens** MEIG.
- perpusilla** MEIG., S. B., V, 218, 18. (1826); Macq., Suit. à Buff., II, Europacentr.
347, 15. (1835). et sept.
albicornis STROBL (*nec* MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XLIII, 269. (1893).
pumila STEIN (*nec* FALL.), Wien. entom. Zeitg., XVI, 94, 8.
(1897).
- perpusilla* STEIN (*nec* MEIG.) = **pumila** FALL.
- picca* R.-D. = **paludosa** R.-D.
plumosa R.-D. = **tigrina** FABR.
- ?**praetexta** PAND., Revue Entom. France, XVIII, 152, 19. ♀ (1899). Gallia.
proboscidea HOLMGR. = **Nordenskiöldi** HOLMGR.
- pulicaria** ZETT., Dipt. Scand., IV, 1733, 114. [*Anthomyza*] (1845) et Europacentr.
XIV, 6292, 114. [*Anthomyza*] (1860). et sept.
macronatella PAND. (*nec* ZETT.), Revue Entom. France, XVIII,
149, 13. (1899).
- pumila** FALL., Musc., 88, 119. [*Musca*] (1825); MEIG., S. B., V, 221, Europacentr.
25. (1826); ZETT., Ins. Lapp., 694, 147. [*Anthomyza*] (1838) et et sept.
Dipt. Scand., IV, 1730, 111. [*Anthomyza*] (1845), XII, 4746, 111. Algeria.

- [*Anthomyza*] (1855) et XIV. 6291. 111. [*Anthomyza*] (1860); SCHN., F. A., I. 665. (1862).
- albicornis* MEIG., S. B., V. 220. 21. ♂ (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 348. 17. (1835); SCHN., F. A., I. 665. (1862).
- ? *brunipes* R.-D., Myod., 536. 3. [*Limosia*] (1830).
- decipiens* PAND. (nec MEIG.), Revue Entom. France, XVIII. 148. II. (1899).
- ? *distincta* R.-D., Myod., 534. 14. [*Caricea*] (1830).
- ? *littoralis* R.-D., Myod., 538. 12. [*Limosia*] (1830).
- ? *pullipes* R.-D., Myod., 533. 12. [*Caricea*] (1830).
- perpusilla* STEIN (nec MEIG.), Wien. entom. Zeitg., XVI. 53. 2. (1897).
- ? *punctata* R.-D., Myod., 544. 7. [*Palusia*] (1830).
- ? *riparia* R.-D., Myod., 533. 11. [*Caricea*] (1830).
- ? *tristis* R.-D., Myod., 534. 13. [*Caricea*] (1830).
- pumila* POK. (nec FALL.) = **bilineella** ZETT.
- pumila* STEIN (nec FALL.) = **perpusilla** MEIG.
- pumila* STROBL (nec FALL.) = **tricolor** ZETT.
- pumila* ZETT. var. b = **decipiens** MEIG.
- pumila* ZETT. var. d = **biocellata** ZETT.
- punctata* R.-D. = ? **pumila** FALL.
- pygmaea** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1721. 99. ♂ [*Anthomyza*] (1845) Europa centr.
et VIII. 3321. 99. [*Anthomyza*] (1849); STROBL, Verh. zool.-bot. et sept.,
Ges. Wien, XLIII. 268. (1893); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XVI. Asia sept.
57. 4. (1897).
- pygmaecella* POK. = **ambulans** MEIG.
- riparia* R.-D. [*Caricea*] = ? **pumila** FALL.
- riparia* R.-D. [*Limosia*] = **tricolor** ZETT.
- ripicala* R.-D. = ? **decipiens** MEIG.
- ritularis* R.-D. = ? **decipiens** MEIG.
- Rondanii* STROBL = **longicauda** ZETT.
- rubripes** R.-D., Myod., 536. 2. [*Limosia*] (1830). Gallia.
- ruficornis** MACQ., Suit. à Buff., II. 348. 19. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia.
336. 8. (1838).
- rufipalpis** MEIG., S. B., V. 222. 26. (1826); POK., Verh. zool.-bot. Europa centr.
Ges. Wien, XLIII. 539. (1893). et mer.,
Asia min.
- elegantula* ROND., Atti Soc. Milano, IX. 198. 2. (1866) et Prodr.,
VI. 259. 2. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX. 106.
(1883); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XVI. 26. 5. (1897);
MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 75. 5. (1897).
- marina* MEIG., S. B., V. 215. 8. ♀ (1826).
- tricolor* POK. (nec ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII.
534. p. p. (1893).
- rufipalpis** STROBL (nec MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. Styria.
269. (1893).
- ? **rufipes** MACQ., Suit. à Buff., II. 330. 5. ♀ [*Atomogaster*] (1835). Gallia.
- sagittariae* R.-D. = ? **bilineella** ZETT.

- salinarum** STEIN, Wien. entom. Zeitg., XVI, 91, 6. ♂ (1897). Germania.
- scirporum* R.-D. = ?**decipiens** MEIG.
- sexmaculata** MEIG., S. B., VII, 335. (1838); MEADE, Entom. Monthly Mag., XXIII et XXIV, 73. ♂ (1887) et Descr. List Brit. Anth., II, 72, 4. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 146, 9. (1899). Europa centr. et sept.
- sermaculata* WALK. (nec MEIG.) = **tigrina** FABR.
- sermaculata* ZETT. (nec MEIG.) = **humilis** MEIG.
- sexnotata** MEIG., S. B., V, 213, 5. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II, 346, 8. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 694, 146. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1718, 96. [*Anthomyza*] (1845) et XII, 4745, 96. [*Anthomyza*] (1855); SCHIN., F. A., I, 665. (1862); RONDI., Bull. Soc. entom. Ital., II, 332, 21. (1870) et Prodr., VI, 260, 4. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX, 106. (1883); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 270. (1893); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XVI, 98, 10. (1897); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 75, 8. (1897); STROBL, Wiss. Mittl. Bosnien, VII, 615. (1900). Europa, Africa sept.
- intermedia* PAND. (nec FALL.), Revue Entom. France, XVIII, 144, 4. (1899).
- sexpustulata** RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 203, 13. (1866) et Prodr., VI, 266, 13. (1877); STROBL, Tief's dipt. Nachr., 44. (1899). Europacentr. et mer.
- stagnalis* R.-D. = ?**tricolor** ZETT.
- strigella* ZETT. = **octopunctata** ZETT.
- tarsalis** R.-D., Myod., 534, 17. [*Caricca*] (1830). Gallia.
- leucophaca* R.-D., Myod., 535, 18. [*Caricca*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II, 345, 5. (1835); MEIG., S. B., VII, 336, 4. (1838).
- tarsella** ZETT., Ins. Lapp., 694, 148. [*Anthomyza*] (1838) et Dipt. Scand., IV, 1736, 117. [*Anthomyza*] (1845). Laponnia.
- tenimana* PAND. = **dorsalis** v. ROS.
- testacea** MACQ., Suit. à Buff., II, 348, 22. (1835); MEIG., S. B., VII, 336, 10. (1838). Gallia.
- testacea* R.-D. = ?**tricolor** ZETT.
- tibialis** MACQ., Dipt. exot., II, 3, 172, 1. ♀ (1843). Algeria.
- tibialis* R.-D. = ?**tigrina** FABR.
- tigrina** FABR., Syst. entom., 779, 31. [*Musca*] (1775), Spec. Ins., II, 444, 42. [*Musca*] (1781), Mantissa Ins., II, 346, 49. [*Musca*] (1787) et Entom. syst., IV, 322, 42. [*Musca*] (1794); ROSSI, Mant. Ins., II, 67, 544. [*Musca*] (1794); FABR., Syst. Anth., 297, 66. [*Musca*] (1805); MACQ., Suit. à Buff., II, 344, 1. (1835); ZETT., Dipt. Scand., IV, 1712, 89. [*Anthomyza*] (1845) et VIII, 3319, 89. [*Anthomyza*] (1849); WALK., Ins. Brit., II, 132, 41. [*Anthomyia*] (1853); ZETT., Dipt. Scand., XII, 4741, 89. [*Anthomyza*] (1855); SCHIN., F. A., I, 663. (1862); RONDI., Atti Soc. Milano, IX, 208, 3. [*Caricca*] (1866) et Prodr., VI, 275, 3. [*Caricca*] (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX, 60. [*Caricca*] (1883); STROBL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 273. (1893); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II, 71, 1. [*Caricca*] (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII, 145, 6. (1899).

- analis* R.-D., Myod., 532. 5. [*Caricea*] (1830).
communis R.-D., Myod., 531. 2. [*Caricea*] (1830).
felina Rond., Atti Soc. Milano, IX. 207. 2. [*Caricea*] (1866) et Prodr., VI. 276. 5. [*Caricea*] (1877).
leonina Rond., Prodr., VI. 275. 4. [*Caricea*] (1877).
paludosa R.-D., Myod., 532. 6. [*Caricea*] (1830).
plumosula R.-D., Myod., 532. 3. [*Caricea*] (1830).
sermaculata WALK. (nec MEIG.), List Dipt. Brit. Mus., IV. 970. ♂ (1849).
? tibialis R.-D., Myod., 494. 6. [*Helina*] (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 295. 5. [*Spilogaster*] (1835).
vittata R.-D., Myod., 532. 7. [*Caricea*] (1830).
vulgaris R.-D., Myod., 532. 4. [*Caricea*] (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 344. 2. (1835); MEIG., S. B., VII. 335. 1. (1838).
torrida WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 437. 1. ♀ (1830). China.
compressicauda STEIN, Annal. Mus. Civ. Genova, XX. 391. 1. (1900).
macularis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 438. 2. ♂ (nec ♀) (1830).
var. macularis THOMS., Eugenes Rosa, Dipt., 559. 203. (1869). Europa,
tricolor ZETT., Dipt. Scand., V. 1769. 152. ♂ [*Anthomyza*] (1845) et Caucasus,
 XII. 4750. 152. [*Anthomyza*] (1855); MEADE, Entom. Monthly Syria.
 Mag., XXIII u. XXIV. 75. [*Chelisia*] (1887); STROBL, Verh. zool.-
 bot. Ges. Wien, XLIII. 267. p. p. (1893); Pok., Verh. zool.-bot.
 Ges. Wien, XLIII. 534. p. p. (1893); STEIN, Wien. entom. Zeitg.,
 XVI. 30. 7. (1897); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 78. 2.
 [*Hoplogaster*] (1897).
albicornis MEIG., S. B., V. 220. 21. ♀ (1826).
? gratiosa PAND., Revue Entom. France, XVIII. 149. 14. (1899).
? infantula Rond., Atti Soc. Milano, IX. 197. 1. (1866) et Prodr.,
 VI. 258. 1. (1877); MEADE, Entom. Monthly Mag., XX. 106.
 (1883) et Descr. List Brit. Anth., II. 74. 4. (1897).
nigrifemur ZETT., Dipt. Scand., IV. 1732. 112. ♀ [*Anthomyza*]
 (1845).
nigrimana SCHN. (nec MEIG.), F. A., I. 666. ♀ (1862).
? nitens R.-D., Myod., 538. 9. [*Limosia*] (1830).
pumila STROBL (nec FALL.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII.
 267. (1893).
riparia R.-D., Myod., 537. 8. [*Limosia*] (1830).
? staqualis R.-D., Myod., 538. 10. [*Limosia*] (1830).
? testacea R.-D., Myod., 544. 8. [*Palusia*] (1830).
tricolor Pok. (nec ZETT.) p. p. = **nigridigita** Rond.
tricolor Pok. (nec ZETT.) p. p. = **rufipalpis** MEIG.
trilineella ZETT., Ins. Lapp., 695. 151. ♀ [*Anthomyza*] (1838) et Europa-centr.
 Dipt. Scand., IV. 1725. 104. [*Anthomyza*] (1845) et XIV. 6290. et sept.
 104. [*Anthomyza*] (1860); STEIN, Wien. entom. Zeitg., XVI. 99.
 11. (1897).
tristis R.-D. = ? **pumila** FALL.

- ? **vaccarum** BOUCHE, Natürgesch. d. Inse., I. 92. 80. (1834); SCHIX., Germania, F. A., I. 667. (1862).
- ? **verticella** ZETT., Ins. Lapp., 691. 130. ♀ [*Anthomyza*] (1838) et Lapponia, Dipt. Scand., IV. 1684. 53. ♂ [*Anthomyza*] (1845) et XII. 6282. 53. ♀ [*Anthomyza*] (1855).
- villipes** RONDI., Atti Soc. Milano, IX. 199. 5. (1866) et Prodr., VI. Italia, 261. 6. (1877).
- vittata* R.-D. = **tigrina** FABR.
- vulgaris* R.-D. = **tigrina** FABR.

Schoenomyza

HAL., Entom. Mag., I. 166. (1833).

Litorella RONDI., Prodr., I. 101. 13. (1856).

Ochtiphila FALL., Dipt. Succ., Ochtidae, 9. p. p. (1823).

acuticornis MEIG. = **litorella** FALL.

albiceps MEIG. = **litorella** FALL.

defecta MEIG. = **litorella** FALL.

fasciata MEIG. = **litorella** FALL.

litorella FALL., Ochtidae, 10. 3. [*Ochtiphila*] (1823); MEIG., S. B., Europa, VI. 93. 6. [*Ochtiphila*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 546. 5. Caucasus, [*Ochtiphila*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 749. 2. [*Ochtiphila*] (1838) et Dipt. Scand., V. 1951. 7. [*Ochtiphila*] (1846); RONDI., Atti Soc. Milano, IX. 187. 1. (1866); SCHIX., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 325. (1867); RONDI., Bull. Soc. entom. Ital., II. 331. 1. [*Schoenomyza*] (1870) et Prodr., VI. 240. 1. (1877); MEADE, Descr. List Brit. Anth., II. 79. 1. (1897); PAND., Revue Entom. France, XVIII. 141. 1. [*Coenosia*] (1899).

acuticornis MEIG., S. B., VII. 363. 33. ♀ [*Sciomyza*] (1838).

albiceps MEIG., S. B., VI. 20. 27. ♀ [*Sciomyza*] (1830).

defecta MEIG., S. B., VI. 19. 22. ♀ [*Sciomyza*] (1830).

fasciata MEIG., S. B., VI. 19. 21. [*Sciomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 408. 16. ♀ [*Sciomyza*] (1835).

ochtiphilina RONDI., Prodr., I. 101. 13. (sine descr.) [*Litorella*] (1856).

punctum MEIG., S. B. V. 217. 15. ♂ [*Coenosia*] (1826).

ochtiphilina RONDI. = **litorella** FALL.

punctum MEIG. = **litorella** FALL.

III. Fucellinae.

Fucellia

R.-D., Annal. Soc. entom. France, I. 10. 269. (1841).

Halithea HALD., p. p., Annal. nat. Hist., I. 2. 186. (1838).

Scatomyza FALL., p. p., Dipt. Succ. Scatomyz., (1819).

- affinis** ZETT., Ins. Lapp., 722. 10. [*Scatomyza*] (1838) et Dipt. Scand., Laponnia.
V. 1983. 19. [*Scatomyza*] (1846).
- arenaria* R.-D. = **maritima** HALD.
- ariciiformis** HOLMGR., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX. 6. 103. Groenlandia.
[*Scatomyza*] (1872); LUNDB., Vid. Medd., 292. 134. (1900).
- branca* ZETT. = **fucorum** FALL.
- dissitinervis** ZETT., Dipt. Scand., IV. 1621. 238. ♀ [*Aricia*] (1845). Norvegia.
- ? **extensicornis** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3294. 164-165. ♀ [*Aricia*]
(1849).
- fucorum** FALL., Dipt. Succ. Scatomyz., 5. 5. [*Scatomyza*] (1819); Europa centr.
MEIG., S. B., V. 253. 14. [*Scatophaga*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., et sept.
II. 395. 12. [*Scatophaga*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 722. 9. [*Scatomyza*]
(1838); HALD., Annal. nat. Hist., I. 2. 186. [*Halithea*]
(1838); ZETT., Dipt. Scand., V. 1982. 18. [*Scatomyza*] (1846);
SCHN., F. A., II. 15. (1864); MEADE, Entom. Monthly Mag., ser.
2. N(XXXV). 219. 1. (1899); LUNDB., Vid. Medd., 291. 132. (1900);
PAND., Revue Entom. France, XIX. 270. 48. [*Chortophila*] (1900).
branca ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3293. 164-165. ♀ [*Aricia*]
(1849).
hyperborea BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXII. 572.
13. [*Scatomyza*] (1865).
muscaeformis ZETT., Ins. Lapp., 723. 12. [*Scatomyza*] (1838).
- fucorum* FALL. var. ♂ = **maritima** HALD.
- griseola** FALL., Dipt. Succ. Scatomyz., 5. 6. [*Scatomyza*] (1819); Europa centr.
MEIG., S. B., V. 252. 11. [*Scatophaga*] (1826); ZETT., Dipt. Scand., et sept.
V. 1987. 23. [*Scatomyza*] (1846); MIK, Wien. entom. Zeitg., XIV.
97. 42. (1895).
- hyperborea* BOHEM. = **fucorum** FALL.
- intermedia* LUNDB. = **maritima** HALD.
- marina* MACQ. = **maritima** HALD.
- maritima** HALD., Annal. nat. Hist., I. 2. 186. 2. [*Halithea*] (1838); Europa,
MEADE, Entom. Monthly Mag., ser. 2. N(XXXV). 219. 2. (1899). Africa sept.
- arenaria* R.-D., Annal. Soc. entom. France, I. 10. 272. (1841);
ROND., Atti Soc. Milano, 185. 2. (1867).
- fucorum* FALL. var. ♂, Dipt. Succ. Scatomyz., 5. 5. [*Scatomyza*]
(1819).
- intermedia* LUNDB., Vid. Medd., 291. 133. (1900).

marina Macq., Annal. Soc. entom. France, I. 7. 424. [*Scatophaga*] (1838).

muscaeformis ZETT. = **fucorum** FALL.

muscaria ZETT., Ins. Lapp., 723. 11. ♀ [*Scatomyza*] (1838) et Dipt. Scand., V. 1985. 20. ♀ [*Scatomyza*] (1846); MEADE, Entom. Britannia. Monthly Mag., ser. 2. X(XXXV). 219. 3. (1899).

muscina ZETT., Ins. Lapp., 723. 13. ♀ [*Scatomyza*] (1838) et Dipt. Norvegia. Scand., V. 1986. 22. ♀ [*Scatomyza*] (1846).

signata ZETT., Ins. Lapp., 724. 17. [*Scatomyza*] (1838) et Dipt. Scand., Laponia. V. 1988. 24. [*Scatomyza*] (1846).

Genera dubia.

Gymnodia

PAND. (*nee* R.-D.), Revue Entom. France, XVII. 45. V. (1898).

impedita PAND., Revue Entom. France, XVII. 45. (1898). Gallia.

Blainvillia

R.-D., Essai sur les Myod., 514. XV. (1830).

palpata R.-D., Myod., 515. I. (1830). Gallia.

INDEX FAMILIARUM ET GENERUM.

- Acanthiptera* ROND. 632.
Acemyia R.-D. 333.
Acomyia R.-D. 333.
Achanthiptera ROND. 632.
Aeromera LLOY. 347.
Aetophaga B. B. 555.
Acroptera POK. 688.⁷
Actia MEIG. 377.
Actia R.-D. 386.
Acyglossa ROND. 696.
Adenia R.-D. 338.
Adenia bis R.-D. 450.
Adia R.-D. 710.
Admontia B. B. 393.
Aenigmatias MEIX. 183.
Aetylia R.-D. 238.
Afellia R.-D. 395.
Afelia R.-D. 299.
Agathomyia VERR. 185.
Agealocera MACQ. 333.
Agria MACQ. 494.
Agria R.-D. 469.
Ahrensia R.-D. 561.
Albertia ROND. 413.
Albina R.-D. 404.
Alina R.-D. 600.
Allocostylus SCHNABL. 626.
Allognota POK. 734.
Allooneura ROND. 159.
Allophora GIRSCH. 577.
Allophorocera HEND. 288.
Allophora R.-D. 577.
Alsonyia B. B. 259.
Almedea R.-D. 404.
Almedoria B. B. 398.
Alnesia R.-D. 447.
Alucina R.-D. 656.
Alumobia R.-D. 519.
Alumobia WULF. 503.
Alumobia R.-D. 519.
Amphichaeta B. B. 308.
Amphisa R.-D. 206.
Amstercina BREML. 438.
Amyclaea R.-D. 450.
Anachaetopsis B. B. 372.
Ananta MEIG. 576.
Anasimyia SCHN. 111.
Anæistrophora SCHN. 464.
Ancylocera MACQ. 333.
Ancylosyrphus BIG. 55.
Andrina LLOY. 561.
Andrina R.-D. 287.
Androphana B. B. 567.
Anomyia R.-D. 302.
Anolia R.-D. 288.
Aneurina LLOY. 168.
Angiometopa B. B. 495.
Angioneura B. B. 501.
Anicia R.-D. 510.
Anocycamptus BIG. 263.
Anthoea ROND. 419.
Anthomyia MEIG. 727.
Anthomyiidae 599.
Anthracia MEIG. 498.
Anthracomyia ROND. 402.
Anurogyna B. B. 332.
Aphiochaeta BRUES. 175.
Aphria R.-D. 417.
Aphritis LATR. 153.
Aplomyia R.-D. 238.
Apodaera MACQ. 508.
Aporomyia ROND. 220.
Aporotachina MEADE. 288.
Aprostrophus L.W. 564.
Araba R.-D. 509.
Arabella R.-D. 510.
Archileops BISCH. 357.
Arctophila SCHN. 140.
Arenia R.-D. 450.
Arge R.-D. 220.
Argyria R.-D. 510.
Argyrella R.-D. 510.
Argyrophylax B. B. 225.
Arta R.-D. 449.
Aricia R.-D. 615. 634.
Arisbaea R.-D. 570.
Arrollia R.-D. 436.
Arthenopus B. B. 518.
Arriindia B. B. 522.
Arrhinomyia B. B. 395.
Asarcina MACQ. 55.
Asbella R.-D. 450.
Aschiza 1.
Ascia MEIG. 84.
Aspidia ROND. 634.
Atelera MACQ. 166.
Atelestus WALK. 183.
Atemnocera BIG. 90.
Atheria R.-D. 373.
Atherigona ROND. 676.
Athygia R.-D. 371.
Atilia R.-D. 277.
Atomogaster MACQ. 667.
Atractochaeta B. B. 360.
Atrania R.-D. 498.
Atrichia R.-D. 371.
Atropidomyia B. B. 442.
Atylomyia BRAUER. 402.

- Atylostoma* B. B. 402.
Aubaea R.-D. 257.
Aubaea bis R.-D. 428.
Auchmeromyia B. B. 524.
Aecrnia ROND. 411.
Aethaspila HEND. 544.
Azelia R.-D. 667.
Baccha FABR. 81.
Bactromyia B. B. 297.
Barychaeta BEZZI. 361.
Baumhaueria MEIG. 358.
Baravia B. B. 259.
Bebricia R.-D. 404.
Belida R.-D. 225.
Bellardia R.-D. 549.
Bellieria R.-D. 469.
Berallia R.-D. 294.
Berrava R.-D. 469.
Bessa R.-D. 299.
Besseria R.-D. 564.
Bigonichaeta ROND. 384.
Bigotia R.-D. 338.
Billaea R.-D. 440.
Biomyia COQUILL. 326.
Biomyia ROND. 419.
Bithia R.-D. 416.
Blaesoxypha Lw. 493.
Blainvillia R.-D. 747.
Blepharidea ROND. 262.
Blepharidopsis B. B. 275.
Blepharigena ROND. 371.
Blepharipa ROND. 224.
Blepharomyia B. B. 383.
Blepharopoda B. B. 224.
Blera BILLB. 21.
Blissonia R.-D. 613.
Blondelia R.-D. 288.
Blumia R.-D. 263.
Bohemannia R.-D. 563.
Bonannia ROND. 427.
Bonellia R.-D. 206.
Bonnetia R.-D. 203.
Bothria ROND. 314.
Brachychaeta ROND. 357.
Brachycoelia MEADE. 372.
Brachycoma ROND. 502.
Brachylabis SCHNABL. 626.
Brachymera B. B. 518.
Brachymyia WILL. 123.
Brachyopa MEIG. 87.
Brachypalpus MACQ. 126.
Brachystylum MACQ. 373.
Braueria SCHN. 418.
Bromia R.-D. 233.
Brontaea KOW. 669.
Brullaea R.-D. 332.
Bucentes LATR. 381.
Buquetia R.-D. 294.
Byomyia R.-D. 602.
Cacnis R.-D. 386.
Callicera PANZ. 152.
Callimyia MEIG. 183.
Calliophrys KOW. 677.
Calliphora R.-D. 545.
Calliphorinae 521.
Calliprobola ROND. 144.
Callomyza FALL. 183.
Calobataemyia MACQ. 501.
Calyptia R.-D. 327.
Calyptia bis R.-D. 469.
Calyptidia R.-D. 325.
Camerania G.-T. 90.
Canilla R.-D. 600.
Campeneura ROND. 15.
Campogaster ROND. 561.
Camponeura WILL. 15.
Campylochaeta ROND. 305.
Campytura ROND. 561.
Carbonia R.-D. 373.
Carceia R.-D. 233.
Caricea R.-D. 682, 735.
Caricea SCHNABL. (see R.-D.) 634.
Cartosyrphus BIG. 21.
Cassidaemyia MACQ. 329.
Catambomba O.-S. 55.
Catachaeta B. B. 276.
Catagonia B. B. 228.
Catharosia ROND. 569.
Catilia R.-D. 445.
Celatoria COQUILL. 564.
Celca R.-D. 247.
Cenogaster DEM. 90.
Centrocera POK. 735.
Cephalomyia LATR. 590.
Cephalops FALL. 159.
Cephalops THOMS. 167.
Cephenomyia LATR. 556.
Cephysa R.-D. 524.
Ceracia ROND. 332.
Ceranthia R.-D. 386.
Ceratia ROND. 332.
Ceratochaeta B. B. 262.
Ceratophya WIED. 153.
Ceromyia B. B. 563.
Ceria FABR. 156.
Cerinae 156.
Ceriodes ROND. 156.
Ceromasia ROND. 285.
Ceromyia R.-D. 386.
Cerophora R.-D. 386.
Ceroplastus SCHELL. 168.
Cestonia ROND. 303.
Chaetina ROND. 259.
Chaetogena ROND. 315.
Chaetolya ROND. 285.
Chaetolyga ROND. 229.
Chaetomera B. B. 361.
Chaetomyia B. B. 261.
Chaetoplecteria MIK. 201.
Chaetoptilia ROND. 4^o 2.
Chaetostevenia BRAUER. 439.
Chaetotachina B. B. 338.
Chalarus WALK. 166.
Chamaesyrphus MIK. 82.
Chariclea R.-D. 318.
Chilosia MEIG. 21.
Chilosia ROND. 733.
Chiastochaeta POK. 731.
Chilosia MEIG. 21.
Chirosia ROND. 731.
Chloë R.-D. 688.
Chlorina R.-D. 700.
Choristomma STEIN. 666.
Chortophila MACQ. 710.
Chrenia R.-D. 419.
Christophoria ROND. 567.
Chrysoia R.-D. 570.
Chrysoclamys WALK. 138.
Chrysogaster MEIG. 15.

- Chrysomyia* R.-D. 543.
Chrysosoma MACQ. 209.
Chrysotoxinae 145.
Chrysotoxum MEIG. 145.
Chymophila MACQ. 153.
Cinochira ZETT. 563.
Cirillia ROND. 436.
Cistogaster LATR. 567.
Claivillia R.-D. 331.
Claivillia SCHIX. 332.
Clausicella ROND. 392.
Clelia R.-D. 327.
Clemelis R.-D. 277.
Cleodora R.-D. 338.
Cleonicæ R.-D. 404.
Clista MEIG. 464.
Clythia MEIG. 186.
Clytho R.-D. 463.
Clytia R.-D. 570.
Clytiomyia ROND. 570.
Cnemodon EGG. 13.
Cnephalia ROND. 367.
Cnephaliodes B. B. 191.
Cnephutachina B. B. 197.
Cnossia R.-D. 246.
Coelomyia HAL. 665.
Coenosia MEIG. 735.
Coenosiiinae 683.
Coen.coenosiaeformes 730.
Coen.hylemyiaeformes 683.
Compsilura BOUCHE. 308.
Conicera MEIG. 181.
Conogaster B. B. 295.
Coprina ZETT. 132.
Crameria R.-D. 438.
Craspedothrix B. B. 395.
Criticala PAND. 504.
Criticalina BEZZI. 504.
Criorrhina MEIG. 123.
Crossocosmia MIK. 225.
Cryptoneura BIG. 15.
Ctenocnemis KOW. 224.
Cuculla R.-D. 669.
Cyphocera MACQ. 202.
Curtisia R.-D. 380.
Cyrtoneura MACQ. 599, 600,
 605, 613.
- Cylindrogaster* ROND. 427.
Cylindromyia MEIG. 429.
Cylindromyiopsis BEZZI.
Cylindropsis BEZZI. 427.
Cylindrosoma ROND. 427.
Cynisca R.-D. 238.
Cynomyia R.-D. 554.
Cynophaga LIOY. 554.
Cynorrhina WILL. 126.
Cyuthia R.-D. 416.
Cyphocera MACQ. 202.
Cyrtilla R.-D. 288.
Cyrrilla ROND. 436.
Cyrtoneura MEIG. 599, 600,
 605, 613.
Cyrtoplebia ROND. 369.
Cystogaster LATR. 567.
Cytoria R.-D. 497.
Cyzenis R.-D. 255.
Damonia R.-D. 246.
Dasyomyia EGG. 125.
Dasyphora R.-D. 605.
Degeeria MEIG. 398.
Delia R.-D. 688, 710.
Demotieus MACQ. 414.
Descoidya MEADE. 357.
Deuterammobia BEZZI. 503.
Dexia MEIG. 445.
Dexiinae 398.
Dexilla WESTW. 455.
Dexiomorpha ROND. 444.
Dexiopsis POK. 732.
Dexiosoma ROND. 446.
Derodes B. B. 288.
Dialyta MEIG. 676.
Didea MACQ. 54.
Digonochaeta ROND.
Dimeraspis NEWM. 153.
Dinera MEIG. 443.
Dinera R.-D. 449.
Dionaea R.-D. 329.
Diplomera LIOY. 320.
Diploneura LIOY. 172.
Diplostichus B. B. 308.
Discochaeta B. B. 395.
Disjunctio PAND. 494.
Dolichocolon B. B. 298.
- Dolichodexia* B. B. 444.
Dorbinia R.-D. 228.
Doria MEIG. 308.
Doria ROND. 306.
Doros MEIG. 80.
Drepanophora STROBL. 182.
Drino R.-D. 238.
Drymeia MEIG. 631.
Dufouria R.-D. 436.
Duponchelia R.-D. 313.
Dysithrica PAND. 464.
Echinogaster LIOY. 198.
Echinomyia DUM. 191.
Echinosoma GIBSCHIN. 216
Edesia R.-D. 293.
Edomyia R.-D. 302.
Egeria R.-D. 688.
Eggeria ROND. 452.
Eggeria SCHIX. 317.
Eggisops ROND. 502.
Eginia R.-D. 584.
Eginiinae 584.
Egla R.-D. 710.
Elaehipalpus ROND. 413.
Elbaca R.-D. 246.
Eleone R.-D. 413.
Elfa R.-D. 386.
Elizeta ROND. 572.
Eloceria R.-D. 393.
Elodia R.-D. 395.
Elomyia R.-D. 573.
Elophilus LATR. 107.
Elophoria R.-D. 318.
Elpe R.-D. 277.
Elpigia R.-D. 517.
Emporomyia B. B. 402.
Endocephala LIOY. 556.
Enggops ROND. 502.
Engyzops ROND. 502.
Euica MEIG. 54.
Euopteria HEND. 644.
Euteromyza ROND. 593.
Eutheniscus R.-D. 220.
Eutamobia LIOY. 294.
Eutamobosca LIOY. 414.
Eutamophaga LIOY. 386.
Eperia R.-D. 246.

- Ephyra* R.-D. 299.
Epicampocera MACQ. 260.
Epistrophe WALK. 57.
Epolia B. B. 514.
Eratia R.-D. 572.
Erebia R.-D. 411.
Eretria R.-D. 306.
Eribea R.-D. 338.
Erichsonia R.-D. 469.
Erigone R.-D. 210.
Eriocmia R.-D. 263.
Eriophora PHIL. 123.
Eriops LIOY. 99.
Eriothrix MEIG. 425.
Eriozona SCHN. 53.
Eriphia MEIG. 631.
Eriphia SCHN. (nec MEIG.) 697.
 Eristalinae 96.
Eristalinus ROND. 96.
Eristalis LATR. 96.
Eristalis ZETT. 21.
Eristalodes MIK. 99.
Eristalomysia ROND. 99.
Ernestia R.-D. 210.
Erycia R.-D. 294.
Erynnia R.-D. 304.
Erypse R.-D. 380.
Erytaca R.-D. 302.
Erythroceras R.-D. 380.
Esila R.-D. 338.
Essenia R.-D. 246.
Estheria R.-D. 443.
Etheria R.-D. 567.
Ethilla R.-D. 238.
Eucercatomysia WILL. 83.
Eudora R.-D. 197.
Eudoromyia BEZZI. 197.
Eugenia R.-D. 246.
Eugeniamysia WILL. 88.
Eumacronychia T.-T. 513.
Eumea R.-D. 246.
Eumeros MEIG. 127.
Eumerus MEIG. 133.
Eumetopia B. B. 509.
 Eumyidae 189.
Euphemia R.-D. 615.
Euphoria R.-D. 608.
Eupogona ROND. 261.
Eurhinomallota BIG. 123.
Eurimyia BIG. 111.
Eurionomyia BIG. 111.
Eurychaeta B. B. 496.
Eurychea R.-D. 247.
Eurygaster MACQ. 294.
Eurygastrina LIOY. 263.
 Euryomma STEIN. 666.
Eurythaca R.-D. 380.
Eurythia R.-D. 216.
Eustalomysia KOW. 696.
Eulachina B. B. 334.
Euthera LW. 566.
Eutrichota KOW. 731.
Eversmannia R.-D. 220.
Eyibrissa ROND. 566.
Erochila ROND. 88.
Erogaster ROND. 432.
Evorista B. B. 255.
 Exorista MEIG. 238.
Fabricia MEIG. 326.
Fabricia R.-D. 196.
Fabriciella BEZZI. 196.
Factoria R.-D. 302.
Fallonia MEIG. 304.
Fannia R.-D. 656.
Faunia R.-D. 334.
Favrella R.-D. 198.
Fausta R.-D. 210.
Febusia R.-D. 454.
Fellaca R.-D. 615.
Ferdinandea ROND. 138.
Feria R.-D. 424.
Fischeria R.-D. 418.
Fortisia ROND. 436.
Frauenfeldia EGG. 459.
Freraca R.-D. 559.
Friedlitzkia SCHN. 305.
Frontina MEIG. 304.
Fucellia R.-D. 745.
 Fucellinae 745.
Futilia R.-D. 338.
Gaedartia R.-D. 318.
Gaedia MEIG. 306.
Gasterophilus LEACH. 593.
Gastrolepta ROND. 499.
 Gastrophilinae 593.
Gastrophilus LEACH. 593.
Gastrus MEIG. 593.
Gaubilis R.-D. 338.
Germaria R.-D. 360.
Gerraisia R.-D. 288.
Gesneria R.-D. 467.
Gimmerthalia R.-D. 302.
Glaucoptana B. B. 384.
Gonia MEIG. 362.
Goniocera B. B. 385.
Gouraldia R.-D. 282.
Graphogaster ROND. 332.
Graphomyia R.-D. 599.
Gravenhorstia R.-D. 396.
Guercinia R.-D. 347.
Gymnobasis B. B. 440.
Gymnochaeta R.-D. 210.
Gymnodexia B. B. 440.
Gymnodia PAND. 747.
Gymnodia R.-D. 669.
Gymnoglossa MIK. 413.
Gymnoparia B. B. 386.
Gymnopeza ZETT. 560.
Gymnophania B. B. 560.
Gymnophora MACQ. 181.
Gymnophthalma LIOY. 386.
Gymnoprosope T.-T. 513.
Gymnoptera LIOY. 173.
Gymnosoma MEIG. 558.
Gymnostylina MACQ. 522.
Hadromysia WILL. 125.
Haematobia R.-D. 612.
Halesa R.-D. 247.
Halidayia EGG. 463.
Halithea HAL. 745.
Halophora PAND. 577.
Hammerschmidtia SCHUMM. 88.
Hamomyia ROND. 698.
Hamalia R.-D. 501.
Harrisia MEIG. 222.
Hartigia R.-D. 469.
Haydaca R.-D. 318.
Hebecnema SCHNABEL. 633.
Hebia R.-D. 419.

- Helicobosca* BEZZI, 496.
Helina R.-D. 634.
Heliophilus MEIG. 123.
Heliozeta RONN. 572.
Helocera R.-D. 393.
Helomyia R.-D. 576.
Heliophilus MEIG. 107.
Helophoria R.-D. 318.
Hemimacqurtia B. B. 257.
Hemimasicera B. B. 295.
Hemithaca R.-D. 262.
Henica MEIG. 54.
Hera SCHNABL. 627.
Herbstia R.-D. 386.
Herilla R.-D. 247.
Heringia RONN. 5.
Hermyna R.-D. 566.
Hersilia R.-D. 306.
Hesione R.-D. 257.
Heteroneura FALL. 183.
Heteronychia B. B. 496.
Heteroptera MACQ. 517.
Hilarella RONN. 513.
Himera R.-D. 347.
Histochoeta RONN. 358.
Histoglossa RONN. 393.
Homalogaster MACQ. 441.
Homalomyia BOUCHE. 656.
Homalostoma RONN. 440.
Homoeocera LIOY. 495.
Homonychia B. B. 206.
Homotoma LIOY. 257.
Hoplisa RONN. 502.
Hoplogaster RONN. 734.
Hubertia R.-D. 300.
Huebneria R.-D. 238.
Hyalomyia R.-D. 579.
Hyalomyioides T.-F. 332.
Hyalurgus B. B. 410.
Hydrophoria R.-D. 684.
Hydrotaca R.-D. 649.
Hyetodesia MEADE. 615.
Hylemyia R.-D. 688.
Hylephila RONN. 698.
Hyperaca R.-D. 456.
Hypereteina SCHIX. 393.
Hypocera 168.
Hypocera LIOY. 173.
Hypochaeta B. B. 305.
Hypoderma LATR. 586.
Hypoderminae 585.
Hyporites POK. 697.
Hypostena MEIG. 397.
Hyria R.-D. 401.
Hystrichoneura B. B. 416.
Hystriomyia PORTSCH. 189.
Ida R.-D. 445.
Idia MEIG. 523.
Idiella B. B. 523.
Idiopsis B. B. 522.
Ilacsa R.-D. 306.
Illigera MEIG. 360.
Illigeria R.-D. 460.
Imalisma MACQ. 114.
Ischyroptera POK. 83.
Ischyrosyrphus BIG. 53.
Ismenia R.-D. 318.
Isomera R.-D. 362.
Istochoeta RONN. 358.
Istoglossa RONN. 393.
Jaretia R.-D. 404.
Kirbya R.-D. 464.
Kirimya BIG. 122.
Klugia R.-D. 372.
Kockia R.-D. 465.
Labidogaster MACQ. 329.
Labidogyne B. B. 329.
Labigastera MACQ. 329.
Lagenosyrphus MIK. 53.
Lalage R.-D. 503.
Lambertia R.-D. 226.
Lasiophthicus RONN. 55.
Lasiops MEIG. 726.
Lasiops MEIG. 627.
Lathyrophthalmus MIK. 97.
Latreillia R.-D. 358.
Lecanipus RONN. 315.
Leioptera R.-D. 282.
Lejogaster RONN. 16.
Lejota RONN. 21.
Leptochoeta B. B. 315.
Leptomysia WALK. 122.
Leptophora SIX. 182.
Leptostyla LIOY. 349.
Leptotachina B. B. 288.
Leskia R.-D. 418.
Lespesia R.-D. 358.
Leucophora R.-D. 698.
Leucostoma MEIG. 327.
Leucozona SCHIX. 52.
Ligeria R.-D. 396.
Lilaca R.-D. 300.
Limnophora R.-D. 669.
Limnospila SCHNABL. 735.
Limosia R.-D. 735.
Limnaemyia R.-D. 203.
Liogaster RONN. 16.
Liophora R.-D. 282.
Liops RONN. 112.
Liota RONN. 21.
Lispa LATR. 677.
Lissocephala POK. 682.
Lissocephala LIOY. 172.
Listeria R.-D. 469.
Litophasia GIBSCH. 463.
Litorella RONN. 745.
Loeria R.-D. 255.
Loewia EGG. 403.
Lomacantha RONN. 277.
Lomatacantha B. B. 317.
Lomatacantha RONN. 277.
Lophosia MEIG. 428.
Lophomyia B. B. 285.
Lucasia R.-D. 298.
Lucilia R.-D. 531.
Lucilia R.-D. 608.
Lupia R.-D. 294.
Lydella R.-D. 288.
Lydina R.-D. 222.
Lylibaca R.-D. 318.
Lyperosia RONN. 612.
Lypba R.-D. 220.
Lythia R.-D. 386.
Machaeraca RONN. 308.
Maecurtia R.-D. 404.
Macronychia RONN. 519.
Macropalpus MEIX. 238.
Macroprosopa B. B. 408.
Macrorrhis RONN. 732.
Macrosoma LIOY. 497.
Macrosoma R.-D. 615.

- Macrotaeniina SCHN. 418.
Maculata R.-D. 567.
 Mallota MEIG. 114.
Malpighina LLOY. 259.
Maraspina LLOY. 549.
Marshamia R.-D. 203.
 Marsilia RONN. 426.
 Masicera MACQ. 280.
 Masistylum B. B. 413.
Medina R.-D. 398.
Medoria MEIG. 500.
Medorilla RONN. 329.
Megaera R.-D. 515.
Megalochaeta B. B. 260.
Megaschida RONN. 175.
Megaspis LW. 96.
 Megerlea R.-D. 498.
 Meigenia R.-D. 320.
Meigeniopsis B. B. 297.
 Melangyna VERR. 48.
Melania MEIG. 434.
Melanocheila RONN. 677.
Melanogaster RONN. 18₂.
Melanomyia RONN. 577.
 Melanophora MEIG. 460.
 Melanostoma SCHN. 48.
Melanota RONN. 434.
Melia R.-D. 377.
Melibaea R.-D. 247.
Melinda R.-D. 549.
Melithreptus LW. 73.
Melitrophus WALK. 73.
 Melizocera RONN. 377.
 Meriania R.-D. 219.
Mericia R.-D. 210.
 Merodon MEIG. 115.
 Mesembria MEIG. 609.
Mesembrius RONN. 107.
 Mesomelaena RONN. 515.
Mesophila WALK. 153.
 Metallica WULF. 522.
 Metopia MEIG. 510.
 Metopina MACQ. 182.
Melopisena RONN. 103.
Metopodia B. B. 508.
 Metopostena RONN. 403.
 Miera ZETT. 563.
Microptoma WESTW. 127.
Microcephalus SCHNABL. 589.
Microcera MEIG. 159.
Microchaetina WULF. 496.
Microchilosia MACQ. 465.
 Microdon MEIG. 153.
 Microdentinae 153.
Micromyiobia B. B. 419.
Micromychia B. B. 220.
 Microphana B. B. 397.
 Micropalpus MACQ. 206.
 Microphthalma MACQ. 447.
Microptera R.-D. 434.
Microstylum LLOY. 143.
Microsoma MACQ. 563.
Microtachina MIK. 34.
Microtricha MIK. 464.
 Mikia KOW. 189.
Mikiella MEUN. 567.
 Milesia LATR. 141.
Milesiformis RONN. 121.
 Milesiinae 121.
 Miltogramma MEIG. 504.
 Minella R.-D. 409.
 Mintho R.-D. 432.
 Minthodes B. B. 428.
Misellia R.-D. 513.
 Mochlosoma B. B. 449.
Mollia R.-D. 398.
 Monochaeta B. B. 356.
 Morellia R.-D. 600.
Morelia R.-D. 441.
 Morinia R.-D. 499.
 Morphomyia RONN. 442.
Moschusa R.-D. 519.
Mufelia R.-D. 545.
Mulio FABR. 145.
Mulsantia R.-D. 469.
 Musca L. 602.
 Muscina R.-D. 613.
 Muscinae 599.
 Musc. ariciac-formes 611.
 Musc. coenosiac-formes 676.
 Musc. muscac-formes 599.
Mycodia R.-D. 247.
 Mycophaga RONN. 730.
 Mydaea R.-D. 634.
Mydaea R.-D. 615.
Mydina R.-D. 634.
Myia RONN. 545.
Myiatropa RONN. 112.
 Myiobia R.-D. 419.
 Myiocera R.-D. 450.
 Myiolepta NEWM. 122.
Myiophora R.-D. 469.
Myiorrhina R.-D. 467.
 Myiostoma R.-D. 440.
 Myopina R.-D. 677.
Myospila RONN. 634.
Myrsina R.-D. 300.
Myrtacella WULF. 320.
Myxocorista B. B. 277.
 Myxodexia B. B. 444.
 Neaera R.-D. 384.
 Neacropsis B. B. 395.
 Nemoraea R.-D. 222.
 Nemorilla RONN. 257.
Nemisia LLOY. 173.
 Neoaseia WILL. 84.
Neolimnophora SCHN. 669.
Neotropidomyia T.-T. 444.
Neurocyia T.-T. 563.
 Nephrocercus ZETT. 158.
Nerina R.-D. 710.
Nivaea R.-D. 450.
Nigrina R.-D. 282.
Nilea R.-D. 277.
Nitellia R.-D. 524.
Noda SCHELL. 168.
Noria R.-D. 462.
Nowickia WACHTL. 191.
 Nyctia R.-D. 497.
Obcida R.-D. 300.
Obelosia LLOY. 172.
Ocalca R.-D. 373.
Ochtiphila FALL. 745.
 Ocyptamus SERV. 80.
 Ocyptera LATR. 429.
 Ocypterula RONN. 428.
Ochalia R.-D. 282.
 Oedemagena LATR. 585.
 Oestrinae 589.
 Oestroderma PORTSCH. 590.

- Oestromyia* BRAUER, 590.
Oestrus L., 591.
Olbiosyrphus MÜK., 79.
Olbja R.-D., 210.
Olivieria MEIG., 417.
Olivieria R.-D., 425.
Omalogaster MACQ., 441.
Omalostoma RONN., 440.
Omocera LIOY., 495.
Omotoma LIOY., 257.
Onesia R.-D., 549.
Onodontha RONN., 649.
Onaocera MACQ., 333.
Onychocera MACQ., 333.
Onychogonia B. B., 362.
Oodigaster MACQ., 334.
Opesia R.-D., 568.
Opeta MEIG., 183.
Ophelia R.-D., 510.
Ophina R.-D., 247.
Ophyra R.-D., 655.
Oplisa RONN., 502.
Oplogaster RONN., 734.
Oppia R.-D., 247.
Oppia bis R.-D., 502.
Orchisia RONN., 735.
Oresbia R.-D., 298.
Oria R.-D., 247.
Orillia R.-D., 419.
Orizia R.-D., 524.
Ornidia SERV., 90.
Orthellia R.-D., 608.
Orthocera MACQ., 15.
Osmia R.-D., 386.
Osmia R.-D., 300.
Oswaldia R.-D., 302.
Pachycephala LIOY., 358.
Pachycephalus WIED., 96.
Pachychaeta PORRECH., 361.
Pachyophthalmus B. B., 518.
Pachystylum MACQ., 361.
Pales R.-D., 311.
Pallasia R.-D., 567.
Palpibraca RONN., 202.
Palpimaga RONN., 172.
Palumbia RONN., 113.
Palusia R.-D., 735.
Panzeria MEIG., 425.
Panzeria R.-D., 217.
Parabrachymera MÜK., 518.
Paracompsomyia HOUGH,
 543.
Paracyrillia STROBL., 332.
Paragus LATR., 1.
Paragusia SCHN., 514.
Parahypostena STROBL., 397.
Parahyria BISCH., 411.
Paralophora GIBSCHN., 583.
Paramacronychia B. B., 519.
Paramorinia B. B., 453.
Paramacera B. B., 380.
Paraphania B. B., 566.
Paraphorocera B. B., 287.
Paraplugia B. B., 371.
Paraprosena B. B., 449.
Pararicia B. B., 613.
Parasarcophila B. B., 467.
Parasetigena B. B., 313.
Parastanferia POK., 384.
Paratrixa B. B., 437.
Paratryphera B. B., 260.
Parerigone BRAUER, 217.
Parerynnia B. B., 303.
Pareulora WACHTL., 191.
Parexorista B. B., 238.
Parhelophilus GIBSCHN., 110.
Parmula HEYD., 153.
Parthenia R.-D., 429.
Paykallia R.-D., 460.
Pegomyia R.-D., 700.
Pelatachina MEADE, 401.
Pelococera MEIG., 83.
Peleteria R.-D., 198.
Pelmatomyia B. B., 257.
Penium PHIL., 13.
Pentomyia B. B., 303.
Peribaca R.-D., 386.
Perichaeta RONN., 356.
Petagnia RONN., 402.
Petvina MEIG., 376.
Petina MEIG., 376.
Pelinops B. B., 376.
Pexomyia B. B., 293.
Pexopsis B. B., 294.
Peyritschia B. B., 452.
Phaedrina R.-D., 302.
Phaenicia R.-D., 531.
Phaenomyia R.-D., 331.
Phania MEIG., 566.
Phanigaster LIOY., 570.
Phaniomyia R.-D., 331.
Phaniosoma RONN., 565.
Phaonia R.-D., 615.
Pharyngomyia SCHN., 555.
Phasia LATR., 572.
Phasiinae 558.
Phbellia R.-D., 247.
Phega R.-D., 294.
Pherecida R.-D., 404.
Phericia R.-D., 436.
Philea R.-D., 247.
Philinta R.-D., 656.
Philodendria RONN., 180.
Philornis MEIN., 544.
Phoenicella R.-D., 427.
Pholoe R.-D., 247.
Phonomyia B. B., 308.
Phora LATR., 168.
Phoraca R.-D., 700.
Phoranthia RONN., 584.
Phorbia R.-D., 710.
Phoreida R.-D., 247.
Phorella R.-D., 469.
Phorichaeta RONN., 373.
Phoridae 168.
Phorinia R.-D., 306.
Phormia R.-D., 530.
Phorocera B. B., 311.
Phorocera R.-D., 315.
Phorophylla R.-D., 434.
Phorostoma R.-D., 450.
Phorostoma RONN., 441.
Phrosina R.-D., 513.
Phrosinella R.-D., 513.
Phryno R.-D., 255.
Phryxe R.-D., 262.
Phyllis R.-D., 626, 632.
Phyllomyia R.-D., 434.
Phyllolele Lw., 508.
Phyto R.-D., 462.
Phytomyptera RONN., 378.

- Phytomyzoptera* ROND. 378.
Piccania R.-D. 288.
Pierretia R.-D. 469.
Piezura ROND. 666.
Pipiza FALL. 8.
Pipizella ROND. 5.
Pipunculidae 158.
Pipunculus LATR. 159.
Pissenmyia R.-D. 362.
Pitthaea R.-D. 257.
Plagia MEIG. 369.
Plagia PAND. 372.
Plagia B. B. 369.
Plagiopsis B. B. 416.
Planes ROND. 132.
Platycheira ROND. 210.
Platychirus SERV. 42.
Platycnema ZETT. 183.
Platycoenosia STROBL. 666.
Platymyia R.-D. 247.
Platynochaetus WIED. 114.
Platypeza MEIG. 186.
Platypezidae 183.
Platyphora VERR. 182.
Plaxomyia R.-D. 602.
Plesina MEIG. 454.
Plesioneura MACQ. 454.
Placota SCHIX. 125.
Pocota SERV. 125.
Podotachina B. B. 334.
Pogonomyia ROND. 631.
Pokornya STROBL. 209.
Polidea MACQ. 222.
Polietes ROND. 615.
Pollenia R.-D. 524.
Polychaeta ROND. 356.
Popelia BEZZI. 201.
Portschinskia SEM. 589.
Polamia R.-D. 615.
Priophora R.-D. 612.
Proboscina ROND. 424.
Prosalpia POK. 697.
Proscna SERV. 448.
Prosopaea ROND. 298.
Prosopodes B. B. 299.
Prothreclus BECK. 167.
Protheclus ROND. 159.
Protoalliphora HOGG. 544.
Psalida ROND. 327.
Psarus LATR. 151.
Pseudaliphora PORTSCH. 327.
Pseudodemotius B. B. 415.
Pseudodoros BECK. 80.
Pseudogonia B. B. 367.
Pseudolimnophora STROBL. 669.
Pseudolomacantha HEND. 277.
Pseudomintho B. B. 428.
Pseudopachystylum MÜK. 357.
Pseudoperichaeta B. B. 263.
Pseudophorocera B. B. 262.
Pseudopyrellia GÜRSCH. 608.
Psilogaster LLOY. 57.
Psilota MEIG. 14.
Pterella R.-D. 504.
Pterocera MEIG. 90.
Ptesiomyia B. B. 306.
Philocera MACQ. 455.
Philocera R.-D. 452.
Philocerina MACQ. 455.
Philochaeta ROND. 455.
Philoparia B. B. 372.
Philops ROND. 409.
Philopsis R.-D. 568.
Philotachina B. B. 349.
Pilozeuxia B. B. 453.
Ptychomyia B. B. 299.
Ptychoneura B. B. 377.
Pynnosoma B. B. 543.
Pyrayura ROND. 329.
Pyrellia R.-D. 606.
Pyrophaena SCHIX. 46.
Pyrrhosia ROND. 418.
Quadrata PAND. 634.
Ramburia R.-D. 384.
Ramonda R.-D. 373.
Ravinia R.-D. 469.
Reannaria R.-D. 362.
Redia R.-D. 362.
Redtenbacheria SCHIX. 437.
Rhaedocineura ROND. 378.
Rhadina KOW. 731.
Rhamphina MACQ. 413.
Rhaphiochaeta B. B. 518.
Rhedia R.-D. 362.
Rhingia Scop. 89.
Rhinia R.-D. 524.
Rhinoestrus BRUER. 592.
Rhinometopia B. B. 356.
Rhinomorinia B. B. 453.
Rhinomyia R.-D. 465.
Rhinophora R.-D. 464.
Rhinophora SCHIX. 457.
Rhinophorinae 454.
Rhinotachina B. B. 415.
Rhyphista ROND. 424.
Rhynchodimera B. B. 449.
Rhyphogonia B. B. 366.
Rhyphomyia KALT. 372.
Rhynchomyia R.-D. 521.
Rhynchopsilops HEND. 631.
Rhyphosia MACQ. 417.
Rhyphotrichops SCHNABL. 627.
Rhyphomyia KALT. 372.
Roeselia R.-D. 378.
Rohrella R.-D. 615.
Rondania R.-D. 464.
Sagaris R.-D. 277.
Salia R.-D. 318.
Sarcobia LLOY. 416.
Sarcophaga MEIG. 469.
Sarcophaginae 467.
Sarcophila ROND. 495.
Sarcotachina PORTSCH. 454.
Sarromyia POK. 413.
Savia ROND. 462.
Scacca FABR. 57.
Scaligeria R.-D. 469.
Scatomyza FALL. 746.
Schaumia R.-D. 226.
Schenbria ROND. 304.
Schineria ROND. 566.
Schizometopa 189.
Schizophora 189.
Schnablia BEZZI. 589.
Schoenomyza HAL. 745.
Scopolia R.-D. 373.

- Scotia* R.-D. 354.
Scutelligera SPHX. 153.
Semitaehina PORTSCH. 502.
Senomctopia MACQ. 233.
Senolainia MACQ. 504.
Sericocera MACQ. 434.
Sericomyia MEIG. 140.
Serraisia R.-D. 469.
Servillia R.-D. 189.
Sesiophaga B. B. 415.
Sethigena B. B. 315.
Setalia R.-D. 508.
Silbermannia R.-D. 436.
Simoides LW. 96.
Siphona MEIG. 381.
Sironia R.-D. 247.
Sirostoma RONN. 441.
Sisyropt B. B. 233.
Smidtia R.-D. 247.
Solieria R.-D. 419.
Somatolia RONN. 222.
Somoleja RONN. 222.
Somomyia RONN. 545.
Somula MACQ. 123.
Spallanzania R.-D. 362.
Spallanzania RONN. 367.
Spathiogaster RONN. 48.
Spatzigaster RONN. 48.
Sphaerogaster LIOY. 469.
Sphaerophoria SERV. 73.
Sphēcāpata RONN. 515.
Sphēcā RONN. 141.
Sphēcālyma PERR. 632.
Sphēcāmorphā RONN. 156.
Sphēcāmyia LATR. 152.
Sphēcāgina MEIG. 83.
Sphēcāca RONN. 141.
Sphēcāpata RONN. 515.
Sphēcāimorphā RONN. 156.
Sphyrocera LIOY. 202.
Sphyromyia BIG. 198.
Spilogaster MACQ. 633, 634.
Spilomyia MEIG. 142.
Spilosia RONN. 320.
Spinolia R.-D. 285.
Spongōsia RONN. 318.
Spongōsia RONN. 318.
Spylosia RONN. 320.
Stacgeria R.-D. 347.
Staqnia R.-D. 615.
Stauferia R.-D. 393.
Staurochaeta B. B. 303.
Steinia B. B. 411.
Steiniella BERG. 411.
Stenomctopia MACQ. 233.
Stenolainia MACQ. 504.
Stephania R.-D. 373.
Stephensia R.-D. 561.
Steringomyia POK. 555.
Stevenia R.-D. 455.
Stomatomyia B. B. 355.
Stomatorrhina RONN. 523.
Stomina R.-D. 522.
Stomorchina RONN. 523.
Stomoxys GEOFFR. 611.
Stroblia POK. 669.
Strongygaster MACQ. 561.
Strongylogaster MACQ. 561.
Strongyloneura BIG. 522.
Sturmia R.-D. 224.
Stygina R.-D. 497.
Stylogymnomyia B. B. 559.
Stylomyia WCLF. 464.
Styloneuria B. B. 459.
Subelytia PAND. 571.
Succingulum PAND. 401.
Syllegoptera RONN. 584.
Syllegopterinae 584.
Syllegopterula POK. 632.
Syngomoptera SCHNABL.
 585.
Syntomocera SCHIX. 443.
Syntomogaster SCHIX. 561.
Syritta SERV. 132.
Syrphidae I.
Syrphinae I.
Syrphisoma A. COSTA. 48.
Syrphoidea I.
Syrphus FABR. 57.
Syrphus ZETT. 96.
Tachina B. B. 191.
Tachina MEIG. 334.
Tachinella PORTSCH. 427.
Tachinidae 189.
Tachininae 189.
Tachinoestrus PORTSCH.
 589.
Tachinomylia T.-T. 334.
Tachinoptera B. B. 300.
Talmonia R.-D. 385.
Tamiclea MACQ. 567.
Tapinomyia B. B. 453.
Taxigramma MACQ. 517.
Temesia R.-D. 247.
Tennocera SERV. 90.
Tennostoma SERV. 143.
Tennicera PAND. 320.
Tephromyia B. B. 467.
Tessarochaeta BEZZI. 201.
Tetrachaeta B. B. 201.
Thalpia R.-D. 300.
Thapsia R.-D. 384.
Theano R.-D. 247.
Thelaira R.-D. 435.
Thelychomychia B. B. 285.
Thelymorpha B. B. 358.
Thelymyia B. B. 261.
Thone R.-D. 519.
Therera FABR. 572.
Theria R.-D. 496.
Thrixion B. B. 437.
Thrychogena RONN. 403.
Thryptocera B. B. 392.
Thryptocera MACQ. 386.
Thyella R.-D. 257.
Tilesia R.-D. 441.
Timaria R.-D. 247.
Tlephusa R.-D. 247.
Trafoia B. B. 426.
Tremia R.-D. 615.
Trichodischia BIG. 285.
Trichogena RONN. 403.
Trichogena bis RONN. 459.
Tricholyga RONN. 354.
Tricholyga RONN. 1865, 262.
Trichometopia LIOY. 175.
Trichoneura LIOY. 384.
Trichoneura LIOY. 455.
Trichoparia B. B. 394.
Trichopticus RONN. 627.
Tricops RONN. 627.

- Triglyphus* Lw. 5.
Trigonospila Pok. 401.
Trineura FALL. 168.
Trineura MEIG. 180.
Triphleba ROND. 172.
Trisoncurea LLOY. 455.
Trilochaeta B. B. 277.
Trixa MEIG. 438.
Tromodesia ROND. 455.
Tropidia MEIG. 121.
Tropidomyia B. B. 444.
Tryphera MEIG. 259.
Tyzenhausia GERCK. 152.
Ubristes WALK. 153.
Uclesia GIBSCHN. 360.
Ugomyia ROND. 225.
Uromyia MEIG. 563.
Urophylla B. B. 394.
Urophylloides B. B. 397.
Vafellia R.-D. 386.
Vanzemia R.-D. 396.
Varichacta SPEIS. 210.
Velocia R.-D. 398.
Verrallia MIK. 167.
Vibrissina ROND. 298.
Viviania ROND. 326.
Volucella GEOFFR. 90.
Volucellinae 90.
Voria R.-D. 369.
Wagneria R.-D. 373.
Wahlbergia ZEFF. 564.
Walkeria R.-D. 339.
Weberia R.-D. 563.
Westwoodia R.-D. 396.
Wiedemannia MEIG. 432.
Wiedmannia R.-D. 282.
Winnertzia SCHN. 515.
Winthemia R.-D. 228.
Wohlfartia B. B. 493.
Xanthandrus VERR. 51.
Xanthogramma SCHN. 78.
Xylota MEIG. 127.
Xylota WESTW. 132.
Xylotachina B. B. 228.
Xylotaaja ROND. 122.
Xysta MEIG. 569.
Yctalesia ROND. 615.
Zabia R.-D. 700.
Zaida R.-D. 282.
Zaira R.-D. 294.
Zaphne R.-D. 684.
Zelima MEIG. 127.
Zelinda R.-D. 277.
Zelleria EGG. 418.
Zelleria R.-D. 339.
Zenais R.-D. 294.
Zenillia R.-D. 277.
Zellerstedtia R.-D. 339.
Zellerstedtia ROND. 114.
Zeuxia MEIG. 452.
Zophomyia MACQ. 411.
Zorella R.-D. 282.
Zygobothria MIK. 226.
-

INDEX SPECIERUM.

- abbreviata* MEIG. 81.
abbreviata POK. 700.
abbreviata v. ROS. 168.
abbreviata ZETT. (*Ar.*) 669.
abbreviata ZETT. (*Pros.*) 299.
abbreviata ZETTA (*Sphaer.*) 75.
abbreviatus ZETT. 66.
abdominalis BOUCHÉ. 635.
abdominalis F. 151.
abdominalis FALL. 168.
abdominalis GIMM. 734.
abdominalis GIRSCH. 584.
abdominalis R.-D. (*Act.*) 389.
abdominalis R.-D. (*Aphr.*) 417.
abdominalis R.-D. (*Ern.*) 214.
abdominalis R.-D. (*Ec.*) 241.
abdominalis R.-D. (*Hcl.*) 576.
abdominalis R.-D. (*Lyd.*) 291.
abdominalis R.-D. (*Pel.*) 199.
abdominalis R.-D. (*Sar.*) 486.
abdominalis R.-D. (*Ster.*) 456.
abdominalis R.-D. (*Tach.*) 342.
abdominalis R.-D. (*Thel.*) 435.
abdominalis ZETT. 634.
aberrans EGG. (*Mer.*) 115.
aberrans EGG. (*Per.*) 294.
aberrans LW. 465.
aberrans ROND. (*Er.*) 246.
aberrans ROND. (*Wintb.*) 228.
aberrans SCHIX. (*Arth.*) 522.
aberrans SCHIX. (*Thrix.*) 437.
aberrans STROBL. 209.
abiens MEIG. 127.
ablecta HARR. 113.
abnormis B. B. 308.
abnormis BRISCHK. 269.
absens WALK. 684.
acanthina ROND. 238.
acanthodes ROSSL. 137.
acanthophora ROND. 289.
accidens WALK. 349.
accincta WIED. 531.
acela WALK. 677.
acerba MEIG. 501.
acerba PAND. 688.
aclosae R.-D. 700.
acra WALK. 656.
aeris MACQ. 247.
aerochaeta B. B. 238.
aeromictae BOUCHÉ. 309.
aeromictae R.-D. 247.
aeromictarium MACQ. 248.
Actaeon BRAUER. 586.
activa R.-D. 270.
aculeata EGG. 600.
aculeata PAND. 549.
aculeata R.-D. 611.
aculeatus LW. 626.
aculeipes ZETT. 627.
acuminata LW. 14.
acuminata ROND. 355.
acuminata STROBL. 736.
acuta PORTSCH. 444.
acuta R.-D. 736.
acutangularis MACQ. 222.
acutangulata MACQ. 282.
acuticornis MEIG. 333.
acuticornis MEIG. (*Sciom.*) 745.
acutilabris BECK. 21.
adamantina R.-D. 609.
adelpa KOW. 726.
adelpa LW. 442.
Admete WALK. 349.
adolescens ROND. (*Brac.*) 503.
adolescens ROND. (*Min.*) 409.
adolescens ROND. (*Phy.*) 462.
adolescens ROND. (*Sar.*) 469.
adscita HAL. 677.
adspersa R.-D. 568.
adunata GEOFFR. 157.
adullerina ROND. (*Phas.*) 574.
adullerina ROND. (*Vol.*) 91.
aegagri BRAUER. 589.
aegrípēs POK. 616.
aegyptius MACQ. 1.
aegyptius WALK. 99.
aegyptius WIED. 77.
aemula MEIG. 239.
aenea A. S. 493.
aenea FABR. 152.
aenea MEIG. (*Chrys.*) 18.
aenea MEIG. (*Lyd.*) 222.
aenea MEIG. (*Min.*) 409.
aenea MEIG. (*Neoa.*) 85.
aenea R.-D. (*Euph.*) 609.
aenea R.-D. (*Ill.*) 582.
aenea v. ROS. 582.
aenea STROBL. 395.
aenea WALK. 405.
aenea ZETT. (*Pyr.*) 606.
aenea ZETT. (*Cy.*) 202.
aeneiventris BIG. 311.
aeneiventris ZETT. 616.
aeneomicans PORTSCH. 605.

- aenescens* MACQ. (*Er.*) 97.
aenescens MACQ. (*Er.*) 248.
aenescens MACQ. (*Meig.*) 321.
aenescens R.-D. 600.
aenescens WIED. 655.
aenescens ZETT. 465.
aeneus FALL. 163.
aeneus MACQ. 137.
aeneus MEIG. (*Mer.*) 116.
aeneus MEIG. (*Par.*) 4.
aeneus SCOP. 97.
aequa STROBL. 288.
aequalis MEIG. 635.
aequalis ZETT. 688.
aequipalpis THOMS. 469.
aequus MEIG. 414.
aerarius ROND. 116.
aerea DUF. 40.
aerea MEIG. 656.
aerea ZETT. 656.
aërea FALL. 669.
aërea ZETT. 656.
aëria MEADE. 656.
aerosa LW. 18.
aestiva MEIG. (*Anth.*) 727.
aestiva MEIG. (*Anth.*) 710.
aestiva MEIG. (*Pel.*) 401.
aestiva R.-D. 270.
aestivalis BECK. 21.
aestivalis MACQ. (*Limn.*) 727.
aestivalis MACQ. (*Pel.*) 401.
aestivalis R.-D. (*Er.*) 248.
aestivalis R.-D. (*Er.*) 248.
aestivalis R.-D. (*Limn.*) 203.
aestivalis R.-D. (*Meig.*) 321.
aestivalis R.-D. (*Mgi.*) 421.
aestivalis R.-D. (*Phor.*) 320.
aestivalis R.-D. (*Ptyph.*) 302.
aestivalis R.-D. (*Sar.*) 473.
aestivalis R.-D. (*Sar.*) 482.
aestivalis R.-D. (*Tach.*) 347.
aestuans FALL. 231.
aestuans MEIG. 312.
aestuans R.-D. (*Lac.*) 533.
aestuans R.-D. (*Lac.*) 539.
aestuum VILL. 669.
aethiops ZETT. 697.
affinis FARR. 578.
affinis FALL. (*Er.*) 239.
affinis FALL. (*Sar.*) 469.
affine G.-T. 150.
affinis HART. 245.
affinis LW. 66.
affinis MACQ. 549.
affinis MEADE. 635.
affinis PALMA. 66.
affinis R.-D. (*Lac.*) 533.
affinis R.-D. (*Nem.*) 223.
affinis R.-D. (*Sar.*) 473.
affinis R.-D. (*Tach.*) 336.
affinis SAY. 57.
affinis SCHIN. 405.
affinis WAHLBG. 107.
affinis ZETT. 746.
afra R.-D. 473.
agile R.-D. 327.
agilis MACQ. 314 et 329.
agilis MEIG. (*Hyp.*) 173.
agilis MEIG. (*Lyd.*) 291.
agilis MEIG. (*Or.*) 550.
agilis R.-D. (*Ar.*) 509.
agilis R.-D. (*Ar.*) 667.
agilis R.-D. (*Dus.*) 605.
agilis R.-D. (*Egle*) 710.
agilis R.-D. (*Euph.*) 609.
agilis R.-D. (*Fell.*) 616.
agilis R.-D. (*Lu.*) 533.
agilis R.-D. (*Mus.*) 282.
agilis R.-D. (*Meig.*) 323.
agilis R.-D. (*Morellia*) 600.
agilis R.-D. (*Mor.*) 499.
agilis R.-D. (*Phori.*) 307.
agilis R.-D. (*Phoro.*) 316.
agilis R.-D. (*Phrym.*) 256.
agilis R.-D. (*Phryr.*) 270.
agilis R.-D. (*Poll.*) 526.
agilis R.-D. (*Sar.*) 473.
agilis R.-D. (*Sar.*) 480.
agilis R.-D. (*Sar.*) 483.
agilitas HARR. 42.
agnata ROND. (*Er.*) 239.
agnata ROND. (*Sar.*) 470.
agnata MEIG. 349.
agnata R.-D. 270.
aguon WALK. 65.
agraria R.-D. (*Macq.*) 406.
agraria R.-D. (*Sar.*) 473.
agraria R.-D. (*Sar.*) 483.
agrostis FALL. 519.
agrestis MEIG. 519.
agrestis R.-D. (*Cer.*) 287.
agrestis R.-D. (*Er.*) 295.
agrestis R.-D. (*Er.*) 248.
agrestis R.-D. (*Hyl.*) 688.
agrestis R.-D. (*Lim.*) 736.
agrestis R.-D. (*Te.*) 467.
agrestis R.-D. (*Mirr.*) 297.
agrestis R.-D. (*Phas.*) 574.
agrestis R.-D. (*Ptych.*) 302.
agrestis R.-D. (*Rhac.*) 379.
agrestis R.-D. (*Sar.*) 485.
agrestis ROND. 521.
agricola MEADE. 484.
agricola R.-D. (*Del.*) 688.
agricola R.-D. (*Pha.*) 573.
agricola R.-D. (*Phr.*) 270.
agricola R.-D. (*Sar.*) 473.
agromyzella ROND. 734.
agromyzina FALL. 734.
agrorum MEIG. 711.
agrorum R.-D. (*Er.*) 248.
agrorum R.-D. (*Tach.*) 342.
ahenea v. ROS. 21.
alacer MACQ. 342.
alacris MEIG. 255.
albanica BIG. 198.
albatella ZETT. 736.
albescens PAND. 361.
albescens ZETT. 698.
albibarbis BIG. 31.
albibarbis R.-D. 251.
albibarbis ROND. 219.
albibasalis ZETT. 700.
albicalyptata MACQ. 404.
albicans FALL. 356.
albicans R.-D. (*Er.*) 248.
albicans R.-D. (*Sar.*) 482.
albiceps MACQ. 349.
albiceps MEIG. (*Anth.*) 684.
albiceps MEIG. (*Lac.*) 533.
albiceps MEIG. (*Sar.*) 470.

- albiceps* MEIG. (*Sciom.*) 745.
albiceps MEIG. (*Trich.*) 354.
albiceps R.-D. (*Era.*) 214.
albiceps R.-D. (*On.*) 550.
albiceps R.-D. (*Tach.*) 342.
albiceps WIED. 543.
albiceps ZETT. 486.
albicincta ROND. 39.
albicincta BIG. 669.
albicincta FALL. 727.
albicincta ZETT. 399.
albicollis MEIG. 384.
albicoma BRAUER. 586.
albicornis MEIG. 736.
albicornis ROND. 635.
albicornis STROBL. 736.
albida MACQ. 467.
albida R.-D. (*Dir.*) 450.
albida R.-D. (*Lim.*) 736.
albida R.-D. (*Phygr.*) 270.
albida R.-D. (*Sar.*) 473.
albida R.-D. (*Sar.*) 486.
albida R.-D. (*Tach.*) 342.
albidella ZETT. 711.
albidipennis R.-D. 486.
albidopilosa PORTSCH. 191.
albidula R.-D. (*Lim.*) 736.
albidula R.-D. (*Sar.*) 483.
albifavies R.-D. 573.
albifrons FALL. 1.
albifrons MACQ. 342.
albifrons MEIG. 116.
albifrons PAND. 669.
albifrons R.-D. (*Tr.*) 467.
albifrons R.-D. (*Hist.*) 359.
albifrons R.-D. (*Phas.*) 573.
albifrons R.-D. (*Phor.*) 307.
albifrons R.-D. (*Tach.*) 342.
albifrons R.-D. (*Zen.*) 279.
albifrons ROND. (*Lim.*) 635.
albifrons ROND. (*Sphce.*) 1515.
albifrons ROND. (*Tach.*) 334.
albifrons v. ROS. 82.
albifrons STROBL. 635.
albifrons WALK. 363.
albifrons ZETT. 736.
albifrontalis GIMM. 399.
albinana ZETT. 731.
albinanus F. 42.
albinanus FALL. 43.
albinargo PAND. 700.
albinervis ZETT. (*Ar.*) 656.
albinervis ZETT. (*Ar.*) 333.
albipalpis MEIG. 736.
albipennis GIMM. 471.
albipennis MEIG. (*All.*) 581.
albipennis MEIG. (*Anth.*) 711.
albipennis MEIG. (*Con.*) 181.
albipennis MEIG. (*Lac.*) 533.
albipennis R.-D. (*Del.*) 711.
albipennis R.-D. (*Ner.*) 711.
albipennis ZETT. 560.
albipennis R.-D. 377.
albipes GIMM. 4.
albipila MEIG. (*Chil.*) 21.
albipila MEIG. (*Pip.*) 11.
albipuncta ZETT. 649.
albiseta MACQ. 576.
albiseta MEIG. 31.
albiseta R.-D. 372.
albiseta ROND. 39.
albiseta v. ROS. 698.
albisquama ROND. 367.
albisquama ZETT. 288.
albisquamis R.-D. 421.
albitarsis MEIG. (*Chil.*) 22.
albitarsis MEIG. (*Pip.*) 11.
albitarsis ZETT. (*Ar.*) 731.
albitarsis ZETT. 162.
albicillosa MACQ. 576.
albicincta MACQ. 323.
albocingulata FALL. 303.
albofasciata MQ. (*Chor.*) 543.
albofasciata MQ. (*Pygr.*) 606.
albofasciatum PORTSCH. 586.
albohatterata STROBL. 174.
albolineata FALL. 615.
albolineata GIMM. 600.
albomaenulata MACQ. 399.
albomaenulatus MACQ. 55.
albopilosus STROBL. 148.
albo punctata v. ROS. 497.
albostrigatus FALL. 57.
albula FALL. 711.
albula MEIG. 699.
alcidice WALK. 65.
alcis HILD. 589.
Albrichi T.-T. 214.
algerica B. B. 366.
algira MACQ. (*Call.*) 545.
algira MACQ. (*Diom.*) 329.
algira MACQ. (*Ech.*) 193.
algira MACQ. (*Min.*) 432.
algira MACQ. (*Phora.*) 172.
algira MACQ. (*Poll.*) 524.
algira R.-D. (*Pel.*) 200.
algira R.-D. (*Sel.*) 508.
algirum MACQ. 505.
algyrus MACQ. (*Par.*) 4.
algyrus MACQ. (*Syr.*) 63.
aliena WALK. 669.
alienans PAND. 732.
alismatic R.-D. 736.
alivarians PAND. 440.
allecta WALK. 688.
allotala MEIG. 635.
alma MEIG. 682.
almeriensis STROBL. 648.
Almquistii HOLMGR. 669.
alneti FALL. 54.
alneti WALK. 55.
alneti Scop. 496.
alnicola PAND. 278.
alpestris BECK. 22.
alpestris ROND. (*Cueph.*) 368.
alpestris ROND. (*Maer.*) 519.
alpestris ROND. (*Oc.*) 429.
alpestris ROND. (*Spil.*) 635.
alpeica ZETT. 727.
alpicola MEADE. 632.
alpicola POK. 734.
alpicola ROND. (*Ech.*) 191.
alpicola ROND. (*Pog.*) 631.
alpicola ROND. (*Vol.*) 91.
alpicola SCHUM. 44.
alpicola STROBL. (*Hydr.*) 368.
alpicola STROBL. (*Eng.*) 502.
alpicola ZETT. 616.
alpigena POK. 711.
alpina MEIG. 438.
alpina POK. (*Dial.*) 676.

- alpina POK. (*Par.*) 384.
 alpina ROND. 616.
 alpina SCHN. et EGG. 24.
 alpina STROBL. (*Anth.*) 727.
 alpina STROBL. (*Ar.*) 616.
 alpina STROBL. (*Chil.*) 38.
 alpina STROBL. (*Vol.*) 91.
 alpina WALK. 697.
 alpina ZETT. (*Aer.*) 555.
 alpina ZETT. (*Chil.*) 22.
 alpina ZETT. (*Ech.*) 191.
 alpinum ROND. 145.
 alpinus PANZ. 102.
 alpinus ROND. 135.
 alpinus STROBL. (*Er.*) 102.
 alpinus STROBL. (*Phal.*) 43.
 altercata PAND. 635.
 alternans MACQ. 69.
 alternatus SCHRANK. 60.
 amabilis MEIG. (*Anth.*) 635.
 amabilis MEIG. (*Met.*) 510.
 Amasiae MEIG. 349.
 Amasiae B. B. 384.
 ambigua FALL. (*Musc.*) 684.
 ambigua FALL. (*Vor.*) 369.
 ambigua KRAM. 492.
 ambigua MEIG. 370.
 ambigua R.-D. 270.
 ambiguum FALL. 48.
 Ambivivus WALK. 349.
 ambulans FABR. 48.
 ambulans MEIG. (*Coen.*) 736.
 ambulans MEIG. (*Epi.*) 260.
 ambulans MÜLL. 667.
 ambulans R.-D. 279.
 ambulans ROND. 289.
 ambulans SCHN. 48.
 ambulatoria MEIG. 399.
 ambulatoria R.-D. 473.
 ambulatrix R.-D. (*Physch.*)
 391.
 ambulatrix R.-D. (*Sar.*) 482.
 amantaria Scop. 529.
 americana T.-T. 391.
 amethystea MEIG. 17.
 amethystina MACQ. 17.
 amethystina ROND. 17.
 amica MEIG. 393.
 amica R.-D. 342.
 amica ROND. 259.
 amita ROND. 471.
 amoena Lw. 619.
 amoena MEIG. (*Call.*) 183.
 amoena MEIG. (*Thel.*) 475.
 amoena MEIG. (*Winth.*) 229.
 amoena R.-D. (*Er.*) 248.
 amoena R.-D. (*Lac.*) 539.
 amoena R.-D. (*Physch.*) 301.
 amoena R.-D. (*Pyr.*) 603.
 amoenus Lw. (*Entom.*) 133.
 amoenus Lw. (*Syr.*) 71.
 Ampebus WALK. 214.
 Amphion R.-D. 235.
 Amphiro WALK. 350.
 amplexens PAND. 550.
 amplicornis ZETT. 383.
 Amsteinii BREMI. 103.
 Amsteinii MACQ. 433.
 amurensis SCHNABL. 585.
 anacantha Lw. 373.
 anacantha R.-D. 282.
 anale O. G. COSTA. 559.
 anale MEIG. 327.
 analis FABR. 573.
 analis MACQ. (*Microd.*) 153.
 analis MACQ. (*Microp.*) 207.
 analis MACQ. (*Mas.*) 282.
 analis MACQ. (*Nemat.*) 85.
 analis MACQ. (*Sphaer.*) 76.
 analis MACQ. (*Vol.*) 94.
 analis MACQ. (*Winth.*) 231.
 analis MEIG. (*Bac.*) 381.
 analis MEIG. (*Mrr.*) 116.
 analis MEIG. (*Micr.*) 207.
 analis R.-D. (*Bac.*) 382.
 analis R.-D. (*Car.*) 736.
 analis R.-D. (*Ech.*) 198.
 analis R.-D. (*Euph.*) 609.
 analis R.-D. (*Limn.*) 669.
 analis R.-D. (*Limn.*) 203.
 analis R.-D. (*Myd.*) 635.
 analis ZETT. 382.
 Anansis WALK. 111.
 anceps R.-D. (*Phr.*) 270.
 anceps R.-D. (*Sar.*) 473.
 anceps R.-D. (*Tach.*) 312.
 anceps ZETT. (*Anth.*) 635.
 anceps ZETT. 172.
 ancilla MEIG. (*Anth.*) 635.
 ancilla MEIG. (*Zen.*) 279.
 ancilla R.-D. (*Phr.*) 270.
 ancilla R.-D. (*Tach.*) 342.
 ancilla v. Rod. 616.
 ancilla ROND. 471.
 ancora MEIG. 573.
 andalusiacus STROBL. 69.
 angelicae FALL. 636.
 angelicae MEIG. 289.
 angelicae PAND. 636.
 angelicae ROND. 616.
 angelicae Scop. 616.
 anglostoma B. B. 333.
 angulata STEIN. 649.
 angulatum B. B. 357.
 angulicornis POK. 636.
 angulicornis ZETT. (*Anth.*)
 676.
 angulicornis ZETT. 333.
 angusta B. B. 233.
 angusta MACQ. (*Chort.*) 741.
 angusta MACQ. (*Mas.*) 282.
 angusta MACQ. (*Phor.*) 348.
 angusta MACQ. (*Tach.*) 347.
 angusta O.-S. 81.
 angusta STEIN. 688.
 angustata R.-D. 473.
 angustata ZETT. 360.
 angustata SCHN. 126.
 angustatus ZETT. 42.
 angusticornis Lw. 373.
 angusticornis RAUZ. 358.
 angusticornis ROND. 134.
 angustifasciata MACQ. 347.
 angustifasciatum MÜLL. 145.
 angustifrons Lw. (*Entom.*)
 133.
 angustifrons Lw. (*Par.*) 2.
 angustifrons MACQ. 515.
 angustifrons MÜLLER. 148.
 angustifrons MEIG. 711.
 angustifrons POEFSCH. 113.

- angustifrons* ROND. (*Chort.*) 711.
angustifrons RD. (*Cyr.*) 436.
angustifrons STROBL. 688.
angustifrons THOMS. 602.
angustigena BECK. 22.
angustipennis BECK. 23.
angustipennis MEIG. 258.
angustiventris MACQ. 202.
angustiventris ZETT. 711.
angustus EGG. 126.
anicula MEIG. 568.
anicula ZETT. 636.
anilis R.-D. 270.
anilis ZETT. 711.
annamites BIG. 57.
annosa ZETT. 616.
annularis CURT. 63.
annulata HARR. 93.
annulata MACQ. (*Coen.*) 736.
annulata MACQ. (*Pip.*) 7.
annulata MEIG. 179.
annulata PAND. 684.
annulatum BIG. 50.
annulatum LW. 148.
annulatus FABR. 116.
annulatus PANZ. 133.
annulatus ZETT. 58.
annulipes MACQ. (*Anth.*) 736.
annulipes MACQ. (*Sphaec.*) 73.
annulipes ZETT. (*Pi.*) 162 et 166.
annulipes ZETT. (*Syr.*) 58.
anomala ZETT. 386.
anomalon SINT. 327.
anomalous ZETT. 518.
antarctica SCHN. 549.
anteambulo HARR. 78.
antennalis ROND. 386.
antennata B. B. 239.
antennata ROND. 304.
antennata ZETT. (*Inth.*) 736.
antennata ZETT. (*Agr.*) 185.
anthinus MEIG. 154.
anthomyiaria ROND. 303.
anthomyia ROND. 684.
anthomyia ROND. 726.
anthomyzoides STORM. 616.
anthophaga BRAUER. 206.
anthophila LW. 565.
anthophila R.-D. (*Del.*) 711.
anthophila R.-D. (*Eglo.*) 711.
anthophila R.-D. (*Ern.*) 214.
anthophila R.-D. (*Mgi.*) 451.
anthophorinus FALL. 99.
anthraciformis MEIG. 38.
anthracina CURT. 180.
anthracina CZERNY. 711.
anthracina MEIG. (*Call.*) 546.
anthracina MEIG. (*Mor.*) 500.
anthracina MEIG. (*Pip.*) 11.
anthracina MEIG. (*Psil.*) 14.
anthracina ZETT. (*Ar.*) 616.
anthracina ZETT. (*Ch.*) 13.
anthracinum MEIG. 327.
anthrax MEIG. 655.
antilopes PALL. 594.
antilopis PALL. 592.
antiopis R.-D. 309.
antiqua LW. 34.
antiqua MEIG. (*Anth.*) 688.
antiqua MEIG. (*Chil.*) 23.
antiqua MEIG. (*Rhac.*) 378.
anxia R.-D. (*Phr.*) 270.
anxia R.-D. (*Sar.*) 482.
anxia ZETT. 651.
apennini ROND. 48.
apenninum ROND. 565.
apenninus PAND. 425.
apenninus ROND. 425.
aperta EGG. 359.
aperta MACQ. 613.
aperta R.-D. 417.
aperta STROBL. 462.
apertus EGG. 425.
aphidiphaga A. COSTA. 14.
apiaria FABR. 609.
apicale ROND. 328.
apicalis LW. 81.
apicalis MACQ. 359.
apicalis MEIG. (*Anth.*) 628.
apicalis MEIG. (*Win.*) 229.
apicalis MEK. 677.
apicalis R.-D. (*All.*) 582.
apicalis R.-D. (*Act.*) 386.
apicalis R.-D. (*Care.*) 235.
apicalis R.-D. (*Er.*) 248.
apicalis R.-D. (*Mgi.*) 420.
apicalis R.-D. (*Myioc.*) 451.
apicalis R.-D. (*Phor.*) 316.
apicalis WIED. 524.
apicalis ZETT. 736.
apicata MEIG. 125.
apicata PAND. 282.
apicata R.-D. 347.
apiaria SCHRANK. 91.
apiarius LATR. 155.
apiforme FABR. 143.
apiforme PANZ. 144.
apiformis CURT. 154.
apiformis FALL. 100.
apiformis DEG. 155.
apiformis MACQ. 124.
apiformis PANZ. 609.
apiformis SCHRANK. 125.
apicora DEG. 93.
appellata R.-D. 270.
appendiculata BIG. 711.
appendiculata KRAM. 490.
appendiculata JACOBS. 572.
appendiculata MACQ. (*Ern.*) 215.
appendiculata MACQ. (*Er.*) 248.
appendiculata MACQ. (*Mel.*) 460.
appendiculata PERR. 565.
appendiculata R.-D. (*Er.*) 248.
appendiculata R.-D. (*Er.*) 248.
appendiculata R.-D. (*Phr.*) 270.
appendiculata R.-D. (*Web.*) 564.
aprica HAL. 656.
aprica MEIG. 294.
aprica R.-D. 270.
aprica ZETT. 321.
apricans R.-D. 309.
apricata R.-D. 473.

- apricatus* R.-D. 207.
aprilina R.-D. 270.
aprilis R.-D. 473.
aprinus PAND. 628.
aptina SCHN. 169.
aquatica R.-D. 669.
aratoria MEIG. 248.
aratrix PAND. 471.
arborea R.-D. (*Phor.*) 316.
arborea R.-D. (*Sar.*) 482.
arbutopum L. 103.
arbutorum SCHRANK. 102.
arcepes PAND. 471.
arctica ZETT. (*Anth.*) 669.
arctica ZETT. (*Er.*) 248.
arcticus ZETT. (*Hel.*) 107, 108.
arcticus ZETT. (*Syr.*) 58.
arcuata MACQ. (*Phor.*) 318.
arcuata MACQ. (*Tach.*) 350.
arcuata MEIG. 181.
arcuata PANZ. 87.
arcuata R.-D. 552.
arcuatum DOX. 78.
arcuatum DEG. 148.
arcuatum L. 145.
arcuatum MIK. 413.
arcuatum PANZ. 147.
arcuatum SCHRANK. 147.
arcuatum ZETT. 505.
arcuatus FALL. 58, 67.
arcuatus MACQ. (*Pem.*) 414.
arcuatus MACQ. (*Psa.*) 151.
arcuatus MEIG. 2.
arcuicinctus WALK. 65.
ardeacea R.-D. (*Comps.*) 309.
ardeacea R.-D. (*Macr.*) 519.
ardeacea R.-D. (*Meig.*) 321.
ardeacea R.-D. (*Phr.*) 270.
ardeacea R.-D. (*Ptych.*) 301.
ardeacea R.-D. (*Sar.*) 482.
ardeacea R.-D. (*Sar.*) 486.
ardeacea R.-D. (*Tach.*) 342.
ardelio R.-D. 347.
ardens MACQ. 248.
ardens R.-D. 539.
arbia R.-D. 323.
arcuria R.-D. (*Fac.*) 716.
arenaria R.-D. (*Pros.*) 298.
arenosa ZETT. 711.
areolaris ROND. 582.
argalis BRAUER. 592.
argentata MACQ. 510.
argentea EGG. 463.
argentea MACQ. 494.
argentea R.-D. 463.
argentifera B. B. 239.
argentifera MEIG. (*Mer.*) 219.
argentifera MEIG. (*Pel.*) 200.
argentifera ZETT. 262.
argentifrons B. B. 494.
argentifrons MACQ. 200.
argentina ZETT. 262.
argula R.-D. 235.
argyrata ZETT. 697.
argyratus STROBL. 627.
argyrata MEIG. 416.
argyrina R.-D. 513.
argyrocephala MACQ. 202.
argyrocephala MEIG. (*Anth.*) 711.
argyrocephala MEIG. 512.
argyrocephala ZETT. 697.
argyropus LW. 133.
argyrostoma SCHRANK. 191.
ariciiformis HOLMGR. 746.
aricina SCHN. 656.
aricioidea R.-D. (*Hel.*) 636.
aricioidea R.-D. (*Pha.*) 616.
arida R.-D. 450.
arimosus BECK. 164.
arion R.-D. 235.
aristalis ROND. (*Act.*) 386.
aristalis ROND. (*Nem.*) 257.
aristata ROND. (*Er.*) 304.
aristata ROND. (*Phor.*) 318.
aristella ROND. 210.
armata MEIG. 656.
armata STROBL. 657.
armillata ZETT. 657.
armipes BECK. 678.
armipes FALL. 650.
armipes ROND. (*Mer.*) 116.
armipes ROND. (*Trich.*) 628.
artogans MACQ. 248.
arrogans R.-D. 533.
arrogans ROND. 696.
arrogans ZETT. 711.
Artemis MEIG. 9.
articulata B. B. 385.
articulata ZETT. 732.
arvensis MEIG. 243.
arvensis R.-D. (*Hyl.*) 688.
arvensis R.-D. (*Lac.*) 533.
arvensis R.-D. (*Phas.*) 574.
arvensis R.-D. (*Phorb.*) 711.
arvensis R.-D. (*Phor.*) 270.
arvensis R.-D. (*Phac.*) 379.
arvensis R.-D. (*Sar.*) 470.
arvensis R.-D. (*Sar.*) 473.
arvensis R.-D. (*Sar.*) 479.
arvensis R.-D. (*Tach.*) 336.
arvicola MEIG. 240.
arvicola R.-D. (*Pel.*) 688.
arvicola R.-D. (*Meig.*) 323.
arvicola R.-D. (*Sar.*) 486.
arvorum MEIG. 491.
arvorum ROND. 479.
arvorum R.-D. (*Er.*) 250.
arvorum R.-D. (*Poll.*) 526.
arvorum R.-D. (*Sar.*) 488.
arvorum R.-D. (*Tach.*) 342.
asella MEIG. 688.
asilica FALL. 123.
asiliformis FABR. 52.
asininus BRAUER. 591.
assimilis FALL. (*Musc.*) 613.
assimilis FALL. (*Phor.*) 315.
assimilis R.-D. 512.
athaliae R.-D. 270.
ater FALL. 628.
ater HARR. 97.
ater MEIG. (*Par.*) 1.
ater MEIG. (*Pip.*) 159.
aterrima FABR. 180.
aterrima MEIG. 667.
aterrima STROBL. 377.
aterrimum VILL. 327.
atomaria ZETT. 711.
atra BLOOME. 15.
atra BRAUER. 211.
atra EGG. 409.

- atra* FABR. 40.
atra FALL. 15.
atra GIMM. 35.
atra LW. 6.
atra MACQ. (*Hel.*) 385.
atra MACQ. (*Phor.*) 172.
atra MEIG. (*Anth.*) 736.
atra MEIG. (*Con.*) 181.
atra MEIG. (*Gon.*) 362.
atra MEIG. (*Plat.*) 186.
atra MEIG. (*Trin.*) 180.
atra R.-D. (*All.*) 580.
atra R.-D. (*Lyrh.*) 396.
atra R.-D. (*Cuc.*) 368.
atra R.-D. (*Cyr.*) 437.
atra R.-D. (*Pion.*) 330.
atra R.-D. (*Er.*) 241.
atra R.-D. (*Mel.*) 461.
atra R.-D. (*Nuc.*) 384.
atra R.-D. (*Sar.*) 486.
atra R.-D. (*Sar.*) 488.
atra ROND. 415.
atra STEIN. 657.
atra VILL. 461.
atra ZETT. 563.
atramentaria MEIG. (*Anth.*) 696.
atramentaria MEIG. (*Pol.*) 529.
atramentaria MEIG. (*Slec.*) 457.
atramentaria ROND. 457.
atramentaria STROBL. 632.
atrata FALL. 408.
atrata MEIG. 405.
atrata R.-D. (*All.*) 581.
atrata R.-D. (*Del.*) 688.
atrata R.-D. (*Hedr.*) 650.
atrata R.-D. (*Meg.*) 323.
atrata R.-D. (*Phry.*) 270.
atrata bis R.-D. (*Phry.*) 270.
atrata R.-D. (*Poll.*) 525.
atrata R.-D. (*Sar.*) 474.
atrata R.-D. (*Sar.*) 474.
atrata R.-D. (*Tach.*) 342.
atrata R.-D. (*Tach.*) 347.
atratella R.-D. 573.
atricans PAND. 636.
atricapilla CIRT. 176.
atricauda ZETT. 697.
atriceps LW. 676.
atriceps ZETT. 550.
atricolor FALL. 700.
atricolor ZETT. 326.
atricula PAND. 396.
atrimana v. ROS. 657.
atripalpis PAND. 636.
atripalpis BEZZI. 612.
atripalpis R.-D. 196.
atripalpis ROND. 318.
atripes BIG. 117.
atripes MEADE. 636.
atripes MEIG. (*Dec.*) 445.
atripes MEIG. (*Macq.*) 404.
atriplivis GOFF. 700.
atritarsis ZETT. 700.
atronteus STROBL. 711.
atropicida PERR. 226.
atropivora ROND. 226
atropos KRAM. 491.
atropos MEIG. 474.
atropos SCHN. 470.
atropos SCHIRANK. 113.
atropurpurea MEIG. 582.
atrox KARSCH. 115.
atrox R.-D. 515.
atram R.-D. 559.
attenuata STEIN. 737.
aucla FALL. 167.
auctinervis ZETT. 711.
auctus ROND. 161.
audax MACQ. 270.
audax R.-D. 342.
audax ROND. 521.
audens MACQ. 342.
augens WALK. 350.
augur R.-D. 342.
aurantiaca BEZZI. 185.
aurantiaca MEIG. 570.
aurata FABR. 24.
aurata R.-D. (*Euph.*) 609.
aurata R.-D. (*Lac.*) 533.
aurata R.-D. (*Lac.*) 539.
aurata R.-D. (*Mgi.*) 421.
aurata R.-D. (*Sar.*) 474.
aurata ROND. 153.
aurata ROSSI. 153.
auratum FALL. 209.
aurca BRÄUER. 217.
aurca EGG. 463.
aurca FALL. 418.
aurca R.-D. (*Clyt.*) 570.
aurca R.-D. (*Er.*) 241.
aurca R.-D. (*Sar.*) 480.
aurca R.-D. (*Tach.*) 342.
aurca R.-D. (*Zen.*) 279.
aurca R.-D. (*Zen.*) 279.
aurca ROND. 138.
aurcola MEIG. 571.
aurcus FABR. 116.
aurcus PANZ. 104.
aurbarbis MEIG. 556.
aurcaudatus BIG. 4.
aurichalcicus ROND. 99.
auriceps MACQ. 572.
auriceps MEIG. (*Gon.*) 363.
auriceps MEIG. (*Ocy.*) 429.
auriceps MEIG. (*Tach.*) 339.
auriceps R.-D. 421.
auriceps ROND. 431.
auricollis MEIG. 59.
auricomus COQUILL. 154.
aurifacies R.-D. (*Er.*) 295.
aurifacies R.-D. (*Te.*) 467.
aurifacies R.-D. (*Maer.*) 519.
aurifacies R.-D. (*Musc.*) 602.
aurifacies R.-D. (*Phry.*) 270.
aurifacies R.-D. (*Sar.*) 474.
aurifacies R.-D. (*Stom.*) 511.
aurifacies R.-D. (*Tach.*) 342.
aurifer LW. 116.
auriflua R.-D. 474.
aurilluae WILF. 370.
aurifrons DUF. 505.
aurifrons MEIG. 329.
aurifrons R.-D. (*Carc.*) 235.
aurifrons R.-D. (*Er.*) 295.
aurifrons R.-D. (*Er.*) 248.
aurifrons R.-D. (*Mel.*) 513.
aurifrons R.-D. (*Phor.*) 307.
aurifrons R.-D. (*Phry.*) 270.

- aurifrons* R.-D. (*Set.*) 508.
aurifrons R.-D. (*Tach.*) 342.
aurifrons T.-T. 518.
aurifrons VILL. 573.
aurigera Egg. 579.
auripila B. B. 288.
auripila MEIG. 24.
auripilus MEIG. 116.
atrocineta R.-D. 270.
atrorubens HART. 304.
atropubescentes LATR. 155.
atrosomata R.-D. 301.
aurulans MEIG. 579.
aurulans PAND. 626.
aurulans R.-D. (*Dion.*) 329.
aurulans R.-D. (*Hel.*) 576.
aurulans R.-D. (*Lispa*) 678.
aurulans R.-D. (*Luc.*) 608.
aurulans SCHIX. 582.
aurulenta MEIG. 297.
aurulenta R.-D. (*Cl.*) 463.
aurulenta R.-D. (*Exc.*) 248.
aurulenta R.-D. (*Nem.*) 258.
aurulenta R.-D. (*Phryg.*) 256.
aurulenta R.-D. (*Phryg.*) 270.
aurulenta bis R.-D. (*Phryg.*) 270.
aurulenta R.-D. (*Wuth.*) 231.
aurulenta R.-D. (*Zen.*) 279.
aurulentum R.-D. 506.
austera MEIG. 326.
austera R.-D. 270.
australis MEIG. 134.
austriaca CZERNY. 616.
austriaca MEIG. (*Pip.*) 9.
austriaca MEIG. (*Rhin.*) 89.
austriaca MEIX. 568.
antissiodorensis R.-D.
autumnalis Beck. 169.
autumnalis DEG. 602.
autumnalis G. T. 191.
autumnalis R.-D. (*Egl.*) 711.
autumnalis R.-D. (*Euph.*) 609.
autumnalis R.-D. (*Hyl.*) 688.
autumnalis R.-D. (*Poll.*) 526.
avida R.-D. 270.
avida Rossi. 116.
avillaris MEIG. 573.
avillaris ZETT. 175.
azurea FALL. 544.
azarca MEIG. 552.
azarca R.-D. (*Luc.*) 533.
azarca R.-D. (*Luc.*) 539.
azarca R.-D. (*Op.*) 550.
Babyssa WALK. 60.
baillans PAND. 507.
badensis Macq. 291.
baicalensis SCHNABL. 628.
balanina PAND. 472.
Balassogloi PORTSCH. (*Pol.*) 202.
Balassog'oi PORT. (*Wolff.*) 493.
balteata HOLMEG. 700.
balteatus DEG. 60.
Balyras WALK. 143.
barbatus COQUEB. 134.
barbata Kow. 186.
barbata Lw. 23.
barbata MEIG. 459.
barbata STEIN. 657.
barbatula ROND. 277.
barbicultrix PAND. 260.
barbiferum PAND. 504.
barbifrons FALL. 60.
barbifrons GIRSCH. 579.
barbifrons SCHIX. 48.
barbifrons VEHR. 58.
barbipes ROND. 737.
barbiventris ROND. 136.
barbiventris ZETT. 684.
bardus HARR. 11.
basalis Lw. (*Chal.*) 166.
basalis Lw. (*Chryg.*) 18.
basalis Lw. (*Eum.*) 134.
basalis MEIG. (*Phas.*) 573.
basalis MEIG. (*Phryg.*) 256.
basalis R.-D. (*Ill.*) 582.
basalis R.-D. (*Phryg.*) 270.
basalis ZETT. 616.
basalis ZETT. 616.
basilaris Macq. 117.
basilaris Macq. (*Coen.*) 737.
basilaris Macq. (*Peg.*) 700.
Banndaueri MEIG. 184.
bautius WALK. 115.
Beckeri FOK. 632.
Beelzebub WIED. 566.
bella Macq. 494.
bella MEIG. 226.
bella R.-D. 609.
Bellardii G.-T. 202.
Bellardii ROND. 54.
bellatrix ZETT. 316.
Bellierella R.-D. (*Pol.*) 312.
Bellierella R.-D. (*Chryg.*) 270.
Bellieri Big. (*Hyp.*) 587.
Bellieri Big. (*Pol.*) 113.
bembicisquax PAND. 508.
bengalensis Macq. 594.
benigna R.-D. 539.
berber Big. 63.
berberidis Lw. 72.
berberidis MEIG. 221.
berberina FABR. 123.
Berecella R.-D. 270.
Bereci R.-D. (*Citr.*) 235.
Bereci R.-D. (*Phor.*) 316.
Bergenstammi Beck. 23.
Bergenstammi MEK. 169.
Berthii Egg. 173.
Bertoi ROND. 456.
Bertolinii ROND. 458.
Bertolinii ROND. 153.
betae CURT. 704.
betae HOLMEG. 688.
betuleti BOUCHE. 616.
Bezzii CORTI. 491.
Bezzii STEIN. 659.
biangulata COOKE. 557.
biarticulata MEIX. 583.
bibax WIED. 636.
bibens MEIG. 291.
bibula WIED. 543.
bicalcarca PAND. 688.
biciliaris PAND. 689.
biciliata R.-D. 519.
bicincta MEIG. (*Gion.*) 362.
bicincta MEIG. (*Phor.*) 308.
bicincta MEIG. (*Stec.*) 156.

- bicincta* VILL. 636.
bicinctum L. 116.
bicinctulata ZETT. 241.
biclanis PAND. 470.
bicolor FABR. 2.
bicolor FALL. 87.
bicolor MACQ. (*Act.*) 386.
bicolor MACQ. (*Chrys.*) 18.
bicolor MACQ. (*Meig.*) 323.
bicolor MEIG. (*Act.*) 387.
bicolor MEIG. (*Aph.*) 176.
bicolor OL. 429.
bicolor PERR. 561.
bicolor POK. 616.
bicolor R.-D. (*Euph.*) 609.
bicolor R.-D. (*Fisch.*) 418.
bicolor R.-D. (*Lac.*) 539.
bicolor R.-D. (*Poll.*) 524.
bicolor R.-D. (*Pyr.*) 606.
bicolor ROND. 136.
bicolor WIED. 700.
bicolor ZETT. 177.
bidens MEIG. 650.
bifasciata B. B. (*Fr.*) 509.
bifasciata FABR. 61.
bifasciata MEIG. (*Phyll.*) 434.
bifasciata MEIG. (*Fr.*) 214.
bifasciata MEIG. (*Xyl.*) 129.
bifasciata MEIG. (*Thel.*) 435.
bifasciata R.-D. 435.
bifasciata SCHRANK. 61.
bifasciata Scop. 95.
bifasciata ZETT. 85.
bifasciatus FABR. 61.
bifasciatus MACQ. 4.
bifasciatus SCHRANK. 61.
bifolia PAND. 699.
Bigotii BECK. 23.
Bigotii G.-T. 146.
Bigotii MACQ. 113.
Bigotii MILL. 387.
Bigolina R.-D. (*Limn.*) 203.
Bigolina R.-D. (*Dev.*) 503.
biguttata CURT. 6.
biguttata MEIG. 331.
biguttata R.-D. 636.
biguttula ZETT. 11.
bijuncta WALK. 211.
bilineata MACQ. 350.
bilineatus CURT. 108.
bilincella ZETT. 737.
Billbergi SCHN. 697.
Billbergi ZETT. 697.
bimaculata HART. 226.
bimaculata MACQ. 559.
bimaculata MEIG. (*Anth.*) 650.
bimaculata MEIG. (*Meig.*) 324.
bimaculata MEIG. (*Pip.*) 8.
bimaculata R.-D. 331.
bimaculatus MACQ. 126.
bimaculatus v. Ros. 42.
bimaculatus WIED. 4.
bina WIED. 701.
binominata VERR. 156.
binotata MACQ. 636.
binotata R.-D. (*Dion.*) 329.
binotata R.-D. (*Meig.*) 321.
binotata R.-D. (*Mas.*) 284.
binotata R.-D. (*My.*) 421.
binotata R.-D. (*Phr.*) 270.
binotata ZETT. (*Anth.*) 636.
binotata ZETT. (*Pip.*) 11.
binotatus STROBL. 626.
biocellata STROBL. 734.
biocellata ZETT. 737.
bipartita MACQ. 350.
bipartita R.-D. 291.
bipilosa POK. 83.
bipunctata CURT. 87.
bipunctata R.-D. (*Hel.*) 636.
bipunctata R.-D. (*Sar.*) 472.
bipunctata STROBL. (*Pip.*) 12.
bipunctata STROBL. (*Pip.*) 6.
bipunctatum MÜLL. 149.
bipunctatus GIBSCH. 59.
bipunctatus MIK. 80.
birufa BIG. 496.
bisbinotata R.-D. 636.
biserialis MACQ. 240.
biserialis PORTSCH. 443.
biseriata MACQ. 510.
bisetosa B. B. (*Cu.*) 367.
bisetosa B. B. (*Fr.*) 240.
bisetosa THOMS. 727.
bisignata MEIG. 321.
bisignata ZETT. 636.
bisinnatus PALMA. 68.
bispinosa PAND. 650.
bispinosa ZETT. 650.
bisulca PAND. 526.
bitineta ROND. 616.
biumbrosa PAND. 711.
bivittata STEIN. 701.
bivittata THOMS. 602.
bizonata ZETT. 248.
blanda FALL. 393.
blanda MEIG. 650.
blanda R.-D. (*Euph.*) 609.
blanda R.-D. (*Lac.*) 539.
blanda R.-D. (*Phor.*) 307.
blonda R.-D. (*Ptych.*) 301.
blonda R.-D. (*Sar.*) 486.
blonda R.-D. (*Tach.*) 342.
blandula R.-D. 342.
blandus HARR. 69.
blattoides MEIN. 183.
blepharipoda B. B. 240.
blepharipteroides DUF. 701.
Blondeli R.-D. (*Deut.*) 503.
Blondeli R.-D. (*Fr.*) 249.
Blondeli R.-D. (*Gou.*) 364.
Blondeli R.-D. (*Pal.*) 313.
Blondeli R.-D. (*Phr.*) 270.
Blondeli R.-D. (*Robr.*) 617.
Blondeli R.-D. (*Sar.*) 483.
Boganiidae ER. 530.
Bohemanni BECK. 169.
Bohemanni ROND. 443.
Bohemani ZETT. 242.
bohemia BECK. 678.
Boisduvalii R.-D. 474.
boleticola ROND. 617.
boletina DUF. 701.
boletina FALL. 186.
boletina v. Ros. 657.
boletorum ROND. 730.
bombiformis FALL. 140.
bombiformis PERR. 124.
bombiformis PORTSCH. 589.
bombivora WULP. 503.

- bombycis* WULF. 354.
bombycivora R.-D. (*Car.*) 235.
bombycivora R.-D. (*Comp.*) 309.
bombycivora R.-D. (*Mas.*) 281.
bombycivora R.-D. (*Phor.*) 318.
bombycum BECK. 354.
bombylans FABR. 143.
bombylans L. 90.
bombylans R.-D. (*Car.*) 237.
bombylans R.-D. (*Gen.*) 363.
bombylans R.-D. (*Nem.*) 223.
bombylans WALK. 219.
bombyliformis F. 105.
bombylius DEG. 609.
Bonapartea ROND. 579.
Bonassi BRAUER. 588.
Bonsdorffi ZETT. 249.
boops THOMS. 682.
borealis FALL. 140.
borealis R.-D. (*Lim.*) 203.
borealis R.-D. (*Meig.*) 321.
borealis R.-D. (*Mer.*) 219.
borealis R.-D. (*Psych.*) 301.
borealis SIEBKE. 109.
borealis STAEG. 107.
borealis ZETT. (*Lr.*) 636.
borealis ZETT. (*Musc.*) 614.
borealis ZETT. (*Wag.*) 373.
boreella ZETT. 185.
borussica STEIN. 650.
Boscii R.-D. 429.
boscorum R.-D. (*Phr.*) 270.
boscorum R.-D. (*Tach.*) 347.
bosnica STROBL. 657.
botanicus WAHLB. 107.
borina R.-D. 602.
borinum SCHWAR. 587.
bovis GMEL. 595.
bovis L. 586.
bovis L. p. p. 594 et 597.
bovistae GIMM. 172.
bracata ROND. 689.
brachialis ROND. 682.
brachycera B. B. 453.
brachycera R.-D. 405.
brachycera EGG. 178.
brachyptera PALMA. 23.
brachyptera PANZ. 573.
brachyptera THOMS. 77.
brachysoma EGG. 23.
brachystoma B. B. 260.
brassicac BOUCHÉ. 712.
brassicac WIED. 727.
brassicaria FABR. 430.
brassicaria PANZ. 47.
brassicaria DON. 131.
Braueri BECK. 23.
Braueri EGG. 61.
Braueri HEND. (*Lom.*) 277.
Braueri HEND. (*Profl.*) 545.
Braueri POK. (*Hom.*) 657.
Braueri POK. (*Lim.*) 669.
Braueri STROBL. (*Cat.*) 560.
Braueri STROBL. (*Met.*) 182.
Braueri STROBL. (*Pip.*) 159.
Brebissonii MACQ. 124.
Bremii MACQ. (*Erv.*) 211.
Bremii MACQ. (*Mas.*) 283.
Bremii MACQ. (*Pach.*) 361.
Bremii MIK. 414.
Bremii SCHIX. 357.
brevicauda ROND. 211.
breviciliata PAND. 443.
breviciliata STROBL. 176.
brevicornis BRAUER. 404.
brevicornis EGG. (*Micr.*) 154.
brevicornis EGG. (*Phil.*) 453.
brevicornis LW. (*Oe.*) 430.
brevicornis LW. (*Orth.*) 15.
brevicornis MACQ. (*Tach.*) 350.
brevicornis STROBL. 712.
brevicornis ZETT. (*Lr.*) 712.
brevicornis ZETT. (*Plc.*) 455.
brevicens EGG. 14.
brevifrons B. B. 240.
brevifrons ROND. 403.
brevifusa PAND. 243.
brevipalpis PORTSCH. 201.
brevipalpis THOMS. 666.
brevipennis BECK. 23.
brevipenne BIG. 504.
brevipennis B. B. 428.
brevipennis LW. 650.
brevipennis MEIG. (*Erv.*) 243.
brevipennis MEIG. (*Lyd.*) 291.
brevipetiolatum MACQ. 328.
brevipila LW. 124.
brevipila PORTSCH. 92.
brevis MACQ. (*Erv.*) 249.
brevis MACQ. (*Mas.*) 283.
brevis ROND. 657.
brevis ROSSL. 328.
breviseria PAND. 379.
breviseta ZETT. 518.
brevivillosa MACQ. 617.
brivia WALK. 696.
bruceas WALK. 350.
brucorum ROND. 334.
brunalis ROND. 632.
brunnea MACQ. 701.
brunnea R.-D. 256.
brunnea R.-D. (*Peg.*) 701.
brunnea R.-D. (*Phyll.*) 701.
brunnea ZETT. 746.
brunneifrons ROND. 684.
brunneifrons ZETT. 684.
brunneifrons ZETT. 689.
brunneipennis A. COSTA. 175.
brunneisquama ZETT. 669.
Brunneri LW. 197.
brunescens ROND. 689.
brunescens ZETT. 689.
brunnibarbis R.-D. 549.
brunnicans R.-D. (*Tr.*) 467.
brunnicans R.-D. (*Pal.*) 313.
brunnicornis MACQ. (*Erv.*) 249.
brunnicornis MACQ. (*Mas.*) 319.
brunnicornis MACQ. (*Phy.*) 462.
brunnicornis R.-D. 224.
brunnicornis R.-D. (*Palus.*) 737.
brunnicornis R.-D. (*Peg.*) 701.
brunnicoesa BECK. 678.

- brunnica* R.-D. (*Hil.*) 514.
brunnica R.-D. (*Linn.*) 659.
brunnica R.-D. (*Lac.*) 541.
brunnica R.-D. (*Mglo.*) 420.
brunnica R.-D. (*Peg.*) 701.
brunnifacies R.-D. 474.
brunnipalpis Macq. 350.
brunnipennis Beck. 23.
brunnipennis Macq. (*Anth.*) 712.
brunnipennis Macq. (*Hydr.*) 650.
brunnipennis Mq. (*Plu.*) 187.
brunnipennis R.-D. 657.
brunnipennis R.-D. 737.
brunnipes R.-D. 757.
brunnis tumis R.-D. (*Ern.*) 211.
brunnisquamis R.-D. (*Sar.*) 486.
buccalis R.-D. (*Macq.*) 404.
buccalis R.-D. (*Poll.*) 526.
buccata B. B. 369.
buccata Fall. 699.
buccata Fall. 699.
buccata Meig. 280 et 321.
buccata PAND. 699.
bucculatus Rond. 61.
bucculoidea R.-D. 286.
bucephala Meig. (*Ill.*) 580.
bucephala Meig. (*Cv.*) 367.
bufonivora Mox. 541.
bulborum Rond. 117.
byzantina Strobl. 16.
cadaverina L. 606.
catelebs Rond. 405.
caelestis R.-D. (*Lac.*) 533.
caelestis R.-D. (*On.*) 550.
caerpicola R.-D. 689.
caerulea Brull. 533.
caerulea Meig. 550.
caerulea R.-D. (*Lac.*) 533.
caerulea R.-D. (*On.*) 552.
caerulea R.-D. (*Phor.*) 530.
caeruleifrons Macq. 350.
caeruleifrons R.-D. 609.
caeruleiventris Zett. 128.
caeruleiviridis Macq. 539.
caeruleonigra Perr. 319.
caeruleoscens Lw. 117.
caeruleoscens Macq. (*Cart.*) 690.
caeruleoscens Macq. (*Peg.*) 399.
caeruleoscens Macq. (*Er.*) 249.
caeruleoscens Macq. (*Liog.*) 17.
caeruleoscens Macq. (*Pip.*) 6.
caeruleoscens Macq. (*Poll.*) 526.
caeruleoscens Macq. (*Tr.*) 439.
caeruleoscens Mg. (*Chil.*) 23.
caeruleoscens Meig. (*Lac.*) 539.
caeruleoscens Meig. (*Tr.*) 438.
caeruleoscens R.-D. (*All.*) 581.
caeruleoscens R.-D. (*Pal.*) 312.
caeruleoscens Strobl. 712.
caeruleoscens Wahlbg. 599.
caeruleoscens Zett. 474.
caesar L. 532.
caesar O. Fabr. 530.
caesarian Meig. 608.
caesia Bezzl. 636.
caesia Fall. 216.
caesia Macq. (*Chort.*) 712.
caesia Macq. (*Hydr.*) 684.
caesia Macq. (*Hyl.*) 689.
caesia Macq. (*Spil.*) 689.
caesia Meig. (*Lispa*) 678.
caesia Meig. (*Musca*) 614.
caesia R.-D. (*Er.*) 249.
caesia R.-D. (*Lac.*) 542.
caesia R.-D. (*Mel.*) 510.
caesia R.-D. (*Musc.*) 614.
caesia R.-D. (*Phr.*) 270.
caesia R.-D. (*Poll.*) 526.
caesia R.-D. (*Poll.*) 526.
caesia R.-D. (*Plyc.*) 300.
caesia R.-D. (*Sar.*) 474.
caesia R.-D. (*Sar.*) 482.
caesia R.-D. (*Tach.*) 342.
caesia Stein. 701.
caesifrons Macq. (*Phor.*) 316.
caesifrons Macq. (*Tach.*) 350.
cajae R.-D. 310.
calcarata Portsch. 669.
calceata Meig. (*Anth.*) 701.
calceata Meig. (*Pip.*) 12.
calceata Rond. 636.
calceatus v. Ros. 159.
calceolata Macq. 73.
calceolata Zett. 701.
calcitrans L. 611.
calcium R.-D. 451.
calens R.-D. 608.
calida R.-D. 607.
calidula R.-D. (*Dus.*) 605.
calidula R.-D. (*Lac.*) 539.
calicindrata Rond. 442.
caliginosa Meig. 169.
callicroa R.-D. 609.
callida Meig. 411.
callimorphae R.-D. 235.
calliste B. B. 472.
callopus Lw. 521.
callosum Harr. 146.
calopus Lw. 61.
calthae R.-D. 712.
calyptrata Zett. 701.
Camerani G.-T. 197.
caminiaria Meig. 498.
camivarium Walk. 328.
campephaga R.-D. 247.
campestris Fall. (*Mel.*) 510.
campestris Fall. (*Pip.*) 7.
campestris Latr. 159.
campestris Meig. (*Er.*) 102.
campestris Meig. (*Rhi.*) 89.
campestris R.-D. (*Egle*) 727.
campestris R.-D. (*Er.*) 295.
campestris R.-D. (*Er.*) 241.
campestris R.-D. (*Er.*) 249.
campestris R.-D. (*Te.*) 468.
campestris R.-D. (*Te.*) 467.
campestris R.-D. (*Hist.*) 359.
campestris R.-D. (*Linn.*) 737.
campestris R.-D. (*Lac.*) 539.
campestris R.-D. (*Lyd.*) 291.
campestris R.-D. (*Mas.*) 281.

- campestris* R.-D. (*Mei.*) 322.
campestris R.-D. (*Musc.*) 602.
campestris R.-D. (*Myd.*) 3637.
campestris R.-D. (*Myi.*) 421.
campestris R.-D. (*Nem.*) 258.
campestris R.-D. (*On.*) 552.
campestris R.-D. (*Pha.*) 574.
campestris R.-D. (*Phor.*) 320.
campestris R.-D. (*Ptych.*) 302.
campestris R.-D. (*Sar.*) 482.
campestris R.-D. (*Sar.*) 482.
campestris R.-D. (*Sar.*) 483.
campestris R.-D. (*Tach.*) 342.
campicola R.-D. (*Del.*) 712.
campicola R.-D. (*Musc.*) 602.
campicola R.-D. (*Pal.*) 312.
camporum MEIG. 109.
camporum R.-D. (*Phr.*) 270.
camporum R.-D. (*Sar.*) 486.
camporum R.-D. (*Tach.*) 347.
cana MACQ. 712.
cana MEIG. 569.
cana PAND. 570.
cana STROBL. 568.
canariense MACQ. 151.
canariensis BECK. 681.
canariensis MACQ. 191.
candens STROBL. 689.
candens ZETT. 712.
candicans KOW. 678.
candicans PAND. 617.
candicans VILL. 669.
canesceus MACQ. 249.
canesceus R.-D. 347.
canesceus ZETT. 712.
canicularis L. 657.
canicularis PANZ. 24.
canicularis ZETT. 665.
caninum FABR. 446.
cassipilus ROND. 117.
cannabinus SCOP. 60.
canora R.-D. 235.
cantans R.-D. 235.
capax R.-D. 343.
capensis B. B. 549.
capensis R.-D. 368.
capillata ROND. 240.
capitata DEG. 363.
capitata FALL. 363 et 364.
capitata MACQ. 368.
capitata R.-D. 365.
capitata WALK. 364.
capreoli HEX. 557.
capucina ZETT. (*Anth.*) 701.
capucina ZETT. (*Ar.*) 637.
carbo SCHIX. 633.
carbonaria MG. (*Anth.*) 658.
carbonaria MEIG. (*Wag.*) 376.
carbonaria EGG. 24.
carbonaria PAND. 375.
carbonaria PANZ. 373.
carbonaria R.-D. (*All.*) 583.
carbonaria R.-D. (*Macq.*) 404.
carbonaria ROND. 658.
carbonaria STROBL. 658.
carbonaria ZETT. (*Aph.*) 178.
carbonaria ZETT. (*Pip.*) 11.
carbonarius ZETT. (*Cn.*) 13.
carbonarium MEIG. 13.
carbonella SCHIX. 669.
carbonella STEIN. 658.
carbonella ZETT. 669.
carbunculus R.-D. 533.
Carceli R.-D. (*Adm.*) 394.
Carceli R.-D. (*Nyg.*) 497.
Carceli R.-D. (*Phr.*) 270.
Carceli R.-D. (*Sar.*) 474.
Carceli R.-D. (*Sar.*) 486.
cardui MEADE. 690.
cardui MEIG. 689.
cardui SCHIX. 690.
carmaria DEG. 549.
carmaria L. 472.
carmaria SCOP. 549.
carriora FABR. 549.
carinata LW. 432.
carinata ROND. 432.
carinatus VERR. 160.
carinifrons FALL. 450.
carinifrons MEIG. 451.
carinifrons ZETT. 171.
carinthiaca STROBL. 380.
carinthiacus LATZ. 58.
caruifer R.-D. 602.
Carpentieri GOB. 172.
carthaginiensis BISC. 357.
cassidae DUF. 330.
casta ROND. (*Eud.*) 197.
casta ROND. (*Lyd.*) 289.
castaneiventris BIG. 34.
Castellani GUER. 225.
catocalae R.-D. 231.
caucasica PORTSCH. (*Sl.*) 456.
caucasica PORTSCH. (*Vol.*) 91.
caucasicus PORT. (*Er.*) 103.
caucasicus PORTSCH. (*Mer.*) 116.
caudata ROND. 262.
caudata ZETT. 684.
caudigera ROND. 283.
cauta MACQ. 235.
cauta R.-D. (*Cyp.*) 437.
cauta R.-D. (*Lyd.*) 291.
cauta R.-D. (*Phr.*) 271.
cautum HARR. 146.
cavigena PAND. 289.
cavilimbus ROND. 134.
cecropiae RL. 231.
celer MACQ. 347.
celer R.-D. 347.
celer MEIG. 561.
celer ROND. 403.
cenisia G.-T. 192.
ceporum MEIG. 690.
ceporum MEADE. 690.
cephalotes BOSC. 160.
cerasi R.-D. 701.
Cerceis WALK. 350.
cercidis R.-D. 508.
cerinum HARR. 559.
certans WALK. 350.
cerri CLARK. 555.
cerri SCHIRANK. 556.
cerrina SCHIRANK. 529.
Cerrini BIG. 362.
cespitem MACQ. 283.
chaetalis R.-D. 483.
chaetogastra ROND. 397.
chaetolyga ROND. 381.
chaetoneura B. B. 496.

- chaetopodus* WILL. 46.
chalconota MEIG. 404.
chalinata PAND. 617.
chalybea R.-D. 609.
chalybeata MEIG. (*Chil.*) 24.
chalybeata MEIG. (*Chryss.*) 18.
chalybeata MEIG. (*Min.*) 409.
chalybeata MEIG. (*Pip.*) 8.
chalybeata ZETT. 18.
chalybeus MEIG. 116.
charcoriensis SCHNABL. 637.
cheloniae ROND. 234.
chenopodii ROND. 701.
chloris HAL. 535.
chloris MEIG. 24.
chloris VERR. 27.
chlorogastra BECK. 169.
chlorus B. B. 408.
chlorus WALK. 27, 36.
chorea R.-D. (*Ill.*) 583.
chorea R.-D. (*Anth.*) 727.
chorea R.-D. (*Del.*) 713.
Christophori BECK. 25.
chrysalidarum ROND. 334.
chrysellæ R.-D. (*Luc.*) 533.
chrysellæ R.-D. (*Luc.*) 539.
chrysellæ R.-D. (*Tach.*) 347.
chrysisfacies R.-D. 474.
chrysigastris R.-D. 533.
chrysinæ R.-D. 213.
chrysis R.-D. 533.
chrysites EGG. 126.
chrysocephala DEG. 554.
chrysocephala R.-D. 611.
chrysocoma MEIG. 25.
chrysocoma WALK. 29.
chrysocoma WEY. 21.
chrysoptani TOWNS. 241.
chrysoptalis ROND. 150.
chrysorrhoea R.-D. 609.
chrysorrhoea MEIG. 545.
chrysozona GIMM. 25.
chryzura R.-D. 609.
ciliaris STROEL. 640.
ciliaris ZETT. 405.
ciliata FABR. 650.
ciliata MACQ. (*Act.*) 387.
ciliata MACQ. (*Mus.*) 283.
ciliata MACQ. (*St.*) 221.
ciliata R.-D. (*Hist.*) 359.
ciliata R.-D. (*Phr.*) 271.
ciliata STEIN. 658.
ciliata T.-T. 231.
ciliata WALK. 713.
ciliata ZETT. 175.
ciliatocosta ZETT. (*Anth.*) 637.
ciliatocosta ZETT. (*Ar.*) 690.
ciliatula R.-D. 474.
ciliatus BIG. 42.
ciliifurca ROND. (*Chort.*) 713.
ciliifurca ROND. (*Hom.*) 658.
ciliifurca ROND. (*Winkl.*) 229.
ciliger LW. 46.
ciligeræ R.-D. (*Brach.*) 503.
ciligeræ R.-D. (*Lyph.*) 221.
ciligeræ R.-D. (*Mgi.*) 421.
ciligeræ R.-D. (*Syn.*) 561.
ciligeræ R.-D. (*Zen.*) 279.
ciliosa PAND. 699.
cilipeda ROND. (*Go.*) 364.
cilipeda ROND. (*Pal.*) 312.
cilipennis MACQ. 458.
cilipes HAL. 667.
cilipes MEIG. 569.
cilitarsis LW. (*Eum.*) 135.
cilitarsis LW. (*Lispa*) 678.
cilitibia ROND. 230.
cimbiciformis FALL. 114.
cimbiciformis PORTSCH. 144.
cincinna ROND. 240.
cincta B. B. 453.
cincta MEIG. 289.
cincta MÜLL. 433.
cincta R.-D. 445.
cincta ZETT. 617.
cinctella R.-D. 539.
cinctellus ZETT. 62.
cinctella ROND. 734.
cinctinervis ZETT. 617.
cinctipes ZETT. 59.
cinctus FALL. 62.
cinctus HARR. 104.
cinctus SCHN. et EGG. 3.
cincreraria R.-D. 279.
cinceraria ROND. 303.
cinceraria ZETT. (*Cocn.*) 737.
cinceraria ZETT. (*Mgd.*) 637.
cincerascens B. B. 449.
cincerascens MEIG. 690.
cincerascens R.-D. (*Del.*) 690.
cincerascens R.-D. (*Er.*) 249.
cincerascens R.-D. (*Mgd.*) 637.
cincerascens R.-D. (*Mgi.*) 420.
cincerascens ROND. 367.
cincerascens WIED. 614.
cincerea BREM. 493.
cincerea FABR. 580.
cincerea FALL. (*Musc.*) 690.
cincerea FALL. (*Musc.*) 727.
cincerea FALL. (*Vir.*) 326.
cincerea LATR. 382.
cincerea MACQ. (*Act.*) 387.
cincerea MACQ. (*Dir.*) 459.
cincerea MACQ. (*Mei.*) 322.
cincerea MACQ. (*Phor.*) 319.
cincerea MACQ. (*Tam.*) 568.
cincerea MEADE. (*Chort.*) 714.
cincerea MEADE. (*Hyl.*) 690.
cincerea MEADE. (*Ses.*) 416.
cincerea MEIG. (*Bu.*) 382.
cincerea MEIG. (*Er.*) 631.
cincerea MEIG. (*Zen.*) 452.
cincerea MIK. 334.
cincerea PAND. (*Chort.*) 714.
cincerea PAND. (*Linn.*) 632.
cincerea PERR. 394.
cincerea R.-D. (*Cuc.*) 669.
cincerea R.-D. (*Dec.*) 446.
cincerea R.-D. (*Ery.*) 296.
cincerea R.-D. (*Eryt.*) 380.
cincerea R.-D. (*Er.*) 249.
cincerea R.-D. (*Hyl.*) 651.
cincerea R.-D. (*Leuc.*) 669.
cincerea R.-D. (*Linn.*) 737.
cincerea R.-D. (*Lyd.*) 291.
cincerea R.-D. (*Lyd.*) 291.
cincerea R.-D. (*Musc.*) 549.
cincerea R.-D. (*Met.*) 510.
cincerea R.-D. (*Mgi.*) 420.

- cinerea* R.-D. (*Mgi.*) 421.
cinerea R.-D. (*Ner.*) 714.
cinerea R.-D. (*Phor.*) 307.
cinerea R.-D. (*Phor.*) 271.
cinerea R.-D. (*Poll.*) 526.
cinerea R.-D. (*Sar.*) 486.
cinerea R.-D. (*Stom.*) 523.
cinerea R.-D. (*Tach.*) 348.
cinerea R.-D. (*Tc.*) 468.
cinerea R.-D. (*Wöhl.*) 231.
cinerea R.-D. (*Zen.*) 279.
cinerea v. Ros. 526.
cinerea WAHLE. 88.
cinerea ZETT. (*Ag.*) 185.
cinerea ZETT. (*Ar.*) 713.
cinereicollis R.-D. 239.
cinereifrons R.-D. 519.
cinereiventris ZETT. 628.
cinerella FALL. 714.
cinerella FALL. *var.* β 727.
cinerella MEADE. 690.
cinerella MEIG. 690.
cinerella R.-D. (*Mei.*) 324.
cinerella R.-D. (*Met.*) 512.
cinerella R.-D. (*Pha.*) 573.
cinerella R.-D. (*Phor.*) 256.
cinerella R.-D. (*Phor.*) 271.
cinerella R.-D. (*Sph.*) 516.
cinerella SCHN. 690.
cinereus FABR. 116.
cinereus MACQ. 207.
cinerosa PAND. 690.
cinerosa ZETT. 690.
cingulata R.-D. 388.
cingulata ZETT. 350.
cingulatum EGG. 49.
cingulatus VOLL. 96.
cingulipes ZETT. 737.
cinifera BECK. 678.
circumflera ZETT. 442.
cirrhata R.-D. 504.
cisalpinum ROND. 147.
cita MACQ. 249.
cita R.-D. (*Er.*) 248.
cita R.-D. (*Xem.*) 258.
cita R.-D. (*Phor.*) 271.
cita R.-D. (*Tach.*) 343.
citreiformis BECK. 174.
citrofasciatum DEG. 78.
civilis PAND. 335.
civilis ROND. 349.
clara MEIG. 637.
claripennis R.-D. (*Act.*) 387.
claripennis R.-D. (*All.*) 581.
claripennis R.-D. (*Ar.*) 637.
claripennis R.-D. (*Car.*) 235.
claripennis R.-D. (*Eggl.*) 714.
claripennis R.-D. (*Eup.*) 617.
claripennis R.-D. (*Helina*) 637.
claripennis R.-D. (*Hcl.*) 576.
claripennis R.-D. (*Hel.*) 497.
claripennis R.-D. (*Hydr.*) 651.
claripennis R.-D. (*Meg.*) 498.
claripennis R.-D. (*Mor.*) 500.
claripennis R.-D. (*Myd.*) 637.
claripennis R.-D. (*On.*) 552.
claripennis R.-D. (*Phorbia*) 714.
claripennis R.-D. (*Phor.*) 271.
claripennis R.-D. (*Phy.*) 462.
claripennis R.-D. (*Sar.*) 474.
claripennis R.-D. (*Sar.*) 474.
claripennis R.-D. (*Sar.*) 479.
claripennis R.-D. (*Sar.*) 483.
claripennis R.-D. (*Stom.*) 611.
claripennis R.-D. (*Tc.*) 468.
claripennis R.-D. (*Tach.*) 343.
claripennis R.-D. (*Thcl.*) 435.
claripennis SCHN. 453.
Clarkii LEACH. 596.
clathrata MEIG. 477.
claudus VILL. 117.
clausa B. B. 285.
clausa MACQ. (*Macq.*) 405.
clausa MACQ. (*On.*) 551.
clausa MACQ. (*Tach.*) 348.
clausa R.-D. (*Buc.*) 381.
clausa R.-D. (*Cyp.*) 436.
clausa R.-D. (*Plg.*) 302.
clausa SCHN. 459.
clausa ZETT. 317.
clausicella ROND. 405.
clausina ROND. 324.
clausa ROND. 206.
clavata Scop. 87.
clavatus BECK. 160.
clavellariae B. B. 240.
clavicornis Coq. 158.
clavicornis FABR. 157.
clavicornis SCHELL. 157.
clavipalpis PAND. 240.
clavipes FABR. 117.
clavilimbus ROND. 134.
clavulus PAND. 477.
clunifera ZETT. 701.
clunipes FALL. 83.
clymene WALK. 350.
clypeatus MEIG. 43.
clypeatus ZETT. 46.
coadunatus ROND. 4.
coalescens GEOFFR. 151.
coarctata FALL. 690.
coarctata Lw. 429.
coarctata R.-D. 249.
coarctatus PANZ. 80.
coarctatus SCHUMM. 48.
coccinea MEIG. 429.
coccinea R.-D. 539.
cochlearia BECK. 678.
cochlearis PAND. 492.
coeneteriorum FALL. 30.
coeneteriorum L. 19.
coenosa R.-D. 670.
coenotaphii MEIG. 18.
coffana R.-D. 529.
cognata EGG. 416.
cognata MEIG. 550.
cognata R.-D. (*Lac.*) 539.
cognata R.-D. (*Phor.*) 271.
cognata R.-D. (*Phyc.*) 301.
cognata ROND. (*On.*) 368.
cognata ROND. (*Er.*) 240.
cognata ROND. (*Sar.*) 478.
cognata SCHN. 395.
colensis MACQ. 249.
colcopteraum BRISCHK. 178.
colcoptata LATR. 578.
collaris FALL. 398.

- collaris* MEIG. 499.
collecta WALK. 350.
collina ROND. 426.
collina WALK. 637.
collinaris R.-D. (*Hel.*) 576.
collinaris R.-D. (*Sar.*) 474.
collinaris R.-D. (*Sar.*) 480.
 Collini VERR. 185.
collinum ROND. 151.
coloratus BECK. 160.
coloratus Scop. 474.
columbina MEIG. 521.
comata ROND. 240.
comitata BECK. 678.
comitata WALK. 350.
commendata R.-D. 483.
commissa WALK. 222.
commixta ZETT. 243.
commota R.-D. 271.
commune WALK. 666.
communis MEADE. 637.
communis R.-D. (*Car.*) 737.
communis R.-D. (*Eggl.*) 714.
communis R.-D. (*Myd.*) 637.
comosa WALK. 350.
compar R.-D. (*Luc.*) 533.
compar R.-D. (*Sar.*) 474.
compar R.-D. (*Tach.*) 343.
compeditus WIED. 3.
complicatus BECK. 46.
compos R.-D. 271.
compositarum VERR. 62.
compressa FABR. 433.
compressa SCHELL. 433.
compressicanda STEIN. 737.
compta MEIG. 203.
compta R.-D. 271.
compuncta WALK. 732.
compuncta WIED. 670.
computa WALK. 350.
comta FALL. 203.
comta MEIG. 617.
comtus HARR. 51.
comtus SCHN. 207.
concaua MACQ. 249.
concauus SAY. 70.
concessa R.-D. 271.
concinna GERM. 521.
concinna MEIG. 169.
concinna R.-D. 539.
concinna MEIG. 309.
concinuus MEIG. 62.
concolor CZERNY. 637.
concolor R.-D. (*Er.*) 296.
concolor R.-D. (*Mei.*) 324.
concolor R.-D. (*Mor.*) 600.
concolor R.-D. (*Musc.*) 614.
concolor R.-D. (*Phr.*) 271.
concolor R.-D. (*Sar.*) 479.
concolor R.-D. (*St.*) 228.
concolor WALK. 50.
concomitans PAND. 714.
conducta R.-D. (*Phor.*) 320.
conducta R.-D. (*Phr.*) 271.
conducta WALK. 211.
confecta WALK. 350.
confidella ZETT. 714.
confinis BECK. 25.
confinis FALL. 241.
confinis MEIG. 637.
confinis ZETT. (*Syr.*) 72.
confinis ZETT. (*Xyl.*) 131.
conformis FALL. 701.
conformis MEADE. 701.
conformis PAND. 701.
confundens ROND. 242.
confusa R.-D. 271.
confusus EGG. 58.
confusus HARR. 47.
confusus VERR. 160.
congenerata PAND. 714.
congenita ZETT. 411.
congenitata ZETT. 637.
congregata ROND. 423.
congrua PAND. 478.
conica FALL. (*Hyd.*) 691.
conica FALL. (*Sphce.*) 515.
conica PANZ. 88.
conica R.-D. (*Maer.*) 519.
conica R.-D. (*Sar.*) 474.
conica R.-D. (*Zen.*) 452.
conica WED. 684.
conicus PANZ. 154.
coniformis STEIN. 637.
conifrons ZETT. 714.
conjugata ROND. (*Eud.*) 197.
conjugata ROND. (*Psi.*) 15.
conjugata ZETT. 211.
conjuncta MACQ. 223.
conjuncta MEIG. 691.
conjuncta R.-D. 526.
conjuncta WALK. 218.
conjungens WALK. 64.
connexa BOH. 186.
connexa MEIG. 306.
connexa R.-D. 324.
connivers ZETT. 211.
conopeus ZELL. 80.
conopoides L. 156.
conops BECK. 25.
conopsca ROSSI. 157.
conopsceus FABR. 80.
conopsoides L. 156.
conostoma WILL. 111.
consanguinea Lw. (*Lispa*) 678.
consanguinea Lw. (*Pho.*) 172.
consanguinea MACQ. 249.
consanguinea ROND. 478.
conscia R.-D. 271.
consecuta R.-D. 271.
consentanea R.-D. 271.
consimilis FALL. 637.
consimilis MALM. 110.
consimilis R.-D. 382.
consimilis ZETT. 637.
consisto HARR. 63.
consobrina MACQ. (*Luc.*) 533.
consobrina MACQ. (*Mei.*) 322.
consobrina MEIG. 211.
consobrina R.-D. (*Luc.*) 539.
consobrina R.-D. (*Phr.*) 271.
consobrina R.-D. (*Sar.*) 486.
consobrina ROND. (*Sar.*) 478.
consobrina ZETT. (*Anth.*) 701.
consobrina ZETT. (*Ar.*) 617.
consobrina ZETT. (*Ern.*) 216.
consobrina ZETT. (*Plat.*) 186.
consobrinus MACQ. 207.
consors ZETT. 637.

- conspersa* MEIG. 260.
consparsata HOLMGR. 670.
constans MEIG. 118.
constans ROSSI. 117.
constans WALK. 350.
constantina MACQ. 658.
Contarinii ROND. 505.
contempta R.-D. (*Poll.*) 526.
contempta R.-D. (*Sar.*) 483.
contempta WALK. 350.
contenta R.-D. (*Phor.*) 271.
contenta R.-D. (*Tach.*) 343.
contigua MACQ. 73.
contigua R.-D. 483.
continua PANZ. 570.
continua R.-D. 602.
continuus LW. 107.
contracta WALK. 212.
contractifrons ZETT. 670.
contraria R.-D. 343.
convergens PAND. 516.
convexa ZETT. 561.
convexifrons PAND. 301.
convexifrons THOMS. 602.
convexifrons ZETT. 400.
convexinervis MACQ. (*Hyp.*) 397.
convexinervis MACQ. (*Met.*) 511.
convexiuscula KOW. 678.
convexula ZETT. 516.
convicta R.-D. 296.
coracina LW. 658.
coracina MEIG. 304.
coracina ZETT. 26.
cordifrons ZETT. 714.
cordia WALK. 714.
corinna MEIG. 410.
corinna R.-D. 583.
corinnae B.-C. 589.
cornicina FABR. 608.
cornicina MEIG. 542.
cornuta FABR. 637.
cornuta ZETT. 242.
corollae FABR. 62.
corollata PAND. 637.
coronata BECK. 174.
coronata HOLMGR. 714.
coronata ZETT. 685.
coronatus ROND. 53.
correcta BECK. 26.
corsica B. B. (*Cyl.*) 427.
corsica B. B. (*Gon.*) 362.
corsica B. B. (*Trich.*) 354.
corsicana B. B. 330.
corusca MEIG. 409.
corusca R.-D. (*Euph.*) 609.
corusca R.-D. (*Lac.*) 539.
corusca R.-D. (*Phor.*) 530.
corusca WALK. 405.
corvina FABR. 602.
corvina ♂ LW. 696.
corvina ♀ LW. 697.
corvina MEIG. 453.
corvina v. RÖD. 501.
corvina VERR. 658.
corydon HARR. 29.
corylana GMM. 212.
costale MEIG. 148.
costalis LW. 428.
costalis v. ROS. 175.
costata FALL. 374.
costata MEIG. 735.
costata ZETT. 175.
costatum PANZ. 559.
cothurnata LW. 658.
cothurnata ROND. 638.
covalis R.-D. (*Lin.*) 204.
covalis R.-D. (*Phor.*) 319.
crabroniformis FABR. 141.
crassa LW. 430.
crassicauda STEIN. 701.
crassicornis MEIG. (*Ich.*) 387.
crassicornis MEIG. (*Phor.*) 170.
crassicornis PERR. 510.
crassicornis R.-D. 231.
crassicosta STROBL. 175.
crassimargo PAND. 478.
crassinervis ROND. 175.
craspedipis MACQ. 478.
crassipennis DYM. 578.
crassipennis FABR. 573.
crassipes SCHRANK. 87.
crassipes WAHLB. 130.
crassirostris MEIG. 691.
crassirostris STEIN. 603.
crassisetula LW. 26.
crassisetula ROND. 261.
crassistylum MACQ. 249.
crassitarsis A. COSTA. 134.
crassitarsis ZETT. 222.
crassiuscula LW. 678.
crataegaeellae R.-D. 283.
crenatus MACQ. 63.
crepusculi B. B. 197.
crinita ROND. 255.
crinitarsata STEIN. 714.
criniventris ZETT. (*Anth.*) 691.
criniventris ZETT. (*Ar.*) 691.
Crisia WALK. 350.
crystalloides SCHIN. 115.
cristata FABR. 381.
cristata MEIG. 443.
cristata WALK. 443.
cristata SCHIN. 450.
cristata ZETT. 443.
cristatus SCHUMM. 45.
cristatus ZETT. 628.
crocata R.-D. 480.
croccinana PAND. 737.
croccipalpis JAENN. 549.
cruciatum BIG. 50.
crucigerus ZETT. 410.
crudelis R.-D. 516.
crucenta PAND. 481.
cruentata MEIG. 478.
cruentata ROND. 230.
cruentatus GEOFFR. 2.
cryptarum FABR. 100.
cryptarum PANZ. 106.
ctenocnema KOW. 726.
cubitalis BECK. 175.
cucullans PAND. 478.
cucullata R.-D. (*Rond.*) 461.
cucullata R.-D. (*Sor.*) 486.
cucullatae R.-D. (*Ban.*) 358.
cucullatae R.-D. (*Es.*) 219.
cucullatae R.-D. (*Hist.*) 359.
cucullatae R.-D. (*Mos.*) 282.
cucullatae R.-D. (*Phor.*) 316.

- cauciliac* R.-D. (*Serv.*) 190.
cauciliac R.-D. (*Wagn.*) 375.
caulinum POK. 628.
cultellata PAND. 478.
cunctans MEIG. 374.
cunctans R.-D. (*Euph.*) 609.
cunctans R.-D. (*Stom.*) 611.
cunctans SCHIX. 628.
cunctans WALK. 651.
cunctata R.-D. (*Phor.*) 271.
cunctata R.-D. (*Tach.*) 343.
cuneicornis ZETT. (*Ar.*) 714.
cuneicornis ZETT. (*Vo.*) 370
 et 350.
cuticularis ROND. 701.
cupraria MACQ. 18.
cuprea BIG. 521.
cuprea MACQ. (*Chort.*) 714.
cuprea MACQ. (*Musc.*) 603.
cuprea R.-D. (*Er.*) 249.
cuprea R.-D. (*Lac.*) 533.
cuprea R.-D. (*Lyd.*) 222.
cuprea R.-D. (*Musc.*) 607.
cuprea R.-D. (*On.*) 550.
cuprea R.-D. (*Phor.*) 530.
cuprea SCOP. 138.
cupreifrons WALK. 714.
cupreus AMST. 59.
cuprina COQ. 128.
cuprorhatus WIED. 97.
curialis MEIG. 38.
curiensis MACQ. 249.
cursitana R.-D. 474.
cursitans ROND. 227.
cursoria R.-D. (*Deg.*) 400.
cursoria R.-D. (*Er.*) 249.
cursoria R.-D. (*Lyd.*) 291.
cursoria R.-D. (*Sar.*) 474.
cursoria R.-D. (*Sar.*) 479.
cursoria R.-D. (*Tach.*) 343.
cursoria R.-D. (*Tach.*) 343.
cursoriam R.-D. 506.
curtinusuta PAND. 714.
curvicauda FALL. 563.
curvicauda ZETT. 715.
curvicornis MACQ. 261.
curvicornis MEIG. 388.
curvinervis BECK. (*Ch.*) 26.
curvinervis BECK. (*Pho.*)
 170.
curvinervis BIG. 585.
curvinervis PORTSCH. 319.
curvinervis R.-D. 420.
curvinervis STROBL. 6.
curvinervis ZETT. 370.
curvipes BOIL. 63.
curvipes FALL. 651.
curvipes GIEL. 117.
curvipes LW. 128.
curvipes MACQ. 600.
curvipes PORTSCH. 651.
curvipes ZETT. 451.
curvitibia BECK. 26.
cyanca R.-D. (*Lac.*) 533.
cyanca R.-D. (*On.*) 552.
cyanca ZETT. 550.
cyaneifrons R.-D. 609.
cyarella MEIG. 607.
cyarella PAND. 607.
cyarella R.-D. 539.
cyaneoviridis R.-D. 609.
cyanescens LW. 521.
cyanescens R.-D. (*Poll.*) 527.
cyanescens R.-D. (*Tach.*) 343.
cyanea MACQ. 311.
cyaneus MÜLL. 42.
cyanicolor ZETT. 607.
cyathisans PAND. 470.
cylindracea ZETT. 397.
cylindrica DEG. 430.
cylindrica FABR. 429.
cylindrica FALL. (*Oc.*) 428.
cylindrica FALL. (*Phyll.*) 434.
cylindrica FALL. (*Phy.*) 377.
cylindrica MACQ. 283.
cylindrica MEIG. (*Oc.*) 431.
cylindrica PAND. 393.
cylindrica R.-D. (*Oly.*) 570.
cylindrica R.-D. (*Deg.*) 398.
cylindrica R.-D. (*Dim.*) 450.
cylindrica R.-D. (*Eg.*) 585.
cylindrica R.-D. (*Lac.*) 533.
cylindrica R.-D. (*Lyd.*) 291.
cylindrica R.-D. (*Mei.*) 322.
cylindrica R.-D. (*Phor.*) 316.
cylindrica R.-D. (*Phy.*) 462.
cylindrica R.-D. (*Rhac.*) 379.
cylindrica SAY. 73.
cylindroidea MACQ. 398.
cylindrus PAND. 737.
cynocephala LW. 26.
cyprica ROND. 508.
cyrrhata R.-D. 299.
cytoncurina ZETT. (*Ar.*) 651.
cytoncurina ZETT. (*Ta.*) 350.
Dahlbomi ZETT. 184.
Dahli BECK. 175.
daicles WALK. 638.
dalcarlica ZETT. 319.
Dalii MEADE. 394.
dalmatica R.-D. 570.
dalmatina SCHIX. 478.
damae B. B. 589.
Damianitschi SCHIX. 701.
Danilewskyi PORTSCH. 192.
dasy-poda PORTSCH. 525.
datanae T.-T. 231.
dauci MEIG. 181.
dealbata ZETT. 737.
debilis HAL. 182.
debilis ROND. 561.
debilis WALK. 633.
debilitata PAND. 399.
debila R.-D. 271.
decedens WALK. 638.
deceptoria LW. 458.
deceptoria PODA. 572.
deceptoria R.-D. 691.
deceptoria SCHRANK. 617.
deceptricula LW. 456.
decidua EGG. 40.
decidua PAND. 334.
decidua R.-D. 271.
decidua VERB. 36.
decipiens LW. 609.
decipiens MEIG. (*Cocn.*) 737.
decipiens MEIG. (*Macq.*) 408.
decipiens PAND. 738.
decipiens R.-D. 249.
dehivicornis MACQ. 283.
decolor FALL. 628.

- decolor* PAND. 444.
decora R.-D. (*Euph.*) 609.
decora R.-D. (*Luc.*) 539.
decorata ZETT. (*Anth.*) 696.
decorata ZETT. (*Deg.*) 400.
decoratum ZETT. 79.
decorus MEIG. 59.
decorus ZETT. 64.
decrepita ZETT. 697.
decolorata ROND. 727.
defecta MEIG. (*Sciom.*) 745.
defecta WALK. (*Anth.*) 617.
defecta WALK. (*Tach.*) 350.
defecta bis WALK. 350.
delixa WALK. 727.
dellorata HOLMGR. 670.
degener HAL. 525.
dellephilae O.-S. 231.
dejecta PAND. 715.
delata R.-D. 271.
delecta MEIG. (*Mel.*) 393.
delecta MEIG. (*Phor.*) 307.
delicata R.-D. 420.
delicata MEIG. 561.
Delicatula ROND. 136.
delicatula R.-D. (*Deg.*) 400.
delicatula R.-D. (*Luc.*) 533.
delicatula R.-D. (*Tach.*) 336.
delicatula R.-D. (*Tach.*) 343.
deligata PAND. 354.
delitescens WALK. 350.
delusa R.-D. 271.
demens R.-D. 251.
demens ZETT. 261.
demi-grans ZETT. 638.
demissa MEIG. 298.
demissa R.-D. (*Er.*) 239.
demissa R.-D. (*Mel.*) 510.
demissa R.-D. (*Mel.*) 513.
demissa ROND. 298.
demissa WALK. 350.
denota WALK. 350.
denotica Egg. 415.
denigrata BOHEM. 715.
denigrata MEIG. 670.
denominata ZETT. 617.
denotus WALK. 350.
denticauda ZETT. 677.
denticens PAND. 715.
denticulata MEIG. 651.
dentipes FABR. 651.
dentipes LINTX. 115.
dentipes MEIG. 160.
denudata HOLMGR. 670.
denudata ZETT. (*Anth.*) 638.
denudata ZETT. (*Frer.*) 560.
depila MEIG. 27.
depressa MEIG. 527.
depressa R.-D. 271.
depressario B. B. 276.
depressifrons ZETT. 478.
depressiuscula ZETT. 670.
depressiventris ZETT. (*Anth.*) 701.
depressiventris ZETT. (*Ar.*) 628.
depressula ZETT. 670.
deprimata ZETT. (*Anth.*) 701.
deprimatum ZETT. 505.
depulsa WALK. 638.
depuncta FALL. 638.
depuncta FALL. 638.
depuncta ROND. 638.
depuncta ZETT. 638.
derasa LW. 26.
deserta ZETT. 638.
desertorum BRAUER. 587.
deses R.-D. 539.
despecta R.-D. (*Maer.*) 520.
despecta R.-D. (*Sar.*) 479.
destillatorius MIK. 80.
Descoidyi R.-D. 364.
detergens PAND. 715.
determinata WALK. 715.
detracta WALK. (*Anth.*) 638.
detracta WALK. (*Ern.*) 212.
detrita ZETT. 638.
devia FALL. 592.
devicta R.-D. 324.
devius L. 151.
devioformis MIK. 638.
dexiaria ROND. 398.
diabata PAND. 685.
diadema HOLMGR. 728.
diadema MEIG. (*Anth.*) 715.
diadema MEIG. (*Linn.*) 204.
Diana BRAUER. 587.
diaphana B. B. 223 et 393.
diaphana FALL. 701.
diaphanus FALL. 410.
diaphana ROND. 420.
diaphanipennis R.-D. 343.
diaphanus WIED. 626.
diaphanus ZETT. 64.
diducta PAND. 715.
didyma MEIG. 638.
didyma ZETT. 670.
didyma ZETT. 670.
difficilis STEIN. 658.
diffusa MACQ. 249.
diffusa R.-D. 533.
digilaria ROND. 701.
digitata ROND. 142.
dignota BIDENK. 685.
dignotus ROND. 72.
digramma MEIG. 500.
dilamirata PAND. 715.
dilatatus MACQ. 43.
dilatatus STROBL. 45.
diligens R.-D. 271.
diligens ZETT. 249.
dilata MEIG. (*Er.*) 296.
dilata MEIG. (*Ph.*) 574.
diluta ROND. 617.
diluta STEIN. 702.
dilatior STROBL. 24.
dimidiata MEIG. (*Pha.*) 171.
dimidiata MEIG. (*Rond.*) 464.
dimidiata OL. 430.
dimidiata PANZ. 573.
dimidiata R.-D. (*Ill.*) 581.
dimidiata R.-D. (*Er.*) 241.
dimidiata R.-D. (*Luc.*) 539.
dimidiata R.-D. (*Myl.*) 421.
dimidiata R.-D. (*Walth.*) 231.
dimidiata ZETT. (*Bess.*) 565.
dimidiata ZETT. (*Chil.*) 27.
dimidiatus LW. 4.
Dinelo WALK. 350.
diophthalma L. 112.
diophthalma ROSS. 113.

- dira* R.-D. 543.
dirae HARR. 11.
disceps PAND. 279.
discicornis MEIG. 17.
discicornis PAND. 388.
discifera PAND. 479.
discimans LW. 43.
discoidalis BECK. 160.
discoidalis MACQ. 574.
discoidica MACQ. 617.
discoidica MEIG. 574.
discolor R.-D. 533.
discolor ZETT. 322.
discrepanda PAND. 228.
discrepans PAND. 462.
discrepans WALK. 283.
discreta MEIG. 715.
discreta R.-D. (*Nem.*) 223.
discreta R.-D. (*Per.*) 294.
discreta R.-D. (*Phr.*) 271.
discreta R.-D. (*Tach.*) 343.
discreta ROND. 416.
discreta R.-D. 204.
discussa PAND. 715.
disjuncta WALK. 336.
disjuncta WIED. 447.
disjunctus BECK. 160.
disjunctus MACQ. 64.
dispaeta PAND. 325.
dispar B. B. (*An.*) 332.
dispar B. B. (*Mel.*) 522.
dispar DUF. (*Prot.*) 545.
dispar DUF. (*Tam.*) 568.
dispar FALL. (*Cyrt.*) 567.
dispar FALL. (*Macq.*) 405.
dispar FALL. (*Musc.*) 670.
dispar LW. (*Spat.*) 48.
dispar LW. (*Sphac.*) 77.
dispar MACQ. 685.
dispar MEIG. 85.
dispar R.-D. (*Macq.*) 406.
dispar R.-D. (*Mpd.*) 638.
dispar ROND. (*Charr.*) 331.
dispar ROND. (*Phas.*) 574.
dispar SCHN. 638.
dispar SCHUMM. 5.
dispar WALK. 638.
dispar ZETT. 160.
dispartita WALK. 212.
dispecta WALK. 231.
dispecta G.-T. 197.
dispineta WALK. 350.
disputanea PAND. 699.
dissecta MEADE. 715.
dissecta MEIG. 715.
dissecta PAND. 715.
dissecta ROND. 716.
dissecta ZETT. 716.
dissimilipes ZETT. 701.
dissimilis MACQ. 678.
dissimilis MEIG. 479.
dissimilis R.-D. 512.
dissimilis ROND. 574.
dissimilis SCHN. 497.
dissitineris ZETT. 746.
dissoluta PAND. 479.
distans MACQ. 271.
distans MEIG. 457.
distans WIED. 453.
distantipennis MACQ. 350.
distenta WALK. 350.
distertina WALK. 350.
distincta B. B. 494.
distincta EGG. (*Gae.*) 306.
distincta EGG. (*Phor.*) 169.
distincta MEIG. (*Anth.*) 685.
distincta MEIG. (*Comp.*) 305.
distincta R.-D. (*Car.*) 738.
distincta R.-D. (*Ev.*) 249.
distincta R.-D. (*Lin.*) 204.
distincta R.-D. (*Mel.*) 461.
distincta R.-D. (*Phr.*) 271.
distincta R.-D. (*Tach.*) 343.
distinctus PALMA. 116.
distinguenda MK. 456.
distinguenda STROBL. 172.
distracta PAND. 420.
disturbata PAND. 289.
divaricata AMST. 41.
divergens BRAUER. 212.
divergens ROND. 716.
diversa MEIG. 465.
diversa R.-D. (*Er.*) 250
diversa R.-D. (*Go.*) 365.
diversa R.-D. (*Luc.*) 533.
diversa R.-D. (*Tach.*) 343.
diversa ROND. 696.
diversipes STROBL. 397.
dives R.-D. 533.
dives ROND. 79.
dives ZETT. 185.
divisa MEIG. (*Loth.*) 685.
divisa MEIG. (*Gov.*) 364.
divisa SCHN. 686.
divulsa WALK. 350.
docilis R.-D. 539.
dolenda MEIG. 378.
dolens ZETT. 445.
dolosa MEIG. 242.
dolosa R.-D. (*Luc.*) 539.
dolosa R.-D. (*Phr.*) 271.
domator WALK. 351.
Dombressonensis BECK. 26.
domestica L. 603.
dominula R.-D. 343.
donaua WALK. 697.
doris MEIG. 287.
doris SCHN. 228.
dorsalis BECK. 170.
dorsalis B. B. 381.
dorsalis MACQ. 121.
dorsalis MEIG. (*Mel.*) 322.
dorsalis MEIG. (*Ph.*) 186.
dorsalis MEIG. (*Tr.*) 439.
dorsalis R.-D. (*A.*) 716.
dorsalis R.-D. (*Luc.*) 539.
dorsalis R.-D. (*Pha.*) 574.
dorsal s. R.-D. (*Rohr.*) 617.
dorsalis v. Ros. 738.
dorsata ZETT. (*Dr.*) 671.
dorsata ZETT. (*Bruch.*) 88.
Dorychus WALK. 351.
Doubleti PAND. 638.
dryadis HOLMGR. 79.
dryophila ROND. 93.
dryophila SCOP. 94.
dryophila SCHRANK. 93.
dubia BIG. 701.
dubia B. B. 242.
dubia FABR. 122.
dubia FALL. 221.

- dabia* MACQ. (*Cocc.*) 738.
dabia MACQ. (*Er.*) 295.
dabia MEADE, 617.
dabia R.-D. (*Ern.*) 216.
dabia R.-D. (*Er.*) 250.
dabia R.-D. (*Lyd.*) 291.
dubia ZETT. (*Pho.*) 172.
dabia ZETT. (*Sphaer.*) 74.
dubiosa B. B. 298.
dubitanda PAND. 671.
dubitata FALL. 686.
dubium ZETT. 49.
dulcis R.-D. 539.
dumeti R.-D. 474.
dumetorum MACQ. (*Er.*) 250.
dumetorum MACQ. (*Mei.*) 322.
dumetorum R.-D. 271.
dumosa PAND. 520.
duodecimpunctata R.-D. 667.
duodenalis SCHW. 596.
duplaris STEIN. 639.
duplaris ZETT. 639.
duplicata MEIG. 639.
duplinervis ZETT. 250.
Dupon-heli R.-D. 250.
ebennia R.-D. 465.
ebriacatus ROND. 3.
ebrachiata PAND. 480.
ebriacatus SCHN. 3.
echinalis PAND. 407.
echinata MEIG. 190.
echinura R.-D. 318.
edar R.-D. 343.
edar WALK. 486.
educata R.-D. (*Phr.*) 271.
educatus R.-D. (*Micr.*) 207.
Edwardsella R.-D. 271.
effecta WALK. (*Mgd.*) 639.
effecta WALK. (*Tach.*) 351.
effodians ROND. 701.
egena R.-D. (*Macq.*) 406.
egena R.-D. (*Phr.*) 271.
egena R.-D. (*Sar.*) 480.
egena R.-D. (*Tach.*) 348.
egens Egg. 325.
egens MEIG. (*Anth.*) 701.
egens MEIG. (*Macq.*) 406.
egerioidea R.-D. 686.
Eggeri B. B. (*Ep.*) 260.
Eggeri B. B. (*Lyd.*) 290.
Eggeri B. B. (*Pty.*) 300.
Eggeri MIK. 154.
Eggeri SCHN. 64.
elaphi SCHRANK. (*Ceph.*) 556.
elaphi SCHRANK. (*Hypp.*) 586.
elapsa WALK. 659.
Elara WALK. 543.
elata MEIG. 369.
electa R.-D. 271.
electa ZETT. 639.
elegans Egg. 163.
elegans LW. (*Chrys.*) 147.
elegans LW. (*Vol.*) 92.
elegans MEIG. (*Call.*) 184.
elegans MEIG. (*Orth.*) 15.
elegans R.-D. (*Lac.*) 539.
elegans R.-D. (*Ptych.*) 300.
elegans SCHN. et Egg. 134.
elegans SCHUM. 84.
elegans VILL. 150.
elegantula FALL. 184.
elegantula ROND. 738.
elegantula ZETT. (*Call.*) 184.
elegantula ZETT. (*Par.*) 514.
elephantina BECK. 678.
elephas BECK. 160.
eligans HARR. 61.
elliptica MACQ. (*Anth.*) 403.
elliptica MACQ. (*Er.*) 250.
elliptica R.-D. 271.
elongata FABR. 81.
elongata MACQ. 319.
elongata POK. 716.
elongata R.-D. (*Mgi.*) 421.
elongata R.-D. (*Tach.*) 348.
elongata SCHRANK. 87.
eluta PAND. 509.
emarginatus LW. (*Eum.*)
 E34.
emarginatus LW. (*Sqr.*) 61.
emissa R.-D. 343.
emissa WALK. 351.
Emoda WALK. 543.
enotata WALK. 351.
ephippium v. Ros. 190.
ephippium ZETT. 701.
epicurea ROND. 448.
epicydes WALK. 239.
ephes FABR. 117.
equestris FABR. 117.
equestris MEIG. 533.
equi CL. 593.
equi LOIS. 588.
erecta WALK. 351.
eremophila LW. 55.
erectorum LEACH. 588.
erigonea R.-D. 212.
erinacea FALL. 676.
erinaceus FABR. 376.
eriophthalma MACQ. 607.
eriophthalma ZETT. 726.
eristaloidea BIG. 122.
eristaloides LW. 115.
eristaloides PORTSCH. 142.
erogata WALK. 351.
errans MEIG. (*Anth.*) 618.
errans MEIG. (*Mei.*) 322.
errans R.-D. (*Ech.*) 193.
errans R.-D. (*Sar.*) 474.
erratica FALL. 618.
erratica FALL. 618.
erratica MEADE. 511.
erratica MEIG. 329.
erratica R.-D. (*Fell.*) 618.
erratica R.-D. (*Sarc.*) 474.
erratica SCOP. 81.
erraticus L. 64.
erraticus R.-D. 209.
erraticus VILL. 53.
eronea SCHNABEL. 618.
Erschoffii PORTSCH. 178.
erucatum ROND. 347.
erucarum SCHRANK. 336.
erucastri R.-D. (*Pal.*) 312.
erucastri R.-D. (*Phr.*) 271.
eructi R.-D. 250.
erythraea Egg. 453.
erythraea R.-D. 539.
erythrocephala MACQ. 549.
erythrocephala MEIG. 546.

- erythroceræ* MEIG. 172.
erythroceræ R.-D. (*Act.*) 388.
erythroceræ R.-D. (*Car.*) 682.
erythroceræ R.-D. (*Den.*) 504.
erythroceræ R.-D. (*Sar.*) 480.
erythroceræ R.-D. (*Te.*) 468.
erythroceræ R.-D. (*Var.*) 371.
erythrocerum R.-D. 328.
erythrochaeta BEZZI. 516.
erythrochila ROND. 27.
erythrogona MALM. 15.
erythronota STROBL. 170.
erythrophthalma STROBL. 490.
erythrostroma HART. 262.
erythrostroma ROND. 26.
erythrostroma v. ROS. 701.
erythrostroma ZETT. 618.
erythrura MEIG. (*Sor.*) 480.
erythrura MEIG. (*Wlth.*) 230.
esuriens MEIG. 701.
euchromis KOW. 64.
eumera LW. 128.
eunotus LW. 126.
euphemioidea R.-D. 639.
euphyppium ROND. 702.
euprosopa LW. 157.
europæ EGG. 447.
evecta WALK. 91.
evidens WALK. 351.
evocata WALK. 283.
evoluta WALK. 351.
evonymellæ BOLCHE. 180.
evonymellæ RATZ. 395.
evacta R.-D. 271.
evacta WALK. 229.
exaculeata PAND. 388.
exagens WALK. 351.
exalceata ROND. 9.
exalceatus ROND. 3.
excavans PAND. 716.
excavata ZETT. 235.
excensa WALK. 351.
excossa WALK. 351.
excisa BECK. 170.
excisa FALL. 234.
excisa LW. 431.
excisus SCHN. 66.
excisus ZETT. 61.
excitata R.-D. (*Phor.*) 307.
excitata R.-D. (*Phr.*) 271.
excitata R.-D. (*Phy.*) 302.
exclusa WALK. 351.
excubans PAND. 716.
excuticulata PAND. 480.
exempta BECK. 175.
exigua MEADE. 716.
exigua MEIG. 561.
exigua PAND. 716.
exigua R.-D. (*Egyl.*) 716.
exigua R.-D. (*Pros.*) 299.
exigua WIED. 671.
exiguus HAL. 167.
exilipes ROND. 134.
exilis MEIG. 702.
exilis R.-D. (*Lo.*) 539.
exilis R.-D. (*Mei.*) 324.
exilis R.-D. (*Phr.*) 271.
exilis R.-D. (*Tach.*) 343.
exilis SCHN. 702.
exilistyla MACQ. 351.
eximia GIBSCHN. 578.
eximia STEIN. 652.
exoleta MEIG. (*Act.*) 388.
exoleta MEIG. (*Lith.*) 618.
expedita SCHN. 351.
expetita WALK. 351.
expleta WALK. 351.
expletus LW. 96.
exsecta WALK. 319.
exsal ZETT. 639.
exsurda PAND. 671.
extensicornis ZETT. 746.
externa PAND. 666.
extorris PAND. 242.
extrema R.-D. 271.
extrema WALK. 639.
exuberans PAND. 492.
exul WILL. 363.
exuta KOW. 677.
Fabricii HOLMGR. 716.
Fabricii R.-D. 716.
Fabricii SCHN. 184.
facialis R.-D. (*Er.*) 241.
facialis R.-D. (*Lo.*) 533.
facialis R.-D. (*Mus.*) 282.
facialis R.-D. (*Tach.*) 343.
facialis WILL. 91.
facilis MEIG. 691.
facilis R.-D. 539.
facultas HARR. 50.
facdata R.-D. 348.
Fagesii GUER. 153.
Fairmairei BIG. 9.
falcata THOMS. 676.
falculæ R.-D. 283.
falculata PAND. 480.
fallax L. 126.
fallax LW. 731.
fallax MEIG. 335.
fallax R.-D. (*Phr.*) 271.
fallax R.-D. (*Sio.*) 474.
fallax R.-D. (*Tach.*) 343.
Fallenii ROND. 122.
Fallenii ZETT. 185.
familiaris W. HARR. 527.
familiaris MEIG. 242.
famula R.-D. 271.
fasciata EGG. 317.
fasciata FALL. (*Aph.*) 175.
fasciata FALL. (*Pla.*) 188.
fasciata FALL. (*Tach.*) 336.
fasciata GIMM. 607.
fasciata MACQ. (*Peg.*) 400.
fasciata MACQ. (*Dil.*) 55.
fasciata MACQ. (*Syn.*) 562.
fasciata MACQ. (*Tach.*) 351.
fasciata MEIG. (*Go.*) 364.
fasciata MEIG. (*Loph.*) 428.
fasciata MEIG. (*Pi.*) 9.
fasciata MEIG. (*Pla.*) 187.
fasciata MEIG. (*Sci.*) 745.
fasciata MEIG. (*Sph.*) 516.
fasciata MEIG. (*Sto.*) 523.
fasciata MEIG. (*Tro.*) 121.
fasciata MÜLL. 76.
fasciata PALM. 259.
fasciata R.-D. (*Lyd.*) 291.
fasciata R.-D. (*Wag.*) 374.
fasciata R.-D. (*Wag.*) 375.

- fasciata* v. Ros. 168.
fasciata SCHN. 26.
fasciata VERR. 95.
fasciata WALK. 188.
fasciata WIED. (*Cr.*) 367.
fasciata WIED. (*Pro.*) 299.
fasciata WIED. (*Syr.*) 132.
fasciatum PORTSCH. 361.
fasciatum R.-D. 505.
fasciatus Coq. 3.
fasciatus Lw. 99.
fasciatus MEIG. 98.
fascicularis PANZ. 407.
fasciculata Lw. 659.
fasciculata MEADE. 652.
fasciculatus Lw. 43.
fascinans MEIG. 400.
fasciola ZETT. 562.
fasciolata R.-D. (*Arr.*) 396.
fasciolata R.-D. (*Er.*) 241.
fasciolatum DEG. 147.
fasciolatum MACQ. 147.
fasciolatum MEIG. 145.
fasciolella ZETT. 516.
fascipennis GIRSCHN. 580.
fascipennis Lw. 430.
fascipennis WIED. 560.
fascipes STROBL. 160.
fascipes ZETT. 160.
fasciventris MACQ. 368.
fastuosa MEIG. 509.
fastuosa R.-D. 533.
fatua MEIG. 296.
fatua R.-D. 271.
fatua SCHN. 227 et 297.
faucis BECK. 27.
fatua MEIG. 278.
fausta R.-D. (*Luc.*) 533.
fausta R.-D. (*Phr.*) 272.
fausta R.-D. (*Tach.*) 313.
Fausti PORTSCH. 456.
farilla R.-D. 510.
farillacea MEIG. 639.
felina R.-D. 522.
felina ROND. 738.
felix WALK. (*Chry.*) 513.
felix WALK. (*Sphaer.*) 77.
femoralis BEISCHKE. 702.
femoralis FALL. 110.
femoralis MEIG. 457.
femoralis R.-D. (*Ill.*) 580.
femoralis R.-D. (*Cor.*) 738.
femoralis R.-D. (*Myl.*) 420.
femoralis R.-D. (*Pal.*) 738.
femoralis R.-D. (*Syn.*) 562.
femoralis ROND. 456.
femorata L. 128.
femorata MACQ. 422.
femorata MEIG. 174.
femorata ROND. 124.
femoratus FABR. 127.
femoratus MEIG. (*Bra.*) 127.
femoratus MEIG. (*Par.*) 5.
femoratus PANZ. 111.
femoratus STEPH. 126.
fenestrata MEIG. (*Myl.*) 420.
fenestrata MEIG. (*Pi.*) 9.
fennica BECK. 170.
fera FALL. 197.
fera HARR. 94.
fera L. 192.
fera R.-D. (*Er.*) 296.
fera R.-D. (*Fell.*) 618.
fera R.-D. (*Myl.*) 451.
fera R.-D. (*Phor.*) 316.
fera R.-D. (*Sph.*) 516.
fera SCHELL. 200.
ferax R.-D. 343.
ferina FALL. 451.
ferina MEIG. 242.
ferina ZETT. 199.
ferox PANZ. 196.
ferox R.-D. 612.
ferrugata R.-D. 272.
ferruginatus BRADL. 595.
ferruginatus ZETT. 597.
ferruginea FALL. 88.
ferruginea MEIG. (*Er.*) 295.
ferruginea MEIG. (*Tr.*) 438.
ferruginea R.-D. 578.
ferruginea ROND. 286.
ferrugineotibialis ZETT. 250.
ferruginocollata ZETT. 691.
ferruginus FABR. 118.
ferruginus MACQ. 44.
ferruginus ZETT. 44.
ferrus R.-D. 605.
ferrida R.-D. (*Luc.*) 533.
ferrida R.-D. (*Pyr.*) 607.
festivans MEIG. 286 et 296.
festivans R.-D. (*Er.*) 250.
festivans R.-D. (*Lyd.*) 291.
festivans R.-D. (*Mel.*) 512.
festinata R.-D. 336.
festiva MEIG. (*Er.*) 242.
festiva MEIG. (*Pi.*) 9.
festiva R.-D. (*Ad.*) 509.
festiva R.-D. (*Egl.*) 716.
festiva R.-D. (*Euphr.*) 609.
festiva R.-D. (*Er.*) 250.
festiva R.-D. (*Er.*) 250.
festiva R.-D. (*Mel.*) 461.
festiva R.-D. (*Myl.*) 421.
festiva R.-D. (*On.*) 552.
festiva R.-D. (*Pal.*) 312.
festiva R.-D. (*Phor.*) 307.
festiva R.-D. (*Sar.*) 474.
festiva R.-D. (*Tach.*) 343.
festiva R.-D. (*Tach.*) 348.
festiva ZETT. 696.
festivum FABR. 78.
festivum FALL. 79.
festivum L. 148.
festivum ROSSI. 79.
Fetisowii PORTSCH. 189.
fida R.-D. 272.
figulina ROND. 702.
lilia ROND. 480.
lilipalpis ROND. 355.
limbiata MEIG. (*Ad.*) 388.
limbiata MEIG. (*Er.*) 242.
limbiata MEIG. (*Mus.*) 499.
limbiata SCHN. 277.
limbriatum Lw. 49.
lingens WALK. 145.
Fiorii BEZZI. 55.
Fischeri BRADL. 439.
Fischeri GEMM. 259.
fissa WALK. 351.
fissiglobulus PANZ. 206.
fixa WALK. 639.

- habellifera* PAND. 691.
flagrans R.-D. 540.
flagripes ROND. 639.
flamma R.-D. (*Euph.*) 609.
flamma R.-D. (*Lac.*) 534.
flammea R.-D. 540.
flammula R.-D. 540.
flava O. G. COSTA. 418.
flava FALL. 176.
flava MACQ. (*Mei.*) 322.
flava MACQ. (*Sphc.*) 84.
flava PERR. 632.
flava R.-D. (*Philinta*) 702.
flavago R.-D. 343.
flavcola FALL. 702.
flavcola R.-D. 437.
flavcolus MEIG. 627.
flavescens BIG. 447.
flavescens GIMM. 639.
flavescens MACQ. 511.
flavescens MEIG. 336.
flavescens R.-D. (*Anth.*) 728.
flavescens R.-D. (*Egyle*) 716.
flavescens R.-D. (*Er.*) 250.
flavescens R.-D. (*Les.*) 419.
flavescens R.-D. (*Macq.*) 407.
flavescens R.-D. (*Mei.*) 322.
flavescens R.-D. (*Mgi.*) 420.
flavescens R.-D. (*Ner.*) 716.
flavescens R.-D. (*Palusia*) 738.
flavescens R.-D. (*Phor.*) 702.
flavescens R.-D. (*Rhaz.*) 379.
flavescens R.-D. (*Sar.*) 479.
flavescens R.-D. (*Sar.*) 486.
flavescens R.-D. (*Set.*) 508.
flavescens R.-D. (*Slom.*) 611.
flavescens R.-D. (*Vor.*) 372.
flavescens R.-D. (*W.*) 231.
flavescens STEIN. 671.
flavibarbata BRISCHKE. 318.
flavibarbis R.-D. 272.
flavibasis STEIN. 716.
flavicalyptrata MACQ. (*Er.*) 250.
flavicalyptrata MQ. (*Macr.*) 409.
flavicalyptrata MACQ. (*Mor.*) 501.
flavicalyptrata MACQ. (*Tach.*) 348.
flavicans FABR. 118.
flavicans GOER. 400.
flavicans MACQ. 236.
flavicans R.-D. (*Macr.*) 520.
flavicans R.-D. (*Tach.*) 343.
flavicans R.-D. (*Tach.*) 343.
flavicauda MACQ. 124.
flavicauda ZETT. 74.
flaviceps MACQ. (*Chor.*) 514.
flaviceps MACQ. (*Tach.*) 336.
flaviceps ROND. 66.
flaviceps ZETT. (*Dr.*) 716.
flaviceps ZETT. (*Gon.*) 362.
flavicincta KOW. 678.
flavicincta LW. 678.
flavicinctus FABR. 104.
flavicornis FABR. 25.
flavicornis FALL. 738.
flavicornis MACQ. 170.
flavicornis MEIG. (*Ch.*) 31.
flavicornis MEIG. (*Di.*) 449.
flavicornis MEIG. (*Pe.*) 83.
flavicornis R.-D. (*Act.*) 388.
flavicornis R.-D. (*Act.*) 386.
flavicornis R.-D. (*Palusia*) 738.
flavicornis ROSSI. 97.
flavicornis SCHIX. (*Ch.*) 21.
flavicornis SCHIX. (*Pe.*) 83.
flavicornis ZETT. (*Ca.*) 560.
flavicornis ZETT. (*Nc.*) 158.
flavicoxa ZETT. (*Anth.*) 648.
flavicoxa ZETT. (*Aph.*) 179.
flavida MACQ. 422.
flavida R.-D. (*On.*) 552.
flavida R.-D. (*Tach.*) 348.
flavidus MEIG. 411.
flavidipenne MACQ. 328.
flavidipennis MACQ. (*Mas.*) 283.
flavidipennis MACQ. (*Tr.*) 335.
flavidula BIG. 496.
flavidula R.-D. 486.
flavifacies R.-D. 652.
flavifrons BRISCHKE. 301.
flavifrons MACQ. (*Er.*) 245.
flavifrons MACQ. (*Mas.*) 283.
flavifrons MACQ. (*Por.*) 319.
flavifrons MACQ. (*Tach.*) 343.
flavifrons R.-D. (*Co.*) 310.
flavifrons R.-D. (*Zen.*) 279.
flavifrons VERR. 65.
flavifrons ZETT. (*Dr.*) 716.
flavifrons ZETT. (*Buc.*) 381.
flavimana MEIG. (*Chil.*) 22.
flavimana MEIG. (*Hyp.*) 174.
flavimana ZETT. 738.
flavinervis BECK. 678.
flavinervis R.-D. 483.
flavipalpis B. B. 278.
flavipalpis GIRSCHN. 519.
flavipalpis MACQ. (*Ac.*) 388.
flavipalpis MACQ. (*Phor.*) 172.
flavipalpis MACQ. (*Syn.*) 562.
flavipalpis MACQ. (*Tach.*) 343.
flavipalpis (*Zo.*) 412.
flavipalpis MEIG. 546.
flavipalpis PALM. 317.
flavipalpis R.-D. (*Ar.*) 396.
flavipalpis R.-D. (*Er.*) 250.
flavipalpis R.-D. (*Er.*) 250.
flavipalpis R.-D. (*Er.*) 250.
flavipalpis R.-D. (*Lu.*) 540.
flavipalpis R.-D. (*Macq.*) 405.
flavipalpis R.-D. (*Mas.*) 283.
flavipalpis R.-D. (*On.*) 552.
flavipalpis R.-D. (*Pty.*) 302.
flavipalpis R.-D. (*Stu.*) 227.
flavipalpis R.-D. (*Vor.*) 372.
flavipalpis ROND. (*Cl.*) 331.
flavipalpis ROND. (*Poll.*) 527.
flavipalpis ZETT. 702.
flavipenne PALM. 149.
flavipennis FALL. 691.
flavipennis MACQ. 406.
flavipennis R.-D. (*Co.*) 310.
flavipennis R.-D. (*Ern.*) 214.
flavipennis R.-D. (*Hyl.*) 691.

- flavipennis* R.-D. (*Ply.*) 302.
flavipennis R.-D. (*Zo.*) 412.
flavipennis ZETT. 581.
flavipes COQ. 445.
flavipes FALL. 702.
flavipes MEIG. (*Macq.*) 406.
flavipes MEIG. (*Pip.*) 160.
flavipes OL. 594.
flavipes PANZ. 27.
flavipes R.-D. (*Ac.*) 389.
flavipes R.-D. (*Myl.*) 421.
flavipes R.-D. (*Peg.*) 702.
flavipes R.-D. (*Rhac.*) 379.
flavipes ROND. 162.
flavipes STROBL. 195.
flavipes WALK. 164.
flavipes ZETT. (*Anth.*) 702.
flavipes ZETT. (*Ch.*) 21.
flavipes ZETT. (*Pip.*) 159 et 166.
flavisquama STEIN. 702.
flavisquama ZETT. (*Ar.*) 618.
flavisquama ZETT. (*Trich.*) 628.
flavisquamis MACQ. 400.
flavisquamis R.-D. (*Act.*) 388.
flavisquamis R.-D. (*Arr.*) 396.
flavisquamis R.-D. (*Dio.*) 329.
flavisquamis R.-D. (*Er.*) 211.
flavisquamis R.-D. (*Myl.*) 422.
flavisquamis R.-D. (*Phor.*) 307.
flavisquamis R.-D. (*Phor.*) 319.
flavisquamis R.-D. (*Phr.*) 272.
flavisquamis R.-D. (*Rhac.*) 379.
flavisquamis R.-D. (*Wag.*) 375.
flavisquamis R.-D. (*Zen.*) 279.
flavissima BECK. 27.
flavitarcella ZETT. 378.
flavitarisis MALM. 106.
flavitarisis MEIG. 6.
flavitarisis ZETT. 134.
flaviventricis MACQ. (*Hel.*) 576.
flaviventricis MACQ. (*Syr.*) 63.
flaviventricis MEIG. 574.
flaviventricis WULF. 200.
flavocincta R.-D. 318.
flavocinctus FALL. 104.
flavofasciatus MACQ. 96.
flavofemorata STROBL. 113.
flavogrisea ZETT. 639.
flavomarginatus STROBL. 79.
flavoptera R.-D. 691.
flavoscutellata ZETT. (*Anth.*) 702.
flavoscutellata ZETT. 227.
flavoscutellatus GIESCH. 57.
flavotibiella ZETT. 702.
florus R.-D. (*Phyl.*) 627.
flexa WALK. 351.
flexiloba PAND. 686.
flexuosa EGG. 168.
floccosa MACQ. (*Chort.*) 716.
floccosa MACQ. (*Hylbr.*) 652.
floccosa MEIG. 124.
floccosa WERR. 35.
floralis FALL. (*Moi.*) 323.
floralis FALL. (*Musc.*) 716.
floralis FALL. (*Musc.*) 691.
floralis FALL. (*Musc.*) 716.
floralis FALL. (*Nem.*) 259.
floralis MEIG. (*Er.*) 243.
floralis MEIG. (*Neo.*) 85.
floralis PAND. 258.
floralis R.-D. (*Cyp.*) 437.
floralis R.-D. (*Am.*) 659.
floralis R.-D. (*Anth.*) 728.
floralis R.-D. (*Er.*) 296.
floralis R.-D. (*Est.*) 443.
floralis R.-D. (*Euph.*) 609.
floralis R.-D. (*Hylbr.*) 652.
floralis R.-D. (*Er.*) 251.
floralis R.-D. (*Tr.*) 468.
floralis R.-D. (*Leuc.*) 699.
floralis R.-D. (*Leuc.*) 534.
floralis R.-D. (*Leuc.*) 540.
floralis R.-D. (*Macr.*) 615.
floralis R.-D. (*Musc.*) 603.
floralis R.-D. (*On.*) 552.
floralis R.-D. (*Phor.*) 307.
floralis R.-D. (*Poll.*) 527.
floralis R.-D. (*Tach.*) 348.
floralis R.-D. (*Tach.*) 313.
floralis R.-D. (*Zen.*) 279.
florea FABR. 168.
florea L. 112.
florea R.-D. (*Li.*) 667.
florea R.-D. (*Er.*) 213.
florea R.-D. (*Fell.*) 639.
florea R.-D. (*Hyl.*) 691.
florea R.-D. (*Pal.*) 312.
florea R.-D. (*Sar.*) 474.
florientina ROND. 454.
floream R.-D. 506.
floricola MEIG. (*Anth.*) 659.
floricola MEIG. (*WAnth.*) 232.
floricola R.-D. (*Del.*) 691.
floricola R.-D. (*Egyl.*) 716.
floricola R.-D. (*Er.*) 250.
floricola R.-D. (*Myl.*) 640.
floricola R.-D. (*Sl.*) 228.
floricola R.-D. (*On.*) 552.
florida R.-D. (*Phr.*) 272.
florida R.-D. (*Sar.*) 474.
floridula R.-D. 475.
florilega R.-D. (*Tam.*) 568.
florilega R.-D. (*Zen.*) 279.
florilega ZETT. 716.
florilega ZETT. 716.
floricaga R.-D. 291.
florum FABR. 128.
florum MACQ. 286.
florum R.-D. (*Egyl.*) 716.
florum R.-D. (*Sar.*) 475.
florum R.-D. (*Tach.*) 343.
florum ROND. 129.
florum ZETT. 129.
fluvialis BECK. 160.
fluvialis R.-D. (*Limon.*) 671.
fluvialis R.-D. (*Lispo.*) 678.
foeda MEIG. 136.
foetida R.-D. 540.

- Foersteri* MEIG. (*Did.*) 55.
Foersteri MEIG. (*Go.*) 364.
foliacea PAND. 427.
fontinalis R.-D. 529.
forcipata BIG. 565.
forcipata MEIG. 330.
forcipata R.-D. (*Cl.*) 331.
forcipata R.-D. (*Dio.*) 330.
forliculæ NEWP. 511.
formicarum VERR. 176.
formosa EGG. 74.
formosus HARR. 65.
forte ROND. 440.
fortis PAND. 442.
fortis ROND. 219.
fossarium MEIG. 106.
fossoria PAND. 481.
foveolata STROBL. 618.
foveolatus ZETT. 628.
fracticornis MEIG. (*Ac.*) 388.
fracticornis MEIG. (*Hyp.*) 397.
fractiseta ROND. 239.
fragilis R.-D. (*Mpi.*) 422.
fragilis R.-D. (*Rohr.*) 618.
frater ROND. 205.
fratercula MEADE. 640.
fratercula ZETT. 640.
fraterculus ZETT. 100.
fraterna MACQ. (*Er.*) 250.
fraterna MACQ. (*Lu.*) 534.
fraterna MEIG. 27.
fraterna ZETT. 30.
frenata PAND. 481.
frenatus HOLMGR. 628.
Friedrichii WACHTL. 197.
Friesiana BOUCHE. 716.
frigida ERICH. 678.
frigida ZETT. 702.
Fricaldzki SCHN. 514.
frontale PAND. 504.
frontalina R.-D. 319.
frontalis LW. (*Ch.*) 27.
frontalis LW. (*Lu.*) 536.
frontalis LW. (*Or.*) 15.
frontalis MACQ. (*Act.*) 388.
frontalis MACQ. (*Anth.*) 716.
frontalis MACQ. (*Chart.*) 716.
frontalis MACQ. (*Musc.*) 603.
frontalis MACQ. (*Mpi.*) 421.
frontalis R.-D. (*Bill.*) 441.
frontalis R.-D. (*Euph.*) 609.
frontalis R.-D. (*Limn.*) 671.
frontalis R.-D. (*Phr.*) 272.
frontalis R.-D. (*Poll.*) 527.
frontalis R.-D. (*Sar.*) 475.
frontalis R.-D. (*Str.*) 475.
frontalis ROND. 603.
frontalis SCHN. 359.
frontalis THOMS. 609.
frontata BOH. 416.
frontata STROBL. 691.
frontata ZETT. 683.
frontatus BECK. 160.
frontella ZETT. 716.
fronto PAND. 738.
frontosa MEIG. 314.
frontosa ROND. 359.
frontosa SAY. 363.
fruticorum FABR. 110.
fucata HARR. 131.
fucatus ROND. 134.
fuciformis FABR. 114.
fuciformis SCHELL. 118.
fucivora KIEFF. 659.
fucorum FALL. 746.
fucorum FALL. 746.
fugax MEIG. 717.
fugax R.-D. (*Er.*) 250.
fugax R.-D. (*Sar.*) 475.
fugax R.-D. (*Sar.*) 483.
fugax R.-D. (*Ta.*) 343.
fugax ROND. (*Er.*) 243.
fugax ROND. (*Pros.*) 299.
fugax STROBL. 717.
fugitiva R.-D. (*Er.*) 251.
fugitiva R.-D. (*Lyd.*) 291.
fugitiva R.-D. (*Ma.*) 520.
fugitiva R.-D. (*Phr.*) 272.
fugilicis ROSSI. 136.
fulgens HART. 209.
fulgens MEIG. (*Anth.*) 702.
fulgens MEIG. (*Limn.*) 204.
fulgens R.-D. (*Lu.*) 540.
fulgens R.-D. (*Mi.*) 207.
fulges HARR. 534.
fulgida R.-D. 609.
fulgida ZETT. 540.
fuliginaria ROND. (*Meg.*) 499.
fuliginaria ROND. (*Way.*) 375.
fuliginipennis GÄRSCH. 582.
fuliginosa HOLMGR. 671.
fuliginosa MEIG. 182.
fuliginosa R.-D. (*Dasyph.*) 605.
fuliginosa R.-D. (*Hydr.*) 686.
fuliginosa R.-D. (*Limos.*) 738.
fuliginosa R.-D. (*Lyd.*) 291.
fuliginosa R.-D. (*Mel.*) 461.
fuliginosa R.-D. (*Mor.*) 600.
fuliginosa R.-D. (*Mgd.*) 640.
fuliginosa R.-D. (*Sar.*) 475.
fuliginosa R.-D. (*Sar.*) 483.
fuliginosa R.-D. (*Sar.*) 486.
fuliginosa R.-D. (*Te.*) 468.
fuliginipennis ROND. 582.
fuligo R.-D. (*Del.*) 691.
fuligo R.-D. (*Sarc.*) 486.
fulvians FABR. 142.
fulva FALL. 235.
fulva HARR. 140.
fulva R.-D. (*Go.*) 365.
fulva R.-D. (*Nem.*) 223.
fulva R.-D. (*Nem.*) 223.
fulva SCHN. 279.
fulvescens R.-D. (*Er.*) 380.
fulvescens R.-D. (*Sar.*) 475.
fulvibarbis R.-D. 549.
fulvicauda MEADE. 481.
fulviceps EGG. 521.
fulviceps MACQ. 717.
fulviceps MEIG. 193.
fulviceps ZETT. 703.
fulvicollis v. ROS. 567.
fulvicornis BRACER. 204.
fulvicornis MACQ. (*Etam.*) 134.
fulvicornis MACQ. (*Way.*) 375.
fulvicornis MEIG. 339.

- fulvicornis* R.-D. (*Dasyph.*) 605.
fulvicornis R.-D. (*La.*) 534.
fulvicornis R.-D. (*La.*) 540.
fulvicornis R.-D. (*Lyd.*) 291.
fulvicornis R.-D. (*Myd.*) 640.
fulvicornis R.-D. (*Poll.*) 527.
fulvicornis R.-D. (*Tach.*) 343.
fulvicornis ZETT. (*Anth.*) 738.
fulvicornis ZETT. (*Min.*) 409.
fulvicornis ZETT. (*Poll.*) 525.
fulvius R.-D. 450.
fulvida R.-D. 343.
fulvifacies R.-D. 530.
fulvifrons MACQ. 63.
fulvifrons R.-D. (*La.*) 540.
fulvifrons R.-D. (*Tc.*) 468.
fulvifrons ROND. 534.
fulvifrons ZETT. 251.
fulvigastris R.-D. 218.
fulvimanus ZETT. 13.
fulvipalpis MACQ. (*Poll.*) 527.
fulvipalpis MACQ. (*Sar.*) 481.
fulvipalpis R.-D. (*Myi.*) 422.
fulvipalpis R.-D. (*Sar.*) 475.
fulvipalpis R.-D. (*Sar.*) 483.
fulvipalpis R.-D. (*Sph.*) 516.
fulvipennis MACQ. 552.
fulvipes BIG. 58.
fulvipes LW. 537.
fulvipes MACQ. 162.
fulvipes MEIG. (*Syr.*) 61.
fulvipes MEIG. (*Tach.*) 259.
fulvipes R.-D. (*Ich.*) 389.
fulvipes R.-D. (*Dio.*) 449.
fulvipes R.-D. (*Ee.*) 251.
fulvipes R.-D. (*Ee.*) 251.
fulvipes R.-D. (*Mos.*) 406.
fulvipes R.-D. (*Rhoc.*) 379.
fulvipes ROND. 256.
fulvipes ZETT. 27.
fulvisquama ZETT. 618.
fulvitarsis MACQ. 6.
fulviventris BIG. 129.
fulviventris BOHEM. 169.
fulviventris MACQ. 13.
fulvomaculata v. ROS. 659.
fulvum B. B. 505.
fulvus MACQ. 120.
fumata ZETT. 406.
fumigata MEIG. 717.
fumipennis B. B. 361.
fumipennis CURT. 136.
fumipennis GIBSCHN. 360.
fumipennis LW. 16.
fumipennis STERB. 100.
fumipennis WALK. (*Chr.*) 120.
fumipennis WALK. (*Plat.*) 188.
fumipennis ZETT. (*Ar.*) 671.
fumipennis ZETT. (*Cl.*) 572.
fumipennis ZETT. (*Pha.*) 188.
fumosa LW. 20.
fumosa MEIG. 633.
fumosa WALK. 633.
funebris HARR. 40.
funebris MACQ. 80.
funebris MEIG. (*Deg.*) 399.
funebris MEIG. (*Phr.*) 169.
funebris MEIG. (*Pi.*) 10.
funebris R.-D. (*Poll.*) 527.
funebris R.-D. (*Sar.*) 475.
funebris R.-D. (*Tach.*) 343.
funebris ZETT. 356.
funeralis MEIG. (*Chil.*) 33.
funeralis MEIG. (*Eum.*) 137.
funeralis ROND. 671.
funeralis WALK. 40.
funesta KÜHN. 717.
funesta MEIG. 509.
funesta R.-D. 389.
funestus FABR. 119.
fungivora R.-D. 614.
fungorum DEG. 730.
fungorum WALK. 703.
furcata BOUCH. 717.
furcata FALL. 187.
furcatus EGG. 461.
furibundata ZETT. 296.
furnaria ROND. 499.
furvus VLEB. 105.
fusca MEAD. (*Brach.*) 358.
fusca MEAD. (*Hylroph.*) 368.
fusca R.-D. (*Car.*) 738.
fusca R.-D. (*Phor.*) 316.
fusca SCHRANK. 35.
fusca STROBL. 731.
fuscana R.-D. (*All.*) 582.
fuscana R.-D. (*Com.*) 600.
fuscana R.-D. (*Myi.*) 420.
fuscana R.-D. (*Phr.*) 573.
fuscipennis MACQ. (*Deg.*) 400.
fuscipennis MACQ. (*Ech.*) 195.
fuscata FALL. 618.
fusciceps ZETT. 717.
fuscicornis R.-D. (*Bac.*) 382.
fuscicornis R.-D. (*Pha.*) 573.
fuscicornis ROND. 36.
fuscifacies R.-D. 475.
fuscifrons R.-D. (*Phr.*) 272.
fuscifrons R.-D. (*Zen.*) 279.
fuscimana v. ROS. 659.
fuscinevris EGG. 443.
fuscinevris v. RÖD. 119.
fuscinevris ZETT. 691.
fuscipalpis MACQ. 534.
fuscipalpis PERR. 333.
fuscipalpis ZETT. 555.
fuscipennis MACQ. (*All.*) 582.
fuscipennis MACQ. (*Anth.*) 717.
fuscipennis MACQ. (*Er.*) 425.
fuscipennis MACQ. (*Ma.*) 283.
fuscipennis MACQ. (*Phor.*) 319.
fuscipennis MACQ. (*Sch.*) 458.
fuscipennis R.-D. (*Ch.*) 403.
fuscipennis R.-D. (*Del.*) 471.
fuscipennis R.-D. (*Ee.*) 251.
fuscipennis R.-D. (*Ga.*) 363.
fuscipennis R.-D. (*Sar.*) 479.
fuscipennis R.-D. (*Sar.*) 479.
fuscipennis v. ROS. 607.
fuscipennis ZETT. 16.
fuscipes MACQ. 172.
fuscipes R.-D. 573.
fuscipes STROBL. (*Phor.*) 171.
fuscipes STROBL. (*Pip.*) 165

- fuscipes* ZETT. (Ar.) 633.
fuscipes ZETT. (Pip.) 161.
fuscisquama ROND. 368.
fuscilaris SCHUMM. 154.
fuscula FALL. 659.
fuscula MEIG. 703.
fusculus ZETT. 161.
fuscum G.-T. 149.
fuscus HARR. 105.
fuscus PALM. 59.
fuscus Scop. 102.
futilis R.-D. 272.
futilis WALK. 627.
futilis ZETT. 351.
gagatea Lw. 28.
gagatea R.-D. (Anth.) 728.
gagatea R.-D. (Arr.) 396.
gagatea R.-D. (Er.) 251.
gagatea R.-D. (Er.) 251.
gagatea R.-D. (Frer.) 559.
gagatea R.-D. (Hydr.) 652.
gagatea R.-D. (Leuc.) 717.
gagatea R.-D. (Mor.) 601.
gagatea R.-D. (Myl.) 421.
gagatea R.-D. (Phy.) 462.
gagatea R.-D. (Poll.) 529.
gagatea R.-D. (Rhin.) 465.
gagatea R.-D. (Rhin.) 465.
gagatea R.-D. (Sar.) 480.
gagatea R.-D. (Tach.) 343.
gagatea R.-D. (Tach.) 348.
gagatea R.-D. (Tam.) 568.
gagatea R.-D. (Wag.) 374.
gagatina MEIG. 465.
galeata HAL. 182.
Galeazzii ROND. 458.
galii B. B. 227.
gallica R.-D. 368.
Garbiglietti ROND. 691.
Garibaldii ROND. 157.
gastricus SCHWAR. 594.
Gazagnairei MEIX. 212.
Gemellarii ROND. 55.
gemina BECK. 28.
gemina WULF. 679.
gemina R.-D. 534.
geminata ZETT. (Ar.) 717.
geminata Scop. 76.
gemmata R.-D. (Luc.) 534.
gemmata R.-D. (Luc.) 540.
genarum ZETT. (Anth.) 738.
genarum ZETT. (Er.) 251.
genarum ZETT. (On.) 551.
Genci ROND. 403.
genibarbis MEIG. 462.
geniculata BOUCHÉ. 703.
geniculata CURT. 8.
geniculata DEG. 381.
geniculata FALL. (Buc.) 381.
geniculata FALL. (Musc.) 738.
geniculata MACQ. (Anth.) 717.
geniculata MACQ. (Chorl.) 717.
geniculata MEIG. (Neo.) 86.
geniculata MEIG. (Oyt.) 16.
geniculata MEIG. (Pi.) 8.
geniculata R.-D. 612.
geniculata v. Ros. 23.
geniculata ZETT. (Chil.) 31.
geniculata ZETT. (Pi.) 7.
geniculatus CURT. 5.
geniculatus MEIG. 161.
geniculatus ZETT. (Pip.) 162.
geniculatus ZETT. (Pla.) 44.
geniculatus ZETT. (Psc.) 415.
genistae PAND. 407.
gentianae PAND. 717.
gentilis R.-D. (Az.) 667.
gentilis R.-D. (Car.) 235.
gentilis R.-D. (Cly.) 571.
gentilis R.-D. (Euph.) 609.
gentilis R.-D. (On.) 550.
gentilis R.-D. (On.) 552.
gentilis R.-D. (Tach.) 343.
gentilis ROND. 499.
genualis ROND. 739.
genualis STEIN. 659.
genupuneta STEIN. 703.
genurufa PAND. 671.
geometae BR. 291.
Goeffroyi R.-D. 475.
germana MEIG. 659.
germana R.-D. (Del.) 717.
germana R.-D. (Myl.) 422.
germana R.-D. (On.) 552.
germana R.-D. (Phr.) 272.
germana R.-D. (Robr.) 640.
germana R.-D. (Sar.) 475.
germana R.-D. (Tach.) 344.
germanica R.-D. 405.
Germari MEIG. 505.
Gerstaeckeri BECK. 28.
gesnerioides R.-D. 470.
gibbicornis MACQ. 251.
gibbosa BECK. 28.
gibbera MEIG. 667.
gigantea ZETT. 28.
gigas PORTSCH. 589.
gigas ROSSI. 142.
gilva HART. 227.
gilva PAND. 703.
gilva ZETT. 703.
gilvipes ZETT. 27.
gilvocana PAND. 717.
Gimmerthali FISCH. 351.
Giraudii EGG. 176.
Girschneri SCHNABL. 619.
glabra MEIG. 500.
glabra R.-D. 717.
glabrata MEIG. (Chi.) 37.
glabrata MEIG. (Nem.) 223.
glabrata R.-D. (Ill.) 581.
glabrata R.-D. (Linn.) 204.
glabrata R.-D. (Luc.) 540.
glabrata R.-D. (Phr.) 272.
glabrata SCHN. 229.
glabricula FALL. 652.
glabricula MEADE. 652.
glabricula MEIG. 403.
glabricula ZETT. 652.
glabrivertris WULF. 503.
glacialis BOHEM. 551.
glacialis Lw. 107.
glacialis ROND. 632.
glacialis STROBL. 619.
glacialis ZETT. 726.
gladiatrix PAND. 493.
glauca MEIG. 243.
glaucescens R.-D. 207.
glaucescens STROBL. 717.

- glaucescens* ZETT. 659.
glauca PANZ. 55.
glaucaus FABR. 54.
glaucaus L. 53.
glaucoptera STROBL. 717.
glauca FALL. 53.
glaucaus MEIG. 54.
glirina PAND. 243.
glirina ROND. (*Chil.*) 33.
glirina ROND. (*Er.*) 244.
glitina ROND. (*Ses.*) 415.
globosa FABR. 567.
globulara MEIG. 505.
globulipes BECK. 28.
globulicentris ZETT. 739.
globulus MEIG. 568.
gloriosa R.-D. 603.
glossatorum ROND. 335.
gnava MEIG. (*Anth.*) 717.
gnava MEIG. (*Car.*) 236.
gnava R.-D. 605.
Gobertii MIK. 619.
gonadesma LW. 16.
goniaciformis MEIG. 358.
goniacoides ZETT. 357.
Gouraldi R.-D. (*Peg.*) 703.
Gouraldi R.-D. (*Phor.*) 319.
gracile MEIG. 51.
gracilis EGG. 303.
gracilis LW. 428.
gracilis R.-D. (*Car.*) 235.
gracilis R.-D. (*Com.*) 310.
gracilis R.-D. (*Der.*) 445.
gracilis R.-D. (*Hydr.*) 652.
gracilis R.-D. (*Met.*) 511.
gracilis R.-D. (*Pty.*) 301.
gracilis WIED. 655.
gracilis ZETT. 686.
gracilipes MEIG. 172.
gracilistylum MACQ. 351.
gracea B. B. 360.
gracea V. RON. 443.
gracum WALK. 149.
graceus LW. 119.
graceus WALK. 116.
graminicola STROBL. 666.
graminicola ZETT. 666.
gramma MEIG. 316.
grandaeva ZETT. 619.
grandicornis MEIG. (*Eu.*) 137.
grandicornis MEIG. (*Chr.*) 17.
grandicornis ZETT. 400.
grandigena PAND. 325.
grandis B. B. 330.
grandis EGG. (*Tach.*) 335.
grandis EGG. (*Xy.*) 569.
grandis MEIG. 133.
grandis R.-D. 336.
grandis ROND. 317.
grandis SCHN. 568.
grandis ZETT. 354.
grandistyla PAND. 382.
granditarsa FORST. 47.
granulata BECK. 28.
grata R.-D. (*Cyr.*) 437.
grata R.-D. (*Euph.*) 609.
grata R.-D. (*Mei.*) 324.
grata R.-D. (*Phr.*) 272.
grata WIED. 739.
gratella R.-D. 581.
gratiosa B. B. 288.
gratiosa MEIG. 293.
gratiosa PAND. 739.
gratiosa R.-D. (*Euph.*) 609.
gratiosa R.-D. (*Luc.*) 540.
gravicornis LW. 375.
gracipes ROSSI. 117.
grisea FABR. 448.
grisea FALL. (*Macq.*) 406.
grisea FALL. (*Musc.*) 691.
grisea KOW. 333.
grisea MEIG. (*Anth.*) 699.
grisea MEIG. (*Ses.*) 508.
grisea MEIG. (*Teph.*) 467.
grisea MEIG. (*Tr.*) 438.
grisea PAND. 568.
grisea PERR. 415.
grisea R.-D. (*Act.*) 389.
grisea R.-D. (*Act.*) 389.
grisea R.-D. (*Am.*) 659.
grisea R.-D. (*Bill.*) 441.
grisea R.-D. (*Cuc.*) 671.
grisea R.-D. (*Der.*) 416.
grisea R.-D. (*Din.*) 450.
grisea R.-D. (*Er.*) 296.
grisea R.-D. (*Er.*) 251.
grisea R.-D. (*Leuc.*) 699.
grisea R.-D. (*Lyg.*) 221.
grisea R.-D. (*Mas.*) 283.
grisea R.-D. (*Met.*) 512.
grisea R.-D. (*Musc.*) 614.
grisea R.-D. (*Phorb.*) 703.
grisea R.-D. (*Sar.*) 470.
grisea R.-D. (*Sar.*) 475.
grisea R.-D. (*Sar.*) 479.
grisea R.-D. (*Teph.*) 468.
grisea R.-D. (*Tach.*) 344.
grisea R.-D. (*Tach.*) 348.
grisea R.-D. (*Tam.*) 568.
grisea SCHN. 424.
grisea STEIN. 659.
grisea WALK. 697.
grisea ZETT. (*Ac.*) 333.
grisea ZETT. (*All.*) 580.
griseicollis MEIG. 424.
griseifrons MACQ. 251.
griseifrons STROBL. 161.
griseipennis VERR. 161.
griseiventris LW. 28.
griseila BECK. 28.
grisella R.-D. (*Mei.*) 324.
grisella R.-D. (*Musc.*) 603.
grisella R.-D. (*Poll.*) 527.
grisella R.-D. (*Phr.*) 272.
grisella R.-D. (*Sar.*) 479.
grisella R.-D. (*Sar.*) 479.
grisella R.-D. (*Teph.*) 468.
grisella ROND. (*Chort.*) 718.
grisella ROND. (*Zen.*) 279.
griseola FALL. (*Macr.*) 520.
griseola FALL. (*Scat.*) 746.
griseolum ZETT. 505.
griseosens FALL. 449.
griseosens MEIG. 340.
griseosens R.-D. (*Der.*) 446.
griseosens R.-D. (*Lyd.*) 292.
griseosens R.-D. (*Macq.*) 407.
griseosens R.-D. (*Mei.*) 322.
griseosens R.-D. (*Myl.*) 451.
griseosens R.-D. (*Phr.*) 272.
griseosens R.-D. (*Sar.*) 470.

- griseusculus* R.-D. (*Sar.*) 475.
groenlandica LUNDB. (*Oph.*) 655.
groenlandica LUNDB. (*Pho.*) 170.
groenlandica ZETT. 530.
groenlandicus O. F. 107.
grossa B. B. 241.
grossa BRUSCHKE 703.
grossa FALL. 28.
grossa L. 193.
grossa SCHRANK 412.
grossicuda STROBL. 731.
grossicornis ZETT. 259.
grossificationis L. 461.
grossioria R.-D. (*Tach.*) 344.
grossioria R.-D. (*Tach.*) 344.
grossulariæ MEG. 64.
grylloetona Lw. 493.
guidanensis PORTSCH. 119.
Guerinella R.-D. 272.
Guerini R.-D. 310.
guttata MEG. 9.
guttata WALK. (*Go.*) 365.
guttata WALK. (*Sar.*) 495.
guttatus FALL. 65.
guttifrons ZETT. 703.
gymnodiscus B. B. 259.
gymnophorina ZETT. 169.
gymnophthalma MACQ. 407.
gymnophthalmum G.-T. 149.
gymnosomea ROND. 603.
gyrovaga ROND. 297.
Haberlandti SCHN. 718.
habilis MACQ. 251.
halenæ R.-D. 316.
haematodes FABR. 130.
haematodes MEG. (*Phoen.*) 427.
haematodes MEG. (*Sar.*) 481.
haematara R.-D. 484.
haemorrhagica MEG. 493.
haemorrhœa MEG. 482.
haemorrhœa PAND. 703.
haemorrhœa ROND. 203.
haemorrhœa ZETT. 703.
haemorrhoidale CLARK 588.
haemorrhoidalis FALL. (*Micr.*) 206.
haemorrhoidalis FALL. (*Sar.*) 483.
haemorrhoidalis GM. 594.
haemorrhoidalis L. 595.
haemorrhoidalis MEG. (*Cr.*) 125.
haemorrhoidalis ZETT. (*Mi.*) 207.
haemorrhoidalis ZETT. (*Pi.*) 162.
haemorrhoidalis ZETT. (*Vo.*) 91.
haemorrhoidata SCHN. 203.
haemorrhous MEG. 5.
Halidayanum ROND. 437.
halophora BECK. 679.
halterata PANZ. 497.
halterata SCHN. 439.
halterata STEIN. 619.
halterata ZETT. 399.
halteratus MEG. 162.
hamata FALL. 631.
hamata MACQ. 659.
hamata MEG. 581.
Hanlleschi B.B. (*Par.*) 260.
Hanlleschi B.B. (*Wag.*) 375.
hannoniensis MACQ. 283.
harpar PAND. 492.
Hartigii MIK. et W. 276.
Hartigii RATZ. 351.
hastata MEG. 85.
hauariensis WIED. 544.
haustellata R.-D. 413.
hebes FALL. 368.
hebes R.-D. 482.
hebes ROND. 367.
helicivora DUF. 170.
helicivora GOUR. 460.
Helleri PALM. 579.
helluo FABR. 571.
helveta R.-D. 571.
helveta MEG. 571.
hemichaeta B. B. 397.
hemiptera FABR. 577.
hemiptera PANZ. 574.
hemisphaerica R.-D. (*Per.*) 294.
hemisphaerica R.-D. (*Phr.*) 256.
hemisphaerica R.-D. (*Sar.*) 482.
hemisphaericum GEOFFR. 559.
hemistylgosa PAND. 285.
Henricii SCHNABL. 108.
heraclellæ BORCHÉ. 180.
heraclellæ STROBL. 179.
heraclei MEG. 272.
heraclei R.-D. 204.
herbaria R.-D. (*Sar.*) 475.
herbaria R.-D. (*Sar.*) 475.
herbicola R.-D. 718.
heryniæ Lw. 29.
Heringii STROBL. 8.
Heringi ZETT. 6.
herosia ROND. 660.
heterocera MACQ. 199.
heterocera R.-D. 374.
heteroneura MEG. 517.
heteropalpa MACQ. 465.
heteroptera MACQ. 587.
hians ZETT. 628.
hiemalis DARLE. 169.
hiemalis R.-D. (*Rhi.*) 166.
hiemalis ROND. (*Pho.*) 172.
hieroglyphica MEG. 74.
hilarella R.-D. (*Pty.*) 301.
hilarella R.-D. (*Tach.*) 344.
hilarella ZETT. (*Ar.*) 718.
hilarella ZETT. (*Hil.*) 514.
hilaris FALL. 696.
hilaris MEG. 696.
hilaris R.-D. (*Ev.*) 244.
hilaris R.-D. (*Ev.*) 251.
hilaris R.-D. (*Lu.*) 540.
hilaris R.-D. (*Mei.*) 322.
hilaris R.-D. (*Met.*) 512.
hilaris R.-D. (*On.*) 552.
hilaris R.-D. (*Phor.*) 307.
hilaris R.-D. (*Phr.*) 272.
hilaris R.-D. (*Sar.*) 475.
hilaris R.-D. (*Sar.*) 479.

- hilaris* R.-D. (*Tach.*) 344.
hilaris ZETT. 72.
 Hillii STROBL. 371.
himaetopus PANZ. 24.
hirsuta DOX. 190.
hirsuta MACQ. (*De.*) 445.
hirsuta MACQ. (*Hist.*) 359.
hirsuta O.-S. 272.
hirsutulus ZETT. 628.
hirta BIG. 263.
hirta CURT. 202.
hirta MACQ. 351.
hirta R.-D. 359.
hirtella Lw. 19.
hirtella R.-D. 283.
hirticeps FALL. 652.
hirticeps Lw. 65.
hirticeps STEIN. 660.
hirticeps STROBL. 631.
hirticeps VERR. 187.
hirticeps ZETT. 726.
hirticornis ZETT. 459.
hirtierura MEADE. 615.
hirtierura ROND. (*Chort.*) 718.
hirtierura ROND. (*Spil.*) 640.
hirtierus PAND. 484.
hirtipes WIED. 484.
hirtipilis PAND. 244.
hirticentris BIG. 31.
hirtulus ZETT. 628.
hispanica BIG. 660.
hispanica STROBL. 683.
hispanicuse STEIN. 666.
hispidula R.-D. 337.
histricina ROND. 718.
histrisio MEIG. 212.
histrisio ZETT. 696.
Hochhuthii GIMM. 93.
Hoffmannseggii MEIG. 185.
 Holmgreni BOHEM. 703.
holosericea FABR. 569.
holosericea MEIG. 187.
holosericea R.-D. 573.
holosericeus BECK. 164.
holosericeus MEIG. 167.
honesta MEIG. 649.
honesta R.-D. (*Er.*) 248.
honesta R.-D. (*Phr.*) 272.
honesta R.-D. (*Pty.*) 302.
honesta R.-D. (*Pty.*) 302.
honesta R.-D. (*Tach.*) 344.
honesta ROND. 29.
horrus BECK. 162.
hortense MEIG. 145.
hortensis MEIG. 286.
hortensis R.-D. (*Eg.*) 691.
hortensis R.-D. (*Phr.*) 272.
hortensis R.-D. (*Poll.*) 527.
horticola DEG. 104.
horticola R.-D. (*Mor.*) 601.
horticola R.-D. (*Sar.*) 482.
hortorum FALL. 601.
hortorum HAL. 601.
hortorum MEIG. 102.
hortorum R.-D. (*Mic.*) 322.
hortorum R.-D. (*Tach.*) 344.
hortulana MEIG. (*Care.*) 237.
hortulana MEIG. (*Er.*) 240.
hortulana R.-D. 520.
hortulana WIED. 601.
hospes MEIG. 414.
hottentota R.-D. 465.
humeralis Lw. 184.
humeralis R.-D. (*Act.*) 389.
humeralis R.-D. (*Bac.*) 383.
humeralis R.-D. (*Limn.*) 204.
humeralis R.-D. (*Myd.*) 640.
humeralis R.-D. (*Phor.*) 703.
humeralis R.-D. (*Rohr.*) 619.
humeralis v. Ros. 704.
humeralis WIED. 676.
humeralis ZETT. (*Luth.*) 640.
humeralis ZETT. (*Aphr.*) 176.
humeralis ZETT. (*Rhin.*) 465.
humercella STEIN. 619.
humercella STROBL. 718.
humercella ZETT. 718.
humercella ZETT. 728.
humiliceps PAND. 244.
humilis MEIG. (*Coen.*) 739.
humilis MEIG. (*Sar.*) 488.
humilis R.-D. (*Mot.*) 512.
humilis R.-D. (*Pal.*) 312.
humilis R.-D. (*Phor.*) 307.
humilis R.-D. (*Pty.*) 300.
humilis R.-D. (*Sar.*) 475.
humilis R.-D. (*Sar.*) 486.
humilis ZETT. 671.
hungarica B. B. 494.
hungarica THAL. 464.
hungarica VIL. 430.
Hyalala WALK. 445.
hyalinata MEIG. 172.
hyalinata R.-D. (*Ern.*) 218.
hyalinata R.-D. (*Meg.*) 499.
hyalinata R.-D. (*Pal.*) 312.
hyalinata ZETT. (*Er.*) 251.
hyalinata ZETT. (*Steer.*) 456.
hyalinatus FALL. (*Musc.*) 629.
hyalinatus FALL. 51.
hyalinipennis THOMS. 679.
hyalipennis FALL. 463.
hyalipennis STROBL. 686.
hyalipennis ZETT. 686.
hyalipenne G.-T. 150.
hyalipennis MACQ. 499.
hyalipennis R.-D. (*All.*) 583.
hyalipennis R.-D. (*Sar.*) 475.
hyalipennis ZETT. (*Er.*) 243.
hyalipennis ZETT. (*Pi.*) 11.
hybrida ROND. 91.
hybrida SCHNABL. 619.
hybridus Lw. 108.
hydrocampae R.-D. 292.
hydrocotilis R.-D. 739.
hydromyzina FALL. 679.
hydrophorina POK. 697.
hymnalis R.-D. 692.
hylemyiaeformis PORTSCH. 502.
hylemyoidea R.-D. 686.
hyoseyami PAND. 704.
hyoseyami PANZ. 704.
hypena BECK. 29.
hyperborea BOHEM. (*Er.*) 671.
hyperborea BOH. (*Scat.*) 746.
hyperboreum HOLMGR. 49.
hyperboreus STAEG. 44.
hyperboreus WILL. 43.
hypomontana ROND. 380.
hystrix BRISCHKE. 718.

- hystrix* OL. 433.
hystrix PAND. 484.
hystrix ZETT. 400.
icterica HOLMGR. 718.
idiotica MEIG. 222.
ignava FALL. 129.
ignava PANZ. 129.
ignea R.-D. 740.
ignita R.-D. 540.
ignita R.-D. (*Pyr.*) 607.
ignobilis MEIG. 214.
ignobilis ZETT. (*Anth.*) 640.
ignobilis ZETT. (*Ar.*) 686.
ignota B. B. 366.
ignota FERR. 292.
ignota R.-D. 272.
ignota ROND. 718.
ichneumonca SCHRANK. 87.
iliaca RATZ. 261.
illinoensis ROBERTS. 232.
illinoensis T.-T. 382.
illocata WALK. 728.
illota HOLMGR. 671.
illustrata HARR. 29.
illustrata MEIG. (*Lac.*) 542.
illustris MEIG. (*Tach.*) 335.
illustris R.-D. 197.
imbelle HARR. 149.
imberbis WIED. 227.
imberbis ZETT. 516.
imbricatus WALK. 566.
imbrida ROND. 729.
Imhoffii MACQ. 439.
immaculata (*Limos.*) 739.
immaculata R.-D. (*Mei.*) 322.
immaculata R.-D. (*Myl.*) 420.
immaculata R.-D. (*Near.*) 384.
immaculata STROBL. (*Pho.*) 170.
immaculata STROBL. (*P.*) 12.
immaculatum MACQ. 505.
immarginatus MACQ. 135.
immarginatus ZETT. 44.
immatura ZETT. 692.
immissa WALK. 283.
immutata PAND. 246.
impar ZETT. 629.
impatiens R.-D. (*Eru.*) 213.
impatiens R.-D. (*Lac.*) 540.
impatiens R.-D. (*Mei.*) 324.
impatiens R.-D. (*Phr.*) 272.
impatiens R.-D. (*Wag.*) 374.
impavida MACQ. 251.
impavida R.-D. 241.
impavida ROSSI. 521.
impedita PAND. 747.
imperatoriae MACQ. 359.
imperatoriae R.-D. 443.
imperfecta R.-D. 406.
impera LW. 652.
impigra ROSSI. 131.
implicatus MEIG. 72.
importuna HAL. 601.
impotens ROND. 335.
impressa LW. 30.
impressa WULF. 370.
impressitarsis MACQ. 692.
imprudens R.-D. 272.
impudicollis PAND. 718.
impudens BECK. 30.
impudica ROND. 718.
impudicum LW. 147.
impudicus ROND. 207.
impulsa WALK. 640.
impuncta FALL. 640.
impuncta ZETT. 640.
impunctata R.-D. (*Ar.*) 640.
impunctata R.-D. (*Myl.*) 641.
impunctata ROND. 495.
impura ZETT. 660.
inacqua PAND. 718.
inacqualis ROND. 356.
inanis FABR. 95.
inanis FALL. (*Myl.*) 421.
inanis FALL. (*Musc.*) 632.
inanis L. 92.
inanis R.-D. 344.
inca BIG. 106.
incana B. B. 395.
incana BRISCHKE. 718.
incana FALL. 325.
incana R.-D. (*Maer.*) 520.
incana R.-D. (*Tach.*) 344.
incana WIED. 619.
incanta R.-D. 483.
incedens PAND. 228.
incedens ROND. 227.
incerta BIG. 365.
incerta MEADE. 383.
incerta WIED. 73.
incestuosa ROND. 91.
incisa LW. (*Chr.*) 19.
incisa LW. (*Sph.*) 74.
incisa MACQ. 351.
incisa WALK. 283.
incisilobata PAND. 484.
incisiva STERN. 705.
incisivalva STROBL. 697.
incisuralis LW. 104.
incisuralis MACQ. (*Deg.*) 400.
incisuralis MACQ. (*Hyp.*) 397.
incisuralis MACQ. (*Pl.*) 454.
incisurata ZETT. (*Ar.*) 660.
incisurata ZETT. 501.
inclinata MACQ. 251.
inclita R.-D. (*Lac.*) 540.
inclita R.-D. (*Lac.*) 534.
inclita R.-D. (*Scr.*) 484.
inclusa HART. 285.
incognita ROND. 718.
incognitus VERR. 162.
incompleta B. B. 565.
incompleta PAND. 401.
incompta MEIG. (*Anth.*) 652.
incompta MEIG. (*Coen.*) 739.
incompta MEIG. (*Set.*) 509.
incompta MEIG. (*Vir.*) 326.
inconfessa WALK. 641.
inconspecta R.-D. 214.
inconspicua MEIG. (*Hyl.*) 641.
inconspicua MEIG. (*St.*) 227.
inconspicua ZETT. 619.
inconstans R.-D. 483.
incrassata MEIG. 174.
incrassata PAND. 564.
incurva MACQ. 516.
incurva ZETT. 395.
incurvata BOUCHÉ. 641.
indivisa WALK. 619.

- indigena* PAND. 216.
indistincta ROND. 641.
inblata PAND. 294.
incipita MEIG. 278.
inermella ZETT. 718.
inermis BRAUER. 595.
inermis MACQ. 119.
inermis R.-D. 652.
inermis STROBL. 489.
iners MEIG. 465.
iners R.-D. 484.
inflans ROND. 409.
infantilis ROND. 290.
infantula ROND. (*Coen.*) 739.
infantula ROND. (*Sar.*) 484.
infantula ZETT. 389.
inficans WALK. 351.
infestans WALK. 351.
infesta R.-D. 611.
infesta WILL. 232.
infima R.-D. 324.
infirma MEIG. 718.
infirma PAND. 719.
infirma ZETT. 728.
infra WALK. (*Anth.*) 641.
infixa WALK. (*Tach.*) 351.
inflata BISCH. 411.
inflata FABR. 93.
inflata ROND. 699.
inflata BOUCHÉ. 292.
inflexicornis MACQ. 351.
infumata HAL. 187.
infusca FALL. 399.
infusca R.-D. (*Er.*) 296.
infusca R.-D. (*Par.*) 314.
infusca R.-D. (*Sar.*) 479.
infusca R.-D. (*Zen.*) 279.
infuscatum LW. 149.
ingens B. B. 237.
ingenua R.-D. 534.
ingredior HARR. 534.
ingrica PORTSCH. 610.
inimica R.-D. 516.
iniqua STEIN. 705.
injusta ZETT. 641.
injusta ZETT. 641.
innocens ZETT. 629.
innocua R.-D. 322.
innocuus ZETT. 629.
innoxia MEIG. (*Ar.*) 396.
innoxia MEIG. (*Hyl.*) 641.
innocua R.-D. (*Phr.*) 272.
innocua R.-D. (*Zen.*) 278.
innupta ROND. 15.
innupta ZETT. 22.
inoportia WALK. 351.
inops R.-D. (*Ern.*) 213.
inops R.-D. (*Phr.*) 272.
inornata LW. (*Chr.*) 19.
inornata LW. (*Coen.*) 731.
inornata LW. (*Ster.*) 458.
inquinata WALK. 351.
inquinata R.-D. 344.
inquirenda ZETT. 686.
insciens PAND. 211.
insecta WALK. 365.
insecdata WALK. 351.
insidiosa R.-D. (*Call.*) 546.
insidiosa R.-D. (*Met.*) 513.
insidiosa R.-D. (*Phr.*) 272.
insidiosa R.-D. (*Tach.*) 344.
insignis EGG. 437.
insignis LW. (*Chil.*) 30.
insignis LW. (*Chr.*) 19.
insignis R.-D. 534.
insignis STEIN. 661.
insignita R.-D. 540.
insignita ZETT. 75.
insinuans MACQ. 251.
insperata PAND. 719.
instabilis ROND. 299.
insularis BIG. 562.
insularis KUNTZE. 692.
insularis ROND. 619.
insusepta WALK. 319.
intacta R.-D. (*Mei.*) 324.
intacta R.-D. (*Phr.*) 272.
intacta R.-D. (*Tach.*) 344.
intacta WALK. 351.
intaminata WALK. 351.
integra R.-D. (*Ill.*) 580.
integra R.-D. (*Er.*) 239.
integra R.-D. (*Er.*) 241.
integra R.-D. (*Pal.*) 312.
integra R.-D. (*Phr.*) 272.
integra R.-D. (*Sar.*) 475.
intercedens WALK. 351.
intercepta WALK. 462.
interclusa WALK. 352.
interclusa bis WALK. 351.
interflua PAND. 719.
interflua PAND. 641.
interlapsa WALK. 457.
interlatens WK. (*Anth.*) 619.
interlatens WK. (*Tach.*) 352.
intermedia BRAUER. 404.
intermedia B. B. 244.
intermedia FALL. 732.
intermedia LW. 55.
intermedia LUNDB. 746.
intermedia MACQ. (*Dio.*) 330.
intermedia MACQ. (*Poll.*) 525.
intermedia MEIG. (*Anth.*) 692.
intermedia MEIG. 430.
intermedia PAND. 739.
intermedia PORTSCH. (*Bill.*) 441.
intermedia PORTSCH. (*Wobl.*) 493.
intermedia R.-D. (*Ech.*) 193.
intermedia R.-D. (*Sar.*) 475.
intermedia VILL. 641.
intermedia ZETT. (*Ern.*) 212.
intermedia ZETT. (*Mei.*) 610.
intermedium LW. 559.
intermedium MEIG. 149.
intermedium WALK. 147.
intermedium ZETT. 150.
intermedius PALM. 3.
intermixta WALK. 259.
interna WALK. 251.
internea WALK. 312.
interposita ROND. 686.
interpunctus HARR. 97 et 112, *errata*.
interumpens WALK. 65.
interrupta HAL. 8.
interrupta MACQ. (*De.*) 446.
interrupta MACQ. (*Linn.*) 671.
interrupta MACQ. (*Lyl.*) 290.

- interrupta MACQ. (*Phor.*) 319.
 interrupta MACQ. (*Sph.*) 516.
 interrupta MEIG. (*Nes.*) 86.
 interrupta MEIG. (*Oc.*) 431.
interrupta R.-D. (*Ech.*) 193.
interrupta R.-D. (*Rhac.*) 379.
interrupta ROND. 362.
interrupta ZETT. (*Aph.*) 177.
interrupta ZETT. (*Oc.*) 428.
interrupta ZETT. (*Vo.*) 370.
 interruptella ZETT. (*Anth.*) 705.
 interruptella ZTT. (*Try.*) 260.
interruptilinea ZETT. 719.
interruptus GIL. 61.
intersecta MEADE. 705.
intersecta MEIG. 719.
intersecta PAND. 719.
intersecta R.-D. 581.
intersecta ROND. 719.
intersecta STROBL. 719.
intersecta WALK. 283.
intersecta bis WALK. 319.
intersecta ZETT. 719.
intersecta WALK. 259.
interventum HARR. 461.
intestinalis DEG. 594.
intonsa LW. 30.
intacta WALK. 212.
intricaria MEIG. 496.
intricarius L. 104.
intricata MEIG. 508.
intricata ROND. 517.
intricata SAUND. 158.
intricatus MEIG. 208.
introducta WALK. 661.
intuenda ROND. 435.
inumbata MEIG. 239.
inuncta ZETT. 641.
invaria WALK. 352.
investigator HARR. 209.
invisa ZETT. 705.
invisito HARR. 76.
involuta WALK. 352.
Ipthime WALK. 352.
Iris LW. 135.
Iris MEIG. 59.
irregularis B. B. 244.
irrequieta R.-D. 312.
irrilans FABR. 612.
irritans FALL. 652.
irritans L. 612.
irritans MEIG. 652.
irritans PANZ. 448.
irrorata MEIG. 442.
irrorata R.-D. (*Tach.*) 344.
irrorata R.-D. (*Tach.*) 344.
Isapis WALK. 432.
Isis WIED. 432.
isura WALK. 661.
italica ROND. 514.
italicum ROND. 149.
italicus ROND. 119.
Jablonskii MIK. 11.
 Jacobaeae HARDY. 719.
Jakovlewii PORTSCH. 189.
janithrix HART. 308.
japonica BIG. (*Lac.*) 534.
japonica BIG. (*Vol.*) 94.
japonicus LW. 65.
Jaroschewskii SCHNABL. 619.
Jaroschewskyi PORT. 361.
jeddensis BIG. 537.
jeddona BIG. 94.
jejana R.-D. 344.
jocosa R.-D. 344.
jocosa R.-D. 512.
jorora R.-D. 310.
jubarum MEIG. 597.
jucunda MEIG. 237.
jucunda R.-D. (*Euph.*) 609.
jucunda R.-D. (*Pty.*) 302.
Judicariae POK. 719.
judicata R.-D. 272.
jugicola POK. 728.
jugorum EGG. 105.
jugorum STROBL. 199.
Jumentarum MEIG. 596.
juncorum R.-D. 739.
jussa R.-D. 272.
juvenilis BRAUER. 497.
juvenilis R.-D. (*Linn.*) 204.
juvenilis R.-D. (*Tach.*) 344.
juvenilis ROND. 290.
juvenis ROND. (*La.*) 540.
juvenis ROND. (*S.*) 485.
Kaufmanni B. B. 402.
Kimakowiczi STROBL. 84.
Klugii MEIG. 81.
Knerii MEIG. 115.
Koslöwi PORTSCH. 590.
Kowarzi BECK. (*Lisp.*) 679.
Kowarzi BECK. (*Pip.*) 162.
Kowarzi NOW. 393.
Kowarzii SCHNABL. 619.
Kowarzii STROBL. 726.
Kowarzii VERR. 661.
Kriechbaumeri SCHN. 579.
Kuntzei KRAM. 471.
labialis R.-D. (*La.*) 540.
labialis R.-D. (*Poll.*) 527.
labialis R.-D. (*Sar.*) 475.
labialis R.-D. (*Sar.*) 483.
labiata FABR. 512.
labiata R.-D. 719.
labiatafium VERR. 65.
labiosa BOHEM. 671.
lacera ROND. 432.
laceras LW. 2.
lacrus MEIG. 63.
laciniata PAND. 492.
laerimans ROND. 375.
laceipalpis ZETT. 641.
laceipennis ZETT. (*Anth.*) 682.
laceipennis ZETT. (*Ar.*) 732.
lactuae BOUCHÉ. 719.
lactuarum BOUCHÉ. 719.
laeta FALL. 619.
laeta MEIG. 304.
laeta R.-D. (*Er.*) 251.
laeta R.-D. (*Musc.*) 407.
laeta R.-D. (*Marr.*) 520.
laeta R.-D. (*Pho.*) 272.
laeta R.-D. (*Pty.*) 301.
laeta R.-D. (*Sar.*) 475.
laeta R.-D. (*Tach.*) 337.
laeta R.-D. (*Tach.*) 337.

- laetabilis* ZETT. 304.
laetatoria R.-D. 534.
laetifica R.-D. 641.
laetus FABR. 79.
laevicula MACQ. (*Er.*) 252.
laevicula MACQ. (*Tach.*) 352.
laevigata L.W. 89.
laevigata MEIG. 248.
laevigata R.-D. (*Car.*) 235.
laevigata R.-D. (*Micr.*) 201.
laevigata R.-D. (*Pa.*) 312.
laevigata R.-D. (*Phr.*) 272.
laevigata R.-D. (*Zen.*) 279.
laevigatum MEIG. 50.
laevis BECK. 34.
laevis MACQ. 252.
laevis R.-D. (*La.*) 534.
laevis R.-D. (*Phr.*) 273.
laevis R.-D. (*Tach.*) 344.
laevis ROND. 525.
laeviventris LW. (*Chil.*) 30.
laeviventris LW. (*Ster.*) 456.
Lamberti R.-D. 465.
lanceolata ZETT. 739.
lanceolata STEIN. 692.
lamia MEIG. 388.
lamina SCHN. 388.
laminata ZETT. 719.
lamnifera ROND. 719.
lancolata MEIG. 87.
lancolata ZETT. 692.
Langhofferi BECK. 30.
lanigerus THOMS. 719.
lanigulosa BECK. 31.
lanio FABR. 529.
laphriformis FALL. 127.
lappae R.-D. 739.
lappona DEG. 141.
lappona L. 141.
laponica BECK. 31.
laponica ZETT. 438.
laponicus ZETT. (*Nephr.*) 158.
laponicus ZETT. (*Syr.*) 65.
laponicus WAHLB. 108.
lapponium FABR. 141.
lapponus ROND. 65.
lardaria FABR. 615.
larvarum L. 335.
larvarum PASS. 206.
larvarum R.-D. 344.
larvicola R.-D. (*Er.*) 251.
larvicola R.-D. (*Hist.*) 359.
larvicola RATZ. 352.
lasciva ZETT. 692.
lasiocampae R.-D. 282.
lasiommata L.W. 355.
lasiopa KOW. 29.
lasiophthalma MACQ. (*Law.*) 607.
lasiophthalma MACQ. (*Spil.*) 641.
lasiophthalma THOMS. 603.
lasiophthalma ZETT. 620.
lasiophthalmus ZETT. 65.
lasiops ROND. 135.
lata COQ. 547.
lata EGG. 441.
lata MACQ. 449.
lata PORTSCH. 189.
lata ZETT. 319.
latecineta BIG. 524.
laterale R.-D. 505.
lateralis BIG. 234.
lateralis FABR. 425.
lateralis FALL. (*Bess.*) 565.
lateralis FALL. (*Myl.*) 122.
lateralis FALL. (*Thel.*) 435.
lateralis MACQ. (*Met.*) 512.
lateralis MACQ. (*Musc.*) 603.
lateralis MACQ. (*Myl.*) 422.
lateralis MACQ. (*Nem.*) 223.
lateralis MACQ. (*Pip.*) 162.
lateralis MACQ. (*Ster.*) 456.
lateralis MEIG. 576.
lateralis PASZ. 433.
lateralis R.-D. (*Cly.*) 571.
lateralis R.-D. (*Ern.*) 213.
lateralis R.-D. (*Ern.*) 218.
lateralis R.-D. (*Mel.*) 324.
lateralis R.-D. (*Micr.*) 207.
lateralis R.-D. (*Phr.*) 272.
lateralis R.-D. (*Pal.*) 312.
lateralis R.-D. (*Serr.*) 190.
lateralis R.-D. (*Tach.*) 344.
lateralis R.-D. (*Tach.*) 348.
lateralis v. ROS. 739.
lateralis STEIN. 679.
lateralis ZELL. 365.
lateralis ZETT. 133.
lateritia ROND. 641.
lateritium MEIG. 565.
lateritarius MÜLL. 54.
laticella MACQ. 252.
laticeps PAND. 261.
laticincta PEER. 287.
laticornis FALL. 705.
laticornis MEIG. (*Nc.*) 384.
laticornis MEIG. (*Sar.*) 485.
laticornis R.-D. 206.
laticornis ROND. 31.
laticornis SCHN. 395.
laticornis ZETT. (*Deg.*) 400.
laticornis ZETT. (*On.*) 551.
laticus R.-D. 475.
latifacies L.W. 31.
latifasci WALK. 304.
latifasciatus MACQ. 66.
latifemorata BECK. 176.
latifrons BRAUER. (*Er.*) 425.
latifrons BRACER. (*Ern.*) 212.
latifrons B. B. 244.
latifrons EGG. 84.
latifrons FALL. 495.
latifrons L.W. (*Hel.*) 110.
latifrons L.W. (*Mi.*) 155.
latifrons L.W. (*Pol.*) 83.
latifrons MEIG. 392.
latifrons PORTSCH. 452.
latifrons R.-D. (*Germ.*) 361.
latifrons R.-D. (*Vor.*) 370.
latifrons ROND. (*Gym.*) 559.
latifrons ROND. (*Mer.*) 219.
latifrons ROND. (*Tach.*) 337.
latifrons SCHN. (*La.*) 540.
latifrons SCHN. (*Myl.*) 424.
latifrons SCHUMM. 61.
latifrons STROBL. 571.
latifrons ZETT. (*Ar.*) 719.
latifrons ZETT. (*Chil.*) 30.
latifrons ZETT. (*Wagn.*) 375.

- latigena* PAND. 489.
latimanus VERR. 43.
latimanus WALK. 44.
latimargo PAND. 194.
latipalpis STEIN. 661.
latipennis GIRSCHN. 581.
latipennis MACQ. 322.
latipennis ZETT. 719.
latipes CURT. 155.
latitarsis EGG. 14.
latitarsis MACQ. 135.
latitarsis ZETT. 705.
lativertris BRAUER. 596.
lativertris ZETT. 692.
latiusculus WALK. 66.
Latreillei R.-D. (*Gym.*) 559.
Latreillei R.-D. (*Xy.*) 569.
latro WALK. 108.
latus COQ. 66.
lauta R.-D. (*Euph.*) 609.
lauta R.-D. (*Phy.*) 302.
lauta R.-D. (*Sar.*) 486.
lauta R.-D. (*Tach.*) 344.
lautus COQ. 66.
lavandulae MACQ. 77.
lavandulae ROND. 1.
lavata BOHEM. 692.
lavata R.-D. 272.
laxiceps PAND. 244.
laxifrons ZETT. 641.
Lefeburei R.-D. 197.
lenis BECK. 31.
lenis R.-D. 540.
lenta BECK. 31.
lenta MEIG. 129.
lenticeps THOMS. 641.
lentis MEIG. 375.
leonina ROND. 739.
lepida FALL. 719.
lepida FALL. 667.
lepida MEIG. (*Anth.*) 661.
lepida MEIG. (*Lyd.*) 290.
lepida MEIG. (*Rhin.*) 465.
lepida R.-D. (*Er.*) 252.
lepida R.-D. (*Lu.*) 534.
lepida R.-D. (*Lu.*) 540.
lepida R.-D. (*On.*) 552.
lepida R.-D. (*Ph.*) 273.
lepida WIED. 661.
lepida ZETT. 719.
leporina PALL. 590.
leptiformis FALL. 184.
leptiformis ZETT. 184.
leptogaster ZETT. 692.
leptotrichopa B. B. 394.
leptotrichopa STROBL. 380.
lepturoides ZETT. 697.
lepturoides ZETT. 698.
lesinensis STROBL. 568.
Lessonae G.-T. 150.
lestremensis MACQ. 423.
Lesueurii MACQ. 65.
lethifera PAND. 278.
Letohai MIK. 518.
leucaniae KIEK. 232.
leucocephala JAENS. 509.
leucocephala LW. 679.
leucocephala ROSSL. 511.
leucosoma MEIG. 190.
leucogaster ZETT. 671.
leucogona ZETT. 7.
leucomelaena KOW. 679.
leucomelas MEIG. 396.
leucomelas WALK. 283.
leucopezza MEIG. 9.
leucophaea MEIG. 356.
leucophaea R.-D. 739.
leucophaea ROND. 236.
leucoptera MEIG. 377.
leucoptera ROND. 575.
leucoptera v. ROS. 527.
leucorrhoeus SCOP. 105.
leucospila ROND. 679.
leucospyla ROND. 679.
leucostieta MEIG. 661.
leucostoma WIED. 655.
leucosoma PANZ. 435.
leucosonus ABR. 53.
libatrix PANZ. 278.
libatrix PAND. 280.
libatrix SCOP. 76.
libera R.-D. (*Lu.*) 534.
libera R.-D. (*Ph.*) 273.
libyca CL. 591.
ligniperdae B. B. 228.
ligustica G.-T. 194.
lilaea WALK. 546.
limbata MACQ. (*Chil.*) 25.
limbata MACQ. (*Sph.*) 77.
limbata MEIG. (*Ca.*) 560.
limbata MEIG. 77.
limbata R.-D. 534.
limbata ZETT. 438.
limbatella ROND. 705.
limbatella ZETT. 705.
limbinervis MACQ. 641.
limpida R.-D. (*Sar.*) 475.
limpida R.-D. (*Tach.*) 341.
limpidipennis R.-D. (*All.*) 580.
limpidipennis R.-D. (*Car.*) 740.
limpidipennis R.-D. (*Er.*) 296.
limpidipennis R.-D. (*Lim.*) 740.
limpidipennis R.-D. (*Lu.*) 531.
limpidipennis R.-D. (*Myl.*) 641.
limpidipennis R.-D. (*Phor.*) 316.
limpidipennis R.-D. (*Sar.*) 482.
Lindemanni GIMM. 352.
lineare ZETT. 150.
linearicornis ZETT. 244.
linearis v. ROS. 33.
lineariventris ZETT. 692.
lineata FALL. 485.
lineata MACQ. 679.
lineata R.-D. (*Dio.*) 330.
lineata R.-D. (*Pha.*) 574.
lineata STEIN. 661.
lineata ZETT. 33.
lineatipes ZETT. 740.
lineatocollis ZETT. 686.
lineatum KELLN. 586.
lineatum VILL. 588.
lineatus FABR. 111.
lineatus HARR. 104.

- lineola* ZETT. 66.
lineolatae HARR. 103.
lineolata ROND. 517.
lingualis PAND. 671.
Linnigii GÜMM. 641.
linogrisea MEIG. 686.
liophilthalmus SCHIN. et EGG.
 54.
liops ROND. 135.
liquida ER. 94.
lithobii GUARD. 395.
lithosiophaga ROND. 206.
litigata PAND. 719.
*litoral*is CURT. 137.
*litoral*is DAHL. 172.
*litoral*is ROND. 444.
*litoral*is STROBL. 740.
*litoral*is ZETT. 732.
litorea FALL. (*Musc.*) 671.
litorea FALL. (*Lispa*) 679.
litorea MEIG. 641.
litorea ZETT. 671.
litorella FALL. 745.
littoralis BECK. 162.
littoralis R.-D. (*Car.*) 740.
littoralis R.-D. (*Del.*) 719.
littoralis R.-D. (*Call.*) 546.
littoralis R.-D. (*Hydr.*) 633.
littoralis R.-D. (*Limn.*) 672.
littoralis R.-D. (*Limos.*) 740.
littoralis R.-D. (*Pol.*) 620.
littoralis R.-D. (*Pyr.*) 607.
littoralis R.-D. (*Tach.*) 337.
litoraviat RATZBG. 692.
litorata LW. 455.
litorata MACQ. (*Hydr.*) 686.
litorata MACQ. (*Limn.*) 672.
litorata MEIG. 719.
litorata R.-D. (*Del.*) 692.
litorata R.-D. (*Hygl.*) 692.
litorata R.-D. (*Myd.*) 620.
licens R.-D. 475.
livida R.-D. 475.
lividiventris ZETT. 629.
lobalis THOMS. 672.
lobata MEIG. 47.
locuples R.-D. (*Ar.*) 599.
locuples R.-D. (*Er.*) 252.
locuples R.-D. (*Lu.*) 540.
 Loewi BECK. 31.
 Loewii BRAUER. 402.
 Loewii B. B. 262.
Loewii END. 549.
Loewii ROND. 515.
 Loewii SCHNABL. 589.
 Loewii ZELL. 84.
 Loewii ZETT. 74.
Loiseleti JOL. 588.
luchopteroides CURT.
longa COQ. 129.
longicauda STROBL. 719.
longicauda ZETT. 740.
longiciliata STROBL. 176.
longicollis MEIG. 679.
longicornis BOUCHÉ. 692.
longicornis B. B. (*Er.*) 304.
longicornis B. B. (*Er.*) 380.
longicornis FALL. 305.
longicornis HEND. 332.
longicornis LW. (*Chr.*) 19.
longicornis LW. (*Eam.*) 135.
longicornis MACQ. (*Er.*) 252.
longicornis MACQ. (*Sph.*) 77.
longicornis PERR. 241.
longicornis R.-D. 396.
longicornis SCHIN. 305.
longicornis STROBL. 216.
longicornis ZETT. 641.
longifacies ROND. 447.
longifila BECK. 31.
longilingua ROND. 417.
longilobata PAND. 537.
longimana EGG. 418.
longimana PAND. 427.
longimana POK. 705.
longipennis PORTSCH. 407.
longipes GMEL. 418.
longipes MEIG. 423.
longipes R.-D. (*Coep.*) 740.
longipes R.-D. (*Limn.*) 204.
longipes R.-D. (*Myi.*) 451.
longipes R.-D. (*Peg.*) 705.
longipes ROND. 425.
longipes ZETT. 629.
longipilis PAND. 720.
longiradix PAND. 384.
longirostris EGG. 448.
longirostris MACQ. (*Pf.*) 418.
longirostris MACQ. (*Mt.*) 208.
longirostris MEIG. 417.
longirostris ROND. 413.
longisquama ZETT. 740.
longitarsis MEADE. 641.
longitarsis STEIN. 740.
longisco HARR. 131.
longiuscula ROND. 679.
longiventris BECK. 31.
longula FALL. 720.
longula MEIG. 692.
longula ZETT. 31.
lophota PAND. 692.
lophyri R.-D. 285.
lota MEIG. 237.
lota PAND. 240.
Löwii SCHNABL. 589.
 Lubbocki VERB. 182.
lubrica R.-D. (*Phr.*) 273.
lubrica R.-D. (*Ply.*) 301.
lubrica R.-D. (*Ta.*) 344.
lubrica R.-D. (*Zen.*) 279.
lubricum G.-T. 147.
lucana ROND. 641.
lucens ROND. 531.
lucida MEIG. 7.
lucida SEOP. 20.
lucidiventris LW. 458.
*lucidiventr*is ZETT. 686.
lucidula LW. 603.
lucidula ZETT. 661.
lucidus LW. 135.
lucidus MEIG. 410.
lucorum FALL. 641.
lucorum HARR. 241.
lucorum L. 52.
lucorum MEIG. (*Er.*) 106.
lucorum MEIG. (*Ca.*) 234 et
 235.
luctuosa MACQ. 10.
luctuosa MEIG. (*Anth.*) 661.
luctuosa MEIG. (*Chil.*) 40.
luctuosa MEIG. (*Peg.*) 398.

- lactuosa* MEIG. (*Phor.*) 169.
lactuosa MEIG. (*Rhin.*) 466.
lactuosa R.-D. (*Ex.*) 252.
lactuosa R.-D. (*Mei.*) 324.
lactuosa R.-D. (*Phr.*) 273.
lactuosa STROBL. 178.
luceilliana ROND. 448.
lulibrina R.-D. 344.
lulibunda HOLMGR. 672.
lulibunda MACQ. 344.
lulibunda R.-D. (*C.*) 390.
lulibunda R.-D. (*Am.*) 661.
lulibunda R.-D. (*Egyle*) 728.
lulibunda R.-D. (*Ex.*) 252.
lulibunda R.-D. (*Hyp.*) 642.
lulibunda R.-D. (*W.*) 232.
lulifacies R.-D. 603.
lulifica FABR. 603.
lulio ZETT. 352.
lugens MEIG. 374.
lugens ROSSI. 128.
lugens ZETT. 661.
lugens ZETT. 661.
Luggeri T.-T. 512.
lugubrina STROBL. 661.
lugubrina ZETT. (*L.*) 661.
lugubrina ZETT. (*Rhin.*) 466.
lugubris A. COSTA. 48.
lugubris FABR. 10.
lugubris MACQ. 499.
lugubris MEIG. (*Anth.*) 620.
lugubris MEIG. (*Phor.*) 170.
lugubris MEIG. (*Try.*) 260.
lugubris PEER. 83.
lugubris R.-D. (*Sar.*) 475.
lugubris R.-D. (*Sar.*) 479.
lugubris ROND. 576.
lugubris ZETT. (*Chil.*) 34.
lugubris ZETT. (*Ste.*) 477.
lunbaris MEIG. 417.
lunata FABR. 523.
lunata MEIG. 9.
lunatifrons ZETT. 705.
lunatus WIED. 57.
lunatus FABR. 135.
luniger MEIG. 66.
lunda VILL. 104.
lunulatum BRAUER. 149.
lunulatus BECK. 67.
lunulatus MEIG. (*Eam.*) 138.
lunulatus MEIG. (*Hel.*) 110.
lunulatus MEIG. (*Syr.*) 67.
lunulatus ZETT. 72.
luperinae R.-D. 374.
lupida FABR. 189.
lurida FALL. 214.
lurida ROSSI. 363.
lurida SCHRANK. 433.
lurida ZETT. 705.
lusatica KRAM. 480.
lusitanea MEIG. 365.
lusitanicus MEIG. 82.
lusoria MEIG. 344.
lusoria R.-D. (*Mor.*) 601.
lusoria R.-D. (*Phr.*) 273.
lusoria R.-D. (*Sar.*) 475.
lusoria R.-D. (*Sar.*) 475.
lutea MEIG. 176.
lutea SCHIX. 177.
luteicauda R.-D. 480.
luteicornis ZETT. 33.
luteifrons R.-D. 468.
luteipalpis R.-D. (*Ex.*) 252.
luteipalpis R.-D. (*St.*) 225.
luteipes R.-D. (*L.*) 642.
luteipes R.-D. (*Hyl.*) 692.
luteisquama PAND. 501.
luteisquama ZETT. 620.
luteitarsis ZETT. 10.
luteola COQ. 190.
luteola FABR. 524.
luteola GM. 122.
lutescens CURT. 188.
lutescens MACQ. (*Ex.*) 252.
lutescens MACQ. (*Mas.*) 283.
lutescens R.-D. (*Met.*) 511.
lutescens R.-D. (*Ta.*) 344.
lychnidis KALT. 692.
lyra HARR. 105.
lyrata ZETT. 446.
macellaria HAL. 525.
machacropsis B. B. 292.
macilentus MEIG. 59.
Macquarti G.-T. 193.
Macquarti Lw. (*Chr.*) 19.
Macquarti Lw. (*Pla.*) 114.
Macquarti R.-D. (*Ex.*) 252.
Macquarti R.-D. (*Mill.*) 1505.
Macquarti R.-D. (*Pty.*) 301.
Macquarti R.-D. (*Sar.*) 475.
Macquarti R.-D. (*Vor.*) 372.
Macquarti R.-D. (*Zen.*) 278.
Macquartii ROND. 153.
Macquarti STAEG. 667.
Macquarti VERR. 19.
Macquartina R.-D. 221.
macra MEIG. 705.
macrocephala HARR. 90.
macrocera MACQ. (*Cl.*) 572.
macrocera MACQ. (*Ex.*) 252.
macrocera R.-D. (*Hel.*) 393.
macrocera R.-D. (*Ta.*) 337.
macrochela ROND. 359.
macroglossa HOLMGR. 740.
macroglossae R.-D. 337.
macromera R.-D. 222.
macronychia B. B. 444.
macronyx B. B. 502.
macrophthalmia BOUCHE. 661.
macrophthalmia Lw. 441.
macrops B. B. 280.
macrops PAND. 672.
macfura R.-D. 252.
macula ZETT. 720.
macularia WIED. 194.
macularis THOMS. 744.
macularis WIED. 740.
macularis ZETT. 67.
maculata FALL. (*Chil.*) 32.
maculata FALL. (*Ple.*) 454.
maculata MACQ. (*Hidr.*) 686.
maculata MACQ. (*Neo.*) 87.
maculata MEIG. (*Nem.*) 258.
maculata MEIG. (*Phor.*) 170.
maculata MEIG. (*Sar.*) 495.
maculata MEIG. (*Pal.*) 312.
maculata R.-D. (*Pal.*) 312.
maculata R.-D. (*Phr.*) 273.
maculata R.-D. (*Ta.*) 344.
maculata R.-D. (*Thel.*) 436.

- maculata* ROND. 523.
maculata Scop. 599.
maculata STEIN. 705.
maculata STROBL. (*Ca.*) 560.
maculata STROBL. (*Char.*) 439.
maculata STROBL. (*Gra.*) 332.
maculata WALK. 82.
maculata WIED. 590.
maculata ZETT. (*Bu.*) 381.
maculata ZETT. (*Pi.*) 12.
maculatus WALK. 162.
maculicornis BONSD. 35.
maculicornis ZETT. 59.
maculifacies MACQ. 283.
maculifrons MACQ. 679.
maculifrons ZETT. 720.
maculigera ZETT. 672.
maculipenne MIK. 79.
maculipennis EGG. 365.
maculipennis MEIG. (*Bu.*) 383.
maculipennis MEIG. (*Pi.*) 7.
maculipennis STORM. 620.
maculipennis ZETT. (*Ar.*) 642.
maculipennis ZETT. (*Er.*) 220.
maculipes ZETT. (*Hyl.*) 692.
maculipes ZETT. (*Peg.*) 705.
maculisquama ZETT. 394.
maculiventris BOHEM. 390.
maculiventris ZETT. (*Anth.*) 620.
maculiventris ZETT. (*Hel.*) 393.
maculosa MEIG. (*Anth.*) 672.
maculosa MEIG. 258.
maculosa R.-D. 574.
maculosa ROND. 516.
maculosum MEIG. 51.
madirensis SCHN. 485.
maesta GM. 10.
maesta R.-D. (*Lyd.*) 292.
maesta R.-D. (*Mel.*) 322.
maesta R.-D. (*Phr.*) 273.
maesta R.-D. (*Sar.*) 475.
maesta R.-D. (*Tal.*) 344.
maga R.-D. 256.
magica MEIG. 390.
magna G.-T. 195.
magnicornis ROND. 35.
magnicornis B. B. 244.
magnicornis SCHN. 193.
magnicornis SIEB. 551.
magnicornis ZETT. (*Anth.*) 620.
magnicornis ZETT. (*Eu.*) 197.
magnicornis ZETT. (*Er.*) 252.
magnifica GÜRSCH. 575.
magnifica MIK. 189.
magnifica R.-D. 534.
magnifica SCHN. 493.
maialis R.-D. (*Lu.*) 534.
maialis R.-D. (*Phr.*) 273.
maialis R.-D. (*Sar.*) 486.
major B. B. 263.
major MACQ. (*Er.*) 252.
major MACQ. (*St.*) 225.
major ROND. 355.
major SCHN. 405.
major STROBL. 68.
majoranæ ROND. 1.
majuscula Pok. 692.
majuscula ROND. 320.
mamillata PAND. 470.
mandarina WIED. 523.
mandata R.-D. 273.
manicata MEIG. 661.
manicata ROND. (*Spil.*) 143.
manicata ROND. (*Yel.*) 620.
manicatus MEIG. 44.
Mannii B. B. (*Ar.*) 509.
Mannii B. B. (*Sty.*) 459.
Mannii MIK. 566.
margaritans PAND. 720.
marginale LW. 79.
marginalis FALL. 672.
marginalis R.-D. (*Er.*) 252.
marginalis R.-D. (*Lu.*) 540.
marginalis R.-D. (*Lu.*) 542.
marginalis R.-D. (*Phr.*) 273.
marginalis R.-D. (*Tach.*) 337.
marginalis R.-D. (*Zen.*) 279.
marginalis WIED. 544.
marginata BECK. 32.
marginata MEIG. 372.
marginata Pok. 662.
marginata WALK. 720.
marginata WIED. 735.
marginatum CURT. 147.
marginatum MEIG. 148.
marginatum WALK. 145.
marginella MEIG. 337.
marginella R.-D. 527.
marginella WIED. 352.
marginellum R.-D. 506.
Marietti ROND. 385.
marina MACQ. 746.
maritima HAL. 746.
maritima PERR. 366.
maritima v. RÖD. 672.
maritima ROND. 444.
maritima SCHN. 440.
maritima Scop. 131.
Marklini ZETT. 195.
marmorata FABR. 359.
marmorata MEIG. 445.
marmorata SCHN. 620.
marmorata SCHNABL. 642.
marmorata ZETT. 642.
marmoratus MEIG. 207.
maroecana BECK. 32.
Marsanii PERR. 121.
masicraeformis PORTSCH. 451.
matrtera ROND. 486.
matutina ROND. 610.
maura FABR. 497.
maura PERR. 462.
maura R.-D. (*Del.*) 692.
maura R.-D. (*Myl.*) 633.
maura R.-D. (*Sar.*) 488.
marima PORTSCH. 495.
Meadei KOW. 726.
Meadei MECS. 620.
Meadei Pok. 632.
means FABR. 29.
means LW. 31.
means MEIG. (*Chil.*) 39.
means MEIG. (*Cocn.*) 732.
means ZETT. 35.
meogramma BIG. 67.

- media* MACQ. (*Mos.*) 283.
media MACQ. (*Pla.*) 187.
media PAND. 314.
media R.-D. 600.
media ROND. (*Par.*) 314.
media ROND. (*Sto.*) 355.
medisecta PAND. 620.
meditabunda FABR. 642.
meditabunda MEIG. 310.
meditata FALL. 733.
meditata MEIG. 230.
meditata R.-D. (*Phr.*) 273.
meditata R.-D. (*Sar.*) 484.
Medocæus WALK. 352.
medovina SCHIX. 399.
megacephala PORTSCH. 495.
megacephalus ROSSL. 98.
Megaleus WALK. 352.
megalops PAND. 620.
megastoma BOHEM. 672.
megastoma BOHEM. 672.
megatricha KERT. 692.
Megerlei MEIG. (*Aq.*) 186.
Megerlei MEIG. (*Anth.*) 705.
Megerlei MEIG. (*Mil.*) 505.
megilliformis FALL. 115.
Meigenii BECK. 177.
Meigenii G.-T. 193.
Meigenii PORTSCH. 427.
Meigenii R.-D. (*Ev.*) 241.
Meigenii R.-D. (*Mos.*) 281.
Meigenii R.-D. (*Mil.*) 506.
Meigenii R.-D. (*Sar.*) 484.
Meigenii R.-D. (*Tach.*) 348.
Meigenii S. F. S. 382.
Meigenii SCHIX. (*Bra.*) 127.
Meigenii SCHIX. (*Lu.*) 540.
Meigenii SCHIX. (*Wohl.*) 494.
melaleuca LW. 679.
melaleuca MEIG. (*Mos.*) 284.
melaleuca MEIG. (*Pol.*) 401.
melanaria ZETT. 720.
melancholica MEIG. 6.
melancholica R.-D. (*Ta.*) 337.
melancholica R.-D. (*Ta.*) 344.
melancholicus FABR. 119.
melania DUF. 662.
melania MEIG. (*Mos.*) 501.
melania MEIG. (*St.*) 458.
melanius HARR. 98.
melanocephala MEIG. 462.
melanocephala v. ROS. 177.
melanocera R.-D. (*Ba.*) 383.
melanocera R.-D. (*On.*) 552.
melanochrysa GMEL. 2.
melanogaster MEIG. 612.
melanogaster ZETT. 720.
melanopa ZETT. 32.
melanopsis LW. 44.
melanoptera FALL. 403.
melanopus ROND. 138.
melanopyrrha FORST. 91.
melanostolus BECK. 162.
melanostoma ZETT. 67.
melanostomoides STROBL. 68.
melanura BECK. 32.
melanura MEIG. (*Anth.*) 720.
melanura MEIG. (*Be.*) 564.
melanura MEIG. (*Sa.*) 486.
melanura MEIG. (*Se.*) 509.
melanura MEIG. (*St.*) 458.
melanura R.-D. (*Go.*) 366.
melanura R.-D. (*St.*) 475.
melanura ROND. 516.
melissæ MEIG. 75.
melitense MACQ. 506.
melitensis ROND. 679.
mellarium MEIG. 50.
mellifrons R.-D. 506.
mellinum L. 49.
mellinus DEG. 44.
mellinus HARR. 57.
mellitargus MEIG. 50.
memnonipes ZETT. 642.
Menapis WALK. 352.
mendax R.-D. 344.
mendica ROND. 502.
menechma PAND. 642.
Menestho WALK. 352.
menthastri DEG. 77.
menthastri L. 74.
menyanthidis R.-D. 740.
mera R.-D. 300.
mera WALK. 352.
meracula PAND. 642.
meridiana L. 610.
meridianum ROND. 328.
meridionalis PORTSCH. 652.
meridionalis R.-D. (*Linn.*) 672.
meridionalis R.-D. (*Pe.*) 201.
meridionalis R.-D. (*Wa.*) 375.
meridionalis ROND. 304.
meridionalis ROND. (*Lisp.*) 680.
meridionalis ROND. (*Yel.*) 620.
merulina SCOP. 458.
mesomelaena LW. 515.
Mesula WALK. 204.
metallica FABR. 17.
metallica R.-D. (*Dea.*) 504.
metallica R.-D. (*Euph.*) 609.
metallica R.-D. (*Lu.*) 540.
metallica R.-D. (*Poll.*) 525.
metallica R.-D. (*Rhin.*) 465.
metallina BECK. 32.
metallina FABR. 17.
metallipennis ZETT. 740.
metatarsalis THOMS. 680.
meteorica L. 652.
meteorica MEIG. 629.
meticulosa SCOP. 85.
metopiella ROND. 503.
metopina SCHIX. 394.
mexicana BIG. 662.
Meyerdürrii SCHIX. 400.
Micado KIRB. 195.
micans FABR. (*Eu.*) 135.
micans FABR. (*Vol.*) 93.
micans GUSCHN. 573.
micans MACQ. (*Mos.*) 284.
micans MACQ. (*Mg.*) 423.
micans MACQ. (*Ta.*) 352.
micans MEIG. (*Mic.*) 154.
micans MEIG. (*On.*) 552.
micans R.-D. (*Lu.*) 540.
micans R.-D. (*Ma.*) 406.
micans R.-D. (*Po.*) 525.
micans R.-D. (*Ta.*) 348.

- michiganensis* T.-T. 447.
microcephala Cl. 557.
microceps Motsch. 363.
microcera R.-D. (L.) 389.
microcera R.-D. (Ern.) 218.
microcera R.-D. (Mn.) 407.
microcera R.-D. (Nem.) 258.
microcera R.-D. (Phr.) 273.
microcera Rond. 449.
microcerum R.-D. (Gy.) 559.
microcerum R.-D. (My.) 440.
micromera R.-D. 301.
micronyx B. B. 308.
micropteryx THOMS. 728.
microstoma B. B. 306.
 Mikii SCHN. 464.
 Mikii SCHNABL. 629.
 Mikii STROBL. (Car.) 682.
 Mikii STROBL. (Platy.) 666.
milesiformis FALL. 122.
militaris MEIG. 653.
militaris WALSH. 232.
minuta MEIG. 318.
minuta ZETT. 705.
minax R.-D. 344.
miniata R.-D. 273.
minima MACQ. 400.
minima ROND. (Musc.) 603.
minima ROND. (Oph.) 655.
minima ROND. (St.) 487.
minima ROND. (Tr.) 355.
minima STEIN. 705.
minima ZETT. 500.
minimus BECK. 162.
minor B. B. 263.
minor GIMM. 426.
minor MACQ. 214.
minor PERR. 399.
minor PORTSCH. 614.
minor R.-D. (Graph.) 600.
minor R.-D. (Hist.) 359.
minor R.-D. (Mcl.) 461.
minor R.-D. (Phor.) 307.
minor R.-D. (St.) 450.
minor ROND. (Star.) 227.
minor ROND. (Tri.) 355.
minor STROBL. (Hyp.) 174.
minor STROBL. (Rhin.) 454.
minor ZETT. 177.
minor domestica DEG. 662.
minus MACQ. 328.
minus R.-D. 329.
minusculum WALK. 505.
minuta B. B. (Hopl.) 502.
minuta B. B. (Mier.) 397.
minuta FABR. 382.
minuta FALL. 516.
minuta MACQ. (Er.) 252.
minuta MACQ. (Er.) 252.
minuta MACQ. (Mcl.) 324.
minuta MACQ. (Phor.) 316.
minuta MEIG. 720.
minuta R.-D. (Aet.) 386.
minuta R.-D. (All.) 582.
minuta R.-D. (Hel.) 517.
minuta R.-D. (Mcl.) 512.
minuta R.-D. (Nem.) 258.
minuta R.-D. (Phr.) 273.
minuta R.-D. (Sar.) 488.
minuta R.-D. (Stam.) 611.
minutalis ZETT. 732.
minutipalpis STEIN. 662.
minutissima ZETT. 390.
minutum MACQ. 50.
minutum R.-D. 559.
minutus STROBL. 119.
mirabilis B. B. 259.
mirifica R.-D. 534.
misera R.-D. (Oa.) 553.
misera R.-D. (Phr.) 273.
misera R.-D. (Sar.) 475.
misera R.-D. (Tach.) 344.
missa R.-D. (Phr.) 273.
mitis MEIG. (Anth.) 705.
mitis MEIG. 244.
mitis R.-D. (Phr.) 273.
mitis R.-D. (Sar.) 475.
mixta BECK. 32.
mixtus MEIG. 136.
mixtus PANZ. 138.
mobilis ZETT. 319.
modesta EGG. 36.
modesta MACQ. 408.
modesta MEIG. (Anth.) 642.
modesta MEIG. (Anth.) 643.
modesta MEIG. (Rhin.) 415.
modesta R.-D. (La.) 534.
modesta R.-D. (Lyp.) 292.
modesta R.-D. (My.) 422.
modesta R.-D. (My.) 422.
modesta R.-D. (Pal.) 312.
modesta R.-D. (Phr.) 273.
modesta R.-D. (Sar.) 475.
modesti ZETT. 188.
modestus HAL. 162.
modestus MEIG. 59.
modesta SCHN. 168.
modestus WIED. 108.
modica R.-D. 534.
moenium MEIG. 119.
moerens MEIG. 466.
moerens ZETT. 698.
moesta HOLMGR. 721.
Mohileviana PORTSCH. 555.
molestus MEIX. 545.
molestus WIED. 108.
molio HARR. 87.
mollicula FALL. 734.
mollis R.-D. (Anth.) 728.
mollis R.-D. (Euph.) 609.
mollis R.-D. (My.) 643.
mollis R.-D. (Orth.) 609.
mollis WALK. 531.
mollissima HAL. 665.
monacantha R.-D. 653.
monacha RATZ. 352.
monacha SCHN. 680.
monilis HAL. 662.
monilis MEIG. 733.
monita R.-D. 344.
monochaeta STROBL. 172.
monochaetum LW. 49.
monodactyla LW. 668.
monspehiaca R. D. 546.
montana B. B. 420.
montana EGG. 32.
montana MACQ. 284.
montana POK. 731.
montana R.-D. (Er.) 252.
montana R.-D. (St.) 475.
montana ROND. (Co.) 368.

- montana* ROND. (*Spil.*) 643.
montanus ROND. 117.
montanus SCHN. 697.
monticola BIG. 728.
monticola B. B. (*F.*) 459.
monticola B. B. (*Fr.*) 426.
monticola CZEKSY, 632.
monticola EGG. 425.
monticola PAND. 424.
monticola R.-D. (*Ny.*) 498.
monticola R.-D. (*Sar.*) 475.
monticola ROND. 427.
monticola SCH. (*Chr.*) 149.
monticola SCH. (*Pi.*) 163.
monticola ZETT. 686.
montium BECK. 163.
montium MACQ. 284.
mordellaria FALL. 174.
Moroneae STROBL. 79.
Moroti R.-D. 337.
motiens ZETT. 677.
morio BR. 431.
morio FALL. 372.
morio R.-D. (*Sar.*) 476.
morio R.-D. (*Sar.*) 476.
morio R.-D. (*Sar.*) 479.
morio ZETT. (*Ac.*) 620.
morio ZETT. (*Chi.*) 33.
morionella PAND. 720.
morionella ZETT. 720.
morionellus ZETT. 14.
morosa LW. 8.
morosa MEIG. 226.
morosa R.-D. (*Nem.*) 258.
morosa R.-D. (*Phr.*) 273.
morosa R.-D. (*Ta.*) 344.
mortuorum L. 554.
moschiferi PALL. 589.
motor WALK. 352.
microcatella PAND. 740.
microcatella ZETT. 734.
micronatus ROND. 119.
micronifera ROND. 332.
multans WALK. 352.
multiapunctata ROND. (*Het.*)
 517.
multiapunctata ROND. (*Sph.*) 75.
multiapunctata STEIN. 672.
multiapunctata ZETT. 75.
multisetosa MACQ. 284.
multisetosa ROND. 368.
multisetosa STROBL. 643.
munda MEIG. (*Anth.*) 692.
munda MEIG. (*Comps.*) 310.
munda R.-D. (*Phr.*) 273.
munda R.-D. (*Tach.*) 344.
mundula ZETT. 319.
mundus WOLL. 3.
munita WALK. 352.
muricola R.-D. 513.
murina HEND. 296.
murina MEIG. 740.
murina ROND. 581.
murina ZETT. 698.
murinum MEIG. 506.
murorum FABR. 100.
musca R.-D. (*Call.*) 546.
musca R.-D. (*Car.*) 236.
musca R.-D. (*Cl.*) 331.
musca R.-D. (*Er.*) 296.
musca R.-D. (*Myl.*) 643.
musca R.-D. (*Phorb.*) 720.
musca R.-D. (*Sar.*) 483.
musca R.-D. (*Tr.*) 468.
musca R.-D. (*Tach.*) 344.
musca R.-D. (*Tach.*) 348.
muscaeformis ROND. 584.
muscaeformis ZETT. 747.
muscaria FALL. (*All.*) 582.
muscaria FALL. (*Deg.*) 399.
muscaria MEIG. (*Anth.*) 720.
muscaria MEIG. (*Anth.*) 728.
muscaria MEIG. (*Hel.*) 496.
muscaria PAND. 298.
muscaria R.-D. (*Pi.*) 302.
muscaria R.-D. (*Sar.*) 475.
muscaria SCHN. 721.
muscaria ZETT. (*Scal.*) 747.
muscarius FABR. 111.
muscida R.-D. (*Er.*) 251.
muscida R.-D. (*Phr.*) 273.
muscida R.-D. (*Poll.*) 527.
muscida R.-D. (*Tach.*) 348.
muscina SCHN. 436.
muscina ZETT. 747.
muscoides WALK. 662.
Massinii ROND. 429.
muscitans FABR. 140.
mutabilis FALL. (*Chil.*) 33.
mutabilis FALL. (*Mci.*) 324.
mutabilis L. 155
mutabilis MACQ. 154.
mutabilis PAND. 322.
mutabilis POJ. 155.
mutabilis WALK. 22.
mutatus BECK. 163.
mutatus FALL. 629.
mutatus ZETT. 54.
mutica ZETT. 662.
myioidea R.-D. (*Ac.*) 333.
myioidea R.-D. (*Cer.*) 287.
myioidea R.-D. (*Com.*) 310.
myioidea R.-D. (*Er.*) 252.
myioidea R.-D. (*Er.*) 252.
myioidea R.-D. (*Phoraea.*)
 705.
myioidea R.-D. (*Phor.*) 319.
myioidea R.-D. (*Phr.*) 273.
myioidea R.-D. (*Sar.*) 476.
myioidea R.-D. (*Sar.*) 479.
myioidea R.-D. (*Sar.*) 487.
myiophoroidea R.-D. 211.
myopina FALL. 677.
mystacea L. 91 et 610.
mystica MEIG. 621.
nana FALL. 560.
nana MACQ. (*Hydr.*) 686.
nana MACQ. (*Lisp.*) 680.
nana MEIG. (*Mor.*) 500.
nana MEIG. (*Musc.*) 603.
nana R.-D. (*Call.*) 547.
nana R.-D. (*Meig.*) 324.
nana R.-D. (*Myl.*) 420.
nana R.-D. (*Phr.*) 273.
nana R.-D. (*Poll.*) 527.
nana R.-D. (*Sar.*) 479.
nana R.-D. (*Tach.*) 348.
nana WALK. 352.
nana ZETT. 740.
napobrassicata BLECK. 728.
narcissi FABR. 118.

- nivivissi* SAM. 124.
nasalis L. 596.
nasata HARR. 90.
nasu BECK. 33.
naso ZETT. 721.
nasuta MEIG. 513.
nasuta ZETT. 34.
nasutula BECK. 33.
nasutula PANZ. 721.
natalensis MACQ. 78.
natus FABR. 119.
natus HARR. 44.
nebrodensis MIX. P. 135.
nebrodensis ROND. 135.
nebulosa GIRSCH. 581.
nebulosa PANZ. 581.
nebulosa R.-D. (Ac.) 668.
nebulosa R.-D. (Hal.) 576.
nebulosa R.-D. (Hydr.) 653.
nebulosa R.-D. (Nem.) 258.
nebulosa R.-D. (Sar.) 476.
nebulosus STERN. 643.
nebulosa VERR. 34.
nectarca MEIG. 253.
nectareus FABR. 60.
nectarinus WIED. 60.
neglecta KRAM. 490.
neglecta MEADE. 721.
neglecta MEIG. 223.
neglecta R.-D. (Phr.) 273.
neglecta R.-D. (Pl.) 302.
neglecta T.-T. 200.
neglecta WALK. (Eru.) 1213.
neglecta WALK. (Ta.) 350.
nemea MEIG. 276.
nemestrina Egg. 229.
nemestrina MEIG. 243.
nemorialis MEIG. 735.
nemorana ROND. 643.
nemorum FABR. 129.
nemorum FALL. 621.
nemorum L. 105.
nemorum MEIG. (Eru.) 213.
nemorum MEIG. (X.) 128.
nemorum R.-D. 273.
nepos ROND. 487.
nercosa MEIG. (All.) 581.
nercosa MEIG. (Go.) 366.
nercosa R.-D. 213.
Nenggebaueri PORTSCH. 590.
neuphratica ROND. 6.
neustriacae RATZ. 352.
noxii WALK. 352.
nicarana R.-D. (Ech.) 195.
nicarana R.-D. (On.) 553.
nicaricensis R.-D. 605.
Nickerli KOW. 181.
nidicola HEYD. 545.
nigella MEIG. 662.
nigerrima MACQ. 461.
nigra GIRSCH. 574.
nigra HART. 427.
nigra KALT. 373.
nigra LW. 122.
nigra MACQ. (Ac.) 333.
nigra MACQ. (Cu.) 398.
nigra MACQ. (De.) 445.
nigra MACQ. (Eru.) 218.
nigra MACQ. (Macr.) 520.
nigra MACQ. (Mir.) 447.
nigra MACQ. (Mor.) 501.
nigra MACQ. (Sput.) 563.
nigra MACQ. (Wag.) 375.
nigra MEIG. (Aph.) 178.
nigra MEIG. (Cocn.) 734.
nigra MEIG. (Op.) 183.
nigra MEIG. (Phyt.) 378.
nigra MEIG. (Sph.) 84.
nigra PORTSCH. 141.
nigra R.-D. (Egla.) 721.
nigra R.-D. (Eru.) 213.
nigra R.-D. (Hel.) 576.
nigra R.-D. (Myd.) 633.
nigra R.-D. (Myg.) 423.
nigra R.-D. (Pha.) 574.
nigra R.-D. (Phr.) 273.
nigra R.-D. (Phy.) 462.
nigra R.-D. (Sar.) 476.
nigra R.-D. (Tach.) 344.
nigra ROND. 740.
nigra SCHELL. (Aph.) 179.
nigra SCHELL. (Phora) 171.
nigra STROBL. 178.
nigra WALK. 130.
nigra WIED. 656.
nigra ZETT. 34.
nigraus MEIG. 498.
nigraus PANZ. 477.
nigrescens MEADE. 693.
nigrescens ROND. 692.
nigribarbis R.-D. 218.
nigribarbis VOLL. 547.
nigricans COQ. 94.
nigricans Egg. (Pros.) 299.
nigricans Egg. (Tach.) 341.
nigricans MEIG. 686.
nigricans R.-D. (Anth.) 728.
nigricans R.-D. (Ar.) 627.
nigricans R.-D. (Myd.) 643.
nigricans R.-D. (Sar.) 479.
nigricans ROND. 414.
nigricauda R.-D. 479.
nigriceps ZETT. 705.
nigricollis BECK. 80.
nigricollis MEIG. 16.
nigricolor FALL. 633.
nigricorne MACQ. 506.
nigricorne STROBL. 50.
nigricornis Egg. (Phor.) 171.
nigricornis Egg. (Pey.) 453.
nigricornis LW. 597.
nigricornis MACQ. (Chil.) 31.
nigricornis MACQ. (Sph.) 84.
nigricornis MACQ. (Syn.) 132.
nigricornis MEIG. 209.
nigricornis R.-D. (Dea.) 501.
nigricornis R.-D. (Eru.) 215.
nigricornis R.-D. (Eru.) 253.
nigricornis R.-D. (Pel.) 200.
nigricornis R.-D. (Tre.) 621.
nigricornis R.-D. (Zoo.) 452.
nigricornis ROND. 638.
nigricornis SCHUM. 81.
nigricornis VERR. 67.
nigricornis ZETT. 81.
nigricornis ZETT. 77.
nigridigita ROND. 740.
nigrifacies PIER. 462.
nigrifacies R.-D. 740.
nigrifemoralis MACQ. 67.
nigrifemur ZETT. 740.

- nigrifrons* BRIL. 337.
nigrifrons BRULLÉ. 100.
nigrifrons EGG. 139.
nigrifrons MACQ. 705.
nigrifrons R.-D. (*Ac.*) 390.
nigrifrons R.-D. (*Fell.*) 629.
nigrifrons R.-D. (*Lac.*) 534.
nigrifrons R.-D. (*Phr.*) 273.
nigrifrons R.-D. (*Sar.*) 487.
nigrifrontis SCHIN. 100.
nigrimana MEIG. (*Anth.*) 693.
nigrimana MEIG. (*Cocn.*) 740.
nigrimana SCHIN. 740.
nigrina FALL. 436.
nigrina MEIG. (*Ac.*) 390.
nigrina MEIG. (*Chil.*) 40.
nigrina MEIG. (*Poll.*) 525.
nigrinervis STROBL. 672.
nigrinervis ZETT. 672.
nigripalpis G.-T. 196.
nigripalpis MACQ. (*Curl.*) 614.
nigripalpis MACQ. (*Er.*) 297.
nigripalpis MACQ. (*On.*) 553.
nigripalpis MACQ. 227.
nigripalpis R.-D. (*Ac.*) 390.
nigripalpis R.-D. (*Er.*) 251.
nigripalpis R.-D. (*Lg.*) 221.
nigripalpis R.-D. (*Phor.*) 530.
nigripalpis R.-D. (*Vor.*) 372.
nigripalpis R.-D. (*Win.*) 232.
nigripalpis ROND. (*Phoro.*) 318.
nigripalpis ROND. (*Phori.*) 307.
nigripalpis ROND. (*Pla.*) 369.
nigripalpis ROND. (*Yct.*) 621.
nigripennis B. B. 560.
nigripennis HUGH. 544.
nigripennis MEIG. (*Ba.*) 81.
nigripennis MEIG. (*Phoen.*) 427.
nigripennis R.-D. (*Rhin.*) 466.
nigripennis R.-D. (*St.*) 457.
nigripennis SCHNABL. 643.
nigripennis ZETT. 733.
nigripes BEZZI. 731.
nigripes FABR. 435.
nigripes FALL. 290.
nigripes MACQ. (*Pe.*) 445.
nigripes MACQ. (*Pl.*) 450.
nigripes MACQ. (*Pi.*) 8.
nigripes MEIG. 34.
nigripes PASZ. 603.
nigripes R.-D. (*Cor.*) 286.
nigripes R.-D. (*Er.*) 239.
nigripes R.-D. (*Fell.*) 621.
nigripes R.-D. (*Hel.*) 643.
nigripes R.-D. (*Limn.*) 672.
nigripes R.-D. (*Lim.*) 740.
nigripes R.-D. (*Lm.*) 204.
nigripes R.-D. (*Mydaca*) 621.
nigripes R.-D. (*Mydina*) 643.
nigripes STROBL. 178.
nigripes ZETT. 129.
nigripila MIK. 53.
nigrisquama MEADE. 662.
nigrisquama STEIN. 705.
nigrisquama ZETT. (*Ca.*) 561.
nigrisquama ZETTA. (*Ta.*) 352.
nigrita FABR. 40.
nigrita FALL. (*Musc.*) 633.
nigrita FALL. (*Min.*) 409.
nigrita MEIG. 431.
nigrita R.-D. (*Arr.*) 396.
nigrita R.-D. (*Er.*) 253.
nigrita R.-D. (*Mas.*) 282.
nigrita R.-D. (*Nem.*) 258.
nigrita R.-D. (*Phr.*) 273.
nigrita bis R.-D. (*Phr.*) 273.
nigrita R.-D. (*Sar.*) 476.
nigrita R.-D. (*Ta.*) 348.
nigrita R.-D. (*Vor.*) 372.
nigrita Scop. 498.
nigritarsis MACQ. 105.
nigritarsis ROND. 119.
nigritarsis STROBL. 38.
nigritarsis ZETT. (*Luth.*) 705.
nigritarsis ZETT. (*Fr.*) 459.
nigritarsis ZETT. (*Syr.*) 67.
nigritellus ZETT. 629.
nigrithorax BEZZI. 118.
nigrithorax EGG. 230.
nigrilibius ROND. 59.
nigritalus ZETT. 161.
nigritus GISM. 5.
nigritus ZETT. 596.
nigriventris MEIG. 488.
nigriventris PALM. 245.
nigriventris ZETT. 672.
nigroantennatus SCHUMM. 106.
nigrofasciata PORTSCH. 442.
nigrofasciata STROBL. 314.
nigrofemorata R.-D. 193.
nigrogriseescens R.-D. 462.
nigrolimbata BOSSD. 615.
nigrolineata WALK. 337.
nigronitens PAND. 721.
nigropicta PORTSCH. 94.
nigropilosa STROBL. 35.
nigropilosum G.-T. 146.
nigroscutellata MACQ. 224.
nigrolarsala SCHIN. 113.
nigrovittata MEIG. 382.
Nili ROND. 100.
nilotica LW. 601.
nitens MACQ. 284.
nitens MEIG. 559.
nitens R.-D. (*Com.*) 310.
nitens R.-D. (*Er.*) 253.
nitens R.-D. (*Lim.*) 740.
nitens R.-D. (*Myd.*) 643.
nitens R.-D. (*Myi.*) 422.
nitens R.-D. (*Poll.*) 527.
nitens R.-D. (*Sar.*) 476.
nitens R.-D. (*St.*) 457.
nitens R.-D. (*Tach.*) 345.
nitens VILL. 139.
nitens ZETT. (*Min.*) 410.
nitens ZETT. (*Poll.*) 529.
nitens ZETT. (*Syr.*) 68.
nitida MACQ. (*Luth.*) 721.
nitida MACQ. (*Cr.*) 287.
nitida MACQ. (*Hgdroph.*) 621
nitida MACQ. (*Hgl.*) 693.
nitida MACQ. (*Gym.*) 522.
nitida MACQ. (*Er.*) 253.
nitida MACQ. (*Rhin.*) 466.
nitida MACQ. (*Sph.*) 516.

- nitida* MEIG. (*Chil.*) 40.
nitida MEIG. (*Pyr.*) 607.
nitida PORTSCH. 130.
nitida R.-D. (*All.*) 581.
nitida R.-D. (*De.*) 445.
nitida R.-D. (*Eggl.*) 721.
nitida R.-D. (*Er.*) 296.
nitida R.-D. (*Er.*) 305.
nitida R.-D. (*Euph.*) 609.
nitida R.-D. (*Er.*) 253.
nitida R.-D. (*Er.*) 253.
nitida R.-D. (*Er.*) 253.
nitida R.-D. (*Er.*) 248.
nitida R.-D. (*Er.*) 254.
nitida R.-D. (*Er.*) 424.
nitida R.-D. (*Hydr.*) 653.
nitida R.-D. (*Limn.*) 672.
nitida R.-D. (*La.*) 540.
nitida R.-D. (*Lyd.*) 292.
nitida R.-D. (*Lyd.*) 292.
nitida R.-D. (*Lydi.*) 222.
nitida R.-D. (*Mas.*) 284.
nitida R.-D. (*Meg.*) 499.
nitida R.-D. (*Mel.*) 324.
nitida R.-D. (*Min.*) 410.
nitida R.-D. (*Nyc.*) 498.
nitida R.-D. (*Oph.*) 656.
nitida R.-D. (*Phr.*) 273.
nitida R.-D. (*Phyll.*) 434.
nitida R.-D. (*Sar.*) 484.
nitida R.-D. (*Syn.*) 562.
nitida R.-D. (*Tac.*) 345.
nitida R.-D. (*Wag.*) 375.
nitida R.-D. (*Win.*) 232.
nitida R.-D. (*Win.*) 232.
nitida v. RÖD. 501.
nitida STEIN. 662.
nitida ZETT. 405.
nitidicauda ZETT. 721.
nitidicollis MEIG. 68.
nitidicollis ZETT. (*Sph.*) 73.
nitidicollis ZETT. (*Syr.*) 68.
nitidifrons BECK. 163.
nitidifrons STROEL. 177.
nitidissimus A. COSTA. 3.
nitidiventralis ZETT. 410.
nitidiventralis BIG. 529.
nitidiventralis MACQ. (*Mgi.*) 423.
nitidiventralis MACQ. (*Tach.*) 352.
nitidiventralis ROND. 378.
nitidiventralis ZETT. (*Er.*) 100.
nitidiventralis ZETT. (*Ta.*) 352.
nitidomaculatum MACQ. 506.
nitidula BIG. 517.
nitidula KALT. 40.
nitidula MEIG. (*Di.*) 330.
nitidula MEIG. (*Nec.*) 85.
nitidula MEIG. (*Phor.*) 172.
nitidula R.-D. (*Euph.*) 609.
nitidula R.-D. (*Lim.*) 740.
nitidula R.-D. (*Lac.*) 534.
nitidulus ZETT. 61.
nivalis BECK. 34.
nivalis ROND. (*Pho.*) 173.
nivalis ROND. (*Yct.*) 643.
nivalis WIED. 680.
nivalis ZETT. 643.
niveipennis ZETT. 706.
niveisquama THOMS. 603.
nobilis FALL. 16.
nobilis MEIG. (*Isch.*) 53.
nobilis MEIG. (*La.*) 540.
nobilis MEIG. (*Mer.*) 118.
nobilis R.-D. (*Mel.*) 325.
nobilis R.-D. (*Ta.*) 337.
nobilis R.-D. (*Wint.*) 230.
noctiluca L. 10.
noctiluca PASZ. 47.
noctiluca ROND. 10.
noctuarum R.-D. (*Co.*) 310.
noctuarum R.-D. (*Er.*) 248.
noctuarum R.-D. (*Phr.*) 273.
noctuarum ROND. 338.
noctuidica ROND. 245.
nomada R.-D. 451.
Nordenskiöldi HOLMGR. 741.
notabilis MEIG. 258.
notabilis STEIN. 672.
notabilis ZETT. 706.
notata FALL. 672.
notata MACQ. (*Er.*) 253.
notata MACQ. (*Sar.*) 495.
notata MEIG. 12.
notata R.-D. (*Er.*) 253.
notata R.-D. (*La.*) 540.
notata R.-D. (*Phr.*) 273.
notata R.-D. (*Rond.*) 464.
notata SCHIN. 12.
notata WIED. 352.
notata ZETT. 170.
notiventralis PASZ. 464.
nova DEF. 226.
nova FERR. 288.
nova ROND. 355.
nova SIEB. 491.
Novaevesciae MACQ. 108.
novemmaculata ZETT. 673.
novempunctata ZSCHACH. 668.
noverca KRAM. 484.
noverca ROND. 488.
novus ROND. 79.
novus SCHNEID. 112.
novus SCHRANK. 155.
Novickii Lw. 24.
nuba WIED. (*Di.*) 494.
nuba WIED. (*Lispa*) 680.
nuba WIED. (*Syr.*) 68.
nubeculosa MEIG. 582.
nubiana BIG. 543.
nubianus BIG. 643.
nubica JAESEN. 488.
nubigena POK. 413.
nubilipennis CURT. 100.
nubilipennis Lw. (*Lispa*) 680.
nubilipennis Lw. (*Ples.*) 455.
nubilipennis MEIG. 582.
nubilis ROND. (*Chrys.*) 19.
nubilis ROND. (*Er.*) 295.
nubilis ROND. (*Mio.*) 410.
nubilis MEIG. 208.
nuceicornis PASZ. 721.
nuda MACQ. 20.
nuda R.-D. 437.
nuda STEIN. 721.
nuda STROEL. 630.
nudifacies MACQ. 368.
nudifrons MACQ. 173.

- nudioculata* MACQ. (*Macq.*) 407.
nudioculata MACQ. (*Wag.*) 375.
nudipalpis BECK. 171.
nudipes BECK. (*Aph.*) 177.
nudipes BECK. (*Plat.*) 45.
nudipes ZETT. 668.
nudiseta BECK. 34.
nudistylum MACQ. 407.
nudithorax R.-D. 204.
nudus LW. 135.
nyctar R.-D. (*Phor.*) 273.
nyctar R.-D. (*Ta.*) 345.
numida MACQ. 3.
nypera ROND. 415.
nypta R.-D. 273.
nypta ROND. (*Eul.*) 197.
nypta ROND. (*Nem.*) 224.
nypta ZETT. 673.
nuptialis R.-D. (*Lu.*) 540.
nuptialis R.-D. (*Lu.*) 542.
nyrus ROND. 484.
nympheae R.-D. (*Hydroph.*) 686.
nympheae R.-D. (*Hydrof.*) 653.
nympheacarum R.-D. 621.
nympheaeicola R.-D. (*Hydr.*) 686.
nympheaeicola R.-D. (*Lisp.*) 680.
nymphiarum ROND. 549.
Nymphidius WALK. 352.
obelisca MEIG. 728.
obesa FABR. 580.
obesa LW. 662.
obesa ZETT. 245.
objecta R.-D. 273.
objecta WALK. 352.
oblata R.-D. 273.
obliqua MACQ. (*Anth.*) 728.
obliqua MACQ. (*Ster.*) 458.
obliqua R.-D. 225.
obliquata FALL. 314.
obliquata R.-D. 520.
obliquum R.-D. 559.
obliquus FABR. 135.
oblita R.-D. (*Phor.*) 273.
oblita bis R.-D. (*Phor.*) 273.
oblonga MACQ. (*Pha.*) 574.
oblonga MACQ. (*Tach.*) 352.
oblonga R.-D. (*Le.*) 333.
oblonga R.-D. (*Pha.*) 574.
obscurata ESCH. 549.
obscura BECH. 122.
obscura BOHEM. 684.
obscura B. B. 201.
obscura FABR. 527.
obscura FALL. 305.
obscura GIBSCH. 578.
obscura LW. 40.
obscura MACQ. (*Anth.*) 721.
obscura MACQ. (*Hydr.*) 643.
obscura MACQ. (*Pip.*) 12.
obscura MEADE. 706.
obscura MEIG. (*Drym.*) 631.
obscura MEIG. (*Sar.*) 454.
obscura R.-D. (*Le.*) 668.
obscura R.-D. (*Linm.*) 673.
obscura R.-D. (*Limos.*) 741.
obscura R.-D. (*Met.*) 512.
obscura R.-D. (*Sar.*) 476.
obscura R.-D. (*Sar.*) 487.
obscura STEIN. (*Peg.*) 710.
obscura STEIN. (*Spil.*) 643.
obscura ZETT. (*Ar.*) 721.
obscura ZETT. (*Trin.*) 180.
obscura ZETT. (*Tric.*) 439.
obscurata MEIG. 643.
obscurata R.-D. (*Er.*) 248.
obscurata R.-D. (*Ny.*) 498.
obscurata R.-D. (*Phor.*) 307.
obscurata R.-D. (*Phor.*) 273.
obscurata R.-D. (*Pty.*) 300.
obscurata R.-D. (*Ta.*) 345.
obscurata R.-D. (*Win.*) 232.
obscurata ZETT. 641.
obscurataeformis SCHNABL. 644.
obscuratidea PAND. 644.
obscuratoides SCHNABL. 644.
obscurella R.-D. (*Act.*) 389.
obscurella R.-D. (*Deg.*) 400.
obscurella R.-D. (*Lu.*) 534.
obscurella R.-D. (*Mei.*) 322.
obscurella R.-D. (*Sar.*) 476.
obscurella ZETT. 512.
obscuricauda R.-D. 476.
obscuricula ROND. 735.
obscurior STROBL. 678.
obscuripennis SCHN. 163.
obscuripalpis R.-D. 540.
obscuripennis LW. 456.
obscuripennis MACQ. 653.
obscuripennis MEIG. (*All.*) 578.
obscuripennis MEIG. (*Ba.*) 82.
obscuripennis MEIG. (*Er.*) 566.
obscuripennis MEIG. (*Ph.*) 463.
obscuripennis MEIG. (*Pi.*) 8.
obscuripennis PALMA. 115.
obscuripennis R.-D. (*Mi.*) 432.
obscuripennis R.-D. (*Ph.*) 574.
obscuripennis R.-D. (*S.*) 479.
obscuripennis ZETT. 693.
obscuripes PAND. 644.
obscuripes R.-D. (*Mei.*) 324.
obscuripes R.-D. (*My.*) 420.
obscuripes ROND. 741.
obscuripes STROBL. 133.
obscuripes ZETT. 644.
obscurum LW. 143.
obscurus MACQ. 629.
obscurus MEIG. 5.
obscurus ZETT. (*Chal.*) 167.
obscurus ZETT. (*Syr.*) 67.
obsequens R.-D. 273.
obsequiosa R.-D. 253.
observanda ROND. 662.
obsidiana WIED. 352.
obsignata ROND. 673.
obsoleta FALL. 495.
obsoleta MEIG. 551.
obsoleta WIED. 523.
obsoleta ZETT. 11.

- obtusata* R.-D. 273.
obtusata ZETT. 699.
obtusinervis ZETT. 163.
obtusipennis FALL. 644.
obumbrata PAND. 355.
occatrix PAND. 488.
occipitale PAND. 506.
occlusa Egg. 527.
occlusa R.-D. (*Lydl.*) 292.
occlusa R.-D. (*Pha.*) 573.
occlusa R.-D. (*Phr.*) 273.
occlusa R.-D. (*Ta.*) 348.
occlusa R.-D. (*Tam.*) 568.
occlusa R.-D. (*Zen.*) 279.
occlusa ROND. (*Macq.*) 407.
occlusa ROND. (*Pet.*) 402.
occlusa ROND. (*Pho.*) 318.
occlusum R.-D. 328.
occulta MEIG. (*Anth.*) 653.
occulta MEIG. (*Var.*) 372.
ochracea RATZ. 279.
ochropus MEIG. 406.
ochrostoma ZETT. 68.
ochrophilina ROND. 745.
ocrecta ZETT. 706.
octoguttata ZETT. 721.
octomaculatum CURT. 150.
octomaculatus CURT. 63.
octomaculatus v. Ros. 45.
octonotatus Big. 68.
octopunctata ZETT. 741.
octosignata ROND. 741.
octosignata STROBL. 741.
ocularius Coq. 98.
oculata PAND. 383.
oculatum ZETT. 506.
oculosa PAND. 280.
ocyni FABR. 47.
ocypetata FALL. 375.
ocypetata MEIG. 584.
ocypeterina SCHIN. 332.
ocypeterina ZETT. 373.
ocypeteroidea R.-D. 332.
Odessaë Beck. 680.
odontogaster ZETT. 721.
Odyneri R.-D. 529.
odynantis R.-D. 204.
ostracca SCHELL. 29.
ostracum FALL. 506.
oestrecus L. 100.
oestriformis MEIG. 53.
oestroidea R.-D. 438.
offensa R.-D. 273.
officiosa R.-D. (*Phr.*) 274.
officiosa R.-D. (*Pty.*) 303.
offusca MEIG. 292.
offuscata MEIG. 479.
oleandri ROND. 75.
olfaciens PAND. 245.
oligoneura Mik. 182.
olitorius FALL. 63.
olivacea MACQ. 527.
olivacea R.-D. 345.
olivacea VEER. 29.
olivacea ZETT. (*Anth.*) 644.
olivacea ZETT. (*Chil.*) 28.
olivaceomaculata PORTSCH.
 407.
olivaceus MEIG. 427.
olivaceus Lw. 135.
Olivierii R.-D. 365.
Olizon WALK. 352.
omissa Beck. 35.
omissa MEIG. 673.
omissinervis Beck. 163.
omnivora BRISCHKE. 292.
opaca MEIG. (*Lydl.*) 292.
opaca MEIG. (*Phor.*) 171.
opaca R.-D. (*Meig.*) 322.
opaca R.-D. (*Sar.*) 479.
opaca ZETT. 562.
opacina R.-D. 582.
opacula STROBL. 673.
opacula ZETT. 734.
opacus FALL. 163.
opalia WALK. 656.
operata R.-D. 274.
operosa MEIG. 686.
operosa PAND. 693.
operosa R.-D. 370.
operita WALK. 352.
oporthana R.-D. 271.
opposita R.-D. 274.
oralis MACQ. 693.
oralis R.-D. (*Ad.*) 721.
oralis R.-D. (*Poll.*) 527.
oralis R.-D. (*Sar.*) 483.
oralis R.-D. (*Sar.*) 484.
Orbilus WALK. 209.
orbitalis PAND. 721.
orygæ R.-D. (*Carv.*) 236.
orygæ R.-D. (*Phor.*) 316.
orygæ R.-D. (*Zen.*) 279.
orichalcea ZETT. 644.
origani MACQ. 75.
ornata GIESCH. 584.
ornata MEIG. (*Anth.*) 662.
ornata MEIG. (*Deq.*) 398.
ornata MEIG. (*Go.*) 365.
ornata MEIG. (*Hel.*) 577.
ornata MEIG. (*P.*) 10.
ornata MEIG. (*Pha.*) 188.
ornata WIED. 152.
ornaticornis ZETT. 253.
ornatum MEIG. 79.
ornatus MEIG. 135.
ortalidis R.-D. 316.
orthoneura MACQ. 644.
orthoptera ROND. 578.
Osiris WIED. 603.
osmioides PERR. 119.
ostendata R.-D. 274.
Osten-Sackenii JAENS. 673.
Osten-Sackenii KIRK. 232.
Oulji GUER. 223.
ovata MACQ. (*Hay.*) 376.
ovata R.-D. 567.
ovalis R.-D. 534.
ovatus Lw. 136.
ovinus Fisch. 592.
ovis L. 591.
oxyacanthæ MEIG. 124.
oxyrhina PAND. 325.
pabulina MEIG. 258.
pabulina R.-D. (*Phr.*) 274.
pabulina R.-D. (*Sar.*) 476.
pabulorum FALL. 614.
pabulorum R.-D. 484.
pachynota Egg. 124.
pachystyla MACQ. 284.
pacifica MEIG. (*Anth.*) 673.

- pacifica* MEIG. (*Myl.*) 422.
pacifica R.-D. (*Mel.*) 322.
pacifica R.-D. (*Phr.*) 274.
pacifica R.-D. (*Ta.*) 345.
pacifica SCHIX. 673.
pacla MEIG. 326.
pagana FABR. 644.
pagana MEIG. (*Bl.*) 383.
pagana MEIG. (*Chil.*) 35.
pagana MEIG. (*Ta.*) 352.
pagana R.-D. 345.
palaestrica MEIG. 653.
palesioidea R.-D. 274.
Pallasii PORTSCH. 590.
pallens BIG. 595.
palliceps BIG. 513.
palliceps ZETT. 706.
pallicornis LW. 414.
pallicornis POK. 683.
pallicornis ZETT. 732.
pallida FABR. 621.
pallida MACQ. 699.
pallida STEIN. 706.
pallidicornis BIG. 253.
pallidicornis BRAUER. 443.
pallidicornis LW. 456.
pallidicornis MEIG. 41.
pallidicornis R.-D. 735.
pallidipalpis MACQ. 353.
pallidipalpis R.-D. (*Ec.*) 253.
pallidipalpis R.-D. (*St.*) 227.
pallidipes R.-D. (*Ec.*) 253.
pallidipes R.-D. (*Lim.*) 741.
pallidipes R.-D. (*Sar.*) 476.
pallidisquama ZETT. 621.
palliditincta BOHEM. 730.
pallidoseutellata ZETT. 706.
pallidus MACQ. 119.
pallipalpis MACQ. (*St.*) 495.
pallipalpis MACQ. (*Ta.*) 348.
pallipalpis ZETT. 683.
pallipennis ZETT. 721.
palipes FALL. (*Phr.*) 256.
palipes FALL. (*Rha.*) 379.
palipes LATR. 179.
palipes R.-D. (*Ill.*) 583.
palipes R.-D. (*Car.*) 741.
palipes R.-D. (*Egls.*) 721.
palipes R.-D. (*La.*) 534.
palipes R.-D. (*Phil.*) 663.
palipes R.-D. (*Pot.*) 687.
palipes STEIN. 706.
pallitarsis STEIN. 673.
pallitibia ROND. 663.
pallitibiae MEADE. 663.
Palméni BECK. 177.
palmpis ROSSI. 187.
palnodes PAND. 721.
palpalis R.-D. (*Hel.*) 496.
palpalis R.-D. (*Hydr.*) 654.
palpalis R.-D. (*Myl.*) 422.
palpalis R.-D. (*Phy.*) 462.
palpalis R.-D. (*Pty.*) 301.
palpalis R.-D. (*Vo.*) 372.
palpalis R.-D. (*Wa.*) 374.
palpalis R.-D. (*Zen.*) 452.
palpalis ROND. (*Act.*) 391.
palpalis ROND. (*Nem.*) 259.
palpata R.-D. (*Bl.*) 747.
palpata R.-D. (*Myl.*) 451.
palpata R.-D. (*Phyll.*) 434.
palpata STEIN. (*Ir.*) 621.
palpata STEIN. (*Peg.*) 706.
palpella ROND. 721.
palpina ZETT. (*Bu.*) 383.
palpina ZETT. (*Pho.*) 169.
palposa CZERNY. 645.
palposa STEIN. 687.
palposa ZETT. 171.
paludosa R.-D. (*Car.*) 741.
paludosa R.-D. (*Lim.*) 741.
paludosa R.-D. (*Lisp.*) 680.
paludosa R.-D. (*Sar.*) 476.
Palumbii ROND. 452.
palustris MACQ. 322.
palustris R.-D. (*Cuc.*) 673.
palustris R.-D. (*Del.*) 721.
palustris R.-D. (*Limn.*) 673.
palustris R.-D. (*Limes.*) 741.
palustris R.-D. (*Myd.*) 633.
palustris Scop. 123.
Pamesos WALK. 353.
Pandelléi STEIN. 654.
Pandia WALK. 351.
pannonia LW. 562.
panuonicus BECK. 163.
pansa SNOW. 367.
pantherina ROND. 683.
pantherina ZETT. 305.
Panzeri ROND. 153.
Paolilli A. COSTA. 199.
papilionis BRISCHKE. 261.
paradoxa B. B. (*Nem.*) 257.
paradoxa B. B. (*Pros.*) 298.
paradoxa B. B. (*Rhin.*) 356.
paradoxalis DEF. 663.
paradoxalis STEIN. 645.
parallela MEIG. (*Phr.*) 274.
parallela MEIG. (*Pty.*) 301.
paralleli HARR. 103.
paralleliventris SCHIX. 693.
paralleliventris ZETT. 693.
parallelus HARR. 110.
parasita MEIG. 353.
parasita R.-D. (*Mil.*) 506.
parasita R.-D. (*Wag.*) 374.
parcespinosa BECK. 680.
pardalina ROND. (*Car.*) 645.
pardalina ROND. (*Picz.*) 666.
parens ROND. 245.
parhyalinatus BIG. 52.
parietum MEIG. 120.
parisiaca R.-D. (*Cu.*) 368.
parisiaca R.-D. (*Den.*) 504.
parisiensis R.-D. 439.
parvatus ROND. 45.
parmense ROND. 150.
parmensis ROND. (*Gac.*) 306.
parmensis ROND. (*Ph.*) 455.
parmensis ROND. (*Zen.*) 452.
parra B. B. 317.
parra ROND. 277.
parthenopea ROND. 439.
particeps WALK. 353.
partita MEIG. 693.
paramplicata LW. 21.
parva B. B. 303.
parva MACQ. 274.
parva MEADE. 654.
parva R.-D. (*Egls.*) 721.
parva R.-D. (*Meig.*) 324.

- parva* R.-D. (*Mor.*) 500.
parva R.-D. (*Sar.*) 482.
parva ROND. (*Hel.*) 668.
parva ROND. (*Hel.*) 577.
parva STEIN. 663.
parviceps KOW. 726.
parvicornis BECK. 35.
parvicornis MEIG. 463.
parvicornis ZETT. 731.
parvula FALL. 721.
parvula MACQ. (*Er.*) 253.
parvula MACQ. (*Mos.*) 284.
parvula MEIG. (*Ba.*) 383.
parvula MEIG. (*La.*) 542.
parvula PORTSCH. 442.
parvula R.-D. 324.
parvula ROND. (*Pho.*) 319.
parvula ROND. (*Sar.*) 489.
parvula ROND. (*Synt.*) 562.
parvum PORTSCH. 328.
pascuorum BECK. 35.
pascuorum MEIG. 614.
pascuorum R.-D. 476.
pascuorum ROND. (*Bo.*) 314.
pascuorum ROND. (*Er.*) 106.
Passerini ROND. (*Hom.*) 663.
Passerini ROND. (*Ster.*) 458.
patellans PAND. 687.
patelliferus ROND. 315.
patelligera ROND. 741.
patellipalpis PAND. 257.
patruelis PAND. 440.
pauciseta B. B. 380.
pauciseta KRAM. 471.
pauciseta PAND. 489.
pauciseta ROND. (*Ba.*) 383.
pauciseta ROND. (*Dio.*) 330.
pauper ROND. 529.
pauperata R.-D. (*La.*) 540.
pauperata R.-D. (*Mei.*) 322.
pauperata R.-D. (*Pho.*) 274.
pauperata R.-D. (*Sar.*) 476.
pauperata R.-D. (*Ta.*) 345.
pauxilla HOLMGR. 673.
pavida HLL. 353.
pavida MEIG. 312.
pavida R.-D. (*Deq.*) 400.
pavida R.-D. (*Mos.*) 284.
pavida R.-D. (*On.*) 551.
pavida R.-D. (*Pho.*) 274.
pavoniae R.-D. 282.
pavoniae ZETT. 355.
Pecchiolii ROND. (*Eng.*) 502.
Pecchiolii ROND. (*Par.*) 1.
peccorum FABR. 597.
pectinata GÜRSCH. 217.
pectinata HEND. 277.
pectinata MEIG. 441.
pectinata ZETT. 317.
pectinatum B. B. 440.
pectinipes BECK. 680.
pedella FALL. 741.
pedemontana MACQ. 191.
pedemontana MEIG. 413.
pedemontana R.-D. 201.
pedemontana ROND. 35.
pedestrus BECK. 35.
pedicellata MACQ. 527.
pedicellata PAND. 568.
pedicellata R.-D. 568.
pedicellata MACQ. 527.
pedissequum HARR. 79.
peller R.-D. 487.
pellucens EGG. 442.
pellucens FALL. 572.
pellucens HARR. 52.
pellucens L. 94.
pellucens MACQ. 571.
pellucens MEIG. 603.
pellucens PORTSCH. 654.
pellucens ROSSI. 93.
pellucida MEIG. 223.
pellucida R.-D. (*Hel.*) 517.
pellucida R.-D. (*Mydava*) 645.
pellucida R.-D. (*Mydina*) 645.
pellucida R.-D. (*Myl.*) 422.
pellucidula MEIG. 55.
pelmatoprocta B. B. 228.
Pelopci ROND. 517.
peltatus MEIG. 45.
pendula PAND. 645.
pendulus L. 108.
penicillaris ROND. (*Hyl.*) 693.
penicillaris ROND. (*Pho.*) 318.
penicillaris ROND. (*Sphoc.*) 517.
penicillata EGG. 605.
penicillata ROND. 654.
peniculata ROND. 663.
pennata Scop. 92.
pentatomae R.-D. 429.
perdita MEIG. 622.
peregrinum MEIG. 666.
peregrinus Lw. 107.
perennis MEIG. 171.
perexigua PAND. 645.
perexilis HARR. 81.
perfidia MEIG. 513.
perforans ROND. 706.
perinealis PAND. 208.
pernix HARR. 491.
perpallidus VERR. 45.
perpendicularis Mq. (*Ma.*) 407.
perpendicularis MACQ. (*Sl.*) 458.
perpendicularis ZETT. 629.
perpingens WALK. 353.
perplexa PAND. 279.
perplexus HUBS. 592.
perpusilla MEIG. 741.
perpusilla SIN. 182.
perpusilla STEIN. 741.
perrema WALK. 721.
persica BECK. 680.
persica BIG. 495.
persica PORTSCH. 190.
personata HARR. 140.
personata Lw. 35.
pertinax MACQ. 253.
pertinax Scop. 106.
pertinens WALK. 353.
pertracta WALK. 353.
perturbans ZETT. 256 et 357.
pertusa MEIG. 645.
perversa B. B. 195.
pervia R.-D. (*Ma.*) 520.
pervia R.-D. (*Sa.*) 487.
pervia R.-D. (*Ta.*) 345.
petiolata BONSD. 443.
petiolata MACQ. 305.

- petiolata* R.-D. (*Br.*) 396.
petiolata R.-D. (*De.*) 446.
petiolata R.-D. (*Er.*) 80.
petiolata R.-D. (*Loc.*) 404.
petiolata R.-D. (*Myl.*) 421.
petiolata R.-D. (*Phy.*) 463.
petiolata PAND. 490.
petiolata STROBL. 568.
petiolinervis ZETT. 353.
Petronillae ROND. 157.
petrosa R.-D. 313.
pexops B. B. 280.
phaeda ROND. 436.
phacoptera R.-D. 436.
phacopterum MEIG. 328.
phalaenaria ROND. 257.
phalerata MEIG. 455.
phasiaeforme EGG. 565.
phantoma ZETT. 25.
phasiaeformis MACQ. 604.
phasiaeformis MEIG. (*Mor.*)
 501.
phasiaeformis MEIG. (*Ma.*) 603.
philadelphica MACQ. 363.
philadelphica R.-D. 531.
philadelphicus MACQ. 70.
philanthi R.-D. 512.
philanthinum IL. 78.
philanthus MEIG. 74.
philanthus SCHN. 77.
Philonis WALK. 353.
phocda ROND. 436.
phylloidea R.-D. 706.
picama R.-D. 614.
Picciolii ROND. (*Cr.*) 125.
Picciolii ROND. (*Oc.*) 429.
Picciolii ROND. (*Phy.*) 378.
picca MACQ. 205.
picca MEIG. 213.
picca R.-D. (*Go.*) 365.
picca R.-D. (*Meg.*) 499.
picena R.-D. 741.
piccus FALL. 106.
picipes MEIG. 668.
picipes ROND. 280.
pieta LEHM. 177.
pieta MEIG. (*De.v.*) 444.
pieta MEIG. (*Pha.*) 188.
pieta MEIG. (*Phar.*) 555.
pieta MEIG. (*Sph.*) 75.
pieta POK. 401.
pieta ZETT. (*Graph.*) 600.
pieta ZETT. (*Wag.*) 376.
picticornis MUK. 154.
pictipennis B. B. 428.
pictipennis EGG. 35.
pictipennis LW. (*Coen.*) 735.
pictipennis LW. (*Phyll.*) 508.
pictipes LW. 130.
pictiventris ZETT. (*Act.*) 390.
pictiventris ZETT. (*Br.*) 722.
pictus MEIG. 207.
picridis R.-D. (*Co.*) 310.
picridis R.-D. (*Phr.*) 274.
piper SCHRANK. 154.
pigra FABR. 130.
pigra LW. 41.
pigra PASZ. 129.
piliceps ZETT. 411.
pilicornis PAND. 513.
pilifer BECK. 36.
pilifera ROND. 229.
pilifera ZETT. 722.
piligera ROND. 518.
piligera ZETT. 631.
pilimanum ROND. 507.
pilipennis FALL. 390.
pilipennis R.-D. 389.
pilipes LW. 431.
pilipes ROND. 601.
pilipes STEIN. 654.
piliseta B. B. 453.
pilitarse ROND. 507.
pilitarsis STEIN. 722.
piliventris POK. 693.
pilosa LW. 680.
pilosa R.-D. (*All.*) 578.
pilosa R.-D. (*Sar.*) 483.
pilosa R.-D. (*Serr.*) 191.
pilosa STEIN. 706.
pilosa ZETT. 167.
pilosella ROND. 722.
pilosiventris BECK. 163.
pilosula R.-D. 525.
pilosus LW. 101.
pinastri DEG. 63.
pinctorum MACQ. 284.
pinguicula ZETT. 563.
pini BECK. 36.
pini HART. 663.
pini PERR. 130.
pinariac HART. 292.
piniperdae RATZ. 353.
pinivorae RATZ. 293.
pipiens L. 132.
pipiens PERR. 517.
pisciventris PAND. 423.
Pitho WALK. 353.
placida MEIG. 33.
placida R.-D. (*Car.*) 236.
placida R.-D. (*Euph.*) 609.
placida R.-D. (*Pha.*) 574.
placida R.-D. (*Phr.*) 274.
placida R.-D. (*Tri.*) 355.
placidus MEIG. 62.
plana ROND. 11.
planiceps LW. 120.
planifacies BECK. 36.
planifrons MEIG. 138.
planigena PAND. 397.
platura MEIG. 722.
platura ROND. 722.
platycera MACQ. 253.
platygaster THOMS. 722.
platygastra LW. 47.
platyptera ZETT. 622.
platysoniac T.-T. 232.
plebeja FABR. 446.
plebeja R.-D. 693.
plebejus FALL. 414.
plebejus SCHRANK. 154.
plorans ROND. 376.
plumata DEG. 92.
plumata R.-D. 622.
plumbago LW. 16.
plumbea MEIG. 622.
plumbea ZETT. 622.
plumbella BECK. 36.
plumicornis ZETT. 514.
plumigera WIED. 460.
plumiseta STEIN. 673.

- plumosa* Gmel. 92.
plumosior PAND. 687.
plumosula R.-D. (*Car.*) 741.
plumosula R.-D. (*Del.*) 693.
plumosula R.-D. (*Phyll.*) 693.
plumalifera Lw. 32.
plurinotata BRULLE. 728.
pluriseta PAND. 517.
plurispinulosa ZETT. 173.
plusiae R.-D. 253.
pluvialis L. 728.
pocopyges PODA. 92.
podacina R.-D. 389.
podagratus ZETT. 45.
podagratus ZETT. 44.
podagrica FABR. 86.
podagrica Lw. 601.
podomygia B. B. 393.
Pokornygi STEIN. 666.
polita BECK. 36.
polita HARR. 17.
polita MEG. (*Pyg.*) 607.
polita MEG. (*Tach.*) 341.
polita MÜK. 551.
polita R.-D. (*Euph.*) 609.
polita R.-D. (*Lu.*) 540.
polita SCHIX. 292.
politula COG. 190.
politus R.-D. 207.
polleniella ROND. 280.
pollinosa BECK. 36.
pollinosa STEIN. 645.
polonica B. B. 437.
polychaeta Egg. 292.
polychaeta MACQ. 245.
polychaeta STEIN. 663.
polygona KALT. 706.
polyodon MEG. 520.
polystigma MEG. 673.
pomonellae SCHIX. 391.
pomoriorum BIG. 299.
Popelii PORTSCH. 201.
popularis MEG. 256.
populi MEG. 622.
populi WALK. 622.
populi ZETT. 622.
porcinus Coq. 68.
porcinus DEG. 102.
potcula ZETT. 245.
Portii ROND. 153.
Portschinskyi SCHIX. 622.
postica STEIN. 663.
posticata MACQ. 115.
posticata STROBL. 177.
posticatus MEG. 117.
posticatus ZETT. 627.
posticus ZETT. 627.
potamogeti R.-D. (*Hydr.*) 687.
potamogeti R.-D. (*Lispa*) 680.
potamogeti R.-D. (*Stag.*) 622.
Potaniini PORTSCH. 590.
potatoria R.-D. (*Phr.*) 274.
potatoria R.-D. (*Ta.*) 345.
potatoria R.-D. (*Zen.*) 280.
potens HARR. 122.
praeceps MEG. 195.
praeceps R.-D. (*Lygd.*) 292.
praeceps R.-D. (*Phr.*) 274.
praeceps R.-D. (*Sa.*) 484.
praeceps R.-D. (*Sa.*) 487.
praeceps R.-D. (*Zen.*) 280.
praeceps ROSSI. 430.
praeceps SCHIX. 433.
praeceps Scop. 432.
praeincta Scop. 52.
praeclosa PAND. 378.
praecor MEG. 306.
praecor R.-D. (*Egley*) 722.
praecor R.-D. (*Euph.*) 609.
praecor R.-D. (*Maur.*) 520.
praecor R.-D. (*Phor.*) 320.
praecor R.-D. (*Phr.*) 274.
praecox R.-D. (*Rhin.*) 466.
praecor R.-D. (*Sar.*) 476.
praecor R.-D. (*Sar.*) 488.
praecor R.-D. (*Stom.*) 612.
praecor ROSSI. 109.
praecor ZETT. 37.
praefica MEG. 407.
praefica R.-D. 274.
praepotata R.-D. 422.
praepotens MEG. 337.
praepotens WIED. 693.
praestans R.-D. 540.
praeterita WALK. 622.
praeterrisa ZETT. 276.
praetexta PAND. 741.
praetiosa R.-D. (*Lu.*) 534.
praetiosa R.-D. (*Lu.*) 540.
prasina BIG. 522.
prasina B. B. 522.
prasina R.-D. 534.
prasinae WULF. 391.
pratensis MEG. (*Lath.*) 722.
pratensis MEG. (*Ch.*) 33.
pratensis MEG. (*Ma.*) 281.
pratensis R.-D. (*All.*) 582.
pratensis R.-D. (*Clq.*) 570.
pratensis R.-D. (*Del.*) 722.
pratensis R.-D. (*Euphemia*) 622.
pratensis R.-D. (*Gymn.*) 673.
pratensis R.-D. (*Lu.*) 534.
pratensis R.-D. (*Lu.*) 540.
pratensis R.-D. (*Mci.*) 322.
pratensis R.-D. (*Mor.*) 601.
pratensis R.-D. (*Myl.*) 422.
pratensis R.-D. (*Phc.*) 320.
pratensis R.-D. (*Phr.*) 274.
pratensis R.-D. (*Poll.*) 527.
pratensis R.-D. (*Sar.*) 476.
pratensis R.-D. (*Ta.*) 348.
pratensis STROBL. 722.
praticola R.-D. (*Sar.*) 476.
praticola R.-D. (*Sar.*) 487.
praticola ZETT. 729.
pratincola PANZ. 729.
pratincola MEG. 729.
pratorum FALL. 163.
pratorum MEG. (*Dos.*) 605.
pratorum MEG. (*Er.*) 106.
pratorum R.-D. 239.
pretiosa SCHIX. 663.
prima B. B. 262.
primus Lw. 5.
privigna PAND. 191.
privigna ROND. 489.
probata R.-D. 274.
proboscidea HOLMGR. 741.
procat R.-D. (*Sar.*) 470.

- procar* R.-D. (*Soc.*) 483.
procar R.-D. (*Ta.*) 345.
procellaris ROND. 729.
procera MEIG. 434.
procera ROND. 397.
processioneae RATZEB. 312.
productus SCHN. 3.
profuga R.-D. (*Myl.*) 422.
profuga R.-D. (*Ta.*) 345.
profugax PAND. 622.
profuges HARR. 80.
projecta BECK. 177.
proletaria EGG. 415.
profixa MEIG. 424.
promans HARR. 409.
prominens MEIG. 245.
promissa MEIG. 722.
prompta MEIG. 290.
prompta R.-D. (*Act.*) 391.
prompta R.-D. (*Euph.*) 609.
prompta R.-D. (*La.*) 541.
prompta R.-D. (*Ner.*) 729.
prompta R.-D. (*On.*) 553.
prompta R.-D. (*Phr.*) 274.
prompta R.-D. (*Phy.*) 462.
properans ROND. 296.
properans ROSSI. 187.
properata R.-D. 274.
propinqua R.-D. (*La.*) 541.
propinqua R.-D. (*Soc.*) 476.
propinqua R.-D. (*Ta.*) 345.
propinqua STORM. 645.
propinquus MACQ. 63.
prosaic R.-D. 310.
prosopoides B. B. 280.
prospinosa PAND. 645.
prostrata ROSSI. 663.
protuberans PAND. 489.
protuberans ZETT. (*Anth.*) 645.
protuberans ZETT. (*Stri.*) 411.
provida MEIG. 466.
provida R.-D. 274.
provincialis MACQ. 199.
provocatrix R.-D. 307.
proxima EGG. 327.
proxima MEIG. 237.
proxima R.-D. 274.
proxima ROND. (*Soc.*) 489.
proxima ROND. (*Vol.*) 92.
proxima SAY. 133.
proxima ZETT. 36.
pruinosa MACQ. 527.
pruinosa MEIG. (*Anth.*) 663.
pruinosa MEIG. (*Er.*) 295.
pruinosa MEIG. (*La.*) 541.
pruinosa R.-D. (*La.*) 541.
pruinosa R.-D. (*Mel.*) 322.
pruinosa R.-D. (*Phr.*) 274.
pruinosum BIG. 50.
prunaria ROND. 376.
pruni ROSSI. 120.
Przewalskii PORT. (*Chry.*) 150.
Przewalskii PORT. (*Port.*) 590.
pseudoarmata STROBL. 663.
pseudococcinella STROBL. 169.
pseudofugax STROBL. 722.
pseudomaculipes STROBL. 693.
psilophthalma BECK. 36.
ptiloparia B. B. 315.
pubeus PAND. 328.
pubera VERR. 23.
pubera ZETT. 36.
puberula R.-D. 252.
puberula ZETT. 453.
pubescens CURT. 145.
pubescens R.-D. (*La.*) 534.
pubescens R.-D. (*Oph.*) 656.
pubescens R.-D. (*Poll.*) 529.
pubescens STEIN. 645.
pubiceps ZETT. 549.
pubicheta ROND. 646.
pubicornis ZETT. 353.
pubipes ZETT. 629.
pubiseta ZETT. (*Anth.*) 646.
pubiseta ZETT. (*Mus.*) 284.
pubibunda GIMM. 319.
pubica R.-D. 416.
pubica ROND. 722.
pubicus ROND. (*Mer.*) 120.
pubicus ROND. (*Mi.*) 208.
puella MEIG. (*Anth.*) 687.
puella MEIG. (*Er.*) 253.
puella MEIG. (*La.*) 543.
puella R.-D. (*Car.*) 237.
puella R.-D. (*Euph.*) 609.
puella R.-D. (*Phr.*) 274.
puella R.-D. (*Ta.*) 337.
puella R.-D. (*Ta.*) 345.
puella ROND. (*Chac.*) 402.
puella ROND. (*Cl.*) 393.
puella SCHN. 693.
puerula ROND. 489.
pugnax R.-D. 345.
pulehella LW. 680.
pulehella MEIG. 399.
pulehella R.-D. 541.
pulehellus LW. 136.
pulehellus PALMA. 42.
puleher MEADE. 630.
puleherimus STROBL. 3.
pulehra EGG. 508.
pulehra WIED. 538.
pulehriceps ALDR. 35.
pulehriceps LW. 677.
pulehriceps MEIG. 99.
pulehripes LW. (*Anth.*) 706.
pulehripes LW. (*Chil.*) 35.
pulehripes THOMS. 164.
pulicaria FALL. (*Aph.*) 177.
pulicaria FALL. (*Pla.*) 183.
pulicaria ZETT. 741.
pullata CZERNY. 622.
pullata MEIG. 280.
pullula ZETT. (*Ar.*) 693.
pullula ZETT. (*Mor.*) 501.
pulverulenta BIG. 573.
pulverulenta MACQ. 284.
pulverulenta R.-D. (*Egle.*) 722.
pulverulenta R.-D. (*Myl.*) 420.
pulverulenta R.-D. (*Pcl.*) 200.
pulverulentus MACQ. 414.
pulvillata ROND. 526.
pumicata MACQ. 312.
pumicata MEIG. 313.
pumicata SCHN. 299.
pumicatum MEIG. 51.

- pumicea* R.-D. 541.
pumila FALL. 741.
pumila MACQ. (*Mgi.*) 423.
pumila MACQ. (*Ta.*) 345.
pumila MEIG. (*Aph.*) 178.
pumila MEIG. (*Mas.*) 284.
pumila MEIG. (*Sar.*) 489.
pumila POK. 742.
pumila R.-D. (*Mci.*) 324.
pumila R.-D. (*Poll.*) 527.
pumila R.-D. (*Ta.*) 345.
pumila ROND. 259.
pumila STEIN. 742.
pumila STROBL. 742.
pumila ZETT. (*Anth.*) 742.
pumila ZETT. (*Aph.*) 178.
pumilus MACQ. 116.
punctata B. B. 332.
punctata O. G. COSTA. 521.
punctata MACQ. 622.
punctata MEIG. 577.
punctata R.-D. (*Cy.*) 567.
punctata R.-D. (*Hct.*) 517.
punctata R.-D. (*Pal.*) 742.
punctata R.-D. (*Per.*) 199.
punctata R.-D. (*Phr.*) 274.
punctata R.-D. (*Rohr.*) 646.
punctata R.-D. (*Sar.*) 470.
punctata R.-D. (*Tam.*) 569.
punctatella R.-D. 674.
punctatum ROND. 507.
punctatum MEIG. 507.
punctatus M'ILL. 98.
puncticeps ZETT. 404.
puncticornis MEIG. 366.
puncticornis ZETT. 517.
punctifer WALK. 98.
punctifera WALK. 200.
punctifrons LW. 136.
punctivenis BRAUER. 439.
punctivenis ZETT. 170.
punctiventris ZETT. (*Anth.*) 646.
punctiventris ZETT. (*Ar.*) 722.
punctiventris ZETT. (*Ta.*) 569.
punctulata R.-D. (*Sar.*) 470.
punctulata WOLF. 464.
punctulatus R.-D. (*Mi.*) 207.
punctulatus VERR. 69.
punctulatus ZETT. 2.
punctum B. B. 220.
punctum MEIG. 745.
pungens FABR. 613.
pungens DEG. 612.
pungens R.-D. 612.
puparum FABR. 219.
puparum R.-D. (*Care.*) 236.
puparum R.-D. (*Eru.*) 217.
puparum R.-D. (*Mas.*) 282.
puparum WALK. 211.
pupiphaga ROND. 228.
pupivora R.-D. (*Mas.*) 284.
pupivora R.-D. (*Phr.*) 274.
pura LW. 622.
purpurea R.-D. (*All.*) 581.
purpurea R.-D. (*Eaph.*) 609.
purpurea R.-D. (*Lu.*) 535.
purpurea R.-D. (*Lu.*) 541.
purpureofasciata ZETT. 607.
purpureus BRAUER. 592.
purpureus MACQ. 136.
pusilla MACQ. (*Ecl.*) 195.
pusilla MACQ. (*Er.*) 253.
pusilla MACQ. (*Pho.*) 319.
pusilla MACQ. (*Ta.*) 353.
pusilla MACQ. (*Ta.*) 348.
pusilla MACQ. (*Te.*) 468.
pusilla MEIG. (*Anth.*) 583.
pusilla MEIG. (*Anth.*) 729.
pusilla MEIG. (*Aph.*) 178.
pusilla MEIG. (*Chort.*) 722.
pusilla MEIG. (*Oc.*) 428.
pusilla MEIG. (*On.*) 552.
pusilla R.-D. (*Ba.*) 382.
pusilla R.-D. (*Cl.*) 331.
pusilla R.-D. (*Co.*) 310.
pusilla R.-D. (*Nyr.*) 498.
pusilla R.-D. (*Ply.*) 301.
pusilla R.-D. (*Rhin.*) 465.
pusilla ROND. 33.
pusilla ZETT. (*Er.*) 253.
pusilla ZETT. (*Hct.*) 517.
pusillum WOLF. 417.
pusillus LW. 136.
pusillus A. ROS. 82.
pusescens SCHELL. 94.
Puziloi PORTSCH. 610.
Pygerae R.-D. 310.
pygialis PAND. 722.
pygmaea FALL. (*Cat.*) 560.
pygmaea FALL. (*Lispa.*) 680.
pygmaea MACQ. (*Dec.*) 400.
pygmaea MACQ. (*Mcl.*) 461.
pygmaea MACQ. (*Ta.*) 248.
pygmaea PAND. 501.
pygmaea R.-D. (*Err.*) 396.
pygmaea R.-D. (*Di.*) 450.
pygmaea R.-D. (*Mci.*) 324.
pygmaea R.-D. (*Phr.*) 274.
pygmaea ROND. 516.
pygmaea STROBL. 502.
pygmaea ZETT. (*Anth.*) 742.
pygmaea ZETT. (*Aph.*) 178.
pygmaea ZETT. (*Chil.*) 33.
pygmaea ZETT. (*Mor.*) 500.
pygmaea ZETT. (*Sar.*) 490.
pygmacella POK. 742.
pylone WALK. 646.
pyralidis R.-D. 258.
pyrastris L. 56.
pyrrhocroa R.-D. 541.
pyrrhois R.-D. 541.
pyrrhopas R. D. 535.
pyrrorum SCHENK. 63.
pyrrhocera WIED. 353.
pyrrhogaster ROND. 202.
quadrata BOUCHE. 476.
quadrata GMM. 173.
quadraticornis MEADE. 208.
quadratus MACQ. 46.
quadricincta ROND. 382.
quadricincta WALK. 353.
quadricinctus ROND. 82.
quadrifasciatus MEIG. 4.
quadriguttata MACQ. 12.
quadriguttata R.-D. 274.
quadrlineata MACQ. 681.
quadriculatus LIOY. 120.
quadrilium R.-D. 271.
quadrimaculata FALL. 646.
quadrimaculata GR. 228.

- quadrinaculata* MACQ. 324.
quadrinaculata PANZ. 12.
quadrinaculata R.-D. (*Er.*) 296.
quadrinaculata R.-D. (*Mas.*) 282.
quadrinaculata VERR. 48.
quadrinotata MACQ. 516.
quadrinotata MEIG. (*Anth.*) 646.
quadrinotata ME. (*Ta.*) 353.
quadrinotata R.-D. (*Bu.*) 382.
quadrinotata R.-D. (*Phr.*) 274.
quadripunctata BELLE. 646.
quadripunctata MEIG. 86.
quadripunctata ROSSI. 676.
quadripustulata FABR. 230.
quadripustulata HART. 230.
quadrisetosa THOMS. 646.
quadrisignata R.-D. 322.
quadricittatus MACQ. 4.
quadrum FABR. 646.
quadrum FALL. 647.
quaesenda PAND. 694.
quaesita R.-D. 274.
quatuoraculata ROND. 12.
quatuorrotata ROND. 647.
quatuorpunctata AMST. 647.
quatuorpunctata R.-D. 617.
quercifolia BOCCHE. 622.
quieta R.-D. (*Lu.*) 535.
quieta R.-D. (*Mi.*) 324.
quieta R.-D. (*Phr.*) 274.
quieta R.-D. (*Ta.*) 345.
quieta R.-D. (*Ta.*) 345.
quinquefasciatus SCHIX. 98.
quinque-lineata ZETT. 674.
quinque-lineatus FABR. 98.
quinquemaculata MACQ. (*Anth.*) 729.
quinquemaculata MACQ. (*Spil.*) 647.
quinquestriatus FABR. 98.
quinquevirgata PAND. 722.
quinquevittata HART. 470.
quinquevittatus MACQ. 98.
quintilis PAND. 722.
radicum FABR. 213.
radicum L. 729.
radicum PAND. 212.
raibensis B. B. 245.
Ramburii R.-D. 476.
ranunculi HOLMGR. 674.
ranunculi PANZ. 124.
rapax R.-D. 345.
rapida MACQ. 316.
rapida MEIG. (*Er.*) 245.
rapida MEIG. (*Pho.*) 173.
rapida R.-D. (*Er.*) 253.
rapida R.-D. (*Myd.*) 647.
rapida R.-D. (*Pho.*) 316.
rapida R.-D. (*Phr.*) 274.
rapida R.-D. (*Pl.*) 455.
rapida R.-D. (*Ta.*) 337.
rapida R.-D. (*Ta.*) 468.
rapidum R.-D. 329.
rapidus MEIG. 208.
rara FABR. 123.
rasa MACQ. 237.
Ratzburgi ZETT. 6.
rebaptizata ROND. 222.
recumbo HARR. 193.
recons BECK. 36.
reclusa WALK. 353.
recta MACQ. 528.
recta MEIG. 211.
rectangularis PAND. 379.
rectangularis MACQ. 458.
rectella R.-D. 274.
rectinervis BIG. 531.
rectinervis KERT. 83.
rectinervis MACQ. 345.
rectinervis R.-D. (*Bau.*) 358.
rectinervis R.-D. (*Er.*) 247.
rectinervis R.-D. (*My.*) 422.
rectinervis R.-D. (*My.*) 423.
rectinervis R.-D. (*Orth.*) 609.
rectinervis WCLP. 187.
rectistylum MACQ. 367.
rectus O.-S. 70.
recurrens LW. 16.
recurra HARR. 529.
recusata PAND. 246.
redempta PAND. 468.
releo HARR. 535.
relecta PAND. 735.
reflecta WALK. 353.
reflexa R.-D. (*Bess.*) 565.
reflexa R.-D. (*Myg.*) 677.
reformata ROND. 211.
reformata WALK. 353.
regalis MEIG. (*Luc.*) 542.
regalis MEIG. (*Musc.*) 609.
regalis R.-D. 544.
regalis ROND. 195.
regalis STEIN. 623.
regens MEIG. 687.
regina MEIG. 530.
Reginaldi R.-D. 483.
regula FALL. 124.
regula R.-D. (*Er.*) 380.
regula R.-D. (*Ta.*) 345.
rejecta WALK. 353.
relata R.-D. 274.
relictus ZETT. 69.
remorata HOLMGR. 722.
remotella SCHIX. 733.
remotella STROBL. 735.
remotella ZETT. 731.
repanda R.-D. 292.
repulsa WALK. 647.
resinellae GIRSCH. 280.
resinellae SCHIRAK. 391.
resplendens WAILRG. 610.
restituo HARR. 426.
retracta WALK. 284.
retioocurra PAND. 553.
retrollexus PAND. 208.
retrostimulea PAND. 722.
retusa R.-D. 274.
reventa WALK. 353.
rhingoides BIG. III.
rhinotmeta PAND. 723.
rhynochops EGG. 36.
ribesii FALL. p. p. 65.
ribesii L. 69.
ridens WALK. 98.
rigida BECK. 681.
rimans ROND. 706.
ripae BRISCHKE. 292.

- riparia* FALL. 677.
riparia MACQ. 623.
riparia R.-D. (*Car.*) 742.
riparia R.-D. (*Del.*) 694.
riparia R.-D. (*Hydr.*) 654.
riparia R.-D. (*Lin.*) 742.
riparia R.-D. (*Lispa*) 681.
riparia R.-D. (*Mel.*) 461.
riparia R.-D. (*Musca*) 604.
riparia R.-D. (*On.*) 553.
riparia R.-D. (*Sar.*) 476.
riparia R.-D. (*Sar.*) 480.
riparia R.-D. (*Te.*) 468.
ripicola R.-D. 742.
rivularis R.-D. (*Im.*) 663.
rivularis R.-D. (*Lim.*) 674.
rivularis R.-D. (*Lim.*) 742.
rivularis R.-D. (*Musc.*) 604.
Robertii MACQ. 284.
robusta LW. 431.
robusta ROND. (*Mer.*) 219.
robusta ROND. (*Myl.*) 440.
robustum PORTSCH. 150.
Roederi KOW. 726.
Roederii G.-T. 195.
Rogenhoferi STROBL. 706.
rostelliformis R.-D. 633.
Rondania PAND. 726.
Rondanii G.-T. 196.
Rondanii MEADE. 654.
Rondanii PAND. (*Dio.*) 330.
Rondanii PAND. (*Lim.*) 631.
Rondanii PAND. (*St.*) 457.
Rondanii STR. (*Coen.*) 742.
Rondanii STR. (*Hom.*) 664.
roralis L. 460.
roralis SCHRANK. 403.
rosae DEG. 57.
rosae HENN. 47.
rosarum FABR. 47.
rosarum PANZ. (*Asch.*) 54.
rosarum PANZ. (*Pip.*) 10.
rosanae B. B. 280.
Rosei BECK. 164.
Rosei ROND. (*Call.*) 153.
Rosei ROND. (*Fann.*) 661.
Rosei ROND. (*Mel.*) 512.
rossica PORTSCH. 115.
rossica SCHNABL. 623.
rostrata EGG. 575.
rostrata L. 89.
rostrata PAND. 490.
rostrata ZETT. 26.
rostratus MEADE. 630.
rostratus ZETT. 45.
rostellum R.-D. 535.
Rolhi PAND. 569.
Rolhi ZETT. 569.
rotundata HARR. 196.
rotundata R.-D. 274.
rotundicornis ZETT. 254.
rotundatum L. 558.
rotundicollis R.-D. 571.
rotundicornis SCHIX. 254.
rotundicornis STROBL. 15.
rotundicornis ZETT. 407.
rotundiventris ZETT. 507.
rotundiventris BECK. 37.
rotundiventris FALL. 571.
rotundiventris LW. 575.
rotundiventris PAND. 723.
rotundicultris ZETT. (*Dr.*) 674.
rubescens R.-D. (*Per.*) 424.
rubescens R.-D. (*Mel.*) 461.
rubescens R.-D. (*Mor.*) 500.
rubescens R.-D. (*Ng.*) 498.
rubescens R.-D. (*Pel.*) 200.
rubescens R.-D. (*Sar.*) 476.
rubescens R.-D. (*Ses.*) 416.
rubescens R.-D. (*Ta.*) 337.
rubetra R.-D. (*Hist.*) 359.
rubetra R.-D. (*Zen.*) 452.
rubida LW. 432.
rubida R.-D. 577.
rubidigaster BIG. 199.
rubidiventris A. COSTA. 120.
rubifrons BIG. 723.
rubiginans PAND. 723.
rubiginosa R.-D. 476.
rubiginosus R.-D. 207.
rubra GURCH. 574.
rubrella R.-D. (*Ec.*) 241.
rubrella R.-D. (*Lu.*) 541.
rubella R.-D. (*Phor.*) 274.
rubrica MEIG. 223.
rubricera BRAUER. 504.
rubricornis MACQ. 513.
rubricornis R.-D. (*Ecl.*) 193.
rubricornis R.-D. (*Gg.*) 522.
rubicornis R.-D. (*Lu.*) 535.
rubicornis R.-D. (*Mel.*) 461.
rubicornis R.-D. (*Poll.*) 528.
rubicornis R.-D. (*Sar.*) 487.
rubicornis ZETT. (*Anth.*) 732.
rubicornis ZETT. (*Nem.*) 224.
rubricosa MEIG. 459.
rubrifacies R.-D. 553.
rubrifrons MACQ. (*Car.*) 286.
rubrifrons MACQ. (*Phor.*) 320.
rubrifrons PERR. 293.
rubrifrons R.-D. (*Act.*) 389.
rubrifrons R.-D. (*Fell.*) 630.
rubrifrons R.-D. (*Per.*) 294.
rubrifrons R.-D. (*Slow.*) 612.
rubrifrons R.-D. (*Ta.*) 345.
rubrigaster ROND. 199.
rubripes R.-D. (*Lin.*) 742.
rubripes R.-D. (*Macq.*) 406.
rubriseutellata MACQ. 353.
rubitarsis ZETT. 378.
rubiventris MACQ. 137.
Ruddii CURT. 112.
rudis FABR. 526.
rudis FALL. 247.
rudis MEIG. 245.
rudis SCHIX. 211.
rufa FABR. 433.
rufa MEIG. (*Hyl.*) 691.
rufa MEIG. (*Plat.*) 188.
rufa SCHUMM. 153.
rufa WILL. 88.
rufella R.-D. 528.
rufibarbis MEIG. 556.
ruficauda BIG. 135.
ruficauda MEIG. 125.
ruficauda R.-D. 290.
ruficauda ZETT. (*Ec.*) 220.
ruficauda ZETT. (*Par.*) 2.

- ruficauda* ZETT. (*Sar.*) 478.
ruficaudis DEG. 126.
ruficeps FABR. 521.
ruficeps FALL. 360.
ruficeps MACQ. 204.
ruficeps MEIG. (*Anth.*) 730.
ruficeps MEIG. (*Lac.*) 535.
ruficeps MEIG. (*Poll.*) 529.
ruficeps CURT. 364.
ruficeps STAEG. 723.
ruficeps ZETT. (*Anth.*) 706.
ruficeps ZETT. (*Syn.*) 562.
ruficollis BECK. 37.
ruficornis GIMM. 506.
ruficornis MEIG. 506.
ruficornis CURT. 136.
ruficornis FABR. 139.
ruficornis MACQ. (*Coen.*) 742.
ruficornis MACQ. (*Cy.*) 202.
ruficornis MACQ. (*Eu.*) 134.
ruficornis MACQ. (*Mus.*) 284.
ruficornis MACQ. (*Pl.*) 455.
ruficornis MACQ. (*Poll.*) 529.
ruficornis MEIG. (*Aph.*) 178.
ruficornis MEIG. (*Cr.*) 13.
ruficornis MEIG. (*Ech.*) 193.
ruficornis MEIG. (*Eu.*) 136.
ruficornis MEIG. (*Mer.*) 120.
ruficornis POK. 709.
ruficornis R.-D. (*Er.*) 296.
ruficornis R.-D. (*My.*) 451.
ruficornis ROND. 83.
ruficornis ROSSI. 139.
ruficornis STROBL. 14.
ruficornis ZETT. (*My.*) 123.
ruficornis ZETT. (*Vor.*) 371.
ruficurva ROND. (*Poll.*) 528.
ruficurva ROND. (*Ycl.*) 623.
ruficurus PAND. 420.
ruficurus R.-D. 422.
rulifrons BIG. 647.
rulifrons LW. 432.
rulifrons MACQ. 338.
rulifrons MEIG. 676.
rulifrons ROND. 450.
rulifrons v. Ros. 706.
ruligena BIG. 531.
rulinana BECK. 37.
rulinana STROBL. 674.
rulinanus BOHEM. 14.
rulina FALL. 706.
rulina MEIG. 703.
rulina ZETT. 391.
rulinasulcus BIG. 66.
rulinovis POK. 647.
rulipalpis JAENS. 531.
rulipalpis MACQ. (*Ar.*) 623.
rulipalpis MACQ. (*Min.*) 410.
rulipalpis MACQ. (*Or.*) 553.
rulipalpis MACQ. (*Poll.*) 528.
rulipalpis MEIG. (*Coen.*) 742.
rulipalpis MEIG. (*Phor.*) 320.
rulipalpis ROND. 371.
rulipalpis STROBL. 742.
rulipennis MACQ. 173.
rulipes B. B. (*Cr.*) 287.
rulipes B. B. (*Dol.*) 444.
rulipes FALL. (*Gym.*) 182.
rulipes FALL. (*Macq.*) 406.
rulipes FALL. (*Musc.*) 664.
rulipes FALL. (*Musc.*) 706.
rulipes LW. 130.
rulipes MACQ. (*Lr.*) 742.
rulipes MACQ. (*Chi.*) 37.
rulipes MACQ. (*Chry.*) 210.
rulipes MACQ. (*Par.*) 467.
rulipes MEIG. (*Aph.*) 179.
rulipes MEIG. (*Or.*) 431.
rulipes MEIG. (*Pl.*) 164.
rulipes R.-D. 376.
rulipes WIED. 490.
rulipes ZETT. 707.
rulipila MEIG. 123.
rulipilus EGG. 126.
ruliscutellaris ZETT. 313.
ruliseta ZETT. 623.
rulisetiformis STROBL. 623.
rulisquamata MACQ. 254.
rulitarsis LW. 18.
rulitarsis MEIG. 378.
rulitarsis ZETT. 37.
rulitorax MEIG. 11.
rulitibia EGG. 27.
rulitibia v. Ros. 333.
rulitibia STROBL. 569.
rulitibius ROND. 116.
ruliventris FALL. 433.
ruliventris MACQ. (*Er.*) 254.
ruliventris MACQ. (*Hyl.*) 730.
ruliventris MACQ. (*Pl.*) 188.
ruliventris R.-D. 205.
rufomaculata CURT. 122.
rufomaculatus DEG. 425.
rufonotata BIG. 232.
rufopicta BIG. 232.
rufoscutellata HEND. 263.
rufoscutellata MACQ. 296.
rufotibialis ZETT. 254.
rufus MACQ. 114.
rufus MEIG. 120.
rugifrons v. Ros. 254.
rugosa MIK. 518.
rugulosa ZETT. 707.
runicis BOUCHE. 707.
ruracula BIG. 723.
rurpestris PASZ. 29.
rurpestris R.-D. 374.
rurpestris ROND. 647.
rurpestris ROND. 647.
ruricapra MIK. 723.
ruricola BIG. 531.
rurium FABR. 106.
Rueppelli WIED. 76.
ruralis FALL. (*Ang.*) 495.
ruralis FALL. (*Vor.*) 370.
ruralis MACQ. 623.
ruralis MEIG. 687.
ruralis MEIG. (*Chi.*) 37.
ruralis MEIG. (*Pl.*) 164.
ruralis MEIG. (*Wohl.*) 494.
ruralis R.-D. (*Cl.*) 571.
ruralis R.-D. (*Er.*) 380.
ruralis R.-D. (*Euph.*) 609.
ruralis R.-D. (*Er.*) 250.
ruralis R.-D. (*Met.*) 512.
ruralis R.-D. (*My.*) 421.
ruralis R.-D. (*Phr.*) 274.
ruralis R.-D. (*Pty.*) 302.
ruralis R.-D. (*Tc.*) 468.
ruralis R.-D. (*Zen.*) 280.
ruralis STROBL. 161.

- curialis* WALK. 168.
ruicola MEIG. 369.
ruicola R.-D. 476.
rustica FABR. 445.
rustica FALL. 337.
rustica MEIG. 341.
rustica R.-D. (Ill.) 581.
rustica R.-D. (Fr.) 647.
rustica R.-D. (Er.) 254.
rustica R.-D. (Hel.) 647.
rustica R.-D. (Hyl.) 694.
rustica R.-D. (Musca) 604.
rustica R.-D. (Muscina) 614.
rustica R.-D. (My.) 420.
rustica R.-D. (Phorb.) 723.
rustica R.-D. (Poll.) 528.
rustica R.-D. (Phr.) 256.
rustica R.-D. (Phr.) 274.
rustica R.-D. (Sar.) 483.
rustica R.-D. (Sar.) 487.
rustica R.-D. (Tach.) 337.
rustica R.-D. (Tc.) 468.
rusticana R.-D. (Sar.) 488.
rusticana R.-D. (Ta.) 348.
rusticanum R.-D. 506.
rusticanus R.-D. 208.
rutila MEIG. 286.
rutila R.-D. (Linn.) 205.
rutila R.-D. (La.) 541.
rutilans MEIG. 506.
rutilans R.-D. 656.
rutilla ROND. 238.
rutillus HARR. 433.
rutilo HARR. 139.
rygelina ROND. 415.
sabulorum FALL. 136.
sabulosa R.-D. (Er.) 241.
sabulosa R.-D. (Mel.) 513.
sabulosa WULF. 361.
Sackenii G.-T. 150.
Sackenii WILL. 115.
sagax R.-D. 345.
sagittariae R.-D. (Hyl.) 687.
sagittariae R.-D. (Pal.) 742.
Sahlbergi BECK. 37.
Sahlbergi ZETT. 647.
saigae PALL. 589.
salicis ZETT. 707.
salinarum STEIN. 743.
saltatrix R.-D. 664.
saltuum FABR. 143.
saltuum MEIG. (Er.) 246.
saltuum MEIG. (Spi.) 142.
saltuum ROND. (Das.) 605.
saltuum ROND. 105.
salutaris MEIG. 596.
salutiferus CLARK. 596.
Sancti-Jacobi BIG. 723.
Sancti-Marci CZERNY. 723.
sanguinea ROND. 427.
sanguinea WILL. 92.
sanguineus MEIG. 426.
sanguinolenta MACQ. (S.) 483.
sanguinolenta MACQ. (W.) 232.
sannio ZETT. 353.
saphyrea R.-D. 607.
sapphinea R.-D. 535.
sarcophagina SCHM. 453.
sarcopana BECK. 37.
saturnica BIG. 128.
saturniae R.-D. (Bau.) 358.
saturniae R.-D. (Tri.) 355.
Satyus BRAUER. 590.
Sayi JAENS. 541.
scavooides FALL. 82.
scalare FABR. 51.
scalare PANZ. 50.
scalaris FABR. 664.
scalaris FALL. 664.
scalaris LW. (Lisp.) 681.
scalaris LW. (Ocpp.) 431.
scambus PAND. 654.
scambus STAEG. 45.
scambus ZETT. 654.
scapularis LW. 431.
scapularis MACQ. 173.
scapularis ZETT. 707.
scatophagina ZETT. 723.
Schenckii ROND. 636.
Schineri BECK. 180.
Schineri BEZZI. 180.
Schineri EGG. 37.
Schineri ROND. 82.
Schineri STROBL. 391.
schistacea B. B. 375.
schistacea MEIG. 357.
schistacea R.-D. (Er.) 296.
schistacea R.-D. (Ta.) 345.
schistacea ROND. 306.
schistella R.-D. 348.
schisticolor ZETT. 694.
Schmidlii ZETT. 34.
Schnabli BECK. 38.
Schnabli B. B. 376.
Schnablii SCHNABL. 678.
Schummelii LW. 48.
Schummelii ROT. 439.
sciutilla R.-D. (Euph.) 609.
sciutilla R.-D. (La.) 541.
sciutilla R.-D. (La.) 542.
sciutilla R.-D. (Pyr.) 607.
scirporum R.-D. 743.
scita HARR. 121.
scitale HARR. 60.
scitulus HARR. 60.
scoparia PAND. 493.
scoparia ZETT. 677.
scoticum CUET. 145.
scripta L. 76.
scripta NOW. 674.
scrupulosa ZETT. 674.
scalpconata ROND. 7.
scutatus MEIG. 46.
scutellare LW. 149.
scutellaris FABR. 77.
scutellaris FALL. (Musc.) 623.
scutellaris FALL. (Musc.) 627.
scutellaris FALL. (Pros.) 299.
scutellaris HART. 282.
scutellaris R.-D. (Bi.) 410.
scutellaris R.-D. (Br.) 88.
scutellaris R.-D. (Car.) 236.
scutellaris R.-D. (Eru.) 213.
scutellaris R.-D. (Eru.) 215.
scutellaris R.-D. (Ery.) 296.
scutellaris R.-D. (Ery.) 380.
scutellaris R.-D. (Euph.) 609.
scutellaris R.-D. (Er.) 248.
scutellaris R.-D. (Er.) 254.
scutellaris R.-D. (La.) 535.

- scutellaris* R.-D. (*Lu.*) 544.
scutellaris R.-D. (*Ma.*) 407.
scutellaris R.-D. (*Myd.*) 647.
scutellaris R.-D. (*My.*) 422.
scutellaris R.-D. (*Phorava*) 707.
scutellaris R.-D. (*Pho.*) 316.
scutellaris R.-D. (*Phr.*) 275.
scutellaris R.-D. (*Ta.*) 337.
scutellaris R.-D. (*Ta.*) 345.
scutellaris R.-D. (*Ta.*) 348.
scutellaris ROND. 391.
scutellaris v. ROS. 707.
scutellaris STEIN. 676.
scutellaris ZETT. (*Call.*) 185.
scutellaris ZETT. (*Pro.*) 299.
scutellata FALL. 38.
scutellata MACQ. (*Call.*) 547.
scutellata MACQ. (*Ce.*) 158.
scutellata MACQ. (*Exc.*) 254.
scutellata MACQ. (*Lac.*) 609.
scutellata MEIG. 81.
scutellata NEWM. 439.
scutellata R.-D. (*Phr.*) 275.
scutellata R.-D. (*Stl.*) 224.
scutellata WALK. 39.
scutellata ZETT. (*Anth.*) 623.
scutellata ZETT. (*Mus.*) 284.
scutellatum Lw. 149.
scutellatum MACQ. 147.
scutellatus MACQ. 158.
scutellatus SCHN. 156.
scutelligera ZETT. 298.
s cunda B. B. 262.
securicornis Egg. 383.
securicornis STROBL. 392.
secutrix R.-D. (*All.*) 583.
secutrix R.-D. (*Phr.*) 275.
secutrix R.-D. (*Ply.*) 301.
sedula R.-D. (*Err.*) 215.
sedula R.-D. (*Phr.*) 275.
segetum FABR. 120.
segnis HOLMGR. 632.
segnis L. 130.
sequis PANZ. 430.
segregata ROND. (*My.*) 422.
segregata ROND. (*Par.*) 314.
seitenstettensis STROBL. 707.
sejuncta ROND. 571.
selecta MEIG. 300.
selecta PAND. 391.
selecta R.-D. 275.
Selene Lw. 138.
selene MEIG. 137.
seleniticus MEIG. 57.
Selysii CARL. 597.
Semenowi PORTSCH. 789.
semiaenea BRULLÉ. 723.
semiaperta Egg. 528.
semiantrata R.-D. 609.
semicana Egg. 569.
semicineta ZETT. 400.
semicinerea MEIG. 584.
semicinerea ROND. 579.
semicinereus WIED. 630.
semiliaphana ROND. 623.
semifasciata BECK. 38.
semifasciatum ROND. 507.
semilava HART. 173.
semifumosus Kow. 164.
semiluctifera VILL. 142.
semimaculatus BECK. 164.
seminitida ZETT. 723.
seminitidus BECK. 164.
semipellucidus ZETT. 630.
semirufa FABR. 126.
semiviolacea B. B. 410.
semizonata ZETT. 353.
senulater HARR. 128.
seneciella MEADE. 723.
senegalensis MACQ. (*Lu.*) 524.
senegalensis MACQ. (*Musc.*) 604.
senilis MEIG. (*Cer.*) 287.
senilis MEIG. (*Mer.*) 120.
senilis R.-D. 275.
senilis ZETT. 723.
senoptera MACQ. 369.
senta WALK. 353.
separ ZETT. 630.
separata MEIG. (*Anth.*) 647.
separata MEIG. (*Archi.*) 396.
separata ROND. (*Exc.*) 246.
separata ROND. (*W.*) 233.
separata SCHN. 647.
separata WALK. 353.
sepia MEIG. 723.
sepia ZETT. 723.
sepiella ZETT. 723.
sepium MACQ. 254.
sepium R.-D. (*Exc.*) 255.
sepium R.-D. (*Phr.*) 275.
septemnotata ZETT. 674.
septimalis PAND. 687.
sepuleralis L. 96.
sepuleralis MEIG. 552.
sequar R.-D. 345.
sequar R.-D. WILL. 363.
serarius WIED. 70.
serena FALL. (*Fam.*) 664.
serena FALL. (*Ma.*) 731.
serena MEIG. 607.
serena R.-D. 275.
sergia WALK. 723.
seria MEIG. 394.
sericariae ROND. 225.
sericata MEIG. (*Anth.*) 623.
sericata MEIG. (*Lu.*) 539.
sericata STROBL. 687.
sericea R.-D. (*Ca.*) 236.
sericea R.-D. (*Leuc.*) 699.
sericea R.-D. (*Linn.*) 205.
sericea R.-D. (*Pho.*) 316.
sericea R.-D. (*Sa.*) 487.
sericeus BECK. 164.
sericomylaeforme PORTSCH. 144.
seriemaculata MACQ. 508.
serolina PERR. 579.
serpylli ROND. 75.
serrata R.-D. 613.
servicentris ROND. 310.
serrulatus MEIG. 120.
serta PAND. 674.
serva MEIG. 623.
serva R.-D. (*My.*) 451.
serva R.-D. (*Phr.*) 275.
Servillei R.-D. 498.
Servilleii R.-D. (*Aph.*) 417.
Servilleii R.-D. (*Exc.*) 241.
servula R.-D. 348.

- setaria MEG. 707.
setibarba B. B. 404.
setibarba EGG. 404.
seticincta BECK. 681.
setipura ROND. 694.
setifacies ROND. (*Di.*) 331.
setifacies ROND. (*Ep.*) 261.
setigena PORTSCH. 404.
setigena ROND. 285.
setigera B. B. 262.
setigera LW. 173.
setigera POK. 647.
setigera STEIN. 624.
setipennis FALL. 385.
setipennis ROND. 490.
setiuerris ROND. 479.
setiventris MACQ. 397.
setosa B. B. 246.
setosa BRISCHKE. 370.
setosa MACQ. 216.
setosa R.-D. 292.
setosa VERR. 168.
setosus FABR. 114.
setosus MACQ. 114.
setulosa LW. 431.
serena R.-D. 275.
serreolatus BIG. 2.
sexdentata BIG. 707.
sergattatus MEG. 66.
sexmaculata MEG. 743.
sexmaculata R.-D. 569.
sexmaculata v. ROS. 188.
sexmaculata WALK. 743.
sexmaculata ZETT. 743.
sexmaculatus ZETT. 70.
sexnotata MEG. 743.
sexnotatus MEG. 46.
sexpunctata PAND. 563.
sexpunctatum MEG. 507.
sexpustulata ROND. 743.
sectana PAND. 707.
siberita FABR. 448.
sibirica BECK. 38.
sibirica LW. 131.
sibirica MACQ. 448.
sibiricum LW. 151.
sibiricum PORTSCH. 144.
sicanus ROND. 120.
siciliana BECK. 38.
sicula R.-D. (*Er.*) 296.
sicula R.-D. (*Go.*) 364.
sicula ROND. (*Pal.*) 113.
sicula ROND. (*Pl.*) 455.
Siebecki SINT. 391.
Siebkii VERR. 109.
sigillata ROND. 674.
sigillatus CURT. 5.
signata BRISCHKE. 723.
signata EGG. 24.
signata MEG. (*Anth.*) 624.
signata MEG. (*Pip.*) 13.
signata MIK. 456.
signata R.-D. 275.
signata ZETT. 746.
signicornis BECK. 38.
signatus BECK. 164.
signatus MEG. 518.
signifera Coq. 397.
silacea MEG. (*Act.*) 391.
silacea MEG. (*Anth.*) 707.
silentis HARR. 141.
Silenus BRAUER. 588.
silvana MEG. 212.
silvana ROND. 648.
silvarum L. 131.
silearum MEG. (*Chr.*) 147.
silearum MEG. (*Er.*) 105.
silvarum MEG. (*Lat.*) 541.
silvatica FALL. 281.
silvatica R.-D. (*Ba.*) 383.
silvatica R.-D. (*Eg.*) 694.
silvatica R.-D. (*Er.*) 251.
silvatica R.-D. (*Lyp.*) 221.
silvatica R.-D. (*Mer.*) 220.
silvatica R.-D. (*Phor.*) 307.
silvatica R.-D. (*Phr.*) 275.
silvatica R.-D. (*Poll.*) 528.
silvatica R.-D. (*Rha.*) 379.
silvatica R.-D. (*Sa.*) 476.
silvatica ROND. 281.
silvaticus MEG. (*Er.*) 102.
silvaticus MEG. (*Pa.*) 161.
silvestris FALL. 698.
silvestris R.-D. (*Er.*) 296.
silvestris R.-D. (*Hist.*) 359.
silvestris R.-D. (*Mi.*) 209.
silvestris R.-D. (*Par.*) 314.
silvestris R.-D. (*Phr.*) 275.
silvestris R.-D. (*Ta.*) 337.
silvestris ROND. 520.
silvestris SCHN. 698.
silvicola LW. 654.
silvicola R.-D. (*Chloë*) 691.
silvicola R.-D. (*Hyl.*) 694.
silvicola WALK. 183.
similans SCHN. 285.
similis CURT. 109.
similis FALL. 106.
similis G.-T. 195.
similis HAL. 181.
similis MEADE. (*Hyl.*) 651.
similis MEADE. (*Sar.*) 490.
similis R.-D. 275.
similis STEIN. 664.
Simonyi B. B. 449.
Simonyi POK. 684.
simplex FALL. 328.
simplex LW. (*Chrys.*) 19.
simplex LW. (*Cyrt.*) 601.
simplex MEG. 734.
simplex R.-D. 254.
simplex THOMS. 676.
simplex WIED. 627.
simplex ZELL. 364.
simplicissima LW. (*Lispa*) 681.
simplicissima LW. (*Stec.*) 457.
simplicitarsis ZETT. 222.
simulans HAET. 285.
simulans MEG. 345.
simulatrix PAND. 542.
sinccus WALK. 98.
sinensis MACQ. 122.
sinensis SCHN. 681.
singularis EGG. 562.
singularis MACQ. (*Anth.*) 1671.
singularis MACQ. (*Er.*) 254.
sinuata MACQ. (*Me.*) 513.
sinuata MACQ. (*Sph.*) 77.
sinuata MEG. 490.
sinuatus LW. 137.

- sinuatas* PALMA, 58.
siphonina ZETT. 514.
siphonoidea R.-D. 287.
siphonoidea STROBL. 391.
sistoria R.-D. 479.
smaragdula R.-D. 609.
smaragdula R.-D. 608.
smerninthi MEADE. 503.
sobria R.-D. 275.
soccata ROND. 676.
socculata ZETT. 694.
socia FALL. 707.
socia MACQ. 284.
socia R.-D. (*Phr.*) 275.
socia R.-D. (*Sar.*) 489.
socia WIED. (*Call.*) 184.
socia WIED. (*Ta.*) 353.
socialis R.-D. 535.
sociata MEIG. 687.
sociella MEADE. 665.
sociella SCHN. 665.
sociella STEIN. 708.
sociella ZETT. 664.
soemus ROND. 491.
sodalis R.-D. 275.
sola ROND. 570.
solata R.-D. 275.
solemnis MEIG. 708.
solers R.-D. (*Lu.*) 535.
solers R.-D. (*Phr.*) 275.
solers R.-D. (*Phy.*) 302.
solifuga ROND. 633.
solita WALK. 647.
solitaria STEIN. 708.
solitaria ZETT. 674.
solitarius ROND. 110.
solitarius ZETT. 72.
solivaga ROND. 285.
solicitata R.-D. 487.
solsittialis FALL. 19.
sonans R.-D. 236.
sonchi HARDY. 723.
songarea BECK. 38.
sonora MFLI. 92.
sonora R.-D. 236.
Sophia R.-D. 205.
sorbillans MACQ. 361.
sorbillans WIED. 334.
sordida BRULLÉ. 727.
sordida R.-D. (*Sar.*) 476.
sordida R.-D. (*Sar.*) 476.
sordida R.-D. (*Sar.*) 480.
sordida R.-D. (*Ta.*) 345.
sordida ZETT. (*Apb.*) 179.
sordida ZETT. (*Pro.*) 545.
sordidipennis DUF. 168.
sordidipennis HOLMGR. 674.
sordidisquama ZETT. 287.
sordidiventris ZETT. 647.
solor MACQ. 215.
solor R.-D. (*Anth.*) 730.
solor R.-D. (*Del.*) 723.
solor R.-D. (*Euph.*) 609.
solor R.-D. (*Lu.*) 535.
solor R.-D. (*Myd.*) 642.
solor R.-D. (*On.*) 551.
solor R.-D. (*Rohr.*) 624.
solor R.-D. (*Sar.*) 476.
solor R.-D. (*Ta.*) 337.
solor ROND. (*New.*) 259.
solor ROND. (*Sar.*) 491.
solor ZETT. (*Chi.*) 38.
solor ZETT. (*Pla.*) 416.
soporecula WFL. 171.
soporecula ZETT. 674.
sorella R.-D. 275.
sororia STROBL. 647.
soporia ZETT. 647.
sorlita R.-D. 275.
sparsa LW. 23.
spathulaceornis ZETT. 353.
spathulaceornis ZETT. 353.
spathulata FALL. 376.
spathulata R.-D. 392.
spathulata ZETT. 665.
spathulatus ROND. 46.
spatulans PAND. 723.
specialis R.-D. 476.
speciosa CURT. 581.
speciosa EGG. 233.
speciosa LW. 522.
speciosa MEIG. 185.
speciosa ROSSI. 144.
speciosa VILL. 665.
spectabilis B. B. 289.
spectabilis MEIG. 414.
spectabilis R.-D. 535.
speculanda PAND. 313.
speculatrix MEIG. 353.
speculifera VILL. 20.
speculiventris PAND. 687.
spemenda ZETT. 254.
sphaeroocera BECK. 41.
sphragina MEIG. 81.
sphragina ZETT. 84.
sphingicides BOUCHÉ. 173.
sphingicides STROBL. 169.
sphingidis WESTW. 173.
sphingirova R.-D. 282.
sphyroocera MACQ. 202.
spinaciae HOLMGR. 708.
spinicincta MEADE. 408.
spinicinctis PAND. 684.
spinicosta PALM. 338.
spinicosta STEIN. 647.
spinicosta ZETT. 647.
spinifemorata MEADE. 647.
spinigera LW. 133.
spinigera ROND. 377.
spinipennis MEIG. 385.
spinipes FABR. 120.
spinipes FALL. 654.
spinipes MEIG. 160.
spinipes POK. 630.
spinipes ROSSI. 138.
Spinolae ROND. 153.
spinosa ROND. 694.
spinosa ZETT. 424.
spinosissima STROBL. 171.
spinosula T.-F. 345.
spinuligera ROND. 289.
spinulosa R.-D. 345.
spissata MEADE. 665.
Spitzbergensis R.-D. 547.
splendens MACQ. 547.
splendens MEIG. 20.
splendida MEIG. (*Lio.*) 17.
splendida MEIG. (*Lu.*) 542.
splendida R.-D. 609.
splendida ROSSI. 142.
splendida WALK. 15.

- spoliata* ZETT. 656.
sponsa MEIG. 699.
sponsa R.-D. (*Sar.*) 476.
sponsa R.-D. (*W.*) 232.
sponsa ROND. 224.
spretta MEIG. (*Inth.*) 739.
spretta MEIG. (*Bibh.*) 416.
spretta R.-D. (*Phr.*) 275.
spretta R.-D. (*Sar.*) 487.
spretta R.-D. (*Ta.*) 345.
spretta STROBL. 723.
spuria ROND. 92.
spuria ZETT. 683.
spurius FALL. 166.
squalens R.-D. (*Pho.*) 531.
squalens R.-D. (*Sar.*) 476.
squalens R.-D. (*Sar.*) 476.
squalens ZETT. 624.
squalida R.-D. (*My.*) 451.
squalida R.-D. (*Sar.*) 476.
squalida R.-D. (*Sar.*) 484.
squamifera STEIN. 708.
squamillava MACQ. 320.
squamigera R.-D. 476.
squamipallens R.-D. 512.
squamosa R.-D. 477.
squamosa ZETT. 320.
stabulans FALL. 614.
stabulans MEIG. 293.
stabulans WALK. 353.
staehliera MACQ. 353.
Staegeri ROND. 511.
Staegeri ZETT. 668.
stagnalis R.-D. 743.
Steinii B. B. 440.
Steinii CZERNY. 624.
Steinii SCHN. 509.
Steinii SCHNABEL. 624.
Steinii STROBL. 676.
stelviana B. B. (*Lec.*) 555.
stelviana B. B. (*Lec.*) 509.
stenoptera MACQ. 369.
stictica MEIG. (*Hil.*) 511.
stictica MEIG. (*Tri.*) 180.
stictica SCHN. 181.
sticticus MEIG. 16.
stigmatella ZETT. 723.
stigmatica MEIG. 730.
stigmatica PAND. 723.
stigmatica ZETT. 11.
stigmaticalis THOMS. 531.
stimulus MEIG. (*Stom.*) 612.
stimulus MEIG. (*Tach.*) 338.
stimulus R.-D. 604.
stimulata R.-D. 275.
stimulator CLARK. 556.
stimulatrix ROND. 557.
stimulea PAND. 694.
stipatus WALK. 111.
stolata ROND. 624.
stramineifrons BRISCHKE. 275.
stramineifrons ZETT. 254.
stramineipes BECK. 165.
strenua MACQ. 223.
strenua MEIG. (*Inth.*) 648.
strenua MEIG. (*Ern.*) 218.
strenua PERR. 517.
strenua R.-D. (*Hyl.*) 694.
strenua R.-D. (*Pol.*) 313.
strenua R.-D. (*Poll.*) 528.
strenua R.-D. (*Sar.*) 480.
strenua R.-D. (*Sar.*) 480.
strenua R.-D. (*Sere.*) 191.
striata FABR. 491.
striata R.-D. 487.
stricta WALK. 724.
stricticeps PAND. 357.
stridens ROND. 275.
strigata GIRSCH. 575.
strigata MEIG. 358.
strigata STAEG. 77.
strigatus FALL. 137.
strigatus MEIG. (*Er.*) 137.
strigatus MEIG. (*Par.*) 4.
strigella ZETT. 743.
strigiceps ZETT. 217.
strigifrons ZETT. 108.
strigilata ZETT. 724.
strigillata BECK. 39.
striginervis ZETT. 334.
strigipes ZETT. 708.
strigosa FABR. 691.
strigulipes VERR. 165.
striolata FALL. 724.
striolata ZETT. 724.
Strobilii ROND. 196.
Strobli BECK. (*Chil.*) 39.
Strobli BECK. (*Pho.*) 171.
Strobli VERR. 165.
Stroblii MEK. 683.
Stroblii STEIN. 665.
stulta ZETT. 246.
stupida BECK. 39.
stupida MEIG. 320.
stupida WCLP. 310.
stupida ZETT. 708.
stygia MEIG. 665.
stygia STROBL. 724.
stygina R.-D. 275.
stygicus NEWM. 98.
stylata B. B. 377.
stylifera POK. 555.
stylosa PAND. 298.
styriaca POK. 698.
suavissima LW. 417.
subaenea R.-D. 250.
subalpina ROND. 35.
subapennina ROND. (*O.*) 553.
subapennina ROND. (*Z.*) 52.
subcalva PAND. 694.
subcineta ZETT. 372.
subcoleoprata F. 578.
subcoleoprata L. 584.
subcoleoprata PAND. 579.
subdentatum GR. 587.
subcylindrica PORT. 454.
subfasciata MEIG. (*Pla.*) 187.
subfasciata MEIG. (*Ta.*) 353.
subfasciata ROND. 329.
subfasciatus ROND. 121.
subfascinervis ZETT. 624.
subfascinervis ZETT. 648.
subglabra R.-D. 248.
subjoceps WALK. 596.
sublutea R.-D. 422.
submetallica MACQ. 163.
submetallica R.-D. 528.
submetallicus ROND. 121.
subnatus R.-D. 177.
subnitida MACQ. 665.
subpellucens ZETT. 666.

- subpellucida Lw. 458.
 subpetiolata ROND. 402.
 subpilosa R.-D. 191.
 subpruinosa ZETT. 254.
 subpuncta FALL. 648.
 subpuncta FALL. 648.
 subquadrifasciata ZET. 173.
 subrostratus ZETT. 630.
 subrotunda MACQ. 333.
 subrotunda R.-D. (Ac.) 333.
 subrotunda R.-D. (My.) 451.
 subrotundata MACQ. 451.
 subrotundata R.-D. (Aec.) 253.
 subrotundata R.-D. (Phr.) 275.
 subrotundata ROND. 441.
 subsecuta WALK. 648.
 subsessilis LL. 157.
 subtesselata ZETT. 648.
 subtilis BECK. 133.
 subtracta WALK. 687.
 subulata PAND. 492.
 subtilis R.-D. (Lu.) 541.
 subtilis R.-D. (Phr.) 275.
 subtilis R.-D. (Ta.) 345.
 subvittata BRULLÉ. 724.
 succinata MEIG. (Ep.) 261.
 succinata MEIG. (Tr.) 269.
 succinata MEIG. (Wa.) 376.
 suda ROND. 608.
 sudeticus SCHNABL. 627.
 suffusa MEIG. 466.
 suggesta PAND. 365.
 sagittatæ R.-D. 604.
 scillorum R.-D. 633.
 sulcans ROND. 708.
 sulcata R.-D. 482.
 sulcatus BECK. 165.
 sulcella ZETT. 730.
 sulcitibius ROND. 138.
 subcæntis ZETT. 730.
 sulphuripes MEIG. 177.
 sumptuosa R.-D. (Lu.) 535.
 sumptuosa R.-D. (Lu.) 511.
 Sundewalli ZETT. 627.
 supera WALK. 648.
 superba BECK. 39.
 superba Kow. 188.
 superba R.-D. 254 et 282.
 superbiens MULL. 140.
 superciliata ROND. 31.
 superciliosa Lw. 681.
 superuncta PAND. 724.
 suppleus WALK. 588.
 sarda ROND. 674.
 sarda STROBL. 675.
 surda ZETT. 674.
 suspecta Lw. 565.
 suspecta PAND. 215.
 susurreans R.-D. 236.
 susurreans ROND. 246.
 suturata ROND. (Chaa.) 392.
 saturata ROND. (Lispa) 681.
 sybarita FABR. 448.
 sybarita MEIG. 415.
 sylc.— V. silv.—
 synophthalma R.-D. 442.
 syrphoides FALL. 53.
 tabaniforme FABR. 504.
 tabanoides JAENX. 98.
 tabanoides MÖTSCH. 93.
 tabida MEIG. (Anth) 708.
 tabida MEIG. (Bac.) 81.
 Tacchettii ROND. (Erm.) 216.
 Tacchettii ROND. (Par.) 5.
 Tacchettii ROND. (St.) 456.
 tachinaria MEIG. 381.
 tachinarium ZETT. 507.
 tachinarius FALL. 426.
 tachiniformis ZETT. 459.
 tachinoides FALL. 442.
 taeniata MEIG. (Co.) 310.
 taeniata MEIG. (Sph.) 75.
 taeniata PANZ. 574.
 taeniata WALK. 73.
 taeniatum MEIG. 507.
 taeniatas MEIG. 3.
 taenionota MEIG. 353.
 taeniops WIED. 99.
 taeniopus MIK. 99.
 Tamara PORT. 238.
 taphicus WIED. 98.
 tarandi Cl. 557.
 tarandi L. 585.
 tarda MEIG. 131.
 tardata R.-D. 337.
 tarditas HARR. 38.
 tarsalis BOHEM. 459.
 tarsalis Lw. 138.
 tarsalis MACQ. 97.
 tarsalis R.-D. (Cor.) 743.
 tarsalis R.-D. (Lisp.) 681.
 tarsalis SCHUMM. 46.
 tarsata MACQ. 37.
 tarsata MEIG. 18.
 tarsatus ROND. 5.
 tarsatus ZETT. 70.
 tarsella ZETT. 743.
 tarsilimbria PAND. 724.
 Tau SCHRANK. 604.
 teale WALK. 687.
 tegularia WIED. 542.
 Telestio WALK. 354.
 tenera MEIG. 275.
 tenera PAND. 245.
 tenera R.-D. 245.
 teneraria R.-D. (Pho.) 320.
 teneraria R.-D. (Phr.) 275.
 teneraria R.-D. (Sar.) 477.
 tenerata R.-D. 345.
 temperata MEIG. 708.
 tempestiva FALL. 604.
 tempta WALK. 694.
 tenula Scop. 412.
 tenax LAMP. 113.
 tenax L. 101.
 tenax MACQ. 353.
 tenax R.-D. 345.
 tenebricosa MEIG. 408.
 tenebricosa R.-D. (Phr.) 275.
 tenebricosa R.-D. (Sa.) 477.
 tenebricosa R.-D. (Sa.) 487.
 tenella R.-D. 480.
 tenera MEADE. 708.
 tenera R.-D. 541.
 tenera ZETT. 708.
 tentaculata DEG. 681.
 tentaculatum PAND. 402.
 tenthredinicora T.-T. 346.
 tenthredinum B. B. 308.
 tenthredinum HART. 301.

- lentiginosa* PAND. 743.
lentipalpis ZETT. 681.
lentisetosa FOR. 624.
lentiventris ZETT. 694.
lentus HARR. 87.
leptira MEIG. 572.
leptocodes PAND. 395.
leptoda R.-D. (*Lat.*) 535.
leptoda R.-D. (*Lyp.*) 290.
leptobranis ROND. 708.
leves R.-D. (*Lat.*) 535.
leves R.-D. (*Lat.*) 541.
leves R.-D. (*On.*) 553.
leves R.-D. (*Pa.*) 346.
leptostrostris PAND. 492.
tergestina ROND. 566.
tergestina SCHN. (*Ho.*) 502.
tergestina SCHN. (*My.*) 424.
tergina ZETT. 708.
terioloensis FOR. 698.
terminalis MACQ. (*Exc.*) 254.
terminalis MACQ. (*Pho.*) 520.
terminalis MEIG. 295.
terminalis R.-D. (*Exc.*) 220.
terminalis R.-D. (*Exc.*) 254.
terminalis ROND. 708.
terminalis STROBL. 164.
terminalis THOMS. 165.
terminalis WIED. 63.
terminata R.-D. 292.
terraenovae MACQ. (*Ca.*) 547.
terraenovae MACQ. (*Pho.*) 531.
terraenovae R.-D. 530.
terraenovae EGG. 216.
tessellans PAND. 208.
tessellans R.-D. (*Exc.*) 217.
tessellans R.-D. (*Mi.*) 297.
tessellata BIG. 544.
tessellata B. B. 216.
tessellata EGG. 452.
tessellata FABR. (*Eud.*) 198.
tessellata FABR. (*Stom.*) 612.
tessellata MACQ. (*Ca.*) 367.
tessellata MACQ. (*Hydr.*) 621.
tessellata MACQ. (*Mo.*) 284.
tessellata MACQ. (*Pho.*) 320.
tessellata MACQ. (*Pho.*) 316.
tessellata MEIG. 198.
tessellata PAND. 466.
tessellata R.-D. (*Del.*) 744.
tessellata R.-D. (*On.*) 553.
tessellata R.-D. (*Pho.*) 574.
tessellata R.-D. (*Poll.*) 525.
tessellata R.-D. (*Rhi.*) 465.
tessellata R.-D. (*Sar.*) 477.
tessellata ZETT. 200.
tessellatum MEIG. 507.
tessellatum MEIG. 221.
testacea DEG. 624.
testacea FABR. 624.
testacea GIMM. 730.
testacea MACQ. (*Cocn.*) 743.
testacea MACQ. (*Dec.*) 446.
testacea PANZ. 88.
testacea R.-D. (*Act.*) 387.
testacea R.-D. (*Ba.*) 383.
testacea R.-D. (*Ech.*) 193.
testacea R.-D. (*Eg.*) 695.
testacea R.-D. (*Fro.*) 394.
testacea R.-D. (*Gio.*) 366.
testacea R.-D. (*Hydr.*) 687.
testacea R.-D. (*My.*) 422.
testacea R.-D. (*My.*) 423.
testacea R.-D. (*Palus.*) 743.
testacea R.-D. (*Phil.*) 665.
testacea R.-D. (*Rhi.*) 524.
testacea R.-D. (*Wi.*) 232.
testacea VALL. 432.
testacea WALK. 624.
testaceicornis v. ROS. 570.
testaceifrons v. ROS. 571.
testacolateralis MACQ. 354.
testaceus MEIG. 3.
testaticornis ROND. (*Chi.*) 26.
testaticornis ROND. (*Exc.*)
 139.
testaticornis ROND. (*Mos.*)
 284.
tetra MEIG. 695.
tetra PAND. 632.
tetraptera ZETT. 196.
tetrapterum MEIG. 328.
tetrastigma MEIG. 618.
tetrella R.-D. 477.
tetripunctata DUF. 494.
Thala WALK. 433.
thalassina MEIG. (*Musc.*) 609.
thalassina MEIG. (*Lu.*) 542.
thelarium SCUD. 241.
Thomsoni BECK. 163.
thoracica MEIG. (*Pho.*) 171.
thoracica MEIG. (*Web.*) 564.
thoracica PAND. 330.
thoracica R.-D. (*Chlor.*) 708.
thoracica R.-D. (*Lat.*) 541.
thoracicus R.-D. 208.
thymastri FABR. 1.
thymastri PANZ. 1.
tibialis FALL. (*Par.*) 4.
tibialis FALL. (*Pel.*) 401.
tibialis MACQ. (*Anth.*) 724.
tibialis MACQ. (*Care.*) 236.
tibialis MACQ. (*Chort.*) 709.
tibialis MACQ. (*Cocn.*) 743.
tibialis MACQ. (*Lispa.*) 681.
tibialis MACQ. (*Macq.*) 406.
tibialis R.-D. (*Act.*) 392.
tibialis R.-D. (*Act.*) 392.
tibialis R.-D. (*Act.*) 668.
tibialis R.-D. (*Exc.*) 213.
tibialis R.-D. (*Euph.*) 624.
tibialis R.-D. (*Exc.*) 254.
tibialis R.-D. (*Haem.*) 612.
tibialis R.-D. (*Hel.*) 743.
tibialis R.-D. (*Hydr.*) 687.
tibialis R.-D. (*Hydr.*) 695.
tibialis R.-D. (*Macq.*) 406.
tibialis R.-D. (*Mos.*) 284.
tibialis R.-D. (*Pec.*) 294.
tibialis R.-D. (*Phor.*) 320.
tibialis v. ROS. 424.
tibialis STAEG. 668.
tibiaria ROND. 695.
tibifella ZETT. 183.
Ticlii SCHNABEL. 624.
Ticlii STROBL. 376.
tigrina AM STEIN. 675.
tigrina FABR. 743.
tigrina MEIG. 648.
tinca HARR. 45.
tinida R.-D. (*Lyd.*) 292.

- timida* R.-D. (*Phr.*) 275.
tineta R.-D. 288.
tineta MEIG. 302.
tineta ZETT. 648.
tineticornis ROND. 431.
tinicipennis HEND. 242.
tinicipennis ROND. 624.
tinia WALK. 724.
tirolensis ROND. 648.
tilillator CLARK. 591.
Titornius WALK. 354.
tomentosa ROND. 580.
tomentosa R.-D. (*Lac.*) 535.
tomentosa R.-D. (*Phr.*) 320.
tomentosa R.-D. (*Poll.*) 528.
tomentosa R.-D. (*Sl.*) 456.
tomentosum G.-T. 149.
tonitruum WIED. 675.
tonsa LW. 463.
topiarius MEIG. 72.
topiarius WALK. 63.
topiarius ZETT. 70.
torventialis ROND. 681.
torrida WIED. 744.
torridus WALK. 99.
topta WALK. 354.
torvus O.-S. 70.
toxoneura MACQ. 553.
tragica MEIG. 396.
tranquilla R.-D. (*Er.*) 251.
tranquilla R.-D. (*Phr.*) 275.
transfugus FABR. 57.
transfugus ZETT. 51.
transfugus L. 112.
transgressa ZETT. 709.
transiens WALK. 634.
transita R.-D. 275.
transsylvanica MIK. 413.
transversa FALL. 709.
transversa MACQ. 371.
transversa MEADE. 709.
transversa STROBL. 709.
transversalis MEIG. 118.
transversalis ZETT. 724.
transvittatum PAND. 401.
trapae R.-D. (*Hydr.*) 687.
trapae R.-D. (*Linn.*) 675.
trapezina ZETT. 724.
trapezoides BECK. 165.
trapezoides MEADE. 724.
trapezoides ROND. 724.
trapezoides ZETT. 725.
trapezicensis STROBL. 119.
trilineatus HARR. 109.
tremula L. 412.
tremula R.-D. (*Car.*) 236.
tremula R.-D. (*Phr.*) 275.
tremulae R.-D. 412.
trepida MEIG. 371.
trepida R.-D. (*Phr.*) 275.
trepida R.-D. (*Pl.*) 302.
triangula FALL. 675.
triangula MEIG. 675.
triangula ROND. 675.
triangularis ZETT. 131.
triangulata LW. 457.
triangulifer ZETT. 71.
triangulifera BOHEM. 675.
triangulifera MEADE. 665.
triangulifera ROND. (*Bil.*) 441.
triangulifera ROND. (*Hom.*) 665.
triangulifera ZETT. (*Er.*) 675.
triangulifera ZETT. (*Bil.*) 440.
trianguliferus ZETT. 5.
trianguligera ZETT. 675.
tricusatum MACQ. 151.
trichodaetyla ROND. 725.
trilineata FALL. 220.
tricineta MEIG. (*Ma.*) 408.
tricineta MEIG. (*Pe.*) 83.
tricineta R.-D. 218.
tricineta ROND. 375.
tricinctum ROND. 146.
tricinctus FALL. 71.
triciugulata STROBL. 500.
triciugulata ZETT. 243.
tricolor BIG. 51.
tricolor FABR. 137.
tricolor LW. (*Eu.*) 136.
tricolor LW. (*Mall.*) 114.
tricolor MEIG. (*Er.*) 100.
tricolor MEIG. (*Eu.*) 138.
tricolor MIK. 402.
tricolor PODA. 92.
tricolor POK. 744.
tricolor PORT. 444.
tricolor ZETT. 744.
tricondyla ROND. 195.
tricuspis MEIG. 517.
tridens BIG. 709.
tridens LW. 156.
trifaria R.-D. (*Hel.*) 497.
trifaria R.-D. (*Ma.*) 520.
trifaria ZELL. 363.
trifasciata B. B. 246.
trifasciata MACQ. (*Hel.*) 497.
trifasciata MACQ. (*Rbi.*) 454.
trifasciata SAY. 447.
trifasciata SCOP. 93.
trifasciata STROBL. 500.
trifasciatus STROBL. 61.
trigonalis MEADE. 624.
trigonalis MEIG. 624.
trigonifera ZETT. 675.
trigonigaster PAND. 725.
trigonogramma CZERNY. 624.
trigonomaculata MACQ. 725.
trigonomaculata V. ROS. 648.
trigonospila CZERNY. 624.
trigonostigma CZERNY. 624.
trigonota ZETT. 675.
trilinea HARR. 109.
trilinea MEIG. 733.
trilineata MEIG. 459.
trilineata STEIN. 676.
trilinecella ZETT. 744.
trimaculata BOUCHÉ. 624.
trimaculata MEIG. 321.
trimaculata RUP. 323.
trimacronata PAND. 654.
trina WIED. 354.
trinacina BIG. 431.
trinervis BECK. 171.
triplosia MEIG. 665.
triplex LW. 725.
triquetra FALL. 668.
triquetra MACQ. 668.
triquetra WIED. 668.
triseria PAND. 246.

- triseolata* STEIN, 726.
trisetata PAND, 246.
tristricata HOLMGR, 739.
tristiola ZETT, 675.
tristis BIG, 634.
tristis FABR, 97.
tristis HERBST, 578.
tristis LW, 20.
tristis MEIG. (*Anth.*) 725.
tristis MEIG. (*Mus.*) 405.
tristis MEIG. (*Ple.*) 8.
tristis R.-D. (*Alm.*) 394.
tristis R.-D. (*Be.*) 382.
tristis R.-D. (*Car.*) 744.
tristis R.-D. (*Ec.*) 251.
tristis R.-D. (*Nc.*) 258.
tristis R.-D. (*Phc.*) 275.
tristis R.-D. (*Sar.*) 477.
tristis R.-D. (*Sar.*) 480.
tristis R.-D. (*Sar.*) 487.
tristor HAER, 11 et 128.
tristriata STEIN, 695.
tristriata BECK, 39.
tritaeniata ROND, 246.
triticipes STEIN, 725.
triumphalis R.-D, 609.
trivittata ZETT, 687.
trivittatus FABR, 109.
trivittatus MEIG, 109.
trixina ZETT, 563.
trivialis WALK, 447.
trizonata ZETT, 320.
trochanderata ZETT, 169.
trochanteratus BECK, 165.
trochanteratus A. COSTA, 121.
trochantericus A. COSTA, 121.
troglydytes ZETT, 683.
Trollii ZETT, 731.
trompe CL, 557.
trompe L, 557.
trompe RATZ, 556.
tropica MEIG, 34.
truncata ZETT, 215.
truncatus ROND, 135.
Trouquii ROND. (*Eu.*) 138.
Trouquii ROND. (*Fe.*) 459.
tuberculata ROND, 654.
tuberculata ZETT, 665.
tuberculatus MACQ, 127.
tuberculatus ROND. (*Eu.*) 138.
tuberculatus ROND. (*Me.*) 118.
tuberculatus STROBL, 632.
tubericola FR, 173.
tuberosa CURT, 665.
tuberosa PAND, 492.
tultschensis B. R, 246.
tumescens LW, 16.
tunicata ZETT, 709.
tumidilabris BECK, 39.
turbidus WALK, 71.
turpis ZETT, 625.
turrita MEIG, 298.
tyana WALK, 725.
Tyche WALK, 354.
typhaecola R.-D, 282.
tytolaensis MEIX, 630.
uliginosa FALL. (*Lispa*) 681.
uliginosa FALL. (*Musca*) 648.
ulmaria ROND, 799.
ulmicola LABOULE, 625.
Ulrichi BRACHER, 557.
ultimus BECK, 165.
umbellatarum FABR, 71.
umbellatarum MEIG, 62.
umbellatarum R.-D, 725.
umbellatarum MACQ, 62.
umbraeulata FABR, 604.
umbra STORM, 625.
umbra ZETT, 581.
umbratica FALL, 457.
umbratica MEIG. (*Anth.*) 634.
umbratica MEIG. (*Ple.*) 455.
umbrimargo BECK, 189.
umbriverris ZETT, 221.
umbriverris MEIG, 582.
umbriverris R.-D, 483.
umbriverris ROND, 577.
umbriverris ZETT, 733.
umbrisqueama BECK, 39.
umbrisqueama ZETT, 675.
umbrosa R.-D, 541.
umbrosa SCHL, 665.
umbrosa ZETT, 408.
uncinaria PAND, 492.
uncinata ROND, 339.
uncinatus PAND, 426.
uncipes ROND, 138.
undulata VOEL, 172.
unguiculata HERB, 268.
ungulans PAND, 521.
ungulata PAND, 492.
ungulata ROND, 683.
unicarata BECK, 172.
unicellata PAND, 695.
unicingulata BOSSH, 354.
unicolor BRULL, 725.
unicolor CURT, 57.
unicolor FALL, 356.
unicolor MACQ. (*Eu.*) 215.
unicolor MACQ. (*Mus.*) 284.
unicolor MACQ. (*Mel.*) 59.
unicolor MACQ. (*Sar.*) 492.
unicolor ROND. (*Al.*) 589.
unicolor ROND. (*Mel.*) 49.
unicolor ROND. (*Pha.*) 578.
unicolor ZETT, 165.
unifasciata STROBL, 87.
unifasciatus ZETT, 71.
unilincata ZETT, 639.
unispinosa ZETT, 172.
unistriata ZETT, 799.
univittata v. Ros, 709.
urvia WALK, 553.
urbana HAER, 382.
urbana MEIG. (*Anth.*) 648.
urbana MEIG. (*Chil.*) 37.
urbana MEIG. (*Phc.*) 169.
urbana MEIG. (*Phc.*) 275.
urbana R.-D, 276.
urens R.-D, 535.
uripera v. Ros, 579.
uroleuca PAND, 682.
ursina MEIG, 199.
ursula ERICH, 725.
usta R.-D. (*Xyl.*) 498.
usta R.-D. (*Pyr.*) 698.
usta ZETT, 327.
ustipennis ROND, 649.

- ustus* WOLL. 102.
uterinus GRO. 594.
uticola MACQ. 254.
uniformis BECK. 39.
vacans PAND. 695.
vaccarum BOUCHÉ. 745.
vaccarum DUB. 655.
vaccina R.-D. 604.
vaccinii SINTEN. 378.
vacuua FALL. 446.
vaccua MEIG. 363.
vaccua R.-D. 363.
vaccua ROND. 420.
vaccuus SCOP. 70.
vafra R.-D. 276.
vaga R.-D. (*Cl.*) 570.
vaga R.-D. (*Lac.*) 541.
vaga R.-D. (*Mg.*) 420.
vaga R.-D. (*Mgior.*) 451.
vaga R.-D. (*Ph.*) 276.
vaga R.-D. (*Sar.*) 477.
vaga R.-D. (*Sar.*) 487.
vagabunda MEIG. (*Macq.*) 408.
vagabunda MEIG. (*Poll.*) 528.
vagabunda MEIG. (*Ta.*) 346.
vagans FALL. 625.
vagans MEIG. (*Err.*) 218.
vagans MEIG. (*Ph.*) 575.
vagans MEIG. (*Sar.*) 492.
vagans R.-D. (*Sar.*) 477.
vagans R.-D. (*Sar.*) 477.
vagans R.-D. (*Ta.*) 337.
vagans SCHM. 212.
vagans STROBL. 625.
vagatoria R.-D. (*Musc.*) 604.
vagatoria R.-D. (*Phaen.*) 625.
vaginicornis SCHRANK. 157.
vaga R.-D. 205.
valentina MULL. 95.
valga ZETT. 601.
valgus PANZ. 127.
valgus ZETT. 127.
valida R.-D. (*Lac.*) 535.
valida R.-D. (*Ph.*) 276.
valida R.-D. (*Tac.*) 346.
valida R.-D. (*Thel.*) 436.
valida R.-D. (*Sar.*) 483.
valida ROND. 220.
validicornis ZETT. 285.
validus MEIG. 118.
vallata MEIG. 354.
vallina ROND. 426.
vana ZETT. (*Cl.*) 675.
vana ZETT. (*Pip.*) 12.
van der Wulpii SCHNABL. 649.
vaussae R.-D. (*Er.*) 296.
vaussae R.-D. (*Ph.*) 276.
vaussae R.-D. (*St.*) 228.
vana PANZ. 123.
varensis R.-D. (*Musca*) 604.
varensis R.-D. (*Poll.*) 528.
varia MEIG. (*Anth.*) 676.
varia MEIG. (*Err.*) 218.
varia MEIG. (*Ph.*) 574.
varia MEIG. (*Poll.*) 528.
varia R.-D. 310.
variabilis FALL. 630.
variabilis MALM. 92.
variabilis PANZ. 39.
variabilis R.-D. 447.
variabilis ZETT. 639.
varians BECK. 40.
varians ROND. 8.
varians WIED. 543.
varians ZETT. 627.
variata FALL. 695.
varicolor MEIG. 725.
varicolor PAND. 725.
variegata MEIG. 625.
variegata STEIN. 675.
varicornis MACQ. 215.
variegata MEIG. (*Tri.*) 439.
variegata MEIG. (*Wl.*) 232.
variegata SCOP. 477.
varinercis R.-D. 483.
varipalpis MACQ. (*Macq.*) 405.
varipalpis MACQ. (*Ph.*) 320.
varipes BIG. (*Orf.*) 16.
varipes BIG. (*Par.*) 5.
varipes CURT. 17.
varipes MEIG. (*Pi.*) 165.
varipes MEIG. (*Pi.*) 8.
varipes POK. 709.
varipes STROBL. (*Anth.*) 709.
varipes STROBL. (*Er.*) 380.
varius MEIG. 133.
varius ROND. 121.
velox B. B. 514.
velox LW. 121.
velox MACQ. 354.
velox PAND. 454.
velox R.-D. (*An.*) 403.
velox R.-D. (*Car.*) 238.
velox R.-D. (*Er.*) 254.
velox R.-D. (*On.*) 553.
velox R.-D. (*Phor.*) 307.
velox R.-D. (*Phor.*) 318.
velox R.-D. (*Phor.*) 316.
velox R.-D. (*Ph.*) 276.
velox R.-D. (*Sar.*) 477.
velox R.-D. (*St.*) 457.
velox R.-D. (*Ta.*) 346.
velutina LW. 40.
velutina MEIG. 181.
velutina R.-D. 655.
velutina STROBL. 655.
velutinus MACQ. 167.
velutinus WILL. 54.
venosa BECK. 30.
venosa LW. 40.
venosa MEIG. 466.
venosa ROND. 649.
ventralis R.-D. (*Limn.*) 205.
ventralis R.-D. (*Ta.*) 346.
ventralis STEIN. 709.
venusta MEIG. 233.
venusta ROND. 16.
venusta R.-D. (*Euph.*) 609.
venusta R.-D. (*Lac.*) 535.
venusta R.-D. (*Lac.*) 541.
venustus MEIG. 71.
verax R.-D. 346.
verecunda ROND. 280.
verecunda WULP. 408.
verna FABR. 683.
verna PAND. 683.
vernale CL. 588.
vernale LW. 151.
vernalis FALL. 40.

- vernalis* CURT. 188.
vernalis MACQ. 454.
vernalis MEG. (*Chil.*) 39.
vernalis MEG. (*Macq.*) 498.
vernalis R.-D. (*Ct.*) 725.
vernalis R.-D. (*Car.*) 236.
vernalis R.-D. (*Cl.*) 571.
vernalis R.-D. (*Del.*) 695.
vernalis R.-D. (*Eud.*) 198.
vernalis R.-D. (*Exc.*) 254.
vernalis R.-D. (*Go.*) 366.
vernalis R.-D. (*Haem.*) 612.
vernalis R.-D. (*Lat.*) 535.
vernalis R.-D. (*Mel.*) 323.
vernalis R.-D. (*Myd.*) 649.
vernalis R.-D. (*Op.*) 551.
vernalis R.-D. (*Pal.*) 313.
vernalis R.-D. (*Pol.*) 201.
vernalis R.-D. (*Phor.*) 316.
vernalis R.-D. (*Phy.*) 256.
vernalis R.-D. (*Phr.*) 276.
vernalis R.-D. (*Poll.*) 528.
vernalis R.-D. (*Rhin.*) 466.
vernalis R.-D. (*Sar.*) 477.
vernalis R.-D. (*Sar.*) 477.
vernalis R.-D. (*Ta.*) 346.
vernalis R.-D. (*Tam.*) 569.
vernalis R.-D. (*Zen.*) 280.
vernalis ROND. 37.
vernulaides G.-T. 149.
Verrilliana MUR. 34.
Verrillii STEIN. 665.
versicolor FABR. 111.
versicolor FALL. 392.
versicolor MALM. 110.
versicolor MEG. (*Anth.*) 709.
versicolor MEG. (*Das.*) 605.
versipellis PAND. 626.
versuta Lw. 201.
verticalis MEG. 371.
verticella ZETT. 745.
verticina ZETT. 684.
vertiginosa FALL. 359.
vesana R.-D. (*Phr.*) 276.
vesana R.-D. (*Pr.*) 302.
vesana R.-D. (*Ta.*) 346.
vesparia MEADE. 665.
vespertina FALL. 634.
vespertina ROND. 610.
vespiforme DEG. 143.
vespiforme L. 141.
vespiformis GOR. 152.
vespiformis LATR. 158.
vespillo FABR. 528.
vestita R.-D. 582.
vestita ROND. 332.
vestitus BECK. 165.
vetorana ZETT. 626.
veternas CL. 597.
veternas JOL. 597.
veterrima ZETT. 676.
vetula MEG. 256.
vetula ZETT. (*Anth.*) 687.
vetula ZETT. (*Cl.*) 725.
vetusta MACQ. 415.
vetusta MEG. 408.
vetusta B. B. 591.
vianna WALK. 726.
viarum R.-D. (*Op.*) 553.
viarum R.-D. (*Phaon.*) 626.
viarum R.-D. (*W.*) 232.
viatica MEG. 520.
viatica R. D. (*Del.*) 695.
viatica R.-D. (*Mel.*) 323.
viatica R.-D. (*Poll.*) 528.
viatica R.-D. (*Wa.*) 374.
viaticus FABR. 121.
viaticus R.-D. 480.
vibripennis ROND. 455.
vibrissata ROND. 303.
vibrissata ZETT. 314.
vicarius SCHN. 730.
vicina CZERNY. 649.
vicina MACQ. (*Anth.*) 726.
vicina MACQ. (*Neur.*) 224.
vicina MACQ. (*Ph.*) 173.
vicina MACQ. (*Sar.*) 492.
vicina MACQ. (*Zo.*) 412.
vicina R.-D. (*Call.*) 547.
vicina R.-D. (*Del.*) 695.
vicina R.-D. (*Esth.*) 443.
vicina R.-D. (*Go.*) 363.
vicina R.-D. (*Lat.*) 535.
vicina R.-D. (*Myd.*) 423.
vicina R.-D. (*Phr.*) 276.
vicina R.-D. (*Ta.*) 337.
vicina VILL. 492.
vicina ZETT. (*Anth.*) 626.
vicina ZETT. (*Chil.*) 41.
vicina ZETT. (*Ta.*) 354.
vicinialis PAND. 287.
vicinus BECK. 165.
vicinus MACQ. 208.
victrix R.-D. 535.
vidua EGG. 362.
vidua MEG. (*Chil.*) 22.
vidua MEG. (*Ta.*) 338.
vidua ROND. (*Mel.*) 410.
vidua ROND. (*Ph.*) 12.
viduata L. 20.
viduata MACQ. 19.
viduata MEG. 289.
viduata SCHN. 22.
viduata WALK. 19.
viduata ZETT. 665.
viduella ZETT. 186.
vigil R.-D. (*Phr.*) 276.
vigil R.-D. (*Ta.*) 346.
vigilans R.-D. (*Car.*) 234.
vigilans R.-D. (*Mel.*) 512.
vilis ZETT. (*Anth.*) 649.
vilis ZETT. (*Tach.*) 354.
villana R.-D. (*Macq.*) 521.
villana R.-D. (*Myd.*) 423.
villana R.-D. (*Phaon.*) 626.
villana R.-D. (*Phr.*) 276.
villana R.-D. (*Sar.*) 477.
villana R.-D. (*Sar.*) 480.
villana R.-D. (*Ta.*) 348.
villana R.-D. (*Xy.*) 569.
villanota R.-D. 506.
Villeneuvei PAND. 668.
villuca MEG. 710.
villuca R.-D. (*Macq.*) 408.
villuca R.-D. (*Myd.*) 423.
villuca R.-D. (*Phr.*) 320.
villuca R.-D. (*Phr.*) 276.
villuca R.-D. (*Sar.*) 484.
villuca R.-D. (*Ta.*) 337.
villuca ZETT. 255.

- villicornis* ZETT. 354.
villipes LW. 96.
villipes ROND. 745.
villipes ZETT. 726.
villosa MACQ. 173.
villosa R.-D. 369.
villosa v. ROS. 168.
villositarsis PAND. 619.
villosus HEND. 631.
vinosa R.-D. 276.
vinosa R.-D. 232.
violacea GRAM. 543.
violacea MACQ. (*Lac.*) 608.
violacea MACQ. (*Poll.*) 529.
violacea MEIG. (*All.*) 581.
violacea MEIG. (*Call.*) 547.
violacea MEIG. (*Chry.*) 17.
violacea R.-D. (*Bys.*) 604.
violacea R.-D. (*Mel.*) 461.
violaceozonata PALMA. 41.
violucina R.-D. (*Lac.*) 535.
violucina R.-D. (*Poll.*) 528.
virens FABR. 7.
virescens BRAUER. 117.
virescens LW. 21.
virescens MACQ. (*Anth.*) 726.
virescens MACQ. (*Ma.*) 285.
virescens MACQ. (*Poll.*) 529.
virescens R.-D. 335.
virgatus COQ. 110.
virginica MEIG. (*Anth.*) 695.
virginica MEIG. (*Tach.*) 354.
virgo MEIG. 193.
virgo R.-D. (*Lac.*) 535.
virgo R.-D. (*Mel.*) 324.
virgo R.-D. (*Phr.*) 276.
virgo R.-D. (*Sar.*) 477.
virgo ROND. 18.
virgo VILL. 676.
viridana R.-D. (*Lac.*) 535.
viridana R.-D. (*Ma.*) 406.
viridescens GIMM. 522.
viridescens PORTSCH. 605.
viridescens R.-D. (*Ca.*) 547.
viridescens R.-D. (*Egle.*) 726.
viridescens R.-D. (*Ern.*) 213.
viridescens R.-D. (*Lac.*) 609.
viridescens R.-D. (*Ma.*) 405.
viridescens R.-D. (*Oph.*) 656.
viridescens R.-D. (*Pol.*) 313.
viridescens VILL. 454.
viridiganea R.-D. (*Eaph.*) 609.
viridiganea R.-D. (*On.*) 553.
viridis COQ. 96.
viridis FALL. 210.
viridis R.-D. (*Eaph.*) 609.
viridis R.-D. (*Lac.*) 535.
viridiventris MACQ. 285.
viridula R.-D. (*Pos.*) 605.
viridula R.-D. (*Eaph.*) 609.
viridula R.-D. (*Lac.*) 541.
viridula R.-D. (*On.*) 553.
viridulans R.-D. (*Erc.*) 217.
viridulans R.-D. (*Lac.*) 541.
viridulans R.-D. (*On.*) 553.
viridulans WALK. 408.
virilis ROND. 293.
virica MEIG. 6.
viripennis MEIG. (*Ba.*) 81.
viripennis MEIG. (*Enc.*) 14.
viripennis MEIG. (*Hyl.*) 174.
viripennis MEIG. (*Musc.*) 604.
viripennis MEIG. (*Syr.*) 72.
viripennis ROND. 389.
viripennis STROBL. (*Chor.*) 21.
viripennis STROBL. (*Ch.*) 14.
viripennis STROBL. (*Er.*) 107.
viripennis STROBL. (*Tro.*) 455.
viripennis ZETT. (*All.*) 584.
viripennis ZETT. (*Syr.*) 72.
vittata BRAUER. 470.
vittata O. G. COSTA. 433.
vittata GIR. 578.
vittata MACQ. (*Anth.*) 726.
vittata MACQ. (*Tach.*) 346.
vittata MEIG. (*Go.*) 364.
vittata MEIG. (*Pha.*) 566.
vittata PORT. 133.
vittata R.-D. (*Ar.*) 626.
vittata R.-D. (*Car.*) 745.
vittata R.-D. (*Go.*) 363.
vittata R.-D. (*Pho.*) 531.
vittata SCHUMM. 88.
vittata WILD. 152.
vittata ZETT. (*Hamm.*) 88.
vittata ZETT. (*Pha.*) 188.
vittatus MEIG. 112.
vitticollis ZETT. 676.
vittifera SCHIS. 626.
vittifera ZETT. 619.
vittiger ZETT. 72.
vittigera COQ. 397.
vittigera ZETT. 710.
vittigera ZETT. 710.
vittipennis THOMS. 682.
vittipes ZETT. (*Anth.*) 696.
vittipes ZETT. (*Pip.*) 165.
vitalis FABR. 597.
viva R.-D. 541.
vivax R.-D. (*Ta.*) 346.
vivax R.-D. (*Ta.*) 348.
vivax ROND. 246.
vivida MACQ. (*Er.*) 255.
vivida MACQ. (*Ta.*) 354.
vivida R.-D. (*Act.*) 389.
vivida R.-D. (*Eaph.*) 609.
vivida R.-D. (*Er.*) 255.
vivida R.-D. (*Erc.*) 254.
vivida R.-D. (*Er.*) 252.
vivida R.-D. (*Hyl.*) 695.
vivida R.-D. (*Musc.*) 520.
vivida R.-D. (*Mos.*) 282.
vivida R.-D. (*Mor.*) 601.
vivida R.-D. (*Ny.*) 498.
vivida R.-D. (*Poll.*) 528.
vivida R.-D. (*Pyp.*) 608.
vivida R.-D. (*Sar.*) 488.
vivida R.-D. (*Ta.*) 346.
vivida ROND. 626.
vivida ZETT. 215.
vivipara B. B. 395.
vivipara DEG. 477.
V-nigrum MACQ. 507.
volatica MACQ. 255.
volaticus R.-D. 276.
volets HARR. 447.
volucellina PORTSCH. 141.

- volucris* R.-D. (*Euph.*) 609.
volucris R.-D. (*Eur.*) 255.
volucris R.-D. (*My.*) 452.
volucris R.-D. (*Tach.*) 346.
volvulus F. (*Phyll.*) 434.
volucra F. (*Xyl.*) 128.
vomitorea FABR. 554.
vomitorea HAER. 547.
vomitorea L. 548.
vomiturationis R.-D. 649.
vorax GEOFFR. 63.
vulgare PORTSCH. 144.
vulgaris FALL. (*Aphr.*) 179.
vulgaris FALL. (*Phr.*) 269.
vulgaris R.-D. (*Car.*) 745.
vulgaris R.-D. (*Del.*) 726.
vulgaris R.-D. (*Egle.*) 730.
vulgaris R.-D. (*On.*) 553.
vulgaris R.-D. (*Vor.*) 372.
vulgaris Scop. 102.
vulcrans R.-D. 612.
vulcerata PANZ. 23.
vulcerata SCHN. 493.
vulnerata ZETT. 216.
vulneraticornis ZETT. 224.
ulpina FABR. 600.
ulpina MEIG. (*Chi.*) 41.
ulpina MEIG. (*Vo.*) 92.
vulpinus FALL. 209.
vulpinus MEIG. 102.
Wachtlii MIK. 357.
Wagne GORSK. 144.
Wallii B. B. 449.
Wankowiczii SCHN. 186.
Westermanni ZETT. 245.
Wierzejskii MIK. 687.
Wilhelmi SCHNABL. 649.
Winnertzi B. B. 335.
Winthemi MEIG. (*Peg.*) 710.
Winthemi MEIG. (*Plat.*) 44.
Winthemi SCHN. 710.
Winthemi R.-D. (*Adm.*) 394.
Winthemi R.-D. (*Eur.*) 255.
Winthemi R.-D. (*Ta.*) 348.
Wohlfahrti PORT. 493.
Wolfii KOW. 160.
Walpii B. B. 287.
xanthaspis WIED. 354.
xanthocerus KOW. 166.
xanthogastra ROND. 233.
xanthogastra WIED. 523.
xantholeuca MIK. 92.
xanthoptera BOH. 695.
xanthopus MEIG. 687.
xanthopus THOMS. 166.
xanthopygus LW. 110.
xanthozona STROBL. 180.
xenoprepes LW. 201.
xylostema GIMM. 216.
xyloina Egg. 431.
xyphus PAND. 417.
Yerburii VERR. 153.
Yponomeutae ROND. 380.
Zelleri SCHN. 418.
Zermattensis BECK. 166.
Zetterstedtii BECK. 41.
Zetterstedtii BIDENK. 649.
Zetterstedtii BONSD. 626.
Zetterstedtii FALL. 143.
Zetterstedtii R.-D. (*Di.*) 450.
Zetterstedtii R.-D. (*Sar.*) 184.
Zetterstedtii ROND. (*L.*) 668.
Zetterstedtii ROND. (*Hil.*) 514.
Zetterstedtii ROND. (*Pi.*) 7.
Zetterstedtii SCHN. 84.
Zetterstedtii VERR. 58.
Zetterstedtii ZETT. 186.
zonalis FABR. 96.
zonaria LW. 377.
zonaria PODA. 95.
zonaria R.-D. 255.
zonata MEIG. 385.
zonata R.-D. (*Eur.*) 255.
zonata R.-D. (*Eur.*) 241.
zonata ZETT. (*Anth.*) 719.
zonata ZETT. (*Aphio.*) 480.
zonatus FABR. 96.
zonatus MEIG. 2.
zonatus STROBL. 163.
zonatus ZETT. 166.
zonella ZETT. (*Le.*) 392.
zonella ZETT. (*Syn.*) 562.
Zugmayeriae KOW. 166.
Zugmayeriae MIK. 127.
Zugmayeriae SCHNABL. 626.

ADDENDA ET CORRIGENDA.

VOL. II.

- Pag. 103. Ad genus **Dicctria** adde synonymon:
Methylla HANSEN, Nat. Tidsskr., (3), XIV, 145, (1883).
- .. 105. lin. 10 infra adde speciem:
Kowarzi FRUY., Math. Természeti Közlem., XIII, 368, (1876),
 Hungaria.
- .. 150. lin. 13 supra species **apicatus** Lw. ad gen. **Machimus**
 transferenda est.
- .. 174. lin. 9 infra species **appendiculatus** Mxq. ad gen. **Argyramoeba**
 transferenda est.
- .. 209. lin. 10 infra adde speciem:
nana WOLL., Ann. Mag. N. Hist., (3), 1, 113, t. V, f. 3
 (1858). — Ins. Madeira.
- .. 212. lin. 3 supra adde speciem:
albata COQUILL., Proc. U. S. nation. Museum, XXI, 317,
 (1898). — Japonia.

VOL. III.

- Pag. 51. lin. 3 infra adde:
 ЧУДЭМ., Entom. Monthly Mag., (2), XVII, 14, (1906).
- .. 88. lin. 4 supra pro: *scutellata* lege: *scutellaris*.
- .. 97. lin. 12 supra: *interpunctus* ex synonymis tollendum, quia cum
Hel. transfuga inveniendum.
- .. 99. lin. 2 infra pro: *auricalcicus* lege: *aurichalcicus*.
- .. 113. lin. 20 infra adde:
 SCHRAVK, Beitr. Nat., 34, [*Masca*] (1776).
- .. 115. lin. 8 supra pro: *crystalloides* lege: *crystalloides*.
- .. 128. lin. 5 supra: *tristor* ex synonymis excludendum, quia ad
Pipizani noctilucam recte inveniendum.
- .. 176. lin. 18 supra adde:
 BAES, Ann. Mus. nat. hung., 111, 552, [*Platophora*] (1905).
- .. 227. lin. 9 infra excludere speciem *nigripalpis* Mxq., quia in gen.
Hemimasicerca locanda.
- .. 231. lin. 8 infra pro: *dalanca* lege: *dalanca*.
- .. 236. lin. 9 supra pro: *argyriae* lege: *argyriae*.

- .. 241. lin. 8 infra adde synonymon:
Sericillei R.-D., Myod., 152, 2, [*Phygaei*] (1830).
- Pag. 251. lin. 1 infra exclude synonymon *lucicola* R.-D., quia recte in gen. **Histochoeta** inveniendum.
- .. 254. lin. 16 infra exclude synonymon *superba* R.-D., quia jam in gen. **Masicera** recte inveniendum.
- .. 256. lin. 13 supra tolle *perturbans* Zett., quia jam in **Monochaeta**.
- .. 280. lin. 2 infra exclude speciem *buccata* Meig., quia jam in gen. **Meigenia** recte inveniendum.
- .. 283. lin. 8 infra pro: **intersecta** lege: **intersecta**.
- .. 291. lin. 17 supra pro: *bideus* lege: *bibeus*.
- .. 291. lin. 20 supra exclude synonymon *brevipennis* Meig., quia jam in gen. **Exorista**.
- .. 294. lin. 2 infra pro: *sicala* lege: *sicala*.
- .. 316. lin. 3 supra pro: *agilis* lege: *agilis*.
- .. 319. lin. 4 supra exclude speciem *brunnicornis* Macq., quia jam in gen. **Exorista** adest.
- .. 347. in paginae numeratione pro: 317 lege: 347.
- .. 350. lin. 16 infra exclude speciem *cuticularis* Zett., quia in gen. **Voria** inveniendum.
- .. 380. lin. 1 infra adde patriam: Carinthia.
- .. 433. lin. 20 infra cit. R.-D. ad *compressa* Fabr. referenda, inter synon. **praeceps** Scop.
- .. 453. lin. 3 supra pro: **erythaea** lege: **erythraea**.
- .. 491. lin. 6 infra adde synonymum:
atropos KRAMER (*neo alior.*), Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog.
V. 13, (1905),
incisilobata PAXD., Rev. entom., XV, (1896).
- .. 502. lin. 3 supra pro: *Eurygops* lege: *Eurygops*.
- .. 507. lin. 14 infra adde speciem:
Rüppellii WIED., Aussee, zweifl. Ins., II, 279, 2, (1830),
Aegyptus.
- .. 513. lin. 7 infra exclude speciem:
albofasciata Macq., quia in gen. **Pyrellia** inveniendum.
- .. 541. lin. 8 supra exclude speciem:
hauriens WIED., quia teste Jaenicke in gen. **Meigenia** locanda.
- .. 594. lin. 8 infra pro **asinimus** lege: **asininus**.
- .. 621. lin. 2 infra dele: *pallipes* R.-D. etc.
- .. 628. lin. 20 supra pro: Zett. lege: Meig.
- .. 649. lin. 1 infra pro: Zett. lege: R.-D.
- .. 643. lin. 19 infra pro: **nubianus** lege: **nubiana**.
- .. 643. lin. 9 infra adde:
STALS, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., VII, 281, 63, (1907)

- .. 655. lin. 23 infra adde synonymon:
argentina Buc., Annal. Soc. entom. France, sér. 6. V. 302. I.
 † (1885).
- .. 657. lin. 8 infra adde synonymon:
chilensis Macq., Dipt. exot., II 3. 171. 4. [*Anthomyia*] (1843).
- .. 678. lin. 15 infra adde speciem:
El-Kantarae Beck., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., VII.
 370. 348. (1907). — Africa sept.
- .. 724. lin. 25 infra adde:
lima WALK. = *cilicrura* ROXD.
- .. 746. pro **Fucellinae** lege: **Fucelliinae**.
- .. 748. apud *Aeroptena* pro 688 lege: 683.
- .. 751. apud *Fucellia*, *Fucelliinae* et *Halithea* lege 746 pro 745.
- .. 752. apud *Hylemyia* adde 696 post 688.
- .. 756. apud *Spallanzania* ROXD. lege 346 pro 367.

Microformed by
Preservation
Services

mfm # 5028
2-17-93



SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00882 9517